




BIBLIOTECA NAZ.
Civile Emanuele II
XXX
F
9
NOLI

XXX

XXX
7
9







J. O. JACOBI
MANGETI,
MEDICINÆ DOCTORIS,
& Serenissimi ac Potentiss. REGIS PRUSSIÆ Archiatri,
BIBLIOTHECA
CHIRURGICA,
SIVE

Rerum ad ARTEM MACHAONICAM quoquò modò spectantium

THESAURUS
ABSOLUTISSIMUS;

QUO OMNES PRORSUS HUMANI CORPORIS AFFECTIONES,
Chirurgi Manum, aut aliam aliquam ejusdem Operam exposcentes,
Ordine Alphabetico explicantur;

ET PER CURATIONES, OPERATIONES, CONSILIA, OBSERVATIONES, AC CADAVERUM
Anatomicas inspectiones, è variis,isque præstantissimis Autoribus, Veteribus ac Recentioribus petitas,
abundè; imò & curiosè tractantur. Cum FIGURIS aeneis necessariis.

TOMUS SECUNDUS



GENEVÆ,
Sumptibus CRAMER, PERACHON & CRAMER FILII.

M. DCC. XXI.

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891





JOH. JAC. MANGETI
BIBLIOTHECÆ
CHIRURGICÆ
LIBER QUARTUS

*De Affectibus & Operationibus Chirurgicis à Litera
D incipientibus.*



ECUSSORIUM INSTRV-
MENTVM. *vid. in Trepano,
sub titulo CRANII
FRACTURÆ.*

DEDOLATIO

*Dedolatio apud Galenum significat Cranii incisionē
cum amissione substantia de qua in Cranii Fractura.*

DELIGATIO *per Fascias vid. sub titulo
FASCIATIO.*

DEGLUTITIONIS VITIÆ.

LÆDETUR deglutitio quando t. impeditur, sive
imminuitur & aboletur, vel quando depravatur.
1. œsophagi ex parte: 2. stomachi seu officii ventri-
culi superioris culpa.

Œsophagi vitium est; (1.) quando musculorum
3. patia, fauces sui ampliatione efformantium, un-
cum sphinctere paralyti resolvuntur, (2.) quando ipsa
musculosa ejus tunica simili malo corripitur. De pos-
teriori vid. VVillis. Pharm. raz. vol. 1. pag. 12. de
priori Tulpus lib. 1. observat. 42. (3.) quando angus-
tatur nimis, sive hoc fiat (a) vel à tumoribus tam pro-
priis, quam partium vicinarum. Illud quando infirmatur
Synanchi, aut quando scirrhoso tumore obidetur, aut
quando à catuncula excrecente viisitur. Exempla quo-
rum vid. Rhod. observat. 46. 47. cent. 1. Hoc quando tonil-
la, alpera arteria, aut uvula intumescunt, inflammantur,
&c. Sive hoc fiat (b) 2. ab arcta nimis clausura, & stric-
tura fibrarum ejus, idq. nunc ex spasmo sive convulsio-
ne, quo pertinet hypochondriaci subinde, non secus ac
maliere hysterici, gale adstrictiōnem & contraturam
per nervorum spasmos ob consensum patientes, quod alii
ex vaporibus hypticis ex hypochondriis elatis fauces
stringentibus male derivant, nempe pertinet hæc gu-
le strictura ab atero; cujus mentionem facit Hel-
sli. Chirurg. Tom. II.

mon. Tr. Alth. & Tullis §. 31. Hinc etiam in Epilep-
tico paroxysmo distillatena aut nulla solet esse de-
glutitio. Nunc ex illarum nimia exiccatione in fe-
bris ardentibus continuit. Quo suo modo etiam
pertinet defectus salivæ, deglutitionem plus minus im-
pediens, nunc ex illarum ab assumptis constri-
ctione & corrugatione, quo Hochstetteri facile obser-
vat. decad. 3. cap. 5. adstrictio gulæ ex portu vini mal-
varici, in quo radix consolid. major, infusa fuit. Sive
illud fiat (g) 3. ab obstructione propter deglutita va-
ria aut majora in faucium isthmo sive principio œso-
phagi hærentia, ubi boli majores, aut Persica, ovum
gallinæcum, &c. aut acuta gulæ infixa, ibique non
sui insolita præsentia, quam propter doctorem, & ha-
jus occasione inflammationem aut abscessum, deglu-
titionem impediens, v. gr. ossicula, spinæ piscium,
acicula gulæ infixa.

*Œsophum superius ventriculi sive stomachi in cul-
pa est: quando sit licet, per œsophagi iter demissa,
nihilominus admittere debita secus, id quod sit im-
petialis, quando quæcumq. occasione irritatus sive lacer-
atus, contumacius se stringit & claudit, adeoque assum-
pta ulterius progredi impedit, id quod fit, (a) quando
vel inflammationem, vel velut excoriationem; aut plus mi-
nus exculceratam, vel tumore quocunque, à priori
nullo modo cognoscibili, obessum fuerit, quo facit
curiosa & notabilis observatio Willisi Pharm. raz.
vol. 1. p. 45. (b) quando copiosiores, plus minus acrotes,
flatus in eisdem angustis inclusi fuerint, quorum
intimica præsentia utiturque, speciatim superius,
officium ad pertinacem sui stricturam irritatur. Un-
de assumpta nonnisi difficulter admittit, aut admissa
eadem expiosi flatus eructantes, insequuntur, eoque
plus minus simul aut resistentur, quo facit non ino-
legans observat. Riveii 12. de morbis insequent.
Idem Platei observat. l. 1. pag. 223. (g) Quando qua-
cumque de causa rauseat, aut assumenda horret ven-
triculus, nam & sic officium claudit, non assumptus
sibi*

sibi hostilia. Hac ratione familiare est fabricantibus, quælibet liquida aut esculenta fluida deglutire, sed carnes, ova trixa, vel similia pertinaciter reipuerit, & oblata nullo modo, aut non nisi difficulter admittunt.

Pertinet hæc Amar-Lusitan. cent. 6. cur. 49. ubi post secretum sanguinis, & assumpcionum vomitionem, deglutiendi omnimoda difficultas etiam aquæ, sola vini assumptione salva. conf. *Hildan. com. 5. observ. 34.*

Depravata tandem deglutitio est, 1. quando liquidæ difficultat, solida facili, & contra deglutitur, de quorum affirmum theoria in Philosphicis, ubi de deglutitione pluries actum 2. quando in eodem assumpcionum vel solidorum vel liquidorum genere, quædam facili, quædam difficultat, quædam omnino non deglutiri possunt. De ejus ratione ex superioribus, specialim ex nautica veneticali jam constat.

Quoad Prognosis.

Igitur deglutitio quod magis vel minus tollitur, eo magis periculum vitæ immineat. A paralyti musculorum faucium nata difficilis deglutitio periculosum & difficulter curabile malum est. Quod si ob spirituum movementum defectum, & ad id inginem vitium resolutionem, prout in acutis interdum accidit, malum evenit pessimum signum, & mortis futuræ indicium, si non soluta, quali in lignam vacuum decidat potus. In vultibus si accidat ex convulsione deglutitio læsa, periculosum, sicut alia convulsiones faucium in acutis periculosius, in chronicis minus. Si à tumoribus per se quidem, & ex interna causa naturali oriantur malum per tumorum vel facili vel difficultat, vel omnino non curabilem naturam, prognosticis faciliis est. Sic v.g. ex ulcere oesophagi cancrolo omnimodo, atque lethali deglutiendi in potentia. Sic ob oesophagum cartilagineum factum deglutitio penitus abolita: *Ann. 3. c. M. c. pag. 26. adcoq. lethalis.*

Deglutitæ res alienæ in faucium isthmo vel hærent, vel extra hunc, vel ad ventrem tandem descendunt. Dum in faucibus hærent, præter inimicam sui præsentiam interdum simul dolorem excitant, unde tumor, inflammatio, abscessus, lique vel lethales, de quo vid. *Hild. cent. 1. observ. 35. Item cent. 3. observ. 35. ex ossiculo oesophago infuso, tumor, dolor, febris, inflammatio, mors:* Vel hoc rupto abscessu rei peregrinæ cum pure excretionem, aut descensum faciunt. Confer item *Hild. cent. 1. observ. 35. ubi mulier ossiculum devoratum, quod pene suffocabatur, septimo tandem die, excitata suppuratione, eiecit:* Vel per alii plus minus vicina loca, exitum sibi querunt. Quo facit exemplum notabile *Parvi lib. 2. cap. 29. Chirurgia, de gramini ramulo deglutito, qui postea intercostale spatium erupit.* Item *Hild. cent. 1. observ. 35. ubi spina picis gutturi biennium infixa, post, excitato abscessu, in extrema colli parte extracta.* Dum verò ad ventriculum quocumq; modo descendunt, vel inferioris per anum succedere denuo excluduntur: dum v. gr. quidam mori, ne in itinere spoliaretur. 6. dictus deglutitæ, etq; post aliquot dies, infuso chylate abstergente, sine noxa rursum redidit, teste *D. Michael.* Vel dum fistula deglutitæ tertio die sine noxa per alvum fuit redita, auctore *Barbeto cent. 1. lib. 2. cap. 39.* Vel in stomacho pertinacius hærentes, variâ mala inferunt, dum v. gr. pylorum obstruunt, quæ obstrutio, si consumaciore fuerit, motum comitem trahit, auctore *Kerling. in specul. Anatom. observ. 1.* Confer etiam *Hildanum cent. 6. observ. 5. Q. d. etiam perlatæ aculeæ, quarum quædam sine periculo, quædam cum summo periculo de-*

glutitæ observantur, conf. *M. C. Ann. 4. pag. 77. Viteri frustula aut annulus, cujus apposite excitatam dyenteriam notat Zacutus Lyfian. lib. 2. Med. Princ. lib. 84. Cæcotorum huc facientium affectionum prognostus ex diæti facilis est.*

Cura.

Pro causatum variatæ, & mali inde nati diversitate, etiam variat. Paralyti partium de deglutitioni inservientium curatur per decoctum salvis in vino, & continendo in ore vii infusionis thymi vel decoctum salvis & erueæ gargariatum, aut in ore contentum egregium est. Nux moschata masticata & deglutita est egregia ol. succini destill. aut ol. destill. anisi salvis, guttatim intra fauces assumpta, sicut efficacissima. Essentia castorei, spirit. cerasorum nigrorum, liliorum convallium, spirit. theriacal. cum essentia castorei pincti, item aqua anhalina est egregia, illinatur collum ac nucha ol. lumbæ, terreste. costin. ol. destill. succini, acif. lavendul. & S. Tumores harum partium, siquidem cogniti fuerint, quales sint, more talium tumorum curari debent. Clautura faucium & Oesophagi à spasmus, atomatis & nervinis, blandi opiatis additis, tam internis quam externis curanda. Si à visio hypo. hordiorum per acidum abortientia & opiatæ, item castoreata. Sin ab exiccatione in febrilibus, interne mucilag. sem. cydon. cum aq. spirit. ran. extracta est egregia. Externè unguent. Zacuti ad hanc affectionem, compositum ex unguento filii Zach. unguento rosato, resump. priv. ol. amygdal. dulc. violar. & mucilaginibus cum lacte muliebri. Salivæ detectus potù præteritum vini, vel ceteris secundariis relaxantur: Item *crystalli frustula* in ore circumdata, salivæ copiam nonnihil provocant. Assumpta extrema pro sua varietate oppositis curanda, ut in illo *Hochstetteri* exemplo, propinquo aceto strangulatio & faucium angustia lubata fuit.

Quoad res alienas deglutitas, sed intra oesophagi superiorum tractum adhuc hærentes, & quanto facilius iterum artificiosè eximende veniunt, vel ad ventriculum, si innocue sunt; detrahendæ, cui finis interviit, vel instrumentum *Pillij Pharm. rat. vol. 1. pag. 45. aut Hildani cap. 1. observ. 31. Quod si his modis non succedat negotio, instrumentis res teneanda, in quem finem vel forte per totius longia, vel instrumentum *Hildani cent. 1. observ. 36. aut hujus succedenda cent. 6. observ. 34. Vel candela cerea, vel spongiosa cum filo, it. pro acicula *Hamulus Hildani cent. 6. observ. 36. Adhibetur ol. amygd. d. & saccharum in forma electuarii ante pastum, ut dolor per oleum leniat, per saccharum verò ulcus forte præterea abstergeri possit.***

Quod si aculeæ, vitri frustula, spinæ piscium, aliavæ acutiores per deglutitionem in ventriculum penetraverint, opera danda, ut hæc sine noxa per infectionem tandem excludantur. In quem finem propinquetur puls aliquanto spissior est oryza, vel milio, vel panico, ita quidem, ut aliquando ager à potu abstineat, ut sita per hujusmodi spissiora involuta res deglutitæ acutiores leniam ex ventriculo per intestina ulterius promoveri queat.

In stomacho si fuerit vitium, priori ex causa, vel tunc læsa methodicè curandæ, vel instrumentum *Pillij Pharm. rat. vol. 1. pag. 45. utendum. Si ex secunda causa inflammatione stomachi præstribenda. Quoad remiam causam stomacho gratis & acceptis insistentem, ventriculus nondum congestus.*

Depravata deglutitio, cum quædam curabilis, quædam non curabilis sit, illa verò notiorum ex vitio speciatim oriens, partim ex diæti vel suo loco dicendis, curatio manifesta erit. *Michiel Emmali. Colleg. Praß. lib. 1.*

Consultationes.

De Lasa Deglutione. Pro Adm. Reverend.
Pariente.

Patiens Adm. Reverend. annorum 66. temperamanti a naturæ orni calidi & humidî, habiq; mediciter carnosî, duodecim abhinc annis hernia hydrocele laboravit, ex qua quorannis arte educabantur sex circiter libræ squæ. Anno præfati ab hac liberatus, conqueri cepit sex ab hinc mensibus de lasa deglutione cum solidorum, tum liquidorum; siquidem ubi primum duos vel tres bolos degluliverit, replentur ei fauces, & œsophagus pleuita viscida albicante, in quibus tantam angustiam parit, ut nil prorsus deglutire valeat. Quod si vim hinc tunc inferat, dolor intensissimus suboritur, cujus ratione assumpta evomuit, dum copia pleurostomatæ, nec quicquam appetit, imo nec panem, nec cibos ex pasta deglutite potest, carnem verò paucissimâ copit, & minutissimè incisam. Propterea extenuatus de agnâ consistit.

Ex hac historia constat, Adm. Reverend. Patientem lasam habere deglutionem, ac proinde œsophagum esse partem principellè lasam, à Latinis gulam, & à Hippocr. fistulam vocatam à lingvæ radice ad os ventriculî pertingentem, cum ex omnium consensu deglutionis munus œsophago à natura demandatum sit. Triplex autem lasa est deglutitio, disperdia, scilicet, imminuta, & depravata est. Deperdia, ratione panis, & aliorum solidorum ciborum, quonullo modo deglutire potest; imminuta, ratione carnis, & aliorum in minutissimas partes incisorum, & depravata, ratione doloris intensissimî provenientis ex violenta deglutione. Cum autem deglutitio dupliciter lædi possit, per essentiali scilicet affectionem, & per consensum cum aliis partibus. In casu præfati œsophagus utroq; modo afficitur; atq; essentialis ipsius affectus competissimè est ex dolore. Ubi enim dolor, ibi morbus, Affici etiam per consensum patet ex insuperantia. Appetitus namq; est actio os ventriculî. Et cum œsophagi morbus triplex esse possit, intemperies scilicet, mala compositio, & soluta continuitas, ex enarratis ab ego Adm. Rever. constat esse morbum in mala compositione, obstructionem scilicet factam à materia pleurosa, crassa, viscida, albicante, quæ ad instar globi, ubi deglutionis canalim ita occludit, ut propterea usum ciborum intermittere cogatur. Non tamen pensanda est ea obstructio, aliquin neque liquida deglutiuntur; cui tamen iustam esse censio intemperiem humidam fibrarum transversarum œsophagi, ob quam non possunt ita contringi, ut cibos solidiores detrudere possint ad ventriculom, concurrente laxitate oris ipsius ab eadem materia producta, cujus causa non sit ipsius contragatio, appetitum ciborum præcedens. Dolor autem sit à violenta solutione continui tunicarum ab eodem cibo facta.

Ac propterea causa præcipua, huius affectus est copia pleurostomatæ, cum à capite fluentis, intemperie frigida, & humida laborante. hac ætate in primis ultimâ senil, tam à ventriculo frigidiore quam par sit, non sine consensu imbecillitatis jecoris, quod loco sanguinis ferream materiam generat, quæ antequam ad scrotum confluit, & hydrocelem produxit, nunc verò ad partem affectam recurrit tam magis homecitas, & relaxat. His ergo sic constitutis, cum neque in ventriculo chylus, neque in jecore sangui-

sufficiens copia generari possit, nemini mirum videri debet, quod subleata sit macies, & totius corporis imbecillitas.

Ex his cùlibet in arte versato competissimum esse potest, quàm difficile sit præsentem affectum, hac ætate, & hoc vitium languore, superare; ut propterea merendum sit, ne in marasimum senilem labatur æger, & fato cedat. Non tamen superandum est medicâ præstidia, ut vita saltem longius protrahatur.

Quare materia fluens à capite derivanda, à ventriculo, & jecore revellenda ad infernas partes, fluxa sensibilibet, & insensibilibet evacuanda, viscerum, intemperies corrigenda contrariis; & visibus consulendum. Quibus intentionibus satisfaciendum remediis chirurgicis, Pharmacæis, & Dieteticis.

Ex Chirurgicis tres prædiorum materię locum habent, cauteria, coarctaturæ, & punctiones. Sanguis missio nullus locus, cum poris infundendis, quàm effundendis esset. Duos tonsillos invadendos censent, alterum quidem sinistro brachio, pro derivatione scil. alium verò interno femori, pro revulsionè à ventriculo, & jecore, & revocatione ferriatis ad scrotum. Quam ob causam stracum per illud transmissum profuturum censio. Neque ex his emissariis majoris maciei imminet metus; evacuante enim materiam ecrementariam, non alimentalem. Refriscans applicatur suture coronali fluxionem trevellet, & calcæabit. Cucurbitule cum flamma infra ventriculom, attractionem cibi sollicitabunt. Punctiones eidem ventriculo bis in die administratæ sanguinem aliciendo, juvant coctionem; imò non præter tem censent applicare vesicans infra scapulas; ad evocandam, & digerendam materiam in œsophago contentam.

Pharmacæuticæ sint alium subducuntia, per clysteres, qui admittunt hanc piam Galeni, cum melle rosâ simpli oleo rutaceo, & decoctione betæ, mercurialis, malvæ, & flor. chamæmeli; mor & validiores, paratos ex hiera Pachii, vel Logadii, cum decoctione symphyti, utriusq; centaurei, colocynthis, nodulo incluse, addito electuæ, de benedicta laxativa; alterius clysteres nutritivos, ex vitellâ ovorum, carne conusa, & jure caponis. Licet enim clysteres medicamentosi non pertingant ad intestina tenuia, cum ab ipsorum facultate non attrahantur tenuitantes tamen aliment inopiâ attrahi possunt, atq; ita nutrire. Interim per os ex usu erunt arsenianina, & incidentia; oxymel nespè simplex, scilicetum, ad attenuandam materiam, vomitum expurgandum, quibus addi potest modicum farine lupinorum vel scharum, quò diutius hæreant, & magis detergant, vomitu provocato oxymelire simplici, & succo syphani cum mulla, Mor exhibeat malva, vel aqua Terutiata, pro majiori detersione; per scriptis interito totulis ex tribus piperib; vel ex radice irisidis in ore detinendi. Applicetur extrinsecus supra vertebres unguentum Agrippæ, vel Martiani; vel fiat iunctio cum oleis de castoreo, rutaceo, & theriacâ antiquâ. Caput evacuandum per erchina, non per masticatoria, ne majori cum impetu fluat materia ad œsophagum; idè succus betæ, radix cylvianis, agaricus in lacte dissolutus; vel etiam pulvis nitentæ præscribatur in citacionis progressu. Quam verò œsophagus minori pleurostomatæ copia redundabit, exhiberi poterit mel rosâ, solutæcum aqua Terutiata, tres vel quatuor dies; moxque reliquis materiâ insensibilibet digerenda, & partes affectæ erunt exsiccando decocto ex ligno lœdico, falsis perilla, & modico insaffras, cum jure columbæ, additis symphyto, beronica, stachade, salvis;

4
 & oisano, cum spiritui terebinthinæ, vel spiritui vitrioli. Quod si deglutire poterit, patetur bonus ex casu theore, & trochiscis cythreos: pegerque in utroque ipsius plures dies.

Videtur fit attenuans, incidens, ac valde nutritius. Propterea fiat consensum ex pulpa caponis cum pistacis, succo citri, & cinnamomo: hac consummatur ex capone asso, adsperso succo citri, & caryophyllis: intinctus item ex petroselino, pane assato, pistaciis, & pulpa perdelis, cunctedantur carnes, & pisces saltem minutim incisus, feraculæ nutriticia. Vinum sit generosum, sed pauca copia. Atque parum & sæpe nutriendus est paries, & in cibis familiariter utatur melle Hispano, vel Cretico, quod in senibus non difficile in sanguinem vertitur. Sic enim sperandam est fore, ut vite prostratus & vires conseruetur. *Bened. Sibonæ. Consil. & Respons. Medic. Cens. 2.*

De Solidorum Deglutitione laesa, & Notu colli impedio. Pro Illustrissimo Comite.

Duo sunt Affectus Comitibus Illustrissimis, tumor scilicet scirrhosus glandularum faucium, solidorum deglutitionem prohibens; & motus impedi in colli, & scapularum, cum aliquo dolore accedente, & recedente, magisque vel minus intensio.

Quorum uterque dependet à caratibo, qui à capite fluxit ad partes affectas, crassiores quidem ad glandulas, ubi in scirrhos conversus, tenuiores verò, & fluxu hiori ad tendinosas, & musculosas partes colli, & scapularum. Quo sane caratibo abundat Comes Illustrissimus, qui copiosius congeritur in ipsomet capite, cum per modum generationis, ratione humiditatis excedit, tum per modum receptiois; ab imbecillio venetico, & à venoso genere; tertio, quia suppressus, ob antiquam narum angustiam, propria excremента non expurgantur. Collectus aurem in capite, liquefactus est à calore ex motu, & insularum contracto, fluxuque ad partes subsutantes colli primò, deinde & scapularum, ubi ab ambiculis frigida decenter, stipatis porositatibus cuitur est, causa lesionis motus, & doloris prædictorum partium.

Affectus equidem non adeò facilis curationis in hac senili ætate, & hoc inequali anni tempore: non tamen incurabilis, quoad motus impedimentum. Glandularum verò inurum centiam quod spectat, aliis utique remediis curari non poterit, quam amputatione alterutius ipsarum, quæ non difficile fieri poterit, quoniam tumor est externus, & non amplius, ad radices lingue hærens: tunc enim ligata radice glandulæ filo teretio, amputari potest fornice; prout mihi non semel feliciter successit. Atque tunc hæc operatio, fieri debet, quando deglutitio & respiratio est graviter laesa.

Ceterum hoc affectu nunc prætermisso, si agitur de difficultate motus, hæc curabitur digerendo materiam fluxam, divertendo fluxum, atque prohibendo regenerationem similis, per correctionem intemperietis, jam peracta universalis totius corporis evacuatione, de qua propterea non est quod pluries agamus.

De peculiari capitis evacuatione difficultas aliqua occurrit: credimus tamen caput expurgandum esse etiam per os; siquidem tumor ille scirrhosus indicat nullam amplius fluxionem adesse. Tentanda quin etiam est expurgatio per nates, ea laxando oleo amygd. dulcium, & alliciendo materiam sabace pulverizato atracho, & insusillato. Per suturas quoque insensibiliter expurgabitur frictionibus, pedinationibus, & similibus. Hisque peractis, decoctum præscribitur ex medulla figo sancti, & salsa, cum visco quercino. Opus est contra vari-

do medicamento, attenuante, & ventriculorum robore: quod omnium maximè præstabile lignum Indicum, parato decocto cum carne, renutritiois cuiusdam causâ. China enim debilius est vitium, *sanctula* subadstringunt, & refrigerant, quibus non admodum opus in hac ætate: si permittitur Terabithina Cyprica, esset accommodata. Sudor interim allicietur solutio, vel cucurbitur repletis aqua fervida, alterata solutio, rore marino, storchade, majorana, calamento, cardo sancto, & similibus. A quo inungatur occiput, & scapula oleo laurino, rutaceo, de calore, & chammælo, superposita lana succida, vel pelle agnina, quam continuè gestabis, excepto tempore sudoris.

His remediis speramus fore, ut Illustrissimus Patiens xx. dictum spiritum citius pristinum sanitatem recuperet, si præsertim jungatur congrua victus ratio. Circa quam notandum est, quod abstinencia à vino conferret: cuius loco in usu erit secunda illa aqua decocti, parata ex coriandæ. Quoad purganciam, laudamus generosiora, præ pulvere hermodactylorum sæpe receptum, vel jalappam, vel mechocam, cum pilulis non possit deglutire. Et hæc est nostra opinio de affectu prædicto, *idem ibidem.*

De Sablata Panis Deglutitione. Ad Perillustrem Hieronymum Odasium Medicum Brixiensem.

Ex doctissima dissertatione constat, Nobilem Patientem quinquagenarium, medicosis constitutis, habitus sanguine, cum bilis subdominio, dum cum sodalibus cibum someret, atque panem attitum deglutiret, motum quandam circa os ventriculi præsentisse, panemque ad faucis angulum fuisse, atque ejus stultum, quod hærent in faucibus rejectum, quod routes conrige, quoties ipsum ingerere tentavit; ac proinde nunquam panem deglutire potuisse, sive solum, sive cum porculis, huncque affectum sex menses perdurasse; quoniam panem summopere appetat, ceteris alimentis cum liquidis tum solidis deglutitis; ita tamen, ut solida gravitatem aliquam circa os ventriculi inferant, qua levatur, dum liquidorum beneficio præcipitantur, solo pane etiam cum liquidis superabundans vomitu rejecto, cibo aliquo suavi cum liquido, cum solidiori aliquando deglutito. In ciborum assumptione observantur, à primo, vel secundo bolo deglutito eructationes nidolentæ, quibus resolutis progreditur in assumptione cibi, quæ etiam extra illud tempus aliquando superveniunt. Quod si in deglutitione impedimentum aliquod observat, subsistit aliquantulum, atque tunc erumpunt fluxus, materiamque cathartica aliquando expuit insipidam, ac deinde pergit in cibi usu: nunquam tamen panem deglutire potest. Perseverat aliquando ardorem in ore ventriculi, nullo observato tamore in visceribus naturalibus. Multa frustra hæcenus fuerunt administrata, lenientia, præparantia, purgantia, & alterantia, cum interna, cum externa, sanguine misso ex jecoraria, & hæmorrhoidibus, bilis idium ventriculo ex oleis, frequentes clysteres: & tandem dejectorii usu, multa bilis copia fuit evacuata, vehementer floscope superveit; ætus causa aquam endive quandoque cum jamento sumpsit; quod nullum fuit in panis deglutitione. Propterea queritur prædictis affectus causa, & quibusnam medicis prædictis superari possit.

Quod ut fiat, supponam tanquam verissimum cum Viro Præclarissimo, stultentiam materiam à ventriculo erumpentem, & pituitosam, quæ à capite con-

fluit,

fluxu, ciborum descensum remocari possit. A flatibus namque repelluntur, & à pituita crassitie retardatur solidiorum descensus, quosque potulentorum usu auxilio. ea fuerint redditi. Quam ob causam gravitatem inferunt in ore ventriculi. Suspiciat quin etiam possimus, ad esse humiditatem excedentem in oesophago; impediens validam constrictionem fibrarum ejus transverfarum, cibos ad ventriculum decedentium. Verum cur panis neque solus, neque cum liquidis degluti possit, perobscuro censeo. Respondere, quidem possemus cum Galeno, & Hippocrate, panem esse viscidioris, & magis glutinosæ substantiæ, quam alia assumpta; hæc tamen visciditas, & lentior est qualitas, quæ in pane semper inest, & nihilominus antebac deglutiebatur absque impedimento. Verum quidem est, quod tunc non adeat illa lentitas in pasto; qui nunc apparet, quoniam neque tanta flatuum copia, neque adeo copiosa pituita observabatur: at tamen flatuum erumpunt, & pituita cum sponie, tum medicamentorum beneficio sæpius sunt deterfa, & expurgata, & nihilominus nunquam succedit panis deglutitio, ac fortè alia assumpsit visciditas & lenta ut ctyazam, far, cibos ex pasta, limacis, & similia à quibus impedimentum nullum accidit. Ac proinde in eam concedo sententiam, quod hoc proveniat ab angustia ventriculi, & aversione specifica ab ipso pane, non verò aliorum alimentorum. Plures etenim sunt, quibus à specificis quibusdam assumptis afflicti ita ventriculus ut non solum ea revomat, sed etiam graviosa superveniunt ipsi accidentia. Aliqui enim abominantur Allium, teste Julio Alexandrino, Secundo de Tuenda sanitate, Cap. 13. qui scribit, novisse se, qui ita allium avertabat, ut nunquam, illud comederit, quod & ego fide mea possum testari de Nob. nostro Patavino Anaxarte Pigna, cui propterea cum ab amicis invitato ad comedendum acciperetur piscem variis modis præparatum, & conditum, cum patinis allium affictum esset, interdixit illi fuit ejus usu. Refert Amatus Lusitanus, Stephanum Surdasum Hispanum à piscibus adeo abhorruisse, ut si cum aliis cibariis eo inficio ipsi exhibiti fuissent, in animi angustias, compressiones cordis cum vomitu, alvique defectione incidere. Petrus Apennensis, referente Marthæo de Giadi, lac ita abominatus, ut nec illud comedentes sine nausea videre possent. Brasavola in Lib. secundum Hipp. de Ratione Vitæ in Acutis, comm. 4. hæc scripsit: *vidimus Illu-Brissumam* in illam *Tarracensem*, *Frederici Regis Neapolitani* filiam natu minorem, quæ carnes edere non poterat, immò nec gustare. Si enim bolus in os imminuebat, in gravissimam incidit hunc syncope, ac vehementem clamorem edebat, in terram præcedens volubatur, idque horafemus spatio contingebat, deinde ad se redibat. Alii abhorrent à caeseo, & eo quidem quocunque modo sumpti, alii foetum ab aliis alimentis, æque alii eo veteri non recenti delectantur. Aliis acrum vomitum excitat; ut mulieri Burgundæ; alia sedat. Nec solum in assumptis alterationes observantur, sed etiam absque his. Scribit enim Autor v. Epidem. Hippoc. adscripi, historiam 79 affectionis Nicænotis, qui cum ad portu progrediretur, sibi tum sonanem cum audiret horis nocturnis, per timore vix se sustinere poterat, interitum autem eundem audire nihil commovebat. Aliam jocofam sympathiam retulit Scaliger de Subtilitate ad Cardanum, Exerc. 344. Reguli Valconis Equitis, qui dum viveret, audito phormyngis sono, urinas illico emittere cogeatur, quæ quendam ex turba aspersit; qui ridiculum illi molitus est ultionem: pone accumbentem adduxit eum quendam cum phormyngæ, cusu ut solebat, sono perterritus, ibi sub mensa in clarissimum convivium sodalicio quin pedes permeletet, continere sese non potuit. Qui-

nimò nec defuerunt alii vinum avertantes, alii panem ipsum raro comedentes: inter quos liceat mihi referre Patrem Corrus Augustinianorum Exalceatorum, nunc Præfectum Cenobii Viennæ ex Nob. familia de Ramesthal, olim S. Cæf. M. pnerum nobilem, nunc vero ætatis annis 40. cæcens, qui nunquam panem quocunque modo coctum deglutare possit nec in præsentia potest, & in primis à pane calido abhorret. A pane autem calido ventriculum quam maximè affici asserit Hippoc. Secundo de Ratione Vitæ in Acutis tract. 34. Cur autem facta sit hæc panis abominatio in casu præfenti, si quis querat, respondere possum cum Scaligerd Exerc. 274. de Subtilitate ad Cardanum, *Harum rerum causas neque ego scio, neque scire labores mihi sapientia vera est molle nimis sapere.* Addeam nihilominus duas causas ab Hippoc. assignatas, Secundo Acutorum citato; quarum prima est, repentina præter consuetudinem panis deglutitio; Secunda æstus ventriculi. Prima habetur ex morbi historia, dum i. fœtur puzza Italici sermonis vim, quod in convivantium convetudine, dum vellet comedere, assumpto pane, cum manducasset, & deglutisset, sed cum sensisset quandam commotionem circa os stomachi, rejectum esse panem. Ex quibus colligitur, à pane confectum deglutito læsionem aliquam in ore ventriculi subsecutam esse, usque sensus semper exquisitis primam renovat molestiam, id est, quod panis rejicitur. Secunda habetur illis verbis historiarum, quod emetitiones sunt intolerantes, defectiones bilioz, & quod insignis æstus percipitur in ore ventriculi; atque ita panis attritus, convertitur in naturam repulsiorem tanquam ventriculo inferni us; cum habeamus ex eodem Hippoc. Secundo Acutorum citato, quod panis calidus assumptus maximam turbationem facit in ventriculo, sitim inferit, & instantinam pleuritidem inducit. Hæc ergo ob causas, præter occultas, panem deglutire non potest, quamquam ipsum appetat, ex memoria delectationis ab ipso perceptæ, quando ventriculus erat naturaliter constitutus. Plus enim potest recensita obiecti molestiam inferentis, quam memorie præterite delectationis. Ita usque venit in alia omnium naturaliter abominabilibus, quod tunc tantum aversionem inducunt, quando sunt præfentia, & actualiter operantur.

Ex his apparet, dissimillam fore præfentis affectus curacionem, non tamen impossibilem. Quæries enim cumque expurgatus fuerit ventriculus ab excrementis biliosis, disculsiue flatus, ac tandem æstus ventriculi intemperies refrigerantibus contemperata, convalescet æger.

Pugna propterea ex Viri Præclarissimi consilio instituenda. Atque interea quæ propolita sunt, valde commendando fonticulum dextro femori inusum. Aquas Cassiananas tanquam deterforias quam maximè laudo, cum dejectionis indium porri datas ad libras tres citietur. Atque uxor usu aquæ Viennesis in agro Lucenæ, vel nostras Beate Virginis, vel aquas Ficuncelle in agro Senensi, vel etiam Noceanas summo præ profutura existimo. Copiose bibantur quindecim dies citietur, cum diutius non dulcibus pita emulsionem sem. melonum, cremore tartari, & spiritu vitrioli, vel salis, incipiendo à libris sex, & singulis diebus addendo libram, à ad triduum usque; mox singulis diebus libram subtrahendo, ad libras sex, præmissa parca cena, quod facilius primæ. Quod si liberè fiat, ut spero, cum hypochondria bene habeant, superfectibile quindecim dies ipsam usque plus minus ad librum, atque iterum ipsam assu met. Nil enim magis exiguus æstus ventriculi, & sineque aliquando dejectionis, cum majori doli eromonia tartari, ita namque excitabitur appetitus, iuxta Hippoc. in Epidemias: Aqua vorax, & vigilæ voraces. Caput lateris Ethnici purgetur; hepatis

refrigerantia applicentur; alvus continuò lubrica fervetur. Ventriculo nil extrinsecus apponendum: quoniam à peccata refrigerio ventriculus roboratur. Panis interitum filiginis variâ formâ aniso, fœniculo, & coisando condiantur. Et hæc in medium quæ afferretur habuit, committendo omnia prudentiori alicujus iudicio. Obiit autem sex mensibus à morbo, impedita deglutione omnium solidorum, vel liquidis apertis digestorum. *Idem ibidem.*

Rarissimus affectus, in quo ager cibum quamvis solidum & durum, absq; difficultate & Potum non sine suffocationis metu deglutiebat.

Soloduri cuidam sexagenario, Domitio Urso Rouchel nomine, cujus etiam in aliis ad te literis mentionem feci, quàm caratibus ad sinistram latus delapsus esset, non tantum paralyticus illius lateris sequutus est; verum etiam deglutitio adeò depravata fuit, ut liquida omnia, præteritum vinum non sine suffocationis metu deglutire posset: reliqua verò quamvis solutissima facillimè, ad ventriculum descendebant. Quàm itaque liquida sorbere non posset, & solidis non satis nutritur, tandem ad summam imbecillitatem, lapsurus vitam pervenit. Ego tertio Aprilis Anno 1620 ad ipsum vocatus, primò pilulis (quas facillimè deglutiebat) corpus leniter levitaret expurgavi; deinde omnia quæ ad vires instaurandas requirerentur, exhibui. Et quia, ut dictum est, liquida, imprimis vinum sine suffocationis metu sorbere non potuit, iuscula utranque spissâ præparavi, additis vitellis ovorum: pro potu lac amygdalarum dedi. Latus resolutum oleis convenientibus & aquis appropriatis inunxi. Collo facculum ex radicibus, herbis, & floribus resolutivis & corroborantibus, in aquâ coctis, applicui. Hinc cum Symptomata omnia multum lminuta fuissent, & latus resolutum ferè restitutum esse videretur: liquida quinciam fac illis quàm antea sorberet: quæ suspeticiam faciendi, domesticè administranda reliqui. Verùm enimverò non diu post meum abitum, quàm caratibus iterum inopinanter ad latus sinistram & laryngem decidisset, omnia deteriora evaserunt: caratibus enim è nudis, maximo cum impetu ad latus sinistram & laryngem delapsus est, & de novo paralyticum induxit: quapropter cum nihil liquidi deglutire posset, nec solidis satis reficeretur corpus; vires quinciam propter longitudinem morbi (antea enim femoris os tibi frigerat, quemadmodum aliis ad te scriptis, neque penitus à fracturâ restitutus fuerat, cum paralyticum corripere) prostratus esset, brevi naturæ debitum perfolvit.

Potè Vir Amplissime, quænam hujus affectus tam rari tamque difficilis fuerit causa, pro summo ingenii tui acumine, nobis quæso expone. Ego sedem mali in Epiglottide, illamque simul & adjacentes partes in ipso quoque momento, cum paralyticum corripere, humore viscido imbutas fuisse, calissimo. Hinc Epiglottide cum laryngem asperamque arteriam exadè obtegere non posset, facili fieri potuit, ut liquidum, & imprimis vinum, quia tenuius est partium, ad ipsam arteriam asperam perveniret, & suffocationis metum excitaret; ductu scilicet verò ratione transacti & ponderis, operculum asperæ arteriæ depresserint, & proinde sine difficultate ad ventriculum pervenerint. Est & alia causa quæ mortem acceleravit, nimis aër frigidus, qui, non satis obturata asperâ arteriâ suo operculo, facili ad pulmonem perveniebat, & calorem vitalem præter modum refrigerabat.

Quotum autem aër frigidus hoc modo, cum impetu & in copiâ ad pulmonem delatus, fracturam vitalem prostrat, in morbo etiam meo expectus sum.

Cum enim propter vehementissimam tussim, epiglottis tandem quoque ita labefacta fuisset, ut asperam arteriam non satis promptè obtegeret; & tussiendo, aut etiam oscitando aër frigidus ad pulmonem perveniret, vires prociuis ad lipochymiam ferè usq; prostratas fuerunt. Tandem necessitas me edocuit, ut tussiendo, linteò calido (quod continuò in promptu habebam) nonnunquam quoque volâ manus os obtegerem, tussiendo autem calidam ex linteò attraherem. Hoc enim modo lipochymiam multò minus frangebatur. His vale, Vir Amplissime, & me, ut faciliè amare perge. Raptim Bernæ, 30, Aprilis, 1621. *Idem.* 27. Gul. Fabricii Hildani.

Anatomica infectio.

Vir honestus 56. circiter annos natus in cantam incidit deglutendi difficultatem, ut cum aliquid in ventriculum exinanitum ingerendum pro vita conservanda veniret, non tantum solida viam sibi in medio oesophago præfultum invenirent, sed etiam liquidorum illâ transitus adeò impeditus foret, ut plures conatus qualibet vice per horæ ad minimum quadrantem essent impediendi, subsequenter etiam ingestorum quæ à parte læsâ ad fauces usque restabant vomitionibus, antequam guttula una aut altera sibi viam aperiret in ventriculi concavum, quò demùm peracto aliquid liquidum ulterius ablatum in dextro pulmone ex lacte & farina aut pane confectum vorate valebat. Nec aliquid in subsidium poterant vel instrumenta Chirurgica ordinaria, vel alia quæcumque à nobis excogitata, quin vitam sic miseritiam per annum & dimidium transgerere, tandemque marasmo, nulla tamen advaiente febre, præterquam ultimis diebus, confectus obierit. Cadavere in casus tam rari causam reterendam aperto, vidimus tuberculum in parte oesophagi media co latere quò trachææ arteriæ adjacet situm, non equidem admodum magnum, sed quod in canerosum quid jam abierat, lividum enim atque etiam saniosum, vasculosisque vasis reterum apparebat. Unde satis constitit non tantum tumore corpore viam impeditam fuisse, sed etiam sineo sibi eo inde continuo quâ transudante oesophagum eâ parte constitutum non parum alimento transgressuro, obstrixisse. Similem propè històriam proponit Clariss. Willis Pharmaceuticus rationalis parte prima sect. 3. capi 3. his verbis. Vir robustus & aliter satis sanus, à longo tempore vomitu etæro laborans, comesta quæque sepius, etsi non semper, mox rejicere solebat: Tandem vicis omnibus remediis morbus in eum statum devenit; ut valde elurians comederet ille, donec oesophagus ad gulum usque impleteret, dein nihilo in ventriculum illabente, ingesta quæque cruda regegeret; Cum pharacis nihil juvenibus præ fame summe elanguesceret, & propediem interire periclitaretur, instrumentum ei instat virgule, à pinna cæcæ, cum spongiæ fibula apicis ejus altius paratam; hoc ægrotaus statim à cibo & potu aliisq; guttulis, unaque oesophago immittere, alimenta secus stagnatura in ventriculum, orificio ejus reterato, detradebat: atque hujus ope per sedecim annos pabulum quotidie sumit: eademque adhuc machina utitur, & etiamnum vivit valeque, secus inedia periturus. Procul dubio in hoc casu os stomachi, sive à tumore, sive à paralyticis semper occlusum, nihil, nisi violenter reteretur, in ventriculum admittit.

Deglutitio impedita à Bronchole Oesophagum attinge, confringente, & tumore athermatico ejusdem Oesophagi.

Letissima Virgo, annos præter propter quadraginta nata, postquam variis morbis ac præcipuè affe-

ctibus

ditus phlegmaticus, per plurimum annorum decursum, confirmata fuisset. Et tempore quo ab iis omnibus evasisset, & valitudine satis integrâ frui cœdebat, is deglutiendi aliqualem difficultatem incidit, quæ per mensis scilicet aucta, cum adjunctâ febri de lentum genere, eiq; subinde Intermitterium sporadicum paroxymis intermissis; nihil prorsus ad mali eradicationem facientibus selectionibus remediis intrinsecis & extra adhibitis, tandem post annum & dimidium ipse ab omniâ impossibilitatē aliquid deglutiendi incidit: unde necessarium fuit injectâ per liphonem altissimo eam ad tempus curare, die 25. Julii anni 1777. inter loquendum, & dum ipsi in, eiq; cunctis paribus, subito suffocatus obijt. Die subsequente 28 hœc matutina, cum morbi sedem attentius indagemus sub musculis colli reperimus glandulas thyroideas vixint; non paucâ tumefactas ac induratas, imo iniectionis ita protensas, ut non tantum œsophagi lateri competerent, sed etiam subcus exploratæ, cum undiq; circumingerent, litæque in eam, nisi ad latera, omnino liberâ. Œsophagum præterea, vitium quasi scorbuticum, & sex circiter lineas crassum, ab eâ ipsius parte qua tracheæ annulo quatio usq; ad annulum nonum subijcebat, & per totum hunc tractum à glandulis tumefactis indivisibilem. In eâ cœphagi tum facti extremitate quæ tracheæ annulo nono subijcebat, inveniunt adnati tumores atheromici, magnitudinem ovæ gallinacæ minoris æquans, cœphagi canalim omnino obtinentes, & quò recurrent disrupti effusa fuerat in ventriculum usq; materia quasi sebacea, seu potius cerebrum aliquamvis animalis excoctum effertens, quales erant erat tota illa que in hâc inferiori tumore concluderetur. Ex câ autem effusione procul dubio enata est subita suffocatio, & mors promptè advocata in debilitatâ subje tâ, ac innumeras affectionibus, imò & in eâ præterea, scilicet jam prorsus atrox.

DENTALIS LAPIS. vld.

DENTIUM MORBI.

De quibus iam per

*Curationes, Consultationes & Observationes
ex quartis.*

*De Variis Dentium Affectionibus ex Clariss. Antonio Nuck.
ac Jo. de dolore Dentium.*

Inter alias corporis nostri partes, intolerabili aliquando dolore affectas, primas sane tenent Dentes, qui varias ob causas tantis non tunc afficiuntur cruciatibus, ut patiens (omnibus in casum adhibitis medicamentis) doloris acerbissimi impatiens, eandem amplius perferre non possit.

Hinc incommodo, ut succurreret *Arts Chirurgica*, *Instrumentum*, quò dolor hic momento citius, & quasi incunantemò tolli posset, excogitatum *Instrumentum* hoc *Cassirium* *actuale* est, quod igitur *Anthraxum* leniter tangit, & cutim, unà cum lub: acerbis neuralis, à secundo vixi venereali oriundis, adurit.

Ur autem rufus hanc Operatio abfolvatur, cannula
five vagina neceffaria erat, quæ cauterium dictum trans-
mittens, impedimento effe poffet, ne latera auris vic-
tiora ledantur.

De Dentium Extrahione.

Dentium Extractio feliciter ut succedat, unusquisque Operationem hanc instituturus, exactam eorum ut & alveolorum habeat notitiam, perquam neceſ-

farium existimamus. Magna liquidem uti inter Den-
tic & alveolos observatur differentia, *Dentium* *maximi*
unicuique, tantum radice donati *Incisores*, *Longissimi* *Ocu-*
lares & *Canini*, *Cassissimi* *Alveolares* appellantur, pro
quibus etiam duo, tere vel quatuor radices, totidemque
alveoli numerantur.

Caudent quique domes lute, vasis sanguineis pariter
et nervosis: Sanguinea videlicet arteria à Carotidis,
Veniens à Jugulari, Nervosa à nervo, oculorum motoris
et gustatoris accipiunt, quæ per tuniculas forami-
nibus illos ingreditur. *Membra* tamen vasa *Inferiora*,
nervosa *Membra*, (quorum quilibet rax summum
accipit) *majora Caninis*, maxima vero *Oculorum* de
ribus sunt destinata.

¹ Quibus consideratis haud difficile colligitur, cur quidam dentes facilius, quidam vero difficilius & cum periculo extrahantur.

Ad hanc autem Operationem debite ex-cedant
varia requiruntur instrumenta: Aliis enim dentes Ca-
mini & Ixeifores, aliis Oculares, aliis Molares & Sapien-
tie, aliis denio, dentium frustra & fragmenta evelluntur.

Instrumentum cum huius scopo convenientium sequen-
tia potissimum in usu sunt:

1. *Pedes Caprini*.
2. *Kastrum Corvinum*.
3. *Fercipes dentaria varia*.
4. *Pellicanus*.
5. *Demiscalpium*.
6. *Trulla*.

Antequam verò Extractio instituitur, explorandum an vacillet dens, vel caele sit co sumptum, in. d. an etiam possit aut debeat extrahi bene perpendendum. Dedicorū namq; Chirurgi effert, nec parum ejus fama detrimenti caperet, si sine successu Operationem instrueret, speciatim ubi ad Principes, Magnates & Matronas delicatiores vocaretur.

Præterea, quoniam Symptoma aliquod ugens, molesta scilicet hæmorrhagia dentium extractioni subinde supervenire solet, Scrypicum medicamentum necesse est ad manus esse debet, *Linicum* v.g. *carpinum* vel *solum*, vel *succo* *Ciri* madefactum. Vel

N. Fungum (Belg. Bovis) eiusq; particulam extra-
li densis alveolo immitte. Vcl

M. Linum f. flavum (Belg. Tunnel.) Vcl

24. *Patib. aut Caput mort. Virial. Vel*

℥j. Chatham Emporeticam alio Vitrioli madidam, hanc sicca, siccatum iterum madesce, madescenti demum exsicc, hocq. ter quaterve repese, tam chatha hujus siccata & preparata portunculam parit samentinem fundenti adnove.

Si verò bilice non cedat hæmorrhagia, cauterium
adhibendum.

Ux itaq; extractio feliciter procedat, gingivae ubi ipsa dente separatur infiltramento prius sepiatanda, (ni jam ante a Scorbutio consumpta fuerit) quia aliis gingivis firmetur aliquando dentibus aduice dilacerantur. Mox *Pede Caprine*, si ex *Anterioribus* fluxit ex alvulo dens expellitur. *Ocularis* aut *Caninus* Forscipe *Dentium* vulgariter extrahitur, quavis aliquando (ubi castorei nota in ipso conspicitur) hujus extractio *Pellitana* si lilius peragatur.

Dentes vero *Melares anteriores* convenientias *Pell-*
eant cum brachijs vestis, *Melares posteriores* *Pelicans*
cum brachijs curvis mollius evelluntur. Ad Dentium de-
nique scilicet extrahenda *Agnum Cervinum* potissimum
convenit.

Gravidis aut nunquam aut rarissime dentes sunt
evellendi, præputis Oculates, quod fœtus oculorum
virgo aliquando erinde fuerit affectus.

Subinde Dentes extra feriem prominentes, oblique versus interna aut externa nascuntur. Horum

prominentia cancellum limā corrigende, non tamen eo usque auferenda, ut dentis cavus in conspectum prodet, ne intolerabilis Odontalgia exinde propululans, patientem nimis excutiat. Idem malum facili supervenire solet, si *Europe incisa* Operatio hec instituitur.

De Dentium robilitate, Causis, & Dentibus Artificialibus.

Molles sepe sunt dentes, vel quod gingiva la-cior reddita, dentibus firmiter non adhaereat, vel eadem acri quodam humore ad alveolos usque consumpta demidentur, minisque stabiles reddantur. Quo in casu gingivae blandioribus astringentibus Antisepticis permixtis roborandae, quale est medi-camentum *Emmulleri* sequens,

R. Radix. Bistort. ʒij.

Fior. Ros. rubr. ʒij.

Balanst. ʒij.

Alum. Ul. ʒijss.

M. cum S. q. Spir. Cucklear. Vel

ʒ. Herb. Scord. ʒij. p. j.

Myrrh. opt. ʒijss.

Alum. Ul. ʒ. vj.

Cog. levis in Fint. alb. Gall. ʒij.

Colat. ʒij. add. Mell. alb. opt. ʒij.

Spir. Vin. Capivar. ʒijss.

Cucklear. ʒj.

M. F. eris & gingivam colluit.

Hæc mixtura in plethorice oris vitia à Scorbuto oriundis magis quoque est efficacia. Vel

ʒ. Herb. Salu.

Rosimarini.

Fior. Ros. rubr. aa. p. j.

Myrrh. opt. ʒij.

Alum. Ul. ʒj.

Carioph. N. vj.

Cog. in Vin. Gall. & ag. Chalybeat. aa.

ʒijss.

Colat. ʒij. add. Mell. Ros. ʒvj.

Spir. Cuckl. ʒj. M.

Ad corroborandas gingivas, dentescere dealbandos Matrone quidam Parilienis sequenti pulvere, ut le-cetis utuntur.

ʒ. Off. Sep.

Crall.

Cremor. Tart.

Lapid. prun. aa. ʒijss.

Res. Rubr.

Pulv. Rosar. rubr. aa. ʒj.

M. F. Pulvis, quo dentes quovis fricantur.

Praeter gingivam male affectam duplici de causa Dentes cadunt: vel quod à semine (sive nevo dente) dens alveolo expellatur, vel quod ob vasa sanguinea male affecta, nutrimento destituta, decidat.

In priori casu totum opus naturæ relinquendum. In posteriori vero (quomodo sermone articulando Den-tes multum auxiliantur) *Artificiales* conficere, & in dependit dentis locum substituere, sapientia necessa-rium.

Nihil quidem frequentius, quam ex *Ebri* eosdem conficere, confectos alveolis immittere, siveque se-rico autoveo vicinis dentibus adalligare. Verum quoniam hi brevi temporis spatio & à saliva & à cibo posive assumpti notabili fædine tingantur, rectius ex *Hyppo-potami dente* conficiuntur, præsertim si cortex ejus exterior in veto colore superbiat: Hæc enim si adfue-rit, ad aliquot annos ejusmodi dentes naturali adhe-ssione illibata semper remanentes, gestare possunt.

Si omnes maxillæ inferiores dentes nullâ remanen-ge decidant, integra dentium series ex fructu eburnæ,

vel *Hyppopotami dente* conficienda erit, atque in ea labium ita disponenda, ne motu maxillæ inferire, eadem quoque moveatur, cibusque ore assumtus quo-dam modo adhuc comminui possit.

Dentium morbi ex Clariss. Michaelis Emmulleri

Dentium vitia sunt si deficient, si vacillent, si stupore aut dolore afficiantur.

Deficiunt dentes, vel proprio vel alieno, gingiva-um vicio, infra, ubi de dentium vacillatione, pro-lixius explicandum. Proprio vicio, dum evelluntur, aut excutuntur à quavis causa externa, vel alteran-tur, ut tanquam minus viventes non amplius cum gin-giva viva cohaerere queant, sed sponte sua decidant. Ut enim mortificatum, v. gr. cariosum os, cum vicinis partibus, vita communi & propria pro ratione spiritus insui & insui glandulis, nullo neque, sed necesse est, ut excidatur & separetur, quo cum vita esse partes subjacentes molles, viventes, consolidatio-ne debita, nutrimento mediante uniri denique queant ita & dens minus vitalis non jungitur amplius gingi-væ, sed ab hac separatus excidit, idque.

1. Si mortuus fuerit proprio ætate, adeoque senii sui ratione, de quo videatur *Helm. alimonia Tartari infansia* §. 25.

2. Si ab externis nimis laedatur & virescat ne sunt nimis frigida, aut copiosius assumpta dentibus inimicissima, & quæ senium eorum accelerant, item ni-mis calida, dentes & gingivas quasi amburendo alterantia, eaque vel crebrius assumpta, vel dentibus ad-mora, à quibus successive ita penetrantur & atrodun-tur dentes, ut, frustulatis tandem excidant. Quid fa-cit perversa plurimum consuetudo, dolores dentium vel aceto simplici vel per coctionem medicato cutantium, à quibus stupescunt non solum omnino dentes, & in-sensibiles sic sunt subtiliores illorum intima fibella, sed & ipsi dentes simul mortificantur & corroduntur.

3. Nimis viscida & glutinosa dentibus inimica sunt, ut sunt omnia dulcia, saccharum, ficus, uti & caseus &c. hæc ipsa enim, ut prompte & tenaciter dentibus adhaerendo, transpirationem eorumdem propter ne-cessariam nutritionem impediunt, ita & successive au-ctorem attrahunt qui continuata sui adhaesione, suc-cessive eosdem alterat, hinc & lac, & quilibet lacte-inia, ob hanc rationem inimica dentibus observan-tur, eo usque ad sui corruptionem live eandem & suc-cessivam deficientiam disponere. Hæc ipsa gingivas simul plus minus alterando, & laxiores fæcidio-res reddendo, indeque nutrimentum pro dente, per gingivas transmittendum, corrumendo, ipsos dentes insigniter ledere valent.

4. Carie denique plus minus exili dentes à lapide dentali sive lithodonto obfissi seu sordibus va-riis inquinati, nigricæ ac furvidi redditi, minus fir-miter gingiva cohaerent sed successive decidunt. Quo postiora vitia non nisi ex viciata dentium nutritio-ne privata, undecunque primitus orta, originem ducunt. In quem finem noto, nutriti dentem, non solum per propria sua vascula, arteriolas & venu-las, circa sui radicem implantatas, sed lateraliter etiam, ex adherentibus ipsis gingivis, unde & tam firmiter eorum quousque sani sunt, est nexus, ut dens sive osseum concretum, ex se indolem, quo-usque gingivis investitur, acutissimi tamen sit sensus? adeo minus vix & nutritionis dentes sunt par-ticipes.

Ac sanè particularis, ac proæ partibus, prop-ria dentibus est nutriendi ac augmentandi ratio, ad-co ut, cum continua attritione necessario immineant, nisi

nisi nova eiq; continua augmentatione reparentur, brevi penitus absumerentur. Quod ulterius ex eo patet, quod uno evulso vel elapso, vicini utrinque se dilatate magis solantes, & ex opposito ipsi respondens oblongati nonnihil, & prioris spatium aliquantum substatate observetur.

Cariem igitur dentis quod attrinet, hæc est *arripi* dentis, *nunc major, nunc minor, quæ insensibiliter substatia eius assumitur, & nunc successive excavatur, nunc altera latere preteritis consumitur, donec successive maris corrosa frigiditate exsiccet.* Inchoat malum ut plurimum in parvo puncto cariescentis quod nigrescit primum, hinc foraminulum aperitur, hincque ad interiora ejus penetrat, quæ quò teneriora ac molliora, indeque facilius dissolubilia, eo promptius absumuntur, & dentem cavum reddunt. Conspicitur tunc, ad interiora, ubi penetraverit corrosio, dolor, nunc major nunc minor, prout radicem dentis nervum diversimodè simul arrosit. Ex corrosio ita dentem nata sanies, ubi per dentis foraminulum relictum, exeat per fistulam, liberum spiritum effluendi haud uacillat fuerit, sed interiora magis ac radicem depris uinum alternatimve, speciatim in maxillaribus, vitaverit, acrimonia hinc nunc gingivam, nunc ipsam maxillam rodit & præternat per illa hujus foramina, per quæ vas in dentes intrat, sensim extra effluit, & rubetcola, nunc in gingivæ, nunc sub maxillæ, excreat, quæ tandem exca saniosum acre liquorem fundunt. Ex licet eorum tale tuberculum & excitationem ulcusculum, subinde tamen, quoties ex carioso dentis sub nutritione vitata nova sanies generatur, recidit, & interdum in fistulam vel gingivæ, live maxillæ, degenerat, adeo ut talia curari nequeant, nisi dentis latus evulsus fuerit. Foram. etiam subinde dentes cariosi inferant, halitum oris indicentem præsertim in *maior* fuerit coram ex avortio, ut alimentum carnosum retenta in eadem putredinem attrahere queant: Unde ex nutrimenti den cariosi propiti corruptione, aut allucororum masticetorum in interdum herentorum putredine, vermes in coram caritibus generantur, gravissimorum dolorum aliorumque malorum autores.

Causa cariei est læsa dens quacunque occasione nutritio live gingivarum vitiatam, & à contiguo dente abscedentiam, indeque ejus lateralem nutritionem impeditum, (unde scorbutici, gingivæ vitio, omnium frequentissimi cariem patiuntur) eveniat causa, live ipse dens sub nutrimenti assimilatione, aut hujus successiva transpiratione frustratus ex illius corruptione, & in acidum corrosivum degeneratione, cariem pedetentim contrahat. Acidum itaque ex nutrimento dentis d generato, tandem corrodens cariem inducit. Carie remota rationem habent, tum omnia dentes alterantia supra allegata, quàm infra circa gingivas, alleganda.

Quoad lapidem dentalem live lithodonton (ut vulgè ex varia, persusione vocant Tartarum dentium) hujus ortum & genesis optimè delineavit *Helmont. Tract. alimenta Tartari insana* §. 22. nempe nutrimentum dentium laterale ex gingivis depravatam, sob sui perfecti cum dente assimilatione frustratum & vitiatum, hincque ex excrementis plus minus naturam degenerans, adhærescit saltem, superficie tenet dentis, ibique quia jam ad duritiem dentalem ex assuetudine sui pro nutritendo dente alteratione, determinatum fuit, ad indurescentiam quasi lapideam dentalem, coagulatur saltem, & talem, plus minus tamen friabilem duritiem acquirit, simulque quicquid mucilaginis ciborum ac potuum imbibitis, immulsecum fortiter indurat. Nunquam igitur sanæ gingivæ

& quæ cupiduli figura ad dentes medium allungunt, bancque finem complexi retinent, dentalem hunc lapidem generare solent, bene autem laxæ, flaccidæ, cruentæ, minusque aptæ dentibus adhærentes, adeoque externis lujulis ad sensum d-nri partem aditum permittentes, nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed potius etiam induribile pervertentes, hoc malum inducunt. Par omnino est ratio sordidorum, nigroque aliove modo male coloratorum dentium: quicquid enim hic tubet viti, nonnisi productum morbosum ex frustrata ac depravata privata dentium nutritione enatum, live externa illa supra circa dentium casum, memorata speciatim vitiosa & dulcia primam occasionem suggesserint, live gingivarum morbosus status, alterando nutrimentum dentium, & vitando lateralem ejus nutritionem, in causa fuerit. Sanè ut scorbutici: nil equè facile est, ac gingivarum va-las libere patiens, si speciatim enatum flacciditatem, ita & in talibus dentium nigrities & sordities frequentissima est. N. grities sanè dentibus adhærens, quid nisi extraneæ ex gingivis, plus minus corruptæ, & acote infecti enocia dentibus adhærentis vestigium est; à cujus hostili præsentia, ut irritantur gingivæ, & invitantur dentis posi, ita ex facili hinc accensita erosio & cariei successibus progressus. Juxta læsionem gingivarum & dentium leni, indeque sordium extraneitatum pluralitatem ac vetustatem admodum: Hinc & ab inunctione Mercuriali pro cura lux ventree similis concitata salivatione, uti notabiliter vitantur gingivæ, ita nigrescere solent, & pluribus sordibus inquinari observantur dentes.

Quoad Caries.

Dentes exidentes aut deficientes reparare, solius naturæ est, quæ in junioribus, per recentium dentium subascensionem priores alveolis suis extrahit, & defectum ita restituit. Quamdiu itaque dentium novorum pismordia & quasi semina inter gingivas resistent recondita, novi dentes, post priorum defectum tenaciter facili possunt, id quod non tantum genuini live sapientie dicti dentes comprobant, sed quod etiam interdum in senectute dentis renas observari fuerint. Atque quod relicum est, saltem defectus illos naturæ nonnihil supplete, artificiales dentes, ex ebone, vel dente hyppopotami, fabricatos in istorum locum substituendo, pro loquela saltem gratia, non autem pro melioris masticationis beneficio. Equidem exempla quædam præstant dentium sanorum ex homine recentem evulsionem, in proprios vel alienos alveolos denud infertorum firmari cum gingiva coallitorum, tanquam si nunquam dens dehisset, ita ut etiam masticatio fortis hoc modo perfici poterit. Sed quoniam adeo incerta & nonnondum confirmata est, eam in medio relinquo. Vob observat. Schrenckii pag. 302. ex Patzo l. 1. c. de dentib; Item Riverium in observ. comm. pag. 357. vel 61 §. Boerl. lib. 2. observ. 10. p. 18.

Quoad cariosos dentes; equidem præsentissimum remedium est cariosi evulsio, interdum etiam necessarium, si longius processerit caries, cum facili aliis contiguus dens contagio carioso inget, & hinc idem malum contrahere possit. Ut taceam, confirmatam cariem, alia ratione quàm evulsione, curari non posse. Quamdiu verò vel nondum edigne processerit malum, vel propter pericula, sub dentium evulsione interdum obviata, hæc nimis metuanur, remediis res tentanda est, cariei progressum ultionem inhibendo:

Evulsio

Evulsio appropriato peragitur instrumento ac succedit eo melius, quo minus firmiter dens adhesit, & quo magis idem vacillaverit. Quo autem disponatur ad faciliorem, magis & minus dolentem, evulsionem, remedia quoadmodum nonnullis adhiberi solent, verbi gratia, tichymali sineus denti indiens: aut si ex eo sile & ammoniacum formentur globuli, aut cum farina triticea fiat pasta, & cavitati dentis indatur.

Præter tichymali lac alia ex simili lactearum genere, pari virtute pollent: ut lac ficulnorum farinæ admixtum, vel ex lacte tichymali cum farina triticea subacta fiat pasta, quæ fita in pinguedine tanæ facit dentes sine dolore cadere: vel farina saliginis miscetur cum lacte cataputæ, instar pulvis, indatur denti cavo, sicque aliquandiu permittatur, brevi sic cadere affirmant. Succus pariter chelidonii majoris, cavis dentibus inditus, eos frangit & efficit. Pinguedo item ranarum viridulum, dentibus adfixata, aut lisdem indita, dentium casum promovet, nempe coquuntur ranæ in olla vitæaræ, assuâ aqua communi, & pinguedo quædam inaurabit, quæ dentis evulsionem promovet.

Vel \mathcal{X} . Gummi ammon. sem. hyoscyani, succi ejusdem an. 3i fl. Miltis addatur Pinguetudinis ranæ viridis ac ceræ parum F. unguent. denti extrahendo applicandum vel indendum.

Caries verò ulterior progressus per artem, & medicamenta inhibetur, efficacissime imprimis per infusionem dentis carioli in loco carioso cum cauterio actuali, sive ex ferro, sive ob subtilitatem commodiorem, ex argento vel auro factio, quo factio auro foliato dens cavus repletur, præservatur enim sic à majori putredine & corruptione: vel ex cera cum melle probe subacta, vel positus ex cera viridi, propter admixtam aruginem, impletur dens carioli excavatio. Ipsa myrica denti indita, egregia est in hoc casu. Confer hîc River. in observat. communic. pag. 309. ubi refertur, quod dentes terebinthina impleantur, & cauterio actuali dens inurantur in carie. Loco actualis cauterii, ubi necessum visum fuerit, potentiale adhibetur: Sæ aqua fortis dens carioso admodum vel spiritus vitrioli ad gutt. 1. vel 2. bombace indita, ac denti adhibetur, mixtæ corrosivæ juvare & præservare dicitur. Item Zingiber in ozymelite coctum, & in cavum dentis immisissum, præservat corruptionem coralliorum pulvis denti cavo inditus, vel ossa sepiæ, item camphora cavi interioriorem progressum inhibent: vel ex pulvere coralliorum alborum cum melle rosato ad consistentiam linimentum crassius tridactis dentibus illitum cariem inhibet.

Fortorem dentium ablata caries sponte curat: si minus gallia moschata cum cypro & mastiche mixta, denti cavo indatur. Tollitur & foetor dentium, si abluuntur aqua in qua sal ammoniacum solum, post prædium & cenam.

Vermes ex dentibus elicite subinde necesse est. Præstat hoc optime Sabina in vino decocta & in ore retenta, quæ copiosius vermes elicit. Fumus item seminis hyoscyami specificus est, per infundibulum susceptus ore, mirabiliter vermes expellit. Confer A& Med. hæf. volum. 1. pag. 209. Suius item sive fumus ex fructu halicacabi confusus, cum cera mixto, facta exinde pasta, & in laminam ferream igneam injecta, fumum suggerit, quo ore excepto, cæteratim vermes cum spuro copioso rejecti, & crudelissimi dolores sopiti, observati fuerunt. Spiritus sulphuris quoque dentibus cum bombace inditus vermes optime necat, & dolorem inde oriundum placat, vel ex pulvere galliarum, cum succo rad. pyrethri impregnato paratur remedium, quod denti in-

ditum vermes expurgat seum cervinum quantum contra vermes dentium valeat. Vid. Bartholinus centur. 3. histur. 96.

Quoad Tophos (sive Lithodonta) dentium eorumque foetorem & nigritiem, ac ab his dentium caries, crebrius dolor, aut præmaturus casus superveniat, cura instituenda venit, per ea, quæ sordes dicatas abstergeat, vitiorum earum aciem, gingivæ & dentibus hostile, absorbere & hinc blanda adstrictoria vi gingivarum tonum roborare valent: quod si longius processerit malum, & trnactor mucus dentes viciaverit, poterit incidenda & dissolvenda, & quidquid heterogenei fuerit abluenda, & quali cædenda adhibenda erunt, habendo semper respectum ad scorbutum plus minus. Convenient igitur in leviori malo ossa sepiæ, CC. ust. mandibul. luc. pisc. testæ ovorum calcin. cinis majoran. coestimatin. urina calida, cum qua fricentur subinde dentes & gingivæ: Tartarus calcinatus aut parum salis tartar. ust. &c.

Duriora subiecta lapidea ex silicibus, pumice, &c. vitanda sunt, quia crebriori usû gingivæ atterere & absumere valent, ut testè monet Zywelferus in Phis. m. reg. pag. 101. nisi ubi fortius agendum: tunc enim paulo tamen rariis adhibita, talia minus nocent. Exempli loco sit farina vîginea Myrsich. ergæ dentibus dealbans, & à tartaro corrosivo purgans.

Hicce modò dictis convenienter radix Irid. Flor. additur, præsertim quod & ipsa conveniat propter odoris gratiam, propter quem ultimum finem non inepta. Paratis dentificiis aliquot guttæ olei destill. caryoph. aut lign. Rhodii possunt addi. Quod si dentis pulvis color purpureus conciliandus, Cacionigillam in aqua alumini solvamus, & soluto aspergamus pulvemet, qui exinde abigit, sed leni admutas ignis idem purpurascit. Quod si penitissimus fuerit malum, sordes tenaciores, obstinata nigrities firmius dentibus impressa, ac firmius conglutinata lithodonta, optimum remedium est spiritus salis cum melle ad gratiam saporis, vel quantum placet melle, & ita gingivis illitus. Spiritus vitrioli suspectus est, cujus loco oleum sulphuris in aqua communi dilutum, vel cum melle rosato subactum adhiberi potest. Pertinet huic oplata Bonelli cent. 2. observ. 69. ad gravius malum præsertim conveniens. Non incommo- dum est, si recipiatur vinum, cui permisceatur spiritus sulphuris, ut acescat, huic immisce radicula polypodii per 24. horas, hunc sicca & utere pro dentifricio, hinc, mundat, & candorem lisdem inducit. Et ea quæ de spiritus vitrioli refert Riverius in libro sexto præf. capite secundo, potius spiritus salis, quam spiritus vitrioli applicanda veniunt. Quod etiam facit ejusdem liquor ex auro usû, hic egregie conveniens citato loco.

Pulvis dentifric. Principiis Altenburgensis. \mathcal{X} . Oss. sepiæ. CC. ust. pumic. præp. an. ʒiij. moschit ʒj. M. F. pulv. cui aspergetur spirt. rosat. ʒß. & sicca. Inceram.

\mathcal{X} . Gran. chem. Santal. rubr. an. spir. vini q. s. pro extrahendo Tinctura, qua itrota aliquoties prædictum pulvemet, & sicca. Non incommo- dum est hujusmodi pulveribus dentificis sal ammoniacum subinde addere, dentibus, gingivæ, ac omnibus oris partibus imprimis conveniens.

Quod atiner dentes vacillantes sive minus firmiter gingivis connexos hoc vlti contrahunt propria vel aliena, gingivarum culpa. Propria eadem est, sed in minori saltem gradu, quæ & dentes decidere per- nitens & cadere facit, & quo superius sufficienter actum. Aliena gingivarum culpa consistit in eo, quod fibrosa illarum caro vel mollis, sive flaccida, vel

fmul

funil tunda, vel etiam nonnulli exulcerata, adeoque omnibus his casibus plus minus cruenta simul e-
vadat. Rarum est, quod in Schenckii collectis ob-
servat. libro primo capite de dentibus pag. 200. re-
fertur, ex defluxione in dentium alveolos, hos gy-
pici putrici inartum impleri, ut dentes extrudantur.
Suscipio tamen non tam ex defluxione, quam
lapidis live topi dentalis uberiori incremento, po-
tius vitium hoc ortum transisse. Ita verò mala gin-
givarum oriuntur frequenter Alveolæ, vel in gene-
re actiosis, vel in specie scorbutico sapore, live
vitioso acti sale inquinata culpa, à qua tenuis libra-
rum gingivarum resolvit & emolliit, penitenti ex-
dem, & plus minus succellivè, non raro sensili ad-
modum cum pruritu erasi assolent, valculus sangui-
nis uos per directioni vitialis, sanguinem pulsatione tuo-
detibus.

Postea & mercurii usus, tam in salivatione en-
tanda, & hinc acriori & preternaturalis cujque
expolitionis salivæ profusum, quàm si lei pro usu
cosmetico applicatus, ordinatio gingivam valdè opere
laxare, & omnes dentes hinc mobiles quasi reddere
solet.

Quòd si ulterius procedat negotium vitriari magis
gingivæ, exulcerati profundius, absumi eadem, vel
consumpi etiam, & ad gangenam disponi assolent.
Malum, quod in genere Scorbutus appellatur.

Quod si firmior paululum gingivarum fuerit tex-
tura relaxata, eadem nihilominus sanguinem uberius
in se recipit, & spumæ intumescit & excrecit carne
laxa, flaccida, & flosida, & faciliè ad tadium eruo-
nent stitantes in gingivam hinc dicta excrecentia
sive dentium superincarnatione.

Ut igitur moveantur hæc mala, præmissa debita
radicis morbose internæ curatione, gingivæ flacci-
dæ, tumide, erante adstringendæ, exulceratæ ab-
sorcentibus, & mundificantibus ac adstringentibus
consolidandæ, coruptæ & plus minus gangrenosæ,
ab ulteriori mali progressu præservandæ. Conveniunt
igitur flor. ros. rubr. flor. aquileg. & ex his para-
tum unguentum de aquil. ad scorbut. oris præser-
vatio prænotum. Descriptio prostat in Tilemanni ma-
teria Medicin. CC. & ebor. ust. Lactæ & Myrrha
alumin. tam crudum quàmustum lap. cancer. fol.
grecus, ligustri, radix iteos, flor. bistort. toment-
ill. flor. malvæ arborescent. nascunt. aqua ruta, sal-
via, Rosmarin. ex his vel fuit Pulver. dentifl. vel
exemplum vide in Barthol. Censur. 6. histot.
54. vel ex illisem sit decoctum verbi gratia, Ruta
in vino decocta, quo calidissimo os eluatur, egre-
git est contra hos affectus scorbuticos. Salvia item
Rosmarin. decocta in aqua cum paucis additis alu-
mine, egregius est Gargarismus ad dicta dentium vi-
ria vel.

2. Herb. saliv. Man. ijsa. flor. malv. hortens. in-
ter. Man. j. rad. polypod. unciam sem. Fiat decoctio
in lib. 3. aqua fervens colatur. adde mellis rosit.
5. ss. alum. ust. 3j. lapid. pruell. 3j. iij. tert. sigilla.
3j. M. F. Dentiluvium.

Pertinet hæc Gargarismus de Tormenilla Myrsin.
part. 393. Decoctum ad gingivas vulnerandas Pueri in
pharmac. pag. 317. Si quoque aliud quid, cetera Myr-
tha & lacta in istis gingivarum vitiis sunt præstan-
tissima. Fide Tinctura lactæ associari solet. Nam
fol. Myrrha crebrius Masticata præstatur egregiè
contra scorbutum oris. Tinctura lactæ prostat, pag.
318. Attamentum Myrs. & Conf. M. C. Ann. 6.
App. 26. B. D. Michaelis tincturam lactæ ita præ-
parabat.

R. Phlegm. vitrioli q. v. in quo dissolve alumin.
q. s. soluta & mista infunde lactæ pulverisatæ donec
tingantur M. Porro ulterius mel rosaceum cum spi-

ritu salis tantillo usque ad gratum acorem impreg-
natum, omnia ulcera & putredinem partium in o-
re sanat, si præsertim ex scorbutico origine ducant.
In specie si simul cum decocto salivæ subinde ab-
luantur gingivæ. Egregium quoque est linimentum
Hartmanni ad hos gingivarum affectus, quod defici-
bit in prax. elymiar. pag. 223. Sed cui non incom-
mode Myrrha addenda venit, ad imitationem Sen-
in prax. lib. 2. p. 3. f. 2. cap. 7. pag. 635. Cui simi-
le est elegans linimentum contra oris & gingiva-
rum scorbutum, quod habet Deckerus in comm. in
prax. Barbett. pag. 156. Cuius loco possit etiam re-
cipi.

2. Alum. crud. 3iss. Bor. squileg. fol. saliv. 2ss.
3ij. Rad. iteos 8. 3ij. Myrrh. elect. 3ij. c. f. q. mell.
ros. f. linimentum egregium ad vacillationem dentium
scorbuticam, Vel.

2. Rad. bistort. 3ss. Bor. 10℥ tubr. 3iss. Balsust.
3j. Aluminis usi 3i.

Impregnetur largius spirit. cochlear. qui ad oris
scorbutum est egregius. Hinc in excrecentia gingiva-
rum scorbutica, luccus cochlear. cum alumine uso
mixtus petquam egregius est. Sicuri ad hæc ipsa gin-
givarum vitia ex scorbutico nullo cedit vernacularis i
cujus decoctum cum alumine & melle nobile expre-
tinentum est, gargarizando usurpatum. Vid. M. C.
Ann. 6. pag. 50. In Dichi Medici. Experiment. part. 2.
pag. 78. Idem egregia est mixtura pro his gingivarum
malis ex aq. calc. viv. cum alumine crud. & ust. ac
rad. iteos Bor. quod in mentem revocat aliam non in-
convenientem mixturam. efficacissimam in scorbutico
oris, nempe erythorem aque calcis vivæ supernatantem
salisformem.

2. Hujus cremor. 3ij. Gum. lac. 3j. Vitriol.
Cypr. gr. vi. aq. rosar. saliv. 2ss. 3ij.

Solve calore leni, os probè impregnetur à lacte,
eo lavetur gingivæ, probatum est. Ac merito extol-
latur usus, lactæ: Nam B. D. Michaeli aliquando pu-
tredinem gingivarum scorbuticam, tantam ut gan-
gram minatur, & propter intensissimum fetore
nemo juxta agum commotari posset, per to-
lam tincturam lactæ, præmissis internis universalibus,
felicitè restituit. juxta lactem hanc nobilissimam est
Myrrha, verbi gratia.

2. Fol. saliv. alumin. ust. maxill. loci piscis calcia-
nas, Myrrh. tubr. an. 3iss. Mell. q. s. pro linim. ad
fricandos dentes.

Quòd si efficacius postuletur, aliquot gutt. spirit.
salis impregnetur.

In gravius malo ulterius procedendum est, atque
sic, præter linimentum Hartmanni, supra laudatum,
ad unguentum Egypticum melle rosato probè per-
mixtum, deveniendum, pro graviore exulceratione,
aut inde metuendis malis gingivarum curandis.

2. Alum. usi, salis ammoniaci, an. 3j. Mastic.
thut. an. 3is. M. F. Pulvis.

Affricandus gingivæ, postea quàm ante & post de-
cocto salivæ, tomentill. ac tot. rubr. os elorem fuerit.
Imò interdum aqua forti gravius gingivarum lu-
xuriez sedanda. Confecti item Linim. Senneri. l. 2. prax.
part. 1. cap. 16. pag. 52. Aut denique aqua viridis ex
leidi aris, paucis insipign. alumine & quibusdam
vulneratis, addito melle in aquam infusus & decoctus,
hic commodè adhiberi possunt, quo afflicta
gingivæ à luxurie, flacciditate & putredine detra-
dantur, e. g. sit vel aqu. Virid. Florum. Pr. pag. 110.
Vel aq. virid. Florum cuius descriptio prostat in fine
observationum ejus.

Stupore, tandem sive Hemodia siccif dicuntur den-
tes, sicque masticationem impedire, quando specia-
li doloris genere afficiuntur, post acida vel assumpta,
vel vomiti rejecta.

Cui affine malum est *Algor Dentium*, dum frigoris attractu notabiliter albeantur dentes, nempe acidum & frigus inimicissima existunt dentibus, unde illorum nimia impressione afficiuntur fibre illorum interiores, & quasi irritantur, ut à cujusvis objecti actione specialis quidam dolor in dentibus percipiatur, masticationis negotium infigniter impediens.

Curat stuporem dentium portulaca recens masticata, calefacta tantum quam ventus, adeoque alcali manifestiori divisa. Siliqua caracea masticata, item, calidum ovi vitellum, ad duricem coctum applicatum. Omnino optimum calida urina applicata; Algorem quod attinet spit. violi dentibus affricus, vel poia calem masticatus, vel vitellum ovi affatum, calide masticatum; item theriaca dentibus affricata huic malo medetur.

Dentium morbi ex Clariff. Ioh. Herthmanni

In stupore decium fricetur dentes stupidi sale, vel masticetur panosa laneus vel idiosus pileus.

In nigredine dentium evitanda, præsertim evitetur acutum & cibi admodum calidi.

Removeatur item sæpius adnatus Tartarus & impuritates dentium, collaendo os à sumpto cibo, cum vino.

Deinde nigredo & colores dentium facti hoc modo commodè auferuntur.

℞. Aq. fontanæ, dilue in eadem spiritum Vitrioli, vel aquam seu spiritum aluminis q. s. ne scilicet omnino acescat. Cum hoc lavameo quotidie mane & vespere cum Lacinia lanea frica dentes diligenter, deinde eosdem frica cum magisterio Corallorum vel cum hoc pulvere.

℞. Mandibularum Lucii piscis, Coralli. albi. CC. usti, aluminis usti, radicis ireos 36. sil. gemme 5j. M. F. pulvis.

Nigredo dentium & lingue, ea esu ceraforum vel myrtillorum extemplo tollitur solum candelarum sulphurearum, *Schwefelsäure*, faucibus tamen propter fumos nocivos oculis.

(Nota, sordida & nigredinem dentium statim ac facile quidem spiritibus acidis detergi, sed si sæpius ita utamur, facile dentes ut alcali oileum erodi fragilesque factos postea tanto majori nigredine & squalore infici, propterea in his affectionibus dentium commendatum habes saccharum aluminis, de quo paulo infra, aut per se aut cum pumice corallive rubris prep. commodum ut dentificium adhibeatur.)

Mobilitatem dentium auferit peculiare & specificum remedium seq.

℞. Gland. 3j. gallar. 3ss, aluminis usti, succi acacie an. 3ss, fol. rosarum rubrarum M ss. Coque cum vini rubri lbij, ad casum unius pollicis, postea cola. Cum hoc decocto sæpius quotidie elusur dentes, rufum figuntur & immobiles redduntur.

Odontalgiam ex quacunque causa ortam ex quadam specifica proprietate tollit radia lapschi acuti (sote germinationem vere collecta præstat, mihi familiaris) exsiccata & denti dolenti applicata.

Idem præstat, sed remissius rad. lappæ que dolores subito auferit, humoremque superfluum extrahit magis.

Si sunt dolores ex destillationibus, decocto rad. urticæ majoris, alii decocto cum pauxillo nucis moschate rase & croci in vino adusto & acet. ana parato & calido in ore, locove dolente tenuito humores illapso mirabiliter extrahunt: ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulo post mitigatur & desinit.

Idem præstat decoctum Guajaci cum vino & aqua paratum. In eodem casu præstat decoctum serpilli (in primis si ea destillatione) vel ejusdem aqua gasulando nempe cum iidem.

(Dolores dentium propediem sedat asperum sequens. *Saccharum Aluminis*.)

Rec. Aluminis crudi lb ij. vel iij. & per retortam in arena lento igne phlegma abstrahit, quo facto cessa, & refrigerata retorta phlegma tedo exsiccat alomini, cumque per 24. horas in digestionem B. V. steterint, phlegma iterum abstrahit, qui labor cobobandi, digerendi & phlegma abstrahendi sæpius repetatur. Tum post ultimum phlegmatis egressum, illud quod in fundo retorte remanet, in cella humide & frigida acri caposum in liquorem abeat, qui filtratus & per 12. dies in cineribus igne lento digestus demum per cucurbitam in cineribus ad siccitatem usque omni humiditate exsurtur. Remanet in fundo saccharum Aluminis.)

Si dentes sunt cavi & dolent, vel etiam circa cavitatem in dentibus dolentibus præstans est ol. Caryophyllorum, in cuius seil. 3j. Camphoræ 36. solutus fuerit. Hujus compositi gut. j. vel altera in gollypio (præsertim quod cum mosco fuit) cavo denti immittis vel etiam dolenti aliquin applicata, omnem dolorem auferit.

Eatenim est laudanum opiatum in forma pilularum dentibus illitum vel inditum, vel externe (in genis) cum unguento alabastrino (gt. j. laudani ad 5j. onguenti) dissolutum. It. cum Emplastro de mastice & cera.

(Subitaneum est remedium perficacia contra & denti dolenti applicata, vel ut pilula efformata cavo denti imposta.)

Dentes cariosos juvat trifolium in semine Hyoscyami per tubulum vel titorium ad dentem dolentem factum.

Dentes cariosi evelluntur promptius, si duobus digitis madefactis, ac inspersis pulvere ex laceris aquaticis excoctis & in clibano calcinatis aliquandiu prehendantur. Laceræ colliguntur Aptili & Majo.

Sic etiam dens ex maxilla motui evulsus, & cum radice sua dentem cariosum sæpius tangens, tandem post aliquod dies stultulat dentem cadere facit.

Laxitati, putredini & cariosis gingivarum à proprietate quadam Aquilegie mederi videtur. Potest autem inde tale compositum fieri:

℞. Pulveris fol. aquilegie, falvæ, menthe crispæ, Nucis Moschate ana 3 6, Aluminis usti 3j, mellis purissimi 3iv. Mel incalefcit ad ignem & leniter decoquendo desumpitur, deinde pulveres prædicti cum melle adhuc calente sensim aspergendo miscantur & serventur ad usum. Hæc urgenti illinantur gingivæ bis quotidie (NB. Decoctum summitatum rubi idem etiam valet hic) quod si cibis capiendus est, eluatur os aqua prunellæ vel infuso nasturtii aquatici in vino (in primis in scorbutico.)

Ad mundificationem antem gingivarum putrefactionem maxime valet aqua illa viridis mea composita secunda, de qua supra in Nasium affectibus, orem nimirum.

Dolor dentium, quia pietumque fit à capitis destitutionibus, ideoque in curatione ipsius statim ad ea accedendum, quæ fluxionem inhibent. Unde statim temporibus applicandum Emplastrum de Gummi Elemi, vel etiam Mastice factum, quod antequam applicetur, calcisat optime.

Inter scapulas applicetur cucurbita magna sine scarificatione.

Hinc statim ad repellentia materiam fluxumque evacuantia confugiendum, qualia sunt galla matura in acet. cocta, ita ut acet. in ore supra dentem dolentem destilaretur calide per horam (vel j.).

Hinc ad topica, anodyna ex proprietate occultata dolorem tollentia progrediendum.

Quod si contrarius sit dolor hūc non cedens, sed ab aliquo intemperie vel capitis vel totius corporis, aut copia materię ad caput fluentis, & inde ad dentes, capiti simul providendum tum evacuantibus, tum alterantibus & confortantibus medicamentis, tum etiam toti corpori.

Topicorum quibus vel solis sæpius dolor omnis aufertur sequentia sunt præstantia.

1. Laudanum opiatum cupus gr. ij. cum gut. ij. spirit. Vitrioli denti dolenti applicetur, simulque pil. j. in corpus afflatur: Dolor loquax, applicato etiam Emplastro ad tempora, & i. opus, cucurbitulis.

Similis planè effectus est oleum ex buxo destillatum.

2. Scitri buxi q. l. & replentur 3. partes retortæ vitreæ, retortam in cineres loca & destilla oleum & liquorem aequum igne primum leni, postremum fortiori, & tandem summo, & destillabit oleum. Idem oleum restida per decantationem aut per vesicam destillatur. Huius olei (sẽ buxo)

3. Gr. ij. & cum vino, si affectus à frigida destitutione veuat, aut cum aceto si à calida. M. Continuat æger mixturam dicam in ore, post aliquid tempus exspuat. Si dolor nondum cessabit, repetatur, donec ad sextam vicem, tandem abluit os vino aut aceto, & sedabitur dolor.

Idem pulvis galliarum in succo radicis pyrethri decies vel 12. imbibitus & exlicatus cum tertio, M. F. globulus parvus qui denti dolenti impositus dolori medetur, dentes firmiores reddit, veniculos in ipsorum cavernis gnitos necat, fluxiones omnes ad gingivæ delapsas extrahit.

Tandem olivum in omni & acerrimo dolore perfrugium, applicare vesicatorium post aures & cervicæ.

Exterius inungi possunt maxillæ oleo amygdalarum dulcium, & tumori applicetur emplastrum de melloto. Si intus in ore ad apothemā tendat dolor; fiat cataplasma ex sicca assata cum farina tritici. Si aperiat, dissolvatur mel rosatum in aqua plantaginis, utroque os abluatur os.

Dentium Morbi ex Clariss. Lucæ Tacci.

Dolent sæpius Dentes in radicibus, ubi membranæ, & nervuli diffunduntur, à sanguine, vel lymphæ eas partes perfringente, acri, acida, salia, aut aliter præter naturam affecta; unde interdum etiam tument mandibulæ, & gingivæ; quin & dentes earum, ipsæ vero erodunt, ulcerationeque inficiuntur, & cum scalpuntur, vel cibis mandunt, nonnihil sanguinis stillant. Tunc autem; ac talis dolor quibusdam accidit, ut impatientes mortem sibi adicerent; quamobrem maximis tormentis annosati potest ex Celso.

Inter dolorem sedantia, illiusque causam corrigentia omnium præstantissimum perhibetur à Roderico à Fonseca oleum buxi, si in foramen dentis una vel altera gutta incipiat; quod etiam à Samuele Formo confirmatur, & modus illud extrahendi describitur, apud Riverium in *observationibus eadem ab illo communis*. Idem quoque præstari dicitur ab oleo camphoræ pari modo in dentis foramen instillato. At illius Cæsar Claudius evellit oleum Terebinthinæ chimicè paratum cum pulvere camphoræ. Camphoram ipsam in aceto modicam elixam adhibet Montagnana; & iterum opium: Thonet solam camphoram; & Rolandus oleum camphoræ gossipio exceptum; vel etiam oleum ligni heraclei, quo præterea humores ibidem stagnantes educi, vetres dentibus innatos necari, & causam quancunque doloris adimi, ait. Alii quoque laudæ aquam solani, cum oleo vitrioli romanæ ad acidum saporem usque premittam. Radices sambuci in Aceto, & vino deco-

ctas singulare experimentum inquit esse Raynaldus Mindererus apud Gaullingium, Decoctum Nicotianæ, & florum chamæmeli topium ore detentum commendat Lo, Henricio, & Riverio; & Cassiducio illud Sabina. Atque Foresto radix lapathi acuti concisa, & supra dentem dolentem appolita; quam etiam magnificat Hartmannus, qui præsentaneum quoque facit esse remedium oleum caryophyllorum cum quinta parte camphoræ. Essentiam similiter satoreje mirifice dolores dentium sedare tradit P. Lo. Faber si aliquot guttis dens dolens & gingiva perficitur infusa, etiam in auribus guttula. Mirum est quod refert Helmontius se vidisse os brachii bufonis statim primo contactu odontalgiam tollere; & eodem dens hominis senio extincti, dolentem dentem excidere. At admirabilis, quod memoratur à Borella: altum contulit cum momento salis pollicis admotum viscus excitando, aquam educere, & dolorem dentium fugare. Buxi pastoris pinita, & indicæ auribus, sicut & nato betonica quimodo dolorem aliquando destillat sciat ab eodem; itemque lapide imperiali dicto denti dolenti imposito: conficitur autem is ex sale petreæ, & alumine fusi cum aliqua portione sulphuris, atque cerebro purgando, vitæ aceto, & nervis opitici detergendis plurimum confere dicitur. Sale fixi arterie temporum applicito curatum dolorem dentium vidit D. Iseque apud Riverium: & pice Burgundica cum pulvere nucis odoratæ, Borellus. Mergere tenet celo sereno in pulvere redigit Tacchettus, deindeque in calcem, donec viridecat; postmodum miscet cum farina, vino, & tragacantho in formam rotularum, & denti laboranti utilis imponit ex Grulingio.

Ad extrahendos vero dentes dolentes absque ulla Chirurgi opera, scribit Riverius efficacissimum esse helibocastrium, si eo dens affectus conficitur. Et Francisus Joël. dissolvendum ait gummi ammoniacum, aut galbanum cum lacte esule, vel hyoscyami, ac decoquendum lento igne donec lac absumat; residuum vero in globulis redactum dentium foraminibus indendum per noctem: mox sine dolore dentes eximi posse subdit. Idem & ego aliquando usu gummi hedere arboreæ factum vidi; cuius decoctum cum rose marino in posca, tepidum ore detentum dolentibus dentibus moderi notat Hentius.

Si vero stupent dentes, ut ab acidis, creduntur prodest portulaca mansa, cera, succus glycyrrhiæ, amygdalæ, avellane. At quicquid calet, certo modum tollere experitur; unde panis calens, vinum calidum, præcipue si in eo ebullierit salvia, rosæmarinus, pipet, pyrethrum, aliudve simile; aqua etiam ardens optima observatur. Ficht. Academicus euriolus fumum absinthii supra prunas in cedi ore exceptum, dolorem, & stuporem dentium prohibere docet. Et Hartmannus eos sale fricati jubet.

Ad dentes insuper etiam valde prodest suum odontalgicum scribit Collins ad granum nunc denti admotum cum gossipio. Et Fredericus Hofmannus spiritum salis adhibet. Olea etiam & essentia omnium aromatum alius sunt in usu, sed præsertim caryophyllorum; itemque spiritus vini cum modico camphoræ. Quod si præterea gingivæ ulcerentur, & sanguinem stilent, commendantur antiseptica medicamenta, infusiones, pulveres, & spiritus Nasturtij, cochlæarum, beccabungæ, salvia, mentha, & aquilgiz, quam cæteris præfer Hartmannus. In uln præc. gen sunt pulveres, & conditura bacorum myrti, rosarum tubæ, Corallorum, myrobalanorum. Sed alkalia acutiora præstantiora existimantur; Et si fortasse emaciat gingivæ, hinc alius interfectus admodum præsentaneum remedium dicitur ab Hartmanno, & Borella,

Si dentium mobilitas accessit seq. en. decoctum expectum, ait Hartmannus, quod habet: gland. 3j. gallar. alum. ulsi, & succ. acac. singul. 3ss. fol. ros. panis. m. is. decoq. in lib. ij. vini rubr. & servetur ad usum. Eo autem sepius dentes eluendos præcipit. Aliud commendat Zecchius, quod paratur ex mell. 3ss. sindaracha, scb. vernic. ammon. alum. scissilis, & thur. singul. 3ss. bull. j. in aqua vice 3ij. acet. alb. 3j. deinde col. & add. croc. g. ij. & cum gossipio eo dentes, & gingivæ fricentur. Non solum, inquit hic Auditor, mobiles dentes confirmat, & roborat, verum etiam congelatos in præstium statum restituit, dolorem sedat, & rheuma delicias, Tincturam essentiam Cusandi Frommanni describit Grollingius, cujus vires summas esse fatetur in dentium mobilitate, & gingivarum puritudine. Hæc etiam opiam efficacissimam testatur Borellus ad dentium radices carne obducendas; dentisque firmandis, & dealbandis. Confit autem illam ex modico aluminis cum uncia una olei sulphuris, & conditura floram buglossi, vel rosarum anella lex. Mox detergo dentium tartaro, ope scalpelli lignei opiatam præclaram admoveo. Præstat idem Aqua descriptione Portæ ad dentes confirmandos, quæ mobiles stabiliri, & erosos carne repleri aie. Firmandis quoque, & dealbandis dentibus optimum dicitur oleum vitrioli à Montano, & Foresto, si nimirum eo dentes refrigerentur; sed aliquoties in usum relato, exius acta non probavit.

Vermes denique dentium radicibus hærentes perimuntur decoctum corticum fraxini, & radicum urticæ, Audite Jo. Cratone. Et Thomas Bartholinus libi à Rustico quodam Empirico communicatum refert mirabile remedium ad vermes extrahendos: & dolores mitigandos: nempe serum cervinum lioreo exceptum, ad ignem liquarem, & gingivis impositum.

Dentium morbi ex Clariss. Theod. de Mayerne.

In dendum dolore primò videndum est quantum sit istius causa, & secundum varia causarum genera vaia & apposita remedia sunt adhibenda. Dentes dolere solent. 1. ab humorum in eos & partes adjacentes influxu, licet dentes ipsi non sint visiosi. Hoc casu ante omnia parietur patienti hydragrigi fortioribus; hinc enim humores vel pituitosi, vel fetidi, per sedem educti à dentibus derivantur, unde eorum dolor proclius effluit. Revulsio etiam per cucurbit. vel vesic. prodest. Vel 2. à Cariebus in dentes cariosos; vel concavos delabente. Hic etiam purgatio imprimis utilis est; at topica sepe etiam sunt necessaria, eaque sæpius opiatæ. Ut.

℞ Olei Caryoph. still. 3ss. dissolv. camph. 3j. adde tinct. opii cum opim. spic. vitr. prius digesti, deinde cum vin. sp. extract. & ad mellag. reduc. 3 ij. tinctur. croci 3ss. Ambr. grif. 3j. Mosch. gr. v. m. serv. in pyxide argentea bene clausa, vel vitro laticulculi ostioli velicæ oculo. Urgente dolore intrinsecum gossypium & indatur concavo denti.

Aqua hæc Crollii magnæ est efficacia.

℞ Origan. serpyll. laly. mentast. hydropiperis, seu persicæ, casus. guaiac. ras. tamarisc. & buxi, ana m. j. affunde spiritum vini opiatum, id est à præparatione Laudani residuum, ad eminentiam quartæ digestum. Extrahatur infusione tinctura. De hoc spiritu tincto tanillum in ore teneatur parte illa ubi sunt dolentes dentes, postea iterum expuatur. Reiteretur si opus sit. Si dens sit concavus, gossypium intrinsecum imponatur.

Vel fistula tabaci circa tubi medium indatur filo ferreo aliquid gossypii aut liamæ carpeis; caput tubi repleatur pulvere tabaci pro more, accendatur, & totus fumus exsurgatur donec pulvis redigatur in cineres; strangatur tubus, & eximatur gossypium co-

leo tabaci madent, quod indatur denti cavo: illico cessat dolor.

Sic oleum stillaricum buxi denti cavo instillatum dolorem compescit certo experimento.

Remedium sequens non fallit.

℞. Lichantracum pinguius partes eras, sulphuris vivi partem unam, pulverizentur simul in mortar. stann. & distillentur in retorta leno igne: primò exhibit fuliginosa substantia nigra & pinguis; tunc auge ignem, & exhibe aliquid unctuosum, quod seorsum clausum reverteretur; postea separa oleum à liquore: utro testifica; serva; applica cum bombase.

Trochisci seq. cavis dentibus inditi mirè dolorem sedant.

℞ Sem. opii 3j. Sem. hyoscyam. 3j. styrac. calamit. mastic. ana 3ij. pyrethr. piperis longi ana 3ss. Castor. croci ana 3j. camphor. gr. v. opii præparati 3ss. m. & cum balsamo Peruv. q. l. m. albi, ex qua trochisci.

Denique hæc aqua nulli secunda est.

℞. Succo alii 3ij. opii 3ij. caryophyll. 3ij. vini Malvatici vel Canarioli 3ij. macerentur per quadratum, deinde f. distillatio ad siccitatem in B. vaporoso vel sicco. Aquæ stillant. adde camphor. per vini spiritum solutæ 3ss. Mercur. anodini in op. vin. sp. soluti 3vj. m. serva vase optimo clauso, applic. denti croco & gossyp. Mercurius anodynus hic est.

℞. Merc. sublimat. q. v. lute affunde aqua. fact. ex nit. i. & vitriol. ij. q. l. & f. cohobatio decies aut duodecies, donec instat olei suar, & in frigido crystallizetur: crystallos spir. vini solve exhalat ad siccitatem; tolve iterum, exhalat ad pelliculam, & in cella ut a. e. crystalliza.

N. B. Ut factor ab opio removeatur (docente Saladino) pistetur 3j. opii cum duobus capitibus alii; deinde distilletur hæc mixtura per alembicum: De ista aqua detur in potu secundum discretionem, quæ mirabiliter provocat somnum & erit sine fœtore. Quod pulchrum secretum non est omnibus revelandum.

℞. Opii 3j. castor. 3j. croci 3ss. addito pauco balsamo Peruviano nigro, f. m. ex qua rurande, qua involuta syndone rattil. induntur atri lateris dolentis.

℞. Mass. istius 3ij. mastic. cum vin. spic. emollit. 3j. gum. elemi & tamaracac. ana. 3ss. m. f. Enplastum, cujus porcio extendatur in holoserico, & applicetur arteriis temporalibus ad fluxionem inhibendam.

3. Dentes aliquando dolent à vermibus qui in iis genti eos erodunt. Hi enecantur vel aqua Mercuriali sæpè præscripta, vel ab Aloë suprà laudatis medicamentis admixta.

Si dolor (undecunque oritur) nullis remediis cedat, dens dolens ferro extrahendus est: quam operationem si præ metu r. fugias ager, trahetur medicamentum empiricum sequens ad dentes sine dolore evellendos.

℞. Ranas virides arboreas quæ volēs, has in sufficienti coris Majalis quantitate probè obtearato vale vitreo in cinere vel arenâ locato; tamdiu sæc coquare donec liquentur & aque fiant: hanc in fimo equino vel balneo inter ferraturam abtegnam potestæ, & supernatantem oleum pinguedinem, quoties apparuerit, corneo coactile, aut ligneo aufer; nulla amplius adveniente, reliquam ut inerte abijce. Hæc allecta pinguedo dentes à suis radicibus vellit, adeo ut si frenum hac illaturus hos aut equus hoc frenum votans in ipso præcepti dentes amittat. Liniatur ignellum hoc unguento, & circum dentem ducitur, qui statim à tali illius postea facillè separatur.

Consolationes.

Dolor ille dentium, qui te tam immaniter excruciat, à frigida destillatione originem habet, quæ à sinistra capitis parte in maxillam ejusdem

um lateris, & dentis nervos, interdum ulque ad oſtoplatas decumbit.

Ad hujus præsecutionem primò colubendus est cararrhus, causæque ejus penitus circumcidenda. Id autem fiet his cataplasis semel in mense devoratis, vel hac porione, si ætas sit aut cædida ætatis constitutio. Sequenti die à prima purgatione tonsam caput his seminis in duplicato linceo conclusis fricabitur, idque fiet spacio duodecim aut quindecim dierum, quibus elapsis purgabitur corpus ut prius. Dein posttridie caput maximeque pars ejus sinistra, paucillo aquæ vitæ singulis matutinis temporibus forebitur, asperito pills, post solum, sequenti pulvere. Interea denticulum rario habenda: quibus denteris ter aut quater in die longè à cibo sumpto, retineatur in ore & manducetur hoc masticatorium, ad punitam è toto cerebri corpore, maxime ex ejus ventriculis, per insensibilem in os & palatum attrahendum. Deinde hoc d. cotho sapissime in die gloriæ abluantur.

Interim cibis boni succi vescendum, sobriè vivendum: abstinentia ab humidis: vitandum frigus capitis, dentium & pedum.

Remedia infra scripta diu ac diligenter continuanda, quia morbus est inveteratus.

℞. Maſt. pilularum cucurmarum & de agarico, Pilularum assafoetidis, an. ʒi.

℞. Aquarum salviæ & betonice, vini albi an. ʒi. In quibus infunde rheubarbari electi, Agnisi tritissimi, an. ʒi. In expressione dissolve diaphanè ʒij. Syrupi capillaris ʒi. Fiat porio purgans.

℞. Melli ʒij. Salis communis ℥i. Seminis anisi & feniculi an. ʒij. baccharum Lauri confusum ʒi. fiat pulvis tenuissimus. Inipregur raso capiti.

℞. Pyrethri, Staphisagrie, Gingiberis, Cardamomi, Caryophyllor. Syriaci calamiæ ana ʒi. Fiat pulvis subtilissimus ad usum dictum.

℞. Malliches ʒi. Radicis Pyrethri ʒi. Cubebarum ʒij. Incorporentur in forma solida cum melle anthopæi: fiat masticatorium.

℞. Salviæ minoris man. j. foliorum myrti man. f. Malliches conquisitæ ʒi. Bulliant simul in vini albi & aquæ fontane an. lb f. Coletur & reſervetur in phiala pro collutione oris. Job. Fernelius ex lib. Medie. p.

Dn. Egidius Heideimann, Senator Colhergenſis optimè meritis, computer & amicis meus honorandis dolore dantium punctorio ac profundo atque hatur, adeò vehementi, ut aliquot noctes inſomnes duceret, ſapor in ore falſus, acris & ſubacutus deprehendebatur cum aliquot totius corporis acris & ſiti.

Reſolutio.

• Causam hujus odontalgie, humorem ex bile & ſero mixtum eſſe, ſapor indicat falſus, acris & ſubamatus, non minus ac ipſe dolor punctorius, qui vehementior quidem eſt & profundus, quatenus materia circa nervulum in radicibus dentium & membranam eorundem internam nervæm hæret.

Humores itaque ſeroſi & biliſi ad dentes confluentes revellendi & repellendi, qui verò jam ſubſistere diſſcutiendi & evacuandi, imprimis autem dolor, tantam ſympſoma urgens, mihi gendus.

Preſcripti hoc nomine anodyna quædam & narcotica, ſocietatem ſcilicet parvam Mindereci, & laudanum opiatum cum ſpiritu vitrioli.

Revulſionis gratiæ cucurbitulas ſcarificatas ſcapulis & brachiis appoſuit: à phlebotomia eorum protius abhorrebat.

Hinc veficatorium Rivioli poſt aures applicuit: frontis & temporibus ad interceptandam fluxionem em-

plaſtrum adſtringens ex bolo, maſtiche, & ovi albumine, induxit.

Interea & collectiones oris ex repellentibus & adſtringentibus ſuſcepit:

℞. Fol. myrrh. plantag. a. etof. ana m. ſ. Red oſylapath. tormentill. ana ʒi. ʒij. flor. roſar. r. ʒi. balaiſt. ana p. j. Cori. granator. ʒij. Inciſ. & conqueſcit. coq. ex aqua plantag. & aceto q. l. & colatur pro collutione oris.

Ad evacuationem humoris ſeroſi & biliſi præbuit portunculam:

℞. Rhabarb. opt. ʒij. Cinam. acut. ʒss. infund. per noct. in aqua cichor. ʒi. Endiv. ʒi. Manè coquentur. add. ſyr. de cichor. c. Rhabarb. ʒvi. pulv. Ciſalapp. gr. ix. M. F. portuncula.

Sub noctem magna ex parte remiſit dolor, manè ad reliquias materie diſſcutiendas & abſtundendas commendavi aquam rutilantini & ſalviæ cum tantillo aceti horum lavendula. Calor. rotius & ſitum reſtinxit lulapio quod ſi componitur.

℞. Aq. cichorii acetof. Endiv. ana ʒi. ʒij. Syri. berber. ʒi. ʒij. flor. pap. Rhoad. ʒij. ſpin. vitrioli q. l. ad grat. acidior.

His methodicè adhibitis ab immani cruciatu liberatus eſt vir optimus, quem ut poſſet ſalvum & ſuperſtitem divina præſtari clementia devotè precor. Bald. Timæ caſum Medicin. lib. i.

Adoleſcens 15. annorum, temperamento pituitoso prædius, cum à validiore exercitio exaltatus, nudo capite fe acri frigido & ventolo ſtutibus expoliſſet ha atrociffimum maxillæ ſiniſtri lateris pluriſimum dentium incidit dolorem, ulque ad capitis interiora & ſuperiora fe extendentem, quo dia nocturne conditione inſeſtatur. Nullus in gingivis aut maxilla exteriore tumor, nulla tubero aut inflammatio apparent. Semit è dente quodam molaris excavato ſeroſum, falſum, acrem, ac inſtar glaciæ ſeigidum humorem ius os exſillare.

1. Hujus ægri affectio Medicis *Odontalgia* & *Dentium dolor* appellatur.

2. Causa antecedens ſunt humores pituitosi ac frigidi in toto corpore collecti, qui à majore calore exercitio conſuſiſto in vapores attenuati, ſicque copioſius ad caput delati, à cauſa procaractica, ſcilicet frigore externo, non tantum ob pororum oculiſſimam intus detenti, verum etiam in liquorem ſeroſum, & ob cruditiorem falſum atque acrem rariſſimè condentiſſi ſunt, qui cum ad vias excrementorum ceteriſſi evacuationi dicar non decurreret, ſed ad ſiniſtri lateris maxillares dentes deſcenderet, acerrimum ibi dolorem excitavit.

3. Frigidum, ſeroſum, ac falſum eſſe hunc humorem ipſe æger lingua ſuis percipit ex guttulis per excavatum dentem in os delabentibus.

4. Dolor autem inde fit, quod nervulus cavitatis cuſque demis molaris inſertus unà cum perſoſo, quo cavitatis & radicis inveſtitur, ab acri humore eroditur, ab cuſque ſummo frigore (quod nervis maxime inimicum) multè afficitur.

5. Dolor autem ſuſum ulque ad capitis interiora extenditur, quia nervuli dentium cavitatis ſua ſerri, ſunt propagines recti & ſexti pari: ſiſ igitur male affecti, non eſt mirum totos illos nervos ulque ad capitis interiora dolere: imò credibile eſt hunc frigidum & acrem humorem per cranii foramina, ex quibus nervi illi egrediuntur, ſecundum nervorum ſtorum longitudinem ulque ad dentes deſcendere, ſicque non tantum eas particulas, quæ radicibus dentium inſeruntur, ſed integros nervos ſecundum longitudinem à crano ulque ad dentes à dicto humore affligi.

6. Nullus autem tumor est in exteriore maxilla, quia humor ille, unde fluxio procedit, non est copiosus, sed paucus & acer. Neque etiam tumor fit in gingivis, quia humor in his non diu subsistit aut colligitur, sed paulatim per creta variis dentis foramen in os effluit.

7. Nulla etiam rubedo præter naturam aut inflammationis in gingivis aut maxilla apparet, quia licet humor dithersis sit acer, est tamen actus & potentia frigida, ita ut inflammatio aliave calida intemperies ab eo produci nequeat.

8. Atrox hic dolor, licet in parte sit ignobilis, atque hinc minoris momenti esse videatur, tamen contemnendus non est, cum propter summam crudelitatem, & continuas quas inducit vigilias, humorumque & spirituum commotionem, facile delirium, convulsionem periculosissimam, aut febrem validam inducere possit. Ac proinde illius curatio differenda non est.

9. In curatione primo imminuenda est causa antecedens, mox conseruens, ac propterea statim remouenda, dolor sedandus, & caput corroborandum.

10. Corpus igitur purgetur cum pulveris diatribith aut diaacarthami drach. j. aut cum his pilulis:

Rec. Massæ pilul. cochiarum, autearum, ana scrup. j. diagridii gr. xv. Cum pauillo syrupi de storace, fiat pil. vii.

11. Ad humoris in cerebri ventriculis contenti evacuationem hoc erithium in nares attrahatur:

Rec. Succl. mercurialis, majorana, ana uoc. l. betæ unc. j. l. Mille per erithio. Huius loco aeger hoc pulvere sternutatorio subinde uti poterit:

Rec. Rad. pyrethri, hellebori albi, fol. majorana, ana scrup. j. piperis nigri gr. v. fiat pulvis.

12. Ad capitis corroboracionem, potiorum appetitionem, & frigidi humoris dissipacionem, præparatur hoc capium:

Rec. Fol. rosmarini, majorana, salvia, ana m. f. flor. lavendula, mellisoi, rosarum rubr. ana p. i. nucis moschat. e, gariophyllorum, ana scrup. ij. thuris, mastichis, ana diach. j. fiat pulvis grossus, & quo in tenui serico confusus f. art. capium.

13. Temporibus ortioque imponatur hoc emplastrum:

Rec. Thuris, mastichis, ana scrup. j. figapeni, tamaracæ, ana scrup. j. l. Millecentur, & extendantur in serico nigro: hancque duo emplastra rotunda.

Iocetera etiam exhibeantur condita & apozemata cephalica, ex majorana, rosmarino, salvia, betonica, conferva aorthos, salvia, aliive similibus confecta. Tabaci etiam fumus per fistulam communi modo sumptus non erit inconueniens.

14. Ager os saepe collatur hoc decocto calido:
Rec. Radie. oxylapathi unc. j. prœnie maris unc. f. Herb. majorana, salvia, hyssopi, thymi, betonica, rosarum, ana m. f. Sem. fœnie, anisi, ana drach. ij. vini q. l. coquantur f. art. ad lib. j. pro collutione.

15. Post collutionem denti excavato cum penia ex gossypio immittatur guttula una olei origani, aut gariophyllorum. In summo dolore interdum etiam pauxillum spiritus vini in ore ad dentes affectos destineatur, quod tamen non est sæpe faciendum, ne gingivæ inde lædantur.

16. Interea etiam ad humorum diversionem summa cum utilitate vesicatorium post autem, atque in cervice applicabitur, & locus diu apertus servabitur.

17. His omnibus non jurantibus, in summa doloris atrocitate exhibeatur sub vesperam pilula ex laudani opiat gr. liij. aut tres pilulæ ex massæ pilularum de cynoglossa gr. xij. aut dentur philonii tomani scrup. ij. vel iij.

18. In victu sit aer calidus & siccus, viteturque turbulentus, pluviosus, imprimis aquilionis. Cibi condantur cum cephalicis calefacientibus; fugiantur au-

tem omnia salia, acida, & ea quæ caput & poribus replent, ut alliumporum, raphanus, &c. Potus sit cerevisia medicioris noræ, & vinum tenue. Somnus longior, Exercitium medicore, & alvus facilis sit.

Observationes.

Vir quidam literatus gingivarum laxitate & dentium citre affectus, scripta quædam medica evolvens, forte incidit in Consilium Cironis 71. ubi hæc habentur: Ad dentium putredinem & easdem vix ulla res melior est, quam spiritus virtioli: paulo post & Herstu tractatus de Scorbuto relegit, ubi scribitur. 2. Thersis. hæc existimant. Dentibus vacillantibus optimum est remedium spiritus, virtioli cum melle rosato mixtus, quantum ad intensam aciditatem sufficit: Innotantur gingivæ & aliz oris partes affectæ, singulis diebus ter. Remedio itaque huic à Medicis creberrimis tantopere laudato confusus, singulis diebus spiritum virtioli cum melle rosato gingivis & dentibus illinivit. Sed panitendo admodum eventu: Brevis enim consumptis gingivarum carnibus & laxatis alveolis, dentes, quos primores appellamus, tam superiores quam inferiores exierunt, reliqui molares subsisterent quidem, sed à medicamento acrimonia adæc corroti, ut ciborum masticacionem parum sufficerent.

Rectius olim hæc de se iudicasse videtur Joël, casus tomo sexto sect. 2. p. 137. hæc sunt verba: Parum bene consulit, qui spiritum virtioli erubitis dentibus illinere docuit. Erit enim eos candidissimos efficiat, tamen crebrior ejusdem usus eos calcinat & friabiles reddit: Baldass. Timæus casuum Medicin. lib. 1.

Dentium dolor plerumque solutus.

Nobilissimus Dn. Richardus Frotech, Hæreditarius in Casarij Damerovv, amicus meus specialis, ultra semestrem dentium dolorem interpolato & per iotervalla recurrense misis modis verabatur, tentata varia remediocum genera tam interna quam externa, sed frustra. subinde enim recensuit dolorem, tandem inter acerbissimos cruciatus plorare coepit, adeo effusus ut ultra boram à fleu sibi temperare non posset. Exiit dolorem penitus remiit, absque ulla in hunc usque diem recidiva.

Resolutio.

Dentium hunc dolorem ab humore tenui & seroso excitatum nullum est dubium, is fletu solutus & per lachrymas tam copiose permanentes, effusus, Jolosis immunitatem, subtilia scilicet causa, denubris artolus, secundum illud Poëæ (ut inter lachrymas etiam joctati liceat.)

Expletur lachrymis, egeriturque dolore. Idem. ibidem. Hic N. de intolerabili dentium dolore conqueratur, qui per aliquot menses continuos duraverat, non ulla topica aliisque assumptis medicamentis dispelli potuerat. Consulit ut per aliquot dies cubitum itura deglueret duas pilulas, pisi magnitudinis, ex sola Aloe lucida confectas, nec quicquam superbi-beret. Hoc cum ter quaterve fecisset, dolor cessavit, neque deinceps rediit. Librand. de Diemeter. in Observ. & Curation. Medic.

Cornelia Jacobi mulier robusta dentium dolore vehementissimo cum dimidiis capitis dolore laborabat: Huic tale vomitorium exhibui.

24. Vitt. antimon. pulver. gr. xij. vin. a'b. 3v. Fiat maceratio per noctem. Mane coletur vinum per chartam emporiticam & detur pro huiusmodi. Hinc plurima biliosa, pituitosa, ac renacia evomuit, aliquot etiam feces habuit. Nocte sequenti bene dormivit, & cessavit dectum, dolor, neque rediit. Idem ibidem.

Denti cancro afflicti.

In Sacris Ægyptiorum literis si quid auditum, aut arcaneum luci proditum ac revelatum ostendit quis vellet, inquit *Pier. Hieroglyphi*. l. 38. de Cancro, Pagurum & ejus generis pices. vel testacea; que laevis gaudet, facie appositae figurabat. Ego hodie ubi obsecrum infans Hebræi casum, cancro non abimilem, ad illius causæ indaginem Naturæ cutis propono, ab eorumdem inglorum splendore, & toto orbi cognita eruditione illi faciem adponi exopto. Erat hic puerulus unius anni, corporis emaciati, coloris ad lividum inclinantis, in quo anteriores aliquot dentes naturaliter albicantes erapere, mox prostrante alio recluso in mandibula sinistra, qui totus quantus niget conspectus sese offerebat: hoc etiam si intrantes parcentes, ut inaudium, & nunquam visum admirari essent, cum tamen nullam molestiam pueri inferret, per integrum fere annum nullo adhibito consilio sollicitati. Sed ubi alios proximis mandibula sinistra dentes parvi atro colore inficere, tumor dolorosus parti accedere coepisset, ad malum debellandam Chirurgum sollicitat: is non cognito affectu varia adhibuit, etiam tumorem scarificavit, infeliciter sane succellit, non tantum gingivam sed & totam genam sinistram exulcerando. Anxio Chirurgus, parentes me in consilium vocare coacti sunt, Examinatis examinandis Cancrum primo oculum, nunc per interceptivæ, & immoderate adhibita exulceratum, ulcus certe non aliguum, sordidum, livens, & cacochemicus aspectu horrendum esse deprehendi: Facto prognostico de gravi & periculoso morbo, in quo est depugnanda in via Naturæ, & quod Cancrum confirmati & exulcerati nulla fere curatio (maxime ubi commode excidendi vel cauteri non valet) melius quod fuisse eum oculum non cutasse; curari enim citius interiret, ut curari verò longiori tempore vivunt, teste Hippocr. 6. Aphor. 30. nam cancer non exulcerati medicamentis resistentibus facile exulcerati possunt, quæ ulcera, ut ab arrabillio humore provenientia incurabilia esse dixit idem Hippocr. Nihilominus ne missus infans omni auxilio destitueretur, pater Dietam modice humectantem & refrigerantem, (adcat enim facia lenta febricula) palliativa ordinavi, quæ ipsi cancro blanditi, eumque lenire possent, ut ita minori cum molestia vitam transigeret, cum est Aqua ad Cancrum *Chelone*, Henni III. Gall. Regis Chiumi peritiss, quod ulcus foveteretur & ablueretur, appposito deinde Emplastro Santalino *M. Sydes*; Sed ulcus pertinax & rebelle, imò de sua natura insuperabile, superari non potuit, quod sensim serpendo miculum temporalem affecit, & convulsionem inducendo mortem acceleravit, Mirabilis certe hæc fuit observatio, & forte inaudita, Cancrum radices suas tanto temporis spatio in hoc solo dente sparsisse, nec alios statim dentes affectisse: quod factum puto ob nutrimentum dentis depravatam, quod provida natura, quamvis porrigit, retrahit servavit, abhorrens ipsi incrementum.

Cancer hic à Dente oriundus, non fuit caries, nulla enim caries solido denti aderat, nec illa tumorem excitat, nisi masculosas partes occupat: Neque fuit Gangrena, ea enim est imperfecta mortificatio ad necrum, seu principium de via ad corruptionem, quæ ad plures mentes absque vicinarum partium sphaerulo & corruptione perdurare non potuisset. *Galenus* l. 2. de Arte curat. ad Glaucomem cap. 5. Celsus l. 5. lib. Medic. c. 38. & alii. *Martin. Franc. Herioli*.

Odontalgia à Ferme excitata.

Quidam Odontalgia immensi ac periodica vexatus sensit in dente quod saltem per tempus intervalla, *Bibl. Chirurg. Tom. II.*

cui remedia plura incassum adhibita: Abstraxi dentum carie dente in vaticulum subiectum vermem expulsi, qui capite ad eandem reflexo filius varios iteravit, foramine iniqui, per quod exiit vermis in dente conspicuo: Qui vermes suffusi hyoscyami, seu cervino giugivis impoiero, alii quæ de dente clicitorum pto fibrillis habent, ab experimento hoc (sepius laudati *Tyson* aliter erudientur, *Oligeri Jacobat*.

De Mirabili quadam Odontalgia, & Innoxia Opiatarum continuatione.

Nobilis & honesta femina; à longo tempore valitudinaria, ob suppreto mensis & regurgitationem sanguinis ad superiora, hæmorrhagiam annuum, quinqueque satis enormi, sepius afflicta, cum duritie laterum, inflatione ventriculi, peditumque tumore, ante duos annos convenientibus usitata remediis, & imprimis ex *Ardularum Egranarum* oleo, prius convalescit, & per integrum annum optime se habuit, Practita autemestate ex molestia & fetu largiori, dentium acquisivir dolorem, quem uno vel altero medicamento adhibito suppressit. Non multo post tamen recruduit malum, miris interim symptomatibus. Nam quotidie circa vespertam edite dolores, quorum prodromus fuit materia quædam crassa, viscida, sanguinolenta inter dentem caninum primumque molarem in maxilla sinistra suppositi efflueret hanc excipit limpidissima pituita, continuo illans, addè copiosa ut vasculum satis magnum impleverit, cum cruciatibus tota nocte durantibus. Obstruxi, quo spumam limpidius ad acrioris fuisse dolores, illo cessante, tenuissimè etiam istos. Adhibui quæ concipere poteram, revellentia, expectuientia, appropriata, sed omnia frustra. Nihil magis conduxit quam *Laudanum Opium*, quo dolores & fluxus istius pituitæ suppressi, somnuli que procuratus optimus. Dum hæc ita sunt, in oculo sinistro extrinsecus naturaliter constituto, omnia apparere duplicata, sine quidem dolore, sed cum magna molestia: applicari velicatosi testantes visus in integrum, quem tamen elapsi aliquot septimanis penitus in eodem oculo amissi, itidemque exiguo temporis spatio elapso recuperavit, p-tiverantibus in eodem statu doloribus. Dentes quos inter hæc materia effluat sine labe erant, alteram tamen eorum, quia vacillare videbatur, evelli curavi, absque ullo emolumento. Tandem omnium petra, solis, me licet quam maxime dissuadente, inhaesi opiat, fumendo illa quotidie. Sic allevata Mens Decembris Viniuum concessit, unde mihi ante sex vel septem septimanas scripsit, quod in illum usque diem quotidie, antequam cubicum ear, bolo ex granis tribus *Laudanum cum Cerebell. Alkerm.* parato utarur, quo vel una vice omnis, statim percipiat dolores majores, *Cassidi Reggers*.

De Vermibus Dentium.

Quemadmodum nul a ferè corporis humani pars, quibus nobilis etiam ista sit, exstiter, quam non aliquando à vermibus infestata observavit Scriptores Medici; ita neque dentes ab his immunes sunt, quippe qui, carie easi excavatique, hanc ex parte digne enate suboli alium sit commodum præbent,

Quales eos observavit *Excell. Du. D. Joh. Nicollani Presbiterus*, P. P. *Kleinmann*, & Collegæ curiosius honoratissimus. *Observatio* 24. superius exhibita ostendit, Nobis, ut paulo post dicemus, alta protius species seie obtulit, nosque dubios fecit; utra eorum *Sinemus* nomine, qui vermis dicitur, *Agria Syria* monacho olim ob nimiam inediatum entos, vocari diceret *prossimus*, *Thyl. Nat. de insectis* l. 30. c. 3. art. 3. p. 184. appellanda sit.

Acutissimorum vetè dolorum vermes hi omnes gaudia existunt, adeò ut de necandis & tollendis iis merito solliciti sint Prædici: & per reliquias variè commendat *Sennerius Med. Præf. lib. 1. cap. 10. pag. 26.* Quibus iure merito annumerandum cenico mucum, seu chyli reliquias interiori tunicæ ventriculi suilli adherentes, qui licet sordidum quadantenus, & delectationibus fortassis abominabile sit remedium, veligo tamen necessitatibus ceterbis experimentis est commendatissimum.

His ipsis dicens Femina, inera lares meos habitan, doloribus acutis lancinantibus dentis maxillæ excavati vexabatur, qui, licet medicamentis sopirentur, subinde recrudescabant. Tandem suavis aliteris summat, ut est istud hominum genus in talibus consilii promptissimi, rotellæ foliola conglobata deni cavo, tenuissimè tunc dolenti, indit. Malum? subito dolores in immensum exacerbantur adeò, ut ob eorum vehementiam saltem non ad infantiam dedigeretur. Commodam autem accidit, ut in vicinia portum cullæ & sinuatum eviceretur audiret: Auxilii ergo, quod alia vice in simili dolore senserat, adhuc memor, lanionem adit, & mucum, pyloro ventriculi adherentem, calentem avide petit, cumque linteolo exceptum, formâ noduli, dolenti denti imponit. Post breve tempus titillationem gingivæ percipit, nodulum ex ore erigit, atque vermes plurimos linteolo adherentes invenit, pluresque alios eum plegmate viscido expulit: dolore paulò post sopito.

Vermes hos aquâ ablutos mihi ostendebat, qui, lumbricorum more variè se contorquentes, aliquandiu adhuc vivebant. Latius pollicem longitudine ferè omnes æquabant, tenuissimum atreicum filum crassitie vix superantes, coloris, dum vivebant, incarnati, mortui vetè & atrescentes magis tusecebant. Per microscopium inspecti egregiè interminorum lumbricos referebant, utinque in acutum rostrum desinentes, corpore ex angulis innumeris coagmentato pellucido, rubello intestinulo per cutim transparente.

Extremum os mucò istò vermes dentium infestatos & ex cavernis suis eli. itos vidimus, ita olim *D. Rivierus*, vermem eorum perforantem lorema ventriculi suilli pellicula evocatum observavit *Osfero. 3. 12. anni 3. Eph. Germ.* dubio peccol ob congenitum quendam putredinis odorem, quem tunica ista, multoque magis macor ex capibus, quibus præcipimus gaudet amica luto sus imbibit. *Gouffredi Sebaldz.*

Vermis Odontalgicus.

Horrida olim morborum exempla nunc tandem suffragante expectantia credibilia fieri competrum est. Vermes in solido durissimoque corpore generati res visa supra fidem: et postquam Lapidum quunque corruptelas & detrimenta à verminibus excitari innouit, etiam de verminosis Dentium casu observata narrantibus fides negari non poterit. Mirari autem usque subit, qui molliculum & penè invisibile vermculi rostrum tam solidi durique corporis perforare substantiam possit: per foras tamen, & à basi ad radicem usque cylindrico foramine petentium dentem solo doloris indicio commonstrat: neque enim ante demolitione animalculi constabit, quam transmissio corpore sensiles nervorum fibras attingit. Etenim vetè totum immensissimum cruciatum parere mobilis rostri perulenta soler, & in abdito lumen impone profundæ libertas est, non facile alio quam Dentis pectus cœrenda. Sed quod & quale illud rostrum? Sanè plerumque Cœrem & ann. 3. 12. corporis impulsu viatorum vel ferro par; neque enim allect tanta ossis duriciæ superari pos-

se videtur. Major autem de origine & natalibus horum animalculi difficultas. In Dentium cavernis, ubi ciborum reliquie hospitari solent, putredinem esse, quæ spiritu animata in vesiculas sese induat, idè aliqua operante, articulares vermetes referat, mobile animal, tratatium est. Sed unde prima vermculi exordia, quando nulla adhuc caries in Dentibus conspicienda, aut quis ille in integro solidoque Dente foraminis cylindrici auctor? Nimirum obstat sunt plerumque Dentium bases, quæ alvearibus insiguntur, mucò quadam albo, quem qui ois ante nascunt, aliquoties de die, impetibus autem manè, detergere solent, apratis in hunc usum Radicis Altheæ fibris. Hic ipse mucos inopis *Leeuwenhoekii*, mirisili in explorandis minimis *Mythagogi*, Observationibus totus quantus verminosus deprehensus, & fortè ex hac classe aut tribu est, qui deinde obectans rostri aliqua prætergravis impulsus Dentem corripit, erodit, tandemque miltum os moris doloribus crudellissimè exercet. Cùm autem mihi quoque exemplum vermium epulmodi obiectum sit, operæ pretium me facturum esse existimo, si, quid mihi obigerit, recenscam. Vetsa erit tabifco & propemodum corrosivo Scorbutu affecta, quæ tandem inter alia Symptomata præter incam expectationem in deploratum incidit Odontalgiam nullis planè remediis, neque opitinis, cedentem. Solet nempe ludibrium Anis esse Dentium dolor, & magis sæpe anilinis, superflitiosis vulgaribusque subigi remediis, quàm exquisitis, de h. d. & ut alibi vocant, Canonici. Adeò nihil hic concepit formale aut excogetissima temedia jvate videbantur. Anicula autem, sive asperitate doloris seu casu adacta, Mel, quod fortè in propinquo erat, eujusque aliis usum suspèctum habebat, delibare audaciæ cepit, & ne consilium temeritatis deesse videretur, ruinosis dentium cavitatibus petulant lingua inferere. Hic ubi medicaminis inconsultè assumpti pernam expectabat, augmentum doloris, præter opinionem alia accidit; nam vix horæ momentum, cum dolore se remittente nocet intolerandam in summâ linguâ pruriginem, quam ut à fluore aceti falso orit credidit, centia manu modica, tepetè tandem volubiles passim vermculos numero quinquæ. Accessit mo protinus jubet tam exitum monstratum fore uita domitrix; virque intaverram xdes, cùm illa gaudio perfusa atque à doloribus libera tum lufum fortunæ mirabilis, tum villis remediis iucrescum opotè explicat. Postquam autem nudam oculotum aciem, tandem & animam admovere capî; inveni eos pediculis planioribus, si feriem pedum avolatamque corporeis formam excerptis, sanè quàm similes multò saltem conminiores, quàm quos in Orum Hepate comperit experientia vulgusque Lanionum in Italia *Bifisli* vocat, à Francisco Redi, Nobili Aterino, illo de Insectis libro, deplorat. Illi autem Vermiculi onde nati, quo ovo, semine aut putredine educti? Figuratum ibi totundulumque & oviforme corpus habuisse, quod se deinde accessu Arctæ alioque in Vermiculum refinaxit, nequidquam cœdas, jam vetè etiam superstitis efficit rostramentum ante aliquo aut ovo animata in planum tandem figuratamque animal cretrevise est cut dubitemus. An potius ex Scorbutico dentium Tartaro Spiritus, vel hinc feminilis unde rapæ commercio vivaces & ampullate vermium vesicular, tandem etiam rostrare pedatæque emerferint: pnet alios judicium esto. Quomodo deinde tantum creaverint dolorem? Utrum figendo trahendoque Hirundinum Instat, nam dolotice functionis speciem persensisse se ægra significabat? An vetè mordendo & vellendo fibrillarum nervorum externa, quæ etia cavitatis fornici impendunt, si modo ulla dentium vitiis in tantè exilitate fingi possit? Sed vetè constat, Vermes, qui in vulnè sape nidum ponunt pullularum specie, ip-

lus se

his lele cutis & glandulosi contextus poris intulisse, subinde etiam fuco aut nigro capitulo emicare doloremque si quem excitant, aut pruriginem, ad feri salisioris affluxum inquitto articulo motu efflicere. Sed quod de Verme Odontalgico monui, utrum ad alios quoque dolores & Auris illos quos immanes sepe notavimus, & Dentium istis vel partes aut majores, transferri possint, non ante dixerim, quam in Ceruminibus quoque non aliter ac in Dentium illo mucos, Vermes enafel experientia compertum sit. Memini tamen in corrupto, utriusque auris Cerumine analogi quid vidisse; coepuscula certe erant ampullata & figurata alia aliis incumbente; sed quod vitali motu, attrita forte & refrigerata, desisterent, non statim temerario sensui accedere opinio debuit. At cum in Pipere, in Calce, & acerrimis quibusque rebus, nasci vermiculos possint; ceruminum illa materia, micis sepe & parulenta, verminationem non abnuet, & sic etiam novis dissimilique dolobus scenam parare poterit. *Nicel. Pechlin. in Observat. Physico-Medicæ.*

A Dentium dolore Maxilla Caries.

Neque ideo omnis dentium dolor à Verme repetendus; aut particula contingens univertali enunciatu equiparandum; quando tor iterum alie cause ita-gendia huic incunda materiam præbere possint. Est Sanguis, Scrum, Pus, sunt alia, plenius tamen corrosiva, quæ eundem illum dolorem creare queunt, quid quod fluxum ex hac parte fit immunitat. Atque hinc adeo est, quod in nullo admodum morbo tanta sit medicamentorum varietas, tanta sarrigo, & arque in ipso hoc, si partem æstimes, exili sane morbo. In formosis sepe Sanguis live ab Utero seu aliunde in caput inque dentem redundat lava sanguinis missione evacandas. Aliis Scrum copiosè destillat, nervellus dentium filamentos acrimonia, & aque salia aut acida, insulata; aliquando & frigore Ammoniacali, nunc & æstuolo calore aut vicina aut destina lymphæ infestatur. Aliquando etiam à fordibus & dentium mucilagine, qui ipsi vermes innafel non improbabile est & jam vidimus, otta aciditas atrocissima doloribus aniam præbet. Hæc ego mucilagines universas inserni atque inculcati dentes vidî, nec ante dolorem requiem fuisse, quam acci adstringenteque Decocto comminuta vici lamellati aut membranae insit recederet. Hic certe acor est purredine natus, & ut Ossium texture nihil est acido hostilis, ita Caries quoque ab uno illo nasci peruenit solæ; & arque ira feratilis ille dolor ab importitate oris, ab ascendentibus ciborum reliquiis originem sepe trahit. Sic Vermis, qui denti allapsus foramen figit penetratque, sed in hoc deinde foramen abducat ciborum reliquiis purredinem & ex illa acrimonia con-spiciet adeo Nervorum filamentis Dentiumque radicibus infusam. Possit verò etiam lympham, illam glandulosè Gingivarum carnis sobolem, tam inretinecina subinde acrimonia imbui, ut omnem à Medicamentis temperiem recuset, & tandem cum tempore carniem re-turam ipsorum, que impetis ossium tergetur p-tinoluque, nec ante desinat, quam rodendo suam ipsos integritat acrimonia, Observationibus potius constare. Oshndit mihi Pharmacopœus & doctus & Artis fax peritissimus spongiosis tubulatisq; maxillæ infioris laminis complures, quæ acrimonia lymphæ sapinus per aliquot hebdomadas sevi-nis sedibus suis extruxerat exulcerata carnis morum iterum sedata fetida coeunt. Natus mihi aliis, qui Fibulam atherit in Gingiva infiore prope dentem primum molarem; funderat illa semper aliquid potide saniet, quâ sustinuita dici non potest, quantis doloribus recitaretur; adeo nunquam de consolidando hoc vulnere fuit sollicitus. Sed

quæ illa lymphæ ferocia, aut, si mavis, *Mucoglyca* non carnes eorum sed & ossa, spongiosa illa & tubulata maxillæ, narium vicinæ se depasit illæ; dentibus, quod in atrocissima illa Scuebui, Sumicacæ specie; in Luc Venetæ non sine horrore vidimus. *Idem ibidem.*

Alveoli dentium ob varias causas penitus con-jumis, unde dentium vacillatio & casus.

Affectus in Observatione 76. descepiro; nota os-sium diminutioni, pure merito annumeranda est talis alveolorum dentium in nihilum red-ctio, in qua ne vestigium quidem eorum relinquatur, unusq; illic tanquam ex tripode dictum, pro certo habet alveolos seu præsepiola dentium evulsionem aut casum spontaneum neutrumque manet aperta. Cui opinioni calculum quoque oppono: Ast verò quid proprie in illa commutatione eveniat, non satis unanimiter eloquuntur Anatomicorum Coryphæi, Curiosus parium & strudæ corporeis indagator Thomas Bartholinus hæc nobis reliquit in sua anatomia cap.9. fol.720. All-quando absteruntur & constringuntur (& dentium dist-erit alveolis) dentibus cadentibus vel cussis. In finis non raro amissis dentibus alveoli absteruntur, & circuitus acutiores facti, durig; ut in senibus ad manducandum den-tium vices subeant. Adrianus Spigelius super hæc re ita inquit: Tot sine causa, quæ dentes, cum quilibet pri-mum erumpens sui proprium ac prehendere coudis præsepiola, concidens etiam quem unâ alveolum suum perdat, ita ut ne vestigium quidem maneat. Joannes Riolanus in sua Anthropographia hæc habet: Dente evul-so, nisi verus succedat, ita conspiciuntur & excavatur alveolis, ut ipsius nullus remaneat vestigium.

Hocum neminem refutare animus est, sed potius eorum observationibus illustrandis hæc addere; ne pen-solium alveolis in sensu oblitterat, & circuitus acutiores & duriores fieri ad manducandum, aut alveolos occurrat, aut concideret sed præterea in multa ita in nihilum redig; ut, mitem visû maxilla tam supelior quam infector tantum ipsi in profunditate amittat, quantum occupare alveolista ut ne quidem minimum dignum lata maneat infector, supeliorq; ad nasum ferre usque deficiat. Hinc foramina pertranscunt ramo nervi quarti pars, (ut cum antiquis loquar destinata,) non ita antica & laterali maxillæ interioris parte, sicuti in maxillis quæ dentibus alveolique omnibus instructæ sunt, inveniantur, verum in summo maxil-læ inferioris. Hinc etiam maxilla superior tantum amittet de sua altitudine, ut inter os & nasum latitudo calami scripseri vix intercedat. Causam istius destructionis aut potius totalis annihilationis alveolorum, sili attritioni in masticandis cibis non possumus ascribere, sepe enim videmus dente uno evulso alveolum ipsius ita aboliti, dentibus proxi-mis aditis alveoli attritionem cohibentibus. Imò non raro in nihilum rediguntur alveoli ante dentium casum aut evulsionem, unde vacillantes dentes maxillæ solommodo coherere giogivatum & membranarum beneficio; & gingivis quoque deficientibus eos soli membranae adherentes deprehendit. Frustra itaque in tali constitutione, dentium remedia ad firmiorem cohesionem querant homines totum malum scot-buto attribuentes, & nil minus quam d. f. Cham alveo-lorum suspicantes: Noli interim credere, Lector bene-vole, hoc malum nemini contingere, nisi erare prove-dioribus; meminit hæc in origina solùm annos nro vidisse, qui aliquot ex antecioribus dentibus ita vacillan-tes aliquando ingerat, donec nullis proficiendis reme-diis antisepticis facillime eos solis digressu evellet. In aliquibus (ut dicit) etiam observavi, simul cum alveolis gingivas perire, & per solas tunc membranas

dentes maxillis adherere, idque tum laxè, ut ne quidem libere comedere possint assidui, imò à lingua motu in locutione tanquam fluctantes sese movent dentes. Dixi superius, eorum alveola in multissimo cibo ab attritione sola non aboleri, neque etiam puro eos semper pellicula ossis claudi, aut concidere, vel occideri, verum in nonnullis senibus in totum aboleri & in nihilum redigi, quemadmodum artetiz ombilicales, fortè in lucem edico, sæpè in tenuem degenerant membranam, ac si nunquam artetiz existissent; sic & maxillæ in senectute sepe immo in totum carescunt. Itaque si perquam tenues sint à natura facti alveoli, evulsi aut elapsi dentibus non habent unde replent cavitatem, & propterea maxillæ ita diminuantur. Si vero abolerantur alveoli antequam dentes exciderint, nullam aliam agnoscere causam, quam scorbuticam affectionem, & tartarum maxillarum dentes obfidentem; unde non solum gingivæ, verum etiam alveoli sensum sensumque contumuntur. *Frideric. Ruysch. Observat. Anatomic. Chirurgicæ. Centur.*

DEPILATIO. *vid. PILORUM DEFLEVUM.*

DERBIA *vid. IMPETIGO.*

DIÆRESIS *vid. sub simili OPERATIONES CHIRURGICÆ.*

DIGITORUM COALITUS,

Contractio, & Digitus sextus.

Curationes.

Notro consilio digitorum coalitus cura à ferro tantum, & eoquæ à prudenti Artifice administrato, sequenti modo expectari potest. Cum uniois hujus inconvenientis vinculum sit renue, nec multis vas sanguinis majoribus aut tendinibus intermixtum, sed solè cute conteatum sit, facile cura succedit. Hoc enim in e. s. uno idu, acuta scilicet incidit potest cutis carnosæ partes intergerimus, excisissæ utrobique superfluis digitorum novorum quasi fundamentis. Non opus hic est ligno, triangulari, ad imitationem Plateri *Manif. Observation. 43.* Nec scalpello quò uti solet. *Hyeronimus ab. Aquapendens Parte secunda Chirurg. cap. 101.* Hic tamen altitudo notandum venit monitum *Celeberrim. Ruysch. Observ. 10. p. 41.* quod delongentur digiti in novam cohesionem prout, quod optime, iostitutis ligaturis, ac medicamentis idoneis, præcaveri potest. Sic quoque cura coalitus digitorum feliciter cessit, testantur Ephem. coelst. Ann. 6. Observ. 38. *Joan. Dolau Encyclop. Chirurg. ration. lib. 7.*

Sexti digiti cura, me arbitrio, in ejus ablatione consistit, & optime perficitur abscissione cum ferro, novacula scilicet, ligaturâ prius inflatâ, & hoc potest fieri in iostitutibus. Legimus enim in *Ephem. German. Ann. 6. & 7. Observ. 18.* Cum infans tertiam septimanam tantum complevisset, ligaturâ præda instrictâ; digitorum firmius adherentem novacula absciderunt Chirurgi, mox alterâ die abscise ligatura alium adhuc digitum amputant, quod fere magno dolore & sanguinis profusione scilicet, & vulnera facile sanata sunt, ita ut vix vestigium telluris fuerit. Constat *Clar. Riedlini Observ. p. m. 127.* Sunt qui exemplo Plateri test. *Obs. 42. Manus.* à resectione

abstinent, usque infantes adulescentes facti sunt, sed non videmus ob quam rationem id omitti debeat, cum digiti tantum quasi petulo pœdeat, & exiguus sit, ita inibatò anabrochilimo facile curati possint, hoc ut ligaturâ cum filo sericeo inflatâ; hinc enim digiti superflui marcescit & decidit, postmodum facili negotio medicamentis congruis penitus sanari potest. In adultioribus verò digitus laxius commodè cura fieri quod Germani *ein Meissel* dicunt, extirpati possint. *Idem ibidem.*

Observationes.

De Digitorum Contractione.

Anno 1596. Marcus Goceran de Petroy, adduxit ad me Lantzonam filium suum Michaelem, 14. menses natum. Is autem sexto mense ætatis manu dextrâ in prona ceciderat: Hinc inde, medius, annularis, & auricularis unâ cum externa metacarpi parte, adhuc combusti fuerunt, ut apices horum digitorum usque ad primam articulationem deciderint. At quia pater curationem impetierit commiserat, digiti omnes, (accepto pollice) cum cute metacarpi quasi in globum conglutinati fuerant. Septimò mense post absolutam curationem, adducunt ad me puerum patreos Lantzonam, auxiliunq; meum implorant. Purgatò itaque corpore, manû ex jussulo exhibita, topica & Chirurgica hec institui. Primò sequenti decoctò emollienti, & unguento per dies aliquot usus sum.

℞. Rad. alch. corn. roto, rad. bryoniz, lilior. alb. an. ʒ. j. flor. chamom. melliloti, hyssopi, chamæpit. chamædr. an. m. j. f. m. sangr. lini an. ʒj. coquant. in jussulo pedum & capitis vervecis, aut vituli pro soto. Postea inuani totam manum & brachium sequenti unguento.

℞. Unguenti dial. h. ʒj; axung. human. gallinæ, anser. utriusq. an. ʒij. succi lumbicor. ʒf. M. F. unguentum. Tan tunc manum involvi emplastro de mucilaginibus, his nervi & callositas ex contigata cute metacarpi & digitorum, in externâ maiori parte contracta, satis emollita. Hinc callum inter digitos & metacarpi novacula excidi, digitos item separavi. Deinceps insperiti pulvete nostro ad sanguinem sistendum, & albumina ovorum mista cum aqua rosacea, & plantaginæ oleoquo rosaceo, applicui. Defensivum quoque ad caput adhivi, & totum brachium oleo rosaceo, myrtillorum, & lambertorum inuani. Postero die sequens digitivum filamentis suavis supra incisiones posui, & brachium, ut antea, supra dictâ oleis inuani.

℞. Terebinth. loræ in aq. rosæ. & plantag. ʒj. olei rosæ. & de vitell. ovor. an. ʒij. croci ʒf. vitellum unius ovi M. Quinto die apposui sequens instrumentum, ea ligno fabricatum, & incipit paulatim attrahere digitos ad naturalem situm. Hoc instrumentum componitur ex ferula. Iuxta tribus digitis in latitudine positis, ejus longitudinis ut à carpo ad cubitum ferè usque pertingat. Secundò ea bā ulnæ rotundæ pollicis crassitie, qui fenestræ firmiter affixus est: mediò autem hujus bacul. exsurgunt 4. clavi rotundi ligno fabricati. Habet item ferula fibulâ duas, & lora duo, quorum beneficio instrumentum brachio alligatur. Alligato itaque instrumento, & undique linteis, stupis, & gossypio bene munito, babui in promptu digitalia ex pelle fabricata, quæ catermitibus digitorum apposui; deinde lora ipsâ appendi, digitos deorsum attrahi; & clavis baculo descripto abais alligavi, aique singulis diebus magis magisque increvavi. Id autem ut cò melius fieret, brachium & manum superiorem unguento, quotiescunque vulnera trachabam inuani.

innam. Ne autem digiti demum conglutinerentur, la-
minas plumbeas digitis interponcbam. His pulu-
itibus digiti ad naturalem iterum reditū fuerunt. In-
terim vulnere quoque consolidari & cicatrizari
non quidem his quæ valde effecant, sed his quæ
simul emolliendi vim habent medicamentis. At-
que sic Divino favore manens in lege nostra restituta fuit.
Gasilius, Fabric. Hildanus Olsseus. Cypre. Cent. 1.

Post diu unum colicum morbum, & retentiones
contractiones quæ fecuras in manibus & pedibus in No-
bili quodam Seno remanserunt in utraque manu con-
tracti digiti, intermodis duobus extensionibus adeo as-
trictis, ut incurrere in volam manus digiti nulla vi
extendi amplius possent. Multis viis remediis, & rheu-
matismis, nihil profecit, durante & jam per biennium per-
severante malo, meo tandem utens consilio, hoc pa-
ciatissimum Inchoavi, purgato prius decore
corpore per tutissimum vino cathartico nervis simul re-
commodato, dextra manu liquens Emplastrum ap-
plicavi.

26. Gummi ammoniac. ℥ij. galban. opoponac. bdellian. ℥j. diffolv in aqua vitæ adde Syrac. calamit. ℥i. arund. aſſer. medull. turis vitæ an. ℥ij. thuris ℥i. arund. lreos. ℥j. hermodact. ℥i. loric. & tefine communis an. q. ſ. E. Emplaſtrum, ſuper alatum extendi & manus inſertioſi tedi univerſe applicetur, & in plicaturam aſtrictorum digitorum impeditur. Fuit Emplaſtrum ſeuſum in partes ror, quot digiti erant, chirothecæ ſeuſum, ſingulis digitis petii. obvolvitur, ut extendi illis jungetetur. Poſtea putricium ex panno duplicato formatum, ſic nitet inſt. ſtom. & aſſeculum panno involvitur, tranſit in colloctum, & omnia ſaſta probe coacta ſic et Emplaſtrum undique ſe digitis incurvatis accommodaret, & coque nonnihil extorſum premeret, totam noct in ſic colloctum retineti, aliquotque noctibus continuavit, manè v. rō hifce impedimentis, ſingulis digitis plumbeum maſſum choræda plani apponam, quæ illos ſeuſum extendet, & tenui, ſoluto inſuper manè viſis eſt ex trochifcis leuonibus carbonibus ignis impoſitis, parato,

26. Maracá 3 i. g. myrth. maflich. an. 3 i. g. Scroac. benjoe. an. 5 p. rad. freos 5 b. com. latices, F. trochilic. hinc viri dum cocturus sunt eis, cum digitos, premendo iamen eos, extendere possit. Emplastrum rursus fissitæ quoq; manui, tribus noctibus tantum apponens, eos etiam digitos iam cedere nonnulli sciat, quibus ad me scriptis, iussu ut articulum roboris causa, bis aut ter capitum decocto Salvia in lixivio, in quo chalyb extractus esset, foveret, usq; horum pergeret: & ut miramque manum dignoq; ante Emplastrum applicitissimè hoc unguentum fissitæ.

26. *Ol. Lumbrie. Lilior. an. 3 ij ss. ol. chirin. izin. an. 3ij. Lihargar. 3ij. coq. pardm. adde gummi ammo- niac. in aq. vitæ folus 3ij. Syriac. 8 ij. latic. 3i. ceræ q. f. f. Oculorum, Interea licet omnia in melius tendere tuncque esset integre restitutionis, nolens amplius apud nos subsistere, thesmas adiit Piperinas, Sed irritio constata, nam earum ulu, digitis amplius attingi potius quam relaxari cupietus. Felix Platerus, Olsfrv. lib. 1. par. 147.*

DIORTHOSIS, *vid. sibi similē* OPERATIO-
NES CHIRURGICÆ.

DRACUNCUL.

D *Racunculū Vena Medinenſis nomine ab Avicen-*
na donat, propterea quod Mediana urbis Arabia in-
colas familiariter afficiat, ſuiſe deſcribitur à vniuerſis

Medicis Paolò Arginetà, Mèd. Affluarib de Nòis
verò huc jam sufficienti qua de illis accuratissimis dige-
ru Clariss. Heron. Wolf hunc.

Diacunculus seu Vena Medullaris lumbicus quidam est, qui proprio suo feminio generatur, live cum sanguine, live lactee & humore, ut vocant, secundario, ad partem quandam sub uterum d. l. to, quæque calore naturæ, aut si quis ita velit, ubi fuerit in his fociis, sumam live animam in ipso latenter excitante, undè primò exigua, sensim in longitudinem illam insignem, quandoque licet, auctus atque laticior in finis variè sit, nihil autè prorsus molestiæ adfert, sed tandem seu alimentis cupiohoris d. f. c. d. seu loci angustia, seu aliâ quæque de causa, exgressum in stratus eorum haurit, in quacumque horum melancholicis coloris sanguine permixti, pusilla exoritur, que deinde intumescit, veticam, live phlyctenam contrahit, atque mox per moritur, live exalata, diacunculo viam apertit, qui tunc ex toto capite paulatim præbuit, necesse cessat continuè protendi. Hæc ille, quibus sine nitido adiciuntur in morbo nobis potius ignota, ac de quo magnam opinionem non potuit Glessem sic scribere: In quodam Arabia loco (ut aiunt) in ribus humicem dracunculæ vocatæ nascuntur, nervis natura, colore crassius atque lumbicis similes, Malescæ sive audeat qui se vidisse dicere, ipse verò cum videretur, videtur, neque de veritate, neque de essentia ipsorum a quicquam exalate conjicere solemus.

Parasitica ab istis lumbicis, secundum Wolff huiusmodi Avicennae explicantem, est maculosa caro, tum crurum, tum brachiorum, tum lumborum. Idque non tantum in hominibus, sed etiam in equis &c.

Differtur à *Crinoidis* de quibus suo loco, quod illi crassiores sunt tantum capillaris aut breviores, illi vero crassiores ac aliquando plus quam ulnae integre longitudinis. A verme de quo in *Affectione Borsina* quod ille varias corporis partes pectet ac obambulet, illi vero in ea in qua creati sunt parte consistunt, donec suo tempore caput extendendo è nido suo, retrahantur. Quomodo pectetæ ab aliis discriminentur venibus, sive ambicalib, quales est Camerario super cap. de Crinoidis, descriptimus, sive insectualibus &c. per se patet.

De *Consp. Dracunculorum* hic quaedam et praefato Wellichio adducimus, scilicet et pirula viscosa & tenacissima, eo propè modo quo pilli in vis generantur utrinus, unde morbus, enascitur qui *Trachiasis* vocatur, quae pirulta ab alimenter congenitur; quibus Arabibus incolae utimur, crassus nimirum ac viscidus, sufficit. De modo autem quò animetur in vermes viventes, ejusmodi materia, jam nemini suam aperuit in morbi descriptione idem Clar. Wellichius.

Signa morbi Diagnostica ex eadem satis patens descriptione, si addamus ex Avicenna ab ipso Welchii explicatam. Si materia ex quo generatur aut aluntur Dracunculi miuior, & præcipue pirsutata fuerit, nulum ferè, aut valde obtusum dolorem faciunt; si vesp actor sit illa materia, calidior, ichorosis & melancholica; exequitium illi dolorem excitant. De *Prognosi* hæc habet Avicenna. *Ei autem in corpore quadragesima ferè, aut quingagesima levis obstat Dracunculus, curationem tamen exorat.* Unde, ut concludit Welchius, apparet affectum nequaquam lethalem esse: Imò nec valde periculosum, si modò dextrè & decetè tractetur. Nimirum nisi aut violenter extenuetur in parte cui adhæret Dracunculus, molior atque inflatus non excitetur, aut ipse etiam absumptus, nihil magni mali minatur.

minuti solet, cum enim relicta in corpore particula, sepius, magnoque cum dolore atque periculo lumbi in minorem, contorquebitur: mox etiam putrescent, ichoresque aut humores acres in partes nervosas extillantes, gravissima symptomata, ac imprimis convulsionem excitabit, quam ipsa tandem mors excipere consuevit.

Cura Dracunculi seu Vene Medinenfis ex Avicenna ejusque Commentatore Doctissimo welschio duplex est, *Præservativa* una, *Cura* altera. Pro præservatione vitanda est regio in qua generatur; cum enim morbi endemici ea sit conditio, ut toto illius teræ tractu, quam occupat, causam suam omnibus communem faciat, ut non fore ullam certiorum præservationem quàm locum fugere clarum est. Sin autem id commodè fieri non possit, saltem à cibis abstinentum ea quibus gigni creditur. Quinam tamen illi sint non explicat Avicenna, Alazaravius omnia olea, omnesque fructus illic vitare jubet, ubi vena exitus live profertens generatur: hæc enim esse ait, à quibus produci solet. Ebn. Jæza autem pisces sigillatim enumerat, & lenticulas cum aceto, dactylis, aliisque similibus indidit. mox. rabul. parie. 7. §. 1. Nihil enim dactylis crudis, coctisque, recentibus pariter, passisque toto Oriente & Africa Aliæque tractu univervo frequentius sit cibo. Joan. Colle Comin. in Avicennam, omnia cibaria potiusque calidiores omnes commemorat, adustos, vitiosos, falsos, ut aquam falsam, carnem falsam, pisces, brassicam, betam, spinaciā, aliæque quæcunque chylum acrem, acidum, acutum & melancholicum gignunt. Vivia item nimis potentia, rapida, crassa, & excitementis humores generantia. Præterea vult Avicenna ut oppuganda causa morbi antecedente evacuetur vitiosis sanguis, secta vena basilica, aut isphena. Item intus ad expurgationem humoris adhibet syrupum myrobalaniotum, decoctum epithymi, pillulas coccias, ac tryphatam cum sena & fumatis paratam: quibus omnibus addit humidationem corporis cibis humectantibus, balneis &c. Hæc de præservativa; Mochi præsentis expurgationem quod spectat illa sic instituitur. Cum vestigium lumbrici, seu Dracunculi apparuerit, membri refrigeratione uti convenit, per cataplasmatam refrigerantia, qualia fieri possunt adhibitis succis frigidis expellitis cum sandalis & caphora, imò post corporis purgationem, per hirudines quoque loco applicatas. Succos caprifilos frigidos sigillatim cum valgò noxia non enumerat Avicenna nec quisquam alius recenset præter unum Borta pileam, qui succum sempervivi, vermicularis, & herbe apocimatum, & que fibra crassa, seu crassula ac telephium est, nominat. Adde possunt, commentante Welschio, quoque alii, ut lactuca, nymphaea, parietaria, alimæ, portulaca, lenticulae, polygoni, oxalidis, umbilici venetis, capreolorum vitis, & maxime tulligania, ejus virtutes omnibus inflammationibus plane singulares & eximie competere sunt. Cataplasma quoque Mathie Naldi ea farina lupini, orobi. leontium, myrrh. aloë, croco, & ol. abisinth. nec non oleo ex fol. abisinth. abroton. matric. sem. acerol. sanon. & ol. lauri. compositum, satis commodum contingere non debet, & si ipsum adfectum nunquam vidisse aut curasse ex scriptis illius satis appareat. Nimirum quæcunque vermibus inimica sunt etiam dracunculis adversantur. Sin autem istæ eludat, jamque prodierit, tunc convenit ei præparare aliquid, cui adligatur, & supra quod blande & paulatim convolvatur, ita ut live usque ad finem sui sine disruptione eeat. Ad hoc autem optimum est plumbi bacillum quod præterquam quod dracunculo convolvendo aptum sit, ejus ponderis fiat necesse, est quod ei trahendo non abumpendo sit satis. De pondere bacilli oculi amplius Avicenna, sed illud explicat Alazaravius dum ex barbaro interprete sic habet. Si de dracunculo jam aliquid egeris, non valet ingeniosior, nisi ut antahatur, si est parvus, quousque egrediarur torus, & si est longus ligatur in extremitate ipsius arando plumbea cum pondere 3j. & dodecatur io ipsam quicquid exierit de eo, & caveat ne vena detruncetur. Alibi pondus illius facit ad 3j. ad 3ij. in eo etiam alii ad 3j. veniunt. Verum pro diversa Vene Medinenfis crassitie aut robore, pondus illud ex Medici solertia & ingenio variandum est. Figura debet esse cylindrica. Summa vero cura sit in casu Dracunculi facili reddendo, quod sit fulciendo membrum cui insidet imbecillitatem & rursus faciendo illud investigationis, ex aqua calida, & muscaginibus, resigantibus, oleis, emollientibus, frigiditatem aut subitili calore prædicis, & quæcumque ad egrillum illis simili ratione facili reddendum idonea sunt. Ac tandem si videatur apertione opus esse, ut interea prodcat Vena Medinenfis, nihilque sit quod prohibeat, aperiarur, & extrahatur. Sin vero exitus ejus commemorata extractione non reddatur facilis, & apertio non sit possibilis, butyro putrescente, tota enim putrescet, atque egredietur. In hoc negotio Aivius Cornario interprete ait. Quod si Dracunculus sponte progrediens facit eamahi poterit, nihil amplius faciendum est. Sin ad suppurationem videretur, à cataplasmati & aquæ multa ac olei irrigatione non est discedendum. Nos vero & emplastrum à bacis lauri post cataplasmatum à fanis, mulso & oleo ablationem imponeat totum. Facta vero suppuratione, cutis per longitudinem secetur, & dracunculus densitatem auferatur, & cutis ligamentis inditis disparetur, & reliqua curatio suppurationis adhibeatur, ita ut animalis suppurato & extracto ulcus incarnetur, & ad ekeatricem perducatur. Incisio, quæ aliquando necessaria, duplex est, una dracunculo integro extrahendo, altera quæ abrupto tantum conveniat. De illa live Avicenna: Maxime vero si fecerit locus à Vena Medinenfis longior, ibique immisio subito specillo depellatur, & incisio eum egredietur cum sale paulatim & blande continetur. Ubi cum cum ipsa ita actum fuerit, tota egredietur. Postea incisionem idem Avicenna his exponit verbis: Quod si numpant, sese occultet, nullam dubium esto quod apertis debeat, ita ut denuo capiat, & dande leniter extrahatur, & locus ut vulnus solet, percuteretur.

Atque hæc de Dracunculo seu Vena Medinenfis distilla sunt: in cujus ulteriorem explanationem Observationes demum aliquæ à Clevis. Welschio in suo de Venâ Medinenfi tractatu à variis additis, adjuvamus.

Observationes.

Aethyops maris prædicti servus, juvenis 28. annorum, cum primum ex Mempsi Aegypti celebri civitate Thessalonicensem advenisset, illico de curis dolore coquebat; est, in quo juxta talem primò ulcus excitatum est, in quo vena modo caput conspicebatur, quod advenientes Turcæ morbum cognoverunt, periculosum esse in Aegypto & India, ac reliquis regionibus quibus innascitur, significantes, quæ Arabes præcipue Avicenna, Venam Medenam, fen. 3. lib. 4. appellari tradit, velut Avenzoar & ceteri hujus doctrinæ homines, quibus morbus hic satis cognitus & familiaris erat: Pro cujus curatione accersit Medici Parahyas lingue Arabicæ doctus, ita orsus est.

est. Primum deinde victus ratione propolita, partem extremam venit, aut verius nervosae corpusculum subflantiae subtili ligno alligavit, quam paulatim ligno traherebat et trahente, adeo ut ad ejus ultimam partem, h. e. ad tunc cubitorum longitudinem post multos dies perveniret. Unde Aethyops à dolentibus & angustis, morbove ipsi liberatus est, nullo supraposito cataplasmate concoquendi vim habente, aut calida sapidificatione aliqua, quæ ex Sorano & Leonide ultionis verbis lib. 4. sine Medicinæ hac morbo auxiliati tradit. *Amant. Lapid. Com. 7. Cap. 64.*

Hollandus quidam è penuria Rupellam delatus, de dolore, inflammatione, & tumore in utroque malleolo conqueratur, rem Chirurgus desert, monetque ut de vermibus cogitaret. Id fecit. Inflammationi succurrebat cerato Galei 14. Med. mod. i. descripto, cui parum basilici misceretur. Ex duobus quasi vermes, aut nervos, ex utroque malleolo unum, prompuentes. Hos Chirurgus seorsim protraxit, usque dum æger de dolore conquereretur, tum in nodum, quod extractum erat, replicando concinnavit, de die in diem opus idem repetendo, usque dum planè exiderit. Illud quicquid fuerit nervi, aut ligamenti, aut vermis, nunquam vitæ alicujus specimen exhibuit. Longum erat pes quinq. contraxit. *Antonius Guentius Parisiensis Medicus & Chirurgus, referente Wessio è suis adversariis à febrili Perungiani petiit.*

Montalbano è Rupellæ p. nuchæ homo allatus jam descripto morbo laborans, sed non ita felicitè curatus: Dum enim tunc sitit usq. extractioni nimis violenti operam dedit Chirurgus, eum discipul, unde inflammatio, dolor, convulsio, & 24. horarum spatio ipsa mors sequuta. Aperto cadavere, p. cœcium inflammationem deprehensum est, cui planè adhaerebat istud, quicquid fuerit, funiculi instar juxta malleolum in gyros quinq. vel sex conotquebatur, inde rectè ad genu potrigebatur, quo in loco iterum in circulo reflexum, tandem ad os Coccygi fecit, aut saltem litchi protendebatur. *Idem, eodem referente Wessio.*

Ad litus ubi nomen Capocori, sive promontorium Cordicum, quidam coarctatus tanquam febris, primo horrore conessus est, calore succedente, totaque corpore pustulis erumpentibus, valde exiguis, quæ tamen omnia, probè operito mox iterum dissiisse evanuerunt. Delatus igitur in proximam pagum, cui nomen Agrata, hanc procul à Castello Sancti Georgii, seu ære Nigritia Mina dicitur, circa malleolum in elixba decem duas pustulas erupisse advertit, quæ vesiculæ contabentes mox rumpebantur, & vermis sive dracunculus ibidem latitans caput suum exerebat, non majus quam aculeus, est, quod ideo à Chirurgo Batavo captum, pennæque medio parumper fuisse insertum, deinceps quotidie circumvolvendo eò usque extraheretur, donec dolorem aliquem percepisset. Ita unius bidui spatio integer paulatim deductus, prodit, aliter verbò abruptus tumorem curvis doloribus maximis exciavit. Qui integer prodierat longitudinem ulnæ nostratis superabat, tenuis erat ad instar choræ testudinæ, coloris dum recens erat albi, exsiccatum autem dondum flavescens, qui tenus etiam ad instar filium sonabat. Chirurgus morbi istius nodum facit petrus erat, ideoque unguentum basilicon & emplastrum palmatum applicuit, quibus tamen sollicitationem felicitè abolit. Nigri illius regni incolæ aliis ligno utuntur exiguo ad extrahendum, & reliquum circa solo oleo palmatum, sive coccorum, quod habent copiosissimum. Tiennium illic transiit, auferunt morbum hunc contraxisse, qui toti regionis familiarissimus ex aqua præcipue in cibis potumq. adsumtis ore creditur. *Georg. Heren. Wessio, ex communicatione Joau. Abrab. Heinzelii Patricii Angulani qui alia decemium in Guinea regna vitam duxit.*

Qui in Guineam navigat, & in Castello S. Georgii de Mina habitans, cujus districtus ad aliquot milliaria extenditur, toto corpore vermibus assigi solent, magis tamen Aethiopes incolæ, quam Germani advenæ. Notari autem dignum est, si quis tantummodò præternaviget prorsum in eum sentire, maxime in brachiis & cruribus, frequentissimè verò in fimo c. Tunc oritur vesicula, unius, in quibusdam tamen trium ipsorum magnitudine. Hæc autem nisi à verme ipso pertundatur, ubi Chirurgi satis maturam judicant, (sunt autem ejus tunc perissimè) aperiri debet, Mox prodeunt pili gemini, albi, & capite adnati, qui ideo barba vermis dicuntur. Vesica ipsa aqua distenta est: tum vermis quotidie mane & vespere extrahitur. In partibus corporis muscularibus, si articuli ferè longitudine prominere saepe accedit ut unico trahit educatur. Longitudine ulnæ, aut etiam sesqui cubitum, exarant, vires coloris & frigidissimi, quamvis ex carne calidi exant. Tenuis ad instar filii, alii tamen ut funiculi. Crassiores venenosissimi & pessimi existunt, valdeque difficultè extrahuntur. Inferiori crurum parte læpius nervis & venis circumvolvuntur, acque tum quidem educi nequeunt: sed abrumuntur. Abruptis autem tumor ingens in pedibus, suppuratus, & copiosam materiam concludens, donec tandem testiculus exciderit, aut scalpello foramen fiat, quo plures quoadque aliorum redduntur, magnitque dolentibus afficiuntur. Ipse ego, cum illic degitem, tribus ejusmodi laboravi, duobus scil. in dextro & uno in sinistro crure. Primus dextri pedis in ipsa planta enatus erat; quò 14. dies decubui, neque ambulare potui, donec tandem discipulus exarscisset. Alter infra malleolum ad digitos usque protensus, ideoque magnis cruciatibus & ulcerationibus curatus est. Tertius itidem sub toto sinistro, cum ad dimidii cubiti longitudinem prodisset, disrupta retrocessit in tibiam, quæ ideo insigniter intumescit, ut 4. menses integros egrotarem. Nec enim nisi sedulo curari potui, quò tempore nec stare, nec ambulare poteram, sed necesse habebam ab Aethiopo pæpente gestari. Stolarum nostri coquus 30. ejusmodi vermium diutius extraxerat, est, per semestre integrum decumbens, ut plerique de vita esse desperaret, tribus enim aut quatuor curat, mox alii exstabant. Quamquam verò pauci repesierant, qui absque hoc morbo ex illis locis redeant, vicissim tamen pauci occurrunt, qui tam multis, ac coquus ille assigantur. Sanatus autem & ipse est, ut me discedente, etiam ulterius testificet. Aethiopes se ipsos sic curant: Ubi vermem digit longitudine extraxerint, abscondunt & oleo palmæ illinunt, solumque recens ejusdem arboris cirplastri loci facit impingunt: tumore quoque, postquam apertione facta, materiam purulentam & ichorodum eilluere permittunt, ita postea solent & Postquam aqua ex pipere alioque herbis satis acti reddita eluunt, imponunt deinde oleum palmæ cum tulio ad mitigationem. Atque hoc remedi ad omnia ulcera utuntur, *Michael Hammerfarnus Narricus Lunarum Guineens. vernaculè lingua inscripsit. cap. 13.*

Laza ubi magis est bene structa, murisque fortissimis cincta summo montis apice sita. In illa meratus est, quo varia mercium genera venus compertantur, magnoque illic fructuum copia reperitur. Sed aqua prava & inialubris, pestilentiæ & morborum graviorum ac lethaliū causa existit. Ex hac aqua, ad Gomeron usque se extendente, ut scribunt, vermes quidam longissimi generantur, qui cruribus humerisque excrevant, torundi, congyrati, & in carne occulti. Quampetundum animadverti concipiente, aperitur locus, ut caput vermis cap.

capi possit. Tum ligneolo diffuso capus circumplacat sive convolvitur, sex saepe pedes longitudine excedens: parum tamen quoties sic extrahitur, donec totus sensum prodierit. Cautè trahendus est, si enim abrumperetur, portio in carne residua, ulcus periculosum efficeret. Medicina contra hanc aquam viciosa est vini providentia, vel saltem abstinentia à potu aquæ illius, antequam cura per pannum transcolata fuerit. *D. de Bourges in descriptione Gallie interioris ab Episcopo Beryensi in Sinas suscepit.*

Petgrini impetigo qui Guineam appellatur, cortipuntur vermibus in corpore genitali: Imò & Aethiopes non tantum albi, sed etiam nigri prope M. nam, locisq; vicinis, àm tamen it qui 5. miliaribus orientem versus habitant, huic malo non sunt obnoxii. Vermes isti, quos linguâ vrenaculâ *krion* vocant, non omnibus, qui eò tendunt sed quibusdam tantum manifestantur. Sunt enim qui his laborant, dum in liore aurifero degunt, alii in rectu demum, & iterum alii post hoc peractum, etiam 4. 5. 6. Imò & 12. mensibus, infestantur. Sunt vicissim, qui ter situs illud asserunt, & tamen nunquam de his vermibus quidquam audiverunt. Nonnulli congressui causam adsignant, alii singularis cuiusdam pitcis eiui, vermibus scapentis. Alii nationibus & balneatilibus in aqua frigida adscribunt. Quidam à nimio vini palmei potu, vel eda panis millacci, *Caudarum*, originem trahere dicunt. Sed omnes illa rationes parum vero consonæ videntur: quia, qui nec cum mulieribus tem habuerunt, nec pilces panesve illorum degustarunt, nec vinum palmeum biberunt, nec frigidam marinam aquam ingesti sunt, vermibus tamen hoc morbo adfecti fuerunt, cum è contrario plures in terra illa, etiam cum metericibus viverent, vinoque palmeo sæpius inebriati, nihil huius mali perulebant. Verosimilius idcirco fuerit, ex singulari quadam aëris malignitate, aut aquæ potu, nasci, quam Nigri illiæ ex quodam fonte petunt, Albiq; vendunt. Verum quidem est peregrinos multos in limre aurifero aquæ plus nimis bibisse, qui nunquam morbo correpti: sed hi navibus suis infra Mouerem appulerant, non Acaræ, aut aliis locis. Qui enim Moueræ appellant, vel aquam multam bibunt, etiam vermibus laborant, quam qui Acaræ, aut superioribus locis. Variis modis invadit hic adfectus: Alios scilicet cum febris, vel humoræ febtilis, alios cum imbecillitate, lipthymia aut anxietate magna, quosdam etiam cum delirio. Primum se manifestat vesicula exigua, sive pustula, morfus pulcis similis, vel tumor, in quo vermis inter cutem & catenem sæpe etiam videri potest, vel efflorescentia quardam sanguinea cum symptomatibus similibus. In carnosa maxime parte cutem, brachiorum, genium & narium, Imò præcipue in omnibus partibus carnosiss, quandoque etiam in seroto, quo maximos dolores eras, quoniam etiam interdum hic loci non doleat. Sunt qui trimestri integro his molestantur, alii è contrario, vix tribus septimanis. Alii etiam aliis plures. Quidam unum tantum, nonnulli una vice etiam 10. habent. Variæ sunt longitudo & magnitudo. Alii duas ulnas exequunt, alii unam tantam, alii denique una etiam breviores sunt. Quidam crassi, ad instar silium crassiores, alii tenues, ut silium sericum. Multi non credunt vivere, sed pro nervis corruptis habent, nec vermes esse putant. Sed motu quem extra ostendunt, diversum competit. Curatio raro infigitur, antequam vermis ipse exitum patet; aut caput excutit. Tunc enim capitur, & renetur, ne retrocedat. Sensim postea extrahitur ramdus, donec ulterius prodire cesset. Ita parumper quiescere sinunt, donec denuo prodire in-

cipiat. Quidquid extrinsum est, ligno cuidam riguo circumvolvitur, ne in corpus tetro meet. Sic verò trahendo ex intervallis pergitur, donec totus omnino egressus fuerit. Si iussu torrida trahatur, hanc raro abrumpi solet, & cum plerumque vulneris inflammatio subsequitur. Exundo etiam plerumque multum siniei secum defert. Nigri manum non admovent, sed elucrarj sinunt, vulnèque aqua salâ eluunt. Optima curatio est, corpus à putrefacta sanie, mundare, & vulnus butyro recenti infuso inungere. Locus quo vermis se manifestat, ante omnia, semper taceat, necesse est, custodiendo illum diligenter, sine ab omni frigoris sensu. Nisi enim id probe obtineatur, intumesceat plaga, & inflammatur. *O Bagnard in Africa descriptione ex Isaac Vassii Manuscriptis.*

DROPAX De eo vid. *Bibliotheca nostra Pharmaceutica.*

DURÆ MATRIS VULNERA Vid. *sub titulo VULNERA.*

DYSURIA & ISCHURIA. vid. *sub titulo URINARUM MORBI.*

Finit Libri Quarti.

BIBLIOTHECÆ CHIRURGICÆ

Libri Quintus.

De Affectibus & Operationibus Chirurgicis a Littera E. incipiemus.

ECCHYMOMA Vid. **CORNEÆ MORBI.**

ECTROPIUM Vid. **PALPEBRARUM VITIA.**

ELEPHANTIASIS.

Elephantia totius substantiæ morbus est, contagiosus, oculus, veneratus, fræ elephantis corio ac tergori eutem hand abumilem reddens, unde & nomen accepit. Habet igitur corporis elephantici forma fere elephantis naturæ similis multa. Ut elephant nulli animali similis est, sic neque hic morbus, alij cuiquam. Ille omnia animalia magnitudine & crassitie superat: hic morbus non solum genere maximus est, sed laborantes etiam efficit seipsum majores & crassiores, totumque corpus in tumorem attollit. Quæ ratione nonnulli bone definiunt tumorem præter naturam, qui totum corpus in speciem elephantis immutat: non quod tumor unus in corpore sit, sed multiplex & inæqualis, & per universum corpus hæc illos dispersus, immo à visceribus factio initio, & progressionem usque à extremam cutem continuoata. Summa corporis elephantici pars crebras maculas, crebrosque tumores, & tubercula, verrucis per similia habet, quorum rubor in lividum aut ætium colorem paulatim convertitur. Et omnes quidem elephantis maculis multis leviter exuberantibus affecti notatque sunt, & livido cinereoque colore toto corpore obscurantur, nocti & motu penè similes. Ad hæc summa elephantici coris inæqualiter crassa & dura, quasi squamis quibusdam exasperatur, ac interdum finditur, rimisq; dehiscit: & elephas quidem corium habet asperum, crassissimum, duris exuberantibus inæquale, & fissuris multis, semita

ac laciis patlongis interfectum atque inaratum. Elephantiasis capilli & supercilia & barbae pili vel excludit, vel in lanuginem extenuantur rarissimam. Et elephas rarissimam lanuginem, non pilos, aut setas toto corpore gerit, præter animalium morem. Denique frigoris impatientissimus est elephantiasis constitutus, & elephantiasis quidem hyeme, aut regione frigida continetur, hinc, & intermoriuntur, nisi tota hyeme calido in loco continetur, & vino generoso reficiantur. Quæ causæ est, ut in frigida regionibus, nec nascantur, nec aliunde advecti diu vivere possint. Tument digitis in pedibus, ac pedes penè similes evadunt elephantum pedibus: unde nonnulli vitium elephantiasis appellatum volunt. Archipenes tamen à magnitudine morbi, sicut ante proposui.

Sunt & qui morbum hunc leonem aut leontiasis appellant, à buccis & superciliis, in his non minus quam in leone protuberantibus, ac flexili mole præditis, seu ob tumida frontis dilatationem ad similitudinem turgisæ piliis supercilionum leonis. Aut denique quod non minus horrendum & formidabilem, quam leonem aspectum præ se ferant elephantiasis laborantes.

Satyriasis etiam nonnullis appellatur, quod iisdem malis cum rubore attollantur, & masculis maxillariis veluti convulsionem patientibus, mentium ipsura effusa quadam ad satyrorum formam similitudine dilatantur, aut ob inexplicabilem impudentemque cocunditiam, qua hi contenti iactantur libidinem. Hoc enim fabulosis Poëtæ satyros exardescere memorie prodiderunt. Habent igitur faciem satyris persimilem, & concubitus vehementer appetunt atque concupiscunt. Dicunt & herculeus, quoniam eo nullus maior est, neque consummator: & magnus quidem est postea morbus, quod ad mortem inscendendam potentissimus sit atque omnium longe efficacissimus. Nempe à mortis causa ducit originem, quæ primigenia est humidi ab alieno calore depopulatio præpropria, quam terrena omnium partium sinceritas consequitur.

Contagiosus vero morbus existit elephas, idque magis quam lues venerea. Non enim, ut illa solo impetu vel concubitu, vel tactu, sed etiam inquinati aëris inspiratione contrahi vulgo fertur. Inquinantur autem aërem inspirando trahimus, ulcerum viulnorum ferrete, & corrupti spiritus exhalatione. Quod si aliquando neque ex parentum semine, neque ex alterius inquinati contagione, sed ex proprio intimoque vicio generatur, non ideo contagiosior morborum numero exponenda est elephantiasis, non enim contagiosus morbus, ex solo ortu primo, sed ex invadendi serpendique modo & ratione spectatur.

Oculus autem morbus dicitur, quod diu intus delitescat, priusquam se prodit, nec ullam insignem sui conjecturam notuante ipsius principium exhibeat, ut qui à manifestis humorum intemperie, aut patetudine oriuntur, & quod neque dolor, neque febris, ullave alia appetit atque inusitata affectio ante hominem incessat: neque in corporis summis partibus reperiuntur per initia, ut prociuum eum videre quis possit, & venient occurrente ac resistit. In viceribus namque abditus fomes succenditur, ibique favit, dum interdum victor, in superficie tandem exardescit. Non igitur ut rectè scripsit Atchigenes, cum signum morbum hunc emittantem est, quoniam ad cunctos tumores prompimus, sed potius perfici. Prima enim mali labe in jecore & liene relictæ, atque inde vicius serpit, patet in internis viceribus tumores excitans, qui in externis postea apparent.

Veneratui quoque censetur elephas. Non enim terrenus & melancholicus humor, toto etiam corpore

exuperans, vel bilis flava, vel ex illis grossa atra, præter hunc instigat, quin venenatam quandam malignitatem ac petniciem accliverit, quæ tum universi corporis humores, tum partium solidarum substantiam polluit & labefactet. Hujus rei argumenta sunt, melancholica morbus & mania, in quibus at à bilis toto corpore diu redundare potest lue elephantiasis, & febria quartana, tum interni tens, tum continua, in qua melancholicum humorem putrescere fatemur nullo elephantiasis periculo.

Elephantiasis causæ, aliæ externæ & evidentes, aliæ antecedentes, aliæ proximæ continentique desunt. In externis numerantur, diuturni & exuentes solis ardores, longa & perpetua suscipienda inedia, victus tenuis, siccans & exaltatiens, decocti guaiacini ulius diuturnus & intemperatus, vini generosioris & meretricis potus: elucida ac potulenta, quæcumque vel bilem flavam exurant & exoriant, aut crassum & melancholicum succum procreant, ut bubula, cervina, asinave caro, & reliqua ejus classis omnia, quæ alibi particulatim enumerata sunt. Deinde saltem omnia & pipere aut alio aromate condita. Postremo legumina plurima, ut lentis, fabæ. Hæc enim omnia crassi prævique sunt tacti.

Secundum locum tenet alterius inquinati contagio, quæ sive concubitu, sive acubitu, sive assidua vita consuetudine computetur, idcirco elephantiam instigat, quod ex elephanter corpore petnicia a quadam qualitate patitur cum humore, vapore aut spiritu transferatur in integrum corpus, cujus non solum humores, sed partes etiam omnes sensum pervadit atque contaminat. In evidentibus primæ ac præcipuum locum sibi vendicat viriola alterius aut utriusque parentis elephantiasis laborantis constitutio. Nam si forte patrem aut alterum genuit elephantiasis tenebatur, fortis protectio ei nascetur elephantiam, tanta est divinæ procreatrix sacralis energia, ut in semine intemperato ac prociis impuro consistens, corporis partes vel ex impura materia fingat & efformet. Si nondum elephantiasis patris quoniam genuit, ten barue, sed in eam duntaxat propensior erat atque proclivis, si filius eadem ætate qua patens, elephantias præbenderet, erique elephantias hæreditarius morbus elephantiam patrum semine gentus. Fieri tamen posse arbitror, ut quemadmodum Aëlis scriptum reliquæ, non omnino contagiosus sint succedens hujus affectionis in omnibus, quam videlicet alterius patris integra valetudine præditi semen in conceptione vincit.

Mulierem quæ instantibus aut profluentibus mensibus concepisse, factum edere in elephantiam proclivem Avicennas literis prodidit, non admodum verisimili opinione. Multis namque orbis tradibus nunquam grassari deprehensa est elephantiasis, in quibus tamen sepe profluentibus mensibus mulieres concipere verisimile est. Et in hac nostra Galia, quæ parum mensibus repurgantur, vix alio quam ipsius purgationis tempore concipiunt, citra ullam in elephantiam propensionem. Secundo loco sunt mensium & hæmorrhoidum diuturnarum suppositio, aut varicum, in quas natura sese exonerare consuevit, scilicet, vel ubi. Deinde jecoris calida & siccæ fortissime bilis flavam cumulas, quæ diu cohibita in atram facile degenerat, & venenatam perniciem indisplicet, quam toti impartitur, ac communit. Animi motores, & perturbatores, quæ melancholicum & terrenum humorem adangete possunt. Perque truncanda, quæ bilem flavam in atram usione commutat.

Antecedentes causæ putantur bilis flava, singulis melancholicus humor, & pituita falsa. Hi enim humores quoniam supra modum torrentur, in atram bilem degenerant, quæ diu coacta huius ac tempore venenata labe inscitur. Nam venenum in nobis sponte

gigoli posse, Pelopis auctoritate confirmat Galenus, & experientia docet in epilepsia, suffocatione uterina, aliiq; ejus classis affectibus.

Proxima continensque elephantiasis causa terrena & melancholica est humor, virus petriolicum adeptus, quod pustula maxime demonstrat, dura, sicca, livida, purpurea, inaequalis curis densities extrinseca nigrescens. Hic aetern humor malignum ac venenatum qualitatem unctione inspicitur, quam tum visceribus, tum alia partibus omnibus sensum impetitur, ac communicat. Illa vero semel inquinata, non nisi terrenum quandam & melancholicum succum, vel ex purissimis alimentis postea proferunt, ejusdem veneni participem: quo partes deinceps imbutae ac enutritae, tempore similes nascuntur naturam, sitque elephantia totius substantiae morbus, & universi corporis velut cancer quidam. Totum igitur corpus in elephantia ita afficitur, ut ipsa quoque ossa vitari dicantur, quod ipsa etiam impio trantur succo. Verum prima ac praecipua mali labe in fecore residet, & quo postea cum sanguine in totum spargi propagarique solet.

Qua sponte propitiusque vitio nulla aletius inquinari contagione invadit elephantia, vires quam feminas sepius & crudelius excetret, atque inter illos, cursum frequentius, qui crassum, leuatum & melancholicum sanguinem, ac falsum pituitum congruunt. Ac proinde qui victu ad hujusmodi procedentes humores idoneo utuntur, sepius, quam qui contrario.

Quamprimum enim in Alexandria elephantia conspiciatur propter vitium rationem, & regionis ferocitatem, ex veterum monumentis accepimus. Illic enim elixare satina, & lentibus, & cochleis, & multis falsamentis, & nonnulli ex ipsis, a nimis carnis & aliis quibusdam cibis, qui crassum & melancholicum succum generant, vescuntur. At in Germania & Miina rarissimi hanc afflictio videtur. Ex apud Scythias lactis potatores nunquam ferè apparuit. Deinde qui vel otio torpescunt, vel cibo & potu nimio sese ingurgitant, vel inedia, vel violenta excitatione, quae impe humores adurit, vel cibos in ventriculo coarumpli, praesertim in calida & sicca regione, utuntur, non raro in elephantiasin incidunt.

Nationum igitur aliae familiarem agnoscunt morbum hunc, ut Aegyptus & Judaea. Aliae vix novere, ut Germania & Scythia & olim Italia. Aliae inter utraque media. In universum aethiopia regionibus, quam temperata, & frigida, frequentior. Quamquam sunt qui extreme frigida ac gelida familiariter esse contendunt, quod prohibita transpiratione, coarctatoque calore humores exantant.

Quod ad aetates pertinet, quom nec pueri, nec adulescentes, humorumque aetate vitis pateant, elephantia vix eos, sponte sine feminis labe invadit, sed aetate florentes, vel etiam proveciores. Vix etiam ulius cunctibus hoc morbo tenetur. Qua ratione nonnulli legimus sibi testes exercuisse, ne ea ignominie labe aspergerentur. Sed & qui elephantico parente progeniti sunt, raro in elephantiasin ante pubertatem incidunt, si prudenter se gerant atque contineant. Eadem de mulieribus, quae singulis mensibus natura lege purgantur: de qua, viris, quibus stas temporibus haemorrhoides fluunt, vel insignes varices, in elibus sanguinem profundunt, sepevitia ferenda.

Antequam in externis corporis partibus oetere elephantiasis nox se prodant, ingens corporis segnitia, & lenavia morumque difficultas, excetret, spiritus tardus & difficilis evadit, alvus siccata & adhaerens est, utinae jumentorum totis simillima, alba, crassa & turbida sunt. Expiratio gravis & fetida, tussis contioni, ipsi

etiam argoto notum parum molles, alidua cruditas. Appetitus nec integer est, nec omnino prostratus, digestio scilicet, tanquam in suum ipsius alimentum a morbo captum errantem, propterea inferioris ventris siccatate laborant. Ipsi tot in vegetem insensum, in fontem propensio. In omnia meris & mortis plena, volut & animi mores, qui subdoli quoque & vasti existunt. Viri causis foras emigrante, malisq; ad eam progredientem, male existit huius, & pro hoc idem ac vivido colore, livido rubore tinguntur, & tumores in facie extubant. Plerumque enim in facie haec lues erumpens, tanquam ignis de specula proci confpicuus effulget. Hinc humore multo perfusis cutis sensum crassior, durior, asperior, decoloratiorque, reddidit & crebras maculas, crebrosque tumores habet: & aliis quidem nigricat aut livescit, quibus melancholicus succus, alius flavescit, quibus bilis flava, alia alba, quibus pilula falsa, vel in atram bilem degeneravit, vel atram bilem permixta est, alia ex tubero livescit, quibus crassus sanguis unctione nigrescit, atque in atram bilem depravatur: unde quatuor elephantiasis differentiae constitui possunt. Alia enim subrubrocinosa dicitur, quae a sanguine melancholico & li oso profecta est, de minor est: solet. Alia alba & melancholico humore peritae falsae admixto, vel postea a pleurita falsae nitrosa est, & hac minus deturpati ac de honesta ari ari solet.

Alia nigra ex vera atram bilem quae omnium pessima & foetissima existit: In hac enim corpus universum tandem ulceribus scaturit, & extrema putredine consumpta plerumque nullo sensu decidit. Alia subflava, quae a bile flava praesartata, & in atram degenerante sit. Haec peritae quidem micis, tandem fetida & pessima evadit. Primum anem in facie, aut in manibus, aut in pedibus elephantiasis signa comparent, naros quoad hanc vitia longissime a corde, & hepae propellente sua corporis extrema, minime tamen expurgante, ob humoris crassiem & curis densitatem: deinde vero & in reliquo corpore palliunt. Eadem de causa in extrema corporis partibus sensus paulatim hebetescens, tandem plane torpescit, Insuper si quis perpetuum, maxime vero in pedibus, & tibi calore in praecordis coarctio, ubi noxae materiae exarigo & focus latet. Morus vero semper per initia integer, in quibusdam etiam ad obitum usque servatur: in aliis tandem depravatur vel procius aboletur: maxime vero in pedibus & tibi. A frigoris & stuporis sensus toto morbi decursu fatigat, sed magis eo ingravescente. Tum temporis depravatur in omnibus partibus concoctiones & assimilationes sunt, qua ratione rubetula plurima veterarum instat, alia juxta alia incrementa, & tumores alii juxta alios exurgunt, melancholici humoris exuperantiam natura foras extrudente. Quae in cute concrevit. Primum quidem, ut supra positum est, in fronte & reliqua facie, quoniam exhalatio omnis sursum facillime fertur, praesertim ad faciem, in qua venulae multae obiterant. Deinde etiam in manibus, & reliquo corpore. Pedes, tura, manus & facies, elephantiasis facillime innumescunt, interdum quoque & reliquum corpus, quod intolerabilis gravitatis sensu semper premitur & torpescit. Libra sensum adeo crassescit ac proliant, ut invertantur, eorum parte inferiore livescit. Nares resine evadunt, & extrinsecus atris tuberculis scabre: intus vero aliam crassiem obducuntur, & timis discerpunt, atque ferè intus ulcerantur. Crassus nigras atque cruentas excutiunt. Quibus ex causis olfactus ferè concidit. Venae temporum distantes sunt, & quae sub lingua conspicuae apparent, livido, nigro, & farculento sanguine rorent. Lingua vero ipsa prandiosa variis exuberat, velut & palatum verrucosis tuberculis.

rubi, rufi. Aures extenuantur rubentes; admixta nigre vitæ, ulcera in earum basis sunt, e quibus sanies defluit, ac prurunt, aut obstruunt sunt & elephantice, ut solito grandiores esse videntur. Oculi caliginosi, in orbem cognatas, alio atque alio colore notantur, plerumque tamen candidum ex rubro flavescit, micasque crassissæ quasi ungue obstruunt. Supercilia pilis nudantur, prominent, crassa, prædura, ac fere callosa evadunt, deorsum versus pondere vergunt. Color lividus aut ater est. Episcenium vehementer coarctatur, dum tandem oculos conegat, ut insensibilibus leonibus accidit, vnde & leonina hæc affectio forte vocata est. Pili in toto corpore præmouentur, dein sensim desinunt, sed primum supercilia, & palpebræ, & mentum & pubes glabrescunt. Deo rata in capite evadit exarsis, interceptivi canis, & calvium subito ingruunt. Horrenda denique evadit parium omnium deformitas. Nam si qui pauci pili remanent, hi magis dedecet, quam qui delucentur. Totus corporis habitus sic commutatur, ut multi aliam instat, prominentes scapulas habeant, & mutato faciei colore, catæteri & mole auribus terrores satyros referant. Pedum plantæ & calnea rimis profundis & asperis interfecta sunt, manuum pedumque digiti siccitate desiccantur, unguisque funduntur ac dilacerantur. Totius corporis cutis exarescit, atque fons æque sicca scabie exasperatur: Sapiens cum pruritu, nonnunquam sine hoc. Malo ingravescente, alimento quidem privatur corpus, ipsaque musculorum caro abscuritur, eo-
 sumque liquefit, sed crassificens tamen cutis rugis asperis magis ac magis exaratur. Ad hæc quæ primum stupida cutis erat, sensus omnino defuit, manente motu, ut ne infixa quidem acicula dolorem moveret, neque asperis ferrens aqua exaratur. Observari tamen in quibusdam pedum morum cum sensu perisse, & in quodam alterius brachii, qui tamen retinui sunt. In omnibus spontaneæ insunt lassitudines, & singula membra quantumvis exigua, insuavia & intolerabili gravitate premuntur. Quinetiam corpus omnia gravatum fert, non illuc delectatur, non cibo, non jujonio, non motu, non quiete. Ab omnibus enim morbus alienus est. Somnus exiguus & brevis est: vigilia peior, mala sua cogitans, vox rancefcit, crassifacit, exasperataque grandinosis vasis arteria & gorture. Neque enim, ut recte scripsit Aræteus, inopiahile est omne corpus talibus scateat tuberculis, quandoquidem & suille carnes, elephantice & andius plenæ sunt. Spiratio difficilior multo quandoquam evadit, & nonnulli circa sternum sic afficiuntur, ut præcordi, strangulique videantur. Spiritus rotiusque corporis calahario fœtore molesta est. Pulsus exiguus, imbecillus, crebet, tardus. Tumores malorum, menti, digitorum, aliarumque partium, in sordida & virulenta, æque fœda ulcera, degenerant, gravisque putredo omnia contaminans, dum aliis oculus, aliis manuum aut pedum digiti: nonnullis etiam pedes, ac totæ manus de corpore excidunt. Neque enim elephantia prius permittit à turpi vita, siveque cruciatibus liberant, quam membratim dilaceratus homo sit, sed longeva est, quemadmodum & elephas animal. Aliæ atque aliter in hisce habet appetentia, non obfusca, sed gustatus atque qualitaris experti est, nollaque edendi aut bibendi delectatio. Angustio pusilloque animo fiant, neque præ vitæ amore vitam relinquere & contentum possunt, neque calamitatem generoso alioque animo perferre, verum seipso, condemnantes se se occupant, & hominum mortuorum confortia, cooptant fugiunt. Non tamen omnia in omnibus, sed alia in aliis symptomata deprehenduntur, ut est peculiaris cunjusque corporis natura, vitæ læ, & gastricis ve-

Bibl. Chirurg. Tom. II.

neri pernicios. Et quo graviora insunt, eo favio elphas judicandus est. De elephantia signis plus satis, nam quæ ex urinis ac sanguine petuntur, incerta sunt omnia atque fallacia.

Quoniam morbis quo dissolvantur, vel paria, vel æquiora esse remedia oporteat (quo enim super losemus) quæ morbo est, hunc quidam minime, eaq. ratione juvare, sed nec protius tollere, nec prolongare possit, nemini mirum videri debet, si nulla remedia a veteribus excogitari potuerant, quæ elephantem ingrus malum expugnare, ac funditus excindere queant. Neque enim in parte una, aut viscere uno inhærescit, neque aut intus duocenas labes occultitur, aut extra tantum prorumpit, neque humores solum, mollesque corporis partes leviter afficit, sed in penetrabilibus totum hominem occupat, & extrinsecus totum amplectitur, in solidas quasque partes, atque in ossa ipsa ita sese insinuans ac penetrans, ut propriam illatum substantiam protius immutat. Triste profecto & visu terribile spectaculum. Quod ubi ad summum malignitatis suæ fastigium confendit, tum stabilem ac firmam in ipsis visceribus & follicis partibus sedem collocat, ut omnino dimoveri, divellique non possit. Hic igitur perniciem differe non aufert, vitam in longius tempus protrahere, & morbi sedentem emendare, non funditus ejus causam excindere licet.

At si ad novam & adhuc orientem elephantiasim custandam, idonea vitæ ratio, & medicamentum quam mox referant, conferantur, saluti spes tandem affulget, præterea si ea improba vitæ ratione, vel ex alterius inquinati contagione, non ex patetum semine malum originem habet. Nam quam ex elephantico semine vitium contractum est, etiam adhuc oritur, de agri tamen salute spes omnis abicienda, nollis tamen remediis morbus coerceri tripimique potest. Sunt autem ex his, qui vitium ex prava vitæ ratione, vel inquinati alterius contagione, non ita pridem contraxerunt curatu faciliores, quibus à bile hura, aut à pleuita falsa, aut à crasso sanguine supercrassifera, proxima mali causa orta est. Quæ à bile originem trahit, saviotibus quidem symptomatis urget, & neglecta citius premit, quam quæ à melincolico, sacco in atram bilem converso proficiat: ideoque majorum curandi rationem postulat, sed falsius remedium edicit & obsequitur. Quibus restes vel natura desit, vel excedi sunt, si vitæ unquam elephantia tuncantur, si Archigeni credimus. Sed nec jam præsentis aliunde præsentis remedium, quam ex restum excisione affulget. Quosque eorum excedi sunt, tanti mali discrimen effugium, si modo temperatam eamque frigidam & humidam vitæ rationem in posterum reoverint, & hancque veterum complures, ut omnium tuisissimam curandi rationem sequeros esse comperio. Legibus autem est ne cum sanis venierant elephantiaci: nec injuria, mea quidem sententia. Licet enim ex his, qui elephantia laborantibus perpetuo assistet, neminem hæcæpus sola inspiratione eodem vitio contaminatum videre possumus: observari tamen halius graveolentia, alacrum fœtore, & terra totius corporis expiratione illorum bonam constitutionem tandem labefacturi.

Quamquam igitur elephantia perinde atque huius vel feræ virus humore quodam non spirito, pro vehiculo uritur, sine quo vitæ consistere, aut in alios commigrare, & patem affectum patere queat: ideoque vel concubitu, vel accubitu, vel osculo, vel alio impuro attritu opus est, ut contagionis feminaria celeriter in alios commigret: quoniam tamen inspiratione sacrem inficiunt elephantiaci, ut afflictoribus omnibus gravis & morbidus sit, recte eos à reliquorum societate leges sejunxerunt.

C 2

Qui

Qui elephantiam cunctis aggreditur, humores præter naturam in corpore collectos primum educere debet, deinde contractam intemperiem & tetram humilitatem venienti participem emendare. Quæ dum sunt & in corpore jam genita tubera fetro exandenda, aut caustico medicamento exedenda & ulcera illinc relicta, vel sponte nata, tergenda, implenda, atque cicatrice obducenda, & alia symptomata corrigenda sunt.

Remedia ergo in genere sunt, Inirio quidem, incremento, & quando humor effervescent, refrigerans & humectans vitæ hæc ubi vero defuerit, & calor clarescere coeperit, temperata, vel paulo calidior. Putrigies frequens, venæ sectio ex intervallo repetita. Balneum aquæ dulcis, litus ex hydragyro, aut certe catapotia ex eo ipso & auro, alia alexipharmaca varia. Cornus seu cucurbitæ. Causica & curem detergentia, atq; faciem illustrantia: quorum omnium usum paritalem expediam à vitio ratione oriri.

Incipiente morbo vitæ ratio imperanda, quæ refrigerandi & humectandi facilitatem habeat. Calida enim & sicca est morbi causa, quæ per contraria profligari postulat: plus tamen aut minus, pro humoris morbum committentis, & corporum differentiis. Conveniunt igitur frequentes sorbitiones ex pullis gallinæ, & vitulina carne, quibus sub finem coctionis, acida & refrigerantia olea adjiciantur, oxalla, atriplex, portulaca, viola, buglossum, borrago, lactuca, scariola, prunigo, uva acerbæ, oxycantha, aliaque ejusdem classis, quæ aeræ bilis calorem & siccitatem temperant, malignitatemque infirmant. Ebor, & cornu cervinum siccitate quidem aliquantum obesse videri possunt, sed veneni perniciem oppugnant & infringunt: maxime vero cervinum cornu, ideoque & sorbitionibus incoquitur, & cibis mittere permiscetur, qui illius siccitatem corrigant. Carne boni succi & coctus faciles, elixæ optimæ sunt, si suprapositis herbis condiantur. Conceduntur & assæ, si cum omphacio aut alio condimento acidulo eorum fervor retundatur. In id primas tenent mali punici, aut citrii, vel medici succi. Sequitur oxallidis succus, omphacium & acetum: quibus aqua rosali quando commode adjicitur. Item aqua sorbilla & pisces euclymi. Cremos hndei amygdalino lacte exceptus, & cum saccharo rosaceo coctus, omne alimentum genus anteit profecto, seu bonitas succi, seu coctionis facilitas, seu calidæ & siccæ, utiq; bilis contemperatio queritur. De lacte asinino eadem ferè sententia est. Vacationibus igitur necessarii preparato corpore, invicem modò hoideatur, modò lac asinum, pro jentaculo sit, præsertim per æstatis ardores, & in elephantem quem æra bilis à flava genita procreavit, aut certe æternis menibus usurpentur. Quinque etiam qui ex hordeo pania conficitur, utilis est, terget, refrigerat, alvum libenter efficit, & alimentum corpori præstat non contemnendum.

Vicenter salsamenta omnia, & stomatocis condita, aliaque omnia potulenta & esculenta, quæ bile ferventem sanguinem procreant, veluti cope, allium, porrum, sinapi: deinde bubula, cervina, asinina, suilla, leporina carnes, cæsus verus, aliaque cibi omnes, qui terrenum ac melancholicum succum prodigunt. Item legumina omnia, & quæ diutius coquantur, & flatus, quibus elephantici maxime premoventur, profutunt. Nisi forte per morbi initia quum fervidus calor omnia exurit. Tum enim & mala carpenda cruda & pira christiana cum saccharo efficit, & lactucam ac portulacam in acetatis, ut tantum fervorem restinguant, maxime verbò melonæ & reliquos fructus horatios ejusdem generis, vel

cetasa acida, Capparum usum etiam veterem in acetatis concedunt.

Potus esto non merum, quod invalescentem partium siccitatem fovet, & humores exurit, non cerevisia, quæ crassi succi copiam aggerat, non aliud denique potulentum genus, quod ferocientem elephantis causam exasperet: sed vel pomaceum, limpidum, pellucidum, optime defecatum, nec acidum, nec prædulce, pari etiam aquæ portione dilatum, vel hordei & passulæ decoctum, vel vulgaris pelsina. Quod sequitur, decoctum humorum fervorem restinguere & malignitatem ocula proprietate seprimere atque obviare potest. Ideoque in hac curatione omnibus aliis antecellit, quando infiri calor vitæ frigida nullo negotio vincere, ac conquecere possunt. His enim languescentibus decocto frigida detrabere præstat.

℞. Sanicula, bugla, plantaginis, pimpinell. calendul. ulmaria, singul. p. j. scobis eburnæ, cornu cervini, utriusque 3 j. palliarum purgat. glycyrrhizæ rasæ, utriusque 3 j. hordei p. j. Coquito in aquæ hvæ r. dum duæ decesserint. Decoctum percolatum, & syropo violarum conditum usui repositum. Eisdem vitæ habet quod sequitur.

Cichorii radicis tres quatuorve uncie, cum passulæ pari pondere, aquæ hvæ r. coquantur, dum sex solum superint. Tum glycyrrhizæ purgatæ rasæ fuscancia, hordei popillul. scobis eburnæ, cornu cervini & sem. fœniculi, singul. 3 j. adjiciunt. Ferventem omnia rursum dum libra una absumpta fuerit: dein olla abigne lemora, perfrigerantur decoctum colo trahitur, quodq; se vel cum sympi violacæ momento in vicem vini usurpetur. Plantago & lactuca recte inferuntur tum sorbitionibus, tum decocto, modò delictis, dum fervet humor & exurit. At inclinante ac fariscente natura frigida omnia marcescentem insitum calorem convellunt, & flatus gignunt, sæpe etiam febrem movent. Pimpinella quid venenata perniciem obducunt, neque frigore aut calore oblit, omni morbi tempore tuto usurpatur, velut & borrago, tanicula, calendula & bugla, quod putredini adversentur, Hordei solius decoctum (aqua hordei vilgo appellatur) & palato non ingratum, & retundendo incipienti morbo apertissimum exitit. Commode in eo mali punici acidi aut subdolcis granula imponuntur, & in vicem sacchari glycyrrhizæ ac uvæ passæ.

Bene faciet & potus divinus, qui pro aquæ coctæ, vel decocti hordei libris singulis succi mali citrii unciam, & sacchari unam habet unciam cum cinnamomi paulillo: sed tandem venticulo officit. Si forte ingrata hæc displiceant omnia: aqua simplex optima usurpatur, quæ tamen afflicta ætate & remissione calore noxia putanda est, cuius loco aq. sacch. & modico cinnamomi, condita conceditur. Inedia quum biliosa marcia imprimis commoveat & accendat, æque grassitum clanculum partium siccitatem promoveat, jure inter res huius morbo infestissimas habeatur. Invalescente putredine ac calore fariscente potus deligendus, qui spiritus instanter, vitæ foveat, serpentem putredinem acuat, & vitam in quàm longissimam huius poterit, tempus proferat: cuiusmodi est qui sic habet.

Capsis & frustum vituli aquæ libris decem coquitur, dum sex superint: sub finem adduntur veronice utriusque, buglossi, borrag. asclepiad. pimpinell. calendul. fœniculz, symphyti majoris & minoris, plantag. scariolæ singulorum M j. rad. pentaphyll. veronice coronaræ, sem. cardui, scobis eburnæ, & cornu cervi, singulorum ℞i. Colaturum jux in vitream ollam inditur, ut in duplici vase aqua proliciat, quæ

saccharo

saccharo & siccis citrini momento condita usui apta sit. Cibis igitur sit paulo plenior, sed euchymis & coctis facilis, sique bis die porius quam semel sumatur. Nova enim efica continenter corpori applicata spatio temporis antiquam vacuositatibus jam minus factam, obsecrat atque infringit.

Vehemens omnis exercitatio, quæ sudorem elicit imprimis noxia est, ut & dura corporis frictiones, & quæcunque vel corpus exerceant, vel humores inflammant & torrefaciunt. Adde & fomenta omnia sicca, & narationes in mari aut sulphureis & aluminosis aquis. Dein & unctiones omnes siquid facultate præditas, de visum ablymbiers (quod tamen à vomitione aliquando, & ubi cruditas urget tuto dari potest.) Hæc enim omnia alique ejus generis insalutentum patium solidatam siccitatem diuturno aut frequentiori usu foveant, & mortem accelerant: quæ admodum & ita, & mortis, & reliqua omnia animalis pathenara, quæ humores exarete, & calorem infusum labefaciunt, atque atterere possunt. Somnus diuturnus elephantiasis perniciosus est, nocturnus autem apellimus post pituitum à cœna intervallum. Deambulatorio lura commoda, velut & scissio lenis, subditiis alvi facibus redditaque utina. Hæc quidem refrigerans & humectans victus ratio, quandiu fervet humor, vixitque calor insitit, alioquin tamen æquante tenenda: maxime vetò in eo elephantis, qui ab atra bile quam flava procreavit, profectus est. Nam quum ita jam exulta ac retortida sit omnia, ut citius dumtaxat superflui frigidi, in calore & frigore temperata alimenta necessaria sunt, alioqui libalente calore insito ac pene jam extincto, quæ ab eo sunt concoctiones frustaneæ, aggeruntque flatus & cruditates, quæ corpus misere lacessunt. Qui eo mileria jam præcipites acti sunt, siemper potentius ac effulento refrigerante, febre tentari solent, donec nata inde cruditas evicta sit: qui tamen morbi initio calidus tum alimentis, tum medicamentis valde offendi videntur. Itaque pro morbi progressionem, ætatis & temperamentum differantia, alique melendi opportunitate pendenter immutanda victus ratio. Hoc tamen sciri velim, calidioris & siccioris victus, quam humidioris & frigidiore graviorem noxam ab elephantiasis contrahi. Inclinaute ergo natura, vini sed diluti usus concedendus, alimenta temperata, euchyma ac concocta facillima deligenda, impetandæ sunt, quæ à languidiore calore nullo negotio confici, concoquique possunt. Fugienda etiam acida omnia, nisi saccharo aut cinnamonomo condiantur. In his nulla tentari debet curatio, quæ morbi causam excidat. Illic enim symptomatum impetum retundere, ac perniciem differre, non morbum radiceis evellere licet. Idonea victus ratione præscripta, in humorem qui nature molesti sunt & graves præparationem & vacationem incumbere oportebit. Sed quoniam res omnino sunt corporis regiones, à quibus excrementa atque educantur, priusquam crassius & faculentius sanguis, venis majoribus coactis agiteret, quæ in prima corporis regione coarctata sunt, eluenda, expurgandaque, priusquam quidem clystere, deinde cathartico blandiore: cujusmodi sunt calix atramentum, thabarnatum, & fenna, & quæ ex his sunt compositiones cathartice. Si quis tamen, ubi plenitudo insit, ante usum cathartico-rum sanguinem mietat, nullam gravem noxam accreturæ. Avicenna Græcorum imitatione venæ sectionem quum ex usu est, punctioni permittit, nec ante octavum ab ea diem purgare aggerit. Purgat autem perietam diacolythidos, vel per apozemata, aut carapota, quæ hellobotum, scammonium, lapidem cyaneum, pulpa colocynthidos, & aloem habeant,

à quibus in hujusce morbi insitis, ob cruditatem, lentorem & crassitatem humoris abstinendum censemus, ne magna sequatur periclitatio. Ille satis est: putat, si semel aut bis quoque anno validis hujus pharmacis purgentur elephantici: nos mitiores sæpius repetitis, sensim cacoehymia sentinam melior, rutilique exhausti didicimus: illorum tamen usum surgente materia haudquidquam repudiamus.

Atchigenes primas purgationes molitur colocynthidis pulpa in carapota r-dacta, quæ tamen serosios humores, qui atræ bili, veluti frænum aliquid insilicunt, & pituitum potius detrahi competimus melancholia retortida iura resistent. Itaque primo curationis hujus die, alvus clystere potuenda, pultrillæ vero, purgans medicamentum, quod nulla perturbatione ventriculorum, primas venas & intestina sanctorum exoneret, propinandum: tertio die vena incidenda in cubito dextro conspicitur postea die secunda & interna sinistra si vires valent: sin minus, bial interpectio his recedendis aptior fuerit. Detrahendi autem sanguini modum, vitæ & valorum plenitudo præficient. Oportebit & in mallois, post aliquos dies venas tundere, deinde & in fronte. Ut temel dicam, sæpe & multum, & variis ex incisi in hoc assu sanguinem mittere operæ pretium est. Reviviscit namque elephantiasorum calor detracta parti & fervente sanguine hacque quasi farcina levatum corpus multo alacrius evadit. Exigua quippe sanguinis pars, in elephantiasis optima est, quæ natura in alioquin cedat, reliqua vetò plurima. Hinc repetita evacuatione detrahete, illam familiari ac bono alimnto adaugeat oportebit. Habendus tamen modus in evacuando, dantique erant intervalva, quæ recedendis vitibus satis sint, & quo magis progrediente morbo vires immutuantur, eo minus sanguinis detrahendum. Intercedum sanguinis detractiones sunt, si durior alvus distictus sublevis, alterius diebus solvenda, aut etiam ducenda, vel calix atramento, vel jasculo purgatorio, vel clystere, aut vicilium modo hæc, modo illo. Sanguine quantum opus erit detracta, duo scopi supersunt, ad quos medici consilium omnes, quæque dirigunt, purgatio & commutatio. Purgatio quidem tunc quod sic vitium fecerit, ut pristinum integritatem recipere non possit. Commutatio vero, cum humorum, tum partium nostri corporis sic venenata labe inquinatarum, ut tamen in pristinum bonitatem revocari, reducere possint. Arte igitur sensim educenda quæcunque à naturali statu ita recesserint, ut nullis remediis restitui queant. At vero immutandus quicquid emendat atque corrigi posse videbitur. Educet autem lecta vena, catharsis, cucubitis, cotinibus, halsels, unguentis, & emplastris digerentibus aut suppurantibus. Venæ sectio noxum quidem humorem demit & vacuat, sed una cum eo viles spiritus & humores poros in sanis detrahit, eaque ratione vires dissolvit, & nativi caloris robur atterit: at in elephantiasis, ubi fere totus sanguis venenatam putredinem concepit, si intervallis repetatur, nihil nocuerit quoad vires valebunt. Purgans tamen medicamentum id duntaxat detrahit, quod natura prius inepitum atque inutile est, relicto utili alendo corpori idoneo, quod immutandis emendetur, si quod substantia aut qualitaris exiguum vitium contineat. Qui circum vitæ & in venis majoribus redundat crassius & faculentior humor, (quomodo esse solet, qui hujusce morbi materia censetur) nec per sudores evacuat, nec ceca transpiratione digerit, nec vomitione facile actuo excludi, sed sola atri purgatione & venæ sectione detrahi potest. Porro horum remedium usus multiplex ac varius existit, nam modo purgantibus &

inmutantibus confusis acque permixtis, eodem die purgatio & commutatio adhibentur, modo vicissim purgatio & immutatio tentatur. Noxios igitur humores eodem die preparare ac purgare possunt syrups & apozemata, quæ præter scissimam, agaricem & elleborem, radices, herbas, seminas, ac flores habeant, quibus attenuandi, incidendi, apertendi, humectandi, refrigerandi, putredinem inhibendi, atque atrox bilis perniciem edomandi, insurgendique faciles sint. Sed his alterius duntaxat diluendis, aut quarto quoque die locus erit, ne quotidiano usu ventriculo ac visceribus (quorum robur ad morbi longiudinem tuæ operæ pretium est) ulla vis & noxa inferatur. Diebus vero interjactis, præparantibus, & imituantibus pugabimus. Immutant autem in quod emendari possit, & præparant quod purgatione excludi possit, cardiaca refrigerantia, humectantia, bilem utramque & crassam pituitam attenuantia, incidentia, & vias purgationis appetenda medicamenta, xulapii, apozemat, syrups, foribitionis, opiatæ, tabellæ, pulverisve formæ quorum materia medico exercitatio utilissima est. Adde & unguenta & balnea, & alia quæcumque in id usus comprobavit. Veteres ellebore nigri obolos tres cum scrupulo scammonii in fero lactis aluminii dissolvebant, ac frequenter præbebant elephantiasis. Purgato dein levis corpore vomitiones præstabant, primum quidem à cibo deinde etiam jejuniis, idque interdum præ raphanis, interdum per album veratrum. Sed effrenis nimis & periculosis, ac nihilominus parum efficax isthæc medendi ratio deprehensa est. Purgatio per elleborem ante balneum usum, & e quissimam præparationem magna molestia minimam prolicere competit. Vomitione nec maritiam crassam circum viscera, & in venis inhaerentem de trahere, nec genarum intemperiem emendare, nec malignam morbi perniciem infrangere potest. mucosam duntaxat v. ntriculi pituitam & bilem molis crassatibus tollit. Multo igitur sic fatius, si nigra & tætoridis hâs callosa, rhubarbo, & sena hâz latius stentue & trahi viderent, ellebore nigri momentum, apozematæ, & syrups purgantibus, quæ sena & rhubarbo habent incoquere, hîque semel aut bis in hebdomada altera ducere. Est autem purgantium, & præparantium quæ modo proposuit, usus vicissim & repetendus, dum alimentis penuria morbis saluetur, ipse vero corporis vires alacriores evadant. Nec negligenda etiam in cibis medicamentosa purgatio, quibus dictis validiora cathartica non pottingunt. In prunorum damalcorum decocto colo transulo, aut in iure pingui fennæ semencia recte incoquantur, cum buglosso, borrag. oxalide, & hyssopi ac rhyni paulillo. Escalotom dein decoctam horis duabus cibus præmittitur. Hæc dum sunt, si vel tubercula, vel late quardam maculæ livido robore eam deturpent, siue sensus in his jam perierit, siue integer adhuc & incolumis persistit, primum foris & unguento emollienda, deinde diluenda cute cornua suctoria identidem adhibenda, quæ pariter tenacius imprædum, & hærentem sanguinem exant atque extrahant. Sic illa fronti, genis, cævic, brachiis, manibus, aliisque minus nobis partibus, commode insinuantur, oereque exurgunt, quicquid in parte recondat humoris alieni. Cornua suctoria quum defusa, nec cognitis est admovendi modus, cucurbitule sufficiunt, etiam multo imbecillius trahit. Post cornua alius rursum discindenda rubra, & catheteris medicamento, aut etiam causticis exterenda, abscondenda sunt. Late maculæ scalpelli corpore diriditæ, mercurio sublimato in populeo unguento dissoluto raditibus exedantur. Idem sed ambubulis ac omnino molestia præstat pulvis mercurii, vel solus vel unguento rosato exceptus, ne-

que validioribus opus esse compendio ad omnes elephantiorum venacosis pustulas, si quis prudenter uti noverit. Maculæ emplastro & cantharidibus, fermento & sapone nigro facile abolerentur. Hoc enim velicas latus tenui leso turgidas caicet, quibus ruptis effluat humore, morna epidermis à vera & transire cute divisâ, facile nulloque negotio per exidit, vel eximitur. Tumque si locus nimium exuberet catheteris unguento imponitur, quod illam reliquis adæquare possit. Quo quum ventum est, cicatrix induitur. Si non exuberet, contractus ardor unguento rosato demulcitur, dein cicatrix contrahitur. Jam vero quum primum istorum præsidiorum usu toti corpori provissim fuerit balneum tepidum ex remollientium decocto apparatus, in quibus die elephantiasis insidet, manet quidem ante opas horis duabus, & vespertini autem eorum horis totidem. Hoc in biduum asservari potest integrum, & semel in hebdomada instaurari, donec remaneant, aut proflus evanescant. omnia huius symptomata. La cautione, ut neque in ipso balneo sudor cietur, aut dissilna: & corpore. Hæc enim calidioris balnei nota est. Sic igitur iusto tepore moderatum balneum, ne calidius morbi causam (quæ sudoribus, præ nimia crassitie tolli nequit) exasperet.

Vespertini post balnei egressum corpore refectato, illius ex hydrargyrio adhabetur & postmodum balnei, catharticum propinatur, quod solum, liquescimus humorem in alvum capiat. Singulis ergo hebdomadibus, balneum innovari debet ad hiduum, & semel quoque die à balneo corpus unguento ex argem vivo in lecto petangi: dein sumpto cibo euchyomo & emperro, totumque si accedat, exsurgens nulla sudoris profusione. Non enim partium solidorum substantiam hydrargyri illu liquefacere, & in sudores, aut musculosum ipsum depravare, sed earum siccitatem humectantibus emendare ac corrigere, & refrigerando fervorem resundere consilium est. Ideoque si bis in hebdomada corpore spatio ad dysenteriam immolente sentitur, semel duntaxat in hebdomade postea inauguratur, & impendens spatium propinquo cathartico coarctatur, ne corpus quod humefacere consilium est, nimio exerceat opere. His quæ diu temedias, quibus mensibus continetur, tametsi morbus in totum nondum erit abactus, fatigante tamen nature duorum taliumve mensium remissionem concedere operæ pretium fuerit: ea lege ut interea octavo quoque die, & syntempo, aut alio cathartico, quicquid de quotidianis alimentis contempnit, detrahatur, & balneum singulis mensibus biduo saltem usqueper circa hydrargyrum interm. aluminii, aut caprini, aut si ne hoc quidem suppetat, vaccini lactis quinq. siue aucie quoque diluendo extorbenda ad hîo saccharo toloco, copias usu atrox bilis perniciem coarctatur. Recreata natura, si nondum proflus delecta erunt elephanica symptomata ad principium supraposite curationis reficere oportebit, omniaque in ordine facere, velut ante positum est, præterquam quod multo religiosius sanguis mitteretur. Idque bis, ter, quæque his, quæ dixi intervallis repetere opere præsum fuerit, si ex descriptis prædictis profectus evidens quaeritur. Maligna huius morbi natura, tenaciter adeo visceribus, aliisque partibus solidis inhaerescit, ut in plerisque, nisi sæpius repetito temediorum usu, funditus non excludatur. Alia igitur annus unus ac curationem, satis est, quæ neque ex parvum semine visum contractum, nequid quæ tentati sunt, alia quoque ext. illuc acceptum vicium jam diu inhaere, vir amplexu factum: alia, quæ vel hereditario hoc vicio, vel alio, sed in veterato tenentur, in vocam curandam, quæ postea tenentur curatio.

Ua et, hinc a præ aliis longis morbis remediorum vari et ac vicissitudine gaudet. Suntque in hoc affectu si quis in alio, ab omnibus fere remediis indiciæ quædam & intermissione sæpe ægro concedenda, deinde & resumptio, & ad priora reditio, & novorum remedium adiuvio adeo necessaria, ut cum vix unquam convalescentiam credam, qui in unico remedio quamlibet generoso ipam saluti collocarit.

Alia curandi ratio superiori affinis, sed facilior.

Præparato qua dilatazione corpore, neglecto limen ex hydrargyro, carapota suscipiunda, quæ calidam & siccam viscetum ac soliditatem partium interpenetrem emendare, omnium humorum feruam & putredinem expugnare, obstructions viscetum solvere, & eorum easum sensu expurgare, atque idcirco elephantiam profligare solent. Cujusmodi sunt, quæ sic habent.

2^a. Argenti vivi ꝑ℞. cum panis adhuc calentis medulla, manibus diti subige, ut in eam plumbaginem deponat, purg tam dein hydrargyrum lucidissimum momento, & olei empythæ arte Chymicæ deprompti ꝑ℞. exacto misceto, adjecta tritebinthine venetæ aquæ ros. eloræ ꝑ℞. tum adde aut purissimam, eodem artificio Chymico in tenuissimum polinem redactam, vel si dixeris, foliorum auri ꝑ℞. amburæ ꝑ℞. pulveris electuarii, diamarg. frigidi & electuarii totum fantalor. simplicis, utriusque ꝑ℞. fingito massam, cui sequentis magnæci ꝑ℞. i. o. adde.

2^a. Foliorum fenæ electuorum lbj. thaharbat in finissima dissoluti xiv. rad. arelicæ ellobori nigri ustratis ꝑ℞. diem unum coassaginate inacta, quod dein exime ac seponere, atque aliud affunde, idque rursus ex ætis duodecim horis expellam cum peso e misceto, & vitæ vas exceptum in diplomate exhalante curaro, atque tolli tum in ingruat ad usum servato. Hujus compositionis ꝑ℞. dabitur quindæcim alternis diebus, tribus horis ante cibum: idque alternis mensibus, interjecto balneo, & aliorum omnium prædictorum & descriptorum usa.

Revens omnia elephantia quæ gentilitio jure computari non sit, his remediis profligant. At quæ vel hereditario jure successit, vel inveterata est, nullo unquam remedio p. nitus excinditur. Hereditaria quippe naturæ & seminis vitio, quod aus nulla emendare potest, committitur. Inveterata vero quoniam partium soliditatem substantiam in sui naturam prius jam immutavit, nullo amplius remedio vincitur. Præstat tamen in rebus angustis, archæque, vel etiam deploratis, aliquod experiri remedium, quam in certam deperationem, ægrius præcipitem dare. Humorum enim est, & plenum benevulcoris signum, in summis etiam malis ad expectandum usque progredi, ut difficilem adactum, si non umino tollamus, certe leniamus & compescamus, sic tamen ne vulgo dedecore afficiantur præsidia, quæ multis fuisse salutis. Itaque in utriusque tenetur modo tradita curatio, si caloris nativi robur superest. Elephantia hæreditaria aut inveterata causam, si radicatus non tollit, eam saltem infringit ac debilitat, peniciliis si processu non aufert. Nam certe differt, vitæque proroget, plerumque in longissimum tempus, & morbi fudorem obducit. Sed ut erit nativi caloris robur, & corporis natura, hydrargyri modus in unguento, quod in egressu balnei aliquando adhibebit, venit decernendum, velati & in carapotis. In omnibus quidem naturis ac corporum generibus, idem remedium, sed non eodem modo

usurpandum fuerit. Qui viribus valent, ac firmo corporis habitu præditi, neque ætatis florem excessu luxu, eis non raro multa & sequens hydrargyriosis quæ ad lipotheses usque progreditur, sed citra sudorum prolationem præter auxilium, openique auxiliis: qui vero senilem jam ætatem affligant, viribusque fracti, thequæntis assidue, opprellique sunt, nihil aut parum adjuvanti ab hydrargyro percipiunt. Quom enim frigidus & humosus sit hydrargyri, solidum senum corpus calore nativo qui superet extincto, morti celeriter addicit. Incipiente igitur, increscente & vigente eleph. int. eorum calore, non vultis titulis famigretatum ex viperis remedium, non theriaca, non terebin, non ignis, non aliud denique illam partibus hydrargyro secundum deprehenditur. Quot ne temere dictum videretur, meæ opinionis longam jam usum & experientia confirmat, rationem panis, ut mos est, expedit.

Elephantia admodum sicca & terrens morbus est: argenti vivum summo humore præditum, quon purum tenuitate omnia permeat, indurata omnia molli, laxat & humectat. Acris, crustus & malignus humor est, qui elephantem parit, argenti vivum cum frigore, tum alia occulta proprietate & efficientia, acrimiam omnium humorum fervorem excutit, & maligni acri, feritatemque interfingit deprehendit. Elephantia non æternas tantum corporis partes attingit, sed soliditatem etiam substantiam labificat. Argenti vivum minima partium tenuitate præditum, non in extima coheret, sed ad viscetum, & soliditatem partium substantiam usque pervadit ac penetrat omnia & æquofore suis viribus afficiens, atque efficiat immutans, itaque prodenter, ut jam præmonui, corporum generibus, & nativi caloris robori, aptetur hydrargyri modus, & justis cellulis circumcircari utendi ratio. Hic enim grassantem foliorum partium siccitatem remorari, atterabiliis humoris inconditum restringere, feritatem cohibere, & invalescentem putredinem arceat potest.

De venæ scissione idem esto iudicium. Neque enim in deploratis, quorum languor jam vires, faciliusque calor infusus, tam sæpe mittendus sanguis fuerit, tamque copiose, quam in recens contaminatis, qui & vitium robore valent, & sanguinis plenitudine tenentur. Mittendus tamen iusto intervallo quam putredo nimium in venis invalescent, penicili in accelerabit, ut sublater parentis sanguinis factura, reliquum languescens, calor facillius concoquat.

Cetera omnia quæ elephantia conveniunt dixi remedia, vix unquam ulla noxa, maximo fere profectu semper à prudenti & rerum usu perito medico usurpantur. Tendens tamen vel in his modus, quæ semper salutaria deprehenduntur, concedendaque naturæ intervallo, & veluti quædam remedium indicia, ferreque, quo repetita illam prostra magis velut nova arduant atque immittunt. Itaque non modo semel in hebdomade melanago medicamento alvum ducant, sed etiam clysteribus sæpe illum solvant, atque grani interdum fortissime purgant quæ bonaginis, buglossi, orallidis, oxylipathicæ illa habuit cum fenæ tenuissima, & rhyri atque hyssopi paulillo. Sæpe laxantibus atque emollientibus balneis insudant. Sanguinem quoque mende, aut si ætis jam valde inclinat, tertio aut quarto quoque mense, aut saltem vere & autumnio detrahant, plus minusve, ut feret plenitudinis, putredinis & vitium ratio.

In loco habent salubriter temperato, lucido, æstate media, solis ardoribus minime exposto, sed ad septentrionem apertis, nam hyeme meridiana solem habere præstat, frigidis hiæc regionibus.

Cibus urantur boni succi & facili concoditionis, illicque temperatis, si jam inclinat ætas ac testisctus est bilis atque feruor; refrigerantibus vero & humectantibus, si nondum morbi calor defuerit. Vino in omnem vitam abstineant, aut certe ad laxissimum annum atque, tumque eo quam dilatissimo urantur. Calcfaciendâ & beneant alimenta, & medicamenta omnia declinent, nec se inedia coniciant, hancundam cohibeant, mori nem metumque; pellant, cupidiarcs, sollicitudineque omnes detrahant, & perturbaciones, concitatioque animi affectus coerccant, atque moderentur. Cardiacâ quæ venenatæ labi obducantur, frequenter olupunt, opiatæ, conditæ, pulveris, electuarii, aquæ stillatiæ forma, idque mane, & ante epulas, vel sub horam formati, interdum & cum epulis: quorum omnium compositiones postea trademus.

Qui elephantico semine progeniti sunt, non subito concidunt, sed sensim invalescente putredine corumpuntur, membraque dilacerantur, tandemque intereunt. Hic varias humorum mutationes ac multiplices morbi & naturæ conflictus observare licet. In his primum faciei cutis crassescens vividum colorem amittit, atque ex rubro livore incipit, quod symptoma antevertere, atque attere capedit, alienæ materię, (quam ex venis ac visceribus natura seie exonerata eo pepulit) vacuatione, balneis aquæ dulcis tepidæ, in quæ emollientes, laxantes, ac tergentes stirpes decoctæ fuerint, victu humectante & refrigerante, fotu emolliente & rarefaciente, unguento molliente, rarefaciente & tergente, admotis cucurbitulis, aut cornu fustorio post fœnicularem, unguento ex hydrargyro corpori post balnei egressum illito. Si malum nihilominus serpit, brevi tubera e-rumpunt, primum quidem in facie, dein in tibis, manibus, aliisque partibus. Hæc scalpello discissa cathetico medicamento radicitus exciduntur, deinde cicatrix inducitur. Progrediente tempore cutis quiboddam faciei locis mire crassescens, maxima detortitate in humorem attollitur, cui color inest ex rubro-nigrescens ac pellucens. Hæc scalpello vulnerata feculentum sanguinem fundit, qui etiam cucurbita, vel cornu fustorio, majore vi elicitur. Emplastro dein cathetico quicquid inæqualiter innumuit ac supercrevit, cadit, atque adequatur. cicatrix tandem contrahitur. Neque enim verendum, vel supercilia, vel frontem, vel genæ periculam sic vulnerata, atque reliquis quæ noo ita iniquaverunt, equare, quum telicâ ex ulcere cicatrix, multo quam reliqua cuti venustior effe solear. Ulcera quæ sponte vel in tibia, vel in aliis partibus nascuntur, sanguinis faculentis & corropi eò decumbentis soboles sunt. Ideoque purgato corpore a sanguinis missione, curatio incienda. Mixtura autem primum quidem incisa vena, quæ fluxionis fontem exhausat, dein quæ ab ipsa parte detiver ac vacuet. Hinc pars incidenda satis alais plagis, ut multus ex ea sanguis emillet, adhibendæque cucurbitulæ: postremo ulcus aliorum more curandum.

Commune est in omnibus ulceribus, quæ in hoc morbo sponte emergunt, post vacuationes universales, & deprivationem, ex affecta parte, ab his sectionibus, partem ipsam cadendam esse, ut adhibito cornu fustorio, aut cucurbita, sanguis ipsi impactus extrahatur, dein cathetico medicamento quicquid vel occuluit, vel supercrevit, vel nimis intumuit, vel aliud inemendabile vitium contraxit, abluatur: postremo ulcus aliorum more & carne impletur, & cicatrice obducatur quam elegantissimâ.

Morbo ingravescente graviora symptomata emergunt. Primum igitur scolis in æternis partibus habetis,

inestque frigore vero perpetuum. Quæ temporata etsi nullis auxiliis sanandis tolluntur, leniri tamen solent, & periculum differri: primum quidem ea curatione quam supra tenuimus: deinde topicis medicamentis, quæ frigidum & crustum humorem partem infectum digerere, crassescere autem emolliere, laxare ac levigare, & insitum ipsius partis calorem fovere atque erigere possint. Cujusmodi est ulcum quod sic habet.

Sigillum Martis, radis bryoniæ, & alihæ, prunis vino albo & oleo sensim incoquantur, dum vinum absumptum sit, oleum dein exprimitur, quo pedis, tibiae & manus, si stuposæ & frigoris sensum incit quoque vesperè inunguntur. Benctactis & sanis digerens, rarefaciens, & corroborans, ex malva, violaciâ, sem. lini, rad. alihæ, origano, sam-psocho, salvia, anagallidæ, tol. rob. omnibus sacculo conclusis, & aqua ac vino albo incoctis.

Quum jam eo miscitæ ventum est, ut portedo hominem membratim dilaceret, insensibilis sed unicum solacium superest, quicquid sic vitium est, vel medicamentis excedere, vel ferro rescindere, vel urere, Escinduntur, vel vicissim exstirpantur minutulæ partes, quas putredo cadaverosa tabefacit, & ulcera illinc relicta aliorum more curantur: in corporis trunco catheteticis potius locus est.

Oculorum membrana sensim crassescens, vilius obducitur inducere: remedium est; foras emolliens, rarefaciens & discutiens. Collyrium tergens, attenuans & ficans, aquæ pulveris, tymp. unguentive specie. Fotus est ex malva, violaciâ, caprifolia, fœniculo, semine lini, saculo couelnis, & aqua ac vino albo decoctis. Collyrium ejus qui aggravescit nartæ & vili magnitudini aptum comparabitur ex mytha & ærugine, ovi albumine coctione induratio, conclusis, & loco humido reconditis, dum aqua viridis exsiliaverit: cui syrupus de abynthio, aquæ stillatiæ, euphrasie, fœniculi & plantaginis, ea temperatione miscbuntur, ut circa vehementiorum dolorem efficaciter attenuet crassescens membranas, & sordes omnes abstergat. Acriori r. medio opus est quum membrana ex majore oculi angulo suæ pupillæ obtenduntur, aciemque pettingunt, qualis sunt quæ ad pterygium traduntur. Busto vivus olla fœtili exacerpus exuritur: tenuissimus pulvis in oculum afflatus, pterygium concoquit, & in pus deducit. Sed quum adhiberet trifrigerans remedium, ex cinis oculi superponendum, ne e-pus acrimonia, dolorem & inflammationem pariat.

Malum invalescente, sic elanguescit insitque calor, ut in omnibus corporis partib. fluxuerint concoditiones, & utrique setosa excrementa colligantur, maxime veto in capite, quæ sæpe in horum tanto impetu decumbunt, ut altissima infocacionis periculo tendendum, sæpe etiam febrem accerant. Interdum in oculos intumet, & discipuli eorum membranis, tepeneinam exstantem inducunt, aut inter eas intercrepra, implacabiles dolores dent, ac piosius obsecant, oculis prouberantibus, ac pene exteris. Presentaneum auxilium affert lingua celeriter missa, phlegmagogum atque hydragogum confusum datum ante tepetum, dein concoquendo & tenuis victus ratio.

Quum nates præ alarum crassitie, ac crustulis, quæ illic adnascuntur, obstruantur, primum crustulæ eacurie molliunt, tergentes decoctum, dein siccitatem lenit, & crustis deinde admixtis prohibebit butyrum filii expeti, aut certe oleum amygdal. dul. recens a pressum radiciâ & lieto oleo, v. c. illa-mo introrsum illitumque.

Concluditur

Concubitus elephantici maxime concupiscunt, nec eo interdicti debent, quum & corpus refrigeret, & mentem illorem animum demulcat. Quoniam tamen nimis frequentem vitæ solvit, pro ratione ætatis & nature ægrotantis in eo modus adhibendus.

Qui desideriorum remedium efficacia integram valetudinem recuperaverit, ne recedens in corpore noxis extremis, mali tunc tandem aliquando revertetur, omni opera prohibeat, itaque cibis eucharis uti conveniat, vel temperatis, vel paulo frigidiorebus & humidioribus, vino omnino sibi interdiceret, vel eo quàm dilutissimo uti, calidis & siccatibus alimentis omnibus vitatis, falsis quoque & aromaticis omnibus, porris, cepis, allii, ōnapi, & reliquis omnibus, à quibus abstinentiam esse in superiori curatione præcepimus. Loca incolant, ætate quidem frigida & humida, hyeme verò paulo ficiora & calidiora. Ad hæc aliis atque aliis medicamentis melanagogis, alvus intervallis ducenda. Habenda sæpe & medicamentosa in cibo ratio.

Vere incunte & autumno vena secanda est, aut etiam sæpius, si quando ulla plenitudine corpus tenebitur. Sæpe & cardica, quæ venenarum morbi malignitati resistant & obducunt, insuperanda venient, opiatæ, cindiri, pulveris, electuarii solidi, syrupi, atqueque stillaritie formâ. Biduo etiam quoque mente, balneum comparandum ætate præferunt, & in eis die desudandum, quæ methodo supra posuimus, adhibita in exitu, corpore tamen prius relicto hydragyrosi, velur ante præceptum est. Alloqui catapodi ex Solc. & Mercurio supra descriptis, ex intervallis utendum.

Fama est elephantiam quandam vitæ pariet ac morbo finem imponere quærentem, viperam in murti doliū itripuisse, confpicatam, extincta in eo vipera, sese multo ad siccitatem, semel atque iterum ingurgitasse. Cujus vi post violentas vomitiones, ebricitas, profundique sopor mori hand dissimilis obrepserit. Quibus tandem discussis, impetisilli defluerant omnes, & ungues exiderunt, dein omnia in ambitu membra corporis contabuerant, denique certum exitum in propinquo videbatur, quem ex reliqua quadam vitium scintilla, natura hominem redintegrans, alias carnes exsternit, ungues novos, & nitidiorum formam insinuat, ac vena cordium, seu lepentis senectam exiit. Ita habet fabula non admodum verisimilis quidem, sed corpus tamen imitatione, antiqui elephantie curationem ad oculum viperarum proprietatem retulerunt, de aliis remediis deservientes. Oculum proprietatem d'xi, propterea, quod qualitatibus manifestis elephantie causam angant potius quam infringant. Nam vel Galeni testimonio, manifestæ ac generales qualitates carnis viperarum sunt, exsiccare valenter, digerere medicenter, & exsiccare. Atta autem bilis, quæ huiusmodi causa est, calida & sicca quum sit, per contrarietatem recundi postulat. Vere potissimum elephantie curationem aggrediantur, in vini generosi doliū illas coniungunt, ac sinunt dam infuscentur, dein vinum ægris nescientibus propinant. Alii medicinam ex viperis confectam, quam theriacam vocant, supinis adhibent. Alii sale theriaco utuntur, quod vivis viperis cum quibusdam aliis medicamentis in hâlli no-

vo combustis comparatur. Alii viperas ipsas comedant in pavillos redactas. Alii illis angustiarum modum apparatus exhibent. Atque hoc omnibus commune est, viperis tandem interdum esse, dum elephantia vel in lepram abeat, vel in torum desinat, an teneas auras distant per eam afflicti. Galenus elephanticos aliquos ita se percurasse gloriatur: quin & incipientem morbum sola cathartici & phlebotomiaz, vere & autumno præscripta proficisse atque propulsa se vidit. Cujus auctoritatem tot seculis confirmatam, etiam non repudat, vix tamen quid de hoc remedii genere censuerit Fernelius, quidque partim dum is Lutetia floretet, partim post ejus obitum expensum sum, perpetuo si entio involvere possum. Elephanticos multos veterum imitatione quum viperarum usu restituere maxima methodo studuisse Fernelius, nemini in tota vita, ut erat in votis successisse: quod cum mihi indicasset, & à remediis omnibus siccantibus abstinentiam non esse monuisset, veterum medicorum auctoritatem ejus opinionis anteposendam ratus, & illorum pollicitis nimium foret addidit: theriacam elephantie multæ, quæ methodo illi præcipiunt, præbui, sed nulli prioris profectus: quæ res effecit, ut viperas ipsas aliter atque aliter apparatus experiri aggressus sum, quas tamen nihilo plus opis afferre compert.

Pancos (fateor) post dies cum extrema squammas & furfures temitur, tanquam elephas in lepram degeneret, videturque juvare per infinita hoc remediū genus, si solius cuticulæ rationem habeas, sed neque viscerum constitutio, hocce modo meliori fieri, neque verrucosa tubera intermoti, neque crassescens cutis deformitas emendari solet: sed elephantium viscus, post viperarum usum, & visceribus multo maiore quàm unquam impetu in cutem teneas, omnia lymphomata sic exasperat, ut aucta putredine membrata dilacerentur ægri terretimo fœtore. Neque enim passilli theriaci, neque venarum viperarum carnes, quovis modo præparatæ, siccam & terentem partium constitutionem corrigere possunt, sed omnia depravare, atque venenata pernicie inficere. Si quis tamen veterum auctoritatem tantum relictis, ut Fernelii & meam hanc experientiam universis medicandi legibus consentaneam suspicam habeat, ei facile sit, quæ ratione illi præcipiunt, viperarum usum experiri. Turfissimam utendi rationem hanc tradunt recentiores.

Viperas præparatas in aqua cum hordeo decoquero, quo postea gallinæ alantur dum implures evadant. His ego gallinis elephantici alendi sunt, donec coram ac pilis defluant omnes, & crassiores cutis squammas ac furfures remittant.

De proximæ elephantie causæ temperamento multum inter se non parum dissentiunt. Galenus melancholicum quidem humorem elephantiam propingere passim confirmat: sed quum ampla significatione id omnibus Latinis usurpat (nam & de prope dicta atra bile, acerrimo & ardentissimo humore, qui & corpus rudit, & terram fermentat, & de melancholico succo frigidiore, qui sanguinis velati fœx & limus est, dici solet) haud facile assensu posse putant, quod in significatione, melancholici humoris nomen in procreatione elephantis accipiat. Sunt qui cum commententur, in Aphor. 2. lib. 4. succum melancholicum frigidum, proximam elephantie causam his verbis facere existimant. In atra, inquit, bile totius corporis color ad nigredinem tendit, pustule nigre sunt ex ejus colore. Et quicumque morbi ex ejus hunc exuperantia, multitudine melancholici humoris manifestum indicant, quemadmodum cancer, elephas, quartana circuitus ex melancholico humore generantur. Si Galeni sententia

sententia, inquit, quartanus circuitus & elephas ea eodem sunt humore, quartanus autem circuitus non raro ex propria dicta atra bile perniciosissimo humore, sæpe vero ex melancholico succo frigido- te & terreno originem habet, & elephantem ab eodem sæpius fieri, otitque necesse fuerit. At libro de atra bile aliter sentire videtur hac sententia. Verum alia quoque plerisque non febribus in cute crassescere, siccescentem exanthemata proveni- re videmus, cum melancholici humoris redundan- tia natura ad extremas partes pellit, quo genere, is quem elephantem nuncupant, continetur. Ubi au- tem tale quidpiam simul cum febre exstiterit, hu- mor melancholicus, qui in cutem abcessit, facit eum quem carbonem appellant. At si cetera febrem de- cumbat, sique cum sanguine conjunctus, gignere elephantem potest: si solus sit in principio quidem tumorem atrum producit, sed progressu temporis in cancrum definit, cum uniusque corrosa cute acrior sit magis malignus, cum minor sine ulcere, la- tentem cancrum efficit. Evidens enim est hos affec- tus omnes, præcipue cancrum, ex humore melan- cholico gigni. Cancrum, inquit, carbunculum & elephantem, ab uno & eodem humore fieri tradit Galenus: at carbunculus à maligna atra bile fieri, contrahique alibi dicitur, quate & elephas: Con- tra tamen, qui *Quidus* est humor melancholicus car- bonem, qui non est ejusmodi, cancrum & elephan- tiam gignit ex Galeno. Eodem etiam libro eum af- firmate tradunt, sububros elephantem, ab atro hu- more qualitatibus miroribus peritico, sanguinique admisso, procreari: & si inveterare, nigrescere ted- di. Quod ut componatur dissidium, atram bilem ea humore melancholico nuper genitam, humoris me- lancholici nomen & appellationem idcirco veteribus etiamnum retinere crediderim, quod nondum plane incaluit, nec pristinis qualitatibus omnino spolia- ta sit. Proinde vero tempore quum manifeste jam incaluit, sævioraque symptomata invade- re proprie atram bilem nuncupant: tamen eadem utrius- que forma, eademque sit species: sic enim videtur sentire libro de tumoribus præter naturam. *Elphas*, inquit, affectus melancholicus est, cuius prima origo ex melancholico sanguine est, spatio vero tem- poris copiosior, quam sanguis atra bilis redditur: quo tempore corpus jam male & graviter olet, tut- que & deformatum videtur, & aspectu horren- dum, atque interdum etiam exulceratur. Hunc af- fectum, quum incipit, *farysalium* vocant, quod *farys* aspectu similes elephantici evadant.

Atra igitur bilis proxima est omnis elephantis causa, sed quæ quum vel ex succo melancholico ac seculento sanguine, vel ex bile vitellina, vel ex ni- troso pituita exstis ac torrefactis, non ita pridem habuit originem, illocum etiamnum appellationem interdum retinet. Neque me iudice, immerito, quod suæ procreationis initio nondum late ab humore à quo nuper genita est, dissiliat. Frigida quidem vi- detur atra bilis Galeno, quia terrestis, non tamen caloris expert, quemadmodum nec cinis, nec etiam ægerum. Jam Arabum de ea iudicium ac sententiam inquiramus.

Avicenna auctor est elephantiam partium soli- darum substantiam, qualitatibus vitæ nostræ è dia- metro repugnantibus & insensis, contineret immuta- re ac pervertere. Quod si verum est, frigidum & sic- cam statuere oportet elephantis causam (calore nam- que & humore vitæ nostra fovetur, contineturque) Quibus perspicuum est, frigidum & siccum è dia- metro oppositi. Elephantia, Avicenna est bilis atra per universum corpus profusio, qua membrorum temperamentum, forma & compositio labefacta-

tur: unde tandem continuaria solutio, & partium casus & sæda ulceratio sequatur. Ad hæc melancho- licum humorem nltum non prius elephantem potere tradit, quam refraict, & inveterata, diuturnaque obstrucliones non aliam ob causam elephantiam in- vertit, quam quod minime ventilatus calor natus præfocetur, unde & tetrigentæ & crassæ sanguis, eique gignendæ idoneus fit. Postremo in elephantis languinem non raro circum articulos conglari, & polium imbecillum his idcirco esse dicit, quod fa- cultas sit imbecilla, & eigua necessitas, frigido na- pote morbo fangente. Principem hunc icholæ au- biæ sequari teccentiores fere omnes, elephantis cau- sam frigidam & siccam esse prodiderunt, atram- bilem non prius tam infeste discentes, quam absum- pta omnino suavit, liquidaque ejus substantia, cal- or tandem profus dissipetur atque divanescat, ter- rea duntaxat eaque siccissima ejus parte cineti haud absimili supersit. Idque petinde esse atque quum succentis ligni, absumpro profus ligni humore, quo terrene ejus partes inter se junctæ coarctant, eva- nescit, & extinguitur, siccissimum amittat cinerem pro ligno relinquent, quem accenso ligno, si contigas, frigidum exstiteris. His igitur auctoribus frigidus & siccus humor elephantiam progignit.

Ego vero (si de re tam controversa meam di- cte sententiam licet) facile efficiam, ut hoc compo- sito dissidio inter veteres concordia vocat, vel si do- gma eligendum est, Græcorum potius sententia sub- ieribendum sit. Quoniam acerrima ac calidissima atra bilis, quæ corpus todere, & terram fermenta- re creditur, à frigido & sicco melancholico suc- co, tempore ac specie recedit atque dilidit: sæpe tamen veteres illam melancholici humoris appella- tione designant & insigniunt: siue quod illa mera & mollitia, aliisque melancholicis perturbatori- bus animam mentemque percellat & eaagret, pe- riunde atque melancholicus succo frigidior, siue quod suæ procreationis initio, dum nondum vehemente incaluit, accensaque est, haud multum à seculento sanguine disceper, ut nec quum siccescens de suo calore non partum deperdidit. His ergo ea causis, veteres maximeque Galen. elephantiam quæ teipsa nunquam aliunde quam ab arabilioris humoris undecumque genitus sit, proficiscitur, sæpe à melan- cholico succo atque humore nasci tradunt, & Avicen- nas frigidum morbum esse prodidit.

Quoniam autem elephantis omnis origo, ab atra bile ducitur, ea tamen pro afflictionem corporum natura, & humoris è quo orta est, affectione, non parum & invadendi, serpendique modo, & sym- ptomatia variat. Ut enim quæ elephantem prehendu- tur corpora, minime ante hanc, melancholica, ut ita loquar, erant omnia, sed alia sanguinea, alia biliosa, alia melancholica, alia pituita falsa persua- sa, alia ea his mista: sic certe neque atra bilis illa ex uno eodemque humore perpetuo nascitur, sed interdum à succo melancholico, frigido & sicco, interdum à bile flava in vitellinam versa, interdum à nigrosa pituita originem habet. Quæ igitur ex fri- gido & sicco, eoque melancholico succo exusto pro- creatur atra bilis, quoniam ejus humoris, à quo non ita pridem usione genita est, naturam con- ditionemque etiamnum redolet, diutius occultatur, nec nisi sensim lentemque tandem in externas partes erumpit: quo quum ventum est, elephantem lo- vioribus symptomatis conspicuum profert: quem nonnulli frigidam causam habere idcirco dicere, quod manifesta caloris symptoma nulla statim corpori intenet nec incutiat. Quæ vero ab adusta flava bile fit, cause suæ naturam redolet, mul- to tenuioribus partibus quam sit, brevi consumi-

nilectibus, in extremitate corporis oculis exarscit, levissimisque incendii symptomata, nisi occurrat, indicit, quæ sui causam calidam esse manifeste demonstrant. Medio quodammodo se habet, quæ à saluta pilita proficiscitur. Quæ vero à sanguine fervidioris exultu proxime ad eam, quæ à prævalida sit flava bile accedere deprehenditur: ut quæ à feculentis & crassioribus, ad eam quæ à melancholico humore fixi distinxit. Quod autem proponit nonnulli, quum jam conique serpendo processit elephantia, ut exhausta humida atque bilis substantia, cui calor insidebat, soli ejus cineres frigidiores superint, arduis, incendique omnia symptomata tum resisteret, morbumque frigidam causam habere, plane falsum est. Licet enim ubi ligni cineres minime tum tacent calorem, quem vel ejus flamma, vel carbonem exhibebant: sunt tamen in egris rebis, à quibus emanant multo calidiores. Quod vini fæces demonstrant, quæ ubi longe calidiores, aerotereque evadunt. Tantumque abest, ut vel atra bilis, aut nonnullarum aliarum rerum cineres frigidi iudicari possint, ut etiam frigidiorum quorundam cineres, non parvam usione acrimoniæ, caloremque conquistant, & assequantur, sicut experientia non docuit, quæ compertum est frigidissimi ac humidissimi argenti vivi cineres, carboneticos, acres, utentesque esse. Ad hæc si frigida & sicca est elephantia causa, cur cedo non solum elephantiorum tubercula exardant, & in profunda ulcera serpendo degenerent, sed etiam parium ipsarum extrema, vel humoris acrimoniæ absumpta perant, vel corrupta, & putredine carieque confecta excludant? Nisi enim frigida & sicca humor melancholicus, vel frigida & humida pilita, illorum possint esse operum cauta: nisi immorata specie in alterius humoris naturam commiserint. Quod igitur distinxit nonnulli, atram bilem per initia elephantia calidam, absumpta tandem liquida & fluente ejus parte, frigidam evadere, minime pertinacis speciei, absumpta plane ceteri potest. Habent enim singuli humores propriam & peculiare temperantiam, quod suppletur summa nunquam de ereat. Calida enim semper bilis flava, calida & ærea, ut pilita semper frigida, frigidaque semper melancholicus humor. Hæc tamen bilis alia calidior, frigidiorque interdum hæc, quam illa pilita censetur. Nisi forte putrescens, per febres pilita, quoniam incalcescit manente forma, istius axiomatis veritatem convellat, atque labefactet. Sed hæc impermittam, veterum nonnulli vix unquam putredine sic incalcescere censuerunt, ut febrem accerteret, fibres omnes biliosas arbitrari quorum opinionem subscripsit Fernelius. Nec si putrescens incalcescat, amplius pilitæ nomine insignitur, sed ejus hæc moria, in quem putrescens degenerat.

Elephantia itaque omnis calidam causam habet, quæ tamen caloræ, siccitatisque ratione, pro corporis affectu, & in morbo, è quo profecta est, natura, proque morbi tempore, non parum varia est. Quod & veterum auctoritate doceri potest, qui non alia ratione existimando censuerunt elephantiasis, quam quod testis vim maximam caloris, fervoremque in universum corpus effundant, qui elephantia causam exasperet.

Pomæ enim è succo malorum dulcium maturitatem assequutionem, facis defecatum, satique maturum, tenue, sublavum, & limpidissimum, quale in Neustria copiosum ferunt agri Constantini, elephantia & melancholicis à arrabulario humore adeo salubre est, ut omne poionis genus bonitate vincat. Quod me longo usu, ratione duce competisse proficor, & complures melancholicos hypochondriacos, quibus jecur & mesenterium morbo causam dederant,

ejus ope restituisse. Nam & tetro melancholico potes, multo quam syrupus è lucco pomorum est: caciis discutiit, & cordi laticitiam adfert, & vitium atque humorum siccitatem, ferinamque qualitatem omnem detrahet ac contemperat, & alimentum copiosum corpori præstat, & assuetis gratissimum existit. At pyracum omne & pomaceum, è malis acidulis expressum, vel vetustate coalescens, noxum existit, perinde atque omnia cruda & acida vina vulgo vitia appellat. Repudiandum & pomaceum, quod è malis dulcibus expressum dulce quidem existit, sed nondum satis concoctum: multoque magis quod fecibus profus non depositis turbidum & crassum præstet, nec incalcescit donec acescat, qualia fere sunt in pingui Algiz solo nata. Copiosius quidem alimentum corpori suppeditant & agricollis ac fossoribus experantur, sed quia obstructions pariunt, crassique succi copiam aggerunt tum sanis tum aegris noxia putanda sunt. Cunctis igitur Medicis, ut elephantia & hypochondriaci, quibus jecur & mesenterium (quod æte sit) vitia causam præbent, tenue, sublavum, pellucidum, beneque maturum pomaceum, pro generosissimo remedio veteribus quidem incorrigito, sed nunquam satis laudando, in vicem vini usurpent, quod tamen calidè & sicce naturæ, præsertim vero æstate, aquam quadrante diluent.

Aliud gratum & innoxium potulentis generis, temperatis, aut non ita calidis naturis ex usu.

℞. Aquæ purissimæ lb. vi. scobis sancti clerici ʒj. sacchari alb. ʒv. ferventis horam dimidiam vase argenteo, aut in olla nova. Colo postea trajicito.

Aliud fervente magis humore commedius.

Habet aquæ purissimæ lb. vi. sacchari alb. ʒv. scobis sancti clerici ʒj. hordei integri p. j. succi mali medici acidolati ʒij. Conserve autem aliquantisper, deinde percolato, & utior. Vulgus priusquam vulgarum, vel hordei decoctum semine feniculi conditum, usurpet, vel certe (modo venerit & præcordiorum satio coletet) purissimam & limpidissimam aquam.

Potes nonnullis divinus appellatus, calidis omnibus naturis, in calidis morbis omnibus utilis, si vates ventericulus.

℞. Aquæ optime lb. vi. sacchar. ʒv. succi limonum ʒj. is. (plus minus pro ventriculi & caloris nativi robore, aut imbecillitate & agrotantis palato) scobis sancti clerici ʒj. Bulliant botam dimidiam tum adjicito cinnamomi ʒss. colato & utior.

Alii sacchari plus mense inferunt. sumpta indicatione aut agrotantis natura, ætate, consuetudine anni tempore, & partium nutritioni disparatum constitutione.

Alius in elephante bilioso, fervente etiamnum circum viscera humore, commedius, sed in juvenior.

℞. Radicum cichorii agrestis, utrumque passariis purgatarum, glycyrrhizæ singulorum ʒij. hordei integri p. j. scobis eburnæ & corn. cervini, sem. faniculi ʒss. santali

lantal, citrini, singul. ʒss. conservant horum dimidi-
am in lb viii. aquæ, dein decoctum transeoletur.
In magno ardore plantago & lactuca recte interuen-
turi.

*Quum partium putredo invalescit, fervente
etiānum humore, profectū majore asur-
patur, quod hic habet poculentum.*

℞. Radicum cichorii agrestis, uvatum passatum
purgatum, glycyrrhizæ, singulorum ʒij. bordei inte-
gri p.j. sanicula, bugula, pimpinellæ, calendul. ulma-
riæ, plantag. lapopi, singulorum p.j. Icobis eburnæ,
& cornu cervini, fantal. citrini, singulorum ʒj. sac-
chari ʒvi. succi mali citrei ʒij. Coquo in aquæ lbviii.
ad lbvj. decoctum, percolatum sponso, & utitur.
Quum calor nativus elanguescere incipit, frigida de-
trahatur.

Decillatum instillans magnatibus extra cupas in
vini vicem ex usu affecta ætate & viribus labescen-
tibus.

Vituli frustum & carnem capi in libris xvi. aquæ
purissimæ, elixato dum vt. duntaxat libæ superint:
adde sub finem veronicæ, utriusq: buglossi, borragin.
pimplo, faricula, calend. bugulæ utriusq: plantag. leri-
olæ, singulorum Mj. rad. amicis & tormentillæ, sem-
inis cardui, scobis eburnæ, & cornu cervini, singulo-
rum ʒij. in colato hæc, rursum adjectio conservæ bug-
lossi, borraginis, violarum, nymphæ, ana ʒiij. con-
servæ ocellorum cœu caryophyllorum polstrarium ʒij.
omnia in ollam vitream indito, ut in duplici organo
aqua proliscitur. quæ saccharo vel Symplo è limon-
bus. aut violaceo & cinnamomi momento condita,
usui apta sit.

Et h'is quidem, aliisque ejus generis potionibus,
quas ex tempore & pro re nata, prudens & ex-
tenuatus medicus instituire poterit, elephantiasis oc-
curreret. Jam purgationum formulæ delectib. ndæ.

℞. Polyposii quæmi, seminis cartami, radi-
cum cichorii & oxalidis, uvatum passatum purga-
tum, foliorum fennæ, singulorum ʒj. coquisio igne
remisso horæ quadrantem, dein adde buglossi bor-
rag. lupul. scolopendriæ. ceterach. adiant. fum-
ariæ, epithymi, singulorum p. j. conservat. bug-
lossi, borrag. & viol. an. ʒij. seminis feniculi, &
melonum an. ʒss. conservant rursum aliquantisper,
dein in decocto percolato tepido, macera horis
duobus thabarb. optimi ʒij ss. cinnamomi ʒss. in eo-
dem expresso dissolve syrups è fumaris ʒj. fiat potus
utane sumendus hora quinta.

Si hoc ægre movetur cathartico Elephanticus, Ca-
tholici descriptionis Fernelii ʒj. remiscetur.

Bolus si magis ardeat, esto hujusmodi.

℞. Atramenti cassiæ recens extracti ʒij. sem. fen-
niculi pulverisati gr. vi. Syrupi violati paulillum.

Pel. sic.

℞. Medullæ cassiæ recentis extractæ, Catho-
lici descriptionis Fernelii, utriusque ʒj. Syrupi vio-
lari ʒj. misce, pizabeto mane tribus horis ante ci-
bum.

Pel. sic.

℞. Cassiæ recentis purgatæ ʒss. thabarb. pulverisa-
ti ʒss. sem. melonum mundatorum & contritorum ʒss.
sem. feniculi, gr. xv. Syrupi violar. modicum, fiat bolus

si undique tenues etiam humores utraliter expel-
dit, conficiationis Hamech. ʒijss. inferentur, thab-
baro quidem detracto, si effensis purgatio metuitur,
sin minus eo etiam relicto.

*Apocema primas corporis sedes expurgans,
venarum infarctus melius expedit.*

℞. Rad. petroselin. feniculi, & apii, in aceto hor-
is vt. maceratarum, singulorum ʒjss. rad. cichorii ʒij.
rad. oxylapathi, oxalidis, asparag. & graminis, singulo-
rum ʒss. foliorum fennæ ʒij. rad. hellebori nostratis
preparatæ ʒij. Coquisio in aqua ad doses tres, adde sub
finem pimpinellæ, buglossi, borrag. endiviz, scariol. lu-
pulozum, omnium capillarum, fumariz, singulorum
manipulum ʒss. florum cordi dicatorum, mentæ, epithy-
mi, hyssopi, singulorum p. j. seminis feniculi, corian-
di preparati & melonum, singulorum ʒjss. In cola-
to decocto dissolve, Syrupi è chichorio simplicis ʒiv.
Clarificetur & condidatur ʒjss. cinnamomi, & ʒj. fantal.
citrini.

*Alium parandarum apocematum modus, quo
nihil vitrium cutione deperis.*

Omnia modò descripta simplicia medicamenta, in
ollam argenteam aut terream induntur, cum eo
aque modo quem superasse volumus, (fecit tamen
apocema ad tres doses aquæ ʒvii. habet) olla dein
luto philosophico obnata, in calidum ferventis
aquæ collocetur, ut horas tres conservant omnia &
ubi olla à lebeti fumosa refrixerit, decoctum colo-
ro trahitur: & syrupus aut saccharum additur, ut in
tres aut quatuor dulces alternis diluculis sumendas di-
vidatur apocema.

D. tracto helleboto, strenue quidem melancholiam
destrahit, sed nec à cerebro, nec à vasis majoribus satis
efficaciter.

Syrupsu solemnū.

℞. Polypos. rad. oxylapathi, oxalidis, cichorii, bug-
lossi & borrag. uvatum passatum glycyrrhizæ, singulo-
rum ʒj. quinque capillarum, buglossi, borraginis, sca-
riolæ, endiviz, chamædryos, singulorum Mj. Coquisio
in aqua ad lbj. Decoctum colo trahendum in ollam in-
ditur, dein adiciuntur foliorum fennæ purgatorum ʒvi.
rad. hellebori nostratis preparati, seminis feniculi, an-
isi & melonum, singulorum ʒss. agarici albi, thabar-
bari selecti, contrul. singulorum ʒss. succorum endi-
viz, fumarizæ, malorum redolentium, buglossi, bor-
rag. aquæ rosarum, ʒij. florum cordi amiconum, folio-
rum mentæ, hyssopi, origani, mellissæ, singulorum p. j.
epithymi ʒss.

Olla luto philosophico obnata, in duplici organo
(balneum marie vocant) fervere sinatur horis quatuor.
Decoctum denique colatum cum duplo sacchari per-
purgatum, in syrupum coquitur, in vase duplici, olla
obnata: dosi ʒij. aut ʒijss. aut ʒijj. cum pari por-
tione decocti borraginis & glycyrrhizæ, bis, ter, quater
ve menset

Opiata.

℞. Uvatum passatum purgatum, uvatum co-
rinthiacarum, jubarbarum, singulorum ʒjss. polyposii
quæmi, glycyrrhizæ, utriusque ʒss. foliorum fennæ ʒiv.
radicum buglossi, borraginis, & lupulorum, singulorum
ʒj. coquisio in aqua buglossi, igne remissa, ad lbj. sin
dein adde utriusque buglossi, utriusque asplenii, adi-
anti utriusque, singulorum Mss. florum cordi amiconum

& nymphæ, singulorum p. j. sem. fœniculi, coriandri præparati, utriusque ʒij. in decocti libra colorata, dissolve sacchari optimi ʒij. Coquito in syrupum, cui adde conservatum buglossi, borraginis & viol. exquisitè contritum, singulorum ʒij. conservæ rosarum ʒiſs. conservæ ocellorum, qui & caryophylli ʒij. sem. 4. frigidiorum majorum mundarum, sem. fœniculi, coriandri præparati, singulorum pulverisatorum ʒiſs. santali, citrini, cinnamomi pul. utriusque ʒſ. acamentæ cassiæ ʒiv. fiat opiatæ mollis, ut ex cochleari vorari possit, cujus dosis erit ʒiſs. aut ʒij. mane duabus horis ante cibum. Acetum ac ferinam omnium humorum qualitatem frequenter usu domat ac demulcet, viscerum & humorum facilitatem temperat: quicquid ventericulum & intestina obstitit, strene detrahât, simulque primas venas & viscera ipsa, obstructione liberat, & vasaque partium impuritatem sensim ac blande in alvum deducit & expurgat.

Huc pertinet syrupus saporis purgatorius, à Mésue descriptus, & syrupus è cichorio compositus, cum ʒiv. rhabarb. pro libris singulis: hujus, aut illius, in tria cochlearia opiatæ superidentur, plenior, nec tamen molestior erit effectus. Dantur per se ab ʒij. ad ʒij. idque ex cochleari, eum aqua casidiacta. Catholicum à Fernelio descriptum inaccessentibus emendatissimum, & crascentibus humoribus commodissimum.

Ins pulli purgatorium.

ʒ. Decocti pulli gallinacel, & viennæ carnis ʒiiv. in quo macera per noctem foliorum linnæ mundarum ʒi. mane bulliant horam dimidiam, igne valde remissio: dein in percolato decocto, rursum se vite facies borraginis Mj. buglossi oxalidis, an. p. j. origini, hyssopi, thymi, singulorum paucillum; decoctum percolatum, & præto tribus horis ante epulas. Si radicis nostratis hell. borii præpa. aræ ʒj. inferretur, melancholicum humorem validius detrahit, nec nocuerit, modò ex longioribus intervallis repetatur. Simplex enim modò decriptio, semel aut bis quaque hebdomada tuto usurpatur, velut à opiatæ.

Præparantia melancholicum humorem, quibus inter purgationum vires utendum erit.

Accipe radicem apii, petroselinæ, & fœniculi, in acetum macerata: tribus horis vi. nvarum passiarum purgatar. glycyrrhizæ, radicem buglossi, borraginis, lupulorum & cicuii, polyopodii quæmi, vitici quæmi, corricis radicem cappatis, & tamasici, singulorum ʒiſs. coquito horam integram in olla nova, & in infusio buglossi, borraginis, endivæ, icariolæ, fumariæ hepaticæ, utriusque asplenii, adiantæ utriusque, singulorum Mj. conservæ florum violarum, borraginis, buglossi, nymphæ, epichymi, singulorum ʒiſs. quarum sem. frigidiorum majorum, sem. endivæ, lictuæ, fœ. iculi dulcis, singulorum ʒij. in decocti libra dissolve syrupi è succis descripti ʒiv. Syrupi Byzantini ʒij. parato apozema clarum & conditum ʒiſs. santali, citrini, & ʒj. cinnamomi. Præbero ʒiv. aræ singulos passus, idque in triduum ante singulas cathartes. Convenit quom pars humorum fervet & exurit, pars verò jam retortida, connumaces obstructions invenit, quas solvere retros vapores diluere, cordis aciem ab his rueri, & incendium internum restinguere, consilium est.

Aliud in elephantæ bilioso superiore, nisi obstructions multæ insint apulis, incipiente, augescente & vigente bilis retortida fervore. Eo enim represso, alia

præparatione opus est, quæ postea tradetur.

ʒ. Rad. cichorii sylvestris ʒij. radicem oxalidis, lupul. buglossi, borraginis, uvæum passiarum, polyopodii, singulorum ʒiſs. glycyrrhizæ ʒi. coquito igne remisso horam unam: dein adde utriusque asplenii, utriusque buglossi, utriusque adiantæ, lupul. fumariæ, endivæ, icariol. planaginis, singulorum Mj. conservæ, buglossi, borraginis, violarum, nymphæ, epichymi, singulorum ʒiſs. quæmor seminum frigidiorum majorum, seminis fœniculi & endivæ, coriandri præparati, scobis iboris, & cornu cervi singulorum ʒij. in libra decocti, percolari diluc syrupi de endivæ, descriptione Fernelii ʒiv. parato apozema conditum, santali citrini ʒj. & cinnamomi ʒiv.

Syrupus è succis, melancholicum humorem & bilem atram demulcens.

ʒ. Succorum depuratorum utriusque buglossi & posiorum redolentium, singulorum ʒiſs. succorum oxalidis, lupul. & endivæ, singulorum ʒij. sacchari albi ʒiſs. Perpurgato ovorum albuminibus agitatis, atque in syrupum coquito, cinnamomi & santali citrini, utriusque ʒj. f. conditum. In quem dein nodulum qui iithæ continetur, diu macerari sinet.

ʒ. Cioci ʒiſs. granorum tinctoriorum ʒj. ambaris cicutæ coloris gr. vj. ligni aloes ʒj. fiat nodulus.

Ulus tempore, miro profectu inferitur tenuissimus pulvis auri præparati, pondò ʒj. mane præteritum duabus horis ante epulas: vorandus autem ex cochleari, ne quid auri percat bis, terve in hebdomade.

Syrupus alius qui, dum tetros melancholici humoris vapores strenue discutit, cordi etiam jucunditatem atque hilaritatem, & incensis atque conflagentibus humoribus refrigerium præstat.

ʒ. Sacci oxalorum rotundorum, rubicundorum & ædulorum, bene maturorum ʒiſs. succorum buglossi & borraginis, utriusque ʒiv. in quibus macera noctem integram florum ocellorum, seu caryophyllorum nostratum ʒiſs. Mane expressis & adjectis hiscebus, alios rursum indito, quos exactis horis 24. expellimas & abiciis eandemque operam tertio aut quarto repetito: in expellim, tandem succis sacchari par pondus diluito, ligni deinde aloes & santali, citrini momento adjecto perpurgatum præsidium in Sympum coquito.

Si fœci fumarizæ ʒiv. inferatur, insuavius, sed adversus melancholicum humorem efficacius remedium fuerit.

Syrupus de endivæ à Fernelio descriptus, incum habet in elephantæ bilioso, quamdiu incendio conflagent viscera.

ʒ. Conservæ florum caryophyllorum nostratum ʒvj. conservæ florum utriusque buglossi ʒij. conservæ rosarum & nymphæ, utriusque ʒiſs. conservæ florum viol. ʒij. pulv. elect. diamarg. frigid. ʒj. scobis edeni cetvi, eboris, & coral. singulorum ʒſ. anxi præparati ʒiſs. ambar. gr. vi. syrupi è succis supra descripti q. f. Conficito opiatum, utrosq. mane, & sub horam somni, quum retros bilis atræ vapores diluere, & cordi levisiam conciliare est animus.

Si propria ac peculiaris ægri natura, aut humorum exuperantium qualitas, aut anni tempus, præsidium, quod magis refrigeret, postulare videbitur, conservæ florum cichorii rectè inferretur: sin contra, quod magis concoquat, ac status discutiat, conservæ heleniæ, mentæ, & florum rositmarini, singulorum semuncia.

D

ʒ. Radicis

℞. Radicis ficæ heleni, uvatum passarum, glycyrrhizæ singulorum ʒij. polypod. quercini, corticis radicum capparis & tamaricis, singulorum, ʒss. coquo igne remisso, in aqua purissima, ad ℥ij. addo sub finem coctionis ascleoil, utriusque sicci p. ij. & quoniam ab igne summoventur, bugloss. borraginis, succi p. i. conservæ viol. bugloss. borraginis, nymphæ, & epithymi, singulorum ʒss. In colato decocto, dissolvē syrupi de succis suprapositi ʒiv. Hoc apozemate ante pastus utendum fuerit ex intervallis, quom flatus & cruditates invalescent. Cruda misce concoquit, crassa enim attenuans, & letosa ac tenuia coctione incrassans, flatus dissolvit, viscera obstructionibus liberat & corroborat, terros melancholicos humoris vapores dissolvit & mitigat: ut semel dicam, morbis omnibus à cruditate & frigida causa, aut viscerum imbecillitate natis, supra opinione optulatur, & tamen nihil calore nimio exurit; sed præparatus humor melanagogo medicamento ex intervallis repetito detrahendus.

Si fortè à icteris siccitate & fervidioris bilis acervo motus est, ne repetito hujus apozematis usu insolescant, (quod tamen in senibus calore infuso jam effluo & frustrata concoctione minime pertimescendum esse competi) sylvestris cichorii radicis ʒij. commode inferentur, & opportune interjiciuntur purgatio. Huc pertinent Symplicis de Epithymo, Symplicis de asplenio, & Symplicis Byzantinus, & multo efficacior, qui sic habet.

℞. Rad. heleni sicci ʒiv. macera horis vi. in succis utriusque bugloss. dein adde omnium capill. epithymi, singulorum M. j. conservæ florum caryophyl. bugloss. borraginis, rosarum, singulorum ʒss. fervescito igne valde remisso horam dimidiam, adjecta aqua sufficienti, tum inposito absynthii sicci vulgaris p. j. & ab igne summovento: in expressione dissolvē sacchari albi ℥ij. Coquito in syrupum conditum, ʒi ss. cinnamomi, & ʒj. faustal. citrini.

Ufus est ante pastus ex cochleari ʒi ss. pro dosi, ad imminuentem ex utriusque vitæ obstructionem & imbecillitatem, hydropem, cruditatem, atque ad omnem luti caloris à frigida causa languentem. Cruda enim & crassi omnia concoquit & attenuat, Cruda & letosa coctione incrassat, flatus dissolvit, fuliginosæ atrox bilis vapores dissipat, viscerum obstructions expedit, ventriculi securis, coctis, & pulmonum robur tenuit, augeatque.

Remediorum cardiacorum & alexiteriorum forma.

℞. Conservæ caryophyl. seu ocellorum, bugloss. borraginis, violarum, nymphæ, rosarum & cichorii, singulorum ʒij. aut in tenuissimum pollinem redacti, vel aori foliati, ʒj. scobis eboris, & cornu cervini, corall. unedonum, scobis cornu unicornis, singulorum ʒj. ambar. optimi grana vi. Syrupi de succis q. f. fiat opiata, utenda mane ante epulas ʒj. aut ʒi ss. pondere.

℞. Conservæ florum bugloss. borraginis, caryophyl. nymphæ & cichorii ana ʒj. michaidat. rhatias, utriusque ʒj. scobis cornu cervini ʒj. Syrupi de nymphæ q. f. fiat opiata, & facili patet, præsertim si calor jam defervuit: nam æstuantem etiamque humore, quæ sic habet commodior erit.

℞. Conservæ florum cichorii ʒij. conservæ florum nymphæ, bugloss. borraginis, rosar. singulorum ʒj. rosar. cornu cervini ʒj. conservæ ocellorum ʒj.

seminum quatuor frigidorum majorum purgatorum, singulorum ʒij. Syrupi de succis descripti q. f. fiat opiata.

℞. Scobis cornu cervini & eboris, unedonum, ossis & corde cervi singulorum ʒi ss. corall ʒss. aut præparari aut bracteolarum ipsius ʒi ss. ambar. ʒss. conservæ caryophyl. & borraginis ana ʒss. sacchari tolant. sextuplum, fiat coaditum.

Aliud in re tenui.

℞. Scobis cornu cervini ʒj. scobis eboris, corall. margaritarum spleodidarum, singulorum ʒj. conservæ bugloss. borraginis, nymphæ, ocellorum & cichorii, singulorum ʒij. sacchari ros. q. f. fiat coaditum. Inclinate calore, incalcescentibus autem emittatibus, midtidatibus & rheumatis utriusque ʒj. inservetur usus est ex cochleari ante pastus, aique etiam sub horam somni.

Detrahit conservis ex utroque condito, pulvis fiat ex cochleari, ut coaditum, ante pastus votandum.

℞. Radicis tormentil. scobis cornu cervini & eboris, margaritarum corall. singulorum ʒj. scobis cornu unicornis, ʒss. pulv. elect. diamargarit. frigidi, & de gemmis utriusque ʒj. sacchari alb. diss. in aqua ros. ʒvi. fiat elect. per tabellam pond. ʒij. quatuor usus erit ante pastus.

Aquæ stillatiæ, quæ ad frmandam luis venereæ perniciem præscriptæ sunt, hi: etiam locum habere possunt: Aliteruribus autem ʒij. cum syrupi violacel ʒj. opiatur, aut condito, aut tabella superdabantur, quæ tamen sequitur peculiariter, elephantium virus domat, ac serpentem putredinem inhibet, deploratis præcipue ad protrahendam vitam frequenti usu commodissima.

℞. Utriusque veronice, bugloss. borraginis, betonicæ, plantaginis, fanticule, bugle, lagopi, ulmarie, calendule, symphiti minoris, florum hyperici, & sambuci, acuminum centaurei ninotis, pimpinelle, singulorum M. j. Contundito omnia, dein in ollam novam indito permittis, quæ sequuntur.

℞. Scobis cornu cervini ʒss. scobis eboris ʒij. radicis tormentil. micis, dictamni, singulorum ʒj. conservatum nymphæ, cichorii, ros. bugloss. borraginis, singulorum ʒiv. aquarum stillatarum eardul benedict. agrimonii, scabiose, succisæ, singulorum q. f. ut supereminant. Harum tamen loco præstantissima est aqua è sanguine humano, e plethoricis bene habentibus secta vena detracta, & à lecto secreto elicta.

Omnia olla conclusa ac luto philosophico obnata in balneo Mariæ triduum macerantur, dein in alembicum vitreum conficiuntur, ut aqua eliciatur, dosi ʒij. cum ʒj. Symp. violacel. Aqua è scobis humanis elicta multis profuisse creditur, cujus tamen nullum feci periculum. Sed pane hortaceo equæ hordentis vulgo appellatis cum vesci oportere tradunt, è cujus stercore eliciatur: saccharo, aut syrupo accommodato, & fual. momento conditi debet, & mane egris nascentibus propinari.

Fanis emolliens & rarefaciens.

℞. Radicum althææ & liliorum, sem. lini, rad. heleni recentis, singulorum ʒij. malve violariæ, parietariæ, scanthi, amagallidis, meliliosi, chamæmeli, singulorum M. j. hiant duo sacculi, ferveant in aquis patibilibus aq. & vini albæ, ad totum parit.

Vnguentum emolliens, rarefaciens ac detergens cutem.

℞. Violariz mucaginis, sem. lini, & radicem altheæ extractæ in decocto melliori & chamæmeli ℥iv. buriyi salis expertis, ol. è sigillo Mariæ, & bryonia quod postea tradetur, singulorum ℥ijj. ol. è myrrha elicti ℥ss. concinnetur linimentum, quo mox à foru pars illinatur.

Forus emolliens, rarefaciens, & discutiens oculis ex asæ crassigentibus membranis.

℞. Fomiculi viridis, chelidoniz, euphrasiz, chamæmeli, melliori, malvæ, violariz singulorum M. j. sem. fomiculi & lini, rad. altheæ singulorum ℥ss. absynthii siccij p. j. Confice facculos, quos in aqua & vino albo fervefacies ad forus oculorum.

A foru aqua instilletur hujusmodi.

℞. Chelidoniz, euphrasiz, fomiculi, symphiti minoris, fomiculæ, singulorum M. vi. sem. fomiculi cum aqua euphrasiz macerati ℥ss. Contusa omeia cum mellis libta, fumo equino in olla nova obruantur dies vi. dein aqua atre chemica eliciatur.

℞. Turiz preparatz ℥ss. aluminis usti, vitrioli usti, utriusque grana xv. sacchari candi. ℥ss. lapidis calaminaris sexties usti & extincti aceto, & postremo in aqua fomiculi ℥j. conficito pulverem tenuissim. tergeodis & abluendis oculorum albuginibus, & attenuatis crassigentibus membranis commodissimum.

℞. Succorum chelidoniz, euphrasiz, & fomiculi, singulorum ℥ij. Sacchari candefacti ℥xv. vitrioli usti grana vi. Coquantur in syrupum oculis instillandum ex intervallis.

℞. Unguenti de turia ℥ss. cui ad le vitrioli usti, aluminis usti, utriusque grana ij. saponis alb. ℥j. conficito linimentum.

℞. Calcis vivæ ℥ss. fecis vini siccz & calcinatz ℥iv. diluio in lixivio clato cineris filicis & corticis fraxini, dein sepius transcolato, ac tandem per fcltrum lixivium elicto limpidum, denique vase cæco ad mellaginem coquito. Elephantica omnia tubercula extirp.

Aliud dolore molestin.

℞. Sublimati ℥j. pul. mercurii ℥ss. unguenti rosæ, descriptiois Meines paulum, ut fiat linimentum.

Dissolva tubercula in crustam indurata, qua decidua adæquate parti cicatrix inducitur.

Alius emplastri forma.

℞. Vitrioli calcinati, auripigmenti usti, utriusque ℥ij. emplastri de cerussa ℥ss. malaxentur simul cum unguento rosæ Mesue, fiat emplastrum, cujus portiancula, dissilcis elephantiscorum tubertibus, præmunita, refrigerant, & emplastico præsidio vicina, ne medicamenti acrimoniâ & fervorem sentiat, imponetur.

Emplastrum quod maculas Elephanticarum entem detartantes extirpat.

℞. Cantharidum pul. ℥ss. saponis nigri q. s. ut unguenti fiat consistentia cum aceto modico, imposito ac finito dum velica extuberet, superdato tamen

Bibl. Chirurg. Tom. II.

emplastico remedio, quod vesicatorium continet.

Simplicia ad balneum Elephanticarum.

℞. Malvæ, violariz, parietariæ, scanthi, singulorum M. xv. fumitetz, morfus gall. utriusque M. xv. radicem altheæ, sem. lini, utriusque ℥ss.

Vnguenta Elephanticis à balneo illinienda.

Succi fumitetz ℥ss. aqua. ros. ℥xv. rad. serpentariæ majoris ℥ij. Coquito dum radix contrahuerit, & succa pene assumptis sit: tunc, dein adde axungie porci buriyi recentis, axungie capreoli, singulorum ℥xv. hydrargyri preparati ℥ij. s. Caput ℥ij. fngito linimentum.

Pel fcl:

℞. Buriyi recentis salis expertis, axungie porci purgatæ, utriusque ℥xv. clauto sepius in succo fumitetz, vel si hyems est, in aqua rosarum, dein addito, ac diligenter permisceto argenti vivi petpurati ℥ij. s.

Carapota ex hydrargyro qua retortida bilis, & omnium atrium ac malignorum humorum ferociam domant & compescunt, easque sensim expurgant, nullo ventriculi incommodo.

℞. Argenti vivi cum panis adhuc calentis mica, manibus ut plumbagine deponat ac expurgeret, die sabadi ℥ss. longa agitatione exactè misceto cum succi limonum momento, & olei è myrrha de prompti, semuncia adjecta terebinthinæ Venetz, aqua ros. cloræ ℥ss. his postea adde auri purissimi preparati in tenuissimum pollinem, vel si id desit soliorum auri ℥ss. ambaris ℥j. pulv. elect. Diamarg. frigidi & triafantaloni simpl. utriusque ℥ij. aloes ℥ss. fngito massam cum sequenti magmate.

℞. Foliorum sennæ integrorum lb. j. rhubarb. in frustula dissilci ℥iv. rad. asafetz & tuzæ, hellebordi nigri nostratis ℥j. diem unum macerato in genollagmate, quod dein expelimito & vitreo vase exceptum adjecta sacchari parti portione in diplomate exhalare finito, dum magna mellaginem referat. Remedii hujus dosis fuerit ℥ss. aut ℥ij. quindecim alternis diluculis, tribus horis ante cibum carapotorum specie.

Calidis naturis commodius erit, quod sic habet.

℞. Hydrargyri à plumbagine repurgati ℥j. exactè misceto atque extinguito in aquis partibus syrupi de limonibus & de succo salivæ, adjecta terebinthinæ in aqua ros. cloræ ℥ss. dein adde elect. Diamargaricon frigidi & triafantaloni utriusque ℥ij. pul. elect. tragacanthi frigidi ℥ss. myrrhæ, croci, gentianæ, ana ℥j. rhubarb. pul. ℥ij. Aloës loræ in aqua endivizæ ℥ss. auri preparati ℥j. fngito massam, addendo ambaris moschi optimi, utriusque grana vi. syrupi de Ruchad. q. c.

In re tenui aurum detrahatur.

Omnium temeriosorum Elephanticarum vires superat catharticum nostrum metallicum, acrem omnem ac feruam humorum omnium qualiterat ac malignitatem micè obtundens, ac nihilominus blandè adco alvum solvens, ut pueris & prægnantibus tuto dari possit. Constat ex hydrargyro & auro

D 2 fig.

sic pernitiis atque immutatis longa maceratione, ut vim catharticam assurgant. Una autem & eadem opera & pituitam, ac crassos omnes humores expurgat, & ciliam ac siccam viscera constitutionem emendat, datur granatum sex pondere. Hoc temedum Cadomus præparat Petrus Philippus, olim nobilis Typographus. *Julius Palmarius de Morbis curatijs lib. 4.*

*Curaciones, Consultaciones, Observaciones
& Anatomicas inspecciones
ex varijs.*

Curaciones.

Elephantiasis seu elephantica lues, est tantum involuta corporis aliqua cutemque imprimis, carque ceteris duntaxat in locis possidet, tamen ægetimo, licet primum illa incipiat, præcaveat, multo minus si confirmata sit, curari poterit, præsertimque si hæreticaria sit. Necdum qui eam curavit, hæcenus inventi fuerunt, quamvis ii qui psoam, falsò, ab imperitis pro elephantia habitam, curant, se elephantiasim sanasse, gloriuntur. Quæ licet ita sint, tamen non negligenda hæc lues, statimque ab initio huic, omnibus artibus occurrendum, & si penitus impediti nequeat, saltem ut protrahatur quàm diutissime fieri poterit, cura adhibenda. Atque ubi vitia erupunt, hisce delendis incumbendum, ne ægris si invalescant, tandem exitium pariant, cum nisi id fieret deum sapere possent supervivere. Dein & cum deformitatem summam hæc vitia creent, ut minus suspecti, diutius in hominum conspectu versari queant, cura interdum palliativa illis quoque adhibetur. Quam magnates à Medicis sæpè magnis promissis efflagitant.

Curatio elephantiasis duplici modo instituitur: Primum generatim toti huic morbo accommodata, postea particulariter vitis tantum illius indetatis.

Generalis Curationis scopus in eo consistit, si fieri possit, ut causam huius luis, venenum scilicet illud evacuantes educamus & qualitatem venenatam inde natam emendemus: Verum cum quæ peculiari quadam vi id efficiant, vel ceteris evacuationibus, ut in lue venetæ, in hac non sint hæcenus inventa, eoque modo in curatione illius procedere nequeamus: Curationis methodus plerumque vitis huius prævis, quæ nascuntur diutius, accommodatur. Et proin cura non adeò absumit huic, quæ in psoa perversa, aliisque prævis maculis, pustulis ulceribusque malignis usurpatis solet, in elephantia quoque instituitur, sequentibus modis.

Purgationes prout corpus humoribus superfluis, vel excrementis seateat cognoscimus, instituantur, cum eas causæ venenatæ accommodare nequeamus, quam tamen ad melancholicum humorem educendum plerique dirigunt, præcipueque ea quæ illius excrementum molliunt, seligant, permiscendo, illius humoris acrimoniam sua humiditate & frigiditate conterperantia, quæ cum & aliis scribis salis & biliosis pertinacibusque humoribus expurgandis competant, uti in ceteris vitis externis inde genitis, in scabie perversa & in lue venetæ, sic & in hac lue, in qua & hæc plerumque congerantur, locum habebunt. Quibus corpora hæc præcautionis loco & ne augeatur malum, veris & Autumni tempore uni vice vel pluries purgamus: Interdum & intermediis temporibus, si impuritas cordis illud requirat.

Perficitur autem hoc ritè: Primum levissimis communis excrementa elendo: Urinjectione Clysmatibus stimulantibus, qualia passim describuntur, eaque quæ in melancholicæ vitæ cura descripta sunt, hic quoque possunt competere.

Vel datur eo nomine Cassia, Catholica, Tryphera perlica, vel Saracenica, Diaphana dissoluta cum aquis convenientibus, vel decocto cicorum, aliove, vel cum Sero Capino.

Vel ℞. Rhubarbari infusi in aqua Endiviæ, vel serpyllatis ℞. vel ℞iv. Syrupi tolarum solut. ut ℞iij. Cassiæ vel Catholici, vel Tryphere perlicæ ℞iij. aquarum Buglossi, fumarie q. l. fiat portio.

Hocque loco vomitus aliquando, cum, ut minus excrementa coacerventur, juvet, in consuetis provocandus, cum levioribus sumptis, tom etiam fonticulis, Helicbori præsertim usui conciliatur.

Preparatio ante purgationem humorum præmittitur, cum syrupis, ut violarum vel fumarie simplicis Buglossi, Endiviæ, Vel etiam fumarie compositio, Nymphææ, de Cucurbita, dissolutis cum aquis fumarie, Lupulorum, Buglossi, Endiviæ, Cichorii, Acetosi, &c. Aromatis. pulvere Trionfanti, vel Santalis.

Vel hoc decocto: ℞. Buglossi octulsi cum radicibus M. ij. rad. Graminis, Asparagi, Liquiritiæ ana ℞ij. cort. Capparium, Tamaricis ana ℞i. Herb. Endiviæ, Cichorii, Lactucæ, Capill. ana M. j. florum cordial. Cicorum rubr. ana P. j. quas: not. semina, feigeld Major ℞vi. Sem. anisi ℞i. Passul. mund. ℞i. fiat decocto & in hisse. dissolve de syrupis prædictis, q. l. vel adde saccharum, aromatis. Trionfanton: Pro s. vel 6. vicibus.

Vel utatur Julepo preparante in Melancholia cura exposito:

Qui ℞. Syrup. viol. borrag. &c.

Aut eo qui ℞. Succorum B. glossi utriusque de Pomis redolentibus.

Vel decocto quod ℞. Rad. Buglossi utriusque.

Purgamus post præparationem prægressam sequentibus:

℞. Rhubarb. infus. in aqua Endiviæ ℞j. Agarici trochisc. infus. in syr. ros. sol. ℞ij. Cortic. Hamech. vel Diaphæ sol. ℞ij. Syrupi viol. ℞iij. dissolv. cum aqua fumarie, Lupulorum, &c.

Vel datur, Bolus: ℞. Catholici ℞. Conf. Hamech ℞ij. de succo Ros. ℞. cum saccharo, fiat Bolus.

Aut hæc portio: ℞. Herbarum cum radicibus Buglossi alterutris, vel Cichorii ana Endiviæ, foliorum fumarie, summitat. Lupuli ana M. seminum Endiviæ, Portulacæ, Melonum, Citri ana ℞. Anisi ℞j. Florum Cordial. P. j. passul. mund. ℞. Prunorum num. v. pulp. Tamand. ℞. Radic. liquet. Polypos. ana ℞j. Foliorum Sennæ mund. ℞vi. Epithymi ℞ij. adde sacchari, q. l. fiat portio. Possunt infundi Myrobalani vel Rhab. vel electuaria in ea dissolvi.

Horum loco dari possunt purgantia in Melancholia cura descripta;

Ur portio quæ ℞. Catholici ℞j. &c.

Vel quæ ℞. Sennæ, Polyposidi, &c.

Vel Siliis ibidem propusit.

Preparamus & purgamus interdum simul hoc Apozemate:

℞. Radic. Graminis, Asparagi, Ruscii, cortic. Capparium, Fraxini, Tamaricis ana ℞ij. Temperentur in vino acidulo, vel addito pauco Aceto, radic. liquitidij ℞ij. Rad. Enulæ ℞j. Herbarum cum radicibus Buglossi, utriusque Cichorii, Acetosi, Lapathii ana M. Herbarum fumarie, Lupuli, Mercutialis, Scabiosi, Capillarium ana M. ij. Herb. Endiviæ, Dentis Leonis seu rostri porcini, lactucæ, Hepaticæ, Lenticulæ

Leontice aquat. ana M. j. Betonica, Thym. iunior. Rosmar. Chamæpit. Chamæcit. ana M. ss. Hocum Cordulinn. Geniæ, Tamaricis, Nenuphar. ana P. j. Semin. quatuor frigid. Majorum ʒj. quatuor seminum frigid. Minorum ʒss. Sem. Acetose ʒij. Semanisi ʒiij. Sem. foeniculi ʒij. Cicerum rubr. p. j. Passilaurum emulset. ʒij. Is. Prunorum n. a. Jujub. Scabiten. ana par. v. Tamarind. ʒj. Polygodii quatuor. ʒiv. Sennę ʒiij. Seminis Carthami conquis. ʒiij. Epithymi ʒvi. Coquantur omnia in aqua cum radicibus, eorumque infusione ut dictum, addendo sacchari q. s. aromatiz. Santalo cinereo, cinamom. vel pulvere Trionfantalon, vel Diamarg. frigid. Pro 5. vel 6. vicibus.

Per vices purgationes insistantur, aliis continuando per aliquot dies, alteris temis, quatuordecim semel, vel bis usitando, prout corpus sacramentis recondere videbitur.

Syrupi, in hanc rem parantur, qui ad usum diutius conservari possunt: Componiturque ea apozemate predicto purgante & preparante convenienter talia. Recipiendos radices, herbas, flores, fructus, semina uti illic demonstratum, & itaque addendo Tamarind. ʒij. Polygodii ʒvi. Foliorum Sennę quatuor. j. Is. Seminis Carthami conquis. ʒiij. Epithymi ʒj. Hellebori nigri ʒss. factaque decoctione in ʒ. q. colatur, infundendo Myrobala, citrin. induratum conficit. oleo ar. ydol. dulc. ana ʒiij. Rhabarbari ʒb. Spicę ʒb. (insanoni ʒj. Agurici trochiscati ʒv. factaque expressione, miscendo syrapi rosatum solativi ʒiv. Sacchari libi. & decoquendo ad consistentiam syrapi: Cujus decem quantitas per se, vel cum junc. Cicerum, aut sero lactis, vel decocto Mercurialis exhibeatur, vel cum aquis convenientibus.

Ea siccis sic fiet: ʒ. Rad. Polypod. liquoris ana ʒiij. foliorum Sennę ʒiv. Seminis Carthami conquis. ʒiij. Epithymi ʒvi. Tamarind. ʒj. passil. ʒj. Semin. Anisi ʒij. fiat decoctio in sero Caprino & lu colatur ʒij. & de succorum fumarie, Lupulorum, Buglossi alacris, scabitolæ, Lapathii ana ʒiij. Iterum decoquantur & desuperentur, addendo Sacchari libi. coquantur ad consistentiam, aromatiz. Santalis & cinamomo ad usum, si locus Mercurialis addatur, erit efficacior.

Hellebori dilutum seu decoctum, ut ipsius acrimonia minuat, aliqui sic parant. Fit decoctum in aqua ea endivia, cichodo, Buglossi, utroque, atque in libi. colaturæ infunditur Hellebori nigri radice, incisorum ʒss. & post macerationem aliquam decoquitur ad consump. duarum partium, Et de tertia dantur ʒiv. cum syrapi viol. ʒb. continuando per aliquot vices.

Epithymi pulverem ad ʒij. cum sero Caprino per mensis spatium & ultra propinant. Operantur melius si pulveris & Epithymi, & Sennę ana ʒj. Tamar. ʒb. Sacchari Candidi ʒj. cum sero detur, aliquandoque continuatur, quibus & alia ut Turbith addi possunt, & que grata sunt, pauca aromata. Que rectius quim pulvis Dialenæ, quem aliis commendant, propinantur.

Electuarium gratum laxans: ʒ. Pulpæ Cassiæ fistularis ʒss. Pulpæ Tamarindorum ʒib. Pulpæ passil. majorum & Prunorum dulc. rob. de Pomia redolentibus ana ʒj. Syrupi violac. & Ros. solutivi ana ʒiij. Diagrydi ʒj. Subtilissime triticum Sacchari Candi ʒb. Turbith. ʒij. Pulv. rad. Liquirit. & Cinamomi ana ʒss. Misce in formam electuarii: Capiat ʒj. capietundi primum gratia, postea plus minue prout operatio successebit.

Medicamentorum saporem magis habebit, si omisso Diagrydo, & Turpato, hinc pulpis Catholicon, Bibl. Chirurg. Tom. II.

Tryptetaio, tyropan rosatum solut. cum infus. Rhabarbari addis; item pulv. Rhabarbari, Sennę. Vel fortiora solutiva el. el. ut de succo rosatum, Hamaceli, Dialenæ, de Citro similique.

Conveniente de lu colaturæ usus ejusmodi per vices usurpatur purgationes, in melius hodie cura expone ut apozema vel syrapi ea siccis parata; vel vinum aut electuarium: Pulvis item.

Uti & alia aliqua, que in cura scabiæ perveris fuerunt, declarata ut seram lactis cum pettinione alborum; syrapi item usualia decemque purgantis: Ea siccis paratus tyropan. dein & vina purgantia: In primitque infusum vel decoctum Hellebori potioneque alie, electuaria & pilule, quorum illic memimus.

Malta quoque in lue venerea exposita purgantia, maxime que in actum humorum conduntia illuc competere diutius hic quoque usurpari poterunt.

Finita purgatione visceribus robur addens, exhibitione conservaram rosatum, Buglossi utriusque Cichorii, Violarum, Capill. Nenuph. vel rabul. Diagrydon, Trionfantalon Diamargeronis; vel Theriacæ, cum consuetâ Buglossi similibus.

Sanguinis detractio per venam sectam, Veris & Antumai temporibus, cum generalis purgatione fiat, ante horum ulum institui solet, ad generalitatem totius corporis evacuationem faciendam, cum aliquando per eam semina hujus luis, quibus sanguis infusus, uti ostendimus infusus non est, tolli nequeant, atque eo nomine minime institui debeat: Fitque hæc in brachio atque in plethoricis mox quoque sequentibus diebus in manu vel pede: Vulgo si sepius phlogomâ atatur, hac malum precavari posse creditur: Cum tamen per eam corpore cabaulo, lues citius & amplius invaleat. Temere quoque ut vulgate opinioni fatiatur; sanguis, ut ex eo lues hæc cognoscatur, dum examini substantur, emittitur & censetur.

Scarificationem singulis mensibus repetitam, in scapulâ, tibis, adhibitis insuper cu. urticulis, convenienter admodum credunt; vel etiam sanguifugis illis adhibitis.

Menses movere, si tardi vel omnino suppressi sine; valde utile, venâ Malleoli sectâ, aliisve illud præstare.

Hæmorrhoides provocare in primis quoque conveniens, applicitis in podice sangolungis, aliisve admotis.

Unio per Cavertia actualia & potentia, si forte externum hoc remedium aliquid efficere possit, alie quando teneatur, non solum in brachiis aut tibis, ut magis consuetum, sed & in capitis superficiei quandoque facta.

Castratio in vitiis seu à veteribus in desperatis interdum instituebatur; idque forte quod per eam totius corporis temperamento immutato, la siis sic effeminatis redditus, atque aliam planè constitutionem adeptus, morbum hunc facilius cessaturus, crederent. Quo remedii genere eo minori cum difficultate sunt usi, quod elephantis alioquin ne alios inficiant, congressus interdictus sit, & illis subtilia virilitas nullum afferat in ea functione ipsi non necessaria incommodum, utque etiam eo nomine à coitu absterentur, quam ut sic curantur.

Alteramus ipsorum corpora, ut si fieri possit in meliorem statum ducantur: Verum cum Intemperies; non manifesta, ratione hujus luis se patefaciat, non quæ certa qualitate contraria illi resistent, possunt illi opponi: Sed usurpantur plerumque quæ actum humorum proveniunt impediunt, eosque

contemperant. Dein & cùm observatur in ejusmodi corporibus siccitas, ariditasque & consumptio quedam; quæ humectando rescindendoque corpora ejusmodi, restantent rescianturque, pietumque ipsi præscribuntur. Inter quæ multa ex illis quæ in hæctica competere diximus, hic quoque possunt convenire: uti & sequentia.

In Aëre puro, non valdè fervescente, sed temperatiorē versentur, sinque procul ab illis qui hac lue infecti sunt, semoti.

Cibus euchymus ex carne juniorum animalium, jussulis, ovīs, lacticiis, oleibz, succisbulque humectantibus & temperatis: Ut in hæcticis & consumptis convenit.

Ranarum uti & Astarum fluvialium & Testudinum aquaticarum & nemoralium carnes comestunt, uti in hæcticis sic, & hic probantur.

Potus sit aqua vel vinum non nimium potens vel dilutum: Interdum & lac caprinum bibant, aliæque decocta in hæctica exposita.

Medicamenta variâ quæ refrigerant & humectant seu temperata sunt, atque acres humores contemperant, hisc inde in aliis vitis externis descriptis, hic quoque possunt competere. Uti & illa quæ in febre hæctica describuntur: Julepi, Syrupi, Aquæ, Confectiones, Condituræ.

Inter reliqua hoc electuarium maxime illis conveniet:

Quod ʒ. Conf. florum Buglossi utriusque ʒiis, florum Cichorii, Violarum, Nymphaeæ & Rosarum ana ʒj. Capill. Venet. Rosmar. ana ʒss. Rad. Buglossi ʒj. condit. ʒj. specierum Triensanton vel Diatrachodon, Diamarz. frigid. ana ʒiis. trochiscorum de Camphora ʒj. cum syrupo de Pomis redolentibus, misce.

Superbibat aquas Fumariz, Lupul. Buglossi utriusque, Endiviz, &c.

Alia multa quæ hepati conveniunt & lioni quorum visio sanguinem immundum genitum loi huic occasionem præbere putant, propinant, & foris simul hinc visceribus applicant, passim in morbis ipsorum ab intemperie calida & obstructione progressis descripta. Quæ tamen nisi hæc viscera manifestè sic affecta cognoscamus, inuoliter plerumque usurpantur.

Anidota quedam quæ peculiari vi elephantiasis contraria esse creduntur, præ cæteris commendantur, suntque sequentia.

Viperarum carnem quocunque modo assumptam, in primis elephantiasis resistere, plerique statuunt. Alii etiam aliorum Serpentum cujuscunque generis, etiam cæcorum usu, eorum cum vitis illi adnatis abscedere posse, ex eo colligunt, quod cum ejusmodi serpentes exavium quotannis exuant, hoc ab infusa illorum carni vi procedere, & proin etiam in homine idem operari posse, existimant.

Exhibetur autem hæc caro ipsi, præparata variis modis: Aliis cocta in jure aliquo convenienti cum sale, uti anguillarum caro, pelle etiam, uti in illa, prius detracta, aut alioquin per coctionem detersa, capiteque & caudâ amputatis, & exenteratis visceribus: sic enim, cum se anguillas comedere, illis persuadentur, minus à cibo hoc abhorrent. Licet & aliter sic coctam & dein incisam, aliove modo conditam, ut minus eam agnoscant, præparatione possimos efficere. Cujus usi cutem squamarum, instar cæcis in locis vitiosis abscedere, alioqui prodidit.

Sufficit & jus interdum, in quo caro hæc coxerit, ut illud sorbeant, vel unâ cum carne comedant. In quo præter sal, semen Anisi, Anethum decoqui possunt;

alii etiam Mentham addunt vel Portum.

Syrupus ex Jure prædicto Serpentinum, addito Saccharo, Cinamomo, aliquando coquitur, ut ad usum diutius aservari possit: hæque forma Cæpius exhibetur.

Alii, si Gallinæ carnis serpentum camdum donec penæ illis deciderit, faginentur, & postea coctæ comedantur, idem præstare docent.

Sunt qui & Vinum in quo vipera extincta fuit, propinant præbent.

Exiccata quoque caro viperarum, ut diu ad usum servari, & cùm non passim viperæ inveniantur, etiam alio transfunduntur, in trochiscos redigunt. Ad quos parandos sumitur caro ipsarum tantum, abjiciuntur etiam extremitatibus & visceribus, atque cum Anetho & sale in aqua coquitur, postea tunditur, & cum panis tritici micis quarta parte in pastam cum jure subigitur, indeque in Pastillos formatur atque exicantur: Talesque Pastilli, trochisci de Therio quo nomine viperæ Græci appellant, vel de viperis nominantur. Licet & serpentibus aliis eodem modo paratis, æquè efficaces esse aliqui judicent.

Hi autem trochisci rariis per se, sed cum confectis viri permitti usurpantur. Quales in electuario supra dicto descriptæ fuerunt. Cui & si trochiscorum horum ʒj. vel plur addatur, efficiens redigitur. Dein & cum hi trochisci Theriacam subant, eam propter ipsos, vel quia aliis venenis resistit, huic veneno adversatur, Elephantiasis quoque exhibetur.

Astarum fluvialium, canetorum vulgè dictorum carnem, eadem vi quæ & Serpentum operari ex eo quod uti illi exivium sic & caneri testam quotannis mutant, colligunt, nec solum vi resistent, quæ & prodesse diximus, sed & hæc potissimum operari, putant.

Herinacel terebellis carnem exiccata sen assam in cibis quoque exhibet Dioscorides & Salamandram aliis medicamentis miscet: Quæ si quid in hac lue possunt, proprietate quâdam illud moluntur.

Sanguinem humanum à recentior jugulato, bibendum, profuisse, historiz aliæque, si non potius fabulæ sint, testantur: Aquam inde destillatam similiter probant.

Cornu Cervi & Eboris rasuram elephantiasis, ut & aliis venenis resistere aliqui docent. Imprimis quæ magnatibus, unicorni, ut prædum auguratur, commendant, magni faciunt.

Smaragdi polvis exhibitus aliquibus magni sit.

Lepre perfectum curam Chymici pollicentur, per legitimum usum Auri potabilis, Tincturæ Antimonii exaltatæ, Tincturæ veræ & genuinæ Corallorum, adhibitis specificis purgantibus, inter quæ extollunt, Arcatum Corallinum, Mercurium dulcem, pilulas Antimoniales per secessum tantum purgantes; Clarissimus D. Hartmannus Viridelli, & Essentiz sulphuris viridoli dulcissimæ usum, in cura lepre in sua præxi Chymiatrica docet & commendat.

Extrema remedia, quibus in generali elephantiasis utimur, sunt Balnea, si fortè illorum continuo usû vis illa venenata & maligna cui membranisque impressa, asserit atque extirpari possit, & si hæc lues manent præcaverit, aut etiam jam invaluerit, curari; Vel saltem per hæc in delendis tuberculis, ulceribus & cutis scabie, quosque hæc deformitas palliati. Sontque ejusmodi balnea vel naturalia vel artificialia.

Naturalia balnea sunt aquarum dulcium calefactarum, quæ certis tempestibus copore prius & postea quoque bene purgato, frequenter usurpata; Veris & Autumni temporibus, ante & post prandium; in illis sedendo.

sedendo, perseverando in usu hominum per tot dies, donec curis floridat, rutilumque faciat, de hac causa maligna in superficie cutis latente, multum demere possunt.

Thermæ Naturæ calidæ validissimæ id præstant, Sulphuræ præteritum, quales sunt in Helvetia noletæ, in Argovia Badenensæ, in Valeria Bigenses, aliarum alius in locis, quæ nunc scabiem cutisquæque generis, vi singulari, uti in ea dictum, sanant, nec & in his hac eadem vel malignam illius vim absumere, vel tantum vicia illius, si non penitus, saltem ex parte delere possunt: si diu illis, uti alias fieri solet, utantur. Eoque nomine ad has thermas non solum cum de hac lue constet, sed ut malum celare aliquando possint consentiunt, sed & cum de ea adhuc dubii sumus, postea amen, ed, an fortè aliqua inde sequutura esset mutatio, illos ablegamus.

Artificialia hæc humida, in quibus sedent, illique uti de naturalibus dictum, diu utantur, ex aqua sunt, in qua vasla, quæ citum rarefaciendo & detergendo pravorum succos absumant, decoquantur. Qualia sunt ex radicibus cum foliis, Althea, Lappathum, Ebulus, Enula: radices item Aris, Serpentariæ, Cucumer agt. Bryoniæ, Cyclaminis, Iridis, Raphani, Hellebori utriusque, Liborini; Item herbæ una cum radicibus, Malva, Buglossum utrumque, Cichodium, Ensilvia, Sualus, Betæ; Item Ablinthium, folia Item Senne, fumariæ, Lupuli, Scabiosæ, Saponariæ, Parietariæ, Violariæ, Hipocistis, Lenticulæ aquaticæ, Saniculis, Aconitæ, Agrimonie, Artemisiæ, Plantag. Polytrichi, Hederae utriusque Chelidonii utriusque, Nymphææ, Tamaricis; Flores Chamomillæ, Meliloti, Sambuci. Oria & facæ aliæve legumina. Funtur marium, Semina Lini, Fœnugræci, & Cucurbitæ ci. genalis.

Hicce plurimæ sulphur, Alumen vel Sal addunt, maxime ubi jam aliquoties leviori decoctio liti fuerit.

Adduntur & alia, fortè arctum causi. Primulæveris, chamæpitys Item odoratæ plantæ, ut Calamintha, Rotinarius, Lavendula, Junq. qui & quilibet Apertivas tales addant.

In scabiæ pervertæ exposita hæc humida non multum ab hicce differunt. hic quoque locum habere possunt: Impetiginis efficax illud quod Gypsum cum albis recipit. Uti & decoctæ quadam, quibus maculas viriosas abluere debet. In la ostendimus, pro balneo hic usurpantur poterunt.

In sanguine humano si sedcant, eoque balnei vice utantur, profuisse quibusdam, historiarum aliquæ testantur.

Sicca balnea in ære calefacto, cum nimium corpus accendat, & violentè ad superficiem corporis humores propellant, non ita probantur. Possunt tamen & illis, ex suffusa decoctionis balnei humidis, leviter calefactis & tepidatis, aliquando corpus, antequam balneum humidum intrent, ut hoc melius operetur, sic disponent.

Illitiones variæ quoque extrinsecus pro generali etiam cura hujus luis sunt, in corpore hinc inde ubi præteritum cutis pustulosa, ulcerosa & scabra tumidaque occurrat, ad vicia hæc tollenda, & si fieri possit, malignam illam imperfectam qualiterque aliquo pacto auferendam. Fiumque ex illis quæ vi exiccante desiccanturque illud agant, additis insuper illis, quæ propietate quadam id efficere possit existimantur, qualia à Serpente genere desumpta existant; sic axungine illorum inunctam, idem quod carnem ipsorum assumptam, præstare possit, putant, nimirum ut cutis inde cum viris illi adharis abscidat. Uti & oleum in quo caro Serpentum coxerit,

vel serpens vivus suffocatus fuerit: Carnem ipsam coxam aliqui inunctionibus quoque miscunt.

Ex prædictis itaque tale fiat Unguentum.

℞. Radix serpentariæ utriusque, Asphodeli vel lilio. rum, Enula campanæ, Betæ, croci lativi ana ℥ss. pistentur optime ulco rosaceo omphacino, addæ uaguenti Citrini ℥ss. Axungie Serpentis ʒij. Terbinth. ʒss. Olei de frum. uo vel vitellis ovorum ʒiij. Olei de Tartaro ʒij. Sulphuris vivi, Niri ana ʒiij. Lichargyri vel oculte ʒss. Boracis ʒij. ʒv. Tunc prepar. Sarcocoll. nutrit. thuris ana ʒij. Mucilagin. sem. lini ʒij. Succo lappathi, fumarie, limonum, ana ʒij. Agitentur invicem in formam nutriti: Unquantur partes scabie, ulcerosæ & pustulosæ.

Vel hæc tale: ℞. Succorum Limonum, vel arant. vel citri, Lappathi, fumarie, scabiosæ, croci camp. ad ℔j. Aceti ʒij. Aquæ viæ ʒj. Olei rosace. omphac. Myrrillosum vel Mastichini ana quart. ʒss. coquantur ad succorum contumpe. addendo olei vitellorum ovorum ʒij. de Tartaro ʒss. Saponis gallici ʒij. Axungie serpentis ʒv. Pomaræ ʒij. Pelis ranei vel hirci ʒss. Mucilagin. sem. ppylli vel lini ʒij. Mellis ʒss. Radic. Aci vel serpent. cucumer. agrici, cyclaminis, Ircos, ana ʒij. Hellebori utriusque ʒij. seminis staph. agr. Raphani ana ʒj. Boracis & Tartari utriusque ana ʒss. Sulphuris vivi ʒij. Cissi sepiæ ʒij. Cochlearum tetr. str. clusis ʒi. Camphoræ ʒss. Lichargyr. tuzie & oculte ana ʒss. Agitur tunc diligenter & fiat linimentum: Pro partibus affectis in corpore.

Hicce & alia addi possunt, veluti oleum de fermento, de semine raphani, oleum in quo coxerit serpens, succus cyclaminis; item Nitrum.

Possit & argenti vivum hicce unguentis addi, quod licet venenatum illam vim in elephantiasis, uti in lue veneræ, minimè extirpet, & proin non eam uti illam sanat, tamen quia vicia hæc externa in cute, in utriusque admodum emendare solet, ob eam causam illis quandoque misceri poterit, non tamen eâ quantitate au. ea ratione, præteritum si generaliores sunt inunctiones, quæ luis veteret venenum expellit, non possit hoc in elephantiasis præstare, sed saltem ad victorum ablationem optulari, & proin in particulatibus, quæ tantum ut pustulis adhibentur remediis, rectius usurpatur. Quod si tamen generalibus etiam inunctionibus permiscere velimus, poterimus præioribus unguentis primò præferimus, argenti vivi ʒj. addere.

Vel tale cum eo linimentum parare;

℞. Unguenti Citrini quartatium ʒj. Olei ovorum ʒj. Olei de Tartaro ʒss. Argenti vivi dissoluti cum pauca terebinth. & unguento prædicto, ʒss. Succo Limonum vel arantiorum ʒiij. Boracis ʒij. Radic. serpentariæ vel aci, lappathi & asphodeli vel lillorum, parum tostorum & contus. & cum prædictis misturum ana ʒij. Melle.

Si prædictis linimentis & unguentis thetiaca Andromachi & oleum Juniperi admisceantur valde, augbitur ipsorum virtus & operatio.

Particulares applicationes, vitiis tantum adhibentur, à lue hæc prodite solitis, si licet lues hæc sanari nequeat, saltem vicia hæc minus deformant aut noceant. Usurpanturque tum in vitiis externis, si forte ea delere vel aliquo pacto imminuere aut oblietate, ut minus appareant, possint, ut pustulis & ulceribus internis, in Dyspneæ, atque oculorum Pellicula.

In pustulis externis, tuberculis, aliisque tuberositatibus cutis, tum in facie ubi magis patent, tum aliis in locis, applicantur remedia; Fiumque ex illis quæ exiccando, detergendoque potissimum illud agant;

vel vi potentiore & caustica. Quæ ratione & cutis nigredinem in cosmeticis & maculas & pustulas rubras aliaque pravas, ut virgines similesque deleri, in ejusmodi vitis ostendimus. Quæ remedia externa illis exposita, tam leviora, quam fortiora, uti & Interdum caustica illis enstrata, cum pustule delende sunt, hic quoque locum in ejusmodi vitis tollendis habere possunt: Quæ variis modis & formis applicantur.

Ex illis quæ nondum erodunt, aquæ destillantæ ad faciem plerumque usurpantur. Qualis hæc est.

℞. Sulphuris ʒvi. Tartari calcinati ʒij salis natri, vitri crystallini calcin. ana ʒij. Thuris, Myrrhæ, ana ʒij. Camphoræ ʒj. Succ. Lappathi, ʒiv. Succ. Limonium ʒij. Aquæ rosarum, florem fabarum vel florem Nymphaeæ aut Plantag. ad ʒvi. destillentur.

Alia aqua: ℞. Tartari calcinati quartar. j. Boracis ʒj. Thuris vel Masticis ʒij. Sacchari candi ʒj. Camphoræ ʒj. pulveris, & subigantur cum mucilagin. Seminis psylli vel infusi. Cum gumi tragacanth. factis cum aqua flor. fabarum vel nenuphar. ʒvi. albumin. ovorum agitata num. ʒj. succi Limonium vel Anacardiorum ʒij. vel ʒij. Destillantur in Alembico.

Aliæ aquæ quoque idem præstare possunt in discoloratione, inter cosmetica expoliæ efficaciores, quæ unguam, tartarum, sublimarum cum cæteris reclinant, vel ex pluribus componuntur & in pustulosa rubra facie, descriptæ aquæ, impingunt illæ quæ Lithargyrium & tartarum cum aliis admittunt. Dein & in maculis aliis diversorum generum ibidem declaratae aquæ ex variis componitur & cum tartaro efficitur.

Liquor albus, quo instat lactis virginialis uti possunt, ad illam faciem alve tuberculæ.

℞. Lithargyr. ʒij. Aceci albi ʒvi. Succ. Limonium vel arantiorum ʒij. Aluminiis vel salis. gemmæ ʒij. Tartari calcinati ʒj. Camphoræ ʒj. Macerentur & agitentur sæpe, ad usum, vel coquantur parum, si statim eo uti velimus.

Vel si phuris, salis natri & Crystallini seu vitri Crystallini tenuissimæ tritæ æquis portiones, parum coquantur, in aceto forti albo: Et cum colatura facies illinatur.

Alii liquores in facie pustulosa in discolorationibus descripti cum sulphure, vel lacte ex lithargyrio parati, horum loco usurpari poterunt. Uti & lac virginale in maculis aliis ibidem declaratum.

Inunctiones privatis partibus adhibentur variæ, quales in discoloratione copiose sunt expositæ, ut in cosmeticis, unguentum cetrinum, quo facies illinatur potissimum, paratum uti illic descriptum fuit. Dein & in pustulosa rubra facie, propositæ ex variis condimentis: Uti & in aliis maculis illis descriptis, ex succis plantarum, aliisque inde petitis, & ex oleo vitellorum ovorum & tartari, aliisque cum helleboro factis; Item ex sanguine leporis & fellibus. Inter quæ Capræ sylvestr. fel in elephantiasi probat Dioscorides, oleum lactæ etiam hic magni fit.

Aliud ad pustulas valde efficace unguentum.

℞. Aloës ʒij. Radici. Afari ʒj. Hellebori viridisque ana ʒj. Semin. Staphis. Agr. ʒj. Colocyntid. ʒj. Fellis aut q. s. fiat linimentum.

Ex argento vivo, in discolorationem vi & in luis venetæ maculis & pustulis enaturæ illationes, hic quoque vitis apponitur; admodum opitulatur, quæ inde peti possunt.

Aliqui hoc remedium extollunt: Ova duo vel tria macerentur in Aceto forti ramdu, donec testa consumatur, postea contendantur, addendo quartam partem illius aceti; miscaturque pulvis Thuris, Pro facie inungenda. Si supponere nigrum vel aliud addas, glaciatus erit.

Caustica quibus ad pustulas delendas utimur, in discolorationibus copiose fuerunt in macularum cura exposita, ex sublimaro plerumque præparata. Uti & caustica, quibus in elephantiacorum vitis delendis quoque uti possimus.

Vel hæc talis illitio. ℞. Unguenti Cetrifal, olei de Tartaro an. ʒj. succi Limonium ʒj. sublimari ʒij. xing. Scorpentis vel gallinæ ʒj. fiat linimentum: Pro facie.

Sunt qui vermes natos in serpente sub terra defosso colligunt, eosque siccatos cum Cantharidum aquo pondere & aceti aceto subigunt, atque in unguentum redigunt.

Ablutiones faciei sunt, ut unguenta aliaque ablutimus, ex decoctis furfuris macri, fabis conquisitis, illarumve Corticibus, cineribus, oryza, Hordeo, lupinis contractis siletem non in farinam redactis, ne pasta cum decoquitur, fiat, sicuti & decoctum pro facie illustranda, in cosmeticis fieri diximus. Cui decocto & flores fabarum, Nenupharis addi possunt, & Malum ataricum in frusta distichum prius.

Vel lavetur facies alis aquis, ut florem fabarum vel decoctis, in facie tuberosa rubra, vel fusca, in cosmeticis & maculis expoliis.

In ulceribus, utrimus, sepequebus, callosis, multa ex illis remediis, quæ pustulis convenire diximus, parare poterunt. Vel utrimus illis quibus alia prava ejusmodi ulcera curati, in doloribus expolimus:

In pilorum casu topicis prædictis in pilorum defluvio in deformationibus prolux expositis, illud quoque visum avetere studemus.

In ulceribus internis & ulceribus inde natis, narium, palati, faucium, non alia remedia, quàm quæ in cæteris hæc sedum ulceribus, in doloribus descriptis sunt, quoque adhibentur. Uti & sicolum illa exalta sit, tandemque inde proveniat, sicuti in utroque hoc affectu quoque ostendimus, procedendum.

In dyspnoea & tæcedine, pulmonum affectu, cum cæca, quæ in illis affectibus cura describitur, etiam hic adhibetur. Et si narium obstructum causâ difficulter ætem attrahant, illis quoque, quid agendum, declaratum fuit.

In oculis enascens pellicula carnea rubra, ne pupillam obtegat, & cæcitatem pariat, mature quantum & quando fieri poterit, impediendum, idque non alia ratione, quàm ea, quæ in panniculi oculi cura, in visus læsionibus, tum si alias ob causis, tum ob hanc rem eveniat, fieri copiose descripta. Quod si palpebrarum accedat nubo, xerophthalmia vel scabrities, eodem quoque modo in illis, uti in aliis illorum ejusmodi aff. cibus, procedendum, Felix Prætor Prætor Medic. 7.3.

Consultationes.

De Lepra. Pro Eleganti Muliere Cretensi.

Cum Juvenis Hæbita Cretensis, annorum 20 temperamenti calidi, & siccæ, menstrualis parvus fluentibus, totius corporis prouti diversata fuisset; cum tuberculis, quæ Effete vulgo; idem prolixus subsistentibus biennio abhinc, universum illi corpus sedatum est; cum ulcusculis in dies magis, magisque serpentibus, atque i. hores acres; & moriacer jugiter effluentibus; quibus non tardè accedebant rigores, & febres; itaque aliquando exsiccatis, squamosa excrementa emergunt; retundescuntibus tamen paulo post denudat majori molestita ulcusculis eodem

eorum calore manantibus. Quæ affectio pluribus hæcenus in Patria tenratis remediis; sanguinis frequentis scil. educatione ex supina; duobus foveiculis utrique interno femori insitis, ac feri lactis caprini usui, cum impermixti, & copiosioris, tum addito rhabbarbo. Extrinsecus quæ etiam succis refrigerantibus, & aliquando detergentibus applicitis, nec prætermisso balneo universalis ex aqua dulci detergentibus alterata. Quæ cum ita fuerint, Medicum exposcit manum.

Primo itaque hujus affectus essentia, & causæ inquirendæ, atque cum protiginosarum cutis affectionum plures sint, species duplex tamen potissimum earum genus complectitur, universalem, & particularium, præter affectus particularibus non est accensendus, ut pater ex ejus historia: proinde, nec herpes nuncupandus, quo laboravit Illustris illa pater, à Gal. memorata 14. Meth. cum eodem teste, malleolum obdedit. Universalis autem simplex cum sit, Scabies, Lepra, & Elephantiasis, & hac postrema omnis profluens abest suscipio; quæ cancer est universalis, Galeno, in qua varia in cute prominent tubercula, in fronte potissimum, aures sunt acutæ, refusa nares, labra crassa, & tumida, cutisque subtrita, & dura torpescit, ex Gal. Lio. de Morb. Causis. 2. ad Glanc. & Libro de Arta bile, quorum nullum in hac patiente est conspicuum. Quamobrem statuendum censuo, affectum hunc vel esse scabiem feram, & confirmatam, vel Græcorum lepram incipientem, ab Avicenna Albatam nigram nuncupatam, cum squamæ se produunt, lepræ indicio luculento, Aetuario teste, inter Græcos non obcuri nominis 2. Method. Utrunque tamen, cum utriusque affectus eadem sit causa, præter solum discrimen ejusdem gravioris & levioris, censendum est, præterentem oportet dicere à sanguine mela nichilco exuto, in pectore fervidiori genito, nec per uterum statim circuitu ex temperamento parientis, ætate, vita præterita, & potissimum ex regione ipsa; qui sua exstiterit uterique vana profusa obdurgens, atque ad partes cutaneas refluens, tenuior sui parte solum præteritum antehac induit; & crassiori vero sub illis coercita, altius extremæ depascit; insula quinque intermptæ calida, & secca, qua putrum sanguinem, qui in eandem partium alimentum cedit, corrumpit; atque affectum præterentem fovet, juxta Pauli, & Aristotelis sententiam, quod scil. lepra non solum cutis superficiem sed & intima absumat.

Quæ cum ita se habeant, quàm difficilis curationis futura sit hic affectus, pater luculentissime cum sit in habitu, à quo periculum insuper imminet elephantiasis, seu lepræ Arabum. Proinde enim Elephantiasis Græcorum in lepram facessere potest, contemperato humore, & expurgato sanguine illo faeculento in visceribus, & venis redundante, & ab illis ad partes cutaneas transmissio, ita non difficilli negotio lepra in elephantiasim defecit, exuberante viscidum atra bile, atque viscera ipsa gravante.

Cursus itaque tenenda, atque humores corrupti cuti impadi detergenti, non sine aliqua restrictione, & partis corroboracione, fluxio derivanda mensis clementibus, & ad alias partes revocantibus, tum novus hujus humoris proventus prohibendus, jecur refrigerantibus, & humectantibus; atque pars affecta contemperanda. Tandem boni succi alimentis sanguis impurus reparandus, corroboratis visceribus, cum venoso genere, quo humores corrupti à se propulsent, & extrudent, ac partes ipsæ idoneo alimento nutrantur, præmilla

universalis corporis purgatione, quam hucusque accuratius institutum missum facimus.

Chirurgia itaque prædicta quod ipse præterit nobis commendatur repetita sapientis sanguinis missio ex partibus infectionis præmissio utri fori, ex humectantibus, & modicæ arsenianibus, quod sanguis fluidior fiat, adhibitis frequentibus pedum, & totum frictioibus, ac locutionibus aqua alterata malva, althæa, floribus, chamæmeli, & meliloth: ita temporis progressu, sanguis corruptus in partibus sub cute conclusus, cucurbitulis scarificatis liodem affixis, vel hiudindibus appositis educendus fuerit, reteratis quinque hæmorrhoidibus, derivationis causa; quamvis huic evacuationi oaruram assuefaciendam non esse censeam, hoc potissimum ætatis fote, ne facti hæc materiam metallis, in totum supprimatur mensura purgatio, cum sterilitatis periculo; ut hanc ob causam nubere quàm maximè ipsi consulendum censeam, licet non sine præfenti conjugis discrimine, cum affectus sit contagiosus.

Pharmaceutica plura quidem suppetunt interna, & externa, atque in internis duo, tæe judice, potissima. Primo quidem viperæ in cibi usum per multos dies, in modum anguille, abscessis capite, & interioribus rejectis, ob venenositatem harum partium naturam, atque amputata cauda, velut nulli usui, per diem in aqua maccata, ademptis exuviis, mox cum oleo anethino in aqua, cum modico sale coctæ, summopere in hac affectu commendata ab Avic. & Aetio, atque præterit experientia maxime ex usu compertæ, longè quidem potior ratione, quàm solum vinum, in quo eadem extinctæ fuerint elephantiasim sanat, ex Gal. Lib. de Subfigit. Empir. & Iliogrog. Cap. 12. ubi plures memorat hujusmodi historias, cuius propterea potum suadent. Aliud remedium accomodatissimum erit lactis potus asinini in primis, velut magis detergentis, & tenuioris substantiæ; quotidie manè ad libras duas, cum saccharo, & cremore tartari, quo defeciosum fiat. A quibus, contrinaz potest usum fuculorum ex cichorio, cum ejusdem succo, ad unc. 1. quotidie, non prætermittis aliis, appetentibus, & mentis clementibus.

Extrema remedia erant primo valida detergentia; in quibus linimentum ex sulphure vivo, nitro, sale, lapatho, & lupinis exceptis oleo amygdal. in formam linimenti; quo illinendum totum corpus, immergendum primo in Aquas Thermalibus sulphureis, vel aqua marina modicè calida, restia quilibet nocte per horam ante cœnam, quintum, aut sextum; quo excipiant refrigerantia, & humectantia, & potissimum Balneum aquæ dulcis, inuncto toto corpore oleo amygdalino, contemperandæ cutis scicitati.

Quibus accedat recta victus ratio; in qua abstineat ab omnibus carnibus, & piscibus salitis; quibusvis leguminibus, carne bubula, caprina, cervina; avibus palustribus, atque omnibus aliis melancholicis fracticibus; nec non à vinis generosis, & subastringentibus; quorum loco uti poterit piscibus petrosus, carnibus agnolis, veterculis, cucurbitulis, melonibus, lactariis, hujus generis refrigerantibus, & humectantibus, ac vino item albo, tenuis substantiæ, oligophoro, & aliis hujusmodi. Quæ in præfenti affectu potiora duxi. Quæ ut ad vota supercedant, faxit Deus salutis Author Benedicli. Sitvane. Cynsi. & Resp. Medic. Crm. 4.

Elephantia incipiens.

Nobilis annos quinquaginta natus, carnosus quidem, sed tamen squalidus, & ad eum accedens habitum qualis est ictericorum, facie rubicunda, seu ea rubore livescere, sanguis crasso nigroque perfusa, qua maculae nigrae, aut lividae, interdum exoriebantur, ut etiam in reliquo corpore, sed nullo aut obscuro praeclares, sed sine feti, sine cibi fastidio, & aliis symptomatis gravioribus. Infinitas hic portiones haulerat medicas, & sudoribus corpus exsiccaverat in balneis calidioribus, non sine valetudinis jactura. Verebatur ne Elephantia corripere, cujus jam videbatur rudimentum.

Rescriptis D. Fernelius hac remedia.

℞. Radicis acetosae, lapati acuti, & Enulae campanae, Polypodii querculi, seminis Carthami, Pulsatillae mandatarum an. ʒi. Endiviae, Cichorii, Plantaginis, Buglossi, Boraginis, lupulorum, Fumaris, Cuscutae, Ceterach. Chamædrys, chamæpitys, an. m. j. florum violarum p.ij. Fiat decoctio ad ʒxv. In colatura infunde per noctem Epithymi ʒss. Foliorum Scenae mandatorum ʒv. agatidis albi ʒij. gingeris ʒij. Manē bulliant parum, & fiat expressio in qua dissolve succorum depuratorum Fumitterae & Plantaginis an. ʒiv. Sacchari albi lib. j. 6. Fiat syrupus perfectus coctus, dosi ʒij. vel ʒiij. cum sero lactis, quinceo aut quoque sexto die.

℞. Conserve Buglossi, Boraginis an. ʒj. Rasurae eboris, & cornu cervi, an. ʒj. Michradati veteris ʒij. Misce pro duabus dosibus post purgationem, horis ʒij. ante cibum.

Post tertiam aut quartam purgationem vena secetur interior brachii sinistri, detrahaturque sanguis ad ʒa. Deinde si qua ratione fieri potest, resistentur haemorrhoides: primum quidem fecibus emollientibus & alterantibus: deinde suppositoriis ex hieta simplici, cum succo Mercutorii, vel cum felle: aut si soris conspiciatur, & intumescent, affixis hi rudimentis: ut his rationibus sanguis ater & melancholicus emanet. Quum ita corpus diligenter praeparatum evacuatorumque fuerit, penitilis etiam balnearum usus ex aqua dulci potabili nique ad multos dies continuatur, mane jejuno stomacho: sed ea ratione non admodum calide sint, verum duntaxat tepidae, ut corpus tantum humectetur, non autem sudores eliciant.

Victus observandus refrigerans, & humidans: Cremor hordei jejuno maxime conducit, cum praeterit non est opus medicamentis. Juscula quoque ex pullis gallinaceis, carne vitulina aut vervecina, cum buglossi, boragine, oxalide, lactuca, & plantagine. Si vinum estare circumcidatur, ejus vice saluberrima erit aqua hordei, vel alius potus in laborantis gratiam comparatus.

Si quae partes in cute eascent nigrescentes aut lividae, nullo vel obrato sensu praedice, his affligantur coquina vel cucurbitae exiguae cum scarificari, eoque satis alto, ut sanguis promanet, sensusque revocetur.

De Elephantia.

Quum de his, quae in facie so. Bocquirese produnt, non bene inter doctos Medicos conveniat alioque affirmant aspectu illum esse horridum & leucinos oculos, lupercilla glabra, satifecere barbiam,

nates humidas, multique tuberculis tum incens, tum fortis deformes cum incipiente ulcere. Hinc respirationem difficilem, tonsillas ulcerari, cum voce rauca & obscura: alii verò istorum quiddam deprehendi negent, & tubercula, si qua, sunt rubra apparet. Necessè est signa, de quibus inter celebres Medicos certatur, omnino obscura & infida laerere neque ab his judicandum quoniam elephantium, neque si, quae dicta sunt, omnia compareant judicandum propterea est elephantia initium, cum praesertim probe corpus alatur, nullusque pedum aut manuum stupor aut refrigeratio subit, qui elephantiam statim initio concomitati solet. Neque si elephantiam initium adit segregandum idè laborans ab hominum consorcio, quum nondum corpus aut spiritus graveolens, nec purredo ea sit, cujus contagione vicinis labefactare possit. Hic agit de te controversia & litigiosa nos subsignari doctores Medici censuimus Johannem Bocquinet etiam etiam aut melancholico sanguine suffusum, & tuberculis sububris deformem oondum esse inter elephantios numendum, nec segregandum ab hominum consorcio.

At si posthac malum omnem medendi vivendi que rationem aspernent, nullisque cedens remediis ingravescat, & manifestiora de se indicia proficiat, tum satis opportune quid agendum fuerit acriore judicio decernatur. Curatio vere suscipienda. Vetus refrigeret ac humectet. Purgetur singulis hebdomadis apozemate. Vino prout abstinat. Calida autem omnia, & venenata pharmaca rum purgancia, cum aleapharmaca declinet, cujusmodi sunt scammonia, mithridatium, theriaca, & utque non modo non juvent affectum, sed etiam humores aduant, & motum conduplicent. *Joh. Fernelius Consilior, Medico. 70.*

Observationes.

Cuidam ad elephantiasin vergenti ita consultum est, jussus est in totum abstinere vino, aut eo dilutissimo uti, vescatur carnis elais, & pullis nutritis passis ea carne colubronum facti, Theriaca bis aut ter septimana utatur ad ʒij. cum aqua mellis, bis mense catholico cum ʒij. confect. hamech. purgetur, aperiat vena basilica sinistra, balneis aq. dulcis utatur. *Guil. Ballardus consil. lib. 1.*

Praemissis lenitivo aperiator vena brachii sinistri, & extrahantur sanguinis circiter ʒx. plus minus, tota etiam hac estate velim singulis menibus circa novilunium hitadines applicari venis sedalibus, ut inde duae aut tres sanguinem eaugant, quoad sponte sua cadant, etenim ferè ea alio nullo remedio majus juvamentum sperare debet: quare ei Author sum, ne ullo modo hoc remedium post primam purgationem intermitteretur, sed hac estate & sequenti autumnio etiam, singulis ut dictum est menibus reiteretur. Postquam octo diebus ex ordine usa fuerit syrupo preparante & digestivo assumat hoc pharmacum.

℞. Confect. hamech. ʒss. el. e succo ros. ʒiij. fol. sen. ʒj. polipod. q. ʒij. F. infusio In decocto liquit. flor. & fruct. corall. cum paucis cinnam. q. l. syr. ros. solut. ʒj. F. porio quae sepius prout opus fuerit reiteretur, purgato corpore; volo utatur singulis diebus mane hoc electuario ad quantitatem nucis juglandis.

℞. Conserv. fl. borrag. ros. ana ʒiij. diarrhod. abbat. theriac. opt. ana ʒj. cum syr. de pomis q. l. F. electuar. quo assumpro ingrediatur balneum aq. dulcis egledia

in quo incoctus rad. acetos. vel lipach. maj. fumar. lupini confusi furfibus mixti, & in panno ligati, quo in balneo sordes abstergi velim; in balneo noretri per hunc sparium, post decumbat, post horam unam aut alteram, absterge sudore, crura & ceteras partes infectas innungat hoc linamento.

℞. Succ. solani, succ. scabiosi, acer. rosac. an. ℥j. succ. rad. lapach. succ. rad. enul. an. 3vj. ol. ros. 3iv. cortic. helleb. nigr. in pectia ligat. glij. coq. omnia ad succotum ferè consumptionem, deinde hellebortus abijciatur, adde butyr. rec. 3ij. pingued. viper. si haberi possint, si non loco eius teriac. bonæ 3j. plumb. ust. 3ss. lithargyr. crust. an. 3ij. thur. 3tiij. styrac. calam. sal. niri an. 3ij. omnia M. & cum succo limonum agitentur tandem in mortario plumbeo donec summam linimentum acceptum. Post balneum absolutum, placeat hoc remedium, quod apud quosdam pro experto secreto in hoc morbo conservatur, ac capiunt mylum deplumatum, postea abscisso capite, pedibus, atque eo eviscerato, interiora omnia, caput & pedes in ollam rudem consiciunt, quam rectam luso oblinunt, & in furnum calidum imponunt. Ubi omnia combusta sunt, extrahunt, quoadque in ea inveniunt, pulverizant, atque ex eo pulvere manè in aliquo liquore propinant, quod verò reliquum est avis, parciuntur in tres partes, & quomodocunque coctum eisdem præbere agrotis, eo ordine, ut tertia die postremam partem avis bibant, quo remedio restantur quidam hunc morbum alias novem diebus spatio perlaratum esse. A me verò alias in Italia hoc sequenti experimento curatus est hic affectus. Accipio duas vel tres viperas, si haberi nequeunt, totidem alios serpentes, confindo vivas & adjecto multo hircio decoquo in aqua quoad hircium tumeat aut eripet, hircio eo & ipsa serpentum carne pullos gallinaceos multos continuò alo, nec aliud alimentum suppedire; solum pulli postquam aliquot dies enutriti sunt, implumes evadent, & tandem rursus plumia vestiri: ubi ipsi per multos dies ita aliti sunt, paulatim in incipio agrum horum carnes, & carni in eorum fuscis alere, hoc remedium comprobatur esse experientiâ. *Reinerus Selenander, consil. 25. sess. 1.*

Valerius de Taranta castrationem in hoc casu valde probat, nec ego eam improbandi in censo; restium enim amputatione evitantur homines in morbum proci, siquæ in sembram naturam degenerant, & hepatis sanguinem illius ardore resincto, humidi & frigidi evadunt: quæ temperies elephantiorum intemperiei calidæ & sicæ toto est genere contraria, adde quod sublati elephantis gignendi facultate, tollitur ea huius mali contagio quæ per proles propagationem in humanum genus sepe & effunditur. *Varus lib. 20. Chirurgia cap. 13.*

Elephas lucæ, vineæ & struma aliquid habere cognatum & egerit, tres hæc hydras unus alexicasos *Hercules* hydropicos vincit & opprimit. *Gul. Ballonius lib. 1. epid. & ephem. pag. 15.*

Lac asinum arceat elephantiasin, caro asina priorit & advocat, unde hoc I an quia carnes crastum succum generat; lac autem fetum & tenuer hoc autem videtur absurdum. Nam *Flippoc. lib. 2. De Nera*, ita scripsit quorum animalium lac tenue est, & sanguis similiter, eorum etiam carnes sunt confimilæ. *idem lib. 2. epid. pag. 186.*

Neapoli cum subsisteret narravit mihi *Marius Schipani* summus ibidem medicus, Principem *Neapolitanum Cerasam* pro curanda lepra vesici solutum

carne atini pulli. *Thom. Barboisus, Hyster. 33. cap. 6.*

Multi, ut ait *Aetius*, castratione se ab hoc morbo vindicarunt, hac ratione juvenem hoc anno liberavimus, qui incipiebat, & ultra principium fuerat progressus, utatur carne erinacei terrestria, siccat in forno, hac non elephantiasin tantum, sed & cachecticis, nephriticis, convulsionibus obnoxius, & is qui aqua interente laborant, convenit, ut testatur *Galenus*. Potest in locum carnis viperarum substitui, secretur igitur caro erinacei terrestria quæ multa haberi potest, ad formam placente reducat, comedat manè ante alia omnia, vel si velit, elixet cum salvia & borrag. & de ea comedat. *Gul. Rondenellus consil. 53. lib. 7. consil. Crasante*, & aliorum medicorum à *Scholtze* editorum.

Tantum curam remedium ulmi ulus in curanda recenti elephantiasin à *Gerardo Desygnere, lib. 1. cap. 7.* prædicatur. Vidit enim adolescentem tali affectu laborantem, & decoctionis, ulmi ulu (facile faciendis) convalescere, ea quidem pro omni potu utebatur in quolibet pasto, cum paucis vino albo, & tanti sudores movebantur gravolenter, ut vix illos custodes ferre possint, ita viscidis purgabant, & magna mixæ cupia exercebantur, quibus excretionibus sanus factus est. *Iul. Casar Bartheolinus*, in hortulo gentili pag. 206.

Anno 1637. tempore autumnali, *Ulmensis* lenio in medio ferme Vicentini itinere, à venesica quadam hospite, inque diversorio demortui quosdam lyprosi caribus coctis menisque appositis tractatus fuit, quatum esu tota ipsi sanguinea massa infecta brevi temporis intervallo, protadici indur, malignitas pusculis cum desecratione capitis infirmis, ad superficiei corporis expulsi, & percepto rubore, quod lætela illa fermius, ob plura alia & varia delicta, publice flammis combusta fuerit, vultuosus patiens de sanitate suæ restitutione desperare cepit: Nihilominus tamen ne sibi ipsi desce videatur, chirurgum alias exercitatum in consilium vocavit, qui re non satis ponderata, solis externis unguentis eundem, sed inani spe, cessare attentavit, usque dum, alicuius in nostris observationibus citatum, *Classisum Dominum* neum (colligam, Doctorem Johannem Georgium Crokelium (ex capis communicatione & hunc curationem habeo) summis precibus extoravit, ut hæc in parte sibi gratificari, & extrema tentare velit.

Hic pro sua humanitate, & agro & chirurgo solitis rationibus demonstrant, absque puge interitum remedium usurpatione, sanguine massæ per præparanda, purgantia & venæ sectionem exacta depuratione; communicat malignitatis medianibus sudoriferis discussionibus; hepatis corroboracione, & vel tandem, externorum debita, inunctione, hinc, etsi nondum, radicato malo, occurrere minime posse. Quare cernario illi onem in curando assiduam, & diligentiam promittit, modo patiens se in omnibus morigerum præstare velit, quod dum complere speraret, curam sequenti methodo aggressus est.

1. Ordinariæ victus ratione, præscribendo videlicet cibos optimi nutrimenti ac omni acedine destitutos, ut in morbi gillici cura fieri debet, pro potu decoctum ligni guaiaci & salassæ cum semibus anisi & farinæ debite præparati curavit *Primo*, ad sudorem movendum, refrigerio, altero verò sanguinem debiliari a^o ssum compescendum concessit.

2. Cordus per bideum digestivo hoc ad expurgacionem præparavit.

℞. Syrupi

℞. Syrop. de duab. radic. ʒi. mell. ros. col. ʒi. crem. Tart. pulveris ʒj. aq. albatag. fumar. ana ʒij. M. pro dosi una.

3. Vitiolum ventriculi faburam, per sequens medicamentum, vivo assumptum, removit.

℞. Mercur. opr. dulcis. ʒj. etoc. metall gr. vi. Gutt. Gamand. gr. vii. M. F. Pulvis.

4. Hinc medianam dextri brachii primam aperit, detractis ʒv. sanguinis, jussit.

5. Per aliquot dies concessa quiete, rursus ad corporis preparationem, quater in jussulo repetitam, accessit.

℞. Pulveris Tartari vitriol. ʒb. dentur doses quarum & quelibet ad singularem chartam.

6. Felicitissimè sanguinis mundificationem molitus est per appositas pilulas.

℞. Panchymag. Coll. ʒij. mercur. dulcis ʒj. Gutt. Gamand. gr. vii. cum aq. ceras. nigr. Form. pilulæ communes, pro una dosi.

7. Accessit ad sudorifera, ubi esset maxime obediens quotidie in priores decocti falsas haurit, dosin sequens hydrotici accepit.

℞. Sulphur. aurat. diaphor. à gr. x. r. usque ad grana xv. F. pulvis ad chartulam.

Quare ad quarum septimanas, tempore maritimo solùm, in lecto per binas horas commorandò, largissimum sudorem movit, exceptos septimo quovis die in quo superius notatas pilulas reiterando assumptis.

8. Sinistri hinc lateris vena tacta sanguis emanans prior longe purior juvenes est. i. z. Sordium rectemora laconico absterfa, & caput approprians, alterato lixivio, mundificatum fuit.

℞. Radic. bryon. ʒj. lapat. acut. ʒb. herb. marub. menth. cistp. origan. beron. ana M. ʒ. flor. chamomill. Rad. alar. cum toro ana p. ij. agat. crud. ʒb. Crassiuscule l. a. concita coquantur lixivio communi.

9. Remanentes quædam pustule in quibusdam corporis partibus & capite, depulsa, & omnia externa inquinamenta sequenti unguento in sine subleza fuerant.

℞. Unguent. alb. camphor. ʒj. Mercur. dulc. ʒij. Tercendo probe, Mad vasculum.

Sic divino favore, pariens amicis maxime notus, decem hebdomadibus felicissime restitutus, aliquandiu decoctum falsas pro potu ordinario usurpavit, ita ut per dies vitæ non amplius malum hoc repullulaverit. *Id. Sententiæ in observationibus armamentariis chirurgicæ adnotat.*

De Elephantia Java nova.

Ante 20. circiter annos incolæ Javæ horrendo quodam morbo affligi cœperunt, qui digitos manuum pedumque consumit, duris atque horrendis tumoribus, qui postea excolerati in putrida atque cacothelica ulcera cum carie ossium degenerant, facies defædatur, neque ullis medicamentis viciat partes ab hac infectione reddi possunt immunes, nisi membrum infectum extirpetur. Pus tam acie & cortosolum est, ut quando tubercula sponte non aperiantur, postea fuerit animadversum, illud in ossa subjecta sævisse, in initio morbi, aurium extremitates supra modum innumescunt, calcaneis omni sensu destituuntur, adeo ut sine dolore acus integra possit adigi, illæque partes ut plurimum exulcerantur: in initio livide apparent maculæ, omnia sensus expertes, capillitium, barba, & supercilia decidunt, quamquam aliquando id non consuegit observaverim. Inter procatarticas causas est

contagium, Malis, putridis, foetidis & tal. coctis piscibus marinis, aliisque crassis chyli cibis & fructibus i. colæ vescitur, pipitis Indici, Lada Chilli diti, integros devorant manipulos, cibos calidos & aromata hoc mensura adsumunt, atque ad libidinis peccatum excitandum Ato quotidie in cibis ununt, hinc etiam intra terræ jugera herba ista sunt constituta: lues veterata iniqua est, adeo ut sicbe quotidiana sit vulgarior: Urque eo melius morbus hic pateat, icon ex adverso posse inspicienda. Quæritur jam, ad quod morbi genus pertineat, quibusve medicamentis curari debeat, *Ex Actæ Rævia Anno 1681. 25. Novem. ad D. D. Christen. Menzelium.*

Solutio. Præter Observationem hanc, à cunctissimo nostro *Disseride*, ad Nobilissimum nostrum *Apellinum* præscriptam, ejusdem etiam dilucidatio, quam magni Parentis filius clarissimus, *Dn. Joh. Christianus Menzelius*; in Academia Francofurtensi cis Viadrum, Anno præterito, sub Excellentissimi D. D. *Bernhardi Allii*, &c. per modum Disputationis publicæ, non infeliciter in Incem dedecet, digna fuit iudicata, cujus præcipuæ partes hic recenserentur. Is itaque morbo huic Elephantiasis, quæ Arabum Lepra est, nomen competere arbitrat, cum taliter adfecta digiti in manibus & pedibus, *Celsi* teste, sub tumore conduntur, præterea excedunt & livida ac foetida sistent sanie, juxta, *Casalsium præc. nov. art. med. lib. 4. cap. 12.* malo etiam incutiente foetida ab humore acrimonia & malignitate pectusque locis excavenit ulcera, noianie *Aut. Palesio exerc. 64.* ipsas præter, nasum, digitos, &c. sensum decidit, ex *Avic. lib. 2. de diut. cap. 13.* ossa interdum fieri cetera; ex *Petri à Castro observo. 215. 40.* plerumque in facie hanc lucem emittente, *Jnl. Palmario Conf. de morb. contr. lib. de eleph. cap. 3.* extuberationes fieri rotundas, & duras sub lingua, palpebris, auribus, *Jac. Holleris de morb. int. lib. 1. c. 64. in Schol. aures exulcerari, Aræto, aures extenuari t. b. etque admixto nigrore, atque exulcerari, eisd. Palmario, sensum perire extremitatibus, & si acu alius pungatur, non sentire, Holleris & *iranesco de Poni. de Sien. morb. 14. 25. ʒ. 30.* neque aqua fervente exuti, *Palmario, pilos passim decidere, ex Platone tom. 3. cap. 4. coultet.* Quæ omnia ceu maxime paralogomonica signa, dum hoc etiam in morbo, à viginti saltem annis in Java gradiente; ideoque novi morbi nomen sibi pro merito, d. pr. benduntur, nomen quoque illud metet, concludit. His ita statuta, fermentum istius morbi in Javam aliunde fuisse illatum inde ostendit, quod sine dubio & ante hæc tempora idem incolis fuerit vidua, qui tamen elephantiaci non fuerit, aut certe jam ad unum omnes sui hujus mali vexillò militante deberent, & ibidem licet loci, unde apporatur est, adeo non leviter, fieri id sine dubio, quod massa sanguinea fermentanda hic aliis imprægnata sit particulis, unde & a'ius debeat esse effectus. Contagium autem huius morbi in eo consistere, quod è corpore elephantiaci exspiret id, quod abundat, spirituosioribus videlicet partibus ex humoris peccantia setentatione sursum ascendentes, & de fermento elephantiaci participantes. Cujus exigua portione tamen inquinari hominem, non sit mirum, dum quotidie magnum massæ fætinacæ molem à puco fermento, ceterisve quantitas à piucis stocibus fermenti, integra regna ab uno posse inf. do insiti videmus; Intellexi neque à fermento excitata loca paulatim mixturam humorum turbante, tandemque ut in sui generis abeat fermentum cogente, adeo ut sanguis elephantiaci postea totus fiat fermentum, someque sit inextinguitus &*

& levi innumerarum infectionum, favere huic morbo ipsam insulse sunt, qui totus in Zona torrida est, magis directos excipit solis radios, multumque ab illius fervore aduritur; Piper Indicum, quod singulariter adiungunt, cibis calidos cum aromaribus, quos sine modo devorant, Arum, quo quotidie in cibis vescuntur, massam sanguineam omnino multis acerbis salibus impregnare, illamque valde acrem reddere; pisces marinos, putridos & fetidos, crassi chyli cibos, & fructus suo lentore, viscidis testestribusque particulis, illam incassare & viscidam facere; luem veneream utrumque indicare, quæ æres volatiles atque fixas particulas tenaci piritæ junctas esse docet; nimiam illam venem, cui supra modum dediti, quicquid in massa sanguinea balumicum est & spirituosum, omne exhausti; adeo ut sanguis florum sit crassus, terrestris, viscidus, & simul valde de acris: si miscerant jam huic sanguini aliquod fermentum, quod acre & sanguine præcipitet, tunc lentorem humo illi orbarum causari oboluciones, acridinem vero flamen partium ledere, sique Elephantiasos causam adesse continentem. Lividas maculas nihil aliud docere, quam illas à reliqua cutis superficie superficies mutatas à fermenti admixtione habere & differentes, adeoque angulos incidentiæ & reflexionis utrobique non esse eisdem, unde mens id animadvertens distinctum, de utraque diversis habet perceptiones, & sic variegata adpareat cutis. Innumercarum extremitatis aurium & reliquorum membrorum orin, quod fermentum elephantiasos partium sibi alias mixturam cohesionem rubet, quæque intestinis iis moribus adeo promptè non obsequuntur, eas ad peripheriam pellat, quæ ingressæ tabulos illos propter crassiem oblitunt, humores præcites retineant, affluentium transitum impediunt, partisque ita cauleant tumorem, in primis in auribus, quorum substantia fibris rigidis constans, castagliosa, durifuscula & ita obliuionibus magis est obnoxia, stupè & insensibilis esse calcaneos, quia humores viscidis, crassis, terrestris, in his corporibus abundantes, à tubulis nervorum recepti, illos tumere faciunt, unde nervi comprimantur, regurgitantibus ita, à clausis hac ratione poris, spiritibus animalibus; hinc nervi illa potio fiat hæc, & mota licet, motum non propaget, nec mens percipiat quid in illa parte retum agatur, calcinem verò & quidem in ipsis morbi principiis affici, quod sanguis gravior crassiorque deotum, naturæ legibus, tendat, maximumque illius propter lineæ rectitudinem imperum fultineat calcaneus, vel ipsa cutis duntic & ligamentorum copia commodeat bilis. Exculcerat illas partes, qui oppelluntur tubuli ab humoribus à tergo prementibus, vel claudantur actibus, vel illas rigiditate sua petruant acie sal, quo sanguis abundat, pertrampant etiam propter subtilitatem & alii spirituosos humores, qui visibus fracti in ipso tumore nidulantur, unde calor totius corporis, usque affluens, subiles illas particulas agitet, sal acre commoveat, atque sic impulsim elephantiasis fermenti juvet, concutiantur hinc habentemque disrumpantur, quarum pars in cinninos resiliat, pars utrobique rapta humoribus innatet, & turbato sic fibrarum ordine fiat cavitas, in qua colliguntur humores, sale acris & corrosivo, à pique, aco, contagio, infecto. Quod aereo puris subiecta posius corrodæ ossa, nisi tumor arte fuerit apertus, quam carnem, nihil esse insolite, prout aqua fortis ferrum, non ceram vel picem adgrederetur, flamen osium carnosum solidius multo esse & rigidius, quiescere ossa particulas pertinaciter juxta se, & ita excipere ichus & impetus irruentium, cedere necitas; carnosus vero, molliores utpote & flaccidiores, licet percurantur,

Bibl. Chirur. Tom. II.

ostiane suas ipsam ebibere vim quandam, retroagere aliam, diutiusque resistere, perinde ac pile immisse vim absorbeat arena, quam effluat tetragie mias, & globus scelopetris trapiat asces solidos, quem putre lignum cedendo & resistendo, viribus privat. Hoc modo fieri cæcitate illa ulcera, ruptos esse nervos, ossa cariosa, carnes coriosas, humorem adesse causticum, unde pars illa non solum moriatur, sed vicina membra paulatim pariantur eademque, serpaque id malum ulterius, denegato commatu decidant membra, & sic miserimum hominis fiat spectaculum. Quod si materia morbifica ad glandulas subcutaneas deierat, radicibus pilorum, quibus hi sunt infixi, resectis, eos decidere, raramque fieri celsariem, si nimis, herere suo loco, utut hoc inter ratioa numerari debere videtur. His præstatis, & prognosi ex *Hellerio, Casalpino, Plateno, Acrio & Aeno* addita, ad secundæ Questionis solutionem progredietur, iterum primi iudens venæsectionem, cum enim sanguis terrestris & viscidus sit, abundeque multis acerbis, volatilibus, & fixis sibus, corrigi eandem debere, inquit, quod quam aduam sit, ægrorum diuturnas restari querimonias, ut igitur felicius immolari regique possit, immittendum esse, ita enim medicamentum hostem viribus fractum superare facilius, & sanguinem cor subire sepius alterarique, nullo venarum habito delecto, si tamen is observandum, electa in cum sinem pelis vena, si magna satis conspiciatur, crasso utpote sanguine myis in rancis aetium inferiorum repetendum. Hæc dum sunt, sanguinem corrigi debet internis medicamentis, & quæ inclinant & attenuant, copiose assumendis, ut omni, iusticeantur sanguini. Hinc Guajaci decoctum commendat, leve, nec nimis crebro, ob acridinem ejus, sumptum; cui adeo præfert Sarcaparillam in mucilaginem, qua acres particulas temperat, resolutam, aut hordei aquæ immaceam, alisque etiam, ut liquirite radici, vel pulvis permixtam, & mane ac vespere inter strigula calide sumptam, aut interdum urgente sui haustum. Decoctum etiam fieri posse ex cortice, ramariscis, fraxini, rad. caprar. chin. Sarsaparill. lign. salsif. tant. omnium, antimonii crudi vel cinabaris in petia ligatur uncia una vel altera, cum tartaro crudo in aqua chalyb. vel sero lactis infusa, addito oymelle scyllitico & succo limonum quo per triduum quietudinem usurpat, purgatorio nem è mineralibus, quarum particule sunt solidiores & graviores, adeoque efficacius operantur, infundendum esse; addendo Pilulas de fimsria aut heliboro nigro, Mercurium dulcem, Atcanum corallin. &c. aut, si puitur in venticulo mobilis suspicio forer, unum alterumve granum Mercurii vice, vel sulphuris aurati antimonii, vel Turbathi mineralis; quo facto, ad apozema per aliquot dies redeundum, deinde rursus purgandum, perisio illa roties reiterata donec sanguis videatur emendatus, corpusque satis præparatum, tunc enim exhibendum potens aliquod ex mineralibus fudisiterum, è Mercurio diaphoretico, Tinctura antimonii, Q. E. Antimonii Regulo antim. sine marre, Sulphure antim. Bezoartico minerali, additis, ut mineralia hæc ob citius in adum deducantur, sale viperatum volatili, croco, tinctura opti, &c. Ut vero sanguis mollior fiat, sal acre infingatur & educatur, præterea laborandum est ibi Emulsionibus amygdal. dulc. &c. Seminis psylli mucilaginem, &c. hic Acidulas naturales, clystium antimonii, scobem eboris, C. C. oculos cancri, corallia exhibenda. Nec nium, caurum tamen, millepedum vel alichorum spernendum, tunc nec vermium mayalum acris suo sale caustico spoliatorum atque in pilula redactorum, vel etiam simpliciter exhibitum, ortum hinc stranguam lactis dulcis

E

daicis haustu statim sedant; copiosum enim sal ita cum urina educi. Viperas ab *Aetio*, *Casalpino*, & *Galieno* dilaudatas, ab *Aræto* & *Palmaro* reprobari notat, ipse vero utriusque, habito diverso respectu, adfertur, cum enim maxima viperarum efficacia à sale volatili veniat, si illud in copia ad massam sanguineam derivatur nondum correctam, inanes non solum facere impetus indicat, sed sal acii novum insuper addere stimulum, unde necessario exasperentur symptomata. Cum vero massa sanguinea satis preparata, eo devenit ut ut diaphoreticis uti concessum sit, maximo cum fructu mineralibus diaphoreticis, utpote in operando tardioribus, ea addi, neque tunc ullum ab eo sale metum esse posse, cum nullibi hæzeat, sed libere transeat, & qua diaphoresi, qua diversis, sal copiosum secum educat. Calstrationem à quibusdam, ut infallibile & presentissimum remedium, magnopere commendatam rejicit, morbi enim causam ab ea non tolli, adit licet, ad acrium spiritum influxu, inextinguibile coëundum desiderium, illud tamen non causam, sed morbi effectum esse, unde neque illo remoto morbum curari. Inter externa remedia, ad humorem terrestem fluidum reddendum obstructions deobstruendas, sal acre educendum, partesque corporis emolliendas, balnea aque dulcis tepida ponit, quorum particulæ aque in poros sese insinuando, illos aperiant, tenacem pituitam diluant, & sal educant; quæ ipsa tamen noceant, si illud sal morbosum sub densa nimis hæreat cute, ita ut educi nequeat, sed majorem concipiat ab aque spiritu motum; quo in casu salius sit aque salis balneum, quod aperiendo poros salii latentis viam exundi patet, & efficacissimum fore sal, quod antimonio, sale communi & tartari igne potentissimo fulis regulo supernaturæ, vel scorias reguli antimonii cum nitro & tartaro facti. Theriacis etiam sulphureis, mere adhibitis, qualia sunt aluminosa, repodiaris, hic professe, quarum defectum suppleant artificialia balnea, ex fol. & rad. alth. emul. bryon. cyclam. helleb. utriusque, lil. sulfur. macro, cont. sambuc. sem. lini & fenugreci, sale ammoniaco, sulphure dec. parata, purgantia stultis addendo, ut ab his excitatis fermentationibus humores incipiant moveri, poris vim faciant, atque sic egrediantur. Tumores esse emolliendos Unguentis dec. notioribus, quæ imprimis Mercurius præcipitatus albus, vel Arcanum corallinum, vel Mercurius dulcis ingreditur. Quibus non proficientibus, tumoribus vel maculis scarificatis cucurbitis vel cornua suctoria Palmarii superimponenda esse, pro crasso sanguine educendo, vel quod melius, atque discindi & medicamentis cathartecis vel causticis, crystallis scil. argenti, Mercurio sublimato corros. Oleo mercurii, Oleo antimonii, Butyro antimonii, vel quod eo fortius, Butyro arsenici. Arsenico sublimato, aliisque exodi, ulcera vero fasti guajaci decocto elui, cicatricemque superinduci; & his nihil proficientibus, ferro exilipari membrum oportere. Tandem si ab ullo medicamento, certe à salivatione sperandum esse remedium, quæ omnibus indicationibus satisfaciatur, glutinosamque pituitam, revera quandoque acerrimam, in copia educat. Denique brevi dicte enarratione eradito discussi finem imponit. *D. Andrea Cleyer.*

Hicce omnibus addamus jam quadam de Cate ejusdemque morbi à Clarissimo & celeberrimo Carol. Drilincurii Collegis excerpta, & ab Excellentiss. D. Guyot. M. D. communicata.

1. Matronam, vidi quæ fluorem album astringentibus internis & suffraginio thuyæ sibi suppresserat,

sed incidit in puritum jugem, inque cuticulæ scabritum tantam, ut per plures mentes furfures largos atque numerosos interitum, nocturne decorticaverit.

Jusculotum usæ è carne vitulina cum chesefol. agrim. eupator. cannab. cichor. atque fumat. nec non baln. aq. tepid. cum sol. vitis feliciter curata, intermedium V. S. & purgatione.

2. Virum autem quadragenarium frustra curavi per plurimis volaribus, misturis & diæta tenui atque diaphor. quo cuticulam ejus emendarem universæ scabram instar vel lebetidos vel elephantinæ corii, quæque per Ampas & spissas squamas hinc & illinc passim decidebat, alia proterius succulente, perinde scabra, spissa atque dura, sed purius omnis exserte. In Italiam se contulit quo viperarum inauguratur adipe, & viperinas carnes edat. Exitum ignoro.

3. Juvenem unum & alterum mirans sum quibus sub morbillorum declinationem salutarem, tota cuticula manuum & pedum abiecit chitothecarum veludonum instar. Id ipsam tertiam vice in vito deprehendi sub finem curatæ febri malignæ.

4. Præpimis autem in admittionem me traxit decennis puer, cujus mater idea piscium, sub initia graviditatis commota, ipsum nonmetitem exelavit pedibus manibusque squamosis, cythral more, squamis scil. larvis, mobilibusque & mucro ad digitorum motiones sese afficiantibus. Imo squamis illis vel sponte, vel imprudenti quovis alio decidit, novæ continuè succrescent.

Quævis autem squama pedunculo nervaceo atque sensili coheret, sicut mihi pariter earum aliquot apicibus unguium sublaris, atque commotis vel etiam leviter inversis, puer eodem, præ dolore nullius evulsionem admittit.

Ab Anno autem 1681, quo ipsum squamosis artibus studii nihil de ipso mihi solvuit.

5. Longissimum porro cuticulam, suis vel unguiculis vel onguibus instructam, & è cadaveribus revulsum meis adhibui subleico. Mitantur omnes quo artificio id præter, nam tota illa & illucera una quæque portio digiti sui refert ideam, sed secretum meum singulos fugit. Extrema prius macero tepida stupor renova, donec putredinis initia subducat, & tunc certè levi industria tantas portiones & taliter figuratas extraho.

6. Coronidis vice cuticulam *Ethiops* prodacam, à me quidem invisam, sed sicut *Riol.* Ambrogr. lib. 2. cap. 4. atque *Pechlini*, in tractatu de nigred. *Ethiop.* mihi inscripto, nigricantem unice, cute verò subjacente canida.

Observatio circa leprosum falso sic reputatum.

Nun ita pridem ad ejuſdam vici, de lepra non suspecti dunaxi, sed tertium jam à Chirargis lepre adjudicati, examen, Magistratus iussu vocatus, cum viderem bonum virum nulli minù quam leprâ laborare; licet octu jam annorum cuticulis leprosis cohabitare fuerit coactus, iussu, ut prædicti illi Chirurgi suam de hoc leproso probatam sententiam signis syllogisticis, & rationibus instructum in medium proferrent. Hic vultu quodam superciliosò, & fastu, ut ferè sit, plus quam ampullosò, illum leprâ laborare instabant, tum quòd narius faciei color in lividum & fuscum defuisset, tum quòd vitis betitudine & vocis raucitate laboraret, tum quòd maxims anhelitus fectore & meplius obvis quoſque deterreret, tum quòd in crure suum aliquat ulcus haberet; tum demum, quòd ante aliquot annos ejusdem filiam lepre adjudicavit, quæ tandem leprosa mortua fuerit. Hicce machinis & argutis tantum apud Magistratum effecerant, ut bonus vir communi hominum

hominum locitatem exclusis, & leprosis adscriptus fuerit, quibus jam octo annis convixit, citra ullam rationem verè lepræ signaturam.

Quæ cum audivissem, ipsique Chirurgi nihil alterius de lepræ naturâ, essentia, causis, differentiis, signis syphiliticis seu pathognomonicis, in medium proferrent, statim intellexi, illos lepræ essentiam ignorare, nec inter lepram & non lepram distinguere, nec ullam differentiam inter lepram Græcorum, quam psozam, & lepram Arabum, seu morbum elephantium, quem & elephantiasin, leoniasin, seu tyrtiasin & tyrtiasin vocare differentiam illis aperui, bonum hunc virum, nullis horum affectuum caracteristicis signis laborare, demonstravi.

Cum enim hoc subiectum nulla ferè & sicæ scabiei species turpiter deservit, nullisque nec renuoribus squamulis obducatur, sed universum corpus incolore, sanum & nitidum, pilosæ tum capitis, tum superciliarum partes puræ, firmiterque suæ hæreant, conclusi, bonum virum à Græcorum leprâ immunitum & saluum esse.

Eundem quoque nec Arabum leprâ, seu vera elephantiasin laborare, ex absentiâ omnium signaturarum caracteristicarum, aut signorum pathognomonicorum convici. Cum enim hic affectus sit contagiosus, sepe hereditarius maligna & perniciosâ suâ qualitate, plurimumque vitiorum congerie corpus defudans atque membranæ solam aliqua involucre, & cutem præsertim inficiens, si tali affectu laboraret bonus vir, haud dubiè octo jam evolutis annis, seise aliquod vitium in apertum dedisset, cum tamen ex sex illis signis syphiliticis nullum hæcenas fuerit observatum: Nec enim unquam in cute vel faciei, vel in genarum, cubiti, femorum, manuum, pedumve tubercula facile mobilia, indolentia, & ex livore ad rubedinem tendentia, horridumque aspectum præbentia, epulularunt.

Nunquam in eo visâ sunt oris tubercula, quæ ora hiant, Linguaque depressa in palato, & faucibus circa linguæ radicem, nunc flavescens, nunc sublivida, vel visâ, vel reperiâ fuisse. Nunquam item vel in pedum digitorum interstitiis, vel in plantis, in crassi præsertim & durâ illius parte, vel in manibus, juxta cubiti articulum, præsertim in acutioribus illius sede, alifve artuum locis, ulcera efflorescerent. Cum enim ejusmodi ulcera & fissuræ veram cutem penetrarent, lata sint, & rarenter ulterius ferrent, labiis callosis, ac prætumidis consistant, atque lesa faciliè eruerent, indolentia sint licet, si talia vel adessent, vel adfuissent faciliè quoque videri potuissent, & ex iis firmum aliquod indicium fieri. Nunquam insuper in eos visâ sunt narium ulcera, earum leprum, fungos & ossis, seu cartilaginem depauperata, nasi turpiter delabente, palatum columellæque depopulantis. Nunquam præterea in eo observati tumores, non tumide in aurium ambitu plenas, non crassitantes auriculæ, non plus jussu urent, aut dilatant narium alæ, non palpebræ, non labia, non pedes, manifeste inflant, aut tumide. Nunquam demum in oculis juxta majorem cantuum natam pellicula, sensim accrescens, quæ sine prædictis jam signaturis accederet, magnâ argumentâ haberetur.

Cum igitur pathognomonica hæc sex signa nunquam in hoc subiecto apparuerint, quis illud leprâ contractum dixerit? Cætera autem signa ab illis Chi-

rurgis allata, quemadmodum & alia quæ addi possent, uti cutis scabietis in pilosa capitis parte, cum squamulis & furfuribus, fissuræ item cutis pedum, manuumque & ungulæ, pilorum item defluxio, sanguinis quoque detracti livor, crassities, cum arenosis seu granulosis quibusdam arenulis; cachectica corporis constitutio, trons cornu insar splendens, fornicatio ac titillatio faciei, palati, lingue, totiusque corporis, sensuum stupor: Hæc, inquam, & similia, non moror, eò quod aliis morbis confectaria arque communia esse possint, quamvis nec & ipsa in nostro hoc subiecto reperiantur, vel si quædam adfuerint, tanti tamen momenti non sunt, quin durissimos labores, nocturnæque diæque familiæ sustentandæ causa, obire possint.

Filiam quod concernit, quam leprâ mortuam putabant Chirurgi, falsâ morbi specie decepti fuerunt. Dum enim tem ipsam diligenter investigarem, cognovi tandem, ipsam non leprâ, sed inveteratò morbo gallico correptam obivisse. Et quod notari eignum est, dum cum leprosis octo annis versaretur bonus vir, prolem ab uxore sana sanctissimam accepit: Unde si infectus fuisset pater, haud dubiè pure concepti hæreditariò, vel prolem, vel matrem, vel utrumque infecisset. *Claudius Dederus; apud Gulielmum Fabrum, Hild. Epistol. centuria.*

Anatomica Insectio

Lepra infecta Matrone cadaver exhibuit viscera, tum vitalia tum naturalia marcere confecta.

Illustris Matrone, Vasconis Proceribus proxima affinitate conjuncta, Burdegalem venit anno 1660. adireque Dn. Drezis seniore, Chirurgum, apud quem tunc temporis artis tyrocinia ponebam Lepre, qua infecta erat, curationem ab illo exposcit: Lepre fuit, & eaque confirmata ex judicio Clariss. Medicorum D. D. *Mangelazæ & Emery*, Facultati Medicæ Burdegalensis adscriptorum: Magistrorum item *Drezæ & Boves* Chirurgos peritiss. Illius enim morbi vix ulla desiderabantur indicia: Capillitium omne deciduum tum sponte tum pectine, quod furfuræas sordes fætidæ simul decussit: Torvis erat alpectus micantisque oculi, Vultum gutta rosacea fedabat, & luridus color violaceo proximus; maxime nasum, & labia: Aurius tamen nariva servata conformatio, nec pone ullæ tuebant glandulæ: quæ in parte collis sinistra, juxta claviculæ, juglandis nucis magnitudine utrinque eminebant mobiles: Lingua tuebatur, extrema parte & prope venas raninas postulis obrita: admodum foetebat anima: Thoracem anticum adhuc candidum nullæ squammæ exasperabant, sed macies illie summa ut & totius corporis habitus: Mammarum nulla vestigia: Vox nequaquam rauca nisi sermonem protraxisset, fusca enim illico fiebat & adeo obscura ut aures viri feriret, subsequente mox ponas desiderio ad induendum scitatem leniendum: Posticibus suis constabant crassities, manus squammis aut fissuris nullo dabant, ac sensus tactus obtusus erat, ad punctiorem tantum & fustem vellitionem sensiles: Respiratio qualis phthisiconum anhelans: Abdomen, præsertim circa præcordium dextrum durum, & æreum: Læta effundebat pauca cruda, levis & crebro cum foetore turbida: Alvi forces, quanquam *viscæ & mæ* *viscæ & mæ* tantum depiceret, recto odore nates sentiebant: Cutis color ab limo pectore ad pedes usque fulcus erat, nigro proximâ, ubique ex arida & scabra: Femora tibias, non secus ac Gallorum Indicorum, squammæ vestiebant, omni sensu destituta, acus quippe circa sensum alre adigebatur: Genitalibus ob importunum

pruritus manum perpetuo inferebat: Ea nudata pustulas pili magnitudine exhibuerant, & quibus nigricans sanies exsudavit: Tetricis erat moribus, in exandescencia prona, maxime post scalpum: Narrabat Illustri, Parentem similem morbum uicasse, contagio in legatione ad Lusitanos contractum, imò in matrem, [ante natam Illustrem Aegrum] transfusum, paulo post purpurationem mortuum: Patrem xij. annos illi superstitem fuisse, sed à fœda illa lue tam male exceptum, ut non Aula solum sed & omni confortio se sub lucere necesse habuerit, quamquam celeberrimi *Garcia à Laper* Medici Hebræi, opera usus fuerit toto biennio: *Afflicta primordia* quatuor ab obitu Illustri, conjugis anais elucere cepisse. Ex eo duos liberos, utriusque sexus suscepisse, non diu superstites: Lais imminere fuisse at non scabiei levis, quem phthisis anno ætatis xij. sustulerit: Conspingueis cæteris peperisse: Caram Illustri Matronæ suscepit supra dicti D. D. Medici & Chirurgi, strenuamque operam toto trimestri navavit, quotum industria, Deum testor, pene salva & incolumis, castellum suum procul distitum repetiit: pleraque enim recensita Lepre indicia delituerant: Novo & nativo capillito ornam caput, desit fœtor, evanuerunt faciei pustule, nisi tamen apice suum servante livorem & crassitiem, imminuunt tamen; deposuit & lingua sua tubercula: Sitis non amplius molesta, subdere quæ circa claviculas glandulæ: Femoribus & tibis cutis æqualis restituta, solus pruritus ex intervallis rediivus molestus fuit: liberior fuit Respiratio, oculi non ut ante truces: At ab axillis vitiosus odor manabat: Si de venenis sermo incidere, recurrebat in os saliva: detumuit quoque abdomen, cælitque hypochondrorum durities: Venter ubique erat tensus Tactus, punctiones vel levissimas impatienter ferens: nec excrementorum alvi tantus fœtor comes fuit, liberique & liberalius efferebantur: Urinæ colore & consistentia naturalibus erat proxime, aculeo sale exare qui ad crebriorem mictionem excitabat: Sibi tandem omnino dissimilis facta est, cunctis mirantibus qui in ea tam insignem ad statum naturalem reditum, quo xiv. mensium intervallo fuit licuit, & quo in priorem, & sex intra septimanas pepere relapsa est, cui se febri continua adiunxit, quam suis inextinguibilibus conquesta est statim lethalis: Lerum præcessit vultus despectatio horrorem omnibus incutiens: Crura, quæ in priore morbo exarant, insigni tumore conficua erant.

Cadaver à dicto D. Dezellis, me præsentem, prænotariis Medicis & Chirurgis dissectum fuit, cujus imæ & mediæ partes solum evoluit: Pulmones scirrhosi omnino & aridi apparuerunt, obfessis illorum bronchiis mucoso, crasso & extreme viscido humore: Sanguis vas thoracis conceptus crassus erat & adustus, sero omnino destitutus: Trachea arteria adeo exsucca & arida ac si sub dio plures dies jacuisset: Cor minimum, parvumque serum in pericardio: Pulmonum lobi ab omni connexu liberi. Lecur scirrhosum lividumque apparuit; imò adacta in viscera interiora novacula, strepitus percipere ab occurso corporum durorum, quasi lapilli oblatis essent: admodum quoque parvum erat & aridum, cujus minor lobus vix latitudine duos digitos transiret æquabat, & longitudine tres: Major eam sequebatur proportionem: Cytis fellea magna, bile turgens: Splen limbum parvus & durus: Pancreas succo quodam ad nigrum vergente turgens, & sicco: Mesenterium duis glandulis, magnis & aridis obfuit, succo solum unguento basilico remixtum, referente tumidis: Inania quoque & arida erant intestina quoad utramque tunicam: Reines calcali infarcti, inapi instar tenuis exiguis, duris, solidis, porri semina colore referentibus: quo-

rum plurimi veteres occupabant: pelvis & catuaculæ laceræ erant: In vesica plurimi etiam reperi calculi cum phlegmate tres item lapilli; haeculolum quatuor ad instar topi molles vel indurati gylli: Uteri quoque membranae exsiccatæ erant, nec non illam substantia, coarctata etiam & vulva & iugosa, patenti- bus nihilominus admodum multis vasis spermaticis: Incisuris factis in habitus corporis musculis, præsertim artuum inferiorum, reperta pluribus in locis caro scirrhosa, pæterquam io tibiis, in quibus paulo minus arida: Venam cruralem implebat sanguis niger & adustus, inanibus pene arteriis: absque vi & eligitis pedum ungues abicellere, manuum prestius hærebant: *Therophilus Boneti, ex communicatione Ludovici Bailly Chirurgi Sepulchrei Tom. 2.*

EMBROCHA. vid. in Bibliotheca Pharmacœutica.

EMPHYSEMA. Vid. sub titulo *Atheroma*.

EMPLASTRA varia vid. in Biblioth. nostra Pharmacœut.

EMPHYEMA.

Antecedentia in Empyemate sunt.

P Eripneumonia, pleuritis, pulmonum Vomica, derivatio sanguinis, vel cujuslibet alius humoris, chyli, lymphæ, &c. in pus mirabilis facta in civitate pectoris a quacunque causa per erosionem, dilatationem, fractionem &c. Sic Hippocrates. *Si in vntrem sanguis præter naturam effusus fuerit, is suppurare necesse est. Et. Diffinitiones in vntrem suppurare ad suppuracionem perveniunt intra dies viginti.* [venit autem suppuracionis nomine pectus intelligendum esse, Auctor est Galenus in Comm.]

Conjuncta.

Pleuritis, vel peripneumonia non expurgata febris intermit, rigor, pondus, & sensus gravitatis in parte. Ita Hippocrates in Prognosticis, & Galeno teste, fluctuat, ait enim. *Ubi quis affatus à decubitu transmutatur, utque maxime, si ab uno in alterum latius se convertere desinere aliquid sentiat, pus multitudine ipsi contineri, band dubia conjectura est.* Haec illi. Audiat etiam aliquando fluctuario, cum scilicet pus est tam liquidum, & copiosum, ut fluctuare, & sonum excitare possit. Respiratio difficilis, spiritum aliquando purum lenum. Empyema autem jam fixum, & confirmatum consistit febris mitior, & lenta, continuè insiliens, quæ partim putrida, partim hectica videtur, interditi mitior, noctu vehementior: sudores multi, sed inutiles, & noctu præsertim supervenientes: tussis frequens, & molesta. Demum maxillæ rubent, oculi sunt concavi, curvi ungues, tumidi pedes, pustulae circa pectus, & ut plurimum in latere affecto curis inflato, & tumor adematosis. Ait Hippocrates in prognosticis. *Si Empyema in altera tantum parte existat, hoc convertere, ac desinere oportet, desinente in altero latere, & an alterum altero calidius sit, anque cubatorem supra sanum latius interrogare, an vi tactus sit omni ali-quod desuper suspendi, si enim ita est, in quodcumque latere pondus insit, in altero suppuratio est, quæ admodum si utrinque calor, & pondus sentiantur, in tota thoracis cavitate pus continetur.* Et idem primo de Morb. Applicetur lentum thoraci madefactum secundum utramque partem, dextram, & sinistram: citius enim resorbatur illud, quod supra partem pus continenter appetitur esse.

Secundentia

Succedentia.

Hippocrates in Prognosticis. Suppuratum si potissimum fuerit, quos febris eadem die dimiserit, pectus raptim, ac citum citius apparet, & si liberati sunt, & venter erigat, & congestio regit, & pus album, leve, concolorque est, & v. canis punita, & absque labore, & valida suffragatur. Itaque opinio quidem sit, ac ceterum iudicatur, si minus quibus ab hac proximi accedunt. Meritorum vero si, quos febris non dimiserit, aut cum videretur deferre, denique rursus inopescit, & sciant, nec citum apparet, alius humida est, pus viride, lividumque sanum, vel purissimum, spumescitque. Perunt, si hoc adsint omnia. Aut quibus alia videntur, alia tamen, horum quidem interueni, quodam in multo tempore incolores evadunt. Hec ille. Et idem. Qui ex pleuritide empyi sunt, si a raptione intra dies quadraginta fursum purgatur, liberantur, alioquin transiunt in tabem. Et de empyi, cum venter, aut feculentum, parum, & alium pus effluat, evadunt: si vero suberuerunt, feculentumque, & satidum, perunt. Et idem in Coacis. Empyici melius habent, & qui sine expurgari videntur, si sanum foridum excreant, cum recidiva interueni. Et imitetur. Quibus scitum a pure vultu ab igne coloratur, si ferit moritur, Et paliet. Ex suppurationibus, quos pulmonum morbo excruciant, si ferit moritur, ex ceteris vero iuvenes Et illi Aphorismi. Quicumque empyi, vel hydropici venter, aut feculentum, si pus, aut aqua universa effluerit, omnino moriuntur. Cuiusmodi autem 4. de Loc. Atl. 7. Quibus in magna puris copia intra liberam, & pulmonem caute liberat in respiratore attollitur, celeriter succedat.

Cum empyema sit collectio puris in cavitate pectoris, & in ejus cavitatem per membranas extendere possit etiam ex Galeno, ut ostendimus in his, quæ ad morbos particulares planè exponendos præmittimus; suppuratus igitur pleuritide, & peripneumonia &c. vel humore quolibet in pus mutabitur per cnales quolibet in cavitatem pectoris derivato, ita ut demum in pus veniant, fiet inde empyema. Cur autem in peripneumonia etiam suppurata, & quomodo fieri possit, ut pus non per os reddatur, sed in cavitatem pectoris abeat, ex qua deinde rursus per os, ac sputum reddi possit, in peripneumonia exposuimus. Cur autem distillationes in ventrem superiores intra dies viginti supparentur, nulla peculiaris à cæca pender, sed per solum observationem, atque experientiam didicit Hippocrates, nitarum enim distillationum rationem esse, ut viginti diebus spatium exigent ad fermentescendum. Faciens autem empyematis pathogomoniam, signum non crediderim esse febri intentionem non repugnans pleuritide, & peripneumonia, in id vero arguere possit pus nondum factum, cum, dum pus coalescit, dolores, & feb es magis fiant, quam jam confecto juxta Hippocratis aphorismum. Sed neque pondus, & sensus gravitatis in parte, cum hæc omnia esse debeant conjuncta cum ipsa inflammatione, & augeri, prout illæ augentur: augentur autem mole, dum pus coalescit. Fieri tamen potest, ut pus sibi viam aperiat ad cavitatem pectoris, neque adhuc multum fluxile subeat, vasa sanguinis, & per corpus derivateur, unde vel obstruendo propter coassum, vel agitando, & fermentando febrem intemperat, atque interim eam demum aliquid ad cavitatem pectoris è polmonibus devenerit; in quam tamen cum deductum fuerit, difficillimum est judicare pondus, & gravitatis sensum ab eadem derivare materia pendere, nisi fluctatio audiat, vel æger fecerit locum ponderis, & gravitatis non esse permanentem, sed hic illuc dimoveri, & hoc esse poterit argumentum collecti puris certissimum. Rigor ab al-

lupso, & cortacea pectus, & inter brachia erit vellestio nervorum, seu motus eorum, qualis, dum obstruuntur dentes ab audito sono, et in rigoris expositione. Quia vero intra cavitatem pectoris derivatur pus, probatur igitur, ne pulmo dilatetur, euntiam opus, & ne pectus constingatur similiter, quantum requiritur; dolores igitur, aut molesta, & difficilis maior respiratio. Quod si pus possit per sinitu tenuitatem &c. intra pulmonem derivari, per ipsum purulentum redeunt, nisi verbi possit, pus non expelletur. Facto autem iam empyemate, vel suppurata potius inflammatione admittitur sanguini solam pus concoctum, nempe satis fluxile, ac rari, hoc est, minime coherens, & minime fermentum: remittitur proinde febris, & cum pus continuè exudet in vas sanguinis, erit continua, intra ex humoris placiditate vix intendens se, aut remittens, & ex hoc similis hæctice: cum autem interdu parant magis post corporis, perficere poterit aliquid eius humoris, & fiet febris mitior; noctu illud obstruuntur hec intensior. Insuper cum cavitates pectoris, & humores totius corporis insituti sint, valide autem nititur pectus in humidum intarsi, valide expellet tam ipsum, quam humores totius corporis; vel proinde in sudorem abire poterit; non erit tamen ille sudor ullius levaminis propter puris abundantiam semper remanentem: quia vero noctu pori coarctantur: partes igitur clauduntur pectus, quæ interdu exire possunt propter exigentiam, & raritatem invisibiles, noctu ad angustias porum subsistunt oportet, quousque cum alijs succulentibus coarctate, æqualem molem majusculam colleat retinentiam porum superent consummum erumpentes in formam aque, vel saporis. Propter stimulum autem à pure intra pectus proveniente fiet tussis, ut ex his, quæ de tussi scripsimus, & ex eo quidem molestior, quod pulmonem, & pleuram vellicat, & aliquando quolibet etiam visu molesta minime minuit. Invalens morbo pulmo à pure magis comprimitur, sanguis influere non poterit, subsistit in ramis vena cavæ ad faciem, unde partes eius rubescunt. Quia vero ingravescit hoc morbo fit gradus ad tabem, nempe corruptionem, & absorptionem partium: igitur vel quia per corruptionem flaccescant, vel quia per absorptionem extenuentur, fiet minor ipsam moles, & hoc decrementum his in partibus erit magis observabile, quæ duris, & immobilibus terminis circumscribuntur, cuiusmodi sunt oculi dura atque immobilis orbita osses circumscripti, unde oculi fieri concavi. Curvi ungues cur facienti, ex his, quæ de peripneumonia, intelligit. Tumbi pedes, vel quia eò deolvitur pus, humor nempe qui utroque nimis mobilis facile ad eos subsistit propter minimum vim pressuræ, vel quia corpore iam ad tabem vergente ex partes similiter citius corruptuntur, in quibus minor vis per expellendi, unde rubescant, hinc fermentescunt, & in tumorem attolluntur. Cum autem pus membranas subeat; per empyematis igitur protractionem poterit ad eum usque penetrare, & quidem vel in insistentem molem collectum, vel hic illuc in minores molulas emulatum: producet hoc ad eum pectoris hic illic putulas: illud tumorem cedematosis propter contentum pus, nisi & hoc contingat propter corruptionem partis, ut in secundo cingit metastasis potius exposuimus. Quæ autem recentissimus ex Hippocrate inter conjuncta ad dijudicandum alterum ne, an utraque pars pectoris empyemate laborat, certa esse possunt, si aliunde constare supponatur, propolis autem empyemate laborare: si vero non constet, pondus, & insistentia sensus, & talis, & effusio limet esse poterit quid necessario conjunctum cum peripneumonia, aut pleuritide ut patet, ex superioribus, & eorum morborum explicatione

expositio: & cum eorundem ratio, ac necessitas ita-
tum ea se ipsa pateat, nihil ejus explanationi immo-
ramur. Quoniam verò febris ab admisione puris pro-
veniens, vel ejus nimiam visciditatem, vel vim ser-
pentandi, aut stimulandi arguit; si igitur in expositis
pulmonum affectionibus, quorum suppuratione fit
empyema, eadem die, qua empyema fit, seu tumor,
in cavitatem pectoris rumpitur, febris cessat, argu-
mento erit, pus esse optimæ qualitatæ, non fermentans,
non obstruens: ducitur autem in vasa sanguinis,
& etiam per spumæ excernitur, æger igitur evadit
ab empyemate. Cum itaque pus non sit quoddam summe
viscidum, non ita multum resistit abstractioni ab in-
terioribus membranis pulmonis, quibus allabitur,
etque de causa sine labore, aut valida tussis per spu-
tum reddetur. Eadem de causa pus erit album, leve,
concolor, nempe æquabiliter liquidum, & ex eadem
materia æque liquata, unde concolor, album, cum
hic sit puris perfecti color naturalis. Quia verò pleura
est humor crudior, & qui ad empyematis constitu-
tionem in pluribus casibus concurrere potest, hinc si
pus cum pituita mixtum reddatur, adhuc aliquid su-
petesse concoquendum arguet: nihil, si absque eadem.
Itaque cum hæc appaeruerint omnia, evadit æger plus
minus facile, aut turd, si eorum aliquot: ex quibus
fieri, ut æger in melius evadens successive magis ad
naturalem statum accedat, unde scire desinet, cibum
appeteret, alvi faeces demitteret, ac produceret non mul-
tum absimiles naturalibus, nempe, consistentes, &
propter cibi parvitatem, exiguas. Contra se habebunt
omnia mortuaria, quæ recentior Hippocrates, ut ex his
patet. Spumolium autem spumam arguet & lentorem
humoris, & eundem nondum concoctum esse, & par-
vam quantitatem ejus, quæ difficile subeat pulmonem,
& difficile ab ejus tunica dividatur, unde magis per
minimas partes permisceatur aëri, cujus eruptioni resis-
tens lentore suo spumam producit. Quadragesimus
dierum numerus est tempus, quod naturaliter requirit
observavit Hippocrates ad hoc, ut per superpurgatio-
nem per spumam possit empyematis evadere, quo sup-
purato tabes fit corruptente pure pulmonem, & impedi-
ente elaborationem sanguinis. Ratio, cur si ab empye
per paracentesim effusus pus bonum, evadens moriantur,
si ferus, patet ex superioribus dictis. Quod si empyi melius
habere, & ferè expurgari videantur, spumam verò
fertidam excreant, veniens in recidivam, & motientur;
apparens enim ille transitus in melius arguet, ex-
purgatam quidem esse quantitatem puris, sed spumam
facilem ostendere poterit, genitum esse ulcus intra
pectus, aut pulmones, ex quo & novum pus genera-
bitur, unde in empyema relapsus, & mors propter
partis corruptionem. Similiter specillum à pure, ut ab
igne coloratum arguet pus non coctum, lividum, &
fortè cum ulcere partem corruptente, unde mors.
Senes verò præcipuè, & juvenes ab empyemate per
pulmonum morbos productum moriuntur, cum in senibus
propter partium siccitatem difficile coalescere possint
villi rupti à ruptione tumoris, in juvenibus au-
tem hunc ipsum coactum impedit tenuitas, & vigor
sanguinis: & ex his adhuc difficilior evadent, qui
temperamento sunt aliquanto humidiores; succescens
enim partes magis, & facilius à sanguinis imperio, &
motu respirationis in dissolutione derineri poterunt.
*Cur vero pure confertim effusum per paracentesim morian-
tur empyi, vide in ejus aphorismi commento, quod
seorsim morbis præmittimus. Textus autem Galeni
est ipso patet, sicut etiam, quid sit Empyema. Clarif.
Læwenius Bellinus Tractatus de Morbis pectoris.*

Sequitur jam Clarif. VIIlissus.

Pleurisim, & Peripneumoniam morbos non tantum
affines, sed invicem commensurabiles, & alterutrinque

successivos esse, ex superioribus manifestum arguet;
porro tum hæc, tum illa, & nonnunquam utæque
simul non bene judicantur, in Empyema transeunt. Si
quando enim phlegmone circa pleuram excitata sup-
puratur, tandem Apostemata disrupto, pus in thora-
cis cavitatem decedens, hunc morbum producit. Pa-
riter ex pulmone inflammato interdum succedit: ni-
mirum ichor circa locum affectum aggregatus, divina
coctione in humorem crassum & flavum abit, qui nisi
per tussim ejicitur, aut pulmonis substantiam interio-
rem sensum labefactans, diathesin phiblicam infert,
vel unitatem pulmonis totius solvendo, tandemque
membranam extrinsecam corrodo in pectus dilabitur,
adeoque empyema parit. Unusquisque pulmonis ab-
cessu aut ulcere laborans, omni pus copiosum & feci-
dum, [uti in pulmonis vomica sæpe cœsingit] ex-
puat, non ideo dicitur Empyematicus. Enimvero vo-
cabuli hujus acceptione communi demotatur, pus
intra cavitatem thoracis collectio, quæ scilicet respi-
rationis organa opprimuntur: illuc vero pus istud
confluere solet vel ex Pleuritide, vel Peripneumonia
[& quandoque forsan ex Angina] suppurata, & dis-
rupta.

Quandoquidem igitur empyema nunquam primario
& ex se incipit, sed aliorum morborum haud rite
judicatorum, ferè semper effectus live productum erit,
circa causas ejus non opus erit multum inquirere.
Ratio formalis sive causa conjuncta ejus satis innote-
scit. Ea scilicet est materia purulenta, è pleura, aut pul-
mone, aut larynge, in thoracis cavitatem effusa. Causæ
autem reliquæ affectuum præviorum propriæ, ad cu-
jusque istorum Aetiologiam pertinent.

Circa materiam morbosicam quædam discrepantia est;
quippe alii hanc merum pus, alii que non hoc, sed
materiam purulentam esse contendunt, in qua opinio-
ne est Joh. Heurnius, qui materiam purulentam pro
Empyematis causa conjuncta statuens, inter hæc &
merum purumque pus distinguit; alterens hoc feci,
ab humore nutritio sanguineus, hoc est ab ipso sanguine
aliquatenus corrupto, sed pepsini capax, materiam vero
purulentam humorem excrementum, viz. serum, aut
ichorem esse, qui à sanguine inter ciculandum alicubi
præedito & obstructo provenit. Hinc observare est
de abcessu qui pus verum & laudabile exhibet, cum
plerumque compactum, undique conclusum, & vel
cysti, vel privatis quasi manibus obvolvatur esse, dein
postquam maturatus & disruptus humorem contentum
effundit, cito ac facile sanari. Verum abcessus marea-
riam purulentam præbens, nidum pusum non ita
conspicuum & parietibus obseptum, sed plerumque inæ-
qualem & sinuatum obciner, arque disruptus sanari
potius quam pus effundit, dein ob perennem humoris
excrementitii scaturiginem egre sanari.

Porro advertere est, utrumque humorem, scilicet tum
pus, tum materiem purulentam interdum insigniter
foetere, quandoque item odore quovis tetro proflus
immunem esse. Quædam apostemata maturata, & dis-
rupta pus foetidum, alia inodorum effundunt. Pulmo-
num vomica, quin & parvium aliarum phlegmonas,
ita diversim hæuifæ sæpius notavi. Materies purulenta
est pleurici ulcerosis effluens grave olet; phthisicorum
spuma, quæ multo magis periculosa existunt, ut pluri-
mum inodora sunt. Usitatum est è latere propter Em-
pyema perforato, materiem primò haud insuavem
exundare, dein post duos, vel tres dies aëre orificium
sæpius subingresso, eam horrendè putrescere, quæ tamen
putredine post injectionem spiritus cæjusvis vini aut
aromatici rursus brevi evanuit. Sed multi quid res
esset, singulorum hujusmodi accidentium & alteratio-
num rationes particulares designare, in quantum pere-
grinum tantum pus, aut materies purulenta alteratio,
illa feorentem inducit adinervit. Cum particulæ sulphureæ
æqualiter

aqualet coctæ, & salinis subjugare in misto continetur, graveolentia abest; quamprimum verò ille solute avolare incipiant, secumque salinas (è quibus aculeantur) auferunt, odorem valde terrem quaquaversum dispergunt. Quod autem ulcero purido, aut Empyematis nido, lotio, vel infectio cum liquore vinolo aut aromatico aliquoties adhibita sepe fetorem tollit, in causa est, quoniam ulcers haud secus ac teste putentis latera quodam quasi fermento liquorem contentum inquinant, adeoque fetorem impriunt: cuiusque adeo à liquore bene temperato & potente, illud vas ut viceris fermentum elinatur aut subigitur, delincepti fustoris propagatio ista cessat. Hinc sequitur indicium non semper malum, nec itaque valde bonum esse, siquidem phthisicorum sputa, & empyematicorum abscessus cum, vel sine graveolentia excrementur, quoniam utriusque generis casus quosdam salubres, aliosque funestus exitibus cognovi. Ad hæc non certius indicium inde sumitur, quod phthisicorum quorundam sputa aque injecta supernantant, aliorumque submerguntur.

Quamquam autem illam puris & materiei purulente distinctionem haud multum improbumus, attamen nec solummodo hæc, nec semper istud Empyematis causam conjunctam esse statumus. Quando hic morbus pleuritidi simpliciter succedens, ab apostemate in lacere suppurato & dissipato oritur, epistemi parum morumque pus est, quod in pectoris cavitatem decidens morbum istum parit. Sin verò empyema Peripneumonies sibilosæ sit (oili pulmonis vomica intercedat) materies ichthiosa, circa phlegmones locum ægella, & postea mæra coctione crassescens, pulmonis unitatem solvit, tandem membranam investientem perforans, inque thoracem exundans, Empyema producit. Ista materia purulenta potius, quam merum pus dicatur.

Empyematis signa, vel ipsam dum in fieri est prænuntiant, vel plane factum indicant. Prioris generis habentur morbi alii, quosum hoc proles esse solet, prægressi; cuiusmodi sunt Pleuritis, Peripneumonia, Angina, quandoque item pectoris plaga aut vulnus, quin & alii interdum ejus affectus, non bene judicant, aut solent: è quibus empyematis securi major erit suspicio, si post unum aut alteram septimanam sine sputo copioso rigores & febris & spirituum languores superveniant. Dein post xiv. aut xx. dies empyematis plane facti signa erunt, respiratio difficilis, pectoris gravitas, materiei fluctuatio, & molestus sensus è corporis situ mutato, siccis & febriculis fere constant, genarum rubor, totius inquietudo & vigilia.

Empyema multifariam distingui solet, scil. imprimis juxta affectionem præcedentem cuius sibilosus est, item quoad sedem ejus in thoracis latere modo dextero, modo sinistro, modo in tota capacitate ejus; & denique quoad materiam morbosam, que vel merum & laudabile pus est, vel materia purulenta, atque hæc modo mitis & benigna, modo acris & fistida.

Morbi hujus Prognosis tum ante, tum post sectionem instituitur; prior determinat utrum latus aperiri debeat nec ne; item prædicat, cuiusmodi cum, vel sine apertione morbi eventus futurus sit. Si empyema tardius post primarium affectum, scil. non ante 30. aut 40. diem, quando vires plurimum accrevit, atque pulmones vixit sunt, eorumque conformatio læsa, succedet; ac insimul si febris velus hecica persistit, respiratio brevis ac laboriosa, pulsus debilis & celer, cum sudore frigido, cumque diarrhea velus colliquativa, & crebris spirituum deliquiis tunc empyici status plane deploratus sectionem minime admittit, medicus enim sinat incurere mori, ne videatur occidere. Sin verò è contra, post mani-

festi empyematis maturius facti indicia, pulmonum, aut lateris molestia, nec non febris aliquæ symptomata remittent, atque pulsus & spirituum robur constabunt, licetbit tuto ad sectionem procedere, sedoque successum felicem sperare. Sectione facta si pus album, vetum bene coctum, aut alias laudabile cum euphoris exiit, & exinde pectoris gravitas, & dyspnœa remittit, & ægrotans quoad alia pathemata melius habet, de therapeia minime dubitandum erit sin vero pus nullum aut malum, si tenue, subcrenatum, aut fistidum ex lacere aperto efflueret perexiguam exinde salutis spem concipere licetbit.

Hippocrates inter signa empyematis funestis prænuntia recentem specillum à pure velut ab igne coloratum; sive quod sepe advertimus & nonnumquam absque malo eventu, si specillum argenteum lateris aperti orificio insertum, statim colore inquam aureo aut cupreo tingetur: quod certe nihil aliud significat, nisi quod puris aut materiei purulente particule sulphureæ adeo exaltantur, & à mixtiosis vinculo laxantur, ut facile abscedentia, corpori collibet alteri, & imprimis argenteo, (cui adhæresunt) asigantur. Vidi aliquando ferinam à longa & laboriosa venatione occisam statim ob epulas in clipeo coctam, non modo lenerrimam ut cochlearibus eximi poruere evasisse, sed etiam cochlear argenteum nidum primo contactu deaurasse. Cujus ratio prolixis eadem ac priore est; nempe carnes illas à nimio dum viveret animal exercitio ades ad putredinem dispositas fuisse, ut sulphuris particule à concretionem liberæ, & ab avolandum aptæ, subiecto statim alteri capaci adhererent. Verum hæc in patergo.

Quod autem spectat ad Empyematis Therapeiam, imprimis considerare oportet, utrum morbi hujus, utpote jam facti, indicia certa sint vel dubia. In priori casu pharmacia haud maleum opus erit, sed tantum corpore preparato, illico ad lateris, apertionem procedatur. Itaque si à pleuritide, aut Peripneumonia non rite judicatis, aut à sanguine post plagam, casum, aut vulnus lotus suffuso, puris, aut materiei purulente, vel sanguinis intra thoracis cavitatem fluctuatio, cum spuro nullo, aut diminuto percipitur; non opus erit ut medicamentis maturantibus, aut expectorantibus amplius immoremur; verum alvo soluta, & sanguine ac humoribus per Julapia, Apozemata, & Anodyna rite temperatis, aut nuda sectio instituitur; aut in teneris & meticulosis cautum imprimis inter sextam & septimam vertebra applicetur; dein escara excutitur, scalpellus oblique postiora ac superiora versus sensim, ac paulatim adigatur, donec in cavitatem thoracis penetrat; dein cannula argentea inserta, materies intrus contenta per vices emittatur; ita tamen ut quantum vires ferent totius humoris evacuatio acceleretur; nam portio ejus inuis telicis intra paucos dies (propter ætrem prout supra dictum est sepius intrus admillum,) fetorem horrendum contrahet, quod malum ut præcaveatur aut esto tollatur, liqore traumatico & abstersivo bis terve in die per siphonem inficiatur. Non opus erit reliqua ad operationem hanc, ejusque processum spectantia particulatim describere: quoniam hæc singula Chirurgis quibusque peritioribus plane innotescunt, & in præd familiaribus habentur. Post sectionem, ejusque administrationem appendicem rite institutam, medico hæc multum præterea agendum speret. Ratio vitæ idonea, crebra alvi (quoties opus erit) per enemata solutio, insuper & remedia vulgo dicta traumatica, quæ linguinis dissolutionem, ejusque in ferofratis pectoris iniquas profusionem impiant, præscribere oportebit.

Quod si morbi huius indicia minus certa, ac (ut a Peripneumonia ac pulmonis vomica prævis pleniusque affollet) prolixius dubia sint, ad sectionem haud cito nimis, aut temere procedatur. Novum enim in aliquibus materiam purulentam, immo plus fædorem, quam insigni dyliqua & pectus gravitate expansio- nibus, thoracis paracenesin & frustra, & non pro- priis innoxie celebratum fuisse, itaque dum per signa pathognomonica de empyemate plene factio constabit, medicamentis (qualia pro Peripneumonia curanda su- pra præscribuntur) expectorantibus, necnon evacua- tionem per urinas & sudores blande movendis, aliquandiu insidendum erit: quibus tandem nihil pro- ficientibus, & empyemate adhuc moriente, vel au- cto (quæ dummodo vires constabunt, præstat reme- dium anceps expectari, quam nullum) ad paracenesin procedatur.

Quod spectat ad medicamentorum pro empyema- te curando requiritorum formulas, aut sectionem ead- em remedia quæ ad Peripneumonia præscribantur conveniunt; paracenesi autem facta, sequentia potis- simum ex usu erunt.

Contra languores, & spirituum deliquia quæ in operatione ista, vel postea consequuntur, Julapium se- quens præsto sit, subinde ad 4. vel 5. cochlearia su- mendum.

℞. Aq. Mellis, Cetalorum nigrorum ana ʒvi. Aq. mirabilis ʒi. Margaritarum pulv. ʒ. Symp. car- yophylliqum ʒi. Mille, f. Julapium.

Decoctum sequens propinetur ter aut quater de die.

℞. Folior. lingæ cervinæ, veronice, eupato- ris, tussilaginis, pilosellæ, fimalicæ, ana Mj. Radic. Rubiæ diactor. chrysolis ana ʒi. hordei ʒß. cicurum rubr. ʒß. passul. solis ʒi. ʒ coquantur in aq. fontan. ℞ iv. ad medietatem, edulcoratur inter sumendum ad placitum cum melle depurato, vel cum syrupo de pilosella. Si ubi fæcis pilulæ seq. sumantur vespiti, & primo mane ad ʒ. vel ʒß.

℞. Pulv. oculor. cuncti ʒi. flor. sulphuris ʒi. salis prunellæ ʒi. spec. diarrhod. abbatris ʒi. Terebinth. venet. locz q. f. f. massâ, formetur in pilulus exigu- us: vel omittit Terebinthina item medicamentum sumitur in forma pulveris ʒß. ad ʒi. bis in die.

Empyematicorum exempla non ita pulsum & cre- bro prostant, atque ab eo morbo curarum multo rariis. Nihil duos, lateris sectionem à medicis omni- modo præscripam admittere nolentes, forum obtu- lit; eorumque cadavera dissecuit. Item binis aliis ope- rationem istam adhibebam vidi, quorum unus con- valuit, alter tubidus lateris; cuius tamen ratio erat, quod pulmone insigniter viciato, & visibus prostratis, lateris apertio serius facta nullum illi juvamen con- tulit; sed spiritus prius imbecilles deprecit valde, eorumque copia absumpsit. Iste casus latus aperia- batur, pulmone fæcis firmam habuit; sed à lateris abscessu latus rupto, materies in thoracis cavitatem decidens septum adeo comprimebat, ut vix respirare posset. Chirurgus sine caussis, inter vertebrae scerram & septimum scalpulum lussit, & carne pe- nitus perforata cannulam iussit. Ichor cruentus pri- mo effluxit, & dein per vices in modica copia exem- per per triduum sine fæce quovis effluxit; postea verò quoties foramen aperiretur, odore terebinthi, cloace cupulvis maxime putentis fetorem superans exspirabat, totaque cameram graveolentia intolera- bili infestabat: quin etiam adeo per plures dies per- sistebat, donec per iniectiones ex myrrha, & herbis amaricantibus aqua & vino incoctis factis, & cepius quotidie adhibitis, tandem exstingueretur, quous- que usum diuturno, materia morbifica, & foetoris omni denique ablata effluxus omnis cessavit; & denique fo-

ramine clauso patiens integrè convaluit. Innotum, qui, eum lateris apertionem nullo medici aut amicum suum admittere vellet, interibat, cadavera dissecuit. Unius alibi mentionem feci, cuius summa erat, quod pus ab Apostemate in pleura, & musculari intercosta- libus excisio, inusque disrupto emanans, loci af- fecti & pulmonis contigui partem ipsa cloce affecer- rat, indeque diaphragma corrodens, & foramine in dextro ejus latere factio, in viscera int. ventris de- scenderat: ibidemque toto ductu ventriculi, & inte- stinorum tunice exterioris, in quas materies puru- lenta deciderat, corroz & discoloras apparebant; & denum materies purulenta intestinum totum cor- rodens, & perforans, una cum excrementis per anam foras prodibat. D. Agrotans robustus & medicis cupisque impatiens, morbi hæc Tyrannidem per duos circiter menses sustinuit; sed interim febriculâ, sæpi, inquietudine, ventriculi molestiâ, & crebra sub- versione & agnoscit ferè continua miserrime afflicti- degebat. Cadavere post obitum aperto, odor fetidissi- mus cloacæ euntem superans per totam cameram distendebatur. Alterius ab Empyemate defuncti An- toine, non ita vastam materis purulentæ diffusionem exhibebat. Illa quidem in latere nidum habuerat, unde in thoracis cavitatem decidens, ibidemque in copia ingenti agellâ, & pulmones continue immer- sos polleens, febrim lentam & quasi hecticam, à qua agrotans vixde senex interit, excubabat.

Hæc Thomas Willis Thymatectice rationalis parte 1. superius jam quadam tum ex Thebesi Discipula- rum tum ex ipsi Galienis & Delfanis (laxissimi ac Celeberrimi Viri D. Caroli Drelincurii in ultieriori huius materie illustratione adhibenda.

Empyematis, Prima ii & Gemini causa est sangui- nis intra capsularem thoracis effusio, eiusdemque in- ibi diuturnior mora, quæ visum vel anæpæm vel hæmaturiam vel hæmaturiam produxerunt, vii crerè dignissimi observationum scriptores luculentum nobis quadruplicis illius causæ fidem faciunt, ac proin nullus omnino superest dubitandi locus de Divini Senis Oraculo scilicet. 6. Aphor. 20. Si sanatus in veniem ef- fusus fuerit præter naturam necesse est in suppuratum, cui sententia subscibit & Hippocrates Locus lib. 2. cap. 7.

Speciatim autem illi Empyematis Primæque potius vul- nera à thoracis alveum penetrantia haud insolentia in Cælis se vidisse proficitur Clariss. necnon Celesterr. Viri D. D. Carolus Drelincurius, Gallienus Regis obitu Consultarius ac Medicus Ordinarius, necnon verò Tra- zæus & Anatonius hæc in Academiæ Professor diffusissimè, Præceptor ac Patris meæ attentione colendum.

Empyema, quod Secundariū nomen indiguamus? pro- curia Pleuritidis agnoscere elicitur ex hoc auro scilicet. 5. Aph. 8. Quicunque pleuritici facti expectorabilem materiam non excludunt intra dies quatuordecim, ut in Empyema degenerat, quia nempe materia illa quæ in- ter pleuram multo colore huc incruentis, manifeste- cit, vel, si magis placeat, purulenta sit, membranam pedetentim arctat, atque sic gliscit in pectus; sed etiam aliquoties impetu facto, locum ampliorum libi querit & membranam illam confestim disruptam. Unde autem illorum modò accidit per prædictam & quan- dam velari purulentam, depurationem & commotionem in verum & Legitimum Empyema degenerat, uti Hen- rius etiam comprehendit in viro annorum 30. qui ex pleu- ritico Empyemate factus est, sed qui talidus mortem obiit, Comm. in scilicet. 5. Aphor. 8.

Quancum autem tales sint Empyematis Pleuritidis rupia venia, (Lueri præsertim Perforatione, ut Mediceorum Aulæ fuit solis interitus venisell. necnon & alia bene multis vel evidente, vel clanculum eva- cuantibus, Empyematis vix sese opponit & illem oc- cupans) nihilominus Clariss. notat Præcis Honorandis, cæ

loci pushti numerosissimam excreant, Milium Dacem veteranum curavit, qui *Empyemate Pleuritidis succedente*, liberali puris expectoratione atque solius *guaiacumoris* & aliquot bechicorum usui integre, *rimis* *spatiis*, defunctus est. Alteram itidem in practico suis collegiis, conscriptam à se historiam nobis exhibuit, de Matrona consuetudinis etatis, que propter ruptam & inter latam pleuritidis vomitum, syncope primam perterrita est, *ut fere Aph. 3. sect. 7. de tandem per alvum atque mitchals ductus largiter profuso pure*, dysenteria atque dysuria laboriosissima decessit fuit; sed ab illis, *uni ab Empyemate*, Actis *Æsculapice subdito*, *paucos intra menses*, immuni evasit.

Virginem insuper vidi pulmone ulceroso, quæ per os & alvum unice, citra *dysuriam*, pus suum profudit ad obitum usque.

Aperto cadavere totum pectus pure stagnans, reperi à dextris & à sinistris, sed nusquam puri sui delegendi vis à pectore in alvum purulentum deducentibus, proximis ob festinationem rei, urgentibus defunctæ conflaginatis.

Empyema dextrum periculosius esse sinistro.

Hippocr. lib. 3. de Morb. dextrum Empyema sinistro damnosius esse pronuntiat, quia, de mente Prædicti mei, *vera impar corrosioni magis obvia quam Aorta durius atque compactor*, At *Rivierus* è contra Lib. Prax. 7. cap. 4. sinistrum Empyema periculosius censet, quod puris edacitate ventriculus cordis sinister periculosius atroxidatur. Sed isthæc vario apud nos scilicet atque futilis, Cordi siquidem *pericardium & ejus aqua*, vice sunt *propugnaculi*, atque *scissæ*. Coc ergo puris mordacitas patet. Imò et si cor puris injuriis obviu fuerit undique; annon sinister ejus ventriculus tot illas facillius eluderet? nam plurimis atque validissimis *visis masculis* donatus est. Coc siquidem univèrsu ex Hippocr. sententia, *reclamante licet Galeno*, masculus est robustissimus non nervo sed carnis densitate atque compositione. Et profectò veritatem illam Hippocratem humam & immotam stare adversum Galenicis impetus, Clariss. oculatissimæque Præles meus, partim libris, partim viva voce, partim *avro* *me docuit*, Is enim nunquam satis laudandus Preceptor, in nuperis suis Collegiis frequentissimis, necnon in Amphitheatro majori, corda nobis cessit ovilla, vitulina, atque humana in fibras spirales à basi ad exum densè revolutas atque retortas. Imò fibras illas non solum in orbem reflexas, sed & masculosas esse ad oculum probavit, & illas præterea à sinistris, quàm à dextris longè numerosiores atque crassiores replicuit atque retexit. Rationem potè discrepantiæ structuræ suis demonstrationibus attexit, densiores scilicet esse sinistri ventriculi fibras ut systole validiori sanguinem pellat ad extremos usque microcosmi fines; at ventriculo dextro pariores atque graciliores inesse, ut systole leviori in proximam & insertam sibi pulmocum arteriam sanguinem acceptum regeret.

Ex istis itaque liquet sinistrum cordis ventriculum dextro validiorem, validius etiam dextro omnes à se puris noxæ amoliturum, atque aded non ita periculosum extare sinistrum empyema, sed casus penitus esse Rivierianus in Hippocratem insultus.

De latere Empyemate internoscendo, ubi memorabile recitatur exemplum de Empyemate inaudita methodo exterius purgato.

Rivierus Prax. lib. 7. cap. 4. signum proponit, tanquam suum, quo latus Empyemicum à latere sono dis-

tingatur, tumorem scilicet oedematolum in latere, cor, solo. Verum diagnosim illam geminis suis observatocibus Præles meus testituit, Hippocrati nimirum, *Guidoni*, *Pigrao* atque *Theremino*. Videbis præsertim *Durol. Coac. lib. 2. cap. 16. Coac. 68.* Sed præterea Præles meus docet latus Empyemicum non modo Oedematosis more tumere, verum etiam ichotes quandoque emittere & fero quouam fanioio atque glutinoso, fastidioso stillare. Imò latus narrat *sudorem puris* tabo quodam purulento hic & illic maduisse, & cum omnia symptomata insinuasit pus esse vel fero vel igne potentiali educendum, ac intem pergerMarrem & Vulkanum perinde horreter, frustillum plumbi, insitit fessæ, in pororum patentioreu unum, tabo crassiori fluxum, curandæ ritu soletter intussum esse, atque sic in dies crassius illud atque longius plumbum inditum esse, donec tandem intussum adactum, pectus ipsum penetrasset, ut ex ejus penetratilibus pure deinceps liberius manare & prole deterio priusina salus redintegraretur.

In Empyematis operatione salubè docet vasis intercostalis parcere Chirurgo.

Lippis & ronsoribus notum est ad Empyemati pectoris apertionem præcipi ut scalpelli dorsum obvertatur costarum crenis, ne vasa cadantur. Sed cautionem illam futilem & agyricam esse nos in Amphitheatro docuit Clariss. Præles meus, Anatomicus magnus Antistes, Notis etenim oculis subjecit beryl duntaxat tractu crenari costas, & falsissimum esse intercostalia vasa costarum crenas longè decurrere. Imò vasa isthæc pleura sua ita nudavit, ut luculentè viderimus *superiorem ubique venam, nervum infimam, arteriam* verò *intermediam* esse, idque tam alta à costarum crenis distantia ut nusquam secandus veniat musculus intercostalis interior, quin isthæc intermedia vasa sancitur transversa. Quid igitur nobis obtrudant, *suam industriam obventori Chirurgi*, sese vasa pleuritica longè declinaturus, si modò, inter Empyemicum pectus aperendum, scalpelli aciem in inferioris colte dorsum obverterint. Apagæ namque agyria unice dignas, à Medici verò geminis atque cordatis longè abhorrentes. *Aqua hæc ex Clariss. D. Drolincartio. Sequuntur jam.*

Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica inspectiones ex variis.

Curationes.

Quoad curam empyematis, seu quando pus factum in cavitate fluctuat, & stagnat, 1. Est evacuandum, 2. Acrimonia ejus noxia corrigenda. 3. Læso partia indulta restituenda.

Quoad *puris evacuationem*, hæc per convenientes vias instituenda vocit. *Via convenientes* sunt vel *naturales* vel *artificiales*: illa quibus natura molitur evacuationes, & quæ subinde per varia loca inimitabiliter arte purulentis evacuat, ut dum v.g. pleuriticorum, vel alias in thorace suppuratorum purulentias, nunc per *urinas*, nunc per *alvum*. nunc frequentissime per *spumam* evacuat, imò per *purulentam*, in toto corpore *fiat*, quo de viro. M. A. N. C. Ann. 2. pag. 230. solvi observatum fuit. Sanè *pus empyem per urinas* excreta c. dolore quasi nephritico & stranguria refert *Horsl. 1. 3. observ. 10. Simile vid. ap. Panarium*, item *Puellam erit. 2. observat. 17.* Episcopi curavi mulierem gravi pleuritica correptam, suppuratam, cui supervenit fastidissima materis purulentæ urina, quæ per 10. vel plures dies continuante cum sensibili alleviatione ipsa sanabatur. *Præcautionem suam pleuritis ac latere per*

pulveres & anthehalic. Poteril, myrrh. ocul. cancror. antimon. diaph. balſ. ſulphuris dierebinth. &c. Elix. Prop. raro propinabam, quia hoc ſemper alvi fluxum ſollicit, ut neceſſe eſſe, cum denique provocare clyſmata. Sicut jam ſuprà huſmodi variæ excretiones circa hepatis & lentis abſceſſus inſinuatæ fuerunt. Facit huc quod reſert *Hildan. centur. 3. liſt. 39.* Nempe ulcus diuturnum in brachio ex icſu ſcleroti, quod, quia per urinum pus exercebantur, ulcus ſiccabantur: Quumprimum verò ulcus recenſer fluerebat, tunc patiens rursus urinas laudabiles nullo pure permixtis reddebat. Per quas vias materia empyematæ in priſtine, v. gr. deſeratur ad urinam aut alvum, aut etiam ad utrumque expoſitione, plures autores litigant. *Conſ. Senu. lib. 2. præf. ubi de pleurit. quæſt. 3.* Willis *Pharm. rar. P. 2. pag. 150. 201.* M. A. N. C. *Ann. 3. pag. 391. & Ann. 6. pag. 75.* His in caſibus ſi moriatur aliſquid natura, ſemper miniſter eius eſt Medicus, dum, quod illam vergeret videt, & ſimul motum illius promoveat. *Su vero rupto abſceſſu & colleſto jam empyematæ pectoris, cum nil moliri obſervat, p. o. cupia puris dum vires adhuc conſtant, evacuan- da, ſuſcipimus vomitus convenit, cujus inſignes utilitates pluriſibus *Piſo de colluvie ſeſſa* declarat. Hinc ſu- ſtatum impuſum permoveendum, ut huius medio cen per proximis vias, modumque magis ordinatum, puris hinc evacuatio, Pro quo ſcopo Nicotiana eſt egregia cujus uſum ſuprà ex *Ferdinando* declaraviſimus.*

In ſpina hoc promovenſe habenda ſimul ratio qualiterum materie purulentæ evacuanſe, quæ quæ aerio fuerit, ac tenuior, eò magis temperantia ſimul utran- da ſunt: Quod ſi vero non acceſſit craſſius ſit pus evacuanſe, incidentia & abſtergentia magis in ulum vocanda. In ſpecie mel, & ex eo paratum hydromel ſed aqua muſſa, oxymel ſquilliticum inter expecto- rantia primariam ducunt; in qua muſſa hyſſopus, ſca- biola, parietaria, balenium, iris, marrubium, liquoria, japaſa, paſſula pro indicantium varietate ſimul incoqui & propinari poſſunt. Vel ſar muſſa expectorant.

℞. Aq. hyſſop. ʒiſſ. aſthmar. ʒiſſ. oxymel. ſquillitic. ʒvi. fyr. Nicotian. ʒſ. emer. ʒiſſ. M. capiant pro libitu.

Artificiales via pro evacuanſe parte ſunt paracentaſi, quæ ubi priores illæ naturales vel non ſubſe- cunct, vel non ſuſſecturas ſuſpicio eſt, in tempore in- ſtitui poteſt. In tempore dico, ut quando natura em- pyema non expurgat per urinam illam inſtituenda Pa- racentaſi, ne pus in ſanem convertatur, ne vires fran- gantur, ac palmo à ſanie corumpatur.

2. Antimonium puris & ejus noxam corrigens, hoc eſt, ne aliis dicunt, ulcus aſſerens & mundificans optime remedia ſulphurea, quodcumque acre tempe- rantia & baſſamica, quæ vi ulteriorem progreſſum apoſtematis & puris inhibentia, uti ſunt ſulphur & antimonialis fixa, &c.

3. Ea verò, quæ laſionem puris poſt abſceſſum ſup- puratum reſolvunt, ſunt vulneraria, præ cæteris hede- ra terreſtris, ſcabioſa, cheſeſſium, item legnum & radicem decoctum, &c. Optime hæc duo jungantur, ſed ſemper habenda eſt ratio Puris ut hoc vel ſimul evacuetur. Felis adqueſta, ne hæc plus majus intenſa augmentetur. Ad hoc ut evacuetur prius præter evacua- tionem per vomitus ſi eſt in thorace, vel in alio lo- co, convenientiſſima ſunt omnia antimonialis fixa, v. gr. antimonium diaphoretic. quod ipſum cum deco-cto cheſeſſi, vel cum hede- ra terreſtri, vel quod me- lius cum decocto radicis china propinquetur, propinando ſcopius cum hauſta illius decocti ʒi. Antimonium diapho- retic. Hoc enim mirabiliter ſuppurationes quſcumque curat ſanguinem congruatum & empyema imprimis pectoris.

Et tunc cum radice China ſimul coquentia uti: ſuf- ſilago, hyſſopus, conſolida major, capſ. veneris & ſi- milis: Non opus eſt multa addere, ſimplex enim ſufficit decoctum cum quo propinquetur Antimonium diaphoreticum.

Post Antimonium diaphoreticum imprimis eſt Bal- ſamum ſulphuris, quæ quancumque ſuppurationem ac internarium partium & viſcerum corruptionem, cito, tuto & jucundè curat. Vel ſimplex vulgaris, cum ſpi- ritu terebinthine, vel anſarum cum oleo anſi pecto- ralis, vel ſuccinatus cum oleo anſi pectoralis, vel ſuccinatus cum oleo ſuccini; vel juniperinus cum oleo juniperino. Loco Baſſami ſulphuris ſimplicis ſu- ſtatur Baſſamum ſulphuris auratus antimonii ex Pole- manno, erit baſſamum eo magis laudans.

Denique Aſceus tract. de capſis vulneribus, Egregium modum docet curandi empyematæ benefi- cia decocti liqui Guajaci, cujus methodus eſt opti- ma, & quæ obſervari aliquot empyematici reſtituti fore.

Nec incommode ligna ſanſala hic recipiuntur, verbi gratia.

℞. Rafur. ligni Guajaci ʒi. ſaſſafr. ʒſ. Macera per 12. horas in aquæ comm. ʒvi. coque ad con- ſumptionem ʒiſſ. adde heder. terreſtr. comar. flor. hyperici. heder. veronic. an. m. j. ad m. rad. glycy- rhiſ. ʒſ. ſem. ſonic. ʒvi. paſſul. minor. coqualla- tar. ʒiſſ. Coqua, ad tramentum ʒi. iv. M. S. de- coctum de quo ager ad minimum ter in die capiat, ſubjungendo & alia remedia.

Hæc denique terreſtris omnibus præferenda eſt ſpeciebus ſimplicium quæ ſuſpuratas ac ſuſtamento, ut ſic dicam, curat: Ejuſ decoctum ſeu eſſentia ſi aſ- ſumatur, aut quod melius cum eodem antimonium diaphoret. propinatur, aut denique ſi ejus luccus ſem- per cum decocto Guajaci permixteatur.

Certum eſt quod hederæ terreſtris ſit inextimabilis in hoc caſu.

Hinc ſunt quæ maxime æſtimant.

℞. Succ. hederæ terreſtr. ʒiv. praſſi (id eſt mar- rubii) ʒi. thuris, myrrhe an. ʒi. Sacchari parum; reſiduantur ad conſiſtentiam ſyr- rupi, & ſubinde uſuepentur.

Denique decoctum braſilice capitate rubræ, cum canthillo ſacchari temperatum, eſt egregium, quia ma- teriam purulentam educit per urinam. Poteſt etiam dari cum decocto China, antimon. diaphoret. & ſi- milia.

Lac quoque capillum cum ſaccharo roſato uſur- patum, pro ultimo hoc ſcopo eſt egregium. vid. M. A. N. C. an. 1. p. 78.

Conſent. cum his Willis. Pharm. ration. p. 2. ubi de phthiſi & empyem.

Baſſami ſulphuris fecit mentionem: ſi huius igneus calor pertemiceatur, optime permixcentur. ſaccharum Saturni vel Antiephœcum Poterli, quæ in his caſibus ſunt egregia.

Item Baſſamum Peruvianum non incommode poteſt ſubſtitui baſſamum ſulphuris. *Michael Enmuller. Col- legii Medic. Pari. 1.*

Quoniam curantur Empyici diſſicillimè, conſueve- runt veteres Thoracem incidere: ut inde purulenta materia promptius educeretur. Monet autem Hippo- crates ne pus univerſum effluat, tunc enim languen- tes Mors cito excipit, ut experimentis pluries inno- tuit. Parrem verò utendum, vel ſecundam nonnulli eligunt inter tertiam & quartam coltam; alii inter quartam & quintam: & alii inter quintam, & ſextam. De qua re legendi poſſim ſed Paulus Agneta, Fabricius ab Aquapendente, Fienus, Scultenus, Bar- bettere, Marchetti. Hippocrates 2. de Morbis utroque latere

lacte pice decocto, infistum potius aperiendum voluit: à minus etiam lethalem dicit factam ibi sectionem. Verùm Epiphanius Ferdinandus ex eodem Hippocrate de internis affectionibus tutius putat perforare costam ipsam. Idipsum approbat Martinus etiam in Hydropneumonia ex eodem Hipp. de Natura mulieb.

At longè periculosiorem, quàm vulgò creditur, Paracentesim esse existimat Jo. Van-Horne, & Tulpius pluries infeliciter institutam ait. Quamobrem plerique ad alia remedia geneta confugiunt, quæ si non magni juvaminis, saltem minoris sunt periculi. Famo tubaci per fistulam excepto, ejusdemque decocto calido cum saccharo bis tantum sumpto, pus è cavo Thoracis per tussim excrevit memorat Epiphanius Ferdinandus: debet autem illud convenienti digestionem depurari, & castigari. Alii communius dieteticis institunt documenta Galeni 6. de loc. affect. cap. 4. Nec denique desunt, qui etiam per alvum expurgant empyema recensente: nam præterquam quod visum id aliquando fertur ab eodem Galeno 6. de loc. affect. cap. 4. confirmatur quoque à Velichio, qui acceptum à Machia Boeceno refert, Empyemum ex pleuritide suam frequenter potione, ex syr. Altheæ, oxymelle, saccharo, muni, oleo amygdali dulcissimo recentis, & aqua scabiosæ, pute nimitum, ut ipse loquitur, alvo proclivius, quam ore, expurgito. At doctus illi nondum satis peripici sunt, quamvis illos ostendere adhibuit sic Baubini telas ab Hortio, & à Sennerto; ac multo autem Galenus exp. 6. de loc. affect. 4. & 7. Aph. comm. 30.

Prohulè nimirum vidimus Empyematis decocta ex scabiosa, pulmonaria, fanicula, tussilagine, hyperico, hyssopo, caudæ benedictæ, betonica, irisidis Florentinæ, & lapæ majus radicis, glycyrrhizæ, consolida, C. C. C. & major ex parte ligno guaiaco, & lentiscono computa, & exhibita ad plures dies cum balsamo sulphuris, anis, vel terebintina, ad guttas aliquot mane per quinq; altum hâtes ante cibum. Et licet quoque obis varis elixir proprietatis elicitis cum aqua cinnamomi, cum quo communicari potest syrupus de tussilagine, de hederæ terrestri, de hyssopo, de pænio, si libuerit. Flores Antimonii hui, & Antimonium diaphoreticum citè preparatum, miram opem præstiterit, sicut pariter illas cennula descriptione Angeli Sale, non neglecta tamen in hanc rem observatione Friderici Hofmanni. Magna etiam vis inest Terebintina alba Cypriæ, si cum modico vitelli ovi dissolvatur, & cum aqua hederæ terrestreis stillatitia gratiam insula tantisper subigatur, quotique cremorem lacteam æmuletur. Capsi potest ad unctam unam vel alteram jejuno stomacho. Succus ejusdem hederæ utilisissimus memoratur à nonnullis, si cum olivano diapensid, redigatur in formam Electuarii, & per vias alimatur, vel in ore detineatur.

Ad Pulmonis vomitum, refert Cardilichus sibi pro secreto communicatum spiritum è palegio in spiritu vini per octiduum infuso elictum, vel insensibiliter vel per sudorem, aut urinum illam dissolvere. At Morbus hic sicut tenuissimus, ita difficillime curationis; quinimò peius hominem enecat, quàm intermouatur aut opportunitas remediis tractetur, cum repente è vivis egros tollere solet, nisi sponte sua tuncque vomica & purulenta materia in Thoracis cavum deponatur, vel sensim expariat. Lucas Toci de Medicina. Præf. part. 1.

Signa Emphysematis sunt gravitas cum fluctuatione (præcipue cum ab uno latere in alterum decumbant) in thoracis cavitate, si Pleuritis aut Peripneumonia præcesserint, respiratio difficilis, spiritum purulentum & fetens, febris hætica, & aliquando sudores nocturni trigidi.

Indicationes sunt puris excretio per expectorationem, urinas, aut lio quocunque modo, ulcers detritio & consolutio, & ab his, hæcile ablatio.

Primo incipiunt Clysteres leniores, emollientes, & carminativi, & repetantur, si alvus non respondeat. Purgentur aget purione sequenti.

℞. Rad. enul. 3j. glycyrrhiz. 3ij. sem. anis. 3i. fenicula. 3i. anis. 3i. crum. tart. 36. fol. fen. mund. vin. alb. odoris. nutrit. 3i. Coque, & Colaturam 3v. aut vi. adde diaphæ. 3i. syr. ros. solut. cum agaric. 3i. M. f. Pocio mane sumenda cum regimine.

Si vires serant & febris urget, instituantur venesectione in brachio.

Victus sit tenuis & siccus, ex illis potius quàm elixis. Sæpius comedat pænicolas, avellan. amygd. dulcis, ficus, passul. &c.

Potus ordinarius sit hujusmodi.

℞. Sarsap. 3vi. lissit. 3ij. lign. sanct. 3ij. glycyrrhiz. 3i. passul. 3ij. aq. boræ. 3xv. infund. & coq. ad tertiam partem consumptionem. Colatur. & aromatizetur 3i. pulv. coriand. ad unum scr. vehit in lagenis lapideis.

Vel ℞. Ratur, lign. sanct. inter. nigræ. 3iv. rad. symphit. maj. 3vi. rad. tussilag. 3v. scabios. veronic. caryophyll. botry. an. m. 3i. glycyrrhiz. recent. 3ij. Infund. in lb vii. 10. f. vase probè occulto, mox coq. in alembico super sic capite. ad lb ij. consumpt. Colaturam sumatur bis terve in die a 3vi. vel vii. quavis vice longè à passibus.

℞. Rad. chin. 3i. enul. 3ij. tussilag. 3ij. caryophyllat. totius, scabios. an. m. 3i. baton. pulmonar. pilosell. heder. terrestr. erytm. an. m. 3i. summit. marub. alb. hyssop. an. m. 3i. passul. purgat. par. xx. jupib. par. x. dactylor. ficum an. par. 1v. Coq. in hydrom. distat. lb vi. ad lb ij. consumptionem. Colatur. adde syr. capill. ven. 3iv. ol. sacch. 3ij. M. f. Apozema. Dos. 3. vi. bis in die longè à passibus per octiduum.

℞. Rad. enul. rec. 3i. urtic. urent. 3i. glycyrrhiz. 3ij. Hysop. 3x. fol. veron. mar. cum turo, heder. terrestr. botry. an. m. 3i. erytm. m. li. summit. hyssop. marub. alb. an. m. 3i. Coq. in hydrom. vinoso. defecet, fiat Colatura, in qua clarificata maceia passul. mundat. lb 3i. ficum ping. 3vi. Bulliant, extrahit pulpam, quæ cum liquore retiduo lentè coquatur in Electuario.

℞. Hujus Electuarii 3v. mell. despumat cum phlogmate, ex distillatione ovis anis. 3ij. sacch. cand. 3v. vin. de Malaga 3vi. Coq. lentè ad consumptionem elegantis, infilla ol. sulphuris per campanam, q. s. ad gratiam aciditatem. M. 3i. & lambatur interit linctus.

Aliquando oleum sacchari hujusmodi præferitur.

℞. Rad. enul. 3i. itreos Flor. 36. glycyrrhiz. 3vi. fol. sac. marub. aro. hyssop. scabios. heder. terrestr. erytm. an. 3i. rad. caryophyll. sac. 3i. cort. rad. cassi. 3ij. sem. anis. fœnic. dalc. an. 3vi. affund. aque vit. ad 1v. digit. furematuralem, infunde per quadrantidum: Colaturæ lb ij. adde sacchar. cristall. pulv. lb 3i. flor. sulph. 3i. accende liquorem in pætopide stannea, & agita vases infusum. mano cessat, cola per lineam, & adde mellis passular. quartam partem f. Eclegma.

Si ipura sint purulenta, & tussis urget,

℞. Pulp. rad. alth. & passul. in aq. scabios. & hyssop. simul. coct. pil. & tracet. 3ij. pulv. subtrill. fol. tussilag. glycyrrhiz. Hysop. an. 36. itreos Flor. 3i. lact. sulph. 3ij. sacch. cristall. pulv. 3vi. cum pauca aqua hyssopi & Palla pro noctiduo hypoglossæ.

Si opus

Si opus sit majori detersione, convenit Lohoch de thure.

℞. Thur. mascul. 3 ij. sacch. crystal. 3 ij. pulv. includ. cavitare majoris pomi dulcis, quod proprio operculo rectum torreatur, & pulpa bene cocta à superfluitatibus separetur, addendo pulp. rad. enul. in hydromel. ad putrilag. coct. pist. & trahet. 3 ij. pulp. passul. 3 ij. pulv. hyssop. & fol. tussilag. an. 3 iij. iteos Flor. 3 ij. succ. glycyrrhiz. 3 ss. syr. de erysin. heder. terrestr. rosis solis an. 3 iij. flor. vel lact. sulph. 3 ss. Mf. f. Lohoch.

Potens admodum est remedium Saponæa sequens magistralis.

℞. Rad. enul. rec. 3 ij. alth. 3 iv. passul. maj. 3 iij. Coq. ad putrilaginem in hydromel. malvar. pistentur, traiciantur per seraceum, de pulpa sume 3 ij. suc. glycyrrhiz. 3 ss. iteos Flor. 3 ij. sem. anif. fenic. dalc. an. 3 ijs. sem. angel. cardam. an. 3 ijs. mastic. oliv. an. 3 i. cinam. inter. 3 iij. croci 3 ij. Terantur terenda in alcohol, adde duplum saponis Venes. alb. & cum syrupo pectorali f. Electuarium, addend. ol. anif. 3 ss. dof. quant. nuc. moscat. bis terve in die.

Mel Passilugum de quo sæpius supra dictum est.

℞. Passul. 3 iv. aq. f. lb xii. macera per 24. dein coq. ad tertias. Colatura coquatur ad mellis consistentiam, & usui servetur.

Tabella de Alchata de quibus mentio supra facta est.

℞. Spec. diarrag. frig. pulv. glycyrrhiz. ana 3 iij. sem. papav. alb. 3 iij. iteos Flor. 3 iij. sacch. alb. 3 iij. cum pulp. alth. q. l. f. Tabella.

Post detersionem, si opus sit validâ exsecatione ulsi-vetur suffusus talia.

℞. Auripigm. ex ciceribus vitis vel cum flor. sulphur. sublimat. 3 ss. Tabaci Indici opt. 3 iij. tussilag. rad. enul. calam. arom. ana 3 iv. lign. aloes. benzoin. gum. gajak. naturalis ana 3 i ss. f. pulvis subtiliss. & cum cereb. Vener. q. l. vel balsam. Peruv. f. trochiscii num. 12. pro salina, cupus fumus excipiantur cum infundibulo.

Sæpius Tabacum compositum sequens præscribo.

℞. Fol. tussilag. siccat. 3 i. laur. saliv. malabar. an. 3 iij. rad. enul. 3 i ss. cort. guajac. gum. ejusdem an. 3 ijs. rabac. Indic. 3 iij. succin. oliban. an. 3 vii. auripigm. Ravif. scintillant. 3 ss. Auripigmentum, succinum, oliban. cort. & gum. pulverizantur, & cum cæteris crassiusculè Incisus misceantur; & capiat fumum insular Tabaci vulgaris, idque paulo ante assumptionem apozematum pectoralium bis terve in die.

Si Empyema per laus alterutrum viam moliantur, laus affectum fovetur focu seq.

℞. Rad. alth. lil. alb. an. 3 ij. brion. ari ana 3 i ss. enul. 3 iij. fol. malv. pærietar. fenecion. ana m. i. scabios. heder. terrestr. marrub. alb. ana m. ij. sem. fenugrac. 3 x. sem. anif. fenic. ana 3 iij. Coq. in aq. f. part. xii. mell. pite. 3 acet. scillit. part. i. Colaturæ adde ol. violat. 3 ss. chamem. rut. ana 3 ss. Mf. & cum spongulis eodem modis f. Focis mane & vesperti per horam integram.

Post focum, optimè detersâ parte, applicetur Emplastrum sequens lateri affecto.

℞. Empl. diachyl. iteos 3 iv. pic. Burgund. 3 iij. ladan. 3 ij. gum. caran. racamzhae. an. 3 i. pulv. hor. charum. mellior. trifol. odorat. ana 3 i ss. pulv. cummin. eor. flor. sulphuris ana 3 vi. croci 3 ij. bals. Peruv. terebinth. Vener. an. 3 vi. cer. flav. q. l. f. Emplastrum. Aut applicari potest Emplastrum Dial sulphuris Rolandi.

Si adsit caranthus, conveniunt fontanellæ, vel in futura coronali, vel in homoplatea.

Aque Thermales sulphureæ hic maxime conveniunt.

Paracentesis atrequum vires sint nimis cumque semper fere felicitat succedit, appetto latere inter quintam & sextam costam (ab inferioribus numerando) eo in loco ubi sub infimo exortus pectoralis musculi angulo musculus serratus major & epigastri obliquus externus dentatione juncturam, scapello acuto panniculo obligato deorsum nactae mucrone, servatâ rectitudine fibrarum intercostalis musculi, & cutem ipsam cum subjectis partibus audacter dividat Chirurgus, adactâ in superiorem costæ quintæ partem acie. N. B. Potius antiorium aliquanulum quam versus spinam secandi sunt omnes Empyematis, quævis diaphragmate & pulmonibus qui in ista parte vulnerari nequeunt, summo inter secundam expansionis momento. Dein fiant sectiones vulnereis, detergentes, & postea efficaces, & consolidantes. *Theodor. de Mayerne Prax. Medic. lib. a.*

Hic in Curatione Empyematis jam addamus quæ de Paracentesi thoracis, habet Thomas Fienius in suo de præcipuis artis Chirurgicæ controversiis libello sic autem ille.

Paracentesis est sectio, per quam sit valnus penetrans in corporis cavitatem. Erit autem per paracentesin intelligitur proprie tantum sectio, quæ fit setto figido, tamen volo ego etiam hanc latius considerare, sic ut sub paracentesin non tantum sectio comprehendatur, sed etiam ultio, quæ fit ulcus penetrans. Perforatio enim usque ad corporis cavitatem sic duobus modis, vel ultione, vel sectione. Quia autem utraque est ad eundem finem, ideo utramque sub generali nomine paracenteseos hic comprehendere volo. Dico, penetrans in corporis cavitatem. Corporis autem cavitates duæ sunt; una supra diaphragma, quæ est cavitatis intra thoracem contenta: alia sub diaphragmate, quæ est cavitatis in abdomine contenta. Ileo duplex est paracentesis; alia pectoris seu thoracis, alia abdominis.

Utrius, & finis utriusque paracenteseos unus est, ut nimirum per foramen sic arte factum aliquod, quod intra illas cavitates contra naturam continetur, & alia ratione à natura excludi non potest, educatur. Quod ibi continetur, vel est pus, vel aqua. Itaque omnis paracentesis est aut ad pus, aut aquam; & vel ex pectore, vel ex abdomine educendum. Pus in pectore colligitur, vel à præcedente angina, vel pleuritide, vel perignemonia suppurationis, & ruptis, & sic affectus vocatur empyema. Vel etiam à vulnere, vel casu ab alto ruptis intra venis & sanguinem multum effundentibus, qui in pus convertitur. Pus intra abdomen colligitur aliqua phlegmone: alioque partis, intra ipsum contentæ, suppurationi aut ruptæ, ut renum, hepatis, mesenterii, peritonæi, alioque. Aqua colligitur supra Diaphragma in cavitatem pectoris, sic ut pulmone innatet, ex pulmonis nimia refrigeratione, pericardii fistula, aut feri ex oculis venarum diapedesi. Erit in affectus vocatur hydrops pulmonis. Aliquando colligitur aqua in abdomine, & ille affectus vocatur Hydrops simplex, seu Ascites. In his omnibus affectibus convenit paracentesis. Puto ego, adhuc aliam causam esse, propter quam paracentesis fieri possit; nimirum, non tantum, ut aliquod ex cavitatibus corporis evacuetur, sed ut aliquid etiam in eas immittatur. Sic potest fieri hæc sectio ut decocta aliquæ abstergentia, cum syringis iniiciantur; interius scilicet ulceribus aliquot difficilibus existentibus, quæ curari non possint, & ad quæ non possint alia ratione medicamenta commode pervenire. Sic Harcerus insignis Chirurgus Hispanus docet, ulcera pulmonis, & Phthisim facile esse curata, & sese sæpius ea curasse, & curæ modum

modum docet hunc, ut nempe in pectore scdō fiat, & per foramen decocta detergentia inficiantur, quibus alius eluatur, mundetur, & consolidetur.

Quæritur autem: an unquam paracentesis pectoris sit facienda? Videtur autem quod non, auctoritate Pauli Aginetæ l. 6. c. 44. ubi dicit: *aliquis nū scdōne, vel ostione thoracis prouturva usque ad cavitatem. Sed isti, inquit, sanum mortem inferunt, vel faciunt, ut fistula remaneat.* Hollerius comment. Sect. 6. Aphor. 27. dicit: *de duos vidisse empyicos, sed unum eorum ovisse, alterum fistulam ulcus forasisse.* Hic ratio videtur suffragari. Quia si in thorace foramen fiat, per illud externus aër ingreditur, & calor, & spiritus interni egrediuntur, & cor, & pulmo, principes & calidissimæ partes, spiritusque plene testigabuntur, & debilitabuntur, & mors sequetur. Secundū quia est communis opinio Medicorum, quod pulmo moveatur fuga vacui, ad mortem thoracis. At si in pectore sit foramen, jam cessabit ratio illa fuga vacui, quia aër, qui potest de foris ingredi per foramen, faciet, ut tunc non sit amplius tale periculum vacui, & ideo debet, mors pulmonis cessare, vel saltem valde minui; pulmonis verò motu vulnere immittitur & parte interiori cavitatem opplente, & respiracionem impediens. sequitur, quod fieri debet suffocatio, & mors. Saltem, cum in cavitare utriusque thoracis pus continetur, non poterit scdō talis alia ratione fieri, quia illa scdō nunc fiet, vel in uno latere, vel in utroque: si fiat in uno tantum, fiet frustra, quia per illam tantum poterit evacuari pus, quod in illo latere est, quod autem est in opposito latere non poterit, & tunc illud poterit adhuc tam bene mortem causare per se, quàm antea. Si fiat scdō in utroque latere tunc omnino sequitur, quod non poterit pulmo fuga vacui moveri, ergo necesse erit pulmonem à respiracione cessare, & ægrum mori.

Contra verò quod hæc scdō in empyicis, & hydrope thoracis aliquando fieri possit, docet, Hipp. variis in locis. Nam lib. 3. de morbis docet, quomodo empyemate laborantes sunt urendi, & secandi. lib. de intern. affect. docet costas ipsas perforare in hydrope pulmonis, quo per foramen aqua valeat exire, & Aphor. 27. l. 6. dicit: quicunque empyici aut hydropeles sunt, & secantur, vel urantur si pus vel aqua confectum exant, moriuntur. Ubi insinuat, quod illi quidem levari, & nri possunt, sed hoc tantum sit cavendum ne aqua & pus confectum faciant. Porro omnes scdō Prædici docent in empyemate, si videamus, quod natura intra certum tempus pus ejicere non poterit paracentesi esse faciendam. Eri enim illa absque dubio non sit periculi experta, non est tamen cetero lethalis, sed sapissime potest curari, ut experientia docet. Præstat ægro remedium adhibere, à quo sit spes sanationis, etiam si periculi aliquid habeat, quam ceteræ morti relinquere. Si enim sic relinquatur vel mori moriamur, multitudine puris suffocari, vel quia pulmones in eis inflammantur, & corrumperunt vel in phthysin abeunt, quæ omnia sunt mala lethalia. Quod autem hæc scdō non sit tam periculosa, ex eo patet, quod omnes singulis diebus experimus, plurimos homines convalescere, qui vulnere thoracis penetrativo læsi fuerint. Hæc accedunt exempla eorum, qui passi talem paracentesin, tamen fœce curati. Scribit Plin. lib. 7. cap. 50. quod Phalaris deploratus à medicis vomica laborabat. Et cum mortem in ære, inquit, quaereret, vulnere pectore medicinam ab hoste invenit, & per vulnus erumpente pure suis cœtus. Idem scribit Val. Max. lib. 1. cap. 6. Hipp. in Coacis prænotionibus scribit, se c. mperum habere, usque ad sectionem quoddam evasisse in diu nri thoracis ulceribus. Paichalius li. 1. c. 39. commendat hanc sectionem, & dicit, quen-

dam nomine Lupum sic ab empyemate fuisse curatum. Velatius in consilio pro vulnere Ducis Tetræ novæ, dicit, se hæc sectione sapius usum fuisse, & alios uni se vidisse, & se nunquam advertisse ea aliquid sinistri, aut contra præcepta æris evenisse, & licet corrigere aliquando, aliquos sic scdōs mori, non fuisse tamen mortuos ratione istius scdōnis, sed magnitudinis primi mali propter quod scdō erat instituta: scribit Brasagomus in suis comment. in 6. Aphor. 27. se quando suppuram viderit, se sanatum fuisse. Saxonia etiam se unum scdōis dicit, & adhuc vivere. Patzcius, Haslarus, Gulinensis, aliquæ Chirurgi celebres hanc scdōnem commendant, & faciendam docent. Quapropter ad argumenta, in contrarium alata sic debet responderi. Ad auctoritates, dubium non esse, quin aliquando scdō moriantur, sed id sæpe accidit, ut air Velatius, ratione Empyematia, quod interna corruptio, & non scdōnis, sæpe quod scdō mala sit facta, aliquando foris æris propter ipsam sectionem. Sed non sequitur, quod ideo remedium omnino sit omitterendum, quod aliquid quando obstat, sufficit, quod possit sapius prodici, & ad hoc ut in desperatis ea usus adhibetur. Ad rationes, atque ad primam: non propter foramen interea illas partes valde refrigerari, propterea quod parvum sit, & semper empyicis, & aliis sineis bene sit lectum, & clausum. Ita videmus ventrem sæpe esse apertum, cerebrum esse denudatum, thoracem à vulneribus magnis peritum, & nihilominus tamen adhuc ægro convalescere, nec exinde interire. Illas partes adeo refrigerari, ut inde mortem sequi necesse. Ad alteram dicunt, quod respiratio non sit fuga vacui, cessi communis scholis medicorum hæc sententia. Scribit enim Felix Platerus, & alii, sese sæpe ægros habuisse, qui ab utroque thoracis latere penetranti vulnere afflæti fuerint, qui tamen non deficiunt, propterea commodè respirare, quod tamen omnino necessarium foret, si pulmo fuga vacui, ad morum thoracis moveretur, ut asserunt Sælbust etiam Alex. Benedictus, Nicolaus Pissus, & alii, quod cum ab utroque latere pus continetur, quod ab utroque latere scdō sit facienda: quod non facient, ut utroque vulnere thoracis respiracionem cessantur, aut pulmonem fuga vacui non amplius motum huius crediderit. Sed posito, quod ita foret, adhuc tamen posset scdō utriusque fieri, quando pus in utroque cavitate continetur, sed non simul, utrum una post aliam, scilicet pure unus lateris per sectionem ipsius lateris evacuatione, & vulnere iterum consolidato. Possit scdō etiam in altero seu opposito latere fieri.

Ut hæc paracentesis commodè fiat, ante omnia considerandum est, quia locus ei convenientis sit pro quo sciendum est, quod semper scdō fieri debet, in loco, in quo pus continetur, & in illa parte, per cuius foramen potest pus exire. Nam si scdō fieret in eam usque cavitatem, in qua non est pus, frustra facta esset, & frustra periculum crearetur, & Medicus ignominia affectus. In thorace autem duæ sunt cavitates distinctæ: una à dextro latere, à sinistro altera: propterea quod membrana, mediastinum dicta, in medio thoracis fit confissima, & unam ejus medietatem ab altera separat: ea quo fit, quod pus, quod in una cavitate est collectum, non possit ad alteram cavitatem venire. Accidit autem, ut aliquando pus in una cavitate, aliquando in altera erutum, in utraque aliquando cavitare colligitur, quapropter multum refert, in quo latere scdō fiat. Colligitur pus in uno vel altero latere, prout phlegmone vel in uno vel in altero latere est generata.

Quæ in dextera pars facta est, in dextram civitatem pus deponit; quæ in sinistra, in sinistram, Per

pleuriticidem semper in unum tantum latus pus deponi potest, per anginam & peripneumoniam, aliquando in unum tantum, aliquando in utroque. Nam in angina pus quod effluit, & delabitur in tracheam, interdum potest dilabi in unum tantum tracheæ tantum, sed dexterum seu sinistrum: interdum in utroque. Trachea enim, cum ad pulmonem pertingit, in duos ramos bifurcatur, quorum unus in dextram, in sinistram pulmonis partem alter fertur: & exinde in sinistram aut in dextram cavitatem thoracis vel in utramque. Peripneumonia etiam est aliquando in uno latere pulmonis tantum, aliquando in utroque. Cum est in utroque, potest in utramque cavitatem pus depocere, et tunc non necessarium: quia et in utraque parte fit, non tamen necessario abscessum facit in utraque parte, aut erumpit. In quo ergo latere pus coarctabitur, in eo erit secandum. Si autem in utroque latere coarctetur, quid erit faciendum? Dicit Alex. Bened. lib. 10. cap. 35. & Nicolaus Pifo ac alii, tum in utroque latere esse secandam, sed non eodem, alius, die. Et ceti, si in utroque latere pus continetur, vel non erit secandum, propter periculi magnitudinem, vel si secandum erit, secandum in utroque: nam aliqui, quod in opposita cavitates pus continetur, non poterit per opposita sectionem evacuari, & sic maneat idem periculum moris à pure in uno adhuc latere contento, quod antea erat à contento in utroque.

Cognoscendum ergo imprimis exactè latos est, in quo pus continetur. Illius cognoscendi varia signa sunt, tumor, calor, dolor, pondus, & strepitus puris fluctuantis. Imprimis dico, tumor: quia tumet, & subtilius quodammodo est latus, ubi collectum pus est, cum cutis exterioris livore quodam, & calore, quem corrupta evaporatio inducit. Sed & naturæ beneficio pus aliquando extoritur extrudetur, atque in musculos externos erumpit. Calor etiam est signum, quia latus illud, in quo pus est, magis calet. Hinc Hippoc. l. 3. de morbis, ad sciendum, in quo latere pus continetur, docet, totum thoracem creta liquida, vel terra crassica obducendum esse, & quæ pars primo fuerit exsiccata, in ea pus contineri. Tertium signum est pondus, quia cum æget lo oppositum, ac sanum latus incumbit, illi pondus aliquod à superna parte pendere videtur, unde interdum angustia premitur, & tulli fatigatur, & majore dolore infestatur. Denique fluctuatio & strepitus manifestus puris auditur in affecto latere, cum æget convolvitur, nisi forsitan puris crassities aut copia, totum spaciū implens, impediat. Hinc Hippocrate. alibi docet, ægrum manibus esse tenendum, & roto corpore concutendum, & Medicum oportere antepetori dolenti adhibere, ut audiat, qua parte strepitus puris audiat. Cognito latere in quo est secandum, locus præcisè est cognoscendus, illum locum aliquando monstrat natura. Itaque si aliqua parte thoracis tumor, aut calor maior appareat, ibi est secandum. Extra illum casum attribitio locus est inveniens.

Aliqui dicunt, intra secundam vel tertiam Costam sectionem fieri debere. Aliqui, inter tertiam, & quartam. Alii inter quartam, & quintam. Alii inter quos est Vidua Vidina. Inter quoniam, & sextam dicunt esse secandum. Plerique omnes, vel inter tertiam & quartam, vel inter quartam, & quintam statuunt. Ego noto famosiore assere, inter quartam & quintam. Illæ autem costæ debent computari ab infra sursum, à costis notis incipiendo: nnde, cum dicimus, quod debet sectio intra quartam & quintam, non debetis tunc intelligere costas spurias, sed veras & legitimas. Verum adhuc multum refert, an versus pectus an versus spinam locus eligatur. Versus

spinam periculosus est: Imo quia ibi pectus pleura vicinior est. Secundo, quia ibi costæ sibi mutuo sunt viciniores, ad latera autem costarum decurrunt magnæ venæ, quæ sunt venæ ægyi propagines. Itaque illæ venæ ibi sibi notu sunt vicinissime, sic ut difficile sit secare inter costas, quin illæ venæ tangeantur. At sursum versus pedus costæ, & venæ divaricantur, & paulatim sunt remiores, & idcirco illi minori periculo sectio fieri potest, debet ergo locus eligi, anteriorum, versus pectus, sex aut septem à digitis transversis remotus à Spina Hippoc. 1. de internis, si secti. advertens periculum in sectione esse, ne illæ venæ tangeantur. Docet alium modum, qui videtur esse tutior, ut nimirum supra tertiam costam secetur, & tunc ipsæ costæ terebello perforantur, & inde pleura transfugatur. Illa sectio videtur minus periculi habere. Recentiores tamen Medici nunquam eam usuparunt: quod propter necesse est, ut illa magnum aliquod incommodum habeat. Illud imprimis est, quod aliqui habere costas tam parvas, & angustas, ut eas perforare impossibile foret. Secundo, quia etiam habent costas satis magnas, tamen nemo eas tam magnas habet, ut per eas magnum foramen fieri possit, sed tantum parvum: per parvum autem foramen non possit satis commodè pus & sæpe tam multum, & crassum evacuari, sed tantum aqua. Et idcirco in quibus propter aquam in thorace paracentesis fit, in his hæc collationem perforatio locum habere possit: vel etiam in his, qui costas habent valde latas. At vero in his, qui angustas, vel qui Empyemate Laborant, non item, ut Libanius super Aphor. & Parus in Chirurg. etiam attestantur. Realdus Columbus insignis Anatomicus, alium locum insinuat, & dicit, commodè, & citra tuto hanc perforationem in dextro fieri posse, quam alii quoque nonnulli sequuntur. Sed cum non habeant certam aliquam de illo loco doctrinam, vobis vulgarem intra costas sectionem commendando.

Quo ad modum perforationis. is duplex est: vel enim fit sectione, vel unctione. Alii sectionem, alii unctionem præferunt. Incedim fit utroque modo. Utilio autem dupliciter fieri potest, vel cauterio actuali, vel potentiali. Antiqui solebant ferro candente urere, ut ex Hippocrate, & Paulo manifestum est. Parus lib. 7. cap. 10. dicit, unctionem quæ cum ferro candente fit magis esse secutaria. Idem ait Leonus: Ratio, propter quam id dicant est, quia ubique inter costas sunt magnæ venæ, quæ facile tangi possunt, & si sectione tangerentur, periculum adferrent uagnæ, & periculosa hæmorrhagia: at si ferro candente tangerentur non est illud periculum, propterea quod venæ à cauterio clauduntur. Vidua Vidius, dicit, debere fieri sectionem cum scalpello, postea ferro candente locum esse intendendum absque dubio ad eandem hæmorrhagiam evitandum: Verum ego imprimis non proba, ut locus ferro candente nique ad cavitatem inauratur. Nam præterquam, quod hoc remedium fit horrendum, & crudele, non convenit etiam corporibus, jam à morbo tam debilibus, & attractu ignis febris angere, & membrana succingens costas inflammari possit. Idcirco Paulus, & Albucasis, cum de unctione nique ad cavitatem loquuntur, dicunt: si se cemedium; à quo statim mors sequatur. Quod si vero proscitio fiat, & tum videant sequi hæmorrhagia, quidem ut tum insuper utilio fiat, sicut Vidius dicit, esse necessarium. Restat ergo ut perforatio fieri debeat, vel sectione, vel cauterio potentiali: & vel alterutro solo, vel utroque simul. Cauterio potentiali solo iuvare, nimis longæ moræ est: sunt enim decem dies, antequam escara excidat, & interim à putredine partes corrompuntur. Hodie moderni Chirurghi utuntur vel sectione sola, vel cauterio potentiali, & postmodum sectione per escaram ab ipso cauterio induram.

Uterque

Uterque modus est bonus. Sed qui sola sectione fit habet interim periculum hæmorrhagiæ conjunctum. Qui vero cum prævio cauterio fit, non item: per escharam enim venæ clauduntur. Quapropter puto ego, hunc ultimum modum esse incensurum, uti etiam Guilielmus attestatur: non tantum, quod per hanc non sit periculum fluxionis sanguinis, sed etiam, quia, cum eschara excidit, magnum sit foramen, quod ultra diu apertum manet, per quod pus potest evacuari. Nam, si sola sectione perforatio fiat, debent ægri continuo cruciati impolitis tentis ad foramen apertum retinendum, quod & calorem, & fibræ, & inflammationem parit. Si simplex sectio fiat, illa debet fieri, cum novacula angusta, & acuta, non autem scali-ello; quia instrumentum debet ab una parte esse obtusum. Scissio debet fieri superius deorsum, sic, ut obstrua pars colli sit sursum: quia sic cavetur, ne vena que sub costa jacet, vulneretur. Et debet duci oblique secundum ductum fibrarum musculorum, nimirum versus deorsum ut sic facilius postea iterum volnus conglutinetur. Cum autem potentiale cauterium imponitur, tum post factam escharam sectio fieri debet: non cum novacula, sed lancetta, ad cavitatem usque: & tunc non necessarium est ductum fibrarum observare, sed præstat rectè transversaliter secundum costas incidere. Sectio etiam facienda est, cum æger expirat, propterea quod pulmo tunc contrahitur, & à costis recedat, & sic minus tunc tangi possit.

Sectione facta pos, aut aqua per foramen educenda sunt, sed paulatim. Nam si confertim educerentur, subire mortis periculum est, sicut Hippocrat. sect. 6. Aphorism. 27. & aliis libris, toxicis est attestatum. Tunc suppurantia, quæ crustas excidere faciunt, sunt deforis adhibenda, intra vero per foramen, cum syringa, injicienda sunt medicamenta, quæ leniunt, & ad temperiem reducendi corruptas partes simul, & pus detergendi vires habent, ut sunt aqua hordei cum melle rosato, aliaque decocta detergentia. Fuit etiam alius veteribus empyicus curandi modus: scilicet ut multis crustis superficialibus, non autem in cavitatem penetrantibus, circumquaque thoracem urent, quem docet Paulus l. 6. c. 46. Alibucal. l. 1. c. 1. & meminit Gal. l. 7. Aphor. 44. cum ex Platone Comico refert, Iulianum Evangelæ filium ab Euphronte Medico, multis escharis inustum, fuisse curatum. Sed de illo modo nos hic non loquimur: sed tantum de tali unctione, quæ in capacitate thoracis penetrat.

Quoad tempus paracenteseos faciendæ, illud vel est generale vel particulare. Quoad generale tempus, dicunt omnes eam in emphyemate esse faciendam ante X. à puris eruptione diem: nam post illud tempus vitæ ægri nimis debiles sunt, & partes thoracis corruptæ inceperunt. Unde etiam si tum paracentesis fiat, partibus sic corruptis, frustranea esset, & æque bene mors sequeretur. Monent insuper Medici ex precepto Hipp. in Coacis prænotionibus, ut neque tum statim à puris eruptione etiam sectio fiat, sed usque ad XV. diem post illam expectetur. Rationem dicunt, ut pus illud interim concoquatur, quod perpetuo post eruptionem crassescere, ac refrigerari potest. Verum puto ego & aliam rationem esse potiorē, ut interea ex propriis signis certius nobis constet, an ita pus erumpere possit, & an in thorace, & qua ipsa parte sit collectum: simulque videatur, an non illud alia aliqua vi à naturâ commodius sit expellendum.

Hæc generalis regula esse debet, ut nunquam paracentesis fiat, cum suspicio jam est, partes intra thoracem à pure corruptas esse. Secundo, ut nunquam fiat, nisi adhuc cum mediocriter vires agro-

rantis constent: nam cum illa vehementer sunt prostratæ, non sunt tam magno remedio tolerando; sed æger succumbit, & moritur. *Hællenus Thomas Flenus de Paracentesi Thoracis: Plura rursus de ea videri possunt sub simili Paracentese. Sequuntur jam præ Emphyemate.*

Consultationes.

Pro quodam Illustri, & Nobili Juvene Emphyemate, seu suppuracione laborante.

Quoniam hic locus effectus in casu Illustris & Nobilis Juvenis apud omnes non ita constat, thoracem tamen ego secundum cavitatem esse existimo, thoracem quidem, ut ligaret spiritalis valde difficilis, secundum cavitatem, ut gravitas illa: quæ in profundo ejusdem præsentitur, necnon fluctuam ibidem percepta, demonstrant.

Et quoniam cavitatis modus proprius est angustia, & hæc multiplex esse solet, puto ego angustiam hanc esse constipationem factam à materia purulenta, quæ ex abscessu anginoso suppurato, atque disrupto in thoracem cecidit, nam cum abscessibile præcessit, per os non fuisse expurgatum, & nunc pus cum tussi expavit, satis apparet thoracis cavitatem dictam à pure constipari: Ex quibus, nisi fallor, constat, quæ sit immediata causa constipationis, est enim pus illud, non quidem genitum in thorace, sed in partibus ipsi superioribus, occasione angini progressæ productum: Pus namque cum tussi rejeclum thoracis actiones necessariis sequitur, expulsiōnem inquam, atque codionem expulsiōnem quidem tantum, quando pus in eodem thorace non generatur (sicuti in casu proposito contingit) codionem vero simul, dum generatur in pectore, seu caviente thoracis occasione materię à capite defillant, quod in patiente nostro minimè locum habet.

Quibus ita breviter constituit. Dico pus ut est quid à toto genere præter naturam esse eradicandum, ut crassum, & viscidum detergendum, ut acre attemptandum, ut lædit thoracem esse educendum per runculationem, & convenientia remedia, proportio tamen semper omnium viscerum thoracis est conservanda.

Quod autem in similibus casibus Medicus vix possit ad optatum finem pervenire, de se patet, quinimod nisi spatio 40 dierum materia hæc expurgetur, actum erit: Accedit (& hoc in casu præsentis non leviorem timorem incutit) quod longè pejus est Emphyema, ad Anginam, quam ad defillationem subsecuti: Quapropter nisi citò succurratur, imminet hecica imminetque phthisis: Quod tamen aliquid spei pollicetur, est ægri prudentia, & ætas juvenilis, nec non & illud quod tota thoracis cavitatis haud est repleta, sed tantum dextra ejusdem pars attingitur.

Accedens itaque ad curationem, venæ sectionem improbo, sed alius non consentiens iudico ad thoracis perforationem in parte dextra inuisione, vel sectione faciendam erit deveniendum.

Quoad medicamenta, quæ antequam chirurgus ad perforationem accedat, remanda sunt, dico quod vel ad pus quiescens, vel motum dirigantur, si ad quiescens, jam oportet materiam attenuare, atque discutere emplastro ex radicibus altheæ, pulvere cimini, radicis ieros, & oleo liliaceo, vel cætaris convenientibus, uti est Diachylon gummarum, Diapysides, & sacrum.

At si idem pus moveatur, prout ad partes diversas movetur, diversa quoque sibi requirit medicamenta.

Si igitur ad cutim facta perforatione utendum est multa, & melle rosato simplici cum aqua hordel; At si ad pulmones incidunt, convenient oxymel simplex, scillinum, loch de pulmone Vulpis, sanum, & expectrum, adjecto modico syrupi violati, vel de liquiritia, vel de farsara, propter puris mordacitatem. At si vias ritque adeat, decoctum convenit Asparagi, funiculi cum lacte sem. melonum, si verò ad alvum tendat, licebit uti mel. ros. sol. agarico, & clysteribus commuobus.

Quoad victum necesse est patientem cibis uti medicinalibus. Ideò pute quiescente, coovenit amygdalatum, & pineatum, si moveatur ad cutim mel cum albaris citi opportunum, si ad rentes petroselinum, Asparagus, & lac sem. melonum probantur, si demum alvum petat, jua caullum, merensalis, & passulatum mirum in modum poterit. In materia quiescente coovenit vinum odoratum, in materia verò, quæ ad Cutim moveatur vinum cum melle potandum erit, in ea, quæ ad rentes à vino medicato cum radicibus aperientibus non est recedendum, ac tandem in materia, quæ ad alvum inclinationem habet, vinum alteratum cum seona, cum carrauo accommodatum existit. In reliquis autem quid sit agendum, nunciatque ex medicis etiam trivialibna manifestum esse iudico, atque ideò reliqua consulo prætermitto. Denique quam maxime oro, ut sanitatem huic Illustri Juveni miscet laboranti concedere ne designetur. *Julus Cæsar Claudius in Consulatu. Medicis.*

De Pleuritis in Empyema degenerante. Pro Reverendiss. Vestali Abbate.

Reverendissima & Religiosissima Vestalis Abbas, ætatis annorum 54. temperamentis calidi, ad humidum vergentis, destillationi obnoxa pituitosa mareria à capite ad varias corporis partes, conjua ratione antehac dolores articulares passa est, duobus abhinc mensibus febricitare cepit, febricitæ singulis diebus habebat annotationes quolibet tertio die sub respondentem, cum levi quadam extremorum refrigeratione; ac deinde incalcescentia, vigilis, & capitis gravitate: cui quarta die supervenit dolor gravis in thorace respirationi molestus, cum difficili decubitu in utrumque latus, tussi, cum excretionem materie pituitosa & aliquando crenata, urinis crassis, & pulsu oppressio adeò gravis, ut vix percipi posset motus distoles: quibus accesserunt animi pathemara, & palpitatio cordis. De agenda propterea consulo.

Quocirca in consulationem acciti, contractatis vlscribis naturalibus, exacerbatoque dolore ad compressionem partium utrinque sub collis mendosis, in eam sententiam deveni, quod laboraret inflammatione spuria sepe transverfa, cum ipsius Medici clinici, aliique constantium tuerentur, febre scil. mali moris eam detineri; quæ causa fuit, cur tunc, & antea plurimis cardiacis usi fuerint, atque vellicantia infernis partibus applicuerint, levita alvo, & præparatis humoribus, sanguineque misso ex salvetella. Ego verò obfirmatus in prima mea sententia, eclegmata præscribens duxi ex syr. de farsara, acetolo simpl. syr. de hyssopo atque in dies dolore utrinque invalescente, præscriptum fuit ol. amygd. dulc. ad ʒv. cum ʒij. syr. acet. simplicis, à cujus usu, remittente dolore, cum sensu majoris gravitatis, & difficultiori decubitu in latu dextrum, suspicatus fui inflammationem in abscessum murari in sinistra parte pleuræ, qua pertingit ad costas mendosis: ac propterea præscripto aceti clystere, quod ob virium imbecillitatem dejectionis per os sumper ferre non posset, morque somento parti affectæ ex flor. chamæm. rad. alth. semib. lini, & melloto, in vino albo generoso manè, & vesperi, cum

spongia calida applicato, dolor remisit luculentius, ita ut decumbere posset in utrumque latus, pulsus invaluerunt, cordis palpitatio, febrilitque remisit, gravitate tamen in parte affecta persistente. Lambitum propterea validius fuit præscriptum, ex oxymelite scillitico, ut & cardiacum, Mithridaticum nempe confectio, quam bis sumpsit; ac tandem validior tussi excitata, abscessusque dilans, ex parte cepit materiam purulentam, cum quibusdam sanguinis notis: atque ita præsens affectus in empyema degeneravit. Quare tunc ed collimavit consilium nostrum, ut expurgaretur materia illa, prænuñciato Hipp. prognostico 5. Aph. 15. quod quicunque ex morbo laterali Empy. sunt, si 40. diebus purgentur, à qua die sic disgressi, liberantur; alioquin ad tabem transiunt.

Expurgari autem debet sensibilitet, vel per partem affectam, vel per utram, vel per alvum, vel per os, & spurum. De evacuatione per partem affectam, thoracem, scil. locutus est Hippoc. 6. Aph. 27. cum dicit: *Quicunque empy. urunt, aut fræant, si utrumque conferim effluat, animo moriuntur.* Ex quibus patet, quoad educi potest, vel per unctionem, vel per sectionem. Ad alterutrum tamen tunc tanum deveniendum esse ait Gal. in commento, quando nulla est spes materiam evacuandi per os, adeoque maxima difficultas respirationis, cum periculo suffocationis. In hoc solo casu hæc operatio administranda. Veram in presenti, quam levior sit spirandi difficultas, quam ante suppurationem, vireque sint robustiores, ideo ipsa supersedendum erit, quin potius procuranda esset prædictæ materie expurgatio, vel per vias urinæ, ut non raro fit, Calcei testimonio 6. de Loc. Aff. 4. cui subscripsit Paulus Agineta, & Arius, cum Recentioribus, scda nempe ipsius transmissione per tanum venæ sine pari inferum sub diaphragmate in vream cavam prope emulgentes, per quam ius ad urinas permeare potest, ut inquit Fallopius; non verò per venam arterialem ad dextram cordis ventriculum, hincque in venam cavam, jecur, & crines, ut assensit Melior; valvulæ namque venæ cavæ in corde admittunt quidem in ipsum materiam, non autem ejusdem ab eo effluxum ad jecur: per alvum itidem expurgari potest prædicta materia, vel per ramos venæ post diaphragma pertransientes à quibus per venam portæ ad intestina, & alvum patet via, ut asseruit Gal. 6. de Loc. Aff. 4. vel tandem per os, tanquam per locum omnium accommodatissimum, ut optimè observat Gal. 5. de Loc. Aff. 1. & sæpius expe ienis comprobatur est. pro ut contrigit Reverendiss. nostræ Patienti, quæ singulis diebus extruist 8. libras, & quod excedit, purulentæ materie; cujus rei causa nos quoque eclegmata præscriptimus patet ex syr. de farsara, de liquiritia, looch de pulmone vulpis, de caulibus, radicibus Ireos & feminibus erri pulverizatis, syr. acetoso simplici exceptis.

Præscriptissim in primi. victum detegentem, & hæmetantem, cremotem hordel integro cortice. Porus loco multa fuit dilura aqua hordæca, cum coriandis præparatis. Atque ita Divina juvante clementia 40. dierum curata fuit. *Bened. Siwale. Consil. & resp. Medici. Cret. 2.*

De Empyemate ex vulnere thoracis. Pro Nobilissimi Cretensi.

Nobilis Cretensis annorum 30. temperamentis calidi quoad jecur, & totum corpus, frigidi & humidissimi quoad caput, sub celo nocturno sæpius moratus, compositioribus & comestioribus dectis, atque incompositioribus se gerens in omnibus sex rebus non naturalibus, tribus abhinc annis, & quod excedit, gravi dolore correptus fuit in regione mamillæ dextræ, gravitatemque sensie in occipite, cum aliqua imbecillitate

aliqua imbecillitate motus corporis. His succellit tussis, spirandi difficultas, & expulsiō cum tussi prius-ioris materie novem mensium spatio: quo tempore pugnione confosus fuit in leva parte thoracis, inter quintam, & sextam costas, & luperioribus, vulnere spitham un penetrante, inferiora venter, & dorsum, cum aëris exsufflatione per foramen, sanguinique ex-cretionē per ipsum: cui panis post diu obducto accessit febris, cum ingenti ætu, magna-que spirandi difficultate, & tussi, atque excretionē sanguinis gramo- si, cum pure, & quidem sinceri, graveolentis, 30. menses. continuo. Foramine deinde per scissio anno post, ex eo valida exsufflatione, & tussi extenuitur pauci puri copia, perseverante ejusdem excretionē singulis diebus per tussim; ad libram. Propterea P. tavius se contulit, & de agendis consulti.

Tria itaque in casu præsentis inquirenda veniunt, suppositio, vulnus penetrasse ad cavitatem thoracis, & ipso patet ex præterita exsufflatione, & ipso cruci- to tunc apparuit. Pulmonum est, quoniam patet tho- racis sint affectus. Secundum, an pulmones sint exul- cerati, cujus rei suspicio est Tertio confusio idem de agendis, pro præteritis affectibus curatione. Et non im- merito queritur primum, quoniam patet thoracis sint potissimum affectus, cum in thorace continentur pul- mones, cor, cum pericardio, & septum transversum. De singulis harum partium dubium esse potest. Existimo tamen pulmones affectos quidem fuisse antea ex defluxa materie puriformi à capite, non solum ad mul- culos thoracis circa mamillam dextram, ubi dolorem; nec ad occiput tantum, & principium nervorum, ubi gravissimam, & motus imbecillitatem induxit; sed etiam ad pulmones, ubi spirandi difficultas, & tussim excrevit, cum excretionē materie per tussim. *Mor- bum enim ostendit sanare.* Verum quod ex vulnere Ir- si sint pulmones, verisimile non est. Tunc enim major sanguinis copia, & ipsius quidem ipsius fuisse- ret: qualis non apparuit, ex medicis curantis fide. Secundum, facta fuisse inflammatio in pulmonibus, in- deque febris statim se prodidit, etque perierat. Tertio successisset ulcus, ac deinde phthisis, quæ non apparet 30. mensium spatio, quo robustus permanet. Præterquam quod litus loci affecti est declivis, in quo non raro fit paracentesis in emphyemate, abique ulla pulmonum offensa. Minus suspicandum est de essen- tiali cordis labe. Successisset namque procul omni dubio lipothymia, pulsatio & syncope, nec tandem superstes fuisset. *Cor namque viscerum omnium princeps diu tolerare non potest graves afflicti, ut asserit Asellus.* De septo transverso gravior incidit suspicio, cum vulnus venit ad inferiora, atque difficillior facta sit respira- tio. Verum tamen neque septum transversum vulne- ratum fuit. Inflammatio namque, delirium, major spirandi difficultas, & motus aliqui convulsivi neces- sario supervenissent; quemadmodum conigit Theoni in obidione circa Datum sagitta in pectore percussio, ab Hippoc. de scripto 5. Epid. Hist. 93. cui statim succ- essit ritus tumultuosus, live Sardonius, & tertia con- vulsus obit: quorum neutrum apparuit. Quod si fe- bris acuta, spirandi difficultas accessit, hanc habet cau- sam: quia obducto vulnere & expurgata materia, decubens hæc ad septum & putrescens prædicta in- duxit mala. Quare statendum censeo, vulnus pe- netrasse in cavitatem thoracis, ibique singulis co- piam fuisse collectam, ob interceptam vulnere cu- rationem, neque inde expurgari potuisse, patet facta licet foramine, atque immixta fistula argentea perfo- rata: quoniam foramen illud fuit altius quam pae- erat, adeoque neque valida exsufflatione, & tussi excreti potuit; Et proinde transmissa ad pulmona materia per ipsum fuit excreta, hylterque copiosa excretaur, ob confusum humorum ad partem affe-

ctam, ubi putrescunt, ideoque & patens ipse obler- vat eandem materiam per tussim inde expurgari, non sine continuo aliquo mutamine. Cum autem trīginta menses ferè continuos fluxerit hæc materia ad pul- mones, non sine ratione dubitare licet, & de pul- monum erusione, & exulceratione. Si enim exulce- ri possunt à catarrho falso, posteriori ratione à pure corrupto, & fusio id fieri potest, cum aliquando phthisis fiat ex purulenta materia, abique ipso cru- ento, aut catarrho falso, ut asseruit Galeus, & ex- perientia sæpius comprobatum fuit. Existimo in hi- lominus in casu præsentis non esse exulceratos pulmo- nes. Febris namque continua esset, à qua tamen men- sibus elapsis erat immunis; corpus esset extenuatum magis, virisque longè imbecillioris. Quare sum in ea tententia, quod sit potius emphyematis, ex col- lectione puris in thorace, quam phthisis ex ulce- re pulmonum.

His sic habentibus, quoad essentiam, & causas præteritis affectibus, non despetendum censeo de salute patientis; quoniam affectus sit antiquus nec dum sanatus. Virum enim robur indicat calidum innatum validum esse, atque posse materiam peccantem eva- cuari, ac deinde ulcus sanari.

Quod ut fiat, tria occurrunt agenda: primum ma- teria in thorace stagnans est evacuanda, cum per lo- cum declivem magis affectus partis, tum per vias uti- nae, tum & insensibiliter per digetionem. Secundum di- vertenda est materia confusum ad partem affectam & ter- tium pars affecta exsiccanda, consolidanda, & robo- randa.

Primum intentioni satisfiet potissimum per foramen patet factum in loco declivi ejusdem partis; secundum per aquas nostras Theriacales Aponitanas, detergen- tes exsiccanes, & materiam ad vias utinæ compor- tantes, sumptas ad lib. i. singulis mane in horis, cum spiritu vitrioli; & tertio portione vulneraria, à Pareo descripta in sua magna Chirurgia. Secundum implebunt cunctum dextro brachio inultum, pro majori diversione à parte affecta. Frequentes item al- vi subductions; Capisurgaria per os, & nates: & tandem decoctum paratum ex ligno Indico, falsiparil- la, visco quercino, & ligno rhodii, cum radicibus consolida, rubi, plantaginis, & betonicæ. Tertio ex usu erunt multa iuxta cum siphone, pro deter- sione; pulveres exsiccanes injecti, & balsamica me- dicamenta. Quorum beneficio patiens Nobilissimus præfatum sanitatem recuperavit, ad laudem, & glo- riam Omnipotentis Dei. *Idem ibidem.*

Empyema à Pleuritis.

Reverendissimus Canonici annorum trīginta sep- tem citat, temperamenti totius calidi & licci, fræ- vidi jecoris, humidi capitis, gracilis habitus & pro- ceræ stature, dum sanus tunc viam agebat, mense Octobris proxime præterito, sub nona die extempo- rano lateris sinistra dolore in regione costarum legitima- rum correptus fuit, prægressa tantummodo eadem die in prandio inappetentia, sequentis vero horribilis inæqualibus, cum tussi & difficili respiratione acuta- que febre. Et cum dolor ille perseveraret, tertia die in curis decubens ad Uthen se contulit, ubi ab Excellentissimis Medicis languis ex brachio lateris af- fecti, præmissi Clystere, detractus fuit: & congrua præscripta tenui viis ratione, pectorales anctiones & lambitiva, temperata prius & concoquentia, in usum ducta fuerunt; Quibus tamen non sufficiens, dolore perseverante, iterum præmissi Clystere die sexta repetita fuit ex altero brachio sanguinis missio: igno & die septima hirudinibus ex venis sedalibus

fuit rursus sanguis extractus, cognita nimirum ab Excellentiss. Viris inflammatione interna: Die vero sequenti puris effusio in latere rupsione ab ipsomet Patientē percepta fuit, cum succederet in eodem latere fluctuatio, & materiz graveoleis ac purulenta per tussim excretio, non sine catarrhali copioso in capite defluxu. Quibus omnibus ita perdurantibus, tenui vincta à Medicis multis diebus prescripto, Expectoratione plura & varia administrata sunt: quinimo & Exiccantia atque insensibiliter digerentia, necnon per urinam ducentia: patata namque fuerunt Julapia, decoctione prius facta radicis chinæ, salsæ, visci querc. & lenicili aliorumque pectoralium ingreditientium, & Terebinthina exhibitæ: sic alia confectioes ac lambitiva. Verum hucusque, nempe ad vigintiannam secundam usque novembriis jam administrata non satis profuerunt, cum perseverent sputa purulenta & sœvida, cum macie & insensibili febricula. Verum tamen est quod postquam paucis adhuc diebus paulo pleniorē viderem Excell. Viri concesserunt, cum exigua quoque vini portione, Reverendissimus Patiens vires reassumpsisse visus est, ita ut & Bare & per cubiculum parumper deambulare possit. Sed à scisido spuro liberari cupiens de agendis consultit.

Affectum lateralem, cumque pleuritico fuisse primum dolorem, propter inflammationem ejusdem Pleuræ, & forsitan etiam lateris musculorum, ut à Viris Excellentiss. iudicatum fuisse ex Curatione apertissime præstita conjicio, ita talem eandem & ego confirmo; Contigit tamen Reverendissimo Patienti quā citissima suppuratione, octava die scilicet, forsitan quia fervidissimus fuerit sanguis: calor uterque, naturalis scilicet, & præter naturam validus, nec forsitan sputa (de quibus in relatione nulla mentio facta est) inflammationis minorativa apparuerunt. Suppurata autem atque distrupta inflammationis purulenta materia inter pulmones atque thoracem contenta, affectum empyematicum produxit, dum per sputum antea expurgata non fuit: cujus qualitas sic abunde patet, dum purulenta apparet, & sœvida à Patientē percipitur, in quantitas mihi non innotescit, cum de fluctuatione, de difficultate decubitus in laevo oppositum, nulla mentio fiat. Verum tamen est quod quantacumque fuerit, nisi in quadraginta diebus post eruptionem expurgata fuerit, in Tabem incidere Patientem pronuntiavit Hippocratices, cum à pure ipso pulmones inficiantur, & aut erosione aut frigiditate afficiantur. Quare cum hodie quadragesima tertia dies à rupsione transierit, de Tabē incipientē dubitandum est. Et quamvis Suppurati, sive Empyematici quandoque etiam à catarrhali materia à capite defluente fieri possint, hæc tamen causā in casu nostro locum non habet, tum quia præcessit dolor lateris inflammatorius, tum quia eo modo non nisi diuturno tempore fit, & tandem quia catarrhalis à capite destillatio octava tantum die successit. Et ideo verum atque legitimum pū quod ab inflammatione emanavit, in thoracē contineri credendum, cui tamen aliquam catarrhi portionem associari posse non est prius negandum. Et quamvis Patiens Reverend. infestitatem seipsum existere, hoc tamen impossibile censuo.

Medica intentio possissima in hoc statu debet esse, puris quā celeritima evacuatio, quæ itaque per viam regiam, per tussim & per sputa pectici solet: quamvis enim Galenus asseratse vidisse pulmonis vomicas per urinam expurgatas, rejecto nempe pure à pulmone quidem per levam arteriam ad sinistram cordis venericulum: à corde autem per arteriam magnam ad testes: atque illinc tandem per ureteres ad vesicam; tamen tamen censendi sunt huiusmodi casus,

sicut impossibiles apud Matthiolum atque Lancetum: Ille enim contra Galenum asserit, quod ex materia purulenta & sœvida est ad Syncope duceretur: Ille vero ait, quod unā cum pure sanguis quoque per urinam educeretur. Verum necita obijciū tenet: non prima, quia Syncope sequeretur, si in corde materia ipsa diu hæretet: nec secunda, quoniam expulsa facultas pū expellit, & rursus sanguinem trahit. Sed severa modice materiz in thoracē existens per sputum expurgatio tentanda: sicut copiosa, tisione aut ultione educenda; ut monuit Hippocratices: eoque audientius, cum afflicta pars sit sinistra, in qua scisido minus periculosus evadit. Sed pro hac operatione observandum Hippocraticis monitum, dicentis quod Hydropicos citius fecare oportet. Tabescentes vero statim urere. Quattuor quoque modis pro materia purulenta absumenda à nonnullis tentatur, Decodis nimirum insensibiliter, digerentibus & exiccantibus, sed incassum semper, si materia copiosa, & frequenter, si etiam ex grā fuerit.

Quibus intentionibus propozitis & consuetatis, exigua existente materia, per regiam viam, nimirum per sputum eir educenda: At si in latere manifesta percipitur, & decubitus super laevo oppositum difficultas Patienti evadat (copiosa materiz indicium) tunc factus est anceps remedium experiri, quā Agram ipsam certe Moni relinquere. Interim totis viribus materia per sputum evocanda Lambivis jam præscriptis: quibus addi poterit olivum sacchari & grana butyri, sive gutturæ aquæ sulphuris. Oxy mel quoque parabitur, lacta maceratione hyssopi, prassii, emulæ camp. & iteos. Efficacissimum quoque expectum Lambivum huiusmodi.

M. Hyssopi, prassii, pulgii, calamitæ an. pug. j. liquoris, hidis, scillæ, helenii, nucleorum pinorum an. 3 ss. biduo macerentur in aqua distillata & aceto, mox expressioni addatur mellis opt. q. s. ad oxy mel. consistant. Exstinctus quoque discussus opsimi parabitur ex fatina solis, binimine, addito pulvere iris, & baccarum luri, omnibus lixivio dulci reformatis.

Quod si placeat materiam ipsam ad vias urinarias ducere, usus Terebinthine aptissimus erit cum succo liquoris condensato, cui posito superpabearur ex decoctione chinæ, salsæ, exiguæ scissas, radice fasciuli & apii parata: ita enim unum facere, & alterum non omittre, non inutile erit. Et si dabit Deus, ut materia purulenta tota aliquo ex jam dictis modis excernatur, & Reverendissimus à Tabē præservetur, Vere veteris pulmonem lœvitas corrigi poterit: oti æque nostræ sulphureæ Aponitanæ.

Præscriptis autem omnibus congrua erit addenda vivendi ratio: cibos acris & salitos concedendo: Vini alii tenuis & subdulcis potum in modum permittendo: & nullam iteratam pro frequenti eir collutione parando: ceteraque omnia præstibendo, Viris Excellentissimis perquam nota: quibus nostrissimum quoque huius casus angustiam esse existimo. *Reym. Jean. Fortis Consult. & Respons. Medicum. T. 2. Cent. 1.*

Empyema & Phthisis.

Admodum Rev. Patet annorum quadraginta quinque, temperamentū coctus biliosi & sublinguini, capitis calidi & humidi, distillationibus obnoxii, duobus jam mensibus ex improvviso sanguinis cepiam, non sine aliqua purulenta, nisi excernere cepit, progressu multo tempore tenui & salsa à capite distillatione cum petenti faucium siccatate. Accersius Medicus statim missionem sanguinis iussit, visusque rationem refrigerantem & humectantem instituit, pilulam scilicet,

scil. hordaceam, & Malvæ succum depur. pro sycopo aletante. Et cum sanguinea & purulenta excreta perseveraverit, quamvis minori copia, unâ cum febrili alteratione à Patientē non percepta, & insigni nucleatoris corporis, decrevit Excellent. Medicus usum lactis instituit: cujus tamen usus porius molestus erat, ut ideo lacti subtilitatem fuerit Decoctum in jure pulli paratum radicibus graninis, foliis malvatum, cich. borag. violarum, feminibus melonum, addito cochlœari tart. albi; quibus parum aut nihil esset asfectus: quotidie osaque purulenta atque cruenta materia excreti non desit. Quare in eadem victus ratio- ne insistent, Bala-um aquæ dulcis aliquot diebus administratum fuit, sine tamen Patientis tolerantia, imo cum virtutis diminutione; & ideo hoc quoque remedium genere omisso, & victus ratione refrigerante & substantiæ humectante prescripta, ab eodem Excellentissimo Medico quod agendum queritur, & à Patientē Admodum Rev. exiit expositur.

Empyema duorum mensium ab Excellentiss. Viro in relatione descriptum, sanationem admittere non potest, si Gal. & Hippoc. credimus: etenim sicut Pleuritis non expurgati, suppurantur: suppurati verò, si quadraginta diem spatio post eruptionem non expurgentur, ab Tabern transiunt, cum post jam statutum tempus pulmoneque substantia non amplius illa servari possit, ut proutera febricitans non hœdica tantum, sed phthitica quoque necessario superveniat; ita cum jam sexagesimus dies præterierit, quo sanguis unâ cum purulenta materia per tussim à pectore excretus fuerit, & quotidie usq. in hunc diem exerceri perseveraverit, ideo Tabern fiv Phthisim jam habsecuram esse credendum. Sed præterea cum tantâ sanguinis excretio post diuturnam tenuem, & saltem à capite in pulmones distillationem, quæ non solum flacciditatem & fraiditatem pulmonum, sed evulsionem quoque, atresiem & ulcus excitare possit, siq. non tantum Phthisim secundam ab Hipp. descriptam, sed primam quoq. Phthisim ab eodem recensitam constituit, præter Empyema quod à catarrhali distillatione in thorace paulatim collectum fuit, ab Hippocrate ipso descriptum.

Quibus ita se habentibus, cum Admodum Reverendi Patris affectiones præter naturam longè superent Attem ipsam, remedia nonnulli ad vitam producendam, nullo modo ad salutem recuperandam proponi possunt. Et quoniam ex una parte purulenta, necnon catarrhali materia medicamenta exsiccantia exigunt: ex altera verò fibris & totius corporis gracilitas expetitur humectantia; ideo unum facere, & alterum non omittere oportet, ut vitam protrahamus, urgentiori tempore incumbendo. Et ideo usum lactis Atellæ bene nutritæ confirmo; & præterea Emulsionem in eadem intentionem, feminum melonum mundat. amygdalatum dale. nucleorum pineorum, in jure cum saccharo; Item carnes pulli junonis & imo parentur Mostelli ex eadem carne nucleis pineis, pistaciis, cum saccharo & exigua aqua flor. citri. Pro potu verò vinum album dulce, tenue & oligophorum: non omittere quotidianas universi corporis inunctiones oleo amygdalino recent. Pro altera verò intentione, in usum ducenda erit radix Chinæ, ita ut quatuor aut quinq. ejusdem incisæ calcule unâ cum carne semper ebulliant: imo & in vino quoq. pro potu infusæ detineantur. In cora præbeat ferculum Saxoniz, cui addatur China ipsa in pollinem redacta. Interim matricæ purulenta expe- ditione semper adjuvanda Lambivitis paratis ex Oxymeritæ, æqua portione sacchari & mellis Hispanici, cum aqua farfaræ & globulo pulveris ieros compo- sito, Apitissimum quoque erit Lambivitis ita paratum.

℞. Julap. acce. fyr. de lifico, olei de saccharo an. ʒi. m. Nec omitterendæ pectorales inunctiones.

Ut ℞. Unguenti malvini, adipis Anselæ, an. ʒi. ol. lil. alb. amygdalarum dulce, an. ʒi. pulv. indos Flo- tent. ʒi. m. reformetur. Et hæc sunt quæ in hujus status angustia adducere possit, cum efficaciora ut effe- ctior, Decocta exsiccantia, Terribindii usus, & sulphu- rata alia medicamenta nec admitti, nec tolerari pos- sint: ut propterea nec à Viro Excellit. Admitti ad- ministrata, minusque propiora fuerint. *Idem ibidem.*

Jævenis 26. armorum, post vulnus, in pectoris ca- vitate penetrans, consolidatum, jam ab aliquot mensibus ad summam maciem redactus, pus quotidie expuit; magnæque dolorem in illo pectoris latere, ubi vulnus fuit inflictum, sentit. Tumor etiam, qua- tuor digitis à vulnere clavicæ distans, ibidem inu- ter costas oblectatur, liquorisque alioquin fluctuatio illi di- gitis percipitur. Vigilia ipsam magnæque affligunt. Febris adeit, quæ hœdica refert. Nisi in lecto cre- dus sedet, præ respirandi difficultate suffocari me- titur.

Afflicte in hoc egro totum corpus, quod ex ejus summa macie: item pulmo, quod ex puris spurco & respirandi difficultate: nec non pleura & musculi in- tercostales, quod ex dolore laceris, ejusque tumore & præterea etiam cerebrum, quod ex vigiliis: ad hæc quoque cor, quod ex febris est manifestum.

Morbis, qui ipsam affligit, est cavitatis thoracis à pote, in ea collectio, nimia angustia; quæ & puris illa collectione, angustiam cavitatis thoracis fa- ciens, Empyema vulgo appellatur.

Causa prima hujus morbi fuit vulnus, in pectoris cavitate ulque penetrans, indicio, vulnus verò consolidato, ante justam sanguinis & pectore evacua- tionem, & valorum vel pororum, sanguinem in ca- vitate thoracis emittentem, justam conglutinationem facta, pro fecunda ejus causa, est habenda; sangui- nem autem post interpenitiam vulnitis consolidationem in pectore retentus, & per vasa pectoris læta in ca- vitate ejus descendens, eamque replens, ibique in pos convertus, partem ne vicinas vitans, litem & continentem, proximamque hujus morbi, ejusque sym- ptomatum constituit causam.

A copia enim ipsius sanguinis, in pus conversi, in cavitatis thoracis collectione, facta fuit magna cavi- tatis thoracis angustia, justam pulmonum expansio- nem impediens; respirationemque tam difficilem indu- cere, ut jam æger, nisi cretus sedet, suffocari, à ma- gnâ copiâ puris, (jacentes pulmones magis, dum illi- ind fursum attollitur, quàm eos ex alpea arteria, in erecto corporis sicut, pus deorsum pelente, recta sive perpendiculariter dependentes, prementis & gravato- ris,) metuat.

Qua autem jam, ab aliquot mensibus, pus illud pulmonum sanguinisque, per os perpetuo transiens, tempestem vitavit, eumque ad corpus ostiendum inextingit reddidit, & pulmonem poros, imo ipsa eor- um bronchia, ingrellum est, ac cordis ventriculi fe- se insinuavit, tempestemque malignam ipsius paren- chymati impellit, ac membranam pleuram & mus- culos intercostales suâ actionis pungit, & jam ab aliquo tempore costosis, hinc, summa ægri maris cum hœdica febris & magnis vigiliis conjuncta, dolorem in pec- toris latere molestus; item puris fluxus, tumor etiam in- ter costas, circa vulnus creatus, cum liquoris fluctua- tione perceptibilibus, originem ducunt.

Morbis hic periculosissimus est, propter febrem & hœdica referentem, puris spurcum, & summam ma- clem, quæ summam pulmonum & cordis arguunt

compelletam. Quia tamen experientia docet, nonnullos, ita affectos, fuisse sanatos, ideoque Curationem etiam tentandam censet.

Ejus in poris evacuatione, per apertum thoracem faciendâ, ulcers mundatio, & consolidatio, & interemptio pulmonum, per contraria, correctione, consistit.

Quam primum itaque pectus, circa locum tumoris, scalpello aperitur, & pus ad quantitatem libræ vel scissillis, pro ratione vicium, & sequentibus diebus quotidie paulo minus, educatur, donec totum pus evacuatam fuerit. Partibus autem vicibus educendum pus, ne conferta ejus evacuatio spiritus subito effundat, & ita ægrum valde debilitet, vel enecet.

Pute evacuato, & ulcere mundato, ejus consolidatio erit, more solito, procuranda: quæ ut feliciter procedat, tali æget ab apert. thorace, utatur decocto vulnerario, sanguinem purgante, alioque detergente, & putredinem inhibente.

Æ. Herb. fœnicula, bugulæ, Scabiosæ, betonice, Hypocistis, card. bened. pilosellæ, pimpinellæ, vincæ perlinxæ, agrim. plantag. anm. j. flor. cord. p. j. coq. in hydromelle ad lb. f. & colentur pro apocremate, de quo sumat æger 3 rr. bis in die.

Ex hoc eodem decocto poterunt fieri injectiones, in cavum thoracis injiciendæ, ad puris evacuationem, & detersionem, & ulcers consolidationem, promovendam.

Velut ratio sit sicca, attenuans, & abstergens. Ideoque cibi condiendi hyssopo, fœniculo: utiles amygdalæ dulces, pineæ, &c. Abstinere æget à leguminibus. Potus conveniens est hydromel, præcipue hyssopo conditum, item aqua hordei, vel cerevisia saccharata. Vinum obliquoportum etiam concedi potest; nisi febris sit magna. *Hærit. Regius apud Theod. Craanen. Medica manu lib. 2.*

Pro Empyemate Consultatio.

Viro quadragenario, gravi sinistri lateris pleuritide detento, remedia non ante tertium diem fuerunt adhibita, quibus postea morbus imminuit non est, sed ultra decimum quartum diem excurrit, febre alidâ, magnis symptomatibus comitata. Ab eo tempore dolor multum imminuit, febris mitior fieri, & pondetosa gravitas in latere affecto ad costas sentiri cepit. Circa vigesimumquintum diem, febre jam valde parva existente, cum caliguo dolore, molestiam gravitatem, ad sinistram maxime larum diaphragmati incumbentem petere æget, & si ab uno in alterum larum se repente devolveret, humorem aliquem defluere sentiret, cuius etiam fluctuatio in motu corporis antrosum manifestè obaudiret. Adjungitur tussicula sicca, quæ nihil effatu dignum expulsi: respiratio difficilis est, imprimis si in latere dextro decubitus fiat. Æget anxios & debilis est, faciliè & sæpe sudat sine levamine ciborum fastidio tenetur, & magis potum quam cibum desiderat.

1. Affligitur Æget Empyemate, quod est puris in thoracis cavitate collectio.

2. Dignoscitur hic affectus, partim ex signis præcedentibus, partim ex presentibus. Præcedentia signa sunt, quod pleuritidis præcesserit, quæ ante decimumquartum diem non est imminuta: quod postea dolor cum febre imminui cepit sine manifesta aliqua evacuatione per spua, atque hinc gravitas ponderosa ad costas in latere affecto percepta fuerit. Præsentia sunt, quod molestia gravitas diaphragmati incumbat, & in devolutione corporis fluctuatio humoris in pectore sentiarur & obaudiarur: quod serena rossus adit, cum difficili respiratio, anxietate, debilitate, & ciborum fastidio.

3. Causa collectionis hujus puris fuit, a tubercula pleuræ & musculorum mellepneumorum inflammatio mutata in abscessus, est quo typus, pus illud in thoracis capacitatem delapsum est, cuius, per diu, hægma nullus ei daretur transitus, nec per pulmonem commodè evacuetur, ibi detentum & cunulatum est.

4. Quod per spua pus non fuerit evacuatam, factum est 1. Quia procul dubio hujus ægri pulmo lateri affecto firmiter non adhæsit, ut in multis contingit, in quibus è rupto abscessus pus faciliè in pulmonem annexum eructatur. 2. Quia pus in cavitate thoracis contentum, ob suam crassitudinem, poros membranæ pulmonem investientis subire neque pulmonem ingredi non potuit. 3. Quia forte pori hujus ægri pulmone angustiores sunt, ita ut hujusmodi crassiores humores non admittant.

5. Dolor cum febre imminutus est, inflammationis acti materia jam in pus convertita, & sic mitiore reddita: cuius pus magna quantitas membranis adhuc conclusa, ad affecti lateris costas ponderosa gravitate molestiam exhibuit. Tandem circa vigesimumquintum diem, rupto apostemate in thoracis cavitatem effluens, molesto pondere diaphragmati incubuit, ejusque in corporis commotione, manifesta fluctuatio precepta est. Eiusdem etiam pondere depressum diaphragma non satis liberè movetur, hinc difficilior fit respiratio, imprimis si lateri sano incumbat æget, tum quippe, præter diaphragma, etiam dexter pulmonis lobus à puris cum mediastino incumbentis pondere compimitur.

6. Tussicula procedit à vellicatione, pulmonis exteriori tunice ab acrimonia puris illata. Hæc nihil fecit expulsi, quia materii irritans extrinsecus pulmonem attingit, nec ejus quicquam bronchia ingreditur.

7. Æget anxios est ob impeditam respirationem. Etiam debilis, quia ab acuto procedente morbo vires admodum sunt prostratæ, unde quoque faciliè & sæpe sudat sudore sympathico. Ventriculo autem eandem ob causam, uni cum hepate, valde debilitato, ejus coctio imbecillis, & appetitus defectus evasit, hincque cibi fastidium processit: adde quoque etiam pus diaphragmati incumbens, stomachum ei annexum languidum facit. Potus tamen magis desideratur quam cibis, ob aliquam sitim à permanente febricula excitatam.

8. Affectus hic periculosus est. 1. Quia respiratio lædatur. 2. Quia subsequitur acutum morbum qui vitæ admodum imminuit. 3. Quia pus in thoracis cavitate conclusum sponte nunquam commodè evacuati potest, nam quæ per spua, vel utinas nonnunquam fit excretio, illa adeo rara est, ut ex sexcentis vix una contingat. 4. Quia si pus dicto loco diutius subsistat, putrescat, hec pulmonem ei innarantem corrumpt, febreque angerebit. 5. Si curatio per medicamenta exhibita insituitur, incertum erit de felici eventu, quia pus è thoracis cavitate per purgationem non potest educi, & per alterantia difficulter in pulmonem impellitur. 6. Si ad chirurgiam deveniendum sit, illa etiam non vacabit periculo. Interim tamen quia febris crassa est, vires adhuc mediocriter constant, atque convenientes adhibita medela multos hujusmodi ægros servavit, non est omnino desperandum, sed curatio quamprimum institienda, quippe quo diutius malum protrahitur, eo magis vires collabuntur, & affectus periculosior evadit, nam corrupto tandem pulmone facilius fiet in phthisin transitus, juxta 5. Aphor. c. 1.

9. Præmissa igitur clementi evacuatione alvi, mox ad expectorantia devenire suadet tussicula, sic enim tentandum anne pus per illam viam possit educi, ope rationum medicamentorum, quæ partim pulmonis poros laxant & dilatant, partim pus ad faciliorem in istos poros ingressum præparant.

ro. Hunc in finem præscribendum tale apozema.

℞. Radicum helenii unc. j. itidis florent. drach. ij. glycyrrizæ casæ, unc. l. herb. hyssopi, præfili albi, capilli Veneris, violariæ, ana m. j. brassicæ rubræ m. ij. sem. anisi drach. ij. l. q. frig. maj. ana drachm. j. l. pulsatam mund. unc. iij. Aquæ q. s. fiat Sarr. apozema ad lib. j. l. cui admisce, Syrupi de passio, de hyssopo, oxymelitis, ana unc. j. dentur tres quatuorve doses de die. Per intervalla lambar æger hunc linctum.

℞. Syrupi de passio, de hyssopo, de jussibis, ana unc. j. croci pulverisati serup. j. milice, fiat linctus.

Terebinthina com vitello ovi in aqua hordei ad crementum redacta & saccharo dulcorata, plurimum quoque prodicit. Neque horum medicamentorum aliquis calor propter febrem valde extrimeendus est, quia febris exigua est, & causæ ejus major ratio habenda est, corpore quæ sublata, facillè evanescet febris.

11. Si his & similibus medicamentis æger spatio duarum septimanarum ad puris excretionem non deveniat, ab eorum usu vix quicquam sperandum est, ac proinde, antequam longior mora vices magis concidant, & pus corraspelum contrahat, eamque pulmonem imprimat, citius illius evacuatio molienda est per Chirurgiam.

12. Igitur in latere affecto, infra axillam, inter quintam & sextam costam, thorax usque ad internam cavitatem cultello perforandus est (cavendo lesionem pulmonis, ut & arteriæ, venæ ac nervi intercostalis) (foramini non valde lato, sed tali tamen quod tubulum argenteum cavam admittete possit, qui facta incisione statim immittendus est, & ita ligandus ut sponte exidere non possit; antequam autem parte sit tuncunda linea obstruatur, ut pus præter vulnere non effluat. Medici illum effluere oqueant. Per hunc tubulum bis de die, extracta tuncunda puris lib. l. vel lib. j. (plus minus, pro puris quantitate & facili tolerantia ægeri) extrahenda est, hinc ejusdem effluxus immittit tuncunda rursus sistendus.

13. Ubi tandem pus totum evacuatum videret, & nihil amplius efflueret, pulmo & interior cavitates aliquoties abluatur hæc mixtura per vulnus injecta.

℞. Decocti hordei unc. v. spiritus vini unc. iv. mellis rosacei, Syrupi de passio, ana unc. j. misce pro injectione, quæ per aliquot horas intra relinquenda est, & postea per dictum tubulum rursus educenda.

14. Si continua & diuturna puris effluxio indicet alius interius nondum esse perlatum, præscribenda erunt decocta abstergentia & vulneraria, necnon injectiones modicè siccantes & abstergentes. Tubulus vero argenteus in dicto vulnere destinatus est quousque nihil puris amplius efflueret, tunc demum extimendus, & vulnus secundum artem consolidandum.

15. Vltima ratio siccior attenuans & abstergens instillatur, cibusque condantur cum chertfolio, hyssopo, brassica rubra, beta, feniculo, passulis, amygdalis, dec. Porus sit pulvis saccharo vel melle dulcorata, aut hydromeli. Somnus mediocri sit, & alvus facilis. Ita & tristitia, animi parietata fugiantur. *labrand. de Diemerlæ. Medicamentum pectus 2. de morbis Thoracis.*

Observationes.

Senem curavi qui ex pleuritide empyema est passus, febre assidua, tussis sicca, spuro saniei copiosæ, difficultate spirandi laborabat, & tabidus procius factus erat. Medici jam deploratus videbantur, & mirum erat, ex quo loco tanta puris copia emanabat, nam

quotidie libras duas excernebat. Hunc præter alia quæ plurima auxilia, lactis asini porus per tres menses exhibitus mihi fuit auxilio, hujus enim ope, puris copia omnino est immixta, restatum corpus, febricula evanuit, tussis nulla. *Zacutus Lusitanus, observ. t. 9. lib. 1. præc. admirand.*

Apud nos Juvénis quidam à me fuit liberatus, qui per annum pus in thorace collectum post pleuritida gestavit, & quasi absimptus erat, usus soli, & per vulnus purgatum pus. Multos hoc modo curavi, quorum nomina supposito. *Gail. Regimontius, præc. med. cap. 15. lib. 2.*

Puer quidam quinque annorum febte continua laborabat, per duos serè menses perseverante, cum tussis frequenter ac molesta, ita ut ad tabem vergere crederetur. Tandem vocatis in consilium Medicis, relatum fuit illum conqueti de dolore lateris sinistri, præcipue cum manu contrectaretur, tum etiam telatum fuit, illum in febri principio perlatum aliquem dolorem in illo latere, qui tamen intra paucos dies delituerat, idcirco pleuritidis non fuit iudicatus à Medico ordinario. Suspicio fuit Empyema aliquod ibi latere, atque ut res clarius evaderet, decretum fuit, admovendum esse per aliquot dies Cataplasma emollens & attrahens, quo per triduum admoto, apperuit elevatio quidam in parte, & ita fluctuatio subobscura percipiebatur, convocato iterum consilio, de Empyemate nemo amplius dubitavit. Apertione facta pus copiosum effluxit, ejusque vacuum per duos menses continuata est, donec tota materia evacuata, æger tandem pestilenti sanitati restitutus fuerit. *Lazarus Rorarius, obs. 75. cent. 2.*

Senex quidam ex curia decidit, laesus est thorace, præsertim dextra in parte. Dolores remediis non cessarent, cogitabant de sectione inter quintam & sextam costam. Divite sunt sententiæ, tandem vicie pars minor, & periclitanti occasione captam ex desperatis penè rebus, applicatum cauterium, hinc per dies plus minus viginti aut viginti quinque materia saniosa serè ad pectus 15. ut retulerat Chirurgi, convalescit. *Gail. Ballanius, lib. 2. Epidem.*

Cum summus Hippocrates passim hoc remedium nuper, nunquid facius est aliquo remedio cruento & anticipi contra motem (si aliter facias, & id remediis genus omittas) redimere? Humanum est, & officii plenum aliqua ratione miseriorum ægrotum dolores levare, atque id magis si cum aliqua salutis spe. *Gail. Ballanius, consil. 6. lib. 2.*

Enatum ex pleuritide Empyema, cum alia non profuissent, frequenter potione ex Syro altheæ, oxymelice saccharino & manna cum oleo amygd. d. rec. & aq. scabioso feliciter curatum Roma accepimus à Maritima Baccano Anglo, pure nimirum alvo proclivius quam ore, expurgato. *Geor. Hieronymus Valschovius, observ. 29.*

Empyema ex pleuritide, sectione inter quintam & sextam costam, felici successu sanatum, frustra adhibitis ex consilio

Medicorum magni nominis, externis medicamentis.

Quæ verò observavi in Empyematibus, nunc in mediis producenda, Nobilis Paravianus, ex pleuritide nod expurgata, incidit in Empyema, tanta puris copia in cavitare Thoracis conclusa, ut iterum & tertio per diem incidet in Lipothymiam, Syncopi proximam: quæ propterea cum decrevissem perforare, neque ejus parces non admittet, vocavi Medicos hujus Civitatis primarios, & potissimum Joh. Veslingium;

gium, meum olim in praxi discipulum, præter alios, quorum nomina non scero, quoniam Prævii res est notissima, cum quibus habita consultatione, proposui sectionem inter quintam & sextam costam, ab omnibus Auctoribus laudatam, atque propriâ experientiâ sæpissime felici successâ administratam; quam cum Medicus quidam in primis improbaret, hujus loco præscriptis cataplasma, apponendum Thoraci, cujus præsidio materia purulenta discerneretur; quem secutus quinætiæ Veslingius, quo tamen præsentē sæpissime hanc operationem feliciter peregeram, eam & ipse damnavit, metu scilicet læsionis vasorum intercostalium; quorum opinionem miratus, qui hæc in medium afferre auli, sequenti die mane Thoracem feci inter quintam & sextam costam, immissa tunc crassa satis, quæ foramen patens servaret, quam sub vespertam eduxi, ac simul tres, & quod excedit, puris libras; à quibus Nobiliss. Juvenis à Lipothymia convalescit, quem postmodum curavi, prout alioqui vulnera Thoracis, educta scilicet quotidie materia purulenta, atque immissa in vulnus paucis post diebus, cannula plumbea, per quam tota sanies penitus exhanst: qua demum educta, ad cicatricem tandem vulnus spatio viginti octo dierum adduxi. *Petrus de Marchettis observat. Medico-Chirurgic. Sylloge.*

Ex vulnere thoracis superius, magna puris copia in ejusdem cavo congesta, sectione inter quintam & sextam costam expurgata; necnon per os, & urinam, dici spatii.

Cujusdam scribæ filius, ex Agiaciorum familiâ, vulneratus parte superiori thoracis, ad ejus usque cavum, ex quo cum pus ægite expurgaretur, multâ copiâ in eundem congestam, decrevit ipsum fecare inter quintam & sextam costam ejusdem lateris, impolita postmodum tutunda, ut superius dixi, sequenti die, quâ eductâ, duæ puris libras effluxerunt. Observatione verò dignum, non solum vulnere officio pus emanasse, sed & per os quinætiæ magnâ copiâ, necnon per urinoam quoque ad libram unam, & quod excedit, per diem; quæ viæ licet omnibus pateant, non tamen naturæ consuevit, factâ potissimum sectione, quæ materiam copiosam effudit, cum tamen pueri esset juvenis 18. annorum, ac robustus, natura propterea has vias communes sibi paravit, ægrò spatio mensis omnino sanato, & adhuc incoli ob rationem superius propositam.

Dubium vero nonnullis quâ ratione materia purulenta, supra diaphragma hærens, non impediat respirationem, cum tamen hoc Galeno instrumentum sit proprium respirationis; quod scilicet experientiâ se ipsi compertum, quendam Nobilem Bellunensem fistulâ laborantem Thoracis, inter sextam & septimam costam, nullâ respirandi difficultate laborasse, cujus morbi causâ consultatione habita cum viris hujus urbis præclarissimis, negantibus multam adesse puris copiam in cavitate Thoracis, nullâ potissimum respirationis difficultate ipsi molesta; illorum tamen opinionem mordicus oppugnavi, materiam scilicet purulentam intus conclusâ asstmann, cujus ratione immixta tutundam crassam satis & longam circa horas vespertinas, vocatis sequenti mane multis studiis, qui consultationi interfuerant, quibus presentibus, cum tutundam educerem erupit ex Thoracis cavo libra, & quod excedit, puris fantensia adeo, ut assistantæ præ odoris gravitate excedere coacti fuerint, quod pus ed confuscerat ex tumore thoracis, quò sex ante mensibus laboraverat puer, superstitē postmodum fistulâ præ-

dictâ. Ex quibus patet, quod quotiescunque pueri mores per non coniungunt, vel motu quinætiæ ipsò diaphragmate, tunc respiratio illa est. Quod verò aliquis objicere possit, quâ ratione scilicet innoscere possit pus in ipso cavitate conclusum, nullâ præsentē respirandi difficultate? Respondeo observandum esse, quod quando adest minima portio puris in Thorace, id non fit sine febre, quod est signum illius pathognomonicon, præter alia ab Auctoribus posita; ut propterea superius admonuerim vulnera Thoracis non esse ad cicatricem decenda, nisi patientes immunes fuerint ab ipsâ aliquot dies: quinimò advertendum quinætiæ, quod quando purulenta materia in cavitate Thoracis supra diaphragma decumbens, non superat pulmonem alas, tunc per rursus non expurgatur; quâ admittit non possunt, eandem non contingentes. Nobilis verò hic puer non solum laboravit fistulâ simplici Thoracis, sed & præterea duabus costis corruptis, quas proinde abradere opus fuit, non sine quibusdam aliis remediis; qui tamen cum per negotia hic morari dignus non possit, non integrâ valitudine discessit, illi tantum præscriptis brevi eo temporis spatio, injectionibus ex vino mulso, & aqua thermalibus sulphuris; in quarum usu mirum occurrit, quod statim infusus rursus excreveratur, ex vino verò injecto, medicamentis potissimum imbutis, illic nullâ morâ, maximò imperiū rejiciebantur majori copiâ; ut propterea observandum sit, non solum pulmones, rursus utpote substantiæ, sed etiam omnes partes nostri corporis suis partibus, per quos non solum excrementa communia, sed etiam materiæ saniosæ extruduntur ad communia loca; sicuti contingit in vulneribus thoracis, quibus non solum ex locis omnibus nostris materia purulenta fluit, sed etiam per intestina. *Idem ibidem.*

De Emphyemate à parotidibus, & Phthisi à Quartana.

Juvenis quidam 22. annorum incidit in febrem continuam; 14. die fit translatio materiæ mollescentiæ, & sunt parotides ex utraque parte valde magnæ, & cessat febris; factis faciendis parotides copiosissime fluxerunt, ita ut ex una ultra 12. pro una vice effluerent, & cum propter copiam materiæ Chirurgus illas sæpius ligare & aperire debuisset, nescio an ex negligentia id de die viæ semel aut bis fecit, materia hæc satis copiosa & acris partem ipsam etiam glandulosam & mollem usque ad asperam arteriam corrosit, & factio ibi ulcere ad pulmones & thoracis cavitatem ruit, & in momento loquelam amisit, disparet tumor parotidis sinistra, nullum amplius ibi pus apparet, nulli potenter, & propter dejectas vires à priori morbo eiectione non potest, & 40. die post moritur. Vir quidam 43. annorum incidit in quarantam, vadit ad aliquem circumforaneum, qui sexies consequenter illi dedit vinum antimoniatum, emanavit quidem febris, sed ob tot vehementes vomitus fit phthisicus, partim ex transata materia, partim ex rupto aliquo vase ob potentissimos & toties repetitos vomitus, hic ad exemplum sui Domini, cui Phthisico & Hædico cum optimo successu dixam lacteam præscripsi, absq; ulteriori consilio, eam etiam uti incepit, adhuc continuat, & in tantum se sustentat, ut tamen adhuc sua perficere possit absq; magna molestia. *Joh. Georg. Griseb.*

Puris spontam Menstruam sine Phthisi.

Nota mihi est materona quædam Nobilis, quæ singulis mensibus semel puris sanio laborat, adeo, ut sæpissime

interum le habet, & formosa est neque etiam rufi vixatur, nisi quando periodicum hoc imminet sanguis spumans, menser tamen patet fluitare. Iudicent nunc eruditi an semper spiritum signum phthirios pathognomonicon existat. Ego sane in ea sum sententia, ulcus pulmonis tabem non esse, nisi longo tempore radu degeneraverit, vel in vomitum vel in empyema. Inspecito variorum hoc morbo moriuorum & dissectionum Cadaverum aliud me docuit. *Alardi Hermannii* sumus.

Latius usus in Empyemate.

Si Aquilonia tempestas, tussis viget, faucium asperitates, alvi duras, horrores, costarum dolores &pectoris aperuit *Hippocrat.* *lib. 3. c. 5.* Expectus idipsum Parochus Koffelezenis in Moravia, habitus crassioris, annorum 30. pleuritide exaquisitit ascendente sinistra parit ex inflammatione plenis laborans, cum dolore pectoris, febre acuta, difficili respirazione, tussi ac pulsu durissimo, quæ insupportabilia exquisitissime pleuritidis signa proposuit *Galen.* *lib. 3. de Loc. affell. cap. 3. & lib. 2. de Cris. cap. 10. & l. de constit. ar. med. cap. 15.* Is septimo die præmissis Universalibus, partim per resolutionem judicatus est.

Partit post 5. dies ob causam externam, recidivam, & non aderat magnifica incensio adhuc ut spiritum facile fiat, quemadmodum loquitur *Avicenna*. *lib. 10. 3. neli 5. cap. 2.* ad hoc spatio dierum 14. mæte in plurima, quæ per vicium imbecillitate tolerari non potuit, tota in suppurationem abiit, est enim his terminis acutorum *Hipp.* *lib. 1. c. 5.* quicunque igitur morbo laterali laborantes in 14 diebus non repurgantur, in ad suppurationem veniunt. Rostro abscedit empyicus noster magnam pus diversicoloris copiam expulit, quæ spiritiones ad septimanas 5. perindebant, ea quantitate, ut die noctue pelvim 5. & ultra libris purit implect. Innumeros cum *Hippocr.* *lib. 1. c. 5. 15.* Empyici qui ex morbo laterali suppurantur, si in 40. diebus purgantur ad dies, quæ sic rostro, liberantur, si verbò non, ad rabem transeunt.

Sumpta itaque prima & potissima indicatione à suppuratione, & instituto comodo victus & exercitum non naturalium ordine, ea adhibuimus quæ clementer & securè pus educerent, & detergerent, non neglectis quæ febrilem comitantem respicerent, & vires hic apprime necessarias roborarent.

Sed ob plurimum pus, & spiritiones copiosas patientis multum defatigatus, hominque privatus, viribus destituit, & ad Tabem transire cepit. De saluæ viæ non desperantes venit in mentem quod habet *Galen.* *lib. 6. c. 17.* Ustione igitur indigere qui plurimum habet pus, ut qui desperent per spiritiones posse expurgari, &c. meliusque esse nos in via salutis dubia aliquid agentem periclitari, quam ægrotum omni spe adempta certo perire; Sed vires emouit fractæ ab hoc præsidio generoso avocabant.

Exadto die 49. Patienti Empyico *Lac Caprillum*; cum saccharo tosiaco mistum (deceat enim alvum) proposuimus quod cum per alias septimanas manere calidum, & recens à capra, etiam in maiore quantitate quam à nobis præscripta esset, videlicet ab lib. 5. haussisset, expurgato illic, omnique putredine, coque glutinoso perficte convalescit, & crassior quam ante evasit, prout in hordienum diem inebulum vivit. *Mauricij Francisci Heroldi.*

De Metastasi humoris per vias occultas; seu, de empyemate post pleuritidem nostram per foramen cutaneum, à vena mediana incisâ. salutariter soluto.

Reçd. *Sancti Stephani & Roderici Costensis in eruditiss. suo tractatu, quæ ex quibus, inscripto lib. 3. cap. 2.* scribit: Metastases, seu humoris in morbis transmissio, non solum per vias manifestas, sed per occultas etiam fit. Nam præter vias unicuique cognitæ, per quas quicquid fluxibile in corpore est, fertur, sunt aliæ incognitæ, quarum nos contemplatio in admirationem deducit. Et *libro eodem cap. 3. ita pergit.* Cum Metastasi per vias incognitas fieri audis, intelligis incognitas nobis, naturæ verò, quæ licet cognitione non utatur, designat tamen à cognoscente, cognitas unde *Hippocrati* *6. Epidem. lib. 5. text. 2. & versione Eusebii, Natura, inquit, ipsa sibi per se, non ex consilio moriones ad actiones obreundans invenit, partem quidem ut mictat, partem verò etiam quibus lingua subservit, & quæcumque alia id genus. A nullo quidem edocta natura cunctaque disciplinam ea quæ conveniunt efficit. *Galenus* accessus exponit vias, aut impetus ad agendum, ut scilicet natura in ea *Avicenna* sine consilio vel obolo in eas actiones seratur, quibus exequendis accommodata habet instrumenta. Hoc argumentum latissime persequitur *1. de usu part. cap. 3. & eundem operis lib. 15. cap. 7. & 6. de loc. affell. cap. 6.* Cæterum *Hipp.* apud quem prius *viæ quæ incognitæ, natura morbum mediatrici dicitur, adtingit paulo post adinvenit natura huius accessus, nempe vias; quæ potest non solum loqui videtur de adiutandis actionibus, sed de viis etiam, per quas naturæ ista mediatrici metastasi humorum efficiens morbis medetur, constat hoc, quia utriusque rei exemplis utitur, &c. Huc usque citatus *Ambrosius*, cuius verba paulo proximiùs hic recensere volui, ut id melius præcise casus singularis & contemplatione dignos intelligatur.**

Vitæ quædam Thoruensis, Dorothea Kriegerin honesti *Johannæ Georgij Zöbner*, civis & negotiatoris apud nostrates non infimæ notæ privigna, annorum septendecim, constitutionis gracilioris, complexionis plethorica, incidit anno 1675. hyemali tempore in pleuritidem spuriam sinistri lateris à pituitosa causa, cum paucis bile permixta, originem ducentem, sed à causa procatartica, scilicet flatuone longa, & sudore subsequente à frigore externo suppressio in actum deductam, post suppressionem sanguinis mensitrali, huc usque inordinate, utpote pituita copiosa permixti, indeque orta obstructione à fluentis; cui jam à longo tempore singulari noctibus gravis fuit suor oleaginosis, savius, coloris crocei, tam in capite, quam in dorso, etiam induratum tinguens, & pinguedine quadam inficiens.

Hinc ego per pectus signis, inter quæ minâ crassa & tincta erat, dolor cum punctura sinistri lateris gravitativus, pulsus celer & validus, respiratio difficilis cum quadam dyspnoea, tertio die morbi à vena mediana dextri lateris sanguinis ultra sex uncias extrahere iussi; quæ merè pituitosis erat: dein remissio paulatim dolore laterali, sed calore adhuc superfluit, altera die post à vena poplitea utriusque pedis ad sanguinem magis revellendum, & mentium fluxum proleptandum (quæ etiam postmodum, quamvis in panca quantitate apparuit) aliquot uncias ejusdem educere sunt: tum statim calor remissus, punctura lateris deheruit, gravativo tantum dolore residuo cum difficultate spirandi manente. Sanguis autem educus pallidus erat;

erat, tunicasque quasdam secundinis fibiles representabat, qualem ego quidem nec vidisse unquam, nec de minoribus valis extractum fuisse, me legisse recordor. Interim hæmorrhagia nasum, ut aërea, ita & nunc continuabat, mîna coacta apparebat, dyspnœa non remittente, quam nox spiritum tenue sequebatur, Aphorismum illam *Hæpaticum lib. 5. Aphor. 2.* qui pleuritide laborant, nisi intra quatuordecim dies lupent per spiritum repurgentur ita in empyema fit transmutatio, verificatus. Quamquam *Aretæus* hic interdum vigesimum diem terminum constituit: *Galenus* verò in commentario non solum empyema, sed quamlibet in pus mutationem intelligit. Sed dum nos materiz evacuationem per sputa cocta & pedore expectabamus, Ecce novum emergens intervenit, scilicet puris cocti albi instar lactis, paululum tamen ad colorem croceum inclinantis, per foramen curaneum à vena incisâ nondum consolidatum, excreto, quæ quidem metastasis materiz per vias occultas, nobisque inognitas pectoris & lateris doloem sensibiliter sustulit, sed cubiti illius manus, ut & homoplaturum doloem majorem excitavit, sputo liquido, falso per aliquot septimanas continuante: quod tamen postea salubriter secum euphoria cessavit, fluxu menstruo revento, virgineque ad hanc usque diem feliciter & paucitate valente. *Simonis Schultzei.*

Ab Empyicis non abducatur quin 1. juvenem proferat à pleuritide Empyicam, sed cujus purulenta, coctas atrox, quas mihi confervo; & sponte sua diu manavit extrosum, & quidem foetidissime & lethaliter.

2. Phthisicam autem curavi annum agentem 30. cujus ulcus pulmonale dextrum tam altos egit cuniculos in pleuram, & in mîculos intercostales ut ejus rubum per cotem efflueret, circa pectoris damnum. Pulmonis enim ulcus toti ambitui interno lateris ulcerosi ita accrevet, ut digito intruso, & orbiculatim ducto deprehensa sit cuniculus. Bechichis & injectionibus bis de die iteratis, vitam sœvina protraxit in septennium; nec interea stas mensibus caute. Imò illum nonimellem petulic, & ita vivacem exclusit ut adhuc dum alacer vigeat, stupentibus amicis.

3. Belli ducem curo Empyicam à plumbi globulo. Is jam ab octennio fistulam gerit & Saturno intra fistulam pectoralem dextram, quotidieque manè & vespere, pus tam feliciter per ulcus excludit, ut nusquam decumbat, sed vix manû, fingatur.

4. Id mihi memoriam reficit viri quadragenarii cui à deatris, circa 3. & 4. costam spiritum tumor in suppuratum abiit, & pluitum pus per tres hebdomadas sudit. Quam stuporem ad puris molem horrendam, ulcers fundo studui. Sed profectò recur esse deceat, cujus purulenta, cuniculis actis, ipsum orbiculatim hypochondrio tam stricte agglutinavit, ut paris nihil in abdomen influerit, sed id omne prorupcit eartorum.

Indicem sæpe sæpius in ulcus intravi, & hepatis sensu profundius excavatum, quasi digitum indecom pomio vieto parit atq; sano; quæ pars enim sana est firmiusculum conservat, dum vicia diffusit nec arte tracta sustinet. Diata vulneratâ & balsamis injectis & admotis cuncta symptomata eluctatus est æger & salubri nunc vestitur aëre. Qui in renibus ulceratur, tam levi cum labore se extricare non possunt, utinis enim strangulosi dicebantur in annos & mîseri peccant, vigiles, febricitantes, sitibundi, aliquando exlucci, fed lumbis indolentes; & id decipit Medicos falsâ jactantibus ibi doloem esse ubi morbus, & de coacta. Hic enim dolor in vesica & in urethra calculum mentitur, cum utinis glutinosissimis atq; purulentis. Dolor autem in rene nullus, quia consum-

pra illius carne, coriaceus evasit & corii bubuli tæsi. siudine. Tales ficculos renales coriaceos sæpe sapientibus habui præ oculis, cum ureteribus & directo pariter præductis & callosis. Unicum vidi & mîtris qui lacte, trochiscis Gordon. & Balsamo Lucatelli purulentiam tenis superavit. Alii omnes ea luchi, inter quos caermplam mihi sine exemplo, tenis enim dextri ulcus atrofert & sibi agglutinaverat ea ulceris directio ileon intestinum; Inde colica immanis & demensans cum excretionibus alvina dysenterica, pauca, frequenci purulenta, sanguinea cui tanquam dysenterice Medicinam feci. Sed cadaver errorem meum detrahit. Non erat enim dy'enteria primaria sed à tenis tabo transitu suo excoasiente & inflammante fistulam intestinale; hanc secus ac dejectiones visuntur dysenterice in Empyemate pectoris; sed ab empyemate tenis id nolumus à me vel visum aliis, vel auditum, vel lectum. *E. Cælestis Clariss. Carol. Drelincurti communicante Excellentiss. D. Grynus ejusdem Dispositio Medice. Del.*

Empyemati curati historia rara, Communicante Clarissimo Pirro, Joh. Rad. Bulet, Med. Doct. Celeberrimo, & Collegii Medicorum Genovesium Agger, auct. Dispositio.

Anno 1638. mense Martio, cum domicilium meum ordinationem tenerem in Prædio meo in villa St. Simphoriani supra Morgias; Agger nomine Nicolaum *Cornex*, honestum Agricolum, ætatis tunc circiter 25. annorum, invisi in Pagu *VVullerensâ* Sed *Simphorianâ*, uno milliatu, distans: Ille autem Agger, post veram Pleuritidis acutissimam, licet quæret Venæ sectio ipsi celebrata fuisse, & varia pectoralia administrata, Empyicus factus est.

Diagnosin illius Empyematis habui, ex eo quod postquam dolor i. tenis ex Pleuritide cessasset circa diem Xam. post primum insulsum, & simul ac febri. Alia de novâ post duos dies apparuit violentior febris, & cum difficilliori anhelina quam antea, ita ut Agger, via spiritalium trahens, suffocari identidem videretur. Aliquantulum fluctuationem percipiebam in ejus Thoracis capitate; Pauca, proculdubio & minor fluctuatio erat quam illa ordinaria in Empyicis, propterea quod in hoc casu esset maxima puris Copia, totam capacitatem replevis; lateris replens, & ideo fluctuationem aliquo modo impediens. Merens ne Agger suffocatus citò periret, nâ Materia purulenta & Thorace evacuatetur: Quod judicabam facile & rursâ fieri posse per Operationem, Paracenthesin dictam, nempe pungendo & incidendo intra Costas 6 am. & 7 am. usq; ad capaciatem Thoracis, ut jam didicetam cum anno 1670. quo Gradus Doctorales accepi in Illustri Universitate Montpelienâ: Et postea sæpius illa Operatione Autopsia mihi nota fuit, tum in magno & celeb. Nosticomio Lugdunensi anois 1673 & 79. tum in Castris apud varios Milites, cum annis 1680. & 81. Medici Castrensis Moutere funderet. Id.ò, ne ille meus Agger *VVullerensis* misere periret & suffocaretur necâ culpa, non apertendo ejus latus; invenit nocte in urbem Morgiam, teibus milliaribus distans, ibi, atq; ibi à Chirurgo illius loci, Dn. *Pappus*, lancetram majorem quam habebat ad Abscessum aperuerat, accepi. Crastina die, summo manè redi in Pagum *VVullerensâ* ad Aggerum meum ut Egomet illâ dictâ lanceolâ Paracenthesin exercecerem, ut Pus, in ejus pectore contento daretur eians. Sed ecce, mirandum! cum ad eum accessi, mihi narrant Aggerum bene se habere, ubique febre & libere respirare; scilicet nocte præterita, cum dormiret paulisper Agger, sponte sua, absque ulla arte, aperturam istam fuisse in supietion capitate Thoracis & ipsius Sterni inter duas Claviculas; & Puris valde laudabilis, nempe albi, levis, bonæ consistentiæ, & minimè foetidi, prima vice & sic, quantitatem effluxisse.

Forma calidam ē Traumatidis nobilis vulgaribus saepius propināti, bis aut ter quotidie; In his portio- nibus Veronice dofin prae aliis aurore. Illa precau- tio uti iudicavi, ut foraminē ex se facto, Turunda ex lineamento lano dura indeteretur, ne elisus clauderetur, antequam omnis Puris copia ē Thorace eva- cuata fuisset, superponendo Emplastrum ē Diapasma ad continentiam ne ex se exierit. Quotidie manē & se- rō Argē ipse Turundam auferbas, ut Puri daretur exitus, immo alleculō Siccum comprimebas, ut puris effluxum cogeret; Primum diebus, Puris quantitas, quae qualibet vice egeretebatur, erat 3 ℥ij. ad iv. sed quo- tidie sensim minuebatur, donec nullum Pus amplius prodiret, nempe usque ad quatuor supremas, & tunc turandā ablata, facta fuit cicatrificatio illius foraminis. Mox consilio tamen adhuc per quindecim dies, post illam cicatrificationem, portioibus vulneratis calidis, & ligis levi purgantē ulcus est. Ab eo tempore optime se habuit, & adhuc hodie Incolumis vivit, æt. 68.

Anatomica inspectiones.

Empyema Pleuritidis succedens ante decimam quartam diem.

Adveniant juniores, quoniam Hippocr. observa- tio: re pleuritidis non ante 14 diem ad suppuracionem tendit; Nobis tamen observatione, non solum in ju- venibus, sed etiam vixis constantis ætatis, 7. vel etiam 4. id evenire, & evidentius id deigni rigore & subsequen- te febre, ab illis diebus invadentibus & singulis die- bus recurrentibus: Sic sane in Nobil. adolescente ri- ger fortissime, 4. 5. 6. 7. usque, repetentes prænuñciavit sup- puracionem.

Dissectio antequam cadaveris secundum inera septena- rium mortis, in illo factam suppuracionem ante per- fectam fuisset demonstravit, cum universus thorax pueri pugnans tepere us esset: Quin memini me vidisse pus in thorace cuiusdam Sacerdotis, qui 9. die extin- ctus obijt, quod p- apostolo consilio purgantē medi- camento ulcus esset, neglectis v. s. & dilata in sextum, quo sum advocatus. *Carolus Piffé de morbis ab illis viri seraf. scilicet. 3. cap. 9.*

Empyema insigne Sinistri lateris thoracis, nulla sua signa exhibens.

Suppuratum mortuum secimus, in quo nulla pulmo- nis sinistra pars aderat, sed tota cavitas aqua & pu- te repleta erat: cum tamen per duorum mensium spa- tium, quo tempore ab hoc morbo vexatus fuit, nullam respirandi difficultatem, & paucam tussim, sine ulla materie morbosæ ejectione habuisset, Artumen totum corpore tota thoracis sinistra cavitas aqua pu- rulentā repleta erat. *Dom. Panarolus Penic. 1. Obser- vat. 46.*

Empyema pulmonum exulcerationem frequenter sequitur in Phthisicis.

Pus in Pulmone exulceratione genitum, non so- lum appetitæ artetæ ramis illapsum casuitur, sed & tandem quando ex corruptione Pulmonum substantia dividitur, in pectoris cavitatem effluens, illicque sen- sim coactum, atque intercedum magnā copia con- gellum, Empyema produci. Quod ab exulceratione hac in phthisicis eo modo prodire S. Cælio patefacit, per quam in corruptione pulmonum puris temper aliquam saltem portionem, si non magnam, pectus

Bibl. Chirurg. Tom. II.

adhærere vel innascere deprehendimus. *Platerus prat. lib. 3. cap. 5.*

Suppurati pericardium totum fere corruptum reperiunt esse, & cordis major pars exesa

In suppurato, qui post diuturnam affectionem obie- rat, observatum est fere pericardium totum corru- ptum fuisse, majoretque ipsius cordis, quod adhuc quidem, ob diutius fuit, putredinalia in eo asserua- tum calorem, palpitabat, paucum exsili exsili, ut quidem ulcus diutius tulisse facile credi possit: *Franc. Reti cap. 23. de Tormenter. vulnecum curatione.*

ENCANTHIS.

Encanthis, Græcè *Ἐγκανθίς* in oculi angulo, unde etiam nomen accepit, exiguum tuberculum est, vel ex fluxione obortum; vel ex ungue porum exci- so, ac proinde contracto, conglubato. & in tuber- culum coarctato, conuenit Cælius & Paulus in Chi- rurgia, quod excipi hamulo & circumcidi debet. Paulus vultellam, ad apprehendendum usurpat; sed hic quoque diligenter temperata manu utendum, ne quid ex angulo abscindatur; cum exiguum lumen nunc, aut Cadula, aut attamento sutoio interpendum est. Paulus Chalcidicū levigatum usurpat. Sed mitiora, quæ non irritant, toriora sunt, ut est methia aut pom- pholyx, aut si album sine opio. *Hieronym. 1. libro ab Aquapendente in Chirurgie operatione.*

Exanthē est Cornelio Cælio, ac Paulo *Aginetæ*, tuberculum, enascens, in oculi angulo; quem *καθάρ* nominat, Ruffus Ephesius lib. 2. c. 5. dividitur autem in benignam, ac cancerosam. Illa ut occurrit frequenter, sic hæc non nisi rarissime.

Vidimus tamen eam, luce clarius in naupego Hor- natio; cui, ex fixis lacrymalis per oculum virioli, intempestivè suppresso, ungue eo luxuriavit glandu- la, & narium parte, oculis adposita, ut ejus excessiva coarctatione, non tantum insalam, sed degenera- verit quoque in peniculosissimum carcinoma. Quod tentavit quidem filo, compingendū, & convenienter ferro excindere Cornelius Sabonius Lithotomus, ac Chirurgus satis felix: Sed acquieverat jam tum eam malignitatem hic timor: ut vix potuerit attingi, qui protinus, profundet pluitimum sanguinis; ac profundè fuit necesse: solis leucanibus uti; quibus exitum agul magis fuit dilatum, quàm ablatum. Vi- derunt itaque illi, quibus actia medicamenta in fre- quenti usum quàm faciliè committitur error; nullā arte deinceps emendabilis. *Nuculae T. Ipius Oiserv. Me- dic. lib. 1.*

Flora vid. sub titulo Oculorum vitia.

ENTEROMPHALOS *Vid. HERNIA;*

ENTEROCELE *Vid. HERNIA.*

EPHELIDES *Vid. CUTIS VITIA.*

EPINYCTIS.

De Epinyctidibus & restolis morbis prorsus a Sin- bus, sic scribit Clariss. & acutissimus Marcus Aure- lius Severinus in suo, de Recondita Abscessuum natu- ra, Tractatu.

Mibi invenite aliquid eorum, quæ nondum in- veniuntur, quod ipsum notum, quàm oculum esse præter; scientie votum ac opus esse videtur, similiterque

similitertque & semipfecta ad finem perducere & absolvere, verba sunt Hippocratis libri de arte principio conscripta, quod ego monitum semper reverentius, in meis de re medica scriptis quidem omnibus, atque in hoc quoque opere de abscissibus, quantum ego judico, ad hunc quæ terminum servavi, ac deinceps etiam in hac, quæ superest, parte pro mea virili servabo, averfus & abhorrens ab eorum more, qui primum excogitantes ventres actam rem agunt. Equidem vidi jam diu vitiis hoc eximi habitus corporis, quod epinyctis à Grecis dictum est, apud Latinos non aliud vocabuli nactum, sic à posteriores medicæ vel scriptoribus alioque magistris ignorari, ut ex observati numeri viris hanc facere minime norint, itaque ex eis affectionibus haberi consuevit, quæ jam à longinquo tempore deficiit, nomen tantummodo retineat, non aliquam speciem; adeoque sit ex morbis secularibus, id est, aliquandiu vigentibus & fugacibus; veluti lichen atque mentagra, quæ Pompeii magni tempore primum visa, non ad longam posteritatem exiit: vel sit ex his decique morbis, qui nuper exuperit paulo superioribus seculis, ut Syphilis, Plica, Brunnus, & alii: verum longe aliter se res habet, ac nusquam interruptum est malum, nostra etiam tempestate stabile, ut certius equidem reddam, quam quæ fuerunt ad Sagram, & si apud solas intruditis tœminas vulgari diu sole saltareccellè nomine cognitur. Porro neque discernendi mali curam Medici susceperunt, neque ejusdem curandi rationem attigerunt, indignum profecto facinus, atque omni, quæ licet, animadversione festinaque sollicitudine convellendum, neque enim aut medicæ amplificandæ aut medicorum auctoritatibus tuendæ, aut militæ mortalitatis adjuvandæ causâ patientium est, ut error hic procrebarur, qui qualis quantusque sit, ipse cognovisti, ubi mali rationem in libri progressu didicisti, viderisque quarum acerbioribus & molestiarum noctu diuque exhibeat, quamdiu pertinax, quàm sepe intradabile sit, quantum ex medico curæ, ac tolerantie, quantum medicaminum & exquiritorum, tam, quæ exterius exhibentur, exposuisti: ad summam tam crudus & insulens affectus est, quantum aliqua Syphilis & struma, quæ communem propemodum cum illa curatorem habent: quin etiam in arthritide pessimum morbi sortem perpetram curata facili: quemadmodum audies in prognosticis. Quis ob causas omnes visum est, humani ac minime sacerdotis hominis officium, si super eadem re tantisper mentem ac studium adhiberemus, quatenus ad justam suam comprehensionem ac lucem res obscurissima restitueretur & à vulgari medentium torpi præfido ac putido procuaru vendicaretur. Igitur nos id, quod in terminis atque aliis plerisque fecimus, in hanc quoque rem diligentem operam navabimus, ut plana tota reddatur si tantum is, qui lucem aliam inhabitat, cujus aliquam particulam nostris allabi sensibus concesserit.

Quæst. 1. De nomine epinyctidis.

Nominum verbis imponendorum ratio varia fuit Græcis auctoribus, quemadmodum Galenus explicavit lib. a. Methodi therapeut. cap. a. A leſa enim particula dicta est cephalæa, phrenitis, ophthalmia, peripneumonia, pleuritis, arthritidis, ichthias, podagra, dysenteria. A symptomate verò nomen acceperunt vigilia, coma, palpitatio, dispncea, paralyſis, illos, teneſmus. A causa dicta sunt melanſcholia, cholera, aqua intercus, leucophlegmatia. A symptomate simul & parte affecta cephalalgia, odontalgia, cardialgia. A similitudine ad aliquid extra positiim alopecia,

ophialis, polyphus, cancer, elephas, myrmæci, lycosis, motus, rhymus, vva. Denique ut nonnulla breviter perstringam, à tempore nuncupati sunt ephe-mæta, nyctalops, epinyctis inditum jam nobis sermone materia, cujus & ipsum etymon diligentius est enarrandum; nimirum alii, quorum uni sunt Celsus & Galenus; ab ea, quod noctu apparer, dictam volunt; alii, quorum est Julius Pollux, Aërius, Paulus, Plinius ab eo, quod noctu molestiam exacerbat.

Jam verò te non perturbet pauca hæc diffinitio, quod hi quidem ad nocturnos exortus, hi ad nocturnos aggressus retulerint nomen; id enim utrumque constare potest autostibus Joanne Cosmæo Patiensis deſinit. medic. E. & Philippo Ingrassias comment. de tumoribus præter naturam 34. ac deſinit Ludovico Sepialio in comment. 2. ad lib. Hippoc. de act. arq. locis P. porro, quo tempore, & quibus vigentiſus causis suis primum inſarior novit affectio, iſſidem etiam & quotidie effloſcere, ut loquuntur Hippocrates, vel exaltari, quod Paracelsus dixit, id est, exacerbari verſimile est, quanquam etiam neque perpetuum est, ut ipsa oriatur noctu, sed fere apud Celſum, id est, maxima parte, ut Ingrassias explicavit. Igitur utroque compatiuntur nomine latam epinyctidem opinari licet & quod vespertinum foret, & quod hoc etiam tempore novus semper inſultus inſtaret, de quibus omnibus cuius tum nascendi, tum invadendi proprietatibus posterius inquiramus.

Interim homonymizæ diſtinctæ causa non omittenda est altera epinyctidis usurpatio, qua usus est Plinius l. 20. natural. hist. cap. 6. ad notandum ulcus, quo videnti acies hebetatur, in oculi angulo perpetuum humorem manante coarctatum, fortasse autem promptius hoc nomen oculi vitio accommodavit Plinius qui legerat apud Hippocratem lib. 5. & 7. epidem. affectionibus circa oculum dolores adnotem. Sed enim Plinius, si recte advertitis, etiam per appellationis modum, duarum affectionum diſtinctionem protulit, quandoquidem ocularibus epinyctidem singulariter, alias vero, quæ nocturnam inquietem invadunt, numero plurimum excolit: quo numero nominantur semper Oribasius, Aërius, Paulus, Actuarius justam quidem hujus rei mentionem profecti, medicam enim Hippocrates lib. de acerbis, aquis, locis n. 4. & lib. a. propteritiorum n. 28. Sunt hæc de etymo, cujus etiam luculentam suam rationem audies suo loco.

Quæst. 2. De genere morbi.

Inſistentibus rite nobis epinyctidis omnem naturam, prima, quæ se offert, generis est quæſtio, in qua re ſtatuenda non conſentient nunes, qui de hac re tradiderunt, ſive Græci, ſive Latini, ex his primus Cornelius Celſus lib. 5. rei medicæ cap. 28. reſtulit ad poſtulas: atque ita etiam Plinius lib. 20. cap. 6. circa principium: Itemque Julius Pollux Onomasti lib. 4. cap. penultimo & Synæſius in commentariis, ut est apud Raphaclem Volaterranum Phyllogie lib. 24. pag. 75. ſed & Græci Oribasius lib. 7. Synopſeos c. 37. & poſt hunc Aërius l. 24. c. 61. & Paulus lib. 4. c. 9. & Joannes Actuarius lib. 2. meth. medendi c. 11. epinyctidas ulcuſculi dixerunt.

Noviſſimè verò Philippus Ingrassias, ut ejus diſſenſionis aliquis modus eſſet, videtur id iudicium interpoſuiſſe pag. a 83. F. ut ab initio ſux generationis ſtatim poſtula quidem ſit iſta; verum eadem abrupra ulcuſculum reddatur. Sed Joannes Gozzarus lib. deſinit.

lib. de vit. med. litera E. sentit nil referre, quod illi quidem pustulas, hi ulcuscula dixerint: sunt enim & ipsæ pustulæ ulcuscula. Mihi vero ipse placidius res utroque compositurus videtur: si commonefecerim auditorem, Græcos illos autores neque simpliciter ulcuscula protulisse, verum quædamque, id est, pustulosa, seu pustuli-formia. Præterquam quod & Celsus, qui pustulas dixit, idem & ulcerari post hæc ipsas affirmavit.

Omnibus autem modis, utra prævaleat vis tumoris an ulceris, quæres: mihi quidem cunctos hos interpretes observanti, necuta aut mista ex utroque videtur, neque admodum apud hos interesse, siue ulcuscula pustulosa, siue pustulæ ulcusculæ, id est, inas existeret dicantur. Sed Philippum Iugrassiam video sæpe in id procedere, ut tumorem vocet: idemque placuit Ludovico Septalio, leco, quem proximo capite testabatur; quod neque displicere cuiquam debet, quando magis æquino tumor, quem ulcus videtur, testimonio auctoritatis, quod est etiam Arabum, quæ simillimæ sunt epinyctidis Græcorum, habeturque à multis etiam ipse, inter apostema & exiurias descriptæ sunt ab Avicenna, nec non ab aliis, quin & circa hæc pustulam vehementem inflammatio est Cornelio, qui magnitudinem ejus fecit faba non majorem, quod quod has duas vocet parum inter se distare competita scribentium nō?

Quæst. 3. De colore epinyctidum.

Diversam quoque coloris faciem epinyctidis tribuerant Græci, quam Latini Ex his enim Cornelio vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit, post quem vitæ & liveris etiam colore proposuit Plinius, vetum Actio Pauloque subnigra sunt ulcuscula, quibus disruptis eorum a sanis effluit, quem sanguinis scarum perhibuit & Julius Polux. Quæ scribentium omnium dissentio conspicua primo levis quidem videtur; etenim Celsi color est varius, Actio Pauloque constitutus & unus, qui subrubet est ad quam sententiam accessit & Pollux.

Verumtamen hoc inter se discrepans conspuitur primus Joannes Goræus: siquidem sub colore subrubro & subnigra & sublivida comp. exstantur, omnis enim sanguis etiam biliosus, hab. cutem effusus, in eos colores facile mutatur: Illud autem, quod Goræum torret, est quod & album colorem interfertur idem autor. Cui etiam illud addit, quod & circa pustulas vehementem inflammatio relictæ est: res certe sic explicata difficilis, ut offensus incompetenti rerum confectione decidit: à Græcis Ingrassias. Verum enim veto de coloris albi discrimine dicam ego post brevi. Interim, quod ad conciliandos auctores pertinet, nulli inde difficultas suadet, si heterogeneus hic tumor statuatur, siue quidem humorum concursu siue partis affectu varia difformitate; de qua re mox plenior atque evidentior demonstratio parata est, si tantisper attendis.

Quæst. 4. De morbi materia, secundum priorum opinionem.

AD hæc, de humoribus quorum vicio produciatur epinyctis, non levis sunt, aut silendi modo memoratorum auctorum dissensio: Actii siquidem & Pauli opinione satis apparet sanguinem esse, qui causa sit mali, tum inde, quod subrubet color aspicitur, tum quod ulcuscula disrupta laute cœnta manant. Contra vero Celsus decrevit adperta pustula mucosam intus exulcerationem reperi, atque

hanc humori, ex quo facta sit pustula, similem colore. Præterea si color interdum est albus, piteuita; confecto erit, cui respondeat, & quoniam non sublivida facies ejusdem est & subnigra-bilem atram hæc aguerit, qui succi fe product etiam nocturno motu, atque in planus dicam, nocturna exacerbatione, quam ob eundem humorum nocturnum motum atque vigorem intereunt.

Hoc binorum hominum dissidium vilius est tanti Siculo Philippo: ut enodationi diffilis, alteri parti adherere crederetur præstabilis, quia lres aut infirmas conciliationes committit; apparuit autem Cornelii definitio potior, ut quæ magis adinet ipsi constaret, quæ definitio morbi opter aut piteuita, aut melancholia videtur addit, qui duo locci nocturnos soli dolores movere possunt. Quamvis igitur hæc ob causam Celsiana propostio Philippo probatur; tantumdem Actii Paulique refellitur, per quos sanguis effectus causa proponitur: cujus vi & natura timentum abest, ait, ut epinyctis induci debeat, ut noctu gravis dolor, ut velut ephemeris, id est, diu molestant appellari debuerit, est autem Philippo fuerit, qui prævalat ad effectum hunc existeret præcipuum nitroia piteuita, unde & albus tumoris color existit, & ob quam adperta intus pustula mucosa, qualis in ceris & acoribus exulceratio reperitur. Altera post hæc atræ bilis est portio, unde sublivida alter sit color, aut livida etiam, si plus ejus humoris affuerit, aut postremo subniger, si plurimus idem accesserit.

Hæc Ingrassias sententia & Celsiana ruit, nam multum sibi visa est efficax; ut vanam etiam existimaret declinationem eorum, qui vellet adstare; posse fieri, ut tuberculum principio quidem fibrarum, mox in livens, aut subnigrum ulcusculum immutaretur, quippe firmus in eo Philippus est, ut contendat omnibus modis negari non posse, sanguineam ac biliosam exuperantiam aut utriusque in illam cellam interdum veratiles, piteuitam & atrabilem, noctu graviore esse. Contra quam tam Ingrassiam constutiamus est quod auctore possit quipiam. Nimiam neque subrubra facile sanguinem absolute coargui carum visio tactam, & alio quovis appulsi succi computrescentis inflammationem, colorem interdum inflammationis consentaneum indisplicet quem admodum scilicet ex cortice videmus hyeme nates intrare atque extere flagrare ac per biuales rigores intermedia manuum tabella & gravi pustula tentari.

Neque sit tam difficile Philippo, biliosum humorem noctu moveri, quando febres tertianæ & hemictanti paroxysmi per noctem haud infrequenter statim piteuita accedant. Præterea, neque, si bilis aut calida humoris adstatur, qui moveat epinyctidas: propterea sit, ut noctu invadere non possit sed satis est, ut noctu moveatur quippe mutatis humoris sedibus & fluctuante ipso, clara Hippocratis doctrina in lib. de natura humana 23. necesse est, dolore consequi duplicem, & unde egressus humor est, & ubi redandat. Quibus addit Galen. (c. 21) ejus comm. hoc imprimis ev. nite per illos humores, qui validas habent vires, siquidem non solum multitudine particulam in quam declinaverunt, aggregantes, sed etiam qualitate dolorem locorum, cum exaltescant aut refrigerent insignit.

Atqui humor is, quem memoramus (inquam ego Severinus) talis ad unguem est, qualem delineat Galenus, est autem hæc, mea quidem opinio, piteuita nitroia & falsa cum plurima succi melancholici portione commista. Quorum ego duorum humorum concursum, tum ex lymphomati jam indicatis, sed plenius etiam exponendis consilio: tum ex Orbisii Actii Pauli testimonio, qui nominatim

quorum is latine sensus est, epinyctides sunt ulcercula sponet naturę trampedencia postulis affinis subtrahere: ex quibus dirupis ichor subcrentus emanatur, per diem non magnopere excruciant; per noctem vero magis quam pro ratione ulceris dolore torquent.

Appendam hanc definitionem sua lance reprobavit Iog assis, quod duo additavit, alterum quod ex sanguinis exuperantia productus affectus sit; alterum quod noctu plurquam ulceris rario poscit, i. dolorescat; qui dolor ex sanguinea materia productus interdum potius advenire debet. Sed nos hanc oppugnationem nullam fecimus in Contraversia III. itaque cum sibi res constet, quod ad hoc spectat, nam neque aliud animadvertit Philippus, ceterum si superesse videretur, ut græcorum definitio, cum ea, quæ latinorum est & prima Celsi conferatur; quam nos rem hercle sine auctorum invidia peragemus.

Ait Cornelius; Pessima pustula est, quæ epinyctis vocatur, ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit: circa hanc autem vehementem inflammationem est: & cum adaspera est; reperitur in aris exulceratio mucosæ: color est humori suo similis, dolor ex ea supra magnitudinem ejus est, neque enim ea faba major est, atque hæc quoque oritur io eminentibus partibus & fere noctu: unde nomen quoque à Græcis & epinyctis impositum est. Hæc ille: quæ nunc eo quidem instituta & producta videntur, ut brevi morbum finiant, sed nunquam doceant & exponant, itaque enarratio est dicendi potius, quam periodica, ac potius hypotyposis, quam *descriptio* atque adeo non cadit in numerum & compari arationem aliarum definitionum. Tamen rectam hanc doctrinam, & cum græcis virisque consentientem, & nunquam asserimus, & supra ostendimus. Verum enim vero potest ex tot omnibus una definitio concinnari, quæ sit, epinyctis est pustula vel sublivida vel subnigra, vel alba, circa quam vehementem inflammationem est, & in qua adaspera reperitur in aris exulceratio mucosæ: perdoles supra virili magnitudinem, oriens in partibus eminentibus fere noctu. Hanc quidem orationem videtur ab Orisadiana discrepare seu genere, in colore, contentis. Sed dissensus istos omnia nos ad consensum revocamus. Atque liberum est cuiquam, vel hunc vel illos auctores sequi.

Sed post hæc examinanda restat sententia definitionis Iulii Pollucis, qui ait; *Ἐπινυκτὶς ὀφθαλμῶν* quæ latine sunt, me quidem interprete, epinyctis est pustula sublivida, humore suffusa, sanguinem referens circa tibias pedesque noctu exorients. Hujus definitionis sensus partim tuetur id, quod Celsus de colore sublivido invasque nocturno expressit partim amplexatur sententiam aliorum, qui de materia sanguinea contenta perhibuerunt. Quamobrem errasse comperitur Philippus Ingrassias, qui eandem hanc cum Cornelio convenire, à Græcis vero discrepare iudicavit. Quin etiam in eo deliquit, quod hanc ex eodem Polluce recitavit perpetam interpretatam ad hunc modum; Pustula sublivida modice extumescens, plena sanguine; in tibis & pedibus fere noctu insistent. Porro quod *ὀφθαλμῶν* modice extumescens redditum sit; hæc non respondent vocabulo, quod sub humida valet. deinde quod *περὶ τὰς* genita noctu insistent verum sit: hoc quoque falsum, in qua re magis accusandus est Philippus, qui, cum in nocturno morbi exortu consentiant Cornelius & Pollux; tamen statuit, contradixisse Celso Pol-

lucem, qui noctu molestantem epinyctidum tenet.

Ad hanc, inquam, modum reliquit Philippus definitionem Pollucis afferens, non tam quidem ipse suo ipsius iudicio, quam lexicorum testimonio strensus; non minus autem lapsus est Rudolphus Guarnetius eruditissimus aliqui Pollucis interpretes, quæ *ὀφθαλμῶν* lividum transiit, nullo in aris *ὀφθαλμῶν*, *ἐπὶ ὀφθαλμοῖς* lividum & sublividum dissimile factio, quali vero gratis & libidine temeraria *ὀφθαλμῶν* prepositum fuerit, non spectato plane, quod in definitionibus nil temere proponatur: quod magis *ὀφθαλμῶν* fuerit, quod *ὀφθαλμῶν* subhumida est interpretatus, quasi vero remiserit hoc nomine *ὀφθαλμῶν* reddere, in altero vero nil retulerit.

Quæst. 9. Epinyctides Græcorum *ὀφθαλμῶν* sunt Arabum?

Hæc controversia præclaros habuit disceptatores; quales fuerunt Joannes Marinus, Joannes Tazaulius, Philippus Ingrassias: inter quos quidem aulus surgere non fuisse; si disputationem hanc diluere licuisset. Verum interpellavit me problema majorem in modum, quam ut silentio prætere potuerim. Referam igitur qualis qualis sit, opinionem meam, rationibus aliqui pro hac aliaris, quæ displicere non fiat, si tantum aquos ac doctos iudices nocte fuerint. Tazaulius quidem lib. 2. c. 2. differens verbis profusus est, Arabum *ὀφθαλμῶν* epinyctides esse Græcorum. Sed Marinus lib. 7. suar. epistol. medicinal. 2. Græcorum epinyctides præcise constituit ad *ὀφθαλμῶν* Avicennæ: cuius illa descriptio legitur lib. 4. fen. 7. *ὀφθαλμῶν* est pustula parva lata sicut vesica, & ad aliquantulum tendens, rubedinem & purpureum faciens, & angustias; eventis subito secundum plurimum, & accidit quandoque, ut curat ab ea humiditas, & fortasse est sanguinea, & secundum plurimum sit vehemens in nocte, & ejus angustia sit in ea vehementior & ejus tristitia.

Quæ magnorum quidem hominum, sed levi collationis examine concepta opinio, haud mihi diligenti exaratione probari potuit: sed neque probabitur fortasse, cui rationes hæc, quæ sequuntur fuerint pensatæ: quas tu quæso purgatis auribus audi. Principio esse videtur affectus ex acutorum genere, quod & modis generationis declarat, qui cito fit, ut Avicenna docuit, & cito etiam dissolvitur, ut recte notat Philippus Ingrassias, qui testatur esse experimentis, tum in se ipso, tum in aliis persæpe factis, sola venæ sectione interaque ferventis bilis ac sanguinis, frigida copioso potu, vel consupsum alterantibus erroris refrigeratione sanatos; quin interdum sanguinis duntaxat missione corpus adeo refrigerat periculum fecisse afficit, ut extemplo decumuerit cor, atque ex aspera levis reddita fuerit, extinctio enim (aliquanto posterius subjanxit) fervore remotaque illius causa continuo defervecit sanguis.

Quod si Philippi testimonium inficiaberis, en principem Avicennam, qui conceptis verbis ait, & causa est ejus (esse scilicet, quod inellectuabiliter effertur) vapor calidus elevatus in corpore febrili, aut à sanguine cholerico aut à phlegmate banrachior banrachium autem Dinos interpretatur falsum, quod est admittum cum cholera. Hinc autem vide, quæ de vaporis materia scripsit Nicolaus fern. 7. sem. 1. tract. 9.

1. tract. 9. c. 19. Et recte q. idem atque constanter, inquit, ej. modi traditur hic halitus, quando pruritus etiam invehit dictus est apud Avicennam.

Affectus igitur hic apprime calidus apparet, tum ex his, tum quod angustiam, id est, ætium v. hementem, ut in variolarum eruptionibus, Nicolao esse inducit, febremque tertianam accendit, macula scilicet utrobique terribile communitate; qua sit etiam, ut nunc præcedat hæc febris, ut dictum est, nunc subsequantur, quod ex Arabum etiam sententia profuit Ingrassias pag. 189.

Atqui eæ & tam multum calidæ nocte nevisquam ab illo grecorum attribuitur sunt epyñctidis; quin etiam si recte perspicitur, haud ita multus huiusmodi fervor est; quando nulla viscerum internorum æ. temperatione, vel refrigerantium oblatione curata est affectio: vetum per exiccantia & horum plurima calida, licet exteriora, quibus & qualibus unis plurimum hæsiæ veteres apparet: quando & talia sunt ea, quæ præceperunt omnia, & exiccationem imprimis nominavit primus hotum autor Orisbalus, mox Aëtius, & ipse idem Actuarius lib. 6. meth. med. cap. 8.

Sed extra Græcos Cornelium Celsum etiam requiramus, qui de morbi genere videtur sensisse, ac certe conamæcin, & longum profectus est, ejus colorem li idum, subnigrum. album humoris suo similem; deinde mucosam exiccationem adpæta jam repetit dicit. Id declaravit de remediis, quæ adhibenda vult: nimirum, ut qui tentatur hoc morbo vir, desudet in balneo, simulque super eas pustulas nitrum inspergat, oleoque vinum immiscet, & sic ungatur, tum descendat in folium; idcirco vero ex pustulis sacra sollet, sit, argenti spuma cum semine fenogreci mista sit, ut his invicem rosa, atque imbi succus adiciantur, donec mellis crassitudo fiat. Hæc ex Celsi doctrina epyñctidos est vitiatas: quam vidit, & Ioannes Manardus, id testatur in lib. 7. epist. 2. minime autem notandum ejusdem comprehendisse videtur Philippus hujus audire, ejus opinio, fuit pustulas esse subiformes, aribus ac toto corpore contentum apparentes, brevique, non diu permanentes, chronicis autem affectus epyñctis, siquidem, quæ pessima pustula est, ex melancholica, sed hæc difficultas curatu semper, ac plane refractaria est.

Ex his igitur omnibus, ut ad propositum revertamur, plane perspicitur; acutum hunc epyñctidis affectum, quales Arabum esse, non est, sed chronicoteron; ac tum propter alia, tum quoniam in cithis & eminentibus tantum partibus nascitur, & calidioribus remediis vincitur, rigidiorum. Accedit, quod nullam ejusmodi pustulam, ex qua vel tangas, vel ichor, vel quivis alius humor manaret, conspexisse nobis aliquando permixtum est, per habitum namque sensibus occultum dissimulat, ait Philippus citato jam dudum loco. Vide autem, ut mihi laborem rependit levis & quæ idem Ingrassias de Arabum in hac re perplexitate comprehendit pag. 188. & 190. etenim, & si nonnulla sensisse cum Græcis videtur: tamen in cæteris non constitisse sibi se producit.

Iam ergo postquam effere Avicennæ epyñctis non sunt: alios auctores exponi noli petas. Ad quod quaesitum respondeo; Scorpionem vetustissimum inter Arabas medicos scriptorem, efferas discevisse in dupli; altera forma ducitur a tan vine cholerico, quam marciam æque exortum attestantur vis & ac-

monia, partis extumescens rubor, æstuario magis interdum quam noctu, ac levamen ex refrigerantibus pharmaciis, & phlebotomia. Altera species exortur ex phlegmate salio baurachino: cujus nota sunt ætibus noctu horæ, diluuntque tuberculi rubor & levamen ex pharmaciis deurgentibus & exiccantibus, & cetera linguinis detractionem perpuratio corporis ex medicamentis extrigentibus, atque emundantibus propria substantia. Hæc ferunt Scorpion.

An igitur ex duobus his effere modis posterior, qui noctu prævalet, epyñctis grecorum est? Hæc sine opinio non parum probabilem se facit his, qui functionem Arabum doctrinam siqui velint. Porro præter hunc unum virum videntur ceteri corrupto judicio, & commenticia scripsisse. Sed neque ab his, si modo Philippo credimus, eximitur Avicenna, qui grecorum auronum, & primi Scorpionis consiliis æque codicibus res utrorumque consiliis. Primum enim Scorpionem sequutus de diurnis fecit efferas & nocturnas: mox ad grecos latius effere definitionem partium ad epyñctidis grecanicæ modum concinnavit, partim etiam de suo addidit halitosam materiam; Deinde vero curationem, quæ apud grecos tantum extrema est, spreta ejus, quæ apud Arabas est, diurnæ effere medicationem internam resinit, utrique i. nocturnæ, ac diurnæ commixturæ; qua quidem re quilibet incertus? quid instabili? quid indignius professori fideli prævique sit, ait Philippus. Verum enim vero non potuerunt ad grecorum dignitatem, ac majestatem succedentes barbaræ scholæ castigatissime ac limpide ex omni parte philosophari; necessum profecto in horum doctrinam nonnulla irreperiant, quæ aut sinceritate, aut firmitudine, aut splendore defecerint, ut in anatomica, botanica, & nominum interpretatione plane res est.

Quæst. 10. Quod epyñctides Græcorum non sunt Arabum Benat noctis.

Avicenna l. 4. sen. 7. tract. 3. cap. 10. quod est inscriptum de Benat noctis, memorie mandavi hæc: si quis passus est definitionem cutis & opilationem pororum, & boni autem digestionis, quatuorque accedunt in frigore noctis, & alperitas, & bohor parva, quæ nominantur planta noctis; & causa est terentio ejus, quod oportet, ut resolvarur, propter constitutionem pororum in radice quam adjuvat, & in qua addit soliditas frigoris, & proprie in hora, in qua multiplicatur digestio, & sequitur multitudinem ejus multitudo vaporis, & ac noctis, & propter illud nominatur planta noctis, quia plurimum accidentium ejus est in nocte & de dispositionibus hujus passionis, quod præstat in ea sit vehementes, & delectat prius, deinde perducit ad dolores vehementes, quos efficit in locis pruritibus.

Hanc ita descriptum morbum Philippus Ingrassias sensit grecorum epyñctidis esse; primum indicio sumpto à nomine, quod insulsum in nocte significat. Deinde argumento ducto à generationis modo, qui est per condensationem cutis; ex qua causa nodulæ illæ plus hoc tempore dolor, quam interdum accedat, necesse est. Post quæ & definitionem Benat non traditam ab Avicenna ad hujus sententiam conatur tradere Philippus, quam multo scilicet, tam iusto labore; quando gratis & ex suo consensu definitionis particulas comminiscitur potius, quam ad Avicennæ sensum accommodat. Itaque piget ambages

etiam & veram confirmationem repetere, præsertim, quando referat magis apud suum auctorem legi omnia.

Interim nos ab epinyctidis opinione Benar longe movemus, vel hoc uno argumento, quod pessima pustula epinyctis est attestante Cornelio, qui super omnes adhibet Philippus; mirissimæ vero inter omnes Benar, quod cum bona singulis confectione conjunctum est. Adde quod Benar, Avicenna auctore, principio quidem delectationem, mox dolorem vehementem inducit, ac vero nulla unquam ab epinyctide delectatio est. Præterea multo plenius cohibet cum epinyctide vel Avicennæ verbis, cūctæ, quam Benar nodis, est autem illa ex hoc ordine rejecta, ergo multo magis & Benar nodis: quare non est hoc unum epinyctis.

Jam igitur, noniam incerta res est epinyctis, & sic obscura nostræ sæculo, ut pro morbo jam obsoleto sit habitus: nitentur mox ipsi non excoletum & obsoletum ostendere, sed enim, qui quotidie cunctis liceat obsolescere. Rem sane difficilem ac plane incredibilem, verum ego plurimum probabilem, & certam omnino reddam, si modo Deus optimus maximus largitor intelligentiæ præsit; in quam rem illud facio testimoniis inditum.

Quæst. 1. De Roscolis Vocatis Saltantibus, Primus autem de harum nomine.

Majorem nostrorum memoria, vulgo percrebuit afflicta, cui roscolæ saltantis nomen; quo per vulgus erito incisa hinc testimonibus, quos ad Latinos homines scribo, eundem abstinere; si quidem proprium suum, id est, ad doctis impostum aliud cognoscerem; verum admico eodum, quod expedit, ut nil reliquere videar eorum, quæ ad stabilendam comprobandunque suntant nostram sententiam faciunt; facit autem & vulgaris appellatio, seu potius per hanc notata res gratissima, affectus nempe præter naturam, cui si nobis & amicorum doctrina præstantium fidere licet observationibus, tum quidem est macula subultra, faculenta, tumoris intrinsecus non expers; sed ubi indicata modo facie recondit tuberculum, quod tactu fæbe vel lupini magnitudinem, ac formam refert, dolore se declarat non mediocri, tum etiam præter tuberculum, interdum etiam ulceratum aliquem præfert ac pustulam. Quæ triplex viri species non a petto particula corporis insidet, sed per artus omnes manus pedesque variè vagantur, sunt autem & qui restantur a minimo digito ad singulos ordinatim alios, atque ab alterutra manu in alteram propagantur, per truncum vero nunquam visam meminitur.

Quam ipsam tum forme, tum sedis inconstantiam aliquando advertentibus nobis, ac quemadmodum licet, exprimere studentibus, visum est, ut inconstantis nature sit dicendus abfessus, si tamen abfessus nomen non pressit, sed laxius, ut in aliis observavimus, factum, accipiantur. Quod ipsum nomen eo accipere debes libentius, quod ab antiqua vulgarum appellatione non discrepat. Roscolas enim intelligo bisariam, vel quod rosarium imaginem & colorem præ se ferunt, vel quod rosidas quædam inspectiones representant. Dicuntur autem saltantes, seu saltatrici, quod tibus privatim occupare consuevit, per dolorem & inquietum faciant, ut stantes homines saltent, id est, cibus æternæ sublaris, aut terra pressi crebro agitentur.

Quamquam hujus ejusdem appellationis & altera

ad discernendum est imposta ratio, quam non expenam, nempe roscolæ simpliciter dictæ, quæ manibus pedibus antibusque delixæ videntur, petniones sunt alias dicti latini; saltantes verb, quæ indefinitis & incertis sedibus inhaerescunt, vagisque excipiuntur hospitalis. Itaque non abs te per vulgus hominum expectorum additum saltantis est dicendum, qualis sint hæ quidem inconstantes ac vagæ, petniones vero paritum certarum vici. Quas ob res aperti convincuntur erroris hi, qui roscolas saltantes cum petnionibus confundunt, adeoque multo maxime lapsus est Gabriel Falloppius, qui petnionibus obnoxias fecit virgines, quibus lux non procedunt expurgationes menstruæ, quasi verò petniones interioris causis agnoscerent, quæ duntaxat ab hyberno frigore ortum habent.

Quæst. 2. Quod roscola non sint chymethila Græcorum, aut petniones Latinorum.

His etiam constantibus, tam non, ut oportebat, advertitis, pletique sunt nostrorum hominum, qui morbum hunc novum minime patientes, ad chymethila seu petniones retulerunt, nisi rum communi aliqua timoris, doloris, coloris insulsi; tum quod petniones calcaneis insidentes roscolas appellatæ vulgo consuevit. Quæ tamen opinio se falsam prodit planis utroqueque discriminibus, causarum & morum. Siquidem petniones non aliter produciuntur, quam à frigore brumæque rigoribus; quo tempore ad externas corporis partes, ad internodia scilicet manuum ac pedum, ad horum calces & ad digitorum utroqueque membrorum extremam, atque etiam ad aurium infimas pinas supremosque lobos & ad omnem extensam ambitum & flexuram excitantur noduli quidam, atque tubercula dolentia, & supra naturalem carnis colorem aliquo rubore, vel livore tincta: unde fortasse roscolarum, aut scellorum vulgo dictorum est omen, propterea, quod hi talem aut colorem, aut figuram & formam habent.

Ita jam apparet petnionum externa privatim causa, & non maligna: roscolarum vero saltantis interna & maligna ex aliis, quæ postmodum dispuerimus, ostenditur. Interim quantum roscolarum sit natura, & ad quod ab antiquis descriptam viri genus sint referendum an vero non fuerint hæ veteribus dignitæ: Difficilis profecto desinit res, ac maxime incorrecta: præsertim quando doctum nullum in hæc re ducere habeamus, ac de nominis quidem pervia conjectura sit. Verum tamen adlaborabimus nos probabilis hæc de re judicium, ac nostrum in re tam obscura studium & industriam à siderari non permittemus.

Quæst. 3. Quod roscola non sint terminithi.

Hippocrates 6. epidem. comm. 3. part. 37. prodidit maxili. laborantes inter cæteros multos non premi terminithi, qui teste Galeno nigra quedam sunt pustulæ in tibus maxime orientes à figura, coloris, magnitudinisque similitudine, quam cum terminithorum, id est, cictrum terebintus habent, appellantur. Equidem ejusmodi nostre roscolæ facile videntur, si terminithorum accidentia singula (reducat) primum quidem hi ad arabilianam materiam reati per matricas exanthi degunt; ut phagedæma, ulcus, lepra, vitiligo. Deinde, niger istorum color refertur à Gal. in hoc loco. Tertio tibus insistent maxime soliti sunt. Quarto cictrum figuram, colorem & magnitudinem æquant. Quinto universo suo perspecto charactere gravis & contumax terminithorum

thorom affectus videtur præcipue, quo! alii graui dixerunt hoc phyma cum adnata pulsula, quæ cum extenuata disimulatur, ulcus parit, ut nos in lib. de uovis observatis articulis explicavimus.

Quæ quidem singula non diffinitione à natura vulgarium roseolarum. Quod enim ad communem materiam, consummationem, & sedem affectam pertinet, hæc tunc de his dubitaverit aliquis, cetera vero plurimum ad eam naturam accedant, neque ego de colore ambigo; licet ambiguitatem aliquam exhibuerit Galeno, qui principio quidem statuit oigos terminthos, deinde ceterum dixit coloris similes, qui plurimum quidem flavi, vel, ut vulgo dicunt, albi sunt: ceterum non defunt nigri, fortasse igitur nigri animo concepti, ciceris simpliciter, & absolute perussit, aut subnigros verius & nigro-virides; quales Dioscoridis Alexandræ, ac Julius Pollux terminthos præposuerunt.

Major hæc ratio est de figura & magnitudine, & omnino de tumoris genere; porro sicut aliquando posticulis ostendunt, atque, ut nomen indicat, roseolæ pustulæ sunt lætæ potius, quam phyma ac tuberculum, terminthi vero phymata sunt ac tubercula circa supra cutem & rotunda, non læta & fissa, sanæque suppete pustulata, ut greci definiturunt, quæ una re iam constanter, & figura, & magnitudo, & habitus terminthorum non is videtur, qui roseolarum. Quid autem si addideris summe tepugnantes uotum, quæ est, roseolas non præferri molestissimis & acerbissimis esse id quod utique de terminthi significatum ab antiquis aut à nobis competere non est. Ita tam laris apparet, arguementis interim aliis pro tempore missis, diversâ plane vitia corporis terminthos, ac roseolas esse.

Quæst. 4. *Quod roseola non sint læta pustule ab Hippocrate memorata.*

Alterum nunc problema de offere, quandoquidem ex pustulatione lætarum ordine posuit roseolas, an hæc expertus fuerit Simon, cuius meminit Hippocratae l. 6. epid. comm. 2. l. 1. c. 30. per hæc: læta pustulæ non admodum pruritiginosæ, quales Simon hyeme habebat: qui cum ad ignem iningeretur, aut calida lavaretur, levabatur, vomitu non lavante, puto si quis calida fomenta adhibuisset utilitatem petere. Non est, inquam, admodum difficile, ut unus idemque morbus sit, atque ille fuerit, nimirum hoc fuit: læta pustulæ conditio non admodum pruritiginosæ. D. inde, quod per hyemem vitium hoc hominem tenuerit, quo tempore viget roseolæ. T. tertio, quod ad ignem inunctus & calida lotus aqua levaretur, non autem vomitu, fortasse quod humor melancholicus, qui vitii autor erat, per eam viam ab inferionibus tractus non vacuaretur. Præterea monstratur humor is frigidas & discissa contomax ex pustularum pustula forma; quippe calidorum acuties est, & celeritas; ut notat Galenus in hoc comm.

Hæc certe singula si contrariis & comprobaverit cum vulgari roseolarum affectu, speciem unam utrorumque fecerit. Verum enim vero læta nimis, & insana duorum sibi invicem similia est conjectura, imo vetò præterea similitudinis capia non a sunt, & illa quidem plane maxima; & quod ab igne & calidis plurimum instantur roseolæ, ut quæ arabitario succo præcipio constare; & quod deest his charactæ inquietamenti nocturni, quo privatim ab omnibus aliis fecerunt, quare non crediderit recte quipiam, ut vulgare hunc uolunt, affectum ibi comprehendere Hippocrates.

Quæst. 5. *De formis roseolarum secundum vulgarem hominum opinionem.*

NON uia est apud omnes roseolarum forma; verum aliqui sunt, qui stramine, macularum modo cærem supremam lambentes & efflorescentia, quorum opinarum alii requirunt dolorem in his & colorem livescemtem atque opacum, alii etiam rubescemtem, sine autem & qui florida facie ac levi qualibet molestia sine contenti; hiique ipsi plura loci subterius comprehendentes, plurius tuberculi, quam maculæ modum volentes: sunt autem & hi, qui putant ad supputatum eadem venire, typumque habere strumatum, terminthorum autem strata dicuntur, liquidum hæc cognoscunt, à nobis plus uno loco descriptos, atque ita per undecim corpus hns dicunt esse & ad ulcerationem etiam deducunt. Præterea, sunt & qui nominant dolores aut thos (interim articulum, an artuum etiam spectato) dummodo noduli quidam tubel circa manuum pedumque digitos & compulsionem apparent; ac ceteris reputant alii symptomatum ejusmodi confectum calidum, alii frigidum affectum, nec deant, qui terminthum faciunt etiam.

Ita sunt multiplices ac vulgares hominum opiniones de roseolarum altitudine forma & natura: verum falsi & pendentes opinantes hi cuncti, quod non memorent illi proprietatem ac distinctionem, quæ est invadendi noctu, quem nos tam singulariter spectamus, & quam privatam & propriam affectus conditionem affirmamus; quæ autem ejusmodi non sunt, eas à verarum roseolarum numero facile relinquitur. Sed ipsi interitum illarum formam cunctatius ediscimus.

Quæst. 6. *De charactere tumoris.*

Infinita pene, sicut in arborum malis omnibus adverterunt Botanici; sic in abortivis est, seu naturæ fallentis, seu morbi cum suo materiarum conditu luxurians varietas, formas enim seu vetus difformitates inducentes, tam multa horum genera, tot vultuum species, tot figuratum discrimina, tot colorum & maturitatis modos non tam eveillant, quam exoptentur utrique: quæ, ut nunquam sitis pro dignitate pusculabitur aut comprehendit unus qui plura hic non ad angustiam aut exponit aut graphice delineabit. Quia enim tam solerti sit ingenium, qui singulas suas conformationes methodo comprehendit? aut qui tam felici sit stylo, ut explicare possit in his fililem formam, in his extumescemtem globum, in aliis ambitus in rotunditatem circumacti, figuram, in aliis infirmam pulmonia tumorem, qui quidem à mammarum crassitie longitudine, qui à pannaceis rugis delectantur; quidam corpore toto vegetus habetur, quidam quo parte tantum illustrat calor, sunt tales, quæ vetò frigidus humor incombibile, emoretur, sunt aliquid in vaticosum gibbosumque flexum circumducti, alii pari instar coacti, non tuberculosi, nonnulli biphiditidi-que, qui pedunculo nitentes: qui læta basi, sed in orbem clata sic nulli producant extra promini, videlicet & reductos, siffulatos & reimos, præterea pyramidis conum, melles, vetruæ, scopuli, grandinis & clavisformæ succurrunt & animalium grous æmulantes talpa, testudo, myoccephalus, polypos, ramula, myrmecia, condyloma, unguis, ala, lichenes, & ex vegetum ordine syofia, nva, melon, monis, terminthi, glandulæ, amygdalæ, thymus, lenicula, milium, hordeum, porri; & quis sub compendi præcisi pro referat omnia.

At equidem

At eundem si recte mentem & oculos per omnia conjiciat, non vulgaris & obvia, sed insolens & singularis apparere forma tumoris, qui roscolarum salutarum promeritis est nomen; hunc eundem nulli confectum ex me notatis, nam hi omnes appetiti, revulsique propemodum e corpore, noster hic non tam extra, quam intra sua limina tumor est. Verantem obviaverit etiam sua sepra laticulculum, sed uniforme substat tuberculum, quin verius tubercula plurima semet, ut dicit, singula suis quasi lachris occultantia, ob id aciem, quod nitare contenta non sine, ob id ipsum a majoribus nostris roscola numero plurimum sunt nominata, sed, ut communi suorum omnium complexu non multum exsuperantem conficiunt turgorem, ita etiam singula pressolam referunt rotunditatem, adeo ut recte quidem fabis consuleret Cornelius, nos quoque lupinis equiparavimus: itaque si nostra hæc referas ad summam unam, est hoc tumoris genus (suisimura, ut homines nullos lateat dantur peritos. In qua ipsius circumscriptione, si quidem o.ulate perspexeris, visentur & quasi rodii quidam ex albo tubescerent, quas sanguineas ego fibras existimo, per cutem humoris alluvie transluentem, eteola autem, & has insignius alterati, luciliterque turgescere, ubi per noctem dolor incurat; si vel intendatur ipsi, vel rem comprehendere sub maligna luce sententium oculi possint.

Quæst. 7. De differentiis roscolarum.

AD hæc autem discrimina roscolarum sunt exponenda, ex qua una te plurimum lucem huic univerto sermoni manaturam confido. Cuperimus rum aliorum audire, tum observatione nostra duplices esse roscolas, alter modus est nulla non anni parte molestantium, & ad plures etiam annos etiam adversus excellentia medicamenta consumacium, quippe quo ab adusta melancholia, nigrotaque pituita proveniunt, ob utrorumque gravitatem circa tibialique potissimum affligentes, quas privata comprehendit propoluitque nobis Cornelius Crisus, qui colorem sublividum, & subnigrum illis attribuit pustulis pessimis nominatis, item quas definitivè Julius Polux ad Cornelii sententiam maxime accedens auctor.

Alter roscolarum modus est lenior, brevior & curatui facilior: imo, qua per se ipsis discedunt appetente vere, quæ hyeme surgant ortæ; superiores autem partes, i. manuum, articulos & interodia tentare consuevit pruriginose, ac de uno in alios digitos, deque sinistra in dexteram manum vagæ, in necondylis verò nata ad extremum discessum ungues ab radicibus plerumque divellant, propietates nimirum, quæ in alteris non sentiuntur. Hæc ego de utriusque discrimina & observationes collegi: quæ medens uti tuo comp. obare possis omnia, si dulci quidem & accurata rerum istarum contemplatione gaudes.

Quæst. 8. Epinyctides Græcorum roscolas esse vulgi saltantes.

HUjus mihi problematis demonstrationem recte recteque influentem, necessarium videtur, ut definitionem sive græcorum sive latinorum, & horum præcipui Cornelii comprobem, nostris ad unguem roscolis accommodatam, idautem non fit, nisi per expensas collatasque particulas ejusdem definitionis, ex his autem primum occurrit genus, quod est apud græcos quidem ulcuscula, apud latinos vero pustula.

La. Hæc igitur utraque appellatio nostris roscolis primum congruat oportet, ut eamdem ostensionem complere possimus, atque adeo monstrandum est, duas illas voculas discriminis completi nihil, aut parum.

Primum igitur ne duplicetur, quod ulcuscula, ulcuscula dixerit Paulus, hoc aliquo nomine non osus exactè. Porro vocabulum aut ulceri significando non est allatum, aut tubercula denotat. Quod enim ad priorum partem pertinet, quomodo quæso te *ulcuscula* sponte, quod Paulus ait, *epinyctes* (efflorescunt) nempe ulcera non efflorescunt, præterquam quid tubercula dixerit ulcera, quorum ulla unquam ab aliquo dicta sunt rubra: quin neque dici vetè ralia quæunt, quando roboris catigosema, præterquam solutis sive ulceratis ipsis partibus & cani corio eudata non compertit.

Attributum igitur aptius tuberculis, quam ulcusculis rubor fuerit, argue ad hunc modum etiam ulcusculi nomine videtur usus auctor libel de viture centaurii cap. 4. P. qui ait. *lavr*: etiam ulcuscula, quæ sunt in capite ipsa, & parva, & rubicunda, parvis papillis similia, & phygeila ipsa, parva & embicunda, permixtus cum aqua, & abrafo capiti inunctus succus. Enimvero ulcuscula dicit papillis similia, ac si dissidet tubercula pustulæ, similiter & ulcuscula eminentia in paribus corporis dicit Galeus in l. 5. de comp. medicam. secundum loca cap. 7. Quod autem modo ulcera eminent, quæ natura non eminent, sed cava sunt & abrafa?

Præter hæc & quo pacto calx cum oleo, aut acetum cum scissio, aut oleo prudenter imponatur ulceribus, quæ maxime potest quomodocumque medicamentis irritantur, ergo non repletis tuberculis hæc insinuantur. Confirmatur autem nostra hæc interpretatio, quod Oribasius, ex quo Paulus & Actius acciperent, apud Actium scripta reliquit hæc: Postquam vero epinyctis excoriata fuerit, emplastris liquidis utere, & cave ne actia & acida, & scissa adhibeas, quo igitur, inquam, modo calcem, aut acetum prius propolita sunt, nisi quod hand ulceratis earum præcepta sunt? discrimina autem explicite (postquam excoriata fuerit,) &c.

Iam vero ne te perturbet, quod ulcuscula, quasi parva ulcera dixerit idem, nempe ulcusculi nomen numero plurium usui medicorum veteri & communi, potius videtur pro tuberculis minoribus, licet ulcusculum singulari numero possit usurpari pro parvo ulcere, significetque solutionem consensu, non tuberculum verò, qui sensus apparet aperte per id, quod mox addidit dicens; quibus rupis, quasi non fuerint ante rupes: similiter & alio hujus ejusdem libelli loco, petulones definitivè quidam ulcera principio, mox ad eadem ulcerata curationem accommodavit hic vir, ergo promissiones naturæ non sunt ulcera.

Sed ad pustulatum nomenclaturam veniamus, ex his, quæ observamus tum apud Cornelium Celsum l. 5. tum apud Paulum l. 4. atque apud alios etiam melioris notæ auctores, quadruplex apparet tumorum omnium ordo: primus, tumorum præcipue magnitudinis; ut carbunculus, carcinoma, & his minores struma, furunculus, phyma, phygeilon. Secundus est tuberculorum, è quibus sunt ac rothodon, thymium, myrmecia, clavus. Tertius sunt pustule, de quibus mox dicemus. Quartæ sunt asperitates critis, ut scabies, impetigo, &c. sed pustulæ triplices sunt Cornelio exanthemata, phytation, epinyctis, quam quidem epinyctidem cum nos tuemur verè non aliam, quam vulgares nostrorum roscolas, has quid dubitamus in pustulatum recensere familias? Est

lia? Est non evidens quidem tumor, neque tuberculum, sed qualla quidem lara exanthemata vocavit Hippocrates lib. 6. epidem. sect. 2. part. quæ est (lara exanthemata) &c.

Neque enim placet opinio Francisci Vallesii, qui argumentatur lara exanthemata tumores esse propterea, quod larum contrarium est acuto. Sed non videtur, quod adiungitur, sequi perpetuo naturam exanthematum, quæ non præterfuit, neque adhiñont tumorem, sed solum coris ex humore supetfuso tincturam, præter quam quod neque larum advenfatur acuto, sed obtufum, necumque aotem fuam opinionem tueretur Vallesius: non erant lara exanthemata tumores, sed aliquid tumoris habentia. Tales equidem aio rofeolas nostras, quæ neque pustule fimpliter, neque tubercula abfolute funt, fed miftam ex his naturam habentia. Quamquam est iocundum, ut inconfpicua quidem, fed acri tactu deprehendendam infra contineant tuberculi fpeciem, quam lupulo vel fabæ fortaffis æquiparaverit.

Ad hunc modum apparet non abfurdum, quod pustulam, id est, piffillam rotunditatem intro forifque delitefcenrem, fimul & emittentem enunciavimus, rem quippe vetricibus non infuam. Sed Avicenna dicit pustulas glandulofas l. 4. fen. 3. tract. 2. c. 7. & ex hujus viti fententia Leonardus Berta-palla l. de apothemat. cap. proprio, & Ioannes Ma-nardus l. 7. epiftularum 2. quod durum, & admi-nabile videri cuiquam non debet, remiffiffimis nobis, quod & Oribafius meminit terminothum, qui lupra tuberculi faciem adicifeant pustulam, enim vero morua duorum ead æfinitas de congreffo: ex pustula, inquam, nonnunquam etiam ulcuscula funt; licet aridiora, & modo tantum cum praticine, modo cum inflammatione, aut dolore, etieque autpus, aut fanks, aut utrunque, ita quidem Cælius de pus-tulis dandim exulceratis, de coarctato vero ulcuscu-lotum in pustulas commotata teftari funt indicato fepe loco Græci ttes, q. i. dandim exulceratis dixerunt; itaque commutatis velut hofpitibus, ac vicibus, nunc ulcuscula tranfinigrant in pustulas, nunc pustulæ in ulcuscula, adeoque non abertavimus à recto nos, qui rofeolas fecerimus ulcuscula fimul & pustulas; tuberculum quidem, quod aliquando fubterius abdu-rumque exiftit, fabæ vel lupini modo ex ralfiore materia coalitum; pustulas vero paulo evidetiores ex tenuioribus fuccis conflatas.

Quæft. 9. Hypothefis de nocturno rofeola-rum dolore experimentis comprobata.

EST primum rofeolarum indicium primumque sym- ptoma difcretivum noctu moleftum dolor: quam ante omnia fpectari ftatuique oportet, quo poffit ad cæteras comprobationes ftatui oportet, qui mihi labor incuendos fortaffe nunc non eilet; fi noftres medi-cos noftam hanc rem advertiffe: verum quando rem ejusdem omnium & curationem fœminis remiferunt, neque de his rebus obfervatio per viros doctos ad hoc tempus facta eft, neccffarium profecto videtur, ut de perpetuo fub noctem epinyctis dolore diffe-ratur; imo verò, ut ejus vi per experimenta fides aliqui proftitatur, quandoquidem hæc tractatio magis ad obfervationem, quam ad fubtili difquifitio-nem pertinet, quamquam non eft, ut aliquam ejus rei rationem comminifci non poffimus; eft aotem ea me judice, quod humor melancholicus, omnium afrooomorum & medicorum confenfu vefperinis horis analogus eft, igitur hoc tempore vicens & hoc etiam decumbentes exercebit accretus, qui humor

in hoc affeetu confando & confervando præcipua eft. Taceo, nam nil repetere necelfum eft, ratio-nem aliam, quam parte libri priore cap. de nocturno epinyctidum dolore produxi.

Sed hæc apud alios, qui tergiverfentur, nulla funt: obfervationes & experimenta profquo; quan-tum, præter quam quod infinitas alii lupet multa languentibus facere per feipfos pœtunt, hæc mihi nuicero non exaugo colligiffe, fed verius meminiffe licuit: quæ funt.

Prima inter omnes fortè nominanda Dionora Stephagnola puella colore fulcior, habita corporis procefo, nec male fimo 17. annum natu, parthe-nophilaci. Spiritus fancti templi Neapolis, una, quæ 4. jam annos id morbi quæfta eft ne, ut infirmas contubernales omnes, quas trecentis frequentiffima puellæ domus hæc facra alit; iniquiet ac vigiles tenet fecum. Surgit autem à ftirato dolore præcepti & non conqutfcit, oîi plurimum temporis alternè rli-bias commoveat fic, ut tripudafæ ptopmodum vi-deatur. Altera ex ejusdem Parthenophilaci viciagi-bus, quæ rofeolas utriusque tibiis palli eft, fuit Lu-cetia de Caftro puella, contra quam prius, tenuis habitus, & fubalbidi. Terti, filla eft obfctitica ha-bitans in ang'portu fancti Gregorii Cænobii Neapo-litani, plus tunc hor. lib. memorata: quæ nocte ad-ventante procius acres dolores perfentifcent fingulis diebus folita eft. Quarta puella quindæim annos na-ta filia Mercularii, in vico, qui ducit ad portam Pla-gæ, quam unâ cum doctore medico Nicolao Angu-lo ab Elienis ad obfervandum à me perducta, vi-ro terum nobilium curiofo, obfervavimus. Quinta Olympia Cytharella Typhouli Cythællæ Amalpa-entis auditoria in re medica noftri foror germana, quæ nocturna tempora duriore fentit, hoc vitio diu gravata. Sexta Antonia Moza vivens ad mœnia fecus D. Mariæ Gratiarum, quæ exulceratas pariter & tuberculofas eas pustulas annum eit exætera, fœmi-na coloris fufci ac prope virago. Septima, quæ po-ftrema quidem omniū fe obulit, ac dignitate pri-ma, Victoria Purpura magnifici viri Andree Mæda-ti conjux, quæ X. jam annos hifce pustulis nigrican-tibus fecundum tibiā finiftam afflita eft, quas ego exulceratas hoc anno detractis nigris cruftulis cura-vi. Hæc ego linguentes (fœminas ergo maxime vi-des obnoxiās) & quamplurimis memoria fervavi pan-cos. Numerabam aureo vix numerabiles alios id morbi paffos Reverende fanctimoniales Dini Mar-cellini Cænobii Ne politani: quorum pila jam mul-tis annis eft cura, accommodatos hifce languoribus fyrupos parare: hæc quippe nocturnas hujus mali ve-zationes longis experimentis competere.

Quæft. 10. Comprobatio coloris, materia, ac reliquorum indiciorum.

Restat ad incepfam demonstrationem poftrema comprobatio reliquorum omnium adnexorum 2 inter quæ prima feminaria funt humorum, & inde color, quorum hic alteros confequitur, ac reficit, fi verum fit, quod teftatur reliquis Hippocrates l. de humoribus; fimilis color efflorefcit humoribus, nil intro regurgitaverit: verum quod ad pofteriorem e-nunciati particulam attinet, potto fub hoc vitio fe fo-ras exenit humor: pustulam enim fecit. Atqui hæc multiplex eft, quæplex & epinyctis apparuit, e-tenim fi fubftraham quæfieri. qualem Græci vi-ri propofuerunt, & ejusmodi per initia nos eam vidimus: quo f. tempore nihil diffam coloris flou (iude enim exanthemata dicta) fub-rubram illam rofaginis fpeciem confervare pœuit, doct

donec aeris occurrantis refrigeratione & contaminatione obtusus in dies maturatq; nitor est in faciem opaciorē, atq; aliquantulum livescens, ac deinceps in oblescentem vitorem.

Præter quos ad nigrum accedentes colores, & albus memoratus est à Celso, qualis & ipse videntur in gastritis roseolis: ubi si aliqua ipsarum parte vel recurret humor roseus, vel non totam æque carnem densa coloris aspergine tinxit, ita quidem seu accedentes, seu collecti sunt uno brevi circumducta varii colorum modi. Neque Hercules injuriā, siquidem humores subtratos species; qui in sanguine plurimum abundent, pituita s. & melancholia: quarum quidem adultam hanc, ob pravitatem firmamque ac longum adhaesum; nitroden illam, ob nocturnum præteritum iniquitatem & ob exulceratam, quem sæpe facit, opinor, sic calidum simili & frigidum affectum constituto; qualis & uterque succus est, nam pituita nitrosa bilis amaræ non caret admixtione, atra vero bilis, quoniam æquiparatur ætero, quemadmodum l. de atra bile docuit Galenus: ob id utique utramque qualitatem servat.

Quæst. 11. Dubitates aliqua discere.

His ostensis aliquæ nunc ambiguitates supersunt resolvendæ, quæ nostro huic placito suspitionem aliquam injicere possent, una est, quod veteres per externa dantur medicamenta curandum hoc vitium professi sunt, atqui nostræ roseolæ, præterquam internis expurgamentis non eximuntur, ut alio loco monstratum fuit, quæ de re malum aliud hoc, atque illud apparet: Ad hæc aliud adversari nostræ suasioni videtur, quod nullum contra cacochymiam, aut cacochymiam remedium admodum lunc avores antiqui, æquum autem fuisse, ut exactius & absolutius suam morbi curationem expolissent, quod cum non est factum, sua est in promptu conjectatio: quod non tanti momenti morbum fecerint, quanti nos facimus, ac proinde non unum idemque se monstrat vitium.

Hæc quidem argumenta in speciem primam videntur rem non obicere confectis: verum enim vero non plane conficiunt, enim vero fieri potuit, ut græci pharmaca quidem interiora silentio præterierint, ac non diæterica tamen auxilia, quibus inter omnia maxime consili sunt, illa autem quævis taceant, tamen eodem pto confesso velut præceptum perpetuum & universale stauerunt, quod si recte advertitis in aliis plebique facere consueverunt, neque enim sic sunt hi profusi præceptum inculcatores, quales hodierna die sunt nostri, sed singuli res antequam Synopses & compendia medicinarum ex vasis Galeni latifundis translatæ conscripserunt. Præterquam quod supercibus istorum repositibus assueta corpora variis, ac frequentibus excitationum generibus, exhausta multo non habebant opus, sed natura in his libera plurimis excrementis longe validiorem ad evincenda mala se exhibebat. Quibus rebus factum est, ut optimi scriptores, & non tanti vitium æstimant, & multum in his opere ponendum non judicant. Quamquam neque sic genus hoc morbi videretur Cornelius Celsus, ut non præcepit ambulationes, exercitationes, gestationes, abstinenciam plurimorum, sudationes in balneo, descensus in solum, atque alia; quæ si providerent aliqui veterem; quid adstruant ulli, quod epinyctidas æstimaverint, quam nos, certe minoris.

Quæst. 12. De causis roseolarum generationis

Quidam in hac re philosophantes, dum accidentium varietatem inspicunt, cuanque, ut cunctis problematis per suas hypotheseis satisfacere facile sit: è quatuor humoribus omnibus, quorum vicio morbus emerget, nullum eximant, sanguis quidem, cujus sæpe videntur color, aut ad hunc accedens maxime discolor facies. Deinde &, quod hic afficitur plurimum in calidis atque humidis ætatibus, habitibus, naturis videntur, quæ maxime ad sanguinem exuperantiam accedunt. Post sanguinem est pituita, quæ non difficile congeritur in feminis & albidis corporatibus, sed nitroia potissimum illa est, cum glycyptica prurigo male valentem locum inest. At neque rejiciat bilis, quæ vellicatim aliquam & acrimoniam præ se ferat. Multo vetò maxime & pthoricitur melancholica portio, præsertim aliqua parte tetortida: cojus & malignus color, & solus color, & pertinacia sæpenumero oblectantur. Itaque vides in congesta Trachelocæ (sic enim appellare nunc licet) nullum excludi vitiosum humorem, sed omnes aut plurimos confluere; sed & multa parte labores singulorum humorum etiam subsunt. quodammodo tædet eo argumento, quod polyphidio curati confocuit hic affectus, quod si & genisse medicamento corruptum à nostris inhaerens humor: id fit propterea, quod admixtum sanguini non nihil est viscidæ pituitæ, quo fit, ut curentur sæpe non aliter, ac stenuat.

Quæst. 13. De causis speciatim, & exaltis.

Sunt evidenciores hujus morbi causæ, aeris, æque, loci; maxime sicut epinor, cum ad frigidum & humidam exuperantiam exorbitant. Ita plerique populi est endemius hic affectus, potissimum verò Neapoli frequens est, in qua urbe propter celsitudinem ædificiorum, quæ re proximæ, id est, paucæ loci intercedunt spectant, minimus est solis locus collustratus, & in qua etiam pluviosa nimium est anni pars & sæpe austrius constitutio: quibus causis accedit & victuatio ex carne bubuli & ovilli, & ex omni brassicæ genere, capitato præteritum, & ex falsis piscibus ulcristina. Est ex hoc genere multorum ulus ferculorum à quo morbos uberrim exaltat ex omni antiquitate in Nepentes opere demonstravit Petrus La Scive vir multicus, ut doctæ ejus edita commentaria satis testantur. Additur & causa, labor, qui prope nullus agnoscitur poetis, & puellis: quem utrumque ordinem privatum obnoxios sibi morbus renet; inde enim sunt cruditates, obstructions, cacochymia, cachexia, quantum vi pollet, excipitur, fovetur ejus vitii cacochymia.

Tæco, quod posteaquam venetra linc exitit, ab illo corrupta est plurima parte sanioris integritasque corporum, quæ progignunt, unde melancholica potissimum, & prava malorum seminis est hodie in hac terra: porro tam minus absit, ut *trachinor* & *trachinor* sit Parthenope vera vocabuli fide, ut cum pubertem, seu dicam potius, cum via compositam venetis se fenerit homo, continuè cum scorticalis commisceri ac provolvari consuevit.

Est & præter hæc suppressio superfluum causa mali præcipua, unde feminis solentis morbus, quamquam pueris, ac puellis impuberibus, puberibus, qui prima generationis expurgamenta non abiecerunt, vel pluskam puritati conveniant, trinitur, pædarthroace nil operata, hoc affine vitium succedit. Sed & foemellis menses desiderantibus frequentissimus hic affectus est: qualium unam, inter cæteras novi, filiam obstetricis in Divi Gregorii, angiporro; cognosces

cognoscere autem facile superfluum hanc suppletionem, quod gens hæc erit languorosa, defecari coloris, & oculis impuris omnes: quamquam non propterea sit, ut meliore colore præditis non adveniat hoc malum, sic modo memorata filia obsterit utroque crure languebat etiam belle colorata, sed hoc unum exemplum mihi vidisse congruit, neque mirum quidem est: nam nihil in medicina perperum affirmavit Cornelius Celsus in operis proximo.

Aliud adhuc explicandum potest: & quid huic affectioni sint obnoxii iuniores, vel accedentes ad hos annos alii, non seniores & ætatis grandiscule homines hæc mali genere infestentur? Nimirum, inquam, quod ætatis primæ moratio cum calore vegeto conjuncta viciis intro conceptam non potest mature non eruptione; discedere in exteriora corporis habitum, ut in aliis quoque superfluitatibus fieri nobis, itaque non testat hanc effusio in grandioribus facienda, quod si testat tamen magno quopiam impedimento, live ad expultricem facultatem, live ad humoris crassitiam, live ad vias præstante vertus eris id evenisse, vel dic iuniores huic vitio subditos & opportunos fortasse propterea, quod his primis ætatibus superfluitatis sanguinis multa redundant, quas vegetus & in incremento, & in ætatis mutationibus vertunt calor nativus in tara corporum textura fecerit ac purgat: quod non ita facile nec sæpe evenit senioribus propterea, quod sunt exatiores, minusque vegeti.

Quæst. 14. De modo generationis.

PUstularum in aperto corporis generationem aperit Galenus in comm. 2. ad lib. 6. epidem. text. 30. per hæc: Egrediantur pustule natura corporis altiores sedes tepurgante, ut nonnunquam per excretionem, ita & per depositionem ad cutaneas partes, subillotes liquorem diffundentes succos extenuans natura discutit; crassioribus autem cuti, sed potius pelliculis, quas epidemias vocat, utpote densiori inhaerentibus pustule exoriantur: idque magis loci sit, his qui densiore ac duriore cute sunt; difficilis est enim per ipsam pinguiorem tenaciorumque succorum transitus. Hec ille.

Refertur autem excretio quoquo pacto ad operam naturæ criticam, ac melioris valentissimi gratia instituta, neque enim prius, quam expultricis vis polleat, fieri solita est. Jam enim quando natura videtur superfluitates illas & ichores, menstrui singulis reliquias in corpore coagulas, quæ principis graviter incommodant, & officiant, protinus, ut æthiocratici convenit, lectissima corporis parte vendicata, quæ cerebrum, cor, & hepar sunt; ad abjectissimas i. ad extremos artus inquinamentum amandat, quod videtur hanc mirum esse, quod prope præcordia aut viscibus incumbens nunquam visa fit rosca mali facies.

Quoniam autem ex internis venarum conceptaculis prodit malum, post majora vasa, quæ facina levantur, sunt tam descendentes illi, à quibus continuo factio pulsio, jam ad crurales deveniunt minores, per quorum minimos succulos eructata materia per tibias antica, postica & omni facie perperat vitium. Jam verò cum & per brachia, quod rarius aliquando fit, seipse proferunt ejusmodi macule, verisimile fit; humoris tenuitate aut transmeatu bilis id evenire.

Quæst. 15. Nota differetias à consimilibus moris.

QUONIAM autem cum plethique viciis extimi corporis conveniunt roscolæ notas istarum differetia exponam. cetera enim indicia, quæ ad marcium, formam, figuram, colorem, dolorem, ac reliquias

Bibl. Chirurg. Tom. II.

noxas, & sympt. mata pertinent; jam credo me satis in prioribus hujus libri disputationibus explicasse. Similis hic affectus est aliis multis i. teminthis, latis exanthematibus, esseris, benar noctis, glandulis, à quibus quantum distent, & per quæ, jam audisti.

Restant syphilia tubercula inflammatoria noctique perdolentia, quæ manus pedesque & eminentes omnes partes coctipere consueverunt, ad has accedunt maxime roscolæ, accedit & arthritidos quædam fors, quæ memoratas roscolas, per extricatos moribus pedibusque nodulos tuberculos, & afflicantes amulatur. Sunt hi quidem utrique tumores, ac dolores nonnulla parte similes, verum, ut ne tibi imponant, adverte causas, quæ in morbo quidem venere per alia symptomata se produnt; in morbo verò articulari junctura ossium & articuli piliatim tentantur, non artus medii, sicut in roscolis consueverunt.

Adde, quod rosca morbi species peculiaribus & propriis suis definitur ignis; quæ supra jam exposui præter quæ nunc describam & alia, quæ spectant partim ad tempus sui accessus, & ad ætatem hominum, qui hoc malo tentantur; partim ad corporis staturam. Porro non observavimus affectum hunc potissimum advenire pueris, sed multo maxime pueris, ac feminis junioribus & omnino ad florentis ætatis annos, nimirum propterea, quod impuriores sunt semper mulieres, præsertim quibus statim menses minus rite recteque procedunt, hi grandioribus id tale eveniat, apparente quidem imagine roscolarum, non tamen erunt vere roscolæ, plurimum enim syphilidos est hoc germen; verrucosum simul & imperiginosum viri formam referens, ut dixi: quam ex deleteria sua causa sedulus inquisitor facile deprehendit.

Hujus ejusdem viri stabili ortus ad hyberna tempora, sicut equidem observo, solet esse, quamquam Cornelius Celsus in libri V. loco alias citato generatim ait, pustula maxime hybernis temporibus oriuntur, nec injuria quidem ad hyemem est earum accessus, quo tempore calor ad excernendum valentissimus est, atque humor aliequ crassissimus diffusi per compactam cutem facile non potest.

Ad hæc longa observatione contempnimus, qui hocce malo tentantur, his omnibus esse plurimum in sanguine impuritatis ac superfluitatis, cacochymiam præci dicunt: quia causa fit, ut longus & pertinax sit hic affectus, ob quam eandem sanguinis impuritatem non injuria quoquo sit, ut mulieres, quibus expurgatio mentis non fit, etiam graves, & bene habite vitium hoc incurant, ac tandem detineantur ab illo, quamdiu morantur, & non effluunt istam mentis.

Quæst. 16. De re prognostica.

FUTURORUM observationes in hoc morbo facere mihi sunt hæc: neminem ad interitus pericula perducit, sic Hippocrat. 1. epid. sect. 3. nocturna non admodum lethalis, verum longa. Sed tamen in articulis & membrorum languores sæpe finitile visa est curata perpetua affectio; neque me Hercules injuria: Siquidem vigens & diu consistens humoris pravitas, ut ulterius procedat, tempore obinet; processit autem à mediis artibus ad ipsos articulos invalescente morbo facilis est, quibus locis hæret firmius & hospitatur imperiosius, in ulcus autem transmigra sæpe lata pustula fomentis acerbis & salis fusa, nisi tamen id, quod gravatum erat corpus ope medica mandatum sit; sunt autem morbi moræ cum obestio corpore semper longæ propterea, quod humores plurima parte frigidi crassi multique dominantur.

Via salutis est natura quidem concoquente ac dissolvente superfluitates, in quibus nimirum corporibus ipsa prepotens est; verumtamen admodum raro visum est, ut sponte naturæ sine medicamentorum auxilio

H

difficilis fuerit victorum gravidus hic affectus, quæ facile omnia contraria & refractaria humoris, quæ morbum fover, natura. Ars igitur accedat oportet, quæ & crassos humores attenuet, obfusque indurcat, metus expellat & ampliet, & in summa concoquat aut discoriat, tum per interna, tum per externa medicamenta, atque alias medendi rationes, quas brevi tradere jam instituo.

Quæst. 17. Indicationes curandi, ac therapeutica ratio generalis & particularis.

Postrema nunc cura superest recte medendi, atque omnibus, quæ præter naturam sunt, occurrendi, sic rite nobis agenda proponemus hæc: Primum enim, studium erit, ne qui molester, affectus, in dies augeatur. Secundum, ut, qui conservari jam sunt humores, nature prægravantes, ac vitium foverentes excludantur, & hæc quidem adversus causam provisio est. Tertium, quoniam nos admodum magnus Hippocrates 2. epid. sect. 2. abscessus veluti glandularum signum quidem eorum, quæ germina habent, ob id, & quia significatur inde malignus morbus, ut Vallesius indicavit, propterea partes interiores ac tota viscera medicari diutius oportet, ut tum eximantur, cum castigentur. Quartum, discutiendum quodcumque circa particulam incubat alienum incrementum. Postrema circa partem dolore levandam, roborandam & in suo statu naturali conservandam, est occupatio.

Jam igitur, ut generales has præscriptas medendi formulas singularem, & adamasium exequamur: principio cibi parces amplectenda, quorum ciborum est & qualitas eligenda, hic, ut hi non salsi, aromatici, acuti, non atrum succum gigantes, non frixi, non exusti capiantur, itemque non legumina, non carnes ventulorum pecudum, non cetaceorum, aut aliorum piscium, non suilla, non pinguis & oleosa, non acida, neque acrum asferunt; sed homo contentus esto carnibus juniorum, quæ maculant, avium montanorum, gallinacei generis, potius elixorum, quam asporum, ovis dudum parvis, recentibus caseosis & coacto lacte; ex oleisbus elenctur impietis buglossum, vulgo borrago, post hæc endivia, cicorium, attritæ, condita, beta, lactuca memoratis cuminum jure decoctæ, vinum aut olygophorum esto, aut paulo vividius aqua dilutum, à grani & nigro abstinentium; ut quod exhibet fomentum arto succo, fervorique ejusdem, cui remittendo atque attemptando refrigerante victus ratione utendum admonuit Joannes Huiccherius 1. de pulsillis. Cum alimentorum observatione conjungitur & aeris usura siccioris quidem, quod ad passibiles qualitates, sed temperatioris, quod spectat ad activas.

Accedit secundus scopus, qui bisariam expletur corporis purgatione, qui delinquentem humorum qualitatem expugnat, & sanguinis detractione, quæ plenitudinem exhaustit, si ipsa sit. Sed vulgarem medentium opinionem ac motem non omissam referte, qui minime pariterunt, ut vena pungetur, aut quæ arthritidis detrimenda, quotidiana mollicium incrementa solet immittere; quam quidem idiotarum opinionem tæpe iudice continere non oportet: Sed reputandum est animo vitium hoc bere fucis, quæ potissima parte distillat sunt à natura sanguinis, si pituita & melancholia: unde fit, ut & polychronicus affectus sit, quales omnes affectus venæ sectione non tractant majores nostri, caventes, ne sanguinem amplius refrigerarent. Adde, quod venæ sectio suapte natura mobiliorum & expeditiorum in valis reddit humorem, quæ causa fit sæpe, ut podagra vel chiragra aduocetur, quam ob causam credo factum, ut aplicatum ac fumentum pro-

hibuerint græci; quamquam balneum probavit Cornelius, quod pleniorum & calidiorum hic motor statuerit affectum. Sed neque modico dissident intervallo medicamentum universale ac particulare, hoc quidem fomentum, illud balneum est, omnibus autem modis expertæ nostrates vetulæ & oblectrices toseolarum modicæ, timent à sanguinis detractione; detrimpta fortassis expertæ. Quibus quidem suis eperimentis; & quibus nuper expolis rationibus manes dare non oportet, verum sit, gracilis homo sit, qui malo vexatur, abstinendum est phlebotomo, quod si plenior corporatura sit & confaciator, hanc utique semel inanire multitudinem non alienum est; ne si illa facultati stimulus sit expellendi, quod 13. methodi therapeutice ne semel quidem adnotavit Galenus. Sed & absolute phlebotomie curandus epinydis docuit Joannes Huiccherius in 1. de diæta, ac therapia pueror. c. de pulsillis alias citato. Atque sic brevi controversia composita, est evacuandi locus è brachio, vel ex manu; si mas sit; è pede verò, si summa, sunt & qui utriusque sanguinem è venis sedis eximendum velint, quæ tamen vacuatio secunda sit aliis phlebotomis oportet.

Sed, ut tertio scopo satisfacias, cathartica non sunt alia deligenda, quam phlegmagoga & melanogoga; ex his autem præcipua sunt mel solutum solutivum, & Scraphium de polyposio, sive apud nostros D. Augustini, & confectio catholica Arnaldi; & Regis Hamech, quæ pro vitium, habitus, ætatis, & regionis modo plus minus committentis & oblectris; Scraphii preparantibus ad hæc ordinis est cortice citri; & è succo fumarie cum aqua mellis vel buglossi. Jam autem, ut quod maximum & præcipuum est, viscera restituit, & malam his habitudinem eruderes, non una quidem ratio est. Nostri curatores omnes è vulgo consueverunt offerre geniste facies saccharo conditas, sunt autem & decoctum leniculis cum melle dicant saria bene fecisse. Plurimum verò præ polyposium prædicant optime facere, quod Medarus lib. de simplicibus cap. 5. calidum fecit ordinem totum, succum secundo, quod humores crassos lentosque torget, digerit, siccet; bilem atram & pituitam vel crassam, vel lentam purgat etiam à junctura; æthereis ob hæc melancholicis prodest, ut quartanis præferam cum multa epithymo, fale indo. Venit nos, ut polyposium probemus, tamen exotica sennam sennam nostris non facimus, tertium verò, sed in attemptandi facultate primum affectus Centaurium majus à nigro Chirone primo quidem chirurgie, ut non secundo pharmacie magistro inventum. Adhuc non omittenda simlax est alpera, quam pro sparto. parili ipso indico, exacte restituit Marius Schipanus singularum medicum parium, & botanice excellentem peritus; neque quod nodoso sit simlax propterea de hac re dubitaveris, quippe id, in quo æquiparantur nostra hæc simlax & rubus Indorum viticulosis, fibre sunt enodes ac longæ, quæ sunt utrique cum lignosa interna portione parites ac perpetuæ. Sed de his apud Prosperum Alpinum 1. de plantis Egyptiorum latè, non interim revertimur ad institutum.

Quibus medicamentis compositum unum decoctum saccharo, vel melle conditum offeres ad multas, tres minimum, aut duas hebdomadas hauriendum scilicet pondus, Centaurium ad uncias iij. poly. ad unc. iij. senna ad unc. j. in aqua fontane sex lib. decoquantur, primum thaponicum, mox polyp. extremam senna. Hic dispar admodum non est Scraphium dictum majus è fumaris, cujus binas uncias tum polyposii, sennæ, thaponici decocto ad duplum addito, sanguis hauriet, ad longum etiam dierum numerum, quorum jam præscripti.

Sed omnes compositiones superaverit ea, quam mox exponam. Sunt, ut in Padastroacae docui, an-gues, quos à calore cervinos dicunt, ad contumacium gravissimumque morborum curationem mirum in modum accommodati, qui superfluitates corporis exic-cantes eluunt, & naturæ lapsus omnes nativa quadam virium proprietate caligant, itaque & ad lucem vene-ream efficaciter expugnandum hoc præcipue medica-mentum voluit utendum Ladovicius Metacius inter Hiipianos omnes medicos experientissimus. Quod ego Serapion sic parare consuevi anguam cervinum vul-go cervonum etate media, ac bene habito corpore in arcula ligneola, quæ fustibus ac sale m receperit, ali-quandiu conclusum capite & cauda pedicis tenuis excutis, exortorum & exenteratum in multas partes concide, & coque in aqua fontana quanta suffecerit cum his simplicibus medicamentis, i. radicis centau-rii majoris vulgo thapontici succoli in taleolas prie-cti unc. ii. radicum emilacis asperæ consularum unc. ij. polyopidi quercini unc. i. radicum buglossi, eradi-viz, cichorii, graminis, asparagorum, silianthi, asple-ni, singularum manip. l. radicis glycyrrhizæ drachmia iiij. eupatorii, chamædrys, scabiole, pimpinellæ, co-ronopi, phyllitidos, hepaticæ, betonicæ, melissæ, sin-gularum manip. j. plantaginis manip. ij. hordei pug. ij. avarum psalliarum exacinarum unc. i. foliorum fenæ orientalis unc. i. ferveant omnia simul ordine competenti, & fucci colatura cum saccharo albo con-diciatur modo, & consistentia syrupi, qui condescit ovi albumine despumato S. A. Dosis ab unc. iij. ad unc. vj. Quod si partito atque multoties decoctum confici certiore conservandorum medicamentis virium, & palati commodio libuerit: consultum huic rei fue-rit, ut ante abrasis & spina carnes anguis ad Clibanii torrorem exempto pane pustulorum forma paululum exiccaveris f. mox sacchari & mellis pauli conditura obductus eisdem conservaveris, sic ad usum eam ma-teriam in decoctum pro ratione sumptis & admi-nueris.

Post hæc ad pustulosam partem remedia referret, quorum pars medicamenta, pars chirurgia est. medi-camenta quidem, ut indicavit Orisibasis, exiccantia quidem sunt, sed sine modificatione, quallia l. 7. synopf. c. 57. dixit filiiis succum aqua solutum, aut cicutam tritum, cujus ejusdem libri c. 42. scripta reliquit hæc: Ad epinýctidis valet apium cum po-lenite tritum & illarum: braccia folia trita impoluta alterci folia ex melle trita applicita. Solanum per se, & cum cicuta viridi, aut olivæ foliis cum aqua coctis utitur, uvæ passæ ademptis acinis tritas admif-ceto, easque splenio illatas imponito, adianthum quo-que ex melle tritum facit. His Paulus l. 4. cap. 9. comprobatis omnibus, & integre traductis addidit adianthum ex melle, & cupite sequenti argenti spumam & sulphur ignem non expertum pari portione cum aceto applicitum, item myrtus, air, in levorem reda-cta sordium illitione cum oleo & vino benefacit &c.

Sed Cornelius Celsus hæc tradidit, epinýctis post lenticulam, recte herba quoque sanguinalis vel viridi coriandro curatur, ulcera ex pustulis facta tollit spu-ma argenti cum semine fenogreci mista, sic ut his invicem rosa, atque iunibi succus adiciatur, donec mellis crassitudo fiat. Hæc ad epinýctidas antiqui: & junioribus verò Joannes Huaccherus in l. jampridem citato medicamentis partim refrigerantibus ad ardo-rem leniendum, partim digerentibus propolis, tra-didit adponendam cataplasma ex hyoscyami foliis confusus cum melle mistis, atque ex braccia, apio, & hordei farina concorporatis, vel ex coriandro vi-ridi cum cymis oleo coctis, nostri ad roseolis, ad ipsi dicunt, fel porcinum aut bovinum adhibent hordei facina, vel crassiore item aliqua materia, quæ consen-

tiat, exceptum, interitum ad 9. dies oblato plantagina succo.

Sed omnia medicamenta superat longè chirurgicum experimentum, quod est scarificatio tum ad ipsas ro-seolis, tum ad tibiarum anteriorem faciem semel aut amplius phlebotomo facta, non alia ferme ratione, quam, quæ à Prospero Alpino 3. de medicina Ægyptio-rum, & à Jacobo Manu lib. de scarificatione vul-gata est, à barbaris plerisque nationibus & Asiaticis hodierna diè feliciter exercita, & à me etiam fere quo-tidie in sacro Incurabili nosocomio nonquam sine fructu administrata, hanc autem in hoc eodem virio curando sentis mire proficuum in utraque memorata virgine Parthenophilacii, & in obstetricis filia, qua miro quodam & incredibili modo visus est dolor sopiri, ut ne talis quidem alias confectis rite corporis expurgationibus periretoret, qua vacuationis exacta opera, vix aliud erit necesse, si fuerint satis intima per-purgata, atque hactenus de roseolis.

De Epinýctide rursus quadam, ex Clariss. Ioh. Mennicks.

I. AD Furunculum hanc ineptè refert possunt Epinýctis, & Terminthum. Epinýctis, ex C. Celsi, Pauli Æginetæ, & Aetii sententia, est pustula pessima colore sublivida, vel subnigra, vel rubicun-da, vel alba, circa quam vehementer laboratur inflam-matio cum ingenti dolore, noctu magis affligens, cumque aperta est, intus mucosa reperitur exulceratio. Color, est humoris sui similis, ab eaque cruenta emanat sanies. Dicit vero Græcis *traverte*, quia fere semper nocte oritur. Arabes *Ejfore*, *Sere*, vel *Saire* appellantur.

II. Fit Epinýctis, hanc fecit ac Furunculus, & sanguine impuro, acri, maligno, criticè in corporis superficiem expulso.

III. Signa verò quibus cognoscitur Epinýctis, sunt quod pustula hæc sua sponte proveniat, colore sint rubicundæ, vel sublivida, vel albicantes, atque gravius noctu quam interdiu adligant. Ceterum dolor in Epinýctide vehementior est, quam pro ejus magni-tudine, cum faba major non fit: sponte exulceratur, & cum ruptis mucosam parit exulcerationem, unde subcreta emanat sanies.

IV. Equidem pustulæ hæc, ex C. Celsi sententia, maxime eveniunt in puerili ætate, raro in medio cor-pore, sæpe in eminentibus partibus, & verno tempo-re, tantque nullius periculi, nisi in curando error committatur, quamvis pravorum humoris in corpore re-dundare indicent.

V. In Curatione Epinýctidis, hanc fecit ac in Furunculo Curando, procedendum; viz. Pustula maturanda, & Puris generatio acceleranda, appositis Uvis passis confusis; vel impolito Cataplasmate ex Uvis passis, Caricis pinguibas, & Rura viridi, simul com-minutis; vel Emplastro Diachylo cum gameni, cum Unguento Basilicone, vel, ut malignitas si quæ addit corrigatur, tali Digestivo.

VI. Unguenti Basiliconis $\frac{3}{4}$ i. Therebinth. venet. $\frac{3}{4}$ ss. Theriacis Andr. $\frac{3}{4}$ ss. Mellis virginici $\frac{3}{4}$ vi. Olei Scorpionum $\frac{3}{4}$ li. M. F. S. A. Digestivum. Postea ulex mandetur Digestivo communi; Unguento Aureo vel Basilicone impleatur; atque impolito Emplastro Dia-palma, vel Styptico tandem cicatrice tegatur.

VII. Terminthum autem Tuberculi lyncies est, & Epinýctidi fere similis, cui superne & inferne nigra pustula incumbit, qua rupta infernè & squammosa ap-paret: difflecto autem tuberculo pus invenitur. Sed cum Terminthum ex eadem causâ, qua Epinýctis, hoc est, ex adusto, acri, & venenato sanguine hæc, eademque pars afficiatur; hinc eadem Curatio ei convenit, eademque Prognosticum, quod Epinýctidi.

EPIPHORA.

Epi^{ph}ora (à *ph*ero fero) est immoderata tenuis humoris fluxio lachrymarum specie in oculos præter naturam facta, humor qui fluit, modo frigidus est & aqueus, nullo dolore molebus, modo acer est aut salus, dolorem, ardorem & ruborem, imò nonnunquam palpebrarum exulcerationem inferens. Symptoma est in excretis. Hujus affectus causa proxima est humor excrementitius, à capite vel aliunde à parte aliqua corporis in angulos oculi influens. Cause disponentes sunt partis affectus imbecillitas, roburque mitrentium. *Thom. Burnet. Theor. Medico-Practici lib. 5.*

Possit evacuantia generalia & particularia, revellentia & derivantia, quibus cerebrum ab humoribus serosis depleatur; ad fluxionem sistendum utatur ager sequentibus.

36. Nuc. cupressi, gallar. virid. rad. biddot. ana ʒss. pulverizentur, & serotentur aceto acerrimo, & lactentur; add. mastich. ling. diac. sandarach. ana ʒvj. octava in aceto loti & siccat. ossium human. calcinat. lap. hæmatit. ana ʒij. bol. Armen. alum. rop. ana ʒiij. Terebint. Venet. cerz. ana q. l. ut fiat Emplastrum, cuius portio extendatur in panno sericeo & applic. arteriis temporalibus & supra supercil. & tota nocte gestetur.

37. Aloes è vesica ʒi. turc. præp. ʒj. Mac. ʒi. Ircos Flor. ʒi. Mastich. ling. diac. ana ʒij. Vitriol. alb. gr. xv. Sacchar. cand. ʒiij. Aquæ stillatit. feniculi, cuphar. ros. plantag. ana ʒiij. M. infolentur per octiduum, mox f. colatura, de qua cap. ʒi. phlegm. alum. q. l. ad contempendum; infillitur gutta in ocul. spūda in gic. *Theodor. de Mayeris Præpar. Medic. lib. 1.*

Puella cuidam novem annorum ex uno oculo lachrymæ ultero effluebant, quæ frigide erant, neque oculum corrodiebant. Erat autem puella pinnitola & cantarbo obnoxia, præstitis universilibus ubi sequenti collyrio uretetur mandavi, quod omnibus conveniens quibus malum perseverat.

38. Aloes, nucis cupr. thuris, mastich. myrrh. ana ʒij. turc. præp. farcocoll. nutrit. ana ʒiij. ling. diac. berber. sumach. ros. rub. ana ʒj. pulverizentur tenuissimè & excipiantur aquâ fœnic. & hac collyrium, cuius ope ab hoc malo liberata est. *Petrus Forestus, observat. 11. lib. 11. De morbis Oculorum.*

Epiphora calidum in muliere quadam ita curavi, corpore repargino & vena secta, collyrio sequenti utebatur.

39. Troch. alb. thasis sine opio, ʒi. Aq. ros. vel pecali ros. ʒiij. Aq. fœnic. (ne ob refrigerationem obundaret acumen visus) ʒiij. M. F. Collyrium.

Si illud non juvaret, consilii ut sequenti uretetur.

40. Cerasi. ablutz. farcocoll. nutrit. licii, acaciæ, thuris, ana ʒi. ossium myrrab. adutor. corall. alb. rub. ana ʒss. Margarit. ʒj. succi mali punici ad dimidii absorptionem cocti, q. l. F. Collyrium. Solut etiam malorum punicatorum succus coctus, donec dimidium absintur, lachryma calida curat. In hac Epiphora commendatur etiam quætera retro aures, *Rondeletius* potius hæud cunctum supra commissuram. Venia quædam in Italia cum oculos haberet lipientes, lachrymanes & saniosos, cum intenso dolore & pruriginè, & nullis remediis posset curari, tandem raso capiti emplastrum vesicatorium impostum est; exaricæque vesicæ ac ruptis, butyro imposto, ac demum caulis folio, quo prædicto perfectè curata fuit. Vesicatoria etiam in collegio proficiunt. *Petrus Forestus, observ. 11. & Schel. lib. 11.*

Pro singulari experimento habetur hoc unguentum.

41. Argin. cris. gr. ʒj. camphor. ʒ. ʒi. turc. præp.

ʒss. butyr. rec. quod cum aqua ros. liquefat, & pacum bulliat, ʒvi. M. decenter ut fiat unguentum. *Julianus* pisi magnitudo in oculi cantum majorem; levitæque inungantur palpebræ. Est ad Epiphora & pusillus oculorum, singulari experimentum. *Felix Platerus, 10. 2d. pract. med. pag. 179.*

EPIPOCELE vid. *Hernia.*

EPIPLOMPHALOS vid. tub. tiralis *Hernia.*

EPULIS ET PARULIS.

I. Quædammodum Laxa, Fungosque intra Nares excrefcens Caro Polypus, ita *Hypercarcinoma* seu *Carcinoma gingivarum* carum. *Dentes Excrefcencia* Epulis dicitur. Hæc vehemens affluendo increfcit, etq; augetur, ut adeo & loquendi, & manducandi adimatur facultatem; viscidam, tenacem, ac foetidam effundit Salivam, & non raro in Cancrum quasi degenerat.

II. Splet vero Affectus hic ex *Scorbuto* semper oritur. Enimvero sanguis hic scorbuticus laesum, recrementum sita acris salina tum per arterias, tum per valcula salivaria, in Gingivas quoque deponit; quæ laxata, fungosque illarum Cariem erodunt, hinc & corrumpunt sepe, ut Dentes stabilite nequeat; aliquando vero Epulam Gingivarum Carnem ultra excrefcere faciunt, adeoque *Epulis* easant: quæ idcirco in Norvegia, aliisque Septentrionalibus Regionibus, ubi Scorbuto Endemius est Morbus alimodum frequenter contingit.

III. Refert *Parvus Chirurg. lib. 7. cap. 4.* Epulis se observasse, canosam hujusmodi excrefcitiam in catilagineam, & ossicam verusitate induisse; quapropter quam celeritate fieri poterit, *Curationem* Epulis aggrediendam esse suadet. Igitur exilis quam sit Epulis, tentandæ Epus per Medicamenta Curatio; atque Unis versatilibus, ut in Scorbuto Cura fieri solet, hæud neglectis, Topica adhibenda sunt. *Excrefcencia & Aluminosa* viz. *Alumina*, aliæque Antiseptica, v. gr. a. Aq. Plantaginis, Salicæ, Antiseptica, Vitis Albi Gallici ana ʒss. Aluminis Cuius pulver. ʒi. Acut. Cinnamon ʒiij. Mifcetur pro Ora Collutione.

Sed Medicamentis si tolli nequeat hic Gingivarum Tumor quam citissimè Filio, vel Culro abscindatur, ne præter modum induretur, vel in Cancrum abeat. Ubi verò abscessus est Epulis, Aggravatus frequenter os colluat, atque Gingivæ ficut præscripta nunc Ora Collutione, vel simili.

IV. Nasclitur quoque in Palato Tumor ex viscofo & acri materie, quæ Os inter & Membranam hyems, illud non raro putrefacit, atque corrumpit, hinc Ulcus gravè excitat. Tumor hic Parulis dici consuevit, atque contingit ex Saliva præter modum acri & salia, simulque glutinosa; quæ per exiles Palati ductus prodians, & ob suam ipsius visciditatem membranam potius transcolari nequens, adeoque inter Os & Membranam subsistens, Tumorem huic producit. Qui ut Cilectetur, discilla pinguis Carica apponatur; hinc quamprimum non expectat suppuratione, sectione lata & profunda, ad os Palati usque, incidatur, & acris, viscidus, necesse subcrenatus humor exatè exprimatur: secus enim subiectum os facillimè corrumpit, oriturque fistulosa, æqueque sanabile ulcus. Facta verò & donec, evacuatoque conclusio humore, absque medicamentorum ope, sola Saliva aptissima sanat. *Sub. Mannich. Chirurgia lib. 1.*

Parulis parva est inflammatio partis alicuius gingivarum cum tumore, quæ si non resolvitur suppurat, & in abscessum vertitur, qui melle caratus in ulcera serpentina sepe degenerat. Si unà dolor atque, lenitior ille gargaritumatis è lacte tepido, caraplasmatæ ex mica parvis albi id lacte cocta, misto ovi vitello, croco & oleo rosato. Si non resolvatur tumor, & ad suppurationem tendat, sicut pinguis per medium secta carboni accenso super

io superponitur, dum aliquantulum arefcit, dein tumori gingivæ apponitur, interdum atque noctu gestatur dum matura parulide pus sponte aut arte fluat. Abscessus hinc relictus non ad cutem faciei, non ad radices dentium aperiri solet, vel sponte nature, vel manu Chirurghi, quo aperto pus erumpit, statimque dolor cessat, & brevi pars recit ad positum statum. Si gingivæ citra tumorem inflammantur, id est, si phlogosi laborent, convenit gargulismus ex aqua communi tepida, Aqua. plantag. rosar. addito aceto rosato, vel oxycrato, vel ex succis sempervivi, plantaginis, solani.

Epulis est excessus gingivarum caro, parulidem male curatam sæpe consequens. Nisi enim in parulide, quæ suppuraverit, ulcus fuerit probe deterium, luxuriat ibi caro, quæ Epulis dicitur, & sensim ingratum, aliquando ovi magnitudinem superans, & sermone masticationemque impedit. Interdum in Cancrum degenerat, quod inde notitur, quod cum prius esset indolens, nunc lancinante dolore committitur est. Cancrum in Cancrum degenerat, nec ferro nec manu Chirurgica aringi debet. At quæ nullum dolorem excitat, alligetur filo duplicato, donec excidat, ubi autem excidit, ne repullulet, ejus radix cauterio ignis aringatur, vel potentillâ, vel oleo vitrioli, aqua forti & similibus, Evitando tamen, ne ab his corrodentibus partes sanæ ledantur. *Auter, Encheiroid. Medico-Prætic. apud Fernel.*

Epulis horrenda.

Clariff. Ioh. Aculubi. Mfstell. Chirurg. Decur. ij. Ann. 4.

Horrendum jure dixero. Epulidem quæ foetilis, tringita circiter annos nata, miserâ ex Polonia, 695. ad nos deferbatur. Maxilla sinistra superior, dentis ineptâ evulsionem fissa, primam malo originem dedisse videbatur, unde tumor parvus, ex bullis dentis alveolo enatus, lora biennium in tantum excreverat molem, ut duplicis pugni magnitudine, totum ferme os occuparet, genâ illius lateris, ad proximè imminuentem creparentur extensa, magnaque tumoris parte extra os prominens, ut à multo tempore labiorum clausura, & dentium commissio interceperetur. Notabili vero à paucis hebdomadis ipsi accesserat augmentum, adeo, ut vel suffocatum, vel fame & siti brevi periculum esset huc miseræ humanæ extempus, nisi subito auxilio subverseretur. Hoc, ut Christianæ charitate moti, pro vitibus prelaressem, accuratius inter oris timabamur, deformem hanc massam durissimam, & maxime palati parti pariter, atque maxilla superioris dicitur connata, ita ut universi sinistra lateris dentes artificum includerentur, ostendenda. Sic omni spatio, quod cultrum admitteret, exclusi, transversa lincione malum dividebamur, ab angulo oris incipiendo, mox falcato culro denudatum aggredierentur tumorem, qui cornea castilagine (ex qua maximum partem constabat) pertinacissime renitens, omnes ferè chirurgi atque ferri vires exhaurebat. Tandem cedere coactus, tres, quatuorve dentes, firmissime sibi implicatos, cum cariosi ossis maxillaris parte insigni, comites extraherem. Hac verò opera, illa tantum Epulidis, dimidietas, quæ extorsum speciebatur, separabatur, plus negotii adhuc facillente alteram, quam cavaris oris circumscribebat. Hæc inoptiore posita loco, quam ut uno tractu rescindi posset, per partes extraheretur operatione adeo laboriosa & crudeli, ut parum omni vitâ non viderim. Quæ vel hæmorrhagia urgebat, vel fungosa caro videbatur, candente ferro probe adrebat, eo successu, ut brevi omnia latiores acquirerent vulnus, solo loco, qui natescens malo dederat, carne fungosa luxuriante. Ferrum igitur hanc aliquoties in

vnum sustulerant, cum tandem attentissima investigatione deprehente relicte cariosi ossis festuca æquans, eximenter, pressu pede, febri canone, illas iniequente.

Epulis prœgrandis, singulari encheiresi, feliciter extirpatur.

Clariff. Georgii Abrahami Mercklini, Mfstell. Chirurg. Decur. ij. Ann. 3. & 6.

Cum Petrus Chirurgus, Joh. Nicol. Marchalekus, notissimus apud nos Balnearum, Anno Christi 1690, mensib. Jun. & Jul. haberet, quod Viennæ Aulæ, coram Judio Imperiali in communis Balnearum Norimbergensium causâ ageret, commodum accidit, ut ab Illustri Sexagenaria majore & quidem admodum obedi. Martonâ, de ficiis magna, eaque canosa excrecentia in inferiori maxilla dexteri lateris, inter caninos den. enata, confideretur. Hæc Epulis per quinque ferè annorum decursum in rapidam indolem secretivè molem, ut jam dimidi ovi gallinæ magnitudinem superaverit, quæ factum, ut inde dolores illis dentibus, intra quorū primam, luxurians caruncula adiorat, propululare cœpit, ultra digitalis articuli spatium ab invicem divulsis, suisque ex alveolis excussis, titulus oris indecorè subinde flaverit, nec unquam claudi pœuerit. In consilium interea rogati sunt diversi sique celebres cum Medici, tum etiam Chirurghi, quorum plerique, quod Tumorem, præmissis universalibus, aliisque necessariis internis Remediis, corrigere, & causticis excedere studuerint, genus abulte, ut illa remiserit Mahum, ut potius magis magisque inde exacerbadit. Hic Marchalekus noster in tempore recordatus, similem Epulidem jam parvam suam idem Chirurgum in plebeio homine singulari encheiresi fatulide, eandem ipse quæque proponere satagit. Quam verò operatio ista cœu nihilis nota, nova, Intentioneque & ambigua videretur, undique conquisivi prius, super propostâ hæc encheiresi, plurimorum Medicorum Jucis, in consilium adelicæ placuit adhuc aliud, & quidem ordinarium celeberrimum Viennensium Chirurgum, nomine Georg. Schlenkiam, qui re, qua licuit fugacitate, peniculatori, non potuit non anquere, inque medium altatum præcedendi modum approbare, quem uterque prævis ex Pilulis constante à Medico præferta Purgatione convenienter Dixi ex ordinatione, videnter implorato D.E.I. adjutorio, hoc feliciter exaugurio artificio aggressus est. Nimirum fetrem repetitis exandescens ductilis redditum chelenna, Tumoris radici fœtice iniecerunt, quod cum in dies artius ad exhiberi consilii formam singulari forpice contrinxissent, tandem die nono eâ deventum est, ut ob illas à maxillari osse interea sponte temotas lamellas ulteriores restrictio fieri oequivit, unde reliqua radicia tenuior porro, quæ adhuc cohesit, peculiari ad hanc ipsam usum fabricato instrumento abscindi & debuit, & facili potuit. Hoc factio, in locum ablata Epulidis applicuerunt Pulverem Fœtice. rubr. quo, exarato triduo, in conspectum venit ipse Tumoris fundus, ex quo abique ullo dolore novem ossium squame prodierunt. Quare visum est, ulcusculum Unguento fœtice Fel. Würtz, addit tantillo Epibegmatis Virrioli, mundare, illudque medicamentum diu adhuc, usque dum echara excidit, & caro paulum repululascere cœpit, in usum posthæc porro vocato Gargarismate adstringente, nec non exteriis, defensionis quodammodo loco, apposito conveniente Epibegmate, una cum Balsamo Florum Sclerani. Quibus adeo feliciter successit curatio, ut Nobilissima femina non solum integrè convalesceret sed & hodieum optime habeat, valetque pancreaticè.

ERYSIPELAS.

Curationes.

Tumor qui Græcis *Erysipelas*, Latinis *Ignis Sacer*, seu *Rosa* nuncupatur, ab Autoctibus male describitur, quod sit tumor præter naturam ex bile fetè in solam cutem, quandoque etiam in muscularibus subiectis, effusa, dolorem, calorem aliaque symptomata causante. Si namque sola Bilis in cutem effunditur Herpes, non Erysipelas oritur.

I. Sed quam vera Inflammatio, atque adeo Phlegmonis species sit Erysipelas, potius dicendum videtur, quod sit Inflammatio valde ardens, maximeque circa eum consistent, & aliquando subiectis carnis aliquid occupans, orta ab effuso, extravasatoque bilioso, tenuiore, & subtiliore sanguine, cum tumore vel exiguo, vel spè, quoad sentum, nullo; cuius color pallidior aut magis flavescens est, quam Phlegmonis, & si retergitur faciliè sanguis subestegit, rursusque illabitur exquisitè tenuis, aspectusque rubens.

III. Est autem Erysipelas duplex; verum seu legitimum, & non verum seu spurium. Verum Erysipelas simplex est, simplici fervore & rubore affectum sine ulla exulceratione, è sanguine bilioso, tenuiore, fervidore, in quo Acidum volatile prædominatur, genitum. Non verum seu spurium Erysipelas trium vulgo habetur generum: Unum quod oritur ex sanguine bilioso, tenuiore, ac acuti, putræ, & rodente, qui idcirco latum, & aliquando profundum satis efficit exulcerationem: Alterum Erysipelas spurium est sine partis affectu exulceratione; in eo tamen exigue succedunt pustule & veticulae, quæ nonnulli incitè, perforarique Saniei aliquotulum fundunt: Tertium genus est, quod fit quidem è sanguine tenui, fervido, ac final vel copia peccante, vel seto abundante, vel terrestribus, acido-austeris, similibusve particulis redundante, unde Erysipelas dicitur vel Phlegmonodes, vel Oedematodes, vel Scyphoides.

IV. Igitur verum seu legitimum Erysipelas è sanguine bilioso, tenui, subtili, fervido, in quo Aciditas volatilis abundat, generatur; qui ex minutissimis capillaribus vasculis exiliens, per sua tenuitate & subtilitate in interiore carne subsistere nequit, sed per extremam cutem, partemque ei vicinam diffunditur, atque ardentem ibidem excitat Inflammationem.

V. Ardens autem illa cutis, partiumque proximè ei subiectarum Inflammatio, Erysipelas dicta, à Phlegmone distinguitur, 1. Colore; est namque color ruber, Erysipelatis ex rubro flavescens, 2. Pulsatione; quæ magna adest in Phlegmone, parva vel nulla in Erysipelate. 3. Tumoris magnitudine; Etenim in insignem tumorem Inflammatio partem attollit, cum & cutem & subiectos musculos occupet; Erysipelas verò partem affectam modicè elevat, adeo ut vix appareat tumor, cum cutaneas partes solummodo ardens hæc Inflammatio invadat. 4. Calore, qui majore est in Erysipelate, quam in Phlegmone. 5. Dolore, qui in Erysipelate minor est, ac pungitivus; in Phlegmone tensivus, & gravativus. 6. Duritie & Mollitie; cum Inflammatio tactui non cedat, sed renitatur; Erysipelas verò si tangatur, tactui cedit. 7. Eo, quod rubedo, quæ in Erysipelate adest, si digito prematur, statim abeat, & cutis sub digito alba evadat, deinde verò mox redeat eadem rubedo, ob tenuem subtilemque sanguinem, à quo fit; in Inflammatione verò hoc non accidit. 8. Quod in Erysipelate nulla tensio, ut in Phlegmone apparet. 9. Loco affecto; Erysipelas namque loco dimovetur, serpit,

& vicinas partes similiter afficit, Inflammatio autem in uno fixitur loco, ab eoque nec discedit, nec dimovetur.

VI. Signa itaque, quibus hæc affectus cognoscitur, sunt ætus ingens, dolor acris non valde vehemens, rubedo ad flavescinem tendens, ad tactum ut facillè cedens, ita & facillè rediens, partis incumescencia, ac tensio levis, pulsatio minor; sique invasio ejus plerumque cum Febre, nisi à causa externa oriantur.

VII. Equidem raro periculosus est affectus Erysipelas, nisi ab exterioribus ad interiora materies repellantur: periculosior verò, si circa oculos, fauces, aliaque nobiles partes consistat; aut si vulneri, ulceri, fracturæ, luxationi superveniat. Ut autem facillius tutique sanetur, resolutio, aut insensibili transpiratione, seu per diaphoretin terminari debet, non suppuratione, quæ in hoc affectu mala admodum est, difficilisque curationis.

VIII. Ut verò Erysipelas rite Curetur, 1. Conveniens instituenda Dieta, atque eadem sex rerum naturalium dispensatio hic observanda, quæ in Phlegmone. Dein Antecedens Materia evacuanda Cholagogis blandioribus, Venæsectione, ac Imptinis Diaphoreticis iterandis, reiterandisque.

IX. Tertia Cura erit de Medicamentis Topicalibus: Quæ in Principio minime sunt valde Repellentia, Exsiccantia, Adstringentia, quod illorum ulio Materia acrior intro compulsa vicinas partes corrodat, & exulceret. Sed si exiguum fuerit Erysipelas, pars affecta à nobilioribus remota; humoresque adhuc fluxerint, applicentur modicè Repellentia, ac Resolventibus mixta; ne oculis nimium poris, hinc radiante nativo calido fere suffocato, Gangrena accedat.

X. Postim quoque Aegris suis consulunt Chirurgi, qui partem Erysipelate affectam inungunt Unguento Nutrito, de Cerasia, Populeo, Rosaceo, Oleo Rosarum, Violarum, similibusve pinguis; upon quæ biliosum, tenuous, fervidum atque in partes cutaneas effusum, extravasatumque sanguinem excitans magis, incendunt, adeoque ardentem hanc Inflammationem maxime adveniunt, ut testè monet Galenus lib. 3. de simpl. Facult. Et scribit Fabricius Hildanus, Cent. 1. observ. 82. se observasse, Erysipelas ex Olei Rosacei inunctione in Gangrænam mutatum fuisse.

XI. Modicè ergo Repellentia, ac Resolventibus Volatilibusque permixta, quæ simul Acidum volatile infringere ac mitigare possunt, hic sunt apponenda, v. gr.

21. Aquæ Florum Sambuci $\frac{3}{4}$ viii. Aceti Sambuci $\frac{3}{4}$ ii. Spirit. vini $\frac{3}{4}$ i. Sacchari Saturni gr. xv. Camphoræ $\frac{3}{4}$ i. Miscerantur pro Epithemate.

Vel 22. Aquæ Florum Sambuci $\frac{3}{4}$ viii. Vini albi Gallici $\frac{3}{4}$ iv. Miscerantur.

Vel 23. Aquæ Florum Sambuci $\frac{3}{4}$ vi. Spiritus vini $\frac{3}{4}$ i. Camphoræ $\frac{3}{4}$ i. Troch. alb. Rhaii $\frac{3}{4}$ i. Miscerantur. Vel 24. Fol. Malvæ, Altheæ, Parietariæ, Salvie an. Mj. Flor. Sambuci, Camomillæ an. Mj. Rosarum Rubr. Mj. Coq. in aq. part. aq. comm. & Vini albi Gallici ad $\frac{3}{4}$ xxx. pro Fomento. Vel decoquantur Flores Sambuci in Lact. Dulci, vel Ebutyrato, & applicentur.

Vel fiat Sacculus Interitus ex Floribus Sambuci, isque in Aqua Florum Sambuci, tantillo Aceti Sambucini addito, madefactus iterumque leviter expressus calidè parti affectæ applicetur, & sæpius renovetur.

Vel dissolvatur Sapo Venus in Aqua Pluviali, vel Florum Sambuci, atque isto lixivio imbutus panni lanei mundi, qui dein fortissimè exprimantur, & parti affectæ calidi applicentur, ac identidem permurentur.

8. Sunt qui Stercus ovillum in vino aut aceto decoctum usurpant.

9. Alii laudant Cretam pulverisatam ope chartæ emporicæ parti imponant.

Nonnulli Spiritum Vinî, in quo Theriaca dissoluta est, lineis duplicatis aut quadruplicatis imponunt. XII. Sed remediis hæc Erysipelâ curari nequeat quin potius exaceretur, hoc vel simile illinatur Unguentum.

℞. Troch. albor. Rhais. Turiz præp. an. ʒi. Li-thargyri ʒiſs. Ceraſſe ʒiij. Flor. Sulphuris ʒi. Cam-phoræ ʒss. Olei Rosarium ʒij. Cere albae q. s. Te-tantur diu, & exacte levigantur in Mortario plumbeo, ac F. S. A. Unguentum.

XIII. Sin vero in Facie fuerit Erysipela, nulla apponenda sunt Repellentia vel Adstringentia, ne quidem Resolventibus mixta, ne materia ad Oculos, Fauces, aliasque partes nobiles pellatur. Sed imponatur Saccalus interius ex Floribus Sambuci, in calida Aqua Florum Sambuci, addito Vino albo Gallico, madefactus, leviterque expressus, qui identidem renovetur. Vel valide applicetur Saccalus, subtilissimâ Tritici vel Hordei Farina repletus.

XIV. Atqui cum Caput occupet Erysipelas, ut Mulieres aliquando experiuntur, nulla omnino humida sunt apponenda; sed linea munda recteque loca, adeoque vapor Saponis persalâ calida imponatur, levisque permittentur. Vel calide applicetur Mustardus sacculus, subtilissimâ Tritici vel Hordei Farina repletus. Vel Lixivium fiat fortissimum ex Saponis Veneto cum Aqua Florum Sambuci, et imbutus lintes munda, que deinde exsiccent, & calide apponantur, identidemque renovata, inmodum modum Ardentem illam in capitis partibus curare. Inflammationem discutiant, resolvuntur. *Job. Munnich. Chirurgia lib. 2.*

Erysipelas recens quancunque partem invaserit externa discutientia requiritur moderata. Sanguis mensura in aceto rosaceo dissolvitur & calide applicatur subito solvit, præsertim si sudores quoque moveantur ex Bezoardico, cum simpliciter cum compposito, vel solari vel lunari in aqua succionis, item ex mistura simplici in eodem vehiculo.

Sic decoctum Myrtis & Olibani in Vino & aceto calideque applicatur cito dissolvit.

Folia raphani sylvestris consularis fibrâ calidissime applicata fervorem sanguinis tepunt.

Nonnulli aqua spermatis Ranarum, ad extinguendum ignem sacrum familiaris est, sed sæpe malo cum succello. Est nimium nimis frigidum, hoc est, habet in se Mercurium cum Saturnina quadam proprietate conjunctum. Itaque repercussus quidem est sed subsequenter gravium symptomatum causa manifestâ. Mortificatur exinde tum partes nervosæ tum venosæ. Ejus tamen particula cum decocto Myrtis & Olibani mista laudabilior est ad institutum.

Tibialis linea imbibita aquâ spermatis ranarum & vitellum excutitur, subinde eodem opere preparata, pedes & crura ab Erysipelate levisse recurren-te muniunt & præservant.

Erysipelâ exaceratâ curam vldè apud Rulandum centuria 1. curatione 43. Hac curâ feliciter usus sum in mulierculâ, (Nubisturum aquaticum singulare.) Item Erysipelâis plegmonosi curat. 61. cent. 9. *Job. Harsmann. in Praxi Chirur.*

Febris Erysipelatosa.

Nullam non corporis partem, idque nullo non tempore incensit hic morbus, at præ reliquis faciem, exarante præsertim estare; quo tempore sæpe dum sub dio versatur, cortipitur ager. Facies liquidem ex im-

perviso in tumorem attollitur, qui subito exoritur cum dolore tuboreque summis, densis minuaturs pustularum ordine distinguitur, quæ autem magis inflammatione in vesiculis subinde facilius: hinc per frontem ipsumque caput latius serpit, oculis interim tumoris magnitudine plane obrutis (rusticis *Sydera-tis* audit;) neque multum profecto ablatit, nisi quod adfuit pustula, ab his symptomatibus que insidit ab apum velparumque aculeis comitantur vulnera. Hoc se habet modo ac vulgaris.

At verò quancunque corporis partem hoc vitium obfederit, ut etiam quocunque anni tempore, rigor atque horror, nisi præcesserit (quod nonnunquam priste, aut nudius tertius solet contingere,) hæc se inflammatione ut plurimum adjungit, insinuper, inquietudo, nec sequit Febris indicia. Pro-cedente morbo, ut primum Febris dolorem, tumorem, atque alia peperit symptomata, (que indies ingra-vecens nonnunquam in *Gangrena* terminatur,) ita hæc invicem hinc mediocriter ad Febris augmentum conficiunt operam, donec remediis idoneis utrasque extinguantur.

Est & alia hæc morbi species, licet raris occurrat. Hæc quolibet anni tempore invadit, id. est hæc ut plurimum æstiva, quod scilicet eger vinorum subtilium magis magisque attenuantium potatione paulo liberalius indulgent, aut liquoris similis spirituosius febriculam, que agens dact, mox excipit pustula-rum per universum teræ corpus eruptio, que urtica-rum puncturas reserunt, & nonnunquam in vesiculis attolluntur, mox sedentes, tuberculorum more sub que se consistit cum puris mordacissimo & vix tollendo. At quævis levissimam scalpuram subeunt, rursus apparent.

Curatio. Hic ego materiam peccantem sanguini per-mixtam citè evacuantem, ejusdemque sanguinis ebullitionem remediis illius contemperantibus inflammanda censeo remediumque que jam partibus impac-ta est, materiam evocandam, discutientandamque.

Hæc ut sunt, ubi primum accedo, suis largam sanguinis quantitatem e brachio extrahi præcipio, qui quidem Pleuriticonum sanguinem sæpe semper emulatur. De sequente blandam illam Positionem Cathari-cam mihi in Praxi familiarem exhibeo, & horâ som-ni si paulo frequentius deiecerit ager) hæc cum ali-quom Paregoricum & Syr. de Meconio in Aq. flor. Paralyt. vel aliam ejusmodi. Peractâ Cathari, partem affectam sequenti decocto foveri jubet.

℞. Rad. Aleh. & Lil. an. ʒij. fol. Malv. Sam-buc. Verbasq. an. M ij. Soc. Melilot. summit. Hy-poc. & Censur. min. an. Mj. Sem. Lini & Fenu-gr. an ʒss. Coq in si. g. aq. ad th liij. coletur liquor & tempore usus adde singulis libris decocti, Spir. Vin. ʒiſs. Siaphæ & panno lanco levis texturæ hoc decocto imbutis ac expressis, calide admoveantur parti bis in die, quæ post futurum quotidie illinatur seq. mix-turâ.

℞. Spir. Vin. th 6. Theriac. Androm. ʒij. Pulv. Piperis longi. Caryophyll. an. ʒij. M. Charta Em-porica hac mixturâ madefacta parti circumvol-vatur.

Agere insuper ut iusculis tantum hordeaceis atque avenaceis, cum ponis assatis vesicetur, vldè; tam etiam cerevisiâ uratus tenuissimâ, & per horas ali-quot singulis diebus à lecto sibi temperet. Hac me-thodo cum Febris, cum alia symptomata citissime ut plurimum fugantur. Sin aliter, rursus venam lecos quod & tertium nonnunquam Seri debet, interposito semper die uno, si prava nempe adix sanguinis dia-thesis, & Febris intensior. Diebus à Venæsectione liberis Enema è Lacte cum Syr. Violaeco, & Julap. refrigerantia ac Aq. Nymph. &c. in Rheumatismi curatione

curatione jam dictis, qualibet hora diei usurpanda præscriptis. Ut plurimum verò unica Venesectione & subsequens Catharsis, si tempore adhibeantur, rem expediunt.

Quæ urticarum puncturas, cum pruritu, refert species pari modo est amolienda, nisi quod hæc remediis ab ætra applicandis minus eget.

Hic obiter dicam, quod licet non solum hic affectus de quo jam loquimur, sed & plethoricæ eorum qui cutim impetunt, & eruptionem aliqualem comitem sibi adiungunt (modo Chronicis si sunt) facile huic methodo cedant, ac proinde sanguinis missione & Catharsi iteratis brevi se præcipiant; eorum tamen aliqui vix planè diversè tractandi sunt, nec evacuationes modo dictæ quantumlibet repetite, nec pulveres testacei edulcorando destituti quiquam proficiunt; cum recrudescant quædam pravam diathesin adæpta intimius cuti impingantur; non nisi remediis hanc sanguinis robur ac vim concillant, proindeque cutis spiraculis deobstruendis apta nita sunt, utilitatem amovenda debellandaque: Cum succellu itaque non vulgari sequentem methodum aggressus sum in Præputio, atque Inverteratis id genus cutis eruptionibus. Ut

℞ Theriac. Andromach. ʒss. electuar. de ovo Bj. rad. serpent. Virgin. (subtiliss. pulv. gr. xv. lapid. Bezoard. Oriental. gr. v. cum f. q. syr. & Conditiâ Citri f. Bolus, sumendus mane & hora somni per dies 21. superbibendo cochl. vii. seq. Julapii.

℞ Aq. Card. Benedictæ ʒvi. Aq. epidem. & Theriacal. stillat. an. ʒ ij. Syr. Caryoph. ʒi. Mf. f. Julapium.

Singulis maturinis post assumptum medicamentum fudet horæ unus vel alterius spatium, vel potius pluribus stragulis quam soleret coopertus in lectulo levi madore indulgetur per dictum tempus. His finitis si pusculæ adhuc non evanuerint, sequenti linimento partes affectæ inunguntur.

℞ Unguent. ex oxylapacho. ʒij. Unguent. pomati ʒi. flor. sulphuris ʒij. ol. Rhodi ʒss. f. Liniment. Verumtamen medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi Venesectione atque catharsi solum adhibita curationem non absolvant, ægrum tamen contra febrem præmuniunt, ob usum medicamentum calidiorum aliis occurrant.

Est etiam Eruptionis species, etiam minus frequens, ad cuius medellam nullæ potius evacuationes conferunt. Hæc tamen in aliis quandoque partibus, ut plurimum tamen in pectore apparet, loco aliquo determinato se figit, vix cutim supereminens, latiore maculam præ se ferens, nisi quod aliquantulum portigitur, ac quasi furfuracea, cum squamulis colore ad flavum vergente tinctis, cernitur. Hæc sive macula, sive Imperigine viget, eger bene se habet, eadem verò evanescente, ut sepe fit, leviculum ægritudinem patitur, aque urios ejus turbidior, & rubicundior, sed ad flavedinem accedens, redditur. In hujus etiam affectus curatione eadem via atque jussim post evacuationes universales, plane remediis insistentium ac in Præputio ferio modo dicto; ac proinde quod usum omittendum, vini, ut & carniū usus omnino concedendus, cum refrigerantia omnia magis ulciant quam proficiat. Atque ita hæc postrema Eruptionis species curatur, quæ tamen aliquando non nisi Aquis Fæteis diu epotis cedit. *Thom. Sidenham de morb. acutis.*

Consultationes.

De Tumoribus Erysipelatosi Crurum, & Pedum, cum Impedimento Motus. Pro Illustriss. & Excellentiss. Marchione Gonzaga.

Ex doctissimis, sermionibus præstantissimi Viri com-

petitissimum sit Illustriss. & Excellentiss. Marchionem laborare tumore pedum, & genuum, qui se præsent plurimum edematosis erysipelatosis facie quandoque, sed rarius, erysipelatis edematosis, pro humore scilicet vitioso redundante. Hernia insuper hydrocele testiculæ dextrum, labefactum fuisse, quæ nedum in præsentia detumuit omnino; cum testis affectus sinistro crassefact magis.

Qui tumores dubio procul ortum ducunt à materia heterogenea; cum magis, minusve prominent, ad exercitii modum validioris, aut remissioris; & quidem serosa potius, quam aliorum aliquo humorum, hoc indicio; quod facili admodum negotio fluat, & resstat à parte affecta, nullumque partibus tumefactis impressum digiti vestigium hæreat. Utrum autem à capite, vel à ventriculo prodierit, cum aliis à nobis in dubium revocatum fuerit, quod ab utraque parte manare possit, nedum in præsentia ea de re quiescamus nobis constat, ut non inani conjectura contentus, prædictos humores potissimum à cerebro permanere localis, & humido: quod proinde facili repletur; accedente tamen aliqua ventriculi labes prout & jecoris fervorem prodidere antea fluentes hæmorrhoides; Patienti Excellent. adolescenti quod nunc luculentius palam facit erysipelas frequenter recrudescens.

Affectus certe difficillimæ curationis, cum ob iniqualem partium intemperiem, tum ob affectuum partium imbecillitatem. Sperare tamen, juvat, fore ut remittant, ope remediorum à Viro Excellentiss. præscriptorum.

Inhærens propterea & ego & prædictis intentionibus divertente fluxionis, evacuande materię, quæ fluxit, contemperandæ frigide ventriculi intemperiei utriusque calidiorum, & calidis jecoris, ac cerebri, refrigerantibus; non sine quibusdam caput exsiccantibus; commendo quoniam maximè universalem totius purgationem, & eamque repetitam, simplicibus primò, & levioribus, max generosioribus, cum præparatis, tum purgantibus.

Mittatur tamen primò sanguis ex jecoraria dextra brachii, mox & ex humerohioidibus. Quod si interitum fluxio aliqua à capite conspicua fiat magis, de qua non levis viget suspicio, caput quoque peculiari expurgandum erit, erithimis, & malicioribus temperatis. Neque præter rem fuerit foniculus unistito brachio inusitatus, derivandi causa à capite & revulsioni ab inferioribus partibus.

Inter Pharmaceutica dejectoria illa præferenda censeo, quæ serositates ducunt, hydragoga nuncupata. In quibus potissima sunt, manna electa, radix mechoacan; necnon pulvis ex hermodactylis; aliquot item grana quandoque diagrydi, cum flor. Cassie & hujusmodi. Alterantia, & digestantia omnia à Viro Excell. præscripta mihi videntur apprime accommodata, & decoctum potissimum; paratum tamen ex salis parilla, Jentisco, ligni sacchi cortice, visco quercina, & sacalis; misco Massas ligno, ob ejus in caput exhalationem; radice item chinæ, male nota: ut plurimum, & cariosa. Quod si in ventriculo evidens noxa deprehendatur, decoctum, parabitur cum columba turricola; alioquin sinceram, penmissa drach. i. Terebinthinae laricina, cum scirp. sem. ossium combustorum. Si verò dum utitur decocto, sudor manaverit in partibus inferioribus, cum pane siligineo à fumo recenti linteo obvoluto, discutietur magis; misco vini uso tempore decocti, cujus loco parabitur mulla diluitor, ex hordeo, & coriandro; atque pro cibo erunt nuclei pini potius quam amygd. dulces; quæ caput tentant magis. Extrinsecus utatur pulveribus capitalibus temperatis, ex cornu cervi, rosis siccis, ossibus combustis, & pumice. Hepar inungatur unguento sacralino, cum succo cicchoril; vel epithema eisdem

eideu applicetur ex succo cicoriorum, cum modico abstineli iugo; ventriculus vero oleo masticchio, de mentha & abstineli; superaddito etiam cerato ex mastiche, & tamarindis. Ab his vero dum utitur pulvere viperino, à Viro Excell. prescripto, & à me summoque commendato, curas, & pedes roborantur lutiis, & aquis Theriacalibus; extirpatus quinque etiam subitis spongiis extirpatus aqua calida pilis imbutis, & fortiter expellis; parvis calceamentis ex pelle canina tanquam minus laqueis. In quorum tamen localium ulu magna religione procedendum erit; eam experientia conflat, Excell. Patientem à discutiendis detectis habere, invalescente potius incutimelentia.

Vitius ratio sit à Viro Excell. prescripta, huc constet ex alimentis calidioribus, & facili coctione, ac vino tenui substatante, non admodum generoso; assumpto medicamento aliquo familiari, quo alvus laxior fiat, & biliofum lepra aliorum humorum vehiculum educatur: in quem usum convenit, Pilul. ex Aloe lota succo rosæ, quarumque sanguis quatuordecim hæmorrhoidalis nunc exhibitus exiguam potest, non omittis localibus tumenti testiculo applicatis, in primis vero cerato oxaleo. Atque hoc potiora duri, si saltem Ulthill. & Excell. Marchionis, quæ ut illi usui sit salutis aurotem Deum O. M. erigere precor. Benedi. Solonio, Confili. & Regi. Medic. Cent. 3.

Erysipelas in facie.

Juvenis 35. annum agens, temperamenti calidius & jecoris, ad calidum & humidum vergentis, habitus mediocriter carnosus, comestationibus, & compositionibus indulgens, quatuor abstinens annis bis per annum, Erysipelate in facie contigit caput, quod incipere solet à parte dextera faciei circa nares, indeque ad totum caput se diffundere, cum levi incutimelentia, calore insigni, & potius rubore quam flavicie, quod mali genus ipsius quoque Genitor pati solebat. Quoniam autem veris tempore, & incunte Autumno invadere solet humilissimè affectio, quæ tepetita sanguinis missione, & alterantibus laticulis curata fuit, non tamen sine vitæ discrimine, quia febris acutissima eandem comitatur, & quandoque ad fauces quoque propagatur, ideo hoc Menle Martio, & in posterum, de agendis pro præservazione consultit.

Hujus affectus per intervalla periodica recurrentis, & hunc Juvenem Nobil. molestantis idea jam notissima est, Erysipelat enim nuncupatur, quod licet vix ad auctam magnitudinem ferri solet, cum corporis potius superficiem, quam internas partes occupare solet, attamen quoniam rarissime datur legitimum Erysipelas, à sancta flava bile productum, ideo Phlegmonosum hoc propriè appellabimus, quod à sanguine bilioso, ut ferè semper, ortum trahit, cujus causa familiaris esse solet trigesimo usque ad quadragessimam aetatem, quibus sanguis pletumque abundat, ideo color ejus, cum calore, rubens sive rubicundus observatur, qui roseus dicitur, redundantis sanguinis indicio, cujus efluxus atque provenus facilis in hoc Juvene semper fuit, temperamento calido & humido prædito, & meracioribus compositionibus dedito, unde biliosus simul & topioris generis, venarum hæmorrhagiam irritat, ad sui in partem hereditario jure imbecillitatem, expulsiorem, potissimum Veris tempore, quo humores à centro ad corporis peripheriam moveri solent, Autumno incute, cum ab ambiente cutis motus densantur, universa diaphoresis imminuitur, & humores per expulsiorem, utpote calidi, sursum in caput ferantur, & facilius obident nares genarumque dexteram & dextræ jecoris, partes scilicet, quæ

facile tenuissimum sanguine suffunduntur, utpote calidioris molliores atque imbecilliores, à quo instillatur, & in tumorem elevantur, unde phlegmonosum Erysipelas, confluunt, quod necessariorum febris acuta, ut symptoma consequitur.

Affectus equidem non spernendus, nam ex levi aliquo errore, aut externa occasione febialis evadere posset, si ab extra ad interna retrocedat humor, unde Phacitides nonnunquam succedunt, quandoque etiam Angina, quandoque pariter suppurat, ut propterea summa cum ratione egrigius hic Juvenis à nobis præservacionem postulet, cum melius sit prævenire quam præcavere. Quod si non statim adeo præservacionis remediis arceat possit affectio, ejusdem quoque præsentis curationem exposcit.

Pro præservacione autem intentiones Medicæ erant, redimere hæc sanguinem immutare, ejusdem vitium corrigere, regenerationem insubdere, & partem affectum roborare. Quoniam omnibus satisfaciendum partim Menie, modici accessione procedente, partim post.

Fontem Chirurgicæ spectantia locum habent paucis diebus ante accessione, sanguis enim omnino educendus, quia vitium in eo est, peccat enim quantitas, ut in hoc, qualitate, ut acris & biliosus, & motus, quoniam quæritur caput, & ideo aperienda sapientia pedis, præcedente tamen hæc prima vice jecoriarie, dextere, seditione, in usum etiam ducl debent quotidianæ pedum lociones aqua calente.

Et Pharmacopœia reliqua sunt depromenda medica auxilia. Et primo Lenientia erunt, Syr. Rosæ sol. cum potione Mappa clarif. vel Caffia cum Tart. Preparans esse poterit decoct. Cich. Boerh. End. Acer. Viol. Sonch. cui præmixta Julap. Acer. ad 3j. C. Reperitur deinde præcisipuum leniens, addita Insul. consuetæ Rhubarb. drachmas. Inde ad ulcerosa præparanda erit progrediendum. Decoct. scilicet Cich. End. Acer. Sonch. Viol. klem. Portul. præmittendo Julap. Rosæ & Viol. ad 3j. Preparati humores sunt expurgandi. Rhab. potissimum, cujus 3j. in Aq. End. infundantur, cum 5j. Myrob. Citrin. Insul. addendo Syr. Rosæ sol. vel præbeatur Elect. de succo Rosæ ad 3j. cum Flor. Caff. quibus superbibat Ser. depur. Carr. aut Aïm. 15 ij.

Hæc sequitur humorum biliosorum expurgatione, calida jecoris & venarum incemperies contrigenda venit, in quem finem Aq. Acidulæ fetæ erunt omnino usurpande. Verum quoniam nonnulli sub Can. periculantur & assumentur, ideo interim in usum ducat Aq. stillatilis ad 15 j. de Sacco Cich. vel Acer. End. & Cucurb. Angaricæ quoque aqua utebatur Avic. & Arabes, cum Syr. de Acido Cit. & de Succo Lim. ut tandem ad Acidulæ, vel Calderianæ in Agro Veneto, vel B. Virginis in Parysino se conferat, 15. aut 10. diebus assumentis. Familiariter inde habeat. Ros. Conf. & 15. aut 10. diebus autumnalem accessione præmissa Leniente, ex sphaera dextera patiet sanguinem sibi misti permittat, & jam diebus alecrantibus suavioribus uratur. Tandem per purgationem, facies martino tempore ablatur Aq. chalybeata, interdum madefiant genæ Aq. Rosæ, hæcque abunde.

A fonte Diæretico magna ex parte pendet hujus affectus præservacio. Etenim primò, nec igni, nec radiis solaribus caput diu exponere debet. Secundò compositiones evitande, merique potus, etiam in mensi, à cibis calfacientibus ac vaporosis abstinentium, à condimentis Aromaticis, Allii, Caprarum, & hujusmodi. Somnus diutius virandus, vel sit brevis saltem, & capite elato. Exercitium probatur, sed ante cibum. Et semel per mensem assumere poterit 3j. Pilul. de Trib. cum Rhab. sub cenam, & in cena præsumat hordeac.

hordeac. Alacriter vivat, & intensas applicationes vires. Quod si jam dictis non obstantibus recurreat affectus, eadem purgatio erit anno proximo futuro peragenda, ut mali radices omnino evelli & extirpari possint.

Erysipelas vero rursus invadens curandum erit ut alias, melius enim est, dicebat Avic. Medicamentum expertum non experto. Nilhilominus, ut Patienti morem geram, nonnulla peculiariter artingam, quæ in curando Erysipelate Medentibus dubium afferte solent.

Ex primo Medicæ intentiones esse solent, humorem ad partem affectam fluentem revellere. Secundo repellere. Tercio eundem expurgare. Et tandem partem roborare.

Quibus explendis, de sanguinis missione dabitur soler, cum Gal. in curacione Erysipelatis, necessariam non esse dixerit. Verum primo sanguinis missionem non reprobavit, sed præterea omitti posse censet in Erysipelate exquisito, quod rarissime datur. In nostro autem casu de hoc dubitari non potest, siquidem phlegmonosum est, & præterea in capite, quo casu, Celsus & Paulus sanguinem edachant, & ideo sanguis iterum atque iterum ex inferiortibus & superiortibus venis adducendus, & reliqua omnia genera resolutionum administranda, scilicet pedum lotiones, frictions, & encurbitalæ.

Extrinsecus repellentia admoveri solent, quæ tamen causæ valde capiti sunt apponenda. Sufficiant igitur lineæ Aq. Ros. tepida imbuta, vel succo sempervivi, qui & repellendi & quodammodo etiam digerendi facultatem obtinet, ab oleosis vero & pinguis omnino abstinendum, ut quæ partis fervore excalesceta magis inflammate possint. Ab his autem repellentibus tertio aut ad summum quarto die abstinendum, nec quicquam aliud curiosè agendum, sed circa septimam lineæ apponantur Aqua, in qua sapo noster Venetus dissolutus fuerit, imbuta.

Interim sanguine prima vice evacuato, post injectionem clysterum, medicamentum evacuant est exhibendum, quod esse poterit, Syr. Ros. sol. cum decoct. Pulp. Tamarind. vel Flos Caff. cum eadem pulpa, à quibus bibenda præbeatur Aq. Nocet. ad lb ij. & inde usque ad declinationem Clysteribus utendum. Postea alterantia in usum quotidianum revocanda, ex Aq. still. Acet. End. quinimb & Plantag. parata addito Syr. de Succo Lim. & de Acido Cit. Et licet videatur Gal. purgationem electivam approbare, ad hanc tamen valde cautè deveniendum est, nonnisi in declinatione, ne agitentur humores & in affectam partem irruant. Quare post septimam præberi potest Elect. de Succo Ros. cum Caff. & ab ea serum, aut Aq. Nocet. ad libras.

Et his omnibus congrua addenda victus ratio, in casu nostro tenuis, non autem adeo ut in exquisito Erysipelate, sic autem in crassius, verbo, sufficiat pituita hordeac. vel Lactuca, aut Cucurbita in iure cocta, cui prope septimum Ovum recens addi potest, conceduntur poma & pyra cocta, & cibum claudat Conf. Ros. Pro potu autem haustiat Aq. stillæ. Acet. aut Hordeac. Quibus addendum, quod nil perniciosius esse possit quam faciem ætæ frigido, aut ventis exponere. Quæ pro curatione sufficiant. Rayn. Joh. Forst. Consult. & Respons. Medicin. Tom. 1. Cent. 1.

Pælla duodecim annorum, jam à tribus annis, circa menscm Majum, incidit in rotas faciei tumorem subarbutandum, oculos pene claudentem. Adest calor & pruritus magnus. Pulsus etiam est iusto celerior; appetitus est prostratus; & plus solito sitit.

Afficitur in hac pælla facies, ut ad oculum est manifestum: uri & cor, quod pulsus iusto celerior, jecur, ventriculus & esophagus, quod sitis, & appetitus prostratus indicant.

Morbus, qui eam affligit, est tumor faciei, ex bilioso sanguine ortus, qui calorem immoderatum, & pruritum, ac colorem tuberciculandum in facie inducens, Erysipelas faciei phlegmonodes appellari solet.

Causa antecedens hujus morbi est sanguis biliosus, ex temperamento sanguineo & dicta fortan calidiore, tanquam à causa procacitica, in toto hujus puellæ corpore, singulis annis genitus. Pars vero ejus circa mentem Majum, ob aeris caliditatem, in corde effervescent, inducit pulsus iusto celerior; ad ventriculum vero & esophagum delata, ibique esophagum nimium exsiccano, succumque acrem ventriculi, faciem excitare solent, copia sua & qualitate biliosa perfundendo, sitim & appetitus prostrantem excitat: ad faciem vero à corde propulsa, ibique poros vasorum aperiens, & se in cutim vicinasque partes magna quantitate effundens, vehementissime, ob ulteriorem coacturam sive putredinem supervenientem, incalescens, ibidem tumoris, ruboris, pruritus, & caloris faciei, causa consensu existit.

Merus est, ne hic affectus erysipelas exaceratam faciei, vel, si humor hic ad cerebrum vel alias nobiliores partes feratur, ne inflammationem cerebri, vel pulmonum, vel pleuræ inducat. Diligenti itaque hic morbus erit impugnandus Curatione; quæ in causæ procacitica, antecedentis, & continentis, item interperiei, & tumoris ablatione, consistit.

Atque ideo primo tale exhibebatur purgans: 2. Syr. ros. sol. cum fol. fenæ 3j. Cremor. tart. ʒi. Scammonei gr. x. Aq. cichoi. ʒ ij. Misce, fiat Haustus brevis, mane exhibendus.

Toti faciei deinde imponantur lineæ sequenti liquore tepido imbuta, sepiusque, ubi excoctata fuerint, renovetur imbutio & applicatio:

2. Aq. plantag. rosar. an. ʒiiv. Lapidis alchymis ʒ ij. Misce.

Vel 2. Aq. flor. sambuci ʒx. Sperm. sanar. ʒv. Spiritus vini opt. ʒvi. Misce.

Si palpebræ oculorum valde etiam intrinsecas, hæ imponantur lineæ, solè aqua ros. & plantag. repli madefacta.

Ad præcavendum, ne sub sequentem Majum rursus recidivam patiar, mense Aprili semel atque iterum purgetur, & utatur diæta tenuiore, & refrigerante. Hæren. Regius apud Theod. Craanen Medicin. lib. 4.

Observationes.

Rusticus quidam Erysipelate phlegmonode in sinistra manu laborans, ex tonsoris consilio per aliquot dies manum & brachium oleo rosæ, inunxit: unde dolores, inflammatio, aliaque symptomata magis magisque ingravescerant; ita ut tandem gangrena correpta sit tota manus, in eam ad me accessisset, scarificatione aliisque remediis quæ ad gangrenæ curationem spectant, curatus fuit. Ex quibus perspicuum est, oleum maxime inflammationibus adverterari. Gull. Fabric. Hildan. obs. 82. cent. 2.

Quidam Erysipelas in scipso & aliis plurimis curavit secteto præstantissimo, quod sic habet, accipiebant folia & ramulosus Sabinæ & in pulverem crassissimum redactis quodidie ter subsista membrum affectum. Si vero exaceratio adjecta esset, ceram virginem in aqua calida manibus tractatam, ampliatim modo, ipsam imponebat. Hæren. Raschius. obs. 124.

Erysipelas cruris

Domino Kelfken, urbis Noviomagi Consul, detrum crus erysipellate correptum fuit, cui malo sequens etiam

eriam antea obnoxius esse consueverat. Senegentiis erat, & corpore valde cacochymo. Erysipelati, ex more vulgi, ipsemet imposuerat lintea indurata in aceto & aqua florum sambuci, quibus erysipelas aliquantum quidem minuebatur, sed vesiculæ quædam hic illic excidebant fuerunt, quales etiam antea ab hujus aceti & aque usû sapient habuerat: his acuta petusula imposuerat folium tabaci viridius (quo præcedentes vesiculas semper curaverat) quod cum per tres quatuorve dies applicatum fuisset, ab acrimonia humorum effluuio cunctis magis magisque exulcerata fuit, ac in medio particula quedam nigra & gangrenosa apparuit, qua visus, æger sibi metuens, Chirurgum accersiri iussit. Hic particulam istam gangrenosam in sola cute facillè excidit, & variis emplastris impositis solutionem sanare conatus fuit, tunc curari propter erysipelas inangens unguentum refrigerans Galeni. Atque illo modo æger per sex septimanas tractatus est. Tandem cum variis de sepe muratis emplastris ac unguentis nihil omnino proficeretur, sed malum in dies accresceret, mensè Junio etiam ego ad curationem advocatus fui. Animadverti egrum multis aquis ac pituitosis humoribus abundare, qui saluti ad cras descendentes hujusmodi continuum exulcerationem inducebant: hinc etiam alvum humidum & liberum, imò quatuor vel quinque fecerunt quotidie habebat. Appetitus medicis erat: sed à medicamentis tantopere abhorrebat, ut nihil, nisi extrema urgente necessitate, per os assumere vellet. Infecto curæ, comperi emplastrum in cutis fuisse quod vicinæ partes exulcerarent, cum enim ob pinguedinem & densitatem humores acres & salios effluentes in se retineret, vel exurgere, non possent, illos ad circumvicinas partes effluere necesse erat, quæ ab eorum acrimonia exedebantur. Proinde cras illud cataplasma curare præstabilis mihi visum fuit, quæ ob mollitiem humores effluentes inhibere ac in se continere, partemque exsiccare possent. In hunc finem sequens cataplasma absque ulla pinguedine præscripsi.

℞. Corticem granatorum, flor. balustiorum, an. ℥b. foliorum quercus, plantaginis, agrimonie, feniculi, an. m. ss. pimpinelle, flor. rosarum rub. an. m. j. aquæ communis lb. iv. coquantur ad medietatem.

℞. Foliorum quereus in. iv. agrimonie, plantaginis, an. m. ss. pulverizentur simul, tunc add: silium fabrum ℥ij. decocti prædicti q. l. coquantur aliquantum, & hac cataplasma.

Hoc postea aliquoties reiterato, ulcus omnino sanatum fuit. Circiter tertio post sanationem mensis, rursus nova defluxio ad cras descendit, magnum ulcus erysipelatodes inducens. Præter unicum haustum purgationem, & unum decoctum ex radicibus chine, salisparille, & similibus, nullum aliud medicamentum assumere voluit. Impositum fuit amplexitum cataplasma, quo res ad tempus bene successit tandem vero nova rursus accedente defluxione cum magno erysipelate, dolores valde accreverunt, ulcus multum extendebatur, ac paulo post etiam gangrena partem invasit, & in cruris exteriori latere particula gangrenosa nigricans, latitudinis dactyl imperialis, conspiciebatur. Chirurgus vino tepido partem affectam aliquantum abluit, ac postea unguento mundificativo ex apio imovit, & postea cataplasma superposuit: atque hic aliquot diebus continuatis, gangrenæ particula tandem exciderunt. Tunc ulcere prius mundato, solum cataplasma impositum est. In creta ad humorum descendendum commotionem evanescione, libenter fomiculum in surc. exteriori parte fecit, verum illud permittente noluit æger. Mensè Martio ulceribus jam sanatis rursus nova accessit acris defluxio

cum erysipelate, hinc ab utroque cruris latere novus ulcus latitudinis palmæ manus excisum fuit. Cataplasma impositum nihil profuit, vires cum appetitu dejectæ sunt, & æger adeo debilis evasit, ut amplius incedere non posset. Paulo post gangrena ad palmæ latitudinem subito accessit, æger periclitari nobis visus fuit, tam propter cacochymiam corporis, quam propter magnam virium debilitatem. Ulceribus gangrenosis innotum fuit unguentum mundificativum ex apio, & cataplasma superpositum; si spiritus vini admoveatur, tantus excitatur dolor, ut illum produs abicere necesse foret. Tunc fomiculum in tina fieri permittit æger, quem scissione novacula libenter fecit, verum cum inde nimis abhorreret, cauterium potentiale, holotescum Paræi, impositum fuit, quod line ullo dolore operatum brevi peregit. Post tres quatuorve dies gangrena in ulcere multum adacta est, atque etiam invasit locum illum cui cauterium impositum, unde cicatrix nondum exciderat. Hunc proinde locum cauterium ad canem ulque vivam scissavit Chirurgus, ut cicatrix citius separaretur, cupis etiam frustula quedam excidit. Sequentibus tribus diebus gangrena magis magisque accrevit ita, ut in loco fomiculi carnis omniæ pars magnitudinis dactylis imperialis, & profunditatis latitudinis pollicis, excidenda foret. Possibile gangrenæ partes sciebant insit cavasit putrescentis, tunc fuit quem vis quipiam aditiam ferre poterat, & gangrena continuo incretcebat. Ut mortificationi ac putrefactioni resistetur, partes infectas abluimus cum spiritu vini in quo sal commune dissolveramus, & perias eodem liquore madefactis impositum, ulcunque ter de die religavimus, quo medio factis fere totis intra seculisum secessit. Deinde ut gangrenæ & emoragie partes à vicinis per suppurationem citius separentur, & sanæ à corruptis præservarentur, ballatum nostrum Magistrale impositum fuit; quod putredini potenter resistebat, & suppurationem egregie promovebat: atque ita partes gangrenosæ paulatim ceperunt excidere; quibus ablati, per aliquot dies impositum fuit unguentum digestivum, ac tandem rursus solum cataplasma, quo ulcera progressu temporis, sed admodum lente, sanata sunt, humoribus pituitosis per fomiculum effluuntibus. Hoc ego, qui ab omnibus pro desperato habebatur, præter multorum opinionem, sanato, magnum nobis bonorem conciliavimus. *Librad. de Diemerbroek in Observat. & Curation. Medie.*

Erysipelas tibia cum ædemate cauterio in ipsâ parte affecta, ex parte curatur.

Vit Amplissimus, Senator Berghensis, *Virap. & ex* *herald. &c.* abdominis amplius, validus, ac robustus, florentis ætatis, erysipelate affligebatur in tibia sinistra, cui succedebat ædema. Medicamenta adhibebam convenerunt erysipelati; sed tandem succedebat ulcusculum in parte inferiore tibiæ materiam serofam fundens, cujus influxu ut stem obviari, de cauterio potentiali infra genu applicando cogitavi, quo operatio successit ex animi sententia affligebatur operatum, erysipelisque longè minus frequens infestabat tibiæ. Verum cum Celebratissimus Dñs Wepferus Bernam accessisset, Amplissimique D. Senatoris inviseret consilium pro erysipelate exoptatum ipsi erogatum, iussit ut cauterium in alteram tibiæ transferretur, priusquam occluderetur. Sed ab eâ occlusionis frequens rediit erysipelas, ulcusque renovabatur: mutata igitur terum vice, postquam referare foret cauterium; à quo iterum effluerebatur materię per multum, tetractabatur erysipelatis

erysipelatis invasiones, "ulcusque sanabatur, cauteri-
tuncque in ritia dextra à prælaudato D. Wepfero
inulsum claudabatur, inde per multos annos sanitate
gaudente Vir Amplissimus, incedebat pede firmo, do-
nos per hyemem rigidissimam, ac nivolum properans
ad Senatum, ingreuerit foris fortuito erysipate, in-
troque repulsi ab ambiente frigore vix intercepedit
ad aditus ad Curiam, ad huius ingressum vehemen-
ter perhorrescebat: appropinquabat idcirco ad hypo-
caustum, cui admovebat lumbos, ubi potissimum
frigus perstebat, ac simul dolorem atrocissimum.
Domum inde reversus Vir Amplissimus febre cori-
plebatur protinus acutâ. Accertiti Medici haud inter
die de morbi idea convenientes, apozema nescio quale
laxans, aut purgans pro tribus aut quatuor dosibus so-
luta præscripserunt ayibus, nam quartâ ad quin-
tam vergente die è vivis excedebat Vir Perilluistris,
cum delirius levissimulus & lipothymus, remittentibus
tamen tum, ut adstantibus apparebat, & febre, & re-
num doloribus. Illud autem morbi genus, me iudice,
non aliud fuit quam Erysipelas repertissimum, ad renes
translaum, quorum inflammationi successit gangrena
que vixit tam robustum paucos inter dies enecuit. Ex
communicatione amica (Lansl. Viri D. Antonii Drelin-
carii) Reipublicarum Bernensium et Friburgensium Archi-
atri Extraordinaria.

*De Erysipate raro, Fonticuli naturalis addita-
mente.*

Exemplum ejusmodi fonticuli, de quo historia præ-
gressa, seu potius scararignus cuiusdam sine alveo fon-
ticuli, producum, ut simul erysipelatis tam miri quam
rari fieri possit mentio.

In suumitate interstitii, quod est inter digitos pe-
dis sinistri majores, à multis annis ipsemet sensit, sed
sine ulla sensu, exudationem quandam, modò humi-
dam siccâ vel cinis, modò siccâ siccâ squamarum vel
crustularum, quæ sæpè & facillè separabiles.

Aliquando peregrè vocatur, post eamdem sitam
appuli, apponerebatur siccus veniens cypinus, qui si-
lis & elizationis defectu palato conciliabat nauticam:
vitiū hoc non satis poterat corrigi vino, quia villo.
Lecti ingressum combattebat horror, hinc curiose plu-
rimis sepultus dormiebam morte solito. Somnus pro-
fundior exonerabat massam sanguineam sero per ludo-
tein copiosissimam.

Evigilanti horæ matutine Bubonis rudimentum
ostendebat in inguine, & amaricem ex bile in pa-
lato, & dolorem quandam totius pedis gravativum,
inprimis autem in interstitio digitorum pedis superius
dicto extensivum.

A meridie domultionem urgebam & expediebam,
quo facto tandem radium seu striam hypomaculidæ
digitos duos latam, æquali latitudine & rubore, à
bubone usque ad digitorum pedis scararignum exten-
sum vidi. Hæc serum consuetò copiosius fandeat per
aliquot dies, & mox à principio cum insigni levamine.

Exagm ejusmodi, tanquam summam prophylacti-
cum, opranda esset Podagrica: sed cum beneficium
hoc nature sit rarissimum, an non excretionis arti-
ficiales hic locorum querenda?

Assentiri videtur Sennerius de arthre. c. 7. qui &
verè sectionem & cucurbitulas ad pollices pedum luda-
dat rationibus & experientia. Salmuth. cent. 3. obs.
46. commendat suo & aliorum ex.emplo fascificationes
menstruas pollicum pedis circa radices unguum.

Contradictor accertissimus est Crato Epist. 152. ad
Thom. Jordanum. Dissensiones aliorum Medicorum
in scem non produco. Et affirmantibus & Neganti-

bus non desunt rationes sat pregnantes. Arbitrium op-
timam judicare esse experientiam, quæ tamen fallax
& non raro periculosa. Si quid statendum, concla-
do, Artem utar Naturæ ministrum & saniam, quæ
tam esse felitem in excretionibus materij morbosæ
solicitantis, ac Naturam: & excretiones naturales
ut plurimum esse placidas & criticas, artificiales contra
violentas & quodammodo symptomaticas. Sigismundi
Gravil.

*De Zona sive Zoster Erysipelatis specie, ejusque
curatione.*

Matheus Aurelius Severinus Philosophus & Medicus
celeberrimus lib. de recondita abscessuum natura 4.
de novissime observatis abscessibus cap. 9. §. 1. p. m.
194. de Zona Herpetis, sive ignis sacri specie, ita
scribit. Zonam quidem ad hoc tempus nemo tradidit à
se observatam; usque adeo, ut veram ejusdem for-
mam ipse, qui vidisset, testificari caveris possit. Ra-
rissimus sane affectus hic esse videtur: Nam ex Ve-
teribus, præter Scribonium, Apuleium, Marcel, &
Plin. nemo ejus meminit Joan. Langius Epist. Med. l.
1. Epist. 32. sub alterius cuiusdam Erysipelatis & quæ-
dam perniciosis specie, quæ merito à cingulo Zonæ
appellatur, eundem depingit, & binis exemplis de-
monstrat. Heort. Smetius Miscell. Medic. lib. 10. ubi
rationum aliquot morborum & Symptomatum Obser-
vation. tenet. p. m. 338. sequentibus verbis cum
describit. Filioles civis Francodentis febricitabat, &
Erysipelate corripiebatur, quod totum pectus cum
dorso toto occupabat. Inde doctum per totum abdo-
men & femora ad genua usque, sursum verò per col-
lum, in faciem & brachia ad cubitos usque sese ex-
porrigebat. Den rooden Umloop vocant Flandri, Sæpe-
citatus M. Aur. Severinus loco prædicto p. m. 196.
talem Zonæ modum & formam observavit, verbis
transcripsimus: Sæpius hæc visa posterius thoracis, &
secundum superiores lumbos circinata: Quam in Sui-
tariis Jesh Sacerdote Sacramum Collegij adum vidi
cum Mario Schipano diligentissimo verum ipsarum Ob-
servatore: Alterum cum Francisco Nola Medico suis
industriis curavit Mario Canello Sacerdoti integerrim.
In polens similiter cuiusdam Saceris calcitrarii, qui
Syphilide fuerat affectus, lucentia nuper fuit observa-
ta cum primis Zonæ: Qui primum dolorem aciem in
pectore persequi fuerat, itaque alia pleraque se ob-
tulerunt in valedictoribus morbis incurribilibus dicato:
Quas omnes explicare longum esset. Hæc Severinus.
Huc etiam referri possunt Maculæ Volticæ Infantum,
Germanicè der Flag. dictæ, quas describit Sennerius
Præf. Medic. lib. 5. Part. 3. Sect. 1. c. 6. & Mel-
chior Sebizius Manualis sive Speculi Medic. Præf.
part. 6. cap. 32. sub titulo Volticæ. Autoribus hisce
inter se collatis apparet, affectum hunc quem singuli
describere, eorum eundemque esse, proindeque ad
Erysipelas referendum: est enim (ut verbis Sebi-
zii citato loco p. m. 1818. utar) utriusque eadem na-
tura atque essentia, unaque causa & una curandi ratio.
Discrimen in eo solum consistere videtur, quod Ery-
sipelas in uno loco plerumque persistit: in Volticæ au-
tem seu Zona, rubor priorem locum deserat, ulterius
tamen progrediat, locaque vicina invadat. Deinde
quid sanguis Volticæ sit calidior, subtilior, & for-
san etiam malignior, quam Erysipelatis vulgaris: Quo
fit ut hinc inde vagetur: & quia sanguis illius acrior
est atque mordacior, expulsem partium facultatem
irritat, ut non in loco permanere nequeat. Quæ tamen
omnia ratione naturarum & ætatis, temporum & locorum
sepe variant. Mihi, ut ingenio fatear, in præxi
Medica per Dei gratiam spatia viginti annorum continue
occupato,

dignis Autoribus superius descripsimus, (live Zona, vel Erysip five Volvata vocetur) tantum his corandū obtingit. Primum hoc affectu correptum Vidi A. 1667. Spectabilem p. m. Andream Schiller Jusliconsultum doctissimum & Scabinum Thuronensem Suburbanum dignissimum, quinquaginta sex annos natum, unā Cancrum ulcerarum in dorso foveantem, quem dicti Anni, Mensis Septembris die vigesima quinta febris adorta, usque ad tertiam Octobris continuè exercebat, tumor autem Erysipelatodes, incipiendo à scapulis, superiorem pectoris parte ad collum ferebat, postea faciem totam & caput occupabat, cum summo dolore, furore & cordis angustia, ut neque cibum capere, nec somno indulgere posset: Sed adhibitis tandem interne Medicamentis partim aliterantibus, partim expulivis & Bezoarticis: externè verò tumori applicatis lixuraminibus, aquis plantaginis & rosarum, cum paulillo croci tepide madefcentibus, pederentem circa nonum diem & tumor & rubedo disparere: ceperunt, donec undecima morbi die, decidens simul capillis planè evanesceret. An. dein 1668 die 4. Novemb. eodem morbo affectam observavi puellam septennem, Christinam, plurimum Reverendi Viri Simonis Westli Ecclesiastæ Martani Vicentissimi & Professoris Gymnasii Clarissimi, Compatri mei admodum colendi, Filiolam: cui malum similiter totum pectus & dorsum ad collum usque cinxerat: hanc partes prius latius distendo, ad faciem & caput ascendens, præcipuè autem remediis idoneis, ut in priore casu, denique cum totali pilorum ephelis dilavio evanuerat. Refert quidem ex aliorum mente loco supra à gsto *Sennerto*, qui affertum hunc senenquam vixisse: tunc: Si macule illæ orificium aliquod, os puta, nares, oculos, aures attingerint, & eo usque penetraverint, malum lethalè fitit, Ideoque ad præcautionem orificia dicta aqua rosarum cum paulillo croci mixto illineunda sunt: Verum nos tale quid animadvertere haud potuimus, sed licet tumor ille totam faciem, labia, nares, oculos & aures, in predicto utroque casu plene occupavit, morbi tamen letum eventum subséquutum videmus. *Simeon Schultzei.*

Erysipelas Erysip.

Inter plura Ignis sacri generis *Erysip* numerat *Pilius N.* lib. 26. cap. 11. qui modum hominem ambiens si clarescit eam enecat, quo M. in hunc Brandeburgensem in Oneshbachio interfecti, Principem verò Palatinum Onkenianum correptum, fuisse à se restitutum refert *Langius* lib. 1. epist. 1. Corripiebatur eodem hucusq. Martoni Hildelici Spanmanni Jurium Practici viro, quod cum pæ pudore dissimularet, & tibiā saltem eodem igne inflammatam & exulceratam Chirurgo tractandam exhiberet, accidit ut altero illo subito invaleceret, & in gangrenam delinere, ægra præter spem placide exspiraret, paulò ante mortem & superciliis illius inspicendi copia faciens, deprehendi a, illud infectiorem ventrem tam accurate circumdedit ut cingulum fuscum palam laeum eximolam referret. *Joan. Henr. Brechfeld.*

Amellam ventrem quandam habui quinquagenariam, Norimbergæ adhuc commorans, quæ triduum diu noctuque iniqua de molliora cum cardialgia circa præcordia quærens, denique sensu sub præcordiis prope stomachum circumfusa ad laterum manus, cinguli instar, pulsulas parvas levidas, cum cois inflammatione acti proterere, sed assumpto cathartico leni, & sudoriferis cum cordialibus ac alexiteris mistis, externe quoque se fomentis modicè refrigerantibus.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

bus sepius tepide detergens, & sponte deficiens p. emittens, intra sexiduum relevavit ea, à tam multo & periculoso affectu liberata. *Joan. Henr.*

ESSERE Vid. *Pylor.*

EXANTHEMATA.

EXanthemata Scorbutica, quorum hinc inde facta mentio, huc imprimis tetris tam vulgaria sunt aique obvia, ut nemo scelli periculum incommineatur, atque etiam non advocato Medico libenter ea toletur: verum illa ista, quæ inter morbos exurgunt corporisque suppositi sem deficiant, maxum statim spectantibus, imprimis feminis, retorena incutunt & æstio quid multo alere videntur. Aque hinc nulla est mora, quin ad eorum comp. cōm. Medici s. protinus accertant, ut de his sententiam fere de blantibusque mutum extimar. Et febris quædam species, fu pura dicta, quæ variis se maculis & ipsa extir, nunc pallidioribus, aunc rubicundioribus, tandem etiam nigris; hanc, si quod Scorbutici salis liæ fractus sit, seu quod intestino & proprio venio exurgat, malignam esse & periculosam omnino sūm per uas. Levior autem est species minisque habet. Scriminis, quam Galli febre Sætar nam vocant hæ. fermentatiois paulò vehementioris materiemque in cūrem evanescens progenies est & ex facili dissipatur. At ego alia quoque exanthemata erumpere vidi, quæ cum illis quædam comparari minime possunt, omni periculo vacua, cetero indico spectaculo quam symptomati obnoxia. Et primo quidam in duobus ex pectore vuln. ratis, uni quidam post vomitum ebullitionemque sanguinis, alteri post hæmorrhoidum roborem toto corpore vetecudum illam & planè omnium effluuissimè vidi, finito intra quatuor horas cum colore leviori paroxismo. An forte de eo intelligi debeat Hippocrat. illud in Coacis *sem. d'anguis d'indus* & sic *figuras, tunc tunc ægæ h'anguis*. Alii, & ipsi Althamarico, Servo à paucis. cæth. tribus quidem diebus continuè elegantissimo rore perfundebant tota, peticulum in manibus, qui aderant, omnibus: et verò cum singulis proxymis, qui quotidi redibant, remittebat quoque color. Famini Nobilem ex febre Tetertum cum vomitu laborantem triduo cum Paroxysmo invaleant hæ univerto corpore macule, sed cum uno alteroque paroxysmo etiam ipsæ deficiebant. Magna interm familiaris & domesticorum soliditudo in corpore uberrimo jam Morbillorum, jam Malignitaris p. picionem moverat; a subia febris roboreque remissio necum omnem exmere. Virgo venustissima, quæ elapsa hæm. cum Quarta condicta erat, ad intermissas menses male morari preces perculsa recidivam invasit vere finis, sed quam tres ex ordine Paroxysmi finient; hanc & ipsam cum primo insultu paulo post terrore color incessebat toto corpore elegantem rorem inque maculas distinctas, confertis ad novum spectaculum parantibus; at, quod terro insultu apparuit, sine ulla admodum offensa corporisque peticulo. Sed quid de isto Exanthematum genere, tenendum, quod Morbillorum specie rores sæpe teterrum trachis inficit, & ante hos sex annos, quando suspecti mihi Germania cum Principe persona decurrenda erat, Palatinum & Sæviām occupabat, equique tribuam ipse quoque cum plerisque itineris focis pendere debebam. Leviculus erat ille morbus, *Sæth* nomine notus, nul nullo habito sexus ætatisque discrimine promiscue omnes invadebat. Paycellissimi ille erat funestus, aliquos diem biduume aut triidum lecto affigebat, aliquid

stando eum vincebant nonnullos impuro corpore diutius vexabat, plerisque tamen molestia quidam & calore paulo intensiore, appetitus defecto & membrorum signitie, mulcabat, quæ vel sponte aut summo Sudatorio cessabant. In unâ autem Stutgardia simul femelle leprogenti eum hoc morbo confectam fuit, quo etiam in levibus contagium aut sporadicum quid hæc intelligis. Examiniemata verò illa non statim universo corpore, sed variis locis, ut constitutio ferebat, sese ostendebant, plerisque tamen in Carpo erant manifestiora, in aliquibus tamen etiam remissior rubedo attentè quædam debuit. Creditur ego collectas per hyemem in sanguine lotas aliquas ad initia veris exsultante sanguine in cutem facile exisse, quod suspexit maxie potius quàm eentro inhaeresceret, & sic originem febriculæ populari & criticæ darent, ubi tamen etiam certæ & astutis infusis partes suis. Et aliqua non de nihilo quia suspicetur. *Joan. Nicol. Pechlinus Obser. Physico Medicar. lib. 3.*

EXCRESCENTIA.

Comprehenditur sub Tumoribus: hic tamen super ea observationem unam asseremus & Clariss. Godofredi Bidloo Exercitationibus Anatomico-Chirurgicis peritam; quæ hæc est.

Anno hocce 1703. ipse Kal. Aprilis, duxit ad me Wilhelmus Beaudoux, Warmondæ Chirurgum exercens, Martyrie Kotszen, ætatis 45. viduam, quinquies prole beatam, & quidem vice ult. mæ am. 1700. novemb. 7. ab lex jam nunc annis in inguine sinistro, gestarentem cuti concolorem, doloris omnis expertem, in principio plis; temporis verò tunc minoris castaneæ magnitudinis tumorem subdudum, circa mensis hujus anni Martii initium valde exuberantem (ad ovi ferè dimensum enim jam pervenerat) & continud incrementum capientem: ad hujus inspectionem XIX ejusdem mensis, prædictus *Beaudoux* vocatus, audita relatione, accersere nempe, hunc tumorem immensum, quotidie sanguinem emittere aliquando ad quatuor, aut quinque libras, tel mitebant statim eumque, post octiduum: rustica, pauper enim & ultra duo milliaria ab eo vivebat remota, præscriptis quibusdam stipicis lig-turæque comprimente, iterum vocatus, hortebat: ea enim brevissima dieum intercapitine hunc tumorem ferè totundum 5. pollicum diametri & 8. longitudinis experiebat; ego, elapso triduo, petulstrato eodem hocce casu, eorum eum sanè horcul, stupui, maximæque momenti & periculi res nescivi: cum autem hic Chirurgus solus & ægræ plures huic visitationi interessent, consanguinei, us, quantum potui, perlassi, consulenter & alios hoc de negotio Medicos & Chirurgos statuerentque in mora enim periculum movebam, de rebus peragendis, quæmocyus.

grid; Apr. de quo cum Chir. *Alderkerk & Beaudoux*, rem examini subiecti observavisse tumorem ad oculum quasi continuè augeri, nigredine confecti, fetore & portredine superficiali corrupti, inquiri sedulo in omnes mali hujus circumstantias, quo, videlicet, modo & pedunculo inguini adhaerere? quo esset de genere tumorem & sic potè; brevi, convenimus sequente die horæ matutinæ septimæ; Chirugi *Torrenius, Cæsius, Alderkerk, van Lee, Beaudoux* & quidam Med. Studiosi, quibus coram mentem meam de hæc excrecentia & methodo, quæ, secundum me, curari aut scilicet tractari posset, explicui: esse, nempe, distentionem, excrecentiam glandulæ cuspidis inguinalis, lato quidem pedunculo inguini inhaerentem; sed tamen ad ejus interiora non pergentem; vicinas quidem partes tegentem, his tamen (puta meatui urinario & aliis) non adhaerentem, de causa, ut vocant, proxima, cl-

issimam, post tot elapsos annos deceptæ hæc promovente exuberantiam, opinatus sum; glandulam hanc ingualem, obstructam artetia, primò indutuisse & manifestè eo in statu, usque dum magno accedente moru impetorque sanguinis, obstructio illa tolleretur, petundetur exi: utique protensaque propagataque arteriarum glomeratione, brevi extirperetur, quam videbam; excrecentia: posse verò hoc modo paucorum, dictum spatio formati magnam tumorem liquidò demonstrari & exemplis de bubone ptilentiali, de fungo & similibus, desumptis, illustravi; huic sermone alia adjecti epique de methodo agendi in hunc tumorem; eam, videlicet, tunc non posse auferri escaroticis, in-ustione, neque incisione; sed verò in constrictionem omnem esse collocandam semper: hæc & plura hunc casum in genere, & specie spectantia, leguntur explicatis inferius.

Prædictis ergo viris mecum sentientibus mihiq; auxiliariis præbentibus manibus, insciè elevari undique & anno lo fectio plicabilique coarctata & ab abdomine, quantum fieri potuit, avulsis excrecentiam decussatim duo, cerâ obliquis, vitula liara (scilicet enim potuisset ferè petcindi cutis nimium clis) horum fibris adaptavi in utraque inguinis parte, ex levi ligno tuncularum, cujus coehilæ manubriolum apponi curaveram; ut, pro re nata, versatili hocce instrumento, ad abdominis & inguinis figuram formato, excrecentia peduncululus a clari, aut laxari posset ad nutum.

Hæc die, suffulta, ab omni parte, pulvillis (compressis) excrecentia, de tota in horam constringebatur, usque dum, ex dolore, judicarem esse ab ultetate coarctatione abstinentum.

5to; Manè expectabat, omnia pro tempore meque intentione sese habere bene ægramque & alvum & vesicam sine molestia exorantivæ; siquid ergo ligavi molem; vesperi autem, esse foris inflammationem, aut gangrenam partes vicinas infestarentur, fetor, pland cadaverosus, abigerent ipsaque excrecentia deliqueret, abdominali, subito spicui vini, femoribus verò ipsique tumori simpliciter sequens, corroborata dicitur & delectans, inspetti fomentum:

Y. Herk. Alderk. M. 11.

Sord. M. 11. mæran. M. 1.

Rog. pelyped. 3d sp. mæran. 31.

for. Refar. Rubr. M. 11.

inter. cog. in vino Rensen. aut Gall. generos; cal. sero. in usum.

6to; Inspecta mecum & Chirugi *Alderkerk & Beaudoux* (is enim usus sum ex mæran;) negotium nostrum Clariss. Med. cui *H. Oosterdyk Schacht* connumeravique, presentatis difficultatibus omnibus ad rem facientibus; ab me agi secundum attem exstinguentem mecum dubium; sed verò hæc una methodo petendum argendumque, statuit.

7to; vidi excrecentiam pustulæ corruptæ, gravi magnoque cum fetore nigrescentem; dormiverat autem ægra facti. bene constrinxitque iterum vitula firmetur.

8to; Accipiebam, ægram, præ dolore, hæc nocte fuisse inquietam, inforem, alvum non deposuisse; vesicam verò sapèpiam; sed tamen sine molestia dolore, pulsu itidem gangruæque rubedine febrem denotantibus, inspi aro curavi suppurationem, quod circa meridiem intentioni meæ satisfecit: subinde quidem aliquid portiones præscribere volui; verum illa ad medicamentorum titulum, cum testata est ab illis aversionem; ut potius illi succederet, quam ea, hæc hora, urgete, tam duxit.

9to; licet omnia & toto succedebant, vidente alimæntis, non sine appetitu & hilaritate, ægra observa-
vique

De fungo (excrecentia subitanea in corpore animalis, alio nomine aliquando hyperfarcio) sustinui, esse ex arteriis laxis, aut ad eorum extremitates, tunc perditis, succi nutritii profluvium, cujus prima guttula tubulo arterioso adhærens, sequente alia, protrahitur; sed tamen huic adaptata atque cum ea, vivificante subtiliore succi nutritii portione dotata, vivit & hoc modo insequente una effusione succi nutritii alteram, potest fieri hanc excrecentiæ Pseudocarnæ speciem.

Pro ulteriore meæ hujus opinionis astructione, duxi in medium omnia illa phenomena, quæ in Fungo præstant quibusque ille ab *Sarcomate*, *Glandulis* & *Tumori Genæ* *Carnis Excrecentiis*, distinguitur, ut; initio digito, linteo, carpo &c. posse abstergi, removeri insit glutinis; abscideri; quinimo et si tractu temporis subrubrum, vel lividum obtinuerit colorem, induruerit vasculis ab latere, ornatus fuerit sanguiferis; cum tamen fibris nunquam instructum carnis, vas ab ortu, aut lamellis apparere, inde collegi fungos, mox desiccantibus & comprimentis ligatura; potius verò vinculo (intellige simul ligto fonte, arteria) aut actuali cauterio debere auterri de abscissione docui eam, minimè convenire, utpote quæ motibus potius augeretur, quàm coergeretur: de escaroticis itidem, hoc in symptomate omne conamen esse irritum; nam unâ confecta escara eique separata, secundâ opus est; propullulante interea de fonte, fungi materia & alimento: videtur mihi cum Sisypho satum volvere, qui hoc opus aggrediuntur: problemati huic, assentiri nemo negabit, quod ab ulceribus dictis hyperfarcio-cicis impuris, ab mola &c. fungositate & cinisum excrecentiæ probam petiti fungi & aliarum excrecentiarum comparationem: quæ enim enacetia, fluidum quod, ulcero huic, de hora in horam ex imo adhaeret eique adhæret, dicitur quidem (sed falsè) caro; sed verò nec genere, nec specie est: nulla etenim carne, hæc in pseudofarcio, deteguntur fibræ: verum quidem est, ulcere neglecto ac diutius fordescente gluxen hoc duritie & colore quadammodò carnem, potius spuram, carni similem massam fingere; sed tamen ritè examinatum, nihil minus, quàm carnis vestigia relinquere inspicendi; sic de mola, polypo & aliis.

Fungositatem hanc, ut curetur, usque ad ipsa ossa, cum quibus, ut plurimum, et commercium est, debere abstergi Scalproque abradi ipsa ossa & in totum emollescere, notissimum novimus: hujus generis ulcus, ante aliquot menses, in hujus civitatis nosocomio studiosè considerandum proposui.

De glandulis vesiculatis nihil memoravi; etsi sui generis potuberantias excrecentiasque patiuntur frequentiores: de carneis quoniam excrecentiis agere, pro scopo, hac in dissertatione habui tantum.

De excrecentiis cutaneis censui, eas esse de glandoso-carneo genere atque proinde eodem modo, cum illis hujus generis; quamvis in aliis corporis locis, tractandis extare: de *Ferru*is tamen aliisque quibuidam cutaneis ruberculis, cum diversis, ab communi, mea sit opinio atque illa meum hoc thema directè spectare non videantur, differam hrevi ex professo.

Restat (Lect. Benev.) ut enarrem, quid me moveat, quate vinculo, non verò alia methodo, hanc excrecentiam auferre constitui.

Primò; cauterio actuali posse desiccare, peruvie eam, salvo, cum inguine, abdomine, nostro, nemo, vel proposuit: nota nempe, nimum imi ventris tenetia tendinosaque dispositione, quàm ut rudiori huic exponi posset medicationi.

adò; Quare escaroticis un tantum non videatur, ratio non erat una; sed multiplex, imò; major erat excrecentia, quàm ut illi consilium, sive in totum ne-

cari posset, primum ex ipsa hac methodo toti corpori noxa induceretur & vitæ periculum. Etò; accrescente indies tumore observabam eum jam multo latius & sanguine hic & illic madere, quapropter de escaroticorum vi, hoc in casu, nulla mihi erat expectatio; addè quòd quæ supra circa fungi curationem dixi de extrudendis & solvendis continuo elidantur.

Etò; Cultro, incisione sanè ad excrecentiam nullas parebat tuò aditus; basis item excrecentiæ latior erat firmiorque inguinis cavitati inhærens, quàm ut incisione possit extripari; huic rationi adijce instantis hæmorrhagiæ periculum vestigiæque ejus, supra memorata, me retentia; vinculo itaque descripto, Deo adjuvante, opus hocce magnum perigi tuò, citò & jucundè.

Ultimò; ut probem, me verbis non inhætere & suum Antiquitati semper tribuere honorem, concedo facile *Sarcoma* esse horum morborum quasi genus & cæteras verò carneas excrecentias, ejus species, aut cæles; modò meam de curatione doctrinam & agendum methodum approbaverit peritorum calculus.

Adem illa forma, cujus stupendam Practicis historiam, mox enarraui: postquam duos electos annos, toto tumore, ablato ejusque ulcere miridissima cicatrice obducto confirmatoque, ab omni inguinis intumescencia liberata vissitasse perficissimè, per omne id temporis, sanæ; iterum me convenit, A. 1705 octò menses Martii, tantam, eodem in inguine, densandam excrecentiam, quantam nec, vel constantissimè quidem, animo, Medico-Chirurgus, sine horrore inspicere, misera potest, egena & ad incisa tedacta, protuberabat lacrymabunda, le; utpote, quæ recentet natis infantibus ab cura esse solbit, oblietis vetula consilio obtemperavisse de tumorem, ante tres septimanas, oleo oblinivisse de suam Chirurgi cupiam, compressisse firmiter; eum verò, festinatioe ea, rā violentiæ eoque cum dolore porupisse; ut peractæ imprudenti veniam simulque, incam implorare opem coegeret, utramque ei concessi facillè, tum quia miserandus omnino erat mulierculæ status, cum (ut aperit rem prodam) sic enim dicit virum honestum) quia sollicita quadam agebat debitatione, an prima excrecentia radicatis totaque de omni, ab me esset extripata? an verò quædam forsitan ejus pars relictæ atque hoc modo, aut meā incitit, aut imprudenti, recidivam (ut vocant) pateret: nam, etsi minimè homo Euripus & de peracta operatione securus, ab omni videtur parte, nunc propter rem, coram multis celebri Medici & Chirurgi præstitam & ab eorum suffragiis comprobam, tunc propter temporis intertrepidum, quā integra extiteret & quæ potest argumenta, de fonte Medico-Chirurgico, pro me militabant, tamen ipse experiri statui, hæc aut præterierit esset excrecentiæ insinuat reliquæ vestigiæque, non probè deleta, an verò novum symptoma?

Manum ergò, Lunæ 16 Martii, circiter octavam, iterum unā cum Chirurgi M. Alderker operi admovevi, quò (ut sequi exhibet figura) hanc excrecentiam, unicuique, assu Medico-Chirurgica furore & studio; quemadmodum & tuò tractationis tempore, inspicendam præbui. (Vid. Tab. V.)

Explicatio Tabula V.


A. Iguen Sinistrum.


B. B. B. *Frumentaria Ipsa De Mole Tumoris eminenter, splendentis Atque livecentes.*

C. C. C. *Sulci. Rimidi excavationesque, luridi coloris Labii & Marginibus effusa.*

D. D. *Partes superficiares, putredine corruptæ.*

Tale,





Tale, quale ad vivum depicham, protulbat foras & multo madens laice ſuſcito, ingens & durum & e monſtrum; ita ut multi, oculis, mox ſtomachabundi, ab horrendo aſpectu terrore, ad eum redierint rati.

Inſeci, quod, exercitatione precedente deſcripti pag. 100: hinc excreſcentiæ torcularium eamque, eodem; ut prædictam, excipere de tractate inſepi modo: totum inſuper, bay. rano madefactis, tumorem exornans ſplenſis & luteamini multo.

Hocce die, conſtitit ror tumoris pedunculo, potius baſi; accipiebam, ab iis, qui ægræ ab officio fuerant,

17 mō. Eam tranſegit pervigilem totam noctem, cuſi frequentiſſimis, & de dolore inſuſtituſſimo & veluti ſtammola corripiente, quæſiſ, nulla cūm tamen ſeſe manifeſtaret febris, paulo, magis coarctavi vincula: poſt meridiem cruciata deſeſſa obdormiſcere; ſed non ſine ſeſe inſepi, veſpeti vērō, omnis viſchatur ſuppreſſis dolore. ſed tamen utriſque inguini, quiniſmo & pubis regioni impuſſim *Empl. deſenſu. vīg.* ne inquinata ab effluente undique, ſtidiſſimo latice, corripeteretur: levis etenim jam nunc conſpiciebatur inflammatio; noctem ſatis egre tranſiit.

18 vō. Apparentibus veſiculis, gangræne pernunciis ægræque, de ſummo d. lotæ circa pudenda totuſque infima regione, conſequentem, omni parti, extra vincula, *ung. alb. capſuræ.* Inſeci; ex tuctore tamen cūm ægra in levia aſſimi deliquit tuctæ, præſcripti ei, quod ſequitur, cardiacum coſcalatim uſupaudam;

*℞. Ag. Meliſſi Pulv. a ʒij.
Cinnamom. ʒʒ.*

Conſol. Alherm. ʒij.

Sarcis perlar ʒb.

Syrup. Paon. ʒij.

Sal. volat. arom. ʒb.

M.

Tumore, circa meridiem, ſummiſter conſtitit, habuerat patiens ſeſe benè: febricula ſicut ſutertulente & periodica, per noctem, iſoleſta, ut Chiturgi famulus, qui excubias celebraverat vinculoque, ut erat monius, conſtrinxerat ulcerus, reſerebat.

19 mō. Elevato autem apparatu, mirabamur (multi enim huius vilitationi intererat Medici & Studioſi) tumoris, ſive excreſcentiæ admodum molem; ſuperabatur enim capitis hominis magnitudinem longè: propoſitum niſilominus præſtiti & ea, qua potui vi, conſtringere & comprimere vinculis mollius tum excreſcentiæ fontes; tamen monuerim expreſſe, toto die, non ingravoſe ſymptum ita; ſed verò.

20 mō. Hauriebam ex relatione, tum ægræ, tum ei adſtantium, eam moleſtam ſuſtinuiſſe & omni ſomno expertem noctem: ſedtem ipſe quoque detegbam liſignem, quam ſymptomaticam ſtatuebam; coarctatis itaque vinculis, exhibui: alvus enim erat adſtricta ab tribus diebus; quam ſolvete tamen; niſi conſectus volui: debilis enim & quæ vix niſcula ſcebat, viribus opus habebat miſera, circa meridiem, hanc ei inſuſionem;

℞. Fol. ſenn. mund. ʒb.

Senn. anſi ʒj.

*Emul. in ag. pur. colatur. ad ʒij.
adde*

Mann. Calatr. ʒj.

Cremor. Tartar. ʒj.

deſur. nſai.

ex qua inſtanti vespere ſemel alvum depoſuit.

Bibl. Chirug. Tom. II.

Curavi, ne excreſcentia ſicilis complicetur, & tranquilla enim nocte parum ſpectans, p. oxy-mor-ſuper febrili cum exacerſatione & ægræ de dolore volitatione, omnem me monentibus, p. uſentiam.

21 mō. Mane naratum ſuit niſil circa apparatus, ægra verò reſecta ſuſculo &c.; tamen jam in conſtavi erat ſator: ut neceſſum fuerit, odiſſima ſig. i dare timoribus: canabæ & ſintan ſine multo co- perit. ſeruebantur quippe ægræ manus ſtallo adſt- rictum & ei manus exhibentium) ca vi, ut quando- que videretur exanimis.

Circa meridiem, novum torculari eſt appoſitum vinculum, putredine conſecto tractoque alit. u; ele- vato, hæc opportunitate, tumor a. app. parit in cote creta & circulate ulcer, pure conſpectum puro & puro, omnis boni peragium; niſi (L. B.) rem ſictam enare te; non verò è lun. inquo petendis ra- tiocinationibus de ſalibz Phenomenis deſerere, mihi propoſuiſſem, habetrem hoc loco exſpandam am- pliſſimum campum. quem chemicis Philoſophantros jubco: ſub veſpetam (petiſis enim diebus ad mini- mum tæ ægram conveni) doſini-nem inſecui eam; conſemendavi itaque, ſuſculi, in quo Rat. C. C. erat coſta, et brum uſum.

22 vō. Tons grabbatus, impuro latice ſanguineo conſpurcatus erat, gangræna indies de de momento in momentum ſutente: inſcribat tumoris circum- ſerentia ſtaccetere: ulcere circuli *ung. deſenſu.* conſpecto o, redli circa piſtiam, quā paſſenſionibus, rigotibus & nauſ. a miſere niſitram vidi agita- tam: præſcripti propterea carbrietem cardiaci præſcrip- ſi uſum ſimulque, per temporis interpoſitiones (ſed ſine ſuperſeris) emulſionis & hordeacei decoſti.

23 vō. Iteratus eſt hauſus *progans*, proſp. cum ul- ceti & cæteris.

24 vō. Hoc die memoriæ dignum acceſſit niſil.

25 vō. Pendente jam nunc ex minoi pedunculo ex- creſcentia, multa mihi ſicta natæque de decido o hoc & præſcripti fruſtu; ſpes; quia autem alvus adſtricta manſerat, acui purgantis ſtimulum;

Quoniam autem ſphacelo conſectus ex parte tu- mor, ita ſatore ſuo inſellabat ægram; ut deſirio corripeteret, ei tinct. ex Aloe, Myrh. &c. Spit. vin. inſeci & (ut impoſſibilem) veſicā, qua potui ſictitate coop. cui habuitque patiens ſuccedentem noctem amicum; deponens alvum bis & commo. viderumque app. tem, quod ei eſt expoſitum ad lubitum.

26 vō. Ex lurido nigram excreſcentiam tee, hoc die, complicavi, ulceri *deſenſu*, inguini & abdo- mini inferiori *deſenſu. vīg.*; ſuperiori verò corro- boſantem hunc ſocum inſeci:

℞. Heri. Rub.

Ibidandr. a. m. ij.

Flor. alſynth. m. ʒb.

Emul. in vine Gall. colat. ad ʒij.

deſur. nſai.

ægræque hauſtum vini cum vitelli. ovar. &c. propi- navi & ut ſctinaretur rorius tumoris ab inguine ſe- paratio & ſimul relinquendi ulceris tum abſterſio, tum deſiccatio, præſcripti hoc ung.

℞. Ung. Baſilicæ. ʒv.

Fuſc. Felo. VVortz. ʒj.

ter, ſingulis diebus, applicandum.

Habuit ſeſe, toto huius diei tractu, benè, exotico- rans tum alvum, tum veſicam, ſic ſine moleſtia; quia partes tumori vicinæ, hic & alibi locorum ex- coctæ proſtabant, iis *Empl. diapalm. diſſol.* appli- cui.

I 3

Vespert

Vesperis de frigore totius femoris conqueſti eſt ægra & iterum ſuprà indigitarum cardiacum: oboriente tuſſi magnaſque, circa eſcharam, hæmorrhagia, noctem valde egit inquietam.

27mo. Præſcripſe, hoc mane, fuere contra tuſſim ex ſecbe: albe tabellulæ, biſque artiffimè coſtituta vincula: phænomenis reſpondentibus ad votum, p. æſtibus porò præſtandis, ſuccedentem noctem ullo ſine notabili ſymptomate, tranſlegit.

28vo. De ardore ſancium, difficili deglucione, alvo adſtricta & capitis dolore querelas movit: quæ omnia, circa meridiem, evanuiſce, alvo laxata, ſympromata: ſextenti tumori ſpir. vin. inſectio optimè dormivit.

29no. Mane, ut & meridiè, torculario ſemiſſimè compulſo, bis hoc die alvum exoneravit, vespereſcente tumori, quaſi de novo, præſertim ad partem verſus abdomen protuberanti impoſitum fuit ſeq. Medic.

29. *Ung. Baſilicon. 3ijj.*
Aſtercur. ſublimat. corroſiv. 3j.
M.

nullo inſigniore incommodo vexata & nocte uſa pacata.

30mo. Abſciſſo altero, novum excreſcentiæ impoſitum fuit vinculum torculariumque ab una parte novum; quoniam præ putredine iplâ tota nigredine confuſcata & imbuta compertiebatur machina; hoc autem, cum ſeriet, non levis oborta eſt hæmorrhagia, quæ tamen mox depreſſa, tum ſupis ex canna-be gypſo ornatis, tum ligaturis ad partem accommodatis in formam falſcæ.

Totus hic apparatus, ea nocte, non fuit ſolutus (etiã ægra conquerereſcebat de maximo circa inguen dolore) ob metum hæmorrhagiæ, circa meridiem immiſſum ſuppoſitorium acutum *trech. albandæ*; alvo tamen medicationi non obtemperanti, præſcriptum eſt, quod ſequitur, purgans:

29. *Reſc. Jalapp. gr. vj.*
Diagrid. gr. v.
Cramer. Tartar. 3ß.
Diſſolv. c. q. ſ. viall. ovor.
addendo
Aq. ſenical. q. ſ. pro hauſu

eiectione circa vespertam induratas & nigricantes ſæces; ſed tamen ab febre & ſancium dolore liberata fuit minimè, ita ut, ne vel momentum temporis, dormiviſſet.

31mo. Mane ligaturæ, circa meridiem, toto apparatus poſepito, ex voto ſeſe habuerunt omnia.

Primo Aprilis. Qua potuit (ſecundùm artem) vi compreſſa eſt excreſcentiæ baſis, quæ jam nunc via pollicis tranſverſi erat latitudinis: inter ægeodum cum ægra de dolore non conquereretur, necum omnem adſtantes Medici & Chirurgi iudicabant eam penitus & rotam extare emortuam; cuius eſſati veritatem demonſtravit dies poſterior:

add. Ab inferiore quippe parte, magna ſquallidaque excreſcentiæ pars, gaſtrici plane corrupta, cecidit; eo tamen cum ſanior; ut, hoc die, quæque putrefactiæ plagæ proſpiciſſe necesseſſum fuerit.

32id. Tumoris ſuperficies partu, qui dextram ſpectat ſenut, nigertiſſima apparuit, effluſque de eo ſurrentis liquidi ingens copia; hoc die & animo & corpore parienti erat debilis, natiſcabunda & metore, quaſi ſuſſocata; præſcripti ei ex vino *Rhenano, croci & pans roſto* hauſum dixerim, *an cardiacum*? qui cum ea permoſcaverat, remanebat eam; poſtquam ſudoris multum eieciſſet & media nocte, va-

gi ſermonis ſeruliſſet multum, ſomno taciſ alto fuiſſe oppreſſam:

33id. Reſectam viribus & in prandio utentem juſculo vetricino, ægram juveni, hoc die mutationis porò obſervatam eſt parum.

34id. Non probè compellens ſolum abſciſſum eſt vinculum unum, comedique bovo cum appetitu dormivique poſt meridiem, per 3, integras horas, deponens commodè alvum ægra.

Omata tum abdomen inferius, tum inguina, loco, quo excreſcentia, ulcere factò per vincula deſicebat ab continuitate, *ung. Baſilicon.* eique cum *ægrilac. novum* inſectum.

35id. Stricteſſimè; quin imò, ut ulterius non potuerit, conſerto vinculo, conqueſta eſt ægra de rigōribus & totius corporis tremore; febris tamen cum vel via adeſſet; tem in vado meque in portu navigare colligi.

7mo. Hæceſcere in totum tumor cepit &

8vo. Pendulus eſt vius; ut cum reliqui, qui

9no. Totus de inguine cecidit, relicto æquali & robicante ulcere; ſed o! non evanidam artis Chirurgicalis fiduciam! certitudinem & ab utroque propoſito demonſtrationem! vidimus etenim Medici, Chirurgi, Studioſi omnes, omnem, totam, integram hanc, de novo, elevatam & lauriantem excreſcentiam exiſpiram priorique ablata albidam, contractam, conſtitutam elatricem.

Nunc à poſteriore conſentiebant omnes, unamquamque inguinalium glandularum, eodem poſſe laborare ex vitio, neque hanc excreſcentiam fuiſſe præteritæ ablatæ veſtigium, recidivam, vel, eodem de pedunculo, non tieſ depreſſam eradicaſſamque luxuriam;

Sed ne vel aliquid detrimenti ægra, ars Medico-Chirurgica, aut poſſetitas ab præoci hac mea ſollicita & aſſertione caperet, etiaſ ſolummodò, ab

xmo. Uſque in

ximum, Huius menſis diem, ulcus per ſe madens puro & ſufficiente liquido, carpto; poſtea verò illi adhibui *ung. Baſilicon. cum Præcipi: Rubi*; quibus etiaſ paratè abſolutique, minime ſeſſidando, illud elatitæ, priore non deformiore eique à latere, fuiſſe obductum conſolidatamque egregie.

Qui huiſ æſti ab initio uſque ab ſinem, extra omnem lucri ſpem, intereſſe non deſiderant hincque Laude, non mediocri, ab me artiſque noſtræ ſautoribus celebrandi veniunt, fuerant, Claſſiſ Docti Med: *Mylſius & van Heeren.*

Halleus Claſſiſ. Domineus Bidino. Nos in Noſocho-miò quod hic Genevæ in gratiam Gallorum pro religioſo proſagorum præcipue erectum eſt, in virgine triginta præter propter annos natâ, menſe Junio anni 1717. manibus ſolertiſſimi Chirurgi Dom. *Grenier*, filiſ, excreſcentiam amputavimus, ſeu potiùs incilio-ne à ſuperioribus ad inferiora, & utrinque regumē-tis excorticatis, ſeparavimus, atque ejus radices pollicem circiter craſſas & imæ ſcapulæ adnexas, ſiſt tranſiſio utrinque ita colligavimus eâ fortunâ ut breviter exciderent, & grande admodum vulnus pro ejusmodi extirpatione factum, intra ſex ſeptimanas occluſum ac cicatritatum probè ſuſcit: Excreſcentia autem illa tota carne, vatitſ eminentiſ protuberans, ac maximam doſi partem occupans, parum dolens, niſi à paucis diebus ex quò lividiſcula evaſerat, libras medicas pendebat decem. Torò autem contractionis tempore, quod omnino mitum, nullâ febris exorta eſt.

EXOMPHALOS vid. HERNIA.
EXOSTOSIS Vid. OSSIUM MORBI.
EXTIRPATIO MEMBRI Vid. sub nuntio
GANGRÆNA.

Finis Libri Quinti.

BIBLIOTHECÆ CHIRURGICÆ

LIBER SEXTVS.

*De Affectibus & Operationibus Chirurgicis
à Lieta F. incipientibus.*

FASCIÆ & FASCIATIO

Tractatum habemus eximium apud Hippocratem super Deligationibus, Fasciis, Sutaris &c. in Libro de Medicis Officiis, cum fuso Galeni in eundem Commentariis, adjectis etiam Tabulis prelegantibus decem, in Editione Operum Hippocratis & Galeni Parisiis, Chretienis, illa omnia quam concinne exprimuntur. Verum ab his hic inferendis jam abstinemus, ut & ab aliis omnibus generalibus in eadem materia dissertationibus, quia fasciationum varis ac speciales methodi abunde demonstratæ reperientur, in vastatum Operationum Chirurgicarum super Corpore Humano exercendum descriptione: Ut & iidem quidam ex iis in Tabulis XVI. XVII. quæ sub titulo *Instrumenta Chirurgica*, afficiantur.

FAVI Vid. *Crysa Lattea*

FERULÆ.

Quandoquidem nostris hoc tempore deficit copia ferularum Hippocrati propriè sic dictarum, Chirurgi utuntur laminis è ligno factis, è quò sunt vaginæ ensium, vulgo assulas vocant, quas stupæ obvolvunt. Alii uruntur chartæ, seu papyro crassissimâ: Alii ligneis frustulis, digitum crassis. Horum usus est, non solum immobile, sed etiam rectum tenere membrum; quod optimè præstant ferulæ; quæ cum levissimæ sint, non premunt, nec inflammationem movent; quatenus verò sunt rigidissimæ rectum servant membrum. Assula faciliè incurvae, ut & charta illa crassissima, oleo præsentem, aut vinò madefacta: Ligna autem crassiora valde premunt, & movent inflammationem. His utebatur Hippocrates, demum post septimum; quia ante septimum magis utebatur intento accendæ inflammationis, quàm intento stabilendi fracturam: Post septimum autem contrà accidit. Hieronimus Fabricius ab Aquapendente.

FIBULA.

De fibulâ ejusque usû, hæc, habet Hieronimus Fabricius ab Aquapendente. Fibula est instrumentum quò constringitur id quod separatum

est. De harum materiâ, & figurâ autem discrepant. Oribasius enim cap. 4. lib. de machinis, ait fibulas fieri ex ære, autò, ferro, & habere formam circuli. Guido fibulas appellat hamos, qui debeant esse parvi, pro ratione membri, & ab utraque parte curvari, ut labrò, utrinque infingantur. At tales auleos pungentes infingere in ipsâ carne, & nervosis partibus est pessimum: Unde hæc sententia falsa est, maxime quia hamus postea latus esse vulnus permittunt. Fallopius voluit fibulas esse primam suture speciem, in quâ filum absconditur, & quæ communiter in vulneribus utitur, & hoc potissimum colligit ex eò, quòd Celsus ait fibulam fieri ex acia molli; ubi Fallopius per aciam intelligit filum, quod nobis vulgò æzza dicitur. At contra hanc sententiam multa afferri possunt. Primum enim acia nusquam in lingua latinâ invenitur, nisi hoc locò apud Celsum, & proinde non potest probari quòd acia latinis significet filum. Secundò, in editionibus nonnullis pro *æza* legitur. *acæ*. Tertiò dicit Celsus, quod fibule ferè vulnus latus esse præstantur: at fibula quæ sit cum filò, secundum Fallopium labia vulneris valde adstringit. Quartò apud nullum probatur, auctorem materiâ fibularum esse filum, sed æs, ferum, autum, lignum: Unde Celsus cap. 25. lib. 7. agens de ratione infibulandi, ait exemptò filò fibula additur; ac proinde patet fibulam non esse è filò. Quindò modus loquendi ipsius Galeni, & Celsi, quando mentionem faciunt fibularum, talis est, ut per fibulam nullò modò filum intelligi queat: dicunt enim, additis, impositis, injectis, superdatiis fibulis: quæ filò non competunt. His ergò rationibus olim adductas, fibulam circuli non fieri ex filò, sed ex ære, aut materiâ ferrea, non quidem è materiâ durâ, quæ in vulneribus infingeretur, ut Guido sentit, sed molliore, quæ infingeretur per utrumque labium, & deinde interqueretur. Postmodum verò melius rem considerans, inveni opinionem Fallopii esse verissimam. Nam primum Celsus fibulam, & suturam simul dicit fieri ex acia molli, non nimis torrà, ubi dictio illa, non nimis torrà, nullò modò acui potest competere, sed filò, quod duplicatum sumitur, & interqueritur, non tamen nimis, ne evadat durum & inaequale. Præterea, si illa dictio, ex acia, intelligeretur, ex acû, nihil faceret ad rem: Sicut enim sutura non fit ex acû, sed è filò, ita & fibula. Modus etiam loquendi ipsius Celsi, cum dicit inficiendam esse fibulam, valde respondet illi loco, cum dicit, injectum vinculum mordet. Licet autem quædam fibule alias fierent è ferro, autò, & materiâ, in vulneribus tamen nihil prohibet, quin è filò fiant: Pro diversò enim usû, & materiâ, & figura variari potest. Hæc Aquapendens in *Pentateucho*; cum quibus tamen non immo cunctis in *Appendice ad lib. de Vulneribus*, ut & in *lib. de Operat. Chirurg.* ubi cum de operatione in labiis leporinis ac divisi exercendâ agi, fibulam facit ex fili quidem, sed circum acus per labii partes utrinque transmissas contineri.

FICUS.

De Ficò, ac ejus curâ sic specialissime scribit Hieronimus Fabricius ab Aquapendente. Ficus ita dictus est propter similitudinem cum fibulâ

fructu; quæ similitudo in tribus spectatur; vel quia habet pediculum tenuem, vel quia continet in se grana similia illis quæ continentur in ficu; vel quia à hîc curatur. Ficus autem vel in capite, vel in aliis corporis partibus viget. De secundò non agemus, quia hic est valde exiguus, qui actionem ferè nullam hêdit, etque faccidus, & curatur forciçe præcisò pediculò, aut fericò constrictò, ut mortuus decidat. De primò hic est scimus, qui est tumor capitis, ex quo tupto, sanies exit similis granis ficuum. Auctores aciem non concordant de ejus natura & loco proprio; dum alii ulcus esse dicunt, alii tumorem. Est etenim ulcerosa eruptio, subdura, rubens, cum dolore, secundum Paulum; àst Hippocrati tumoribus annoveratur. Ficus igitur est tumor, qui facillè degenerat in ulcus, ex Galenò 5. de Medic. per loc. cap. 4. Sed dubium restat de loco; dum alii hunc tumorem capitis proprium dicunt; alii, ut Hippocr. palpebrarum, & oculorum; alii, ut Galenus, menti; alii, or. Celsus, partem barbae, partem capillorum. Est autem tumor maximè in capite, & puerorum præsertim, qui eodem etiam excitatur in aliis corporis partibus, ex Aërio lib. 8. cap. 14. Tumor ergo tubens est, rotundus, subdurus; ex quo sanies exit similia semini ficuum, ubiçunque sit. Fit autem ficus ex humoribus mistis, sanguine scilicet crasso, pituita, & ferofitate, quia est tumor rubens, rotundus, in capite, qui citò, non citè curatur, exulceratur, propter ferofitatem pituitæ admixtam; illa enim facillè cutem erodit. Differt fici à Phyraciò; quia hoc est tuberculum acutum, subalbidum, non dolens; ille verò tumor est majus, rotundus, rubens, dolens, ex quo exit sanies coarctata, propter copiosam ferofitatem quæ prohibet quæ minus crassa materia à calore concoquatur, unde fit ut conglobetur.

In curatione fici, prohibenda exulceratio, quia migraret in alium morbum qui longior est: Exulceratur autem fici si non citè curatur. Curatione autem quæ illam exulcerationem prohibet est, quæ purgat totum corpus, ut pilule colicæ, decoctum salis parillæ cum sudore, ad evacuandam ferofitatem; quod fit etiam per curationem csplæ: Dura pars affecta verò fici emollienda; aliàs discussioe et evacuationibus utendum. Itaque hæc sunt indicationes, ac prohibetur suppuratio in pueris, ut missilòis contusio, cum paulò sale impolitò; aqua sulphuris, & salis per spongiæ impolitæ; aqua marina; & muris appolitæ; fici decoctæ in aquâ & emplastris modo impolitæ. In durioribus corporibus, valeor calchanti misti, aluminis, glomeris, partes æquales, squamæ æris duplum, gluten in aceto modicò diluatur, & cum reliquis imponatur. s. lihangy. 3iv. sal. fossil. 3ij. thoris 3ijj. sandarach 3j. terantur, imponantur. Si exulceretur, adhibendum ceratrum citrinum, elsterium tritum, lini semen tritum, cum aquâ impolitum. Item detergendum est fici exulceratus, pulpâ fici mellis admixtâ; item curatò tripharmacò. Convenit etiam unguentum citrinum linamentis obductum.

FISTULA

De Fistulis *Pelluris, Abdominis*, aliarumque partium, vide Caput de Ulceribus ubi hæc pertractabuntur. Hic tantum de iis quibusdam in specie ex Clar. Petro de Marchetti ac Theodoro de Mayenne; aliisque.

De fistularum Ani Differentiis.

Licet non me lætaret, ab omnibus auctoribus curationem fistularum ani proponi, cum tamen diversi sint à me modo, & ordine eas explicandi, ac curandi, ideo decrevi eum in medium afferre, quo sæpe felicissimo successu has sanavi, à differentiis ipsarum exoritur.

Aliæ itaque fistulae sunt prope anum, non tamen pervenientes ad ejus orificium; nonnullæ ad ipsam pertingunt, & serpunt exterius supra intestinum, quod tamen non perforant; quædam verò ipsum percutiunt; alia quædam in externo muscululo sphinctere; alia ad partem ultime ejus mediam; quædam prope eundem externum superius, vel etiam ultra, superiori tamen parte; alique inter utramque tunicam intestini recti sursum tendunt, modo ad medium sphincterem, modo ulterius; earum item quædam aliquando ad venaem dissecunt, quæ sunt species fistularum ani, & intestini recti à me oblectatae. Præterquam quod aliæ uno tantum sinu, aliæ pluribus percurrant; quædam tortuose, quæ differentie accurate recensendæ fuerunt, usque ad earum curationem apprime necessariæ.

De Causis Fistularum Ani, & Intestini Recti.

Causæ harum fistularum aliæ sunt externæ, aliæ internæ. Externæ, vulnera, in altera degenerantia, atque hæc in fistulas; conuisiones ex equitatione, ex lapsu, vel aliqua hujusmodi causa anum contudente, ejus ratione oriuntur abscessus; quæ conuisiones, prope anum potissimum, ex pure in his conuulsio, perforant absque dobio intestinum, quæ si longius ab ano recedant, illud non læsant, sed tantummodo carnem, supra quam exterius serpunt.

Causæ verò internæ fistularum ani, & intestini recti sunt humores, hæmorrhoides, exulceratio.

Hæmorrhoides siquidem, ratione doloris sanguinem attrahunt, subito postmodum tumore, qui in sinum, tandem in fistulam defecit. Ab excoriatione verò intestini recti laboriuntur, dum ab aliqua materia biliosa, mordaci, vel virulenta, ex Luce potissimum Venerea exulceratur, atque sensim excavato ulcere ab eadem in eo congesta, & diutius hærente, paulatim perfoditur; atque materia inter partes musculosas collecta, progressu temporis subditur tumor in partibus externis ani, qui discupitur in fistulam fauces, quæ tum partes ejusdem musculosas externas percutit.

Ab humoribus quinetiam heterogeneis aliquando ad intestinum confluentibus, & musculum sphincterem perforantibus, abscessus, & fistulae suboriuntur, ratione superius allata.

Atque hæc sunt causæ, & modus generationis fistularum ani, & intestini recti. Ad signa modò progrediamur.

Signa Fistularum Ani, & Intestini Recti.

Si faciat fistula in partibus externis prope anum; quæ tamen musculum sphincterem non perforaverit, id specillo patebit, prout si penetraverit in intestinum; introito siquidem digito oleo lauto in anum, specillum nudum illi occurret.

Dignoscuntur

Dignoscuntur fistulæ inter utramque tunicam intestini, immisso specillo, si digito non fuerit obvium; sed membrana ipsius intestini rectum. Observandum verò, quod specillo immisso, totam longitudinem fistulæ deprehendimus, quo non perringit digitus in anum immisso. An verò eadem fistula perforet intestinum rectum in musculo sphinctere, vel supra eundem, hoc prodit signum; si quidem si digitus in anum intrusi apertæ ab eodem non constringitur, sed in loco veluti vacuo hæretæ sentitur; quo stylus quintæ in fistulam demissus pervadat ad extremum usque digitum, in illud scilicet cavum, fistulam perforatæ intestinum supra musculum indicio fuerit, cuius intestini perforati signo ab omnibus proposito, accedant statim, male olentes scilicet ex fistula erumpentes, aut faeces.

Utrum verò fistula fuerit in principio musculi sphincteris, medio, vel fine perbellæ pariet digito, & specillo, ut supra observavimus. Quando verò ad vesicam tendunt fistulæ, sicut id nobis demonstrat, oculis siquidem ipsi id pariet specillo in locum vesicæ demisso: si verò vesicam pertrahant, copiosa effluit urina, atque aut per totum viæ curiculum laborant, aut misere paucis post diebus ægri moriuntur, si fistula valde dilatetur. Ex hæc quoad signa, in quibus Medico-Chirurgus multum accuratus desideratur, in his potissimum, quæ musculum, & intestinum perforatum proiungit.

De Fistularum Ani Prognosi.

Omnes fistulæ superius descriptæ à perito Medico sunt sanabiles; prout, omni ambitione p oculi, felicissimo successu eorum quamplures, imo facientis perfectæ sanavi, methodo inferius proponenda: quantum in his quædam facilius, quædam difficilius; & quidem ægre admodum sanantur, quæ scilicet supra sphincterem musculum intestinum perforant; ut quæ à Luc Gallica subortæ. Facilius verò, & brevi tempore, quæ in orificio ani; & minus facile, quæ in medio musculi, ut & quæ intestinum perforant supra musculum, quippe difficillime istæ, nec nisi longo tempore admittunt sanationem.

Majori autem difficultate, si symptoma aliquod grave eisdem accesserit, utpote inflammata hæmorrhoides, atque proxiimus illis suboritur abscessus, dolor gravis papis afficit, ut & callus annulus, ac durus admodum, quæ symptomata licet diutius protrahant eorum sanationem, non verò eam prohibent omnino; quin potius his sublati, facilius eadem coneligit.

Dubium verò apud auctores, utrum ani fistulæ oculis debeant, quibusdam id omnino negantibus, utpote quæ insaniabiles, ipsorum sententia, qui hæc curandi viam ignorant; quibus testagatur, cetero omnes debere, ac posse sanari, his exceptis, quo casu evadendum, an fistulæ post cachexiam sint obortæ, an verò fistulas cachexia exasperit: si enim fistulæ cachexia succedunt, tunc non sunt sanandæ, nisi prius sublata viscerum omnium intemperie, & ad laudabilem redacta: quæ verò cachexiam præcedunt, omnino obducendæ.

Quod verò ex fistulis induci possit cachexia habens, facile est probare; sanguis siquidem, dum circulationem partem à fistulis corruptam, ac proinde inquinatam aluit, pravam nescio quam suscipit qualitatem, quam visceribus postmodum imperit, ac cachexiam inferit dispositionem, vel saltem, non concessa circulatione, sanguinis terri vapores, elevati à parte fistulosa pure obita sanguinem contaminant, unde vizata nutritione oritur cachexia.

Quod verò aliqui obijciunt, quo scilicet purulenta illa materia, quæ continuè ex fistula effluat, erumpat, eadem sanata; hæc certe, inquit, testatur, & corruptam necesse est recutere, atque alias partes labefactare; ut propterea pessimum consilio fistularum ani sanatio tendenda sit. Respondemus, multum cacandum sanatione; siqui detrimentum; siquidem prout natura singulis corporis partibus proprium alimentum largitur, ita paræ fistula laboranti, cui tamen puriæ cum sanguis laudabilis licet, accedit, corrumpitur, & in pus convertitur; qui præterea est expurgandus, unde sanati filio à, alimentum illius partis non corumpitur amplius; quinimo alimentalis substantiæ particeps in eam faciet, ut non sit opus materiam illam reflucte ad partes sanas, atque iparum temperiem corrumpere; ut propterea fistulæ ani, & intestini recti possint nullo egrotorum periculo sanari, ut sepius observavi. præmissa ratione totius corporis cura, expurgantibus materiam morbosam, & viscerum naturam temperiem redintegrantibus; atque quo omnis prioris timor abieciatur refluxus, fomiculo fomiculo deatto iuvandus, expurgandus quovis excrementis.

Cutandæ verò fistulæ ani, periculo gravioris mali, ex puris effluxu, ut sepius sic, cohibito, quod acutus, & calidus in variis sinus se diffundit, periculo intestino, & amplius ulceribus productis, ex quibus quamplures moriuntur; prout exacto biennio accitio illustrissimo, & Excellentissimo Malip. ro D. Marcel Procuratori, non admittit sectione fistulæ ani, quod & in secentis aliis observavi; ad quamvis potius curationem me accingo.

De Fistularum Ani, & Intestini Recti Curatione.

Curatio fistularum duplex est; alia universalis & causæ, alia particularis ipsi morbo dicata. Universalem quod spectat, si viscera parientis fuerint bene constituta, ut patet ex incolupta valetudine totius corporis, abunde erit corpus expurgare lenientibus, præparantibus, & purgantibus, levioribus tamen, nillo sanguine, si opus fuerit, ex brachio, vel pede, quamquam aliqui abhorreant à medicamentis; quibus quidem non refragatur, præsentè optima corporis constitutione, quæ prædictis multis curavi, non expurgato corpore, felici successu, & absque ullo futuri morbi periculo. Quod si patiens fuerit mali habitus, & cachymicus, purgandus primò semel, & iterum, fluxioni accendæ, ac tollendæ; tum propinandum decoctum ex ligno Guajaco, silis parilla, aliisque medicamentis, pro ægri temperamento præsentè siquidem cachexia, raro admodum ea toto sanantur fistulæ, nisi sublata viscerum intemperie, iisdemque corroboratis. Quoad curationem topicam, multiplex ea est, pro varietate, & differentis fistularum; Fistulæ quippe prope anum, quæ non perringunt ad ipsius ostium, facillimè sanantur, non tamen absque sectione, & quidem si rectæ, non sepius repetita, si sinuosa, pluribus.

Primò igitur foramen fistulæ dilalandum tarandis, imbutis aliquo proprio medicamento, unguento scilicet ex betonica, matriisylva, & huiusmodi; ac quorundem eadem crassiores immittendæ, donec foramen fistulæ satis amplius admittat scissellum ad sectionem; quod si aliquando non sufficiens, aliæ adhibendæ ex radice genisæ, aut medullâ sargi, vel spongia filo contractâ; satis verò dilatato foramine, demittendus cutrellus rectus, ab Aquapendente delineatus in instrumentis Chirurgicis, atque faciendæ unica sectio ad fundum usque ipsius fistulæ; postmodum

postmodum imponendi globuli imbuti ovi albami-
ne, ad prohibendam inflammationem, superinjectis
stipis in eodem madefactis; quibus postea die re-
motis, diligenter stylo inquitendi alii sinus, qui dilatandi,
atque secandi modo jam dictorum refrigerantia applican-
da, atque supra fistulam primo sectam adhibendum di-
gestivum. Quia verò sepius, illi tollendo ex uls etis ve-
xide actis, vel precipitatum inspersum; cavendo tamen
ne hæc corrosiva contingant labia vulneris, metu do-
loris gravioris. Quibus frustra adhibitis, deveniendum
ad ignem actualem; quamquam observaverim aliquan-
do callum sublatum solo digestivo; quod licet alicui
fortan novum, & præter rem videri possit, sepius
tamen experientis mihi est compertum, potissimum
verò in muliere quadam laborante antiqua fistula,
perforante ambus nates, per ossis coxendicis foramen
na, quæ clauduntur à musculus obstruendis extre-
mita, quæ callo obduraverat admodum duro, ad crassi-
tatem medi digiti, quam curavi amplis ntrinque sec-
tionibus, ad ossa usque; postmodum applicato
digestivo, concoctionis causa, quibus callus mollior
factus, levi negotio abscissit, infert coricis arboris
spatio quinque mensium, perfectæ adeo muliere sana-
ta, atque multis post annis incolumi.

Consumpto verò callo, deterfque vulnere, caro
generanda, non quidem unguentis sarcoticis, utpote
humidioribus, sed siccis, de tuthia vel Iodis; atque
ita globulis his imbutis valus implendum, ut caro
è fundo succrescat, priusquam illi imminuantur; nec-
non supra eisdem applicandum ceratum de chalciti-
de vel de cerusa, aut de gratia Dei; vel, hyemali
potissimum tempore, Barbarum.

Producta æqualiter carne, inducenda cicatrix non
pulveribus, nec filamentis atidis, quibus labia vulne-
ris callosa evadunt, & cicatrix non ita facile obdu-
citur, sed eorum loco, medicamentis potentia sicca,
actu verò humidi, prout superaddita unguenta, Iodis,
de tuthia, de plumbo, & similia, quibus dura, ac soli-
da evadet cicatrix, quæ difficillius deficit.

Quia verò quandoque succrescit caro, quæ remora-
tur cicatricem, atterenda hæc lumine usfo, præcipi-
tato, & similibus. Atque hæc de curatione primæ dis-
tinctionis fistularum.

Aliæ verò fistulæ, quæ ad officium ani pertin-
gunt, & serpunt externis supra intestinum rectum,
non tamen ipsum perforant, non ita facile sanantur,
ob copiosas humiditates, quæ ab intestinis continud
defluunt. Hæc tamen, prout in aliis diximus, sunt di-
latandæ, & secandæ; nullo quippe alio præsidio sanantur.

Hic oritur dubium, an sectio sit facienda in interna,
an externa parte; si enim externa longior videtur futura,
ac nimis profunda, non levi sane periculo sit, ratione
magnæ sectionis; si interna, voluerantur sanæ partes.
Id tamen solvitur, quod scilicet sectio internæ partis
sit præferenda; quia fistulæ, quæ serpunt secundum
intestinum rectum, quamvis ipsum non perforant,
nunquam possint consolidari nisi ipso quinetiam sec-
to; nec absque ratione, cum heterogeneæ substan-
tiæ sint, intestinum, & caro circumposita, quæ proin-
de non potest adglutinari, nisi carnes substantiæ ope,
quod per sectionem curandum.

Quod verò caro intestino coalescere non possit,
causa est humiditas ichorosa, quæ ab ejus membra-
nis effluit, humidat carnem ipsam, impeditque quo-
minus possit agglutinari; ut propere non sit omni-
no metuenda musculi sphincteris, & intestini recti se-
ctio; hæc tamen cautione ut musculus non totus se-
cetur, ne facies involuntariè excernat.

Facta sectione, omnia præstanda superius præcipi-
ta; hoc solum excepto, ut digestivi loco, utamur unguento
ex Beronica, v.l de matrisylla aliquot dies; adhibitis
deinde resicantibus paulo validioribus, coercenda in-
perflua humiditati, atque solidiori carni in fundo fistu-
læ producenda; oppleta verò fistula carne firma lauda-
bili, obducenda cicatrix modo supra dicto; quæ tamen
mollior sit, non dura, quo musculus perfecte constri-
gi possit; hæc siquidem aliquando dura adeo evadit,
ut ille satis non possit coarctari, non sine involuntari
fecum excretionem, cujus causa impetrit sectionem mus-
culi à Medico, factam calumniantur.

Quod si contingat callum durum produci, emol-
liendus erit aqua forti, vel spiritu vitrioli, præter
infectus in aquis nostris thermalibus, apprimè utiles,
quarum vis non solum callos emolliendi, sed etiam
simul & fenel mistic corroborandi parva lesas; in
quam rem prospera vitanda olea, Unguenta, & ce-
rata, quippe quæ laxando, reddunt partes fluxioni ob-
noxias; & callo nonnisi tardius producendo opportuna.

Succedit modò curationi fistularum, quæ intestinum
perforant, sive in externa musculi sphincteris, sive me-
dia, sive suprema ejusdem parte; quæ tamen loci diversi-
tas non mutat curationem, sed solummodo ejusdem
tempus; extremi quippe musculi fistulæ citius sanantur,
medii verò, vel interni, tardius, præter præfatas
sectiones, quibus ad perfectam eorumdem sanationem
opus est; quæ, prout alia omnia, primum dilatandæ
tutandis accommodatis, mox secandæ, idque duplici
ratione, vel syngotomo, vel filo setico, aut seta equina.
Utique longa, patientibus setum reformidantibus;
licet hæc sectio longa sit, & dolne molestia; frequentius
verò syngotomo, quia citius, & minui dolore ope-
ratio perficitur.

Facta fistulæ, alterius modò supra dictò pro-
cedendum, caventque ex sectione oppleta, globulis
imbutis ovi albamine. Notandum tamen, quod hæc
fistulæ plures possunt globulos, ut sectio patens sit,
ne coalescente demò intestino, quod facile sit, par-
tibus circumpositis, fistula eodem statu, quod antea
viget. Facta cōctione, potius unguentū ex Beronica,
cum digestivo, atque opitū purè apparet, pro-
ducenda caro, non quidem ut alium vulnecum,
ratione superius allata, Unguentis de Petronica, vel de
matrisylla, quibus, ob æqualem humiditatem laxa
sit, & molli, in parte potissimum humidiori, sed ad-
hibitis filamentis siccis, pulveribus tuthie præparare,
etere sigillatæ, cornu cervi ulis, plumbi, & hujusmo-
di medicamentis actū, & potentia sicca inspersis, quin-
tariam firma obducitur.

Quod si musculi sphincteris multum sit abscissum
contraria instituenda curatione, unguentis nampe actu
humidis, non verò siccis ne cicatrix sit sum docui,
durius, & solidior evadat, quæ prohibeat contractio-
nem ipsius musculi, cum secum involvitur extrū.

Modum verò quod attinet curandi fistulas, quæ
intestinum perforant ultra ipsum musculum sphin-
cterem, superiorem partem, quamquam insaniabiles à mul-
tis habentur, nisi totò musculi sphincteris perfectò, ex
quò involuntaria fecum excretio; eas tamen sapient
sanavi summā felicitate, citra illud incommodum,
facta congrua dilatactione, prout in aliis omnibus præ-
scriptum; musculus siquidem sphincter eoque se-
candus, ut aliqua ipsius pars, verbi gratia, ad lari-
tudinem annuli, integra superie, ac intus, quæ suo
fungatur officio.

Facta sectione, superflua fistula erit inveniendi, in cal-
lus tollitur, cujus sublati crassa buyro, vel digestivo,
implenda cavitatis globulis, imbutis unguento de tuthia;
hæc observatio, ne immutuantur illi donec proba caro
æqualiter generetur, & cavitatis oppleatur.

Quia verò plurimū accidit, ut propter redundantem humiditatem parvis generetur caro fungosa, & mollis huic abluenda, valet Unguentum lūdis, cum unguento de turtia æqualiter mixtum, usque dum caro viliis producta fuerit, cicatrice postmodum obducta.

Succedunt modo fistule, quæ serpunt inter utramque tunicam intestini recti, & superius tendunt, modo ultra latitudinem sphincteris, modo infra; quæ tamen raro callosæ sunt, ut ego ob erravi, propter affluentem humiditatem intestinum, & membranas continuo alluentes, quæ proinde itatis sunt dilatandæ turundis ex panno lino confectis, viratis illis ex medulla fœrgi, radice gentianæ, & spongia præparata, quæ plus facit dilatando, læcerant membranas intestinorum; quib. abunde dilatatis, secandæ illæ sunt secundum longitudinem, absque ullo metu læsionis musculi sphincteris; ad internam vero faciendâ est sectio.

Dum verò secantur, immittenda intra anum cannula rotunda, altero extremo clausa, altero videlicet, si fissura patefacta, in cuius medio lana mollis, vel gossypium lateat, ne acies scalpelli hebetetur; cuius cannule usus est, ut secta fistula, excipiat gladiolum, illatis proinde intestini partibus oppositis.

Curantur facili istæ fistule scæz obductæ cicatrice, injectionibus exsiccantibus, bis quotidie infusis, nec non iniectionibus imbutis unguento ex turtia, atque pulveribus ipsius exsiccantibus.

Facta sectione, statim iudenda turunda longa ad fundum usque sectionis pertingens, illa ovi albumine, cum bolo armena odonali conquisito, postero die ad detractionem, impicienda aqua hordei, cum melle rosaceo, & super turundum, inspergendi pulveres ex bolo armena, terra argillata, cornu cervi usito; tum ad exsiccatum, tum ad additendum. Notandum verò, quod his fistulis nunquam digressum adhibendum, ne tennes membranas intestini curam-pantur. Transcitis quænot, aut quæque diebus, parandæ injectiones ex aquis thermalibus moxitis ægrotorum; vel hatum liopai, atrichialibus ex virgolo, nitro, sale, alumine, cum aqua communis, immixta semper intranda linba. x pilus unguento ex turtia; deinde pulveribus exsiccantibus jam dictis; quibus remediis obduccenda cicatrix, quæ durior licet, & callosa, ne nigram tamen impedit constitutionem musculi sphincteris; quinimo si mollior foret, brevi resolveretur de novo ab humiditate continui partem illam alluente.

Supercæsi curatio fistularum ad vesicam serpentium, quæ differunt: quædam enim perveniunt ad eius colum; & quædam aut iuxta eam exoritur, vel mediam, vel finem, nec ipsam petrosa. si alæ ipsum percutiunt in ejusdem exortu, aut medio, aut circa finem, qua vesica anteceditur for cervicali.

De priusdictis actum in tractatu de fistulis uteritæ de aliis non est differendum, cum omnino sint insanabili, & solo prognostico relinquenda, ne infametur præsidia, max multis fuisse saluti, ex Celso, ut proinde curam sola curatio docenda superest, quæ perveniunt ad cervicem vesicæ, ipsam tamen non perforant, in quibus maiori dilatactione opus est, quam in superius propositis, in quam rem, ex usu sunt turundæ ex spongia comota, & compressa, radice gentianæ, medulla fœrgi, vel sambuci; atque diluata fistula, faciendâ sectio, non quidem scalpello, sed gladiolo in hunc usum parato, admodum recurvo, dorso laevi, ne lædatur collum vesicæ, acuta acie, quod parte illud investientes sint membranosa, quæ difficulter secantur. Si sint plures sinus, propt. plurimum sic pluribus quinque-tiam sectionibus patefaciendi, illa semper cervicæ, ne

Medico infamia innotetur; turpe quippe, ac scurrum foret, urinam per aliam partem effluere, quam naturalē. Facta sectione, callus removendus, tum absolvenda curatio modo jam proposita in aliis fistulis, à quibus istæ non differunt, nisi ratione situs. Obviandum tamen Medico, ut statim ad fistulam ani curatorem, se accingat, nisi tenente ægro; suppressa siquidem, ut lape sit, periculenta materia, vari sinus excavantur, unde progressu temporis fistula in plures diffunditur, ex qua materia suppressa suboritur aliquando abscessus, non sine magno dolore, & febre laevi gravi.

Quod si fistula fuerit amplæ, deducant totum corpus in cachexiam; sanguis quippe, dum circulatori motu movetur, & partem astrictam premat, suscipit nescio quam malam qualitatē, & inquinatur, atque à parte fistula excavata elevarunt vapores putridi, qui labefcunt viscera naturalia & vitalia.

Fistule verò, quæ perforant intestinum, ideo statim sunt curandæ, quæ ægri plurimum laborant tenismo, & frequenti deiectionis cupiditate, cum doloribus in excitatione rectum; & quod gravias, cum pars affecta pute semper redundet, accidit sepius, ut in ulceris phagedæna facessant; quod sequebatur obsequi.

De Symptomatibus supervenientibus curationi Fistularum ani, & Intestini Recti.

Precipua symptomata, quæ in fistulis ani ad se trahunt curationem, sunt, sanguinis fluxus, inflammatiō, vehementis dolor, & hæmorrhoides. Dolor sedandus anodynis, ut oleo an ygdalarum dulcium, violarum, chamæmelino, lacte, butyro loro aqua rosacea, & hujusmodi.

Aliquando insignis suboritur inflammatio, præsertim ex sectione, si fuerit magna, ratione scilicet doloris attractis humoribus; tunc vero applicanda repellentia, ut ovi albumen, succus plantaginis, portulacæ, polygoni, myrtillorum; atque si dolor, & ardor urgent, educendus sanguis e venis superioribus, revulsiois causâ, ad partes longinquas.

Tument vero sepiissime hæmorrhoides, sectione potissimum, & applicatione medicamentorum acrimia irritatæ, hinc acuti dolores, qui curationem trahunt, quibus ex usu est lintum in lacte tepido expectillum, & applicillum, necnon ossa panis lacte vaccino imbuta, & appodita; propt. optimum unguentum rosaceum; cum casu conveniunt quincetiam stupescientia, leviora tamen, ut nunguentum populeum, vel santalinum, cum portuincula opii. Nullum verò præstantius remedium sectione venæ brachii, i. ratione revulsiois; postmodum ex pede, derivandi causâ, ratione morbi, & virium.

Ultimum symptomata est sanguinis profluvium; secantur quippe aliquando rami venarum hæmorrhoidaliū, qui statim sanguinem magno impetu effundunt; qui proinde omni ope sistendus, cum in eo vita consistat; applicandum propterea gossypium usum, cum pulveribus adstringentibus; necnon stupæ imbutæ ovi albumine, parte manu opprime compressa per aliquod tempus, donec coarctetur; quo apparatu utendum duos, aut tres dies, quousque sponte à pute allente desinat. Quibus verò instituta est aliqua sectio, vel hæmorrhoides fluxus, intestus ex aquis thermalibus non sunt administrandi, utpote qui facultate quadam fluxum sanguinis denuo excitant, quorundam chirurgorum gravissimo errore, qui illis utuntur.

*De Observandis in curatione Fistularum Ani
& Intestini Recti.*

Perperam existimant multi Pseudo-Medici, se sanare posse fistulas ani, & intestini recti balsamis, unguentis, injectionibus; aliique huiusmodi presidiis; verum frustra laborant, cum hæc nonnulli sectione, & unctione sanabiles sint. Siquidem ego ipso, quinquaginta annorum, nullam vidi fistulam ani sanaram perfecte; licet observaverim aliquas à bathitonforibus, imperitiisq; Chirurgis ad cicatricem deductas, quibusdam atcais remediis, sed speciem solum, & superficiei tantum, in quarum posse fundo materia purulenta delitesceret, paucos post dies in novas majores fistulas, & graviores distulsi.

Quare si ex toto fistulæ sint sanandæ, ferro sunt omnino secandæ, quod licet multi reformident, Anatomæ ignari, eisdem tamen perituri nullo periculo, & metu hoc presidio utuntur, quod tamen caute administrandum in huiusmodi fistulis, ne lacerentur venę fedales, hæmorrhoides distæ, cum sanguinis erumpentis magno impetu, qui non adeo facile sistitur. Si itaque hæmorrhoides non tumeant, faciendæ sectiones inter unam & alteram anni rugam; si verò apparent, eadem inter ipsas administranda.

Fistulæ profundæ opus habent pluribus, & repetitis sectionibus, metu inflammationis, unica enim, & ampla, ob vulnervis magnitudinem, dolorem, & inflammationem excitat; quod observandum etiam in fistulis profundis, ut propterea gravissimo errore quidam imperiti chirurgi, saniores potius, statim post sectiones ani, & intestini recti, furantem candente urant partes recentes caltro læsis, unde dolor insignis, & curatio longius protrahitur.

Sepiùs à verò accidit, ut flaccida caro subretectat, quæ corrosivis abstinenda, alumine scilicet uto, præcipitato, vitæ ævi, trochiscis de minio, & huiusmodi in quorum tamen usu observandum, applicanda mane potius quam vespere, ne ratione doloris, patientibus somnus intercipiatur, magno eorum detrimento; multos siquidem vidi, qui ob vigilias, & dolores à medicamento vespere adhibito, inciderunt in febres; quod non accidit, si interdia eadem medicamenta usurpentur; quia vis sensiva occupatur, & advocatur à variis obiectis externis, præterquam quod possumus eadem renovare, & illorum loco, sedentibus dolorem uti, sine ullo incommodo patientis, & homini; quod noctu commode præstare non possumus.

Quod si pars ægra dolore afficiatur, aditque febris, vel inflammatur hæmorrhoides, tunc à sectione abstinendum, donec propriis remediis cedant; contingit verò aliquando dolor à materia purulenta, supposita in aliquo loco ipsius fistulæ, & possimum in altam partem fistulis, & sinibus æternis, in quibus acrimonia corrodit partes subiectas, & dolores inferre continuos, quos quibus sanandis statim faciendæ sectio, ut eadem cesset.

Observandum etiam summa diligentia, ut antequam egeri huiusmodi dimiserant, sectiones omnino sint caute opertæ, & cicatrice obductæ, si enim vel minimum quid eorum suppetes fuerit, non occlusum, progressu temporis parvis guttæ genitæ erodunt partes, atque ulcus, & fistula suboriuntur; cuius erroris crimine laborant Medicorum nonnulli.

Observationes.

De Fistulis Ani.

Quatuor fistula perforantes rectum intestinum, in infante unius mensis, perfecte sanata.

Curavi infantem unius mensis, Nobilem Patavinum, laborantem quatuor fistulis ani, perforantibus rectum intestinum, parte inferiori.

A principio exiguis curandis duas tantum ipsarum dilatavi, impositum solum siccum, cui alligavi parvum syngonium, arte paratum; quas postmodum sanavi modo mox propositis, tractam de fistulis; alias vero duas eadem methodo feci, & ad cicatricem deduxi, ægro firma etiamnum valitudine dirigente. Quod observasse à se fuit, ut rarum, ratione ætatis.

De Ulceribus Ani.

Quia verò nostris ævo frequentissimè suboriuntur ulcera in intestini recti, ægè admodum sanabilia, ut quotidiana patet experientia, modum propterea hæc sanandi proponere decrevi, hoc præmissis, quod pleraque horum ulcerum ortum ducunt à Lue Venerea, & possimum præputera, rara verò ab alia causa; licet quædam oriuntur à dysenteria, in parte nempe superiori ipsius intestini recti, & coli; alia verò ex hæmorrhoidibus, partis scilicet inferioris ejusdem recti, & circa orificium ani; rhagades verò, vel scissuræ quæ à siccis, & acidi humore ortæ; facile tamen sanabiles, dummodo mala aliqua qualitate cæteant. Ulcera autem ex dysenteria facta, detractione aquæ hordei, & melle rosæco iterum, & tertio per siphonem infusis; postmodum nostris aquis rheumalibus, brevi spatio temporis sanantur; pro rhagades unguento ex cerula camphorato, ducto in plumbæ mortario. Ulcera verò Venerea, quæ plurimum supra musculum sphincterem, non adeo faciles; ex concubitu quippe semine corruptum, & virulentum in ipso superstes, ulcera ampla excitat, quæ progressu temporis erumpunt, aut superius, vel inferius; cum observaverim in cadavere supra triginta ulcera, distincta magnitudine ungui. supra ipsum musculum sphincterem, per totum rectum intestinum serpentis, ad coli quinquariam partem aliquam; ex quibus ulceribus duæ, tresve libras puris per diem evacuabam. Ille autem patiens erat valde emaciatus, cum febre lenta ex ulcere quæ à me curatus tredecim, aut quatuordecim diebus tandem obiit. Præter ulcera verò supra musculum sphincterem, adhuc finas quidam, ab ulceribus superioribus serpentes, usque ad ani orificium; quorum ulcerum causa fuit Medicorum incuria, qui duos ante annos ipsum non sanatum dimiserunt, ejusdem salutis præsertim, quod materia à toto corpore maligna expurgaretur; ut propterea miserimus patiens sine remediis diem obire coactus, quareobrem modum ducere decrevi, quo in curatione horum ulcerum uti soleo.

Primo itaque totum corpus ab humoribus expiant, dum medicamentis proptis, humores redundantes purgantur; deinde assumentum decoctum ex ligno Guajaco, & salis, per quadraginta dies, cum sudore, prout in Lue Venerea; atque dum hæc sunt, adhibenda remedia topica, in primis Injectiones à principio

à principio, ex aqua hœdel, mista, cum Unguento Aegyptiaco, ad abstergenda necra, semper sordida, uique dum dolorem inferunt, atque cum ex ipsis aliqua portio sanguinis effluit, tunc verò abstinendum ab Aegyptiaco, cujus loco erit decoctum Guaiaci, scordii, virgæ aureæ, & huiusmodi, postmodum utendum aquis nostris Thermalibus nionis/Egrotorum: atque ab injectionibus immittenda semper turunda longa, & crassa, imbuta unguento rubro, Placentini, dicto, aut unguento ex turtia, misto cum unguento Sidis æquali doli, & aliqua semper porzione præcipitati, ut Lul Venetæ dicat. Quomodo multa ulcera Venerea sanant, & quotidie sano, quamquam ulcera quandoque ad id maligna occurrant, quæ remediis dictis non cedunt, in quibus deveniendum ad ignem, quo insutenda non semel, sed iterum, & tertio, ac quarto atque ne partes sanæ lædantur, locum primò ulceris invenientes; in quam rem nuntiant quidam instrumento speculo ani vocato, quo lætantes partes, cum dolore, & inflammatione, neque tamen locus ulceris patet, ut propterea usum speculi non probem, cum facilius quod optamus consequi possimus. Quo itaque ipsum duntaxat ulcus innotat sine læsione aliarum partium, hac methodo ator, immittit turundam longam, crassam, aliquo unguento ex prædictis imbutam, quatuor aut sex horarum spatio, qua educta, obiter, quæ pars ejusdem unguento cateat, cujus loco aliqua materia purulenta superflua ipsi tumore inhærens parefaciat locum; & magnitudinem ulceris, tum mihi parò cannulam ejusdem longitudinis, quæ possit pervenire ad ulcus, cujus extremum, sit obtusatum, & perforatum tantum illa parte, quæ ulceri responderet, deinde munito cannulam limbo imbuta ovi albumine, cum aqua rosarum, ipsamque in anum intrudo, & ferramento eandem immisso, repletis vicibus intro ulcus; hac tamen cautione frequentius id fiat, & citius, remoto ferramento candente, potius quam eodem diutius intra cannulam contento, ne scilicet intestinum rectum alius innascat, & perforetur. Facta iniectione, duos aut tres dies utendum turunda imbuta butyro; postmodum deveniendum ad iniectiones superfluas dictis ex aquis thermalibus, vel decoctionibus exsiccantibus, imposita semper turunda imbuta dictis unguentis, qua methodo multa ulcera Venerea injectionis recti sanavi, quam propterea latere nolui.

Observatio Singularis.

Gravis symptoma ex vi in anum immissa canda porcina, ejusdem setis ad medium usque fecis brevi omnino sedata, cum salute agra.

Memini Meretricem quandam in vixæ periculum deductam, cui à quibusdam studiosis canda porcina quæ acri hyemi frigore obstruatur, intra anum immissa fuit hac ratione, scilicet primò setis ejusdem, ad medium usque, valde asperis, postea innecta eadem oleo, atque in anum ipsius mulieris vi intrusa; cum verò aliqua portio ipsius caudæ, tres digitos, extra emineret, atque eandem Medici tentarent educere, pili inversi desigebantur in intestinum rectum, ut dolorem agra ferre non posset, cum verò medicamentum postmodum per os exhibuissent, speculumque immisissent, ut anum dilatarent, & educerent caudam, frustra fuerunt, adeò ut sex dies alvus illi suppressa fuerit, accedente vomitu, cum febre, & dolore omnium intestinorum; acrius

Nihil. Chirurg. Tom. I. L.

verò, cum omnia prædicta inessetissem, atque in longum digram, aut tres (spissimas perforavi, in extremo levigatas; deinde filo crasso extremum ipsius caudæ, extra anum prominens atque alligavi, atque immisso filo in cavitatem ejusdem arundinis, in pedicem immisi, per quam filo attracto eandem eduxi, illis omnino intestino recto, ex quo statim maxima copia fecum effluxit, cum patientis levamine postmodum injecto, duos aut tres dies, lacte caprino, bis terve per diem, atque sedato dolore, gravissimo certe, infudi vi vinum nigum anilem ad corroborandum partem, quibus ex toto convalescit agra. *Petrus De Marchetti in Sylloge observationum Chirurgicar.*

De Fistula in Ano.

Morbis per se patet, præcipue si instrumentis expleatur ulcus.

Indicationes sunt hæc: sanguis fluxus si adsit sistendus, necus sordidum detergendum, carne replendum, per siccantia consolidandum, & cicatrix firma est procuranda; humorum acrimonia obtundenda, & corpus est tenuiendum.

Quoad Viduum, comedat parvè, vescatur unico cibo, prunis, passulis: bibat cereviam medicatam. Conveniunt quoque emulsiones, amygdalarum, hordeæ, Pasta tergia, panis marcius, gelatinæ, lactis, sed præcipue lact asinum ad humorum acrimoniæ temperandam.

Purgatur set diebus alternis hoc modo.

℞. Calomelani. opt. præparat. gran. xv. vel. xx. diapn. solutiv. ʒij. gum. Arab. ʒj. tol. aur. numero 4. M. f. Bolus mane sumendus, superbibendo tantillum vin. alb. aut cerevis. medicat. & postea jusculum. Sine ullo dolore operatur aut sanguinis fluxus.

Iniectiones Clysteres ex vulnerariis, & lenientibus, ut sanguis fluxus sistatur, ut in Capite de Diarrhœa Dysenteria & Tenesmo describuntur.

Iniectiones fiant primò anodynæ, dein detergentes, & denique astringentes & exsiccentes. Anodyna supra in Cap. 3. de Tenesmo, &c. describuntur. Detergentes sic talia.

℞. Rasur. gusac. ʒij. rad. caryophyllat. ʒij. aristol. rot. ʒj. fol. linalcl. prunel. vine. pervicæ. veronic. herb. Robert. pilolell. ana m. ʒj. Cog. in aq. fabror. ferrat. ad ʒij. adde sp. vin. ʒijij. mucilag. sem. pilyl. & cydon. in aq. ros. & plantag. extract. ʒij. tereb. Venet. ʒj. vitell. ovor. numero 2. M. f. Iniectio. Adde quoque potest mel. ros. aut Tapimel.

Tapimel de quo hoc sermo est, nihil aliud est, quam mel decoctis vulnerariis additum & depuratum, ubi basis est tapus barbarus.

Iniectio astringens sic talis.

℞. Sterc. asinin. rec. m. ij. aq. ros. plantag. ana ʒijij. Infunde & decoq. Interim. adde succ. plantag. ʒij. syr. de papav. ʒij. gum. Arab. in aq. spectat. tant. solut. ʒij. F. Iniectio bis in die ulsupand.

Aliquando addo phlegmat. alum. uncias aliquot, ol. myrrh. per deliqui. ʒj. trochisc. alb. Rhaf. ʒij. sacch. Saturn. ʒj. viticell. Martis ʒss. Aliquando facio ex calce viva ʒj. in aq. fabror. ferrat. Div. vase æneo per hor. xj. macerat. vnde sumo ʒij. & mucilagines, ovi vitellos, &c. addo.

Aliquando compono ex aq. calcis & mercurio subtilat. simul commist. & sacch. Satur. edulcorat.

Conveniunt Intus Diaphoretica viz. Hartmanni aut commune, cum pulveribus resacis & terreis commista, viz. ocul. can. magis. petas. bezaor. orient. corall. &c.

K Petulitæ

Perfistat in usa Decocti sudorifici sequentis ad 20. 30. 40. dies, plus minus pro ratione operationis & virium.

℞. Raser. lign. sanct. rec. & resinos. sarlap. medullosi, buxi ana ℥ij. rasur. quer. rec. rad. caryophyllar. ana ℥iij. rad. tapl. barbat. filipend. scrofular. maj. ana ℥j. rad. lymph. maj. cortic. rad. ononid. ana ℥x. rasur. corn. cerv. rec. dent. equi marin. ana ℥ij. perlicar. macular. m. ij. prunell. bugul. faneicul. veron. utriusque, scabios. ana p. ℥ij. flor. primul. ver. p. v. ℥ij. corilim. p. ij. Marratio indatur, & superaffunde aq. sequentis ad supereminet. ℥ij. digitor. Digere in fumo equino per biduum. Cola pro ℥ij. dos. marucin. provocetur sudor, superpositis stragulis sine calore externo.

Aqua sudorifica talis est.

℞. Rad. perasie, rec. ℥ij. rad. bardan. ℥ij. ulmar. cat. bened. calend. bened. ana m. v. ℥ij. scord. m. v. fummit. anth. beton. ana m. ℥ij. cort. citr. ℥vj. incis. & contus. assund. cerevis. fort. gallon. ℥ij. macera in fumo per quadriduum, & vale duplici distilla ad usum.

Post quantum quæque sudorem repetatur bolus purgans cum mercurio.

Dicbus sudorum, nisi fluat alvus, subducatur Ene. mare.

Postea (præcipue si rabis sit metus) deveniat ad usum balnei ex aqua & lacte cum multo tapso barbat. ad 4. 6. aut 8. dies semel in die.

Cerevisia medicata rei hujusmodi.

℞. Raser. lign. sanct. ℥ij. sarlap. ℥vj. rad. lymph. maj. ℥v. cort. rad. duleamar. rad. caryophyll. silic. formin. scrofular. maj. filipend. tormentill. ana ℥iij. rasur. dentis equi marin. ebor. ana ℥ij. fol. rec. siccat. bugul. prunell. scabios. agrimon. pilosell. veronice. utriusque, faneicul. ana m. ij. noc. moschar. per frusta dissecta. numero v. cerevis. lupulat. fort. cong. xij. bulliant in parte cerevis. mox ubi refrigerint, reliquum addatur cum succ. cochlear. ℥ij. nascitur. becabung. ana ℥ij. pomor. redolent. rec. expresse. ℥vj. fermentatione peractâ logenis lapideis indatur pro potu ordinario.

Ad fontem impurum occludendum utilissimum est Electuarium seq. in cujus usus diu perfistat.

℞. Conserv. flor. papav. rhoad. ℥j. conserv. ros. rub. ℥ij. pulv. rad. lymph. maj. ℥8. rad. scrofular. filipend. rad. martin. ana ℥ij. mag. ster. perlar. corall. lap. hæmar. præparat. ana ℥iij. sang. dracon. ℥ij. spod. ℥j. gummi. Arab. ℥iij. syr. corall. q. f. Electuarium.

℞. Hujus ℥ij. terriblinth. coctur. indurat. croc. maris corallin. ana ℥j. M. f. bolus mane sumendus, superbibendo haustum lactis asinini, & vespertim horis tribus à cena. Adde aliquando barticum ferri vini. Hispanic. extinct. & in porphyrite lavigat. ad ℥ij. aut ℥ij. aut amplius pro te nata.

Eidem intentioni inservire Julapium hoc, quod post dosin Electuarii (vel alias) sumi potest.

℞. Flor. veron. rub. p. ℥ij. papav. erras. p. ij. malv. roseæ p. iij. ros. rub. p. iij. aq. ciehor. fumar. pomor. redolent. ana ℥ij. * aquæ & cordibus animalium ℥vj. p. vitrioli q. f. ad gratiam; extrahe rincturam. Cola, & in ℥vj. colaturæ dissolve syr. de lymph. ℥ij. de pomis redolent. corall. ana ℥8. M. f. Julapium bis in die sumend. Singul. dos. adde gum. Arabic. in aq. plantag. solut. ℥8.

Julcula Medicata fieri possunt & rad. chin. rasur. ebor. dent. equi marin. corn. cerv. rad. scrofular. lymph. filipend. sem. melon. passul. & herbis vulneraria & adstringent. ventre galli veteris inclus. & in oco. cum frusto carnis vitulina.

Hydromel quoque ex vulnerariis & irgredientibus cerevisiæ medicata parari potest.

Si addit callositas, conveniunt pulveres cathartici ut pulv. Vigonis, argemalis; immò illeceus humanum siccatum, calcinatum, & pulverizatur.

Si addit caro fungosa, absumatur ad fundum alum. ust. Præcipitatio per se aut cum alum. mist. potestentim alterutrum pulverem augendo, ol. antimon. unguent. Egyptiac.

Balsamum ad ulcus detergendum tale sit, præcipue si addit caro fungosa.

℞. Virid. aris deputat. & insubillif. pulv. ℥j. vitriol. Hellac. ℥ij. ol. ablet. lin ana ℥ij. terrib. Venet. gum. elem. ana ℥ij. liquoris gummarum cum ol. & adde virid. ar. & vitriol. & digere super ciner. a. p. de noctem, addendo flor. antimon. m. recut. alb. præcipit. ana ℥j. sal. Saturn. ℥ij. M. f. limpidum à crasso separatur. Huic balsamo addi potest balsam. sulphuris.

Ad omnia ulcera putrida Pulv. sequens est præstantissimus.

℞. Mercurii præcipit. ℥j. vitriol. alb. alum. ost. ana ℥8. elcharam facit profundam. Aut ol. antimon. cum ol. papav. aut ros. commisit. donec stanno illitum id nigrescere non facit, credit carnem putridam nullo vel saltem exiguo dolore.

Intestinum rectum pondere suo deorsum tendens cum dolore, sustentetur spongia molli cum idoneo subligaculo.

Post injectiones ne coarctentur putulenta materia cannulam interdiu gestet, cui apprimatur spongia, ne aer subeat.

Sedibus quoque exsiccans hujusmodi fieri potest post ulceris detersionem.

℞. Mercur. ℥j. lap. pyrit. ℥vj. mastich. rhur. sandarac. ana ℥ij. ladan. ℥iij. styrac. calamit. benzoin. ana ℥ij. gum. guaiac. ℥8. f. Alcohol. & cum rebeblith. Venet. q. f. f. Trochisc. pond. ℥ij. Recipiat fumum in sella perforata, dein per embolum in anum semel in die; pro euphorbia continuetur. Addi potest gum. animæ, benzoin. &c.

Profunt Aquæ Spadane: Aut si haberi non possunt, substituantur Vinum Chalybeatum vulnerarium sequens.

℞. Raser. lign. sanct. ℥ij. cortic. ejusd. ℥ij. sarlap. ℥vij. rad. sic. lymph. maj. scrofular. otriusque, filipend. tapl. barbat. sanguinar. caryophyll. ana ℥iij. fol. succ. prunell. bugul. veronice. maris, virg. aur. hyperic. ana m. ij. androssem. equiset. pimpinell. agrimon. ana m. i. rasur. dent. equi marin. ℥ij. spod. corn. cerv. ad albed. ust. ana ℥8. croc. Mart. aperient. ℥xv.

Imbibantur vin. albo generoso ad macerationem, dein eiusd. vini adde ℥xxx. F. Vinum medicatum.

Si à vino nimis incalescat æger, diluatur dosis viz. ℥iij. cum aq. Spadens. ℥ij.

Si sinus non lani. sit apertus, aperiatur turundis ex medulla sambuci, vel ex spongia carâ, glutine taurini. aut ichthyocolla imbuta.

Si exulceretur ipsum intestinum rectum, & nullis cedat remediis, tandem ad excisionem deveniendum. Nam secundum Hippocratem, Rectum intestinum & secans & resicans, & confusus hinc ligans, & utrens, & potest faciens, statim si hæc gravissima esse videantur, nihil lesens. Theodorus De Mayerne in Praxis Medica.

De Vlenibus, & Fistulis Ventræ.

Oriuntur ulcera ex gonorrhœa Gallica, plurimum in

in extremo collo vesicæ, atque urethra; et aliquando etiam ab humoribus calidis, acribus, & corroden-
tibus, licet raro. Ulcera autem culli vesicæ in
perineo sita; eorum verò, quæ paulo infra ip-
sum, scrotò; quandoque verò inter glandem, &
proctum delitescunt, in foveola scilicet illa, ubi glandis
totius. Hæc autem non ita facile sanantur, nisi
ex toto gonorrhœa sublata: quæ enim ab aliis hu-
moribus oritur, emulsiorem seminum melonum decem,
aut duodecim dies, sponte sunt sanabilia. Si
itaque ex gonorrhœa orem ducant, curanda hæc
medicamentis accommodata, ab omnibus propo-
sitis, licet spectantibus, decocto liliæ Guajac, cum
sudore, & hujusmodi. Sanata gonorrhœa ulcers
incurandum primum; nisi enim sanetur, caro ex ipso
luxuriat, unde affectio, quæ sarcoma Græcis, vulgo
carcinoma, quam lithotomi cotrosivis medicamentis
attingunt. Hæc itaque ne succedat, ulcera cum can-
dellis quibusdam, compositis ex pulveribus plumbi
usti, cereis, rubeis preparata, mistis cum cera, in
urethram immittendis, & detinendis diu. Inque,
quæ, melendi penitus sollicitudine, educuntur; quibus
solis hæc ulcera sanantur. Observandum tamen, non esse
imponendas, fluentes gonorrhœas, ne ab illis supplessis,
exulceret collum vesicæ, & alias partes proximas; at-
que, si malignitatis aliqua suspicio subit, eadem can-
dela imbuenda unguento ex æruis camphorato, misto
cum præcipitato pulverisato, abique ulso meta, ne
hoc exulceret partes sanas; tum quia est correctum
unguento ex cereis; tum propria experientia duce,
hoc scilicet non excoriare partes sanas sed tantummodo
extinguere malam qualitatem ulcerum, quæ sub-
lata, candellis supra dictis postmodum sanantur facili-
tate: in quam rem uros etiam aqua Aponianæ,
assumpta per os, ad decem libras, cum spicis te-
rebenthine, aut vitrioli decem, aut duodecim dies,
quatuor horis ante prandium, qua, urinx mutum
perlabente, ejusdem vi exsiccat ulcera urethrae fa-
cillime consolidantur, qua methodo quamplurima
hujusmodi sanantur.

Et quia solent perforare urethram cum integre-
ntis, aliquando in perineo, quandoque in scrotò, ab
illis, progressu temporis, fistulae suboriuntur, quæ si
in perineo, absente gonorrhœa, pars callosa circa
urethram, & partes adjacentes, incuranda fermento
candente, quo caro illi accrescat; & ad cicatricem
deducatur fistula; hæc tamen lege, ne ille inuratur, at-
que fistula amplior fiat, nec urethra, pars spermatica
amplius inflantur, & refarciatur; ut propterea sat
futurum sit, eidem parti circum circa carum inducere,
quæ vice sit urethrae, ut cicatrice obduci possit me-
dicamentis larcocicis, & epuloticis jam dictis.

Observandum tamen, quod si pars interna urethrae
non solidæ sit, ostii catunculum superius jam dictam
ac proinde in curatione hatur fistulam; patienti
candelam ceteram in eadem semper gestandam, ne in
cassum omnia adhibeantur.

Si verò pars urethrae scrotò opposita fistula labo-
raverit, urina ex ipsa effluens scrotum corrodit plu-
ribus foraminibus quæ curatio admodum, & diffi-
cilis, licet scilicet successu eandem sepius hæc methodo
tentaverim. Expiato prius corpore, & exhibitio deco-
cto Guajac, cum sudore, fluxionis sistende, statim ac-
cedo ad partem ipsam læsam, quæ si multiplex fuerit,
omnes fistulas leco: & per candelam propositam om-
nem operam in sananda urethra adhibeo; cum alia
ratione fistulae scroti non omnino sunt sanabiles, nisi cura
palliativa, qua decem recedunt: quod si non possit
sanari urethra candelâ, scrotum secundum, usque ad il-
lius fistulam, ipsaque inveniunda, modo jam dicto, & ca-
rone scilicet partes oppellendi: ac tandem cicatrix inducenda

medicamentis propolitis. Contingit verò aliquando,
quod in quibusdam observavi, ut scilicet petula ure-
thra ex gonorrhœa, amplo foramine, minus profluat, &
scrotum repleat, ad magnitudinem quandoque capitis
pœti, dilatatis nempe partibus ejusdem, unde dolor,
inflammatio insignis, ex qua tandem gangrena, &
sphacelus; quorum causa, ferantur candidibus,
& incidentibus pars ipsa, alienata, & citorescens
putanda; quod aliquando observavi, si vero sphacea
lo corrupto, & exipitato, pululatis testis, foramine
amplo in urethram patefacto; quod sanavi modo su-
perius propolis, per candelam scilicet, & usu sarco-
ricorum; ac tandem epuloticis: inque alia ratione
vidi hujusmodi patientes sanatos, quæ licet ab alia
Medicis fonte observata, propria tamen experientia
confirmata, addere præter rem non existavi. *Pe-
rus de Merbæus in Sylloge observationum Chirurgica-
rum.*

Consultationes.

*Pro Illustri & nobili Equite Simone Merlino
Foroliviense Flcere intestini recti fistuloso, & si-
nuo per partem externam natis sinistra vicinam ap-
prehendente detento.*

Sicuti perennis desiderandi cupiditas in illustri, &
nobili patiente affectus intestini recti ad finem est in-
dicium, ita & exercitio postmodum ramenti intesti-
nalis idem intestinum paulo supra laborare, præcipue
verò secundum partem sinistram tum uoxa circa na-
tem ejusdem lateris, tumor inquam, ac inflamma-
tio quædam prægressa, tum immixta tenta, & in
partem ea recepta demonstrant. Verum affectum
puer naturam nullum alium esse, nisi ulcus, quod
intestinum rectum ac partem externam natis sinistra,
vicinam apprehendit, præter fidem oculatam, ichor
liniolus ad flavitatem inclinaus, qui continuo ef-
fluit, satis superque suadet, quod & cavum esse ex
tenta immixta, & affectu natis, item & fistulo-
sum ex diuturnitate illius, jugique ichoris tenuio-
ris emanatione. (nam & multis annis talem efflu-
xionem cum pruritui intra, extræque anum passus est
que indusia è regione ipsi ano semper infecti) con-
sumari posse mihi videor videre; Atque ulcus prædi-
ctum per rotam intestini substantiam pertransisse, ori-
ficiisque ulceris in eodem reperi intestino, ex vi-
cua nate affecta facile luadet potest.

Sed quid causæ sit quod dum mingit illustris
patiens, ut plurimum egerat, ac atrea inter min-
gendum difficultatem perentiter, foecesque semper
liquidas excreverit, non erit ab ea cognovisse. At-
hibitor ego postremum ex humoris acrioris, & copio-
siori tunc temporis ad intestina defluente, eorumque
expulsiorem facultatem sollicitante, accidisse; diffi-
cultatem verò loti in aliqualem compactionem ob-
rutescentiam partium affectarum vesicæ proxima-
rum factam, referendam esse censeo, atque tandem
dejectionem tempore mictionis aliquando fieri potui
quia intestinum rectum secundum proptum mufcu-
lum sphincterem malè habens, facile in redditu uri-
nae adhuc, ac velie, nolit, egressum fecum admit-
tere cogitur.

Principia autem generationis ulceris propoliti sunt
proxima & remota, proxima in unius mæritæ
acrioris copiosum affluxum referte non habeo, mæ-
ritæ namque accedine erosionem, copia vero lunum
& cavitatem efficere valet, & ubi diutius copulavit

saniosa detrahetur, callo, ac proinde fistulæ datur occasio.

Principia remota pertinent ad causas generantes materiam prædictam, & genitam moventes, in fene illarum tum Intemperiem jecoris fervidam, uti calor fluvius exurit jecoris soboles docet, tum errata in vita antea facta repono, in harum verò numero naturam imbecillitatem partium ani, & earundem laxitatem, & humiditatem, robur autem ex paltrici partium totius, præcipuè verò jecoris pono.

Ut ex his unicuique faciliè sit intelligere, ad Medicum pro curatione instituenda attinere, ut ulcus istud fistulosum amotis impedimentis agglutinetur; cæterum cum impedimenta & propria, & communia existant, ratione illorum oportebit ampliare, deretigere, & siccare, callum eximere, & quod est deperditum fasciotis reparare, ratione horum, communium scilicet, humorum affluxum inhibere erit necesse.

Quæ opera ad felicem exitum produci posse non dubito, tamen meo iudicio cum insigni difficultate, quia medicamenta opportuna prohibentur, aut saltem difficulter admittuntur, & partem affectam undequaque non possunt aringere, partemque denum malè habens suâ naturâ imbecilla existit.

Sed an hæc facienda cautio meritiò dubitari possit, nam ex una parte ætas patientis ultimi senii est enim illustris eques septuagenarius) distantia loci affecti à partibus præcipuis, tandemque præservatio forsitan à gravioribus malis, quam homines medicis hinc ulceribus fistulosis ut plurimum sibi nascuntur, facile quævis persuadere possint, remedia pro perfecta, & vera sanatione non esse tenenda; Ex altera verò parte, quoniam nobilis patiens viribus est valens, bene habitus, ac in cæteris sanis, sæpiusque huiusmodi fistulæ multiplicaverunt, & concitata fluxione humorum inflammationem, dolorem, cruciatibus sibi insignes adjuvant, tuberculaque dura in intestinis occasione illarum suboritur, meritiò quodam exitus factum intercluditur, curatio absoluta videtur ex usu opportuna, & necessaria.

At ego in ea sum sententia, ut si vera curationis sese dare voluerit vir illustris, quod possit utiq; curati, sin minus, Medicus in id incumbat oportet, ut præservetur, qua amporatis vel saltem retrahatis causis remotis, ulcerique continuo detergo, exiccatoque marulo non augeatur, sed potius reprimatur, quæ curandi modum, tamen sciam, & palliarum, gravissimè nihilominus viri insequuntur.

Deveniens ergo ad præsidiorum materias, & primum chirurgicas, statuo curationem ab aliqua sanguinis missione per sectam venam auspiciandam esse, vena idè in cubito, vel in manu secunda seligatur, sanguis enim in toto redundat, robur vitium adeit, & corporis habitus ad crassum inclinat, deinde cantharis in brachio sinistro aut femore dextro, secundum partem domesticam inusta securi & perennes frictions, deligationes, ventosationesque partium superiorum nihil summo potè probantur, apertionem verò loci ab experto chirurgo, medicamentis non conferentibus non improbo.

Postmodum ad pharmaca, primum communia, dein privata devenio, quare si de communibus sit sermo, pro lenitæ alvo syrupum rosatum solarium, ac de polyposio, pro humoribus concoquentibus decoctum cichoraceorum, boraginis, betonicæ, ac passularum cum suis syrupis; pro purgatione infusum Rhabarbari, Agarici, & senæ, cum manna etiam, atque etiam laudo: Quintimo & cataplasia de tribus cum Rhabarbaro, tempore verò calidiori decoctum, infusumque mirbolanorum citrinorum,

chebulorum, & indorum ex sero lactis paratum, intervallis quibusdam assumpere profutura propono: Vnum quicquid, si patiens eum cum à natura promissum fuerit, semel in mense habitum à cibo non viroperio. Verum & de medicamentis insensibiliter evacuantibus, præmissa purgatione est cogitandum, decoctum idèitico guajacæ, & falsæ cum china, & sandalis erit miri usus, & si sudor, modèitè tamen, & placidè promovebitur, tanto efficacius reddetur medicamentum; Urinalla quoque medicamenta, non vera (nam vera jecur magis accendunt) huc referenda, quare inter alia mihi tum thermæ frigidae, tum serum lactis distillarum, adjecto lacte seminum melonum copiosè bibitur tempore opportuno nihil maxime aridum, verum & ab oxymelle diluitori ex decocto radice apii recentis, capillorum veneris, scolopendri, & eretoidis non abhorreo.

Denum de particularibus pharmacis cogitandum, quæ si referantur ad jecoris intemperiem, præter aliqua ex utralibus dictis, succum quoque ciclioreæcorum non solum assumptum, sed formâ irrigationis hypochondrio dextro unâ cum aceto, & pulvere sandalorum adhibitur, sicini & conservæ rosarum cum speciebus confectiois ex tribus sandalis usum continnum non improbo; Quod si medicamenta hæc ad ulcus attineant, non solum à qualitate manifesta, sed & à propioritate, duo sunt, primum est pulvis radice gentianæ, vel aristolochiæ ex vino epotus, alterum est pulvis tantum adhibitus, verum à quibusdam radix hellicæ nigri in fistula tribus diebus dimissa, item & clareurum terebinthinæ exceptum radice quæmmeris asini summis laudibus extolluntur. Sed quæ à qualitate nota operantur, sunt detergentia, siccantia, callum abluementia, & agglutinantia; Atqui ostium dilatandum rursus vel ex gentiana, vel spongia confecta, deinde ad medicamenta prius ordinis deveniendum, sunt autem thermæ salsuginosæ, inter quas, velut omnium regiona est aqua Tetræclæ vocata, quæ non solum in potu per tres vel quatuor dies ante decoctum guajacæ assumpta, sed & injecta ac per modum semicupii usupota plurimum valet; succus quoque apii cum vino Mellis decoctionis hordei, myrtiæ & aloes injectus, est accommodatus, at pro callo eximendo nil præstari unquam succo herbæ Regiæ cum Ammoniacæ aceto dilutus, & injectis, sed quod omnibus præferendum, est unguentum Aegyptiacum lixivo dilutum, à quotum usu, si pars nimium irritetur, injiciatur serum lactis, vel ipsomet læ asinum, & si ex voto callus auferatur, ac fasciæcorum usum accedendum, qualia erunt unguentum isidis, vel de unta vino Mulso dilutum; item & succus pimpinellæ, virgæ auræ, & Ceanoth minoris, omnia injecta. Pro agglutinatione fiat injectio ex vino nigro assucto decoctionis plantaginis, rubi, malicui, hypoxisidis, & acetæ, huc referendum oxellen Galeni, & eratam barbarum.

Videtur his omnibus undequaque conveniens injungatur, qui erit ut nobilis patiens vescatur bonis cibis, & abstineat à salis agruminiis, aromatis, lacticiis, cibis, farina subactis piscibus spaliolosis; atque similibus acrioris, & crassioris naturæ, bibat vinum subacrum, subantherum, guajacæ, ac sandalis medicatum, tempore autem decocti infusiatur victus semi arentians, & vinum intendantur, reliqua hi ipsi respondent, Deusque O M. faxit, ut cedant in salutem illustris, & nobilis Equitis. Julius Cesar Claudius in Consultationibus Medicis.

De Ulcere fistuloso Ani. Pro Nobili
Paciente.

Quod morbi vel diligentissime curati, aut non faveant, aut agere saltem, modo ob ipsorum contrarietatem, modo ob ægrotum, aut medicorum frequentes errores, modo utramque ob causam, prout in casu præsentis contigisse observo. Suboritur enim nobili huic patienti tribus ab hinc annis ulcus fistulosum in ano, cujus ratione frequentem pulsus est, & patitur deieciendi voluntatem, doloremque, & gravitatem circa podicem. Neque hæcenus ab æstetu proposito liberari potuit, variis licet remediis prædictis administratis. Idque duplicem ob causam, primo quidem ob incitum cum ipsiusmet ægri incompositæ viventis, & affectum ipsum aliquandiu impetentis, tum medicorum, vel potius circumsorancorum quorundam, qui generosis cathartici humorum colluvium à toto ad partem affectam attraxerunt, tum & ob ipsiusmet affectus pertinaciam. Sicut enim facillime suboritur ulcera fistulosa circa anum, ob innatam illarum partium molliorem, laxitatem, & humiditatem: ita genita ægri admodum sanantur, ob continuam ad ipsas fluxionem, & difficilem locorum partium affectæ adhesionem, cum prædictum ulcus hæc veteraretur, & dolorifica, putrida, depauperata, & tabe Gallica inquinata fuerit; cuius natura esse ulcus hoc valde inspicitur. Hoc etenim sicuti originem duxit à flava bile, fallaciter pituita, genita ob incompositam vivendi normam, & ad prædictas partes, tanquam imbecilliores à tribus annis decumbente: ita fovetur à continua fluxione à cerebro humido, ventriculo imbecilliori, & jecore præciliò, ratione intemperie ipsius. Quod contumax quæritum factum est, ob virulentiam Gallicam, & alias pravos qualitates proprias: cum præterit adeo altas egerit radices, ut non immerito suspicari liceat propagatum esse in varios sinus, angui in funiculum ipsum penetrasse. Quæ de re certiores erimus, si digito in podicem immisso stylum in ulcus demerimus perciperimus vel si sanies per alvum, & materiam faculentam, & furiatam per ulcus effluere observabimus: atque hinc fibrilla illa lenta, qua hebdomadas, & menses consistunt, originem ducere potuit, vaporibus scilicet putridis jugiter ad cor elevatis ab ulcere hoc putridis, quæ huius scilicet, dum egeruntur faeces duræ, cum rigore, silem præteritis benibus partem exulceratam exquisito sensu præditam, atque calore, ac sentis spiritibus, ratione doloris, huiusque tandem catenis excreverunt, ex sanguine illo vitioso genitæ, ut propterea ulcus propiussem omnium malorum sit fons, & origo, quo non obducto, nec alii affectus cedunt.

Hoc autem consequi difficillimum censeo, ne dicam impossibile, si præterit pertingat ad intestinum ipsum. Non ob id tamen medicis prædictis lapsuscedendum censeo, quibus saltem ipsius incrementum coercetur, metu aliquando febris fixæ, quæ ad tabem, & mortem nobilem nostrum patientem tandem deducat; cui non satis vires constant, generalis remediis pareat. Quæ hæc fistula enim ex illarum censu est, de quibus verba fecit Hippoc. 3. in 6. Epid. 39. dum prodidi, tales fistulas aliquando humores superfluos purgando præservare à gravioribus malis, propterea non curandas. Ille enim sunt fistula callosæ, sine dolore non depauperantes; hæc vero est dolorifica, ideo non callosa, depauperans & dyspulsora, cacoethes, & maligna.

Ipsius autem curatio absolvitur exsiccatione ulceris.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Quod fieri non potest, nisi subtilis impedimentis, quæ in casu præsentis sunt quatuor. Primo fluxio petrenis, quæ est averrenda, & al. xipharmaciæ extinguendum inquam mentum. Secundo intemperies calida & humida refrigerantibus, & exsiccantibus removenda. Tercio sinus, qui apertendus, si fieri potest, vel saltem laxandus. Atque demum detergendum, & exsiccandum est excrementum crassum, & tenue in parte exulcerata.

Ut prædictis indicationibus satisfiat, præmittenda est diligens rotas corporis evacuatio, cum educatione sanguinis, tum ex jecoris dextra, tum ex lappena sinistra, accedente simpliciter, ac repetita humorum virtutem præparatione, & purgatione, atque insuptione facta duorum foniculorum dextro femori, & sinistro hachio, exhibita triduum Aqua Tertutiana, cum syr. rus. Placet quin etiam reperitus usus blandi decocti ex ligno Indico, farsaparilla, & similibus, cum cephalicis, & aliis quæ hypochondriorum rugitas, & tensiones ipsorum: à cuius usu 40. dierum spatio, cum blando sudore, commensuratus usus Lactis caprelli, tanquam detergentis, refrigerantis, & agglutinantis, 20. dies circiter cum otio, seu decem guttulis olei lipo Indico, ac tertio ex usu erit aqua B. Vi genis, refrigerans, detergentis, & exsiccans, vel ipsius loco aqua Vi. lensis in agro Lucensis. Atque hæc de internis. Externa topica varia sunt, pro sinuum varia conditione, in magnitudine, & profunditate. Si enim admodum alte descendat, culro falcato angusto sicut apertendi, profundiores vero turunda laxandi, blandique etiam sentibus atterendas levis quidam calculus in superficie, non enim cunctis totum sinum occurrere, alioquin non esset dolorificus. His prædictis, exsiccandum est ulcus, non omnia ipsius deterruerit. In quem sinum maxime possent aque nostræ Thermales, in primis Montis agrosorum. Per al. xipharmaciæ deinde ipsi ulcers occurrerunt. Tandem ad majorem exsiccationem, & roborationem partis, balsamum occidentale opportunissimum unctio, præter alia leviora culibet in arte verisimilissima, brevitate propterea gratia prætermittendi. Atque hæc pusillima pro prædictis affectibus curatione proponenda dux. Benedictus Silvaticus Consilior. & Dispens. Medic. Centur. 3.

De Ulcere Ani. Pro Nobili Matrona Cremonensi.

Viginti nunc agunt mensis, cum Nobilissima Matrona annorum 27. ulcus patitur in tota interiora parte intestini recti, suboritur forsitan ex acidi materia biliosa in jecore fervido genita, & à rogo corpore ad intestina, tanquam ad lentum, tunc temporis transmissa, quando diarrhoea biliosa laboravit, non sine confusus pituitæ saltu, absque ulla suspitione alterius corruptionis virulentæ. Ulcus hoc nunc callosum factum est, propter matriciam causam porrostratibus partis affectæ infusam est sordidum, ob defectum caloris nativi, atque dyspulsorem, ac difficilis sanationis, ob ingentem affluxum materię pituitosæ, biliosæ, & atrabilis à ventriculo, jecore, & toto corpore ad partem affectam, cacoethes quæritam, propter intemperiem humidam partis affectæ, cuius indicium evidens caro circa eandem inæqualiter excreverunt. Est dolorificum aliquando, cum propter decubium prædictæ materię, tum propter violentam faciem excretionem, fistulosum fortasse, eum supradictæ partes facili sinuosis ulceribus sint opportuna, propter continuam earum humiditatem.

Difficillime propterea curationis, ut mirum videt non debeat, si ulu tot medicorum prædictorum ex

K 3 methodi

methodi lege propofitum non ceffit. Non ob id tamen illi fupetendum eſt, quorum beneficio ſperamus fore, ne aliquo faltem tempore Nobiliſſima patiens priſtine ſanitati reſtitatur.

Quoad ut fiat præmiſſa univerſali rocius cura, revelentibus, derivantibus, & evacuantibus ſiſtenda eſt finis, & materia fluxa evacuanda, ulcus detergendum, valide exſiccandum, & cicatrice obducendum, adminiſtrandi interim jecur refrigerantibus, & calidum innatum partis affectu foventibus. Quæ præſtabuntur remediis Chirurgicalis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Pro totius itaque Evacuatione, præſcribatur leniens paratum ex mell. & fyr. roſ. ſol. cum manna electa, vel ex electuario lenitivo, & manu, cum pulpa tamarindorum. Sanguis interim educatur ex vena interna utriuſque brachii, longe à mentis purgationibus; innox ſub illorum tempus, ex ſaphena. Preparantur humores fyr. de ſucco hortiſſini, & oxymel. ſimplici, cum decoctione eichorii, ſonchi, hepaticæ, hortiſſini, agrimonie, & ſemini cufci; ac deinde purgantur tsub. lenia, & agarico infuſi in decoct. curd. adhiſto fyr. de polyp. compoſ. roſ. ſol. & manna. Reperant deinde prædictorum humorum præparatio ſyrup. de fumaris compoſ. de eichorio cum thubarb. & oxymel. compoſito, additis aquis beron. fumarie, lupulorum, & eichorii: alternitibus diebus prædictarum aquarum loco, addatur unſ. ſiſ. decoct. epithymi Mel. & ſaſſa humorum præparatione, repetatur purgatio medicamento jam præſcripto, vel junioris. Validiora namque & iraherent humores ad partem affectam. Interim inſeruntur fomiculus brachio ſiniſtro, ad major. in reſuſcit. & detentionem cum materie fluentis tum fluxu, & in parte ulcerata contentæ. Exhibeatur aqua Tetratiana quatuor aut quinque dies quolibet mane, ad libras quatuor, cum unc. iij. mel. roſ. ſol. A quibus ex uſu erit decoctum radicis chinæ, ſaſſe parillæ, & ſantalorum citrinorum, additis. hordeo, & eichotaceis, 40. dierum ſpatio, exſicato ſoluto cum doſiſſis liſſimo fervido plenis ſemel in die: victu modice tenui præſcripto, vini oligophori potui conſeſſo. His internis accedant externæ localia, & quæ clyſterum, & ſuppoſitoriorum uſu part. in affectum attingunt: arque adeo aptissime conveniunt clyſteres ex aqua Tetratiana, cum melle roſ. vel etiam ex moria, ad majorem detentionem, tum ex vino rubro, cum pulvere turritæ, fabarum, hordei, & thuris. Turunda patentur externæ binthina Cyprica, & melle, cum ciner. quercus, eſſalicide, oſteis uſtis, & arithologia rotunda. Omnium tamen maxime uſui erunt aquæ Thermales montis agrotorum, utpote quarum vis præſens ad ulcera antiqua, admiſſantur per clyſteres, vel inſectis ſuſa; in ſiſdem tertia tamen quaſque die obliniri poterit pars affecta ſevo hâcino, arque ex ipſo turunda parata continenda in ano, ad emolliendum callum, qui deinde ardeatur detentioſis validioribus. Quæ ſi ſuſſa fuerint & deveniendum erit ad ignem, parata cannula undique ſectâ perſuſa, in podicem inſerenda, in quam deinde immittatur ſerum candens, idque ter, & quater in die; nullum enim præſtantiuſ, & tutius remedium in ulceribus antiquis purtidis ineſtini recti expertuſ unquam fui. Aquis Thermitibus propoſitis, inſiciendis addentur aloë, thus, & ſarcacolla, ad majorem exſiccationem; tandemque appllentur ſarcocia, ut beronica, matryſſyla, plantago, & oſſa cremata, cum vino. Ad compreſſendam autem jecoris fervorem abſque ventriculi noxa, conferat aquarum Thermitum frigidarum internus uſus, decem aut 12. dies, cum diureticis, quo ad urina vias petducantur.

Quibus addatur congrua victus ratio prædicta portione reſpondens. Ita namque ipſo fore, ut priſtinam ſanitatem conſequatur Nobiliſſima Matrona. *idem ibidem.*

De Fiſtula antiqua, & Condylomatibus, cum ſſere. Pro Nob. Florentino.

Tor, & adeo refractarii ſunt affectus Nobil. priſtinentem divexantes, ut nec ipſius Apollinis manus debellari poſſint; ex ſide Vitorum Præclariffimorum, qui ad nos ſcripſerunt, ut propterea medica expoſitæ præſidia, non pro hojus ſalute, ſed pro vite ſaltem prolongatione. Fiſtula namque antiquæ in podice ſemper curæ difficilis, ob fixitatem & humiditatem inſignem portis affectu, continuamque incrementorum colluviem; magis verò profunda, ſordida, verminosa, & rabo Gallico infectæ; detentioſa autem, & magis rebelles, quando perforat inſectinum. Ita ut ſæces tranſmittat per ulcus; hæc tamen vita in longum protrahatur. Avençoræ teſtimonio inſer Arabes, & Marthi de Gradi inter Latines, hiſtoriam reſerentis Medici Ticinienſis de Filbertis, qui feces per ulcus exeret 2 annos viginti coacti non. Quod ſi ulceri antiquo, ſiſtuloſo, profundo, cacothi, verminoso, & Gallico accedant condylomata, ſive carnis excreſcentiæ, longis inſecutibus produnt affectum, ob conſuſum ſanguinis vitioſi, & melancholici; quem ſane in Nobiliſſimo invenne prædominari conſpicere facile eſt ex deſcripto ejus temperamento. Quando verò decennio ſere inſiſſe variis medicis præſidiis ſitæ, & ex lege præceptis cum aſſumptis, tum applicatis, non ſolum non reſiſt æſtus, ſed in dies magis invaſit, veſicæ collum erodit, ira ut feces, & ventris crepitus cum lotio emanantur; quo prioris modo id à Felnetio poſſum eſt. de Partium morbis & Symp. Caput vel ſaltem urine craſſe, ſordide, & ſanguinolenta coſpicit, cum ipſius oſſis ſicci aliqua labe, atque omnium circumpoſitarum partium. qui locus quæſo fuerit ulli medicis præſidiis? Accedente verò his omnibus ſub hecetica, rabida, maraſmode, cum grandi corporis macie, ut oſſa ſola cute teſta videantur, viſibiles adeo proſtratis, ut ſemper decumbente cogatur quæ ſpes eluceſcit de vite prolonganda? Quinimo perſens impendit necus, ne adveniente eſtate, detentora ſint omnia, viſibilesque collapsi, ſuccumbat tandem pariens; ut propterea vite in promptu niſi ſi, quo vita quidquam ejus proſigetur, quod à Viſis doctiſſ. & in arte veriſſimis hæcenas non fuerit præſcriptum.

Quare ſicuti ſummopere laudo quoad partem affectam, frequentem ulcerum detentionem, modò aqua Tetratiana, & melle, modò vino in quo ebulliant ſcodium, matryſſyla, lupini, & ſabæ omniſſis cauſticis, validioribusque detentioſis; ita non in conſultum cenſeo eam corroborare ferro candente per canoulam ſectam longiore à latere undique perſuſam, intra podicem ſimel ac iterum ſingulis diebus applicato. Hoc enim unico remedio vidi fiſtulas Gallicas, putridas, & alias multos annos, abſque ulla noxa durare; norum tamen ad hæc calamitates perducas. Ratione autem febriſ, ſi vires ſerent, ex ſe eſt conſilio maraſmum torridum in ſenilem mutare, per refrigerationem corporis balneo æquedulis, adminiſtrato ex Gal. præcepto in Methodo medendi. Et quanquam alias non admodum proſuerit decoctum radicis chinæ, atque hæc non fuerit adeo familiaris nature ipſius; utrumque nihilominus ſerum præſcribendum exiſtimarem. Omnia enim ſecundum rationem facienti, licet non

non succedant, non est ad alia tranſeundum, itante eo quod à principio vitium eſt, ex Hippoc. decreto. Quod licet locum habeat in curativis intentionibus, non autem in marctis remediis: attamen in caſu preſenti etiam iſdem prædictis medicis occurrunt aſtractis inſiſtere, atque aliquot dies decoctum radicis chinæ repetere, cum carne porci, tritis, & caſidis cancerorum paratum, ita tamen ut in ipſo deinde fiat contuſum pulpe caponis nutriti carne viperina. Si namque erit medicamentum olium roſum. Quod ſi in ipſo diſſolvatur ſempulvus magiſtri peſtium, vires quicquid magis inflauabit: exhibito deinde cibo modica quantitate, faciliſ coctionis, & ſubſtantiæ; cuiusmodi erunt ova tremula, capſum vel contuſum perdicum, teſtes gallorum juniorum, gelu ex carne caponis, cum ſucco citri; & morſelli ex piſtaciis, nucleis piſeis, amygdaliſ dulcibus, pulpa perdicis, & nucleis indiæ, cum ſaccharo, & aquæ ex fl. citri, cum quibus aſſumet aliquando unum vel alterum coctilear aquæ vitæ ad inſtillandas ſeres jam collapſas, à Quercetano deſcripſe in ſua Pharma-opera Reſtituit. Poſt uſum autem prædicti decocti aliquot dies, lac præſcribitur, primo arte paratum ex nucleis piſciſ, piſtaciis, amygdaliſ, & ſeminibus melonum, in ſere pinguis caponis, cum ſaccharo; tandem vero & naturale, idque aſſinum, ſi mulieris non fuerit copia, ex mamellis exuſum, aut cum modico ſaccharo, & buccella panis, ubi per unum emuſum fuerit, dummodo venter flatibus non obſtinet, Quod ſi redundant, cum aliqua imbecillitate ventriculi, præmitti poteſt ſilicidium ſupra ejus fundum ex oleo abſinthie, amygd. amarum, chamemelino, & malychi, cum vino albo generoſo ad penetrationem; munito deinde roto abdomine ſummitate præpuræ prædictis oleis imbutæ; ac deinde lac vel humanum ex ubere, vel aſſinum, cum quarta parte mellis Hiſpani, loco ſacchari, ex Gal. decreto 7. Meth. modendi præſcribitur ad nucleas quatuor, vel quinque ad ſummum ſingulis maturis horis in auroa, præmiſſa parca cura, quo ventriculus vacuus ſit; atque ſecunda quatuor vel quinque dies periculum fiet ejus tolerantia. Quod ſi nullam noxam inde capiat, & facile ſeriet, continuandus erit uſus ipſius aliquot hebdomadaſ; non oſtendiſſa enim totius corporis inundatione oleo amygdal. dulcium, facta blanda ſuſtione ad reuocandum ſanguinem, & retardandam corporis exſiccationem. Ex hæc adnotanda duxi Vletorum præclariffimorum mandatis obſecrandus potius, quam ut magni ſote uſus ſperem. *Idem iſdem.*

De Vlcere antiquo Intefini reſi. Pro Illuſtriſſ. Equite Maſſeo Ferrarienſi.

Rogatus ab Illuſtriſſimo Marchione Pio ſententiam de Chirurgica operatione pro ſalute Illuſtriſſimi Equitis Maſſei interuenero recti inteſtini ulcere laborantis, propoſita, inteſtini nempe quædam extractione, atque aſſione, inſiciati ſanè non poſſum, à Chirurgicis celeberrimis ſolertia, & uſu, nonnonquam præſtari quædam miraculis præquam ſimilia: quemadmodum & legi ab ipſis ex dorſo & regione renis tentam ipſum cum extractione calculi, patientiſue ſalutæ ſectionem, rem proſecto longè diſticiſſimam. Quare & operationem propoſitam quod attinet, illam eorum periciæ lubens committo: quam tamen & periculi plenam eſſe, & male ceſſuram exiſtimo. Tamen enim non ignoro, inteſtinum rectum partem eſſe, quæ loco dimoveri, & foras probabi poſſit: quod pueris non raro accidit, ob laxatos humiditate muſculos, nonnunquam & nixu maior parturitibus,

arque idcirco lubens fatear vaſiſſimorum emollientibus, apique inſtrumentis inteſtinum id à Chirurgo extrahi, detergeri ulcus, atque poſſe: cum tamen ſemel diutaxat admoſto igne ſubſequi haudquaquam poſſit atque adeo curatu diſſiciliſ, inuenerat ſcilicet, ſordidi, profundique ſanatio, Chirurgia hæc quid allatita ſit emolumenti non video. Forſis certè ſilicidium inteſtinum longè maximam ſubſide gængeæ periculum. E-dem veto mo ab uſione intro reducto, quid aliud ſperandum, quin exſtata recedente, ſitu ulceris preſtito ſimilimus? Neque enim de ſectione hæc cogitandum. Eſto tamen (quod im-poſſibile ego quidem iudico) ſiccat ulcus hoc, ſanauit modo prædicto poſſit, non poterunt certè non impetere continuè ab inteſtini prociſione moleſtæ. Neque enim quamvis exlicato, ac cicatrice obſuſto ulcere, tanta unquam eſſe poterit laxitatis partium corroboratio, ut continuam inteſtini preſſuram prohibere poſſit, ni idipſum centum globulo idoneo, ſalutique compente coarctetur. Hæc mea ſuper ea te ſententia. *Idem iſdem.*

De Vlcere ſyſtola in podice: Pro Illuſtriſſ. D. Georgio Nani.

Aſſectum Illuſtriſſimi D. Georgii: eſt minus mihi, quam Viciſ illis Excellentiffimis, qui ad ipſum Venerii, diutius continuè inuenerunt, cognofcere licuit, Excellentiæ tamen totæ Illuſtriſſimæ gratiam morem, quæ mea ſit de mali huſus natura; ejuſque futuro ſuccoſo ſententia pau. ſis apriam. Malum hoc ex uſcerum eſſe gentie indubitatè pronuncio, quod & à paucis jam menſibus etiam ſuſpicatus; argumeto ſuſtat ex uſceris materia qualitas. Neque enim id quod eſſuere ſoler, ſimplex pueri eſt, ſed materia quedam cum nodica pterumque ſanguinis portione petnixa. Sed neque ex venis hæmorrhoidaliſ, ut cenſent, manat hic ſanguis. Eſſet enim & copioſus, & ſtoridus, & à quolibet materia ſeſunctus, ſuoretque vel ad mediocrè conatum ſemper, & à paritibus ano cicunpoſitis emanaret. Hiſ autem omnibus conditionibus ſanguinem, de quo nunc ſermo, videmus diſſertum. Etenim neque multis ſi unquam eſt, neque expertus putredinis, neque à reliqua materia ſeparatus; ſed & lotis aqua thermalis illis paribus, ejus ſiſtitur fluxio; atque ab altiore loco eundem profluere ipſi nos cum ſpeculi beneficio explorauimus, cum ſtylo argenteo goſſypio involuto alius immiſſo, neque ſine ſanie extracto. Accedit, quod quæ ſpeculo adhibito videri potteſce partes, viderimus nec abſque carne ſuperflua exulceratas. Verum non unico ulcere conſtat malum hoc. Viderè enim mox ulcus eſt in ani extremo ſub ipſis hæmorrhoidibus, in ipſo dein progreſſu excoſatio multa ſpeculi beneficio detegitur, non ſine metu ne aliud intus diſtrectat, quod à ſpeculo, aut etiam ſtylo deprehendi non poſſit. Materie enim excrentis & copia eſt maior, & terminor à quo, quod partem altior, quam ut univerſam ab iſi, quæ videri poſſunt, ulceribus promanare ſtatimur. Quare cum neque alienas momenti adit dolor, internam quandam adſeſe fiſulam non levi ſuſpicionè adducor tamen hæc de re Excellentium tuam Illuſtriſſimam certam reddere non poſſum.

Utut ſit, non leve ſine eſt hoc malum, cum quod partim fit hæditarium, quod imbecilli, humidoque natura ſit loco, atque inueteratum; tum etiam quod continuè ab prauorum univerſo corpore humorum affluu ſoveatur. Quapropter & quod boni ſugurari poſſum

possum non video. Neque enim facile crediderim eam fore Illustrissimi Domini Georgii patientiam, quam diuturni adeo, atque pertinacis mali curatio exposcit: quinimo pronunciare ausim, hunc ejus affectum eodem, quo Illustrissimi Domini Antonii ejus parentis, successu fruendum. Quod tamen prognosticon haud difficeret usque ad id rati esse, quin sperare liceat fore, ne Illustrissimi patiens diuturno usui praedictorum, vichique praescripta ratione, sanitati tandem aliquando restituarur, quam eidem a praepotente Deo toto animo enixe precor. *Idem ibidem.*

De Fistulis Ani, Pro Nobili Polono.

Ea est affectuum pertinacia, qui à decennio Nobilissimum patientem ex recit, ut de ipso sanandis nullas asperet spes; adimplantibus etiam Vitis doctissimis, qui ad nos scripserunt, adeo ut medica solummodo admittant praesidia, quorum ope vita saltem longius protrahi possit. Fistula siquidem antiquae anni semper sunt difficiles, ob fluxionem, imbecillitatemque panis affectu difficilisque sanantur, quando sunt fortidae, profundae, & verminosae, virulentiae Gallicae participes: periculosum verò, quoniam perforant intestinum, ita ut faeces ex ulcere effluant; cum quo tamen affectu vitam longius protrahi possit, prodidit Avicenna, & Matthaeus de Gradis, qui refert historiam medici copiosam de Filiberto Papientis, qui intestino perforato, & faecibus per ulcus erant emittibus vitam traxit viginti, & plures annos. Quinimo, intestinis perforatis, & ventre ipso, adeo ut faeces illae transmittantur vivente aegrotis, prodidit Avic. Prima. t. Fem. 6. Tract. 1. cap. 1. Neque lethalis omnino esse solet ani fistula, licet vesicam emulcerans, ut succedat nichilo fecum, & puris, crepitulique per pondendum, testimonio Fracastori Lib. 6. de Partium morbis, & symptomatibus Cap. 11. Quod si ulceri antiquo, putrido, sinuato, Gallico, intestina perforanti accedant cumis exercitiae, seu condylomatosa, longe magis incurtabiles exhibent affectum, ob confusum sanguinem vitiosum, & melancholicum quem sane in nobili patiente praepolite conjicere est ex ejusdem tempeamento. Verum quum toto fere decennio variis medicis praedictis praesidiis, cum internis, tum externis non solum cessaret affectus praedicti, quin potius in dies magis convalesceret, quibus accessit fibris critica, tabida, & marasmodus, cum corporis macie adeo gravi, ut ossa pelle obdulta supersint, virelique adeo prostratae ut continuo sit ipsi decubendum, non modo valentia adipiscenda, sed neque longioris vitae alicui spei locus est, quin potius moriendum ne sub aetatem in denerius omnia labantur, virelique quam collapsae tandem fatiscant: ut propria vix mihi superflua quod illis addam, quae à Vitis doctissimis fuerunt haecenus usitata ad vitam longius saltem produciendam.

Quare si necesse laudo summo opere frequentem ulcerum deteriorationem, modo aqua Tenuisana, modo vino albo in quo bulliant matricaria, lupini, addito mucosico melle; omissis omnibus causticis; & valde oleosis detergentibus: ita non inconfutatum censeo exsiccate validius, & corroborate partem illam affectam ferro candente, per cannulam ferream perforatam ad latera intra podicem iterum ac tertium in die infero, nec diutius detento. Ratione verò febris marasmodi, si ferant vires, consultum esset ex Galeni consilio curare ut marasmus torridus in senem fuerat, refrigerari, & humectato corpore balneo aquae dulcis, ex Galeni praescripto administrari in lib. methodi medendi. Et quanquam alias non magno fuerit usui decoctum radices chinae, atque lac

naturae averanus fuerit; utrumque nihilominus iterum teneandum existimarem, exhibito decocto radices chinae quindecim dies circiter, parato cum carne suilla recenti, tanis, & cancrorum caudis; in quo deinde fiat confusum carnis caponis, nutriti carne viperina. Ita nanque fiet medicamentolum. Quod bis in die exhiberi poterit, interposito paucis cibo mediocriter quantitate, & facili concōctione, purioris fortidibus, pulvis Indici, vel testiculis medicamentorum, aut gela ex carne caponis, cum succo citri mortellis etiam ex pistacis, nucleis pineis, amygdalis ducibus, carne caponis, & pulpa uncis Indici à quo lac ipsum erit accommodatissimum, primo quidem atre paratum, aliquot dies, ex emulsiōne seminum flegmorum majorem, nucleis pineis, pistacis, & amygdalis ducibus, in quo dissolvatur syrup. sem. magistria pelatum, deinde & naturale asinum, cum modico saccharo, & mica panis, ad uncias quatuor circiter: nisi antea ex usu vitium fuerit Vitis praedictissimum peticulum facere lactis muliebile ex ubere exsucti. In quorum usu carnis purissima fiet, quo usus lactis tempore ventriculus sit junius. *Idem ibidem.*

De Fistula lachrymali quatuordecim supra capite de Aglype fuisse egerimus, perplacet tamen hac rursus adaucere ejusdem historiam satis raram, ac primò responsum, quam dedisti informationem parum accurata mihi super hac re transmissa, cui subnectam morbi integram historiam; qualem scilicet habui postquam Nobilissimum Agram, Lausannam hac de causâ profectus adivi.

Ex his omnibus quae per epistolam ad me transmissam significata sunt, satis agnosco fistulam lachrymalem affligi Nobilissimum Matronam, ac non indidem constare, an eminentiae omnis jam facta sit experta, hocque fistulam quam Chirurgi Galli *Fistule plane* vocant continere, & an omni prorsus caries subiectum curetur, nam etiam specillo exploratio ubi curata non sit, non indidem tamen concludendum nullam adesse, siquidem specillum commodè, ac pro arbitrio non movetur, ac voluitur hinc in partibus delicatioribus, nec caries ita incisionibus petalidis sepius per subiacet, quia multi sinus arduiores, ac variè conroti saepius ad eam difficultate deducunt viâ. Suppono interim Medicos ac Chirugos in hanc exploratorem adhibitos, nihil quod exquisitioris accusationis sit omisissè, & ea propter tantum novam medicari operam rationem, quod per viam sibi primò locum paratam ad morbi penitiores penetrare radices non datur: Verum liceat mihi opponere, 1. quod si fistula de qua agitur omnis prorsus eminentiae sit experta, vix concedatur distinguere quò denum incidenda veniat locò, pro cura perficienda, quòdque etiam si fistula pus multum eructaret, elevationem satis sensibilem praeberet, unde innotesceret subiecta caritas, attendendum foret an ne, cum Domina Agra junior sit, fistula eò locò ponatur, in quo, caute absente, commodum fuerit dilagationem compressivam adhibere, sique curam, quam non semel expectavi sum, peragere. 2. Videndum si fistula ejus fuerit conditionis quae incisionem necessariam exquirat qua in ipsius devianatur fundum, sive sit: sique ossi adnatæ illius ea lem obtergentes remediis absumi queant, videndum inquam, cuius loci operationis esse debeat, quò scilicet fructuosior, quàm prius celebrata, evadat, quod non levis si difficultas, dum

pum interim errores in hoc commissi, incisiones saepius multiplicare cogunt, & vultum non parum deformant; sic aliquando vidi à Chirurgo, quamvis periculis, rotam prope oculi circumferentiam fixis violatam, quia dum caries in ipso oculi angulo parvibusque viciosis exquirebatur, inde ad os Zygomatis partem temeriosam, ubi posita erat deveniendum fuit. 3. Quamvis mihi non satis perspectæ sint omnes Medicorum assensuum rationes quibus ad appetitionem cæteris potentiali sibi parandam inducitur, non possum quin egeram ejusmodi applicationem non parum secum vehere periculi, dum scilicet non ita penes nos est illius actionem cohibere, quin saepius ad ipsum oculi canthi majoris ligamentum pervadat, quò cecidit, vel nimium debilitat enascitur morbus qui Rhys dicitur, quique præter alia incommoda non parvam deformitatem inducit. Adde quòd etiam si tale quid non contingat, semper futurum sit ut turpituudo non mediocris de cicatrice resistente enascatur; i quoque tam promptè quandoque molliorem pervadat eutem medicamentum, ut ad os nasi spongiorum levique tantum pellicula indutum liberius permeat, illudque suâ acrimoniâ cicatræ afficiat, ac inflammationem in viciniam accersat per exagitationem ac fermentationem salium, & resolutionem facienti invidiosum, quam procurat. Unde patet ad hoc præsidii penus non esse descendendum, donec alia omnia inutilia oculos videantur super his autem non est quòd determinatè pronunciemus, præterquam ægritudinis examen diligenter perferemus Medicorum ac Chirurgorum ordinatos adhibemus.

In sequentiis cum Lausannæ vissemus, prætervisis examine novimus de morbo ea qua jam supra paulo enarravimus.

Nobilissima Matrona D. B. annos circiter, 23. nata, fistulam lachrymalem juxta dextræ oculi angulum majorem gessit, qua conservatur pus copiosum, illudque crassius aut tenuius, pro ratione temporis quò in parte afflicta commoratur. Per se autem non evacuaturs pus aggestum, sed tantum expressione factâ per immisionem indolis inter oculi globum ejusque orbitam, illo spatio quod canthum inter majorem ac minorem medium interjacet; digesto, tunc aliqua vi adducto per punctum lachrymale inferius non minori eructatur vehementia humor quàm si per syphonem traheretur. Inò si materia contenta intra cili longius siccò copiosius aggesta sit, quòd si rarius est ac lymphidus sub lachrymanum forma effluit quidem, sed parvè admodum. Præteritis temporibus compressâ parte affectâ per canalem lachrymalem pus transmittebatur ad nares, verum cum à sepe jam multis glutinosioribus ipsius cuticulæ hanc sibi viam clausisset, ad supradicta necessario illud refuit, unde non mirum si canalis superior pars hemisphaica facta sit, inque ea quam passus est dilatatione continetur, vix humorum ad cochleas mediocriter quantitate, si modò per eam horas non comprimatur. Originem hujusce fistulæ repetunt ab icili ex ipsâ infantia oculo infuso enata est magna inflammatio, quæ eam in glandula lachrymali reliquit alterationem, unde suspectus sit continuò humor, qui per ostium canalis lachrymalis inferioris, seu punctum lachrymale inferius, expurgatur, lymphidus primum vilis est, donec alteratione sensim aucta purulentus evaserit; nec hodie totus ab ipsâ glandula detrahitur, sed etiam à carnis ab membranis glandulosis superiori prædicti canalis parti adhaerens, in quas proculdubio liquor desuper clapsus, acrimoniâ suâ eam irritationem ac debilitatem fecit, quæ in quâ sit quòd ea fuerit nutriti quæ

in eas contrivatur, lymphæque excremētæ etiam portio in pus abeat, & à multiplici hæc icatrigine tam copiosum promanet. Si per ostium canalis lachrymalis quod hic, non parum dilatatum reperitur, nobis licitum fuisset solum argenteum tunc inducere, facilè de carie, an scilicet in intra orbitæ fortitan addit, (quod aliquando vidimus) constitisset. Verum quandoquidam præ metu irritationis ac inflammationis molestæ sic procurante, ab eo atcebamus tunc, conjecturaliter tantum hæc in re pronunciamus; scilicet, tunc ex qualitate humoris profluens, qui nec odore, nec colore cariem arguit; tum ex caribus superstitis quæ nec livent, nec dolent, quantumvis quotidiè vehementius pro educendo pure comprimantur, tum ex oculi globo emollescente miculis, ubi nec rubor, nec ad alterutrum lapsa illa tractatio apparet; tum ex ipsius glandulæ lachrymalis colore qui satis naturalis est, nec aliqua fœdatur ulceratione aut erosione. Exinde enim probabiliter admodum deducitur materiam excretam maligniori non esse sortis, aut intensiori acrimoniæ, sicque hæcenus valis suis quantumvis dilatatis coacti potuisse, ac ea minime sic perituisse, ut ad nudum os pervenerit. Quod etiam faillidè deducere est ex eo, quòd humor toties compresso suo siccò per punctum lachrymale effluit; si enim peritrusus foret canalis humorque in orbitæ cavum, aut extris ad eam influxus liberius vagarent, quidni sibi alias pro exitu requireret vias? Verum quid hæcenus magno ægræ dono, infectum est, non sic impossibilem semper persilabit, ni totis viribus & derivetur & mitigetur humor, oculisque cum adjuventibus partibus corroboretur. Caries autem hæc in parte èd periculosa sit, quòd vix ac ne vix quidem medicamenta aut operationes necessarias pro sui cura admittit. Pro humore evacuatò propinquat nati perforatio juxta oculi majorem cuticula, at hæc operatio minus fructuosa foret, quia etiam prima mali origo in glandula lachrymali fuerit, illius ad vicinas & inferiores sibi partes contrivata est, ac eamque constitutionem ita vitia vit, ut copie materiam quæ jam excrementum præcipue faciant. Jam autem quis non videt perforationem propinquat sublimiori perficiendam loco, quòd atque deinde valeat humor inferius infra oculi orbitam aggestus, ut sic commodè exhaletur? Itaque donec tumor aliquis exteris enascatur quò incisio ad cavitate fundum pergere deat. (quod vix possibile credimus) cogemur curæ insistere palliative, cuius fructus aliquando lætior malis evadit; quàm quod nobis primò polliciti fueramus. Hæc de causâ ut emissarium aliquod aperiremus humori, sitacutur omnino conducibile foret, sed delicatior Nobili. ægræ constitutio, illiusque pro tam generoso præsidio summa aversatio, nos in cauteliò in nichil continuo ingrand jam coniecit. 2. Semel singulis septimanis corpus expurgabit ægræ; & quandoquidem ventriculus purgante ordinaria tolerata non valet, hoc commodè fiet per infusum thei & senæ cum paucis sale prævulle, quò vice aque communis p rabitur potus cocti, saccharo edulcorandus, & aqua naphæ aromatizandus. 3. Serum in genere absumet, & ejusdem acrimoniam non parum obundet si in potu ordinario utatur, loco aque communis cum vino, decoctò tenui radicis chinæ, salicæ, vici quercis & ligni leni. 4. Singulis noctibus cubitum ita oculo affecto, nateque ejusdem lateris excipiet fimum, quò de pugnili uno aut alteri pulveris in carbones immixti elevabitur; qui pulvis ex mastiche, olivand, myrrhâ, succinò & sanguine draconis, cum paucissimis acrimoniæ cinnabari paratus est; continuoque

post fumigationem apponet oculo luteola conduplicata liquore balsamico, è myrrha, balsamo verò & Tolosano, extractis. 5. Imponer capiti sacculos cephalicos è succino, mastiche, gummi elemi, benzoin, flor. lilior. convall. falvæ, anth. betonica, confectos, addito balsamò verò. 6. Subinde de die atstahet in nases pulverem nasalem carathis educendis non parum aptum &c. His D. O. M. benedicat. Datum Lautanæ die 6. Martii ann. 1693.

Remediis præscriptis omnino convalescit ægra, & post multos annos oculi sana ex inflammatione palpebrarum obtuit.

Observationes.

Levi Aeff dem Sande Hildenæ, consanguineus meus, vehementissimo dolore cujusdam dentis molaris vexabatur. Adit barbitonforem, qui fracta dentis eminentia radicem in alveolo reliquit, inde continuato dolore eoratus est abscessus circa dentis radicem, quo rupto exterius paulatim remisit dolor, ulcus verò (quod nullo modo consolidare potuit barbitonfor) in fistulam degeneravit. Diversorum Chirurgorum consilia imploravit: sed frustra, donec ego quinto post anno ad paternos lares reversus, curationem Dei beneficio infra scriptis remediis feliciter absolvi. Instituta optimâ victus ratione sequentem exhibui potiunculam.

℞. Pulv. Passiflanti ʒj. detur cum decocto betonica, falvæ, rosmarini & majoranæ. Postidie venam in cubito incidit. Deinde materiam in capite sequenti decocto preparavi, & leniter purgavi.

℞. Herbar. & flor. betonicæ, scab. yeron. culcitrae, agrimon. an. m. j. Gummit. rosmar. major. flor. falv. & primul. veris an. m. ʒ. sem. anis. fenic. an. ʒij. liquirit. ʒj. Coquant. in aq. ad consumption. te tiz parietis. Hujus colaturæ per triduum in autota calidæ ad ʒiv. melle despangeo dulcoratæ, exhibui.

Postea. ℞. Eisdem decocti colaturæ ʒj. fol. fen. mundat. ʒij. agar. recent. trochiscat. & rhabarb. elect. an. ʒij. Maneant in infusione horas 24. deinde iterum leniter calefacta, fortiter exprimantur. Expressioni admisce syrup. de betonica & rosar. solut. compos. cum rhabarb. agar. & fena an. ʒj. M. f. poco pro 4. matutinis. Tandem sumit sequentes pilulas.

℞. Mass. pilul. aurear. & aggregativ. ana ʒiij. trochisc. alhand. & diagr. an. gr. 4. Cum fyr. de starchad. formetur pilol. 5. que diluculo sumantur. Preparato facis corpore radices deoris effodi, callositatem verò fistulæ unguento quodam caustico absumi & ulcus unguento de succo apii mundificavi, tandemque cicatricem emplastro dialcith. & pulv. alum. usq. induxi, sicque curationem spacio 30. dierum feliciter absolvit *Fabr. Hildan. Obser. Chir. Cent. 3.*

Juvenis quidam Colonienfis non ea obicitâ famillia oriendus, cum simili morbo laboraret, in manus barbitonforis incidit, qui variis & per mentes aliquot frustra adhibitis remediis, tandem me consuluit, & quidnam amplius agendum esset à me inquisivit, cui præscripam methodum fideliter communicavi, q. à & brevi sanatus fuit æger. *Idem ibidem*, ubi rursus duo alia adducunt exempla quibus ulceris confirmatus quid valeat methodus descripta: sed etiam rursus ex Clariss. Hildano aliud exemplum.

Invetrata ac deplorata inferioris maxilla fistula quomodo curata.

Nobilis matrona Basileæ, ea morbo acuto sinistrâ restituta, & fluxione ad dentes inferioris maxillæ sinistra lateris, cum per multos menses vexata esset, nec dentem, ad quem carathis decumbebat, sibi extrahendum curasset, tandem radicem ipsius exorta inflammatione & dolore maximo generatus est abscessus. Quo ceteris rupto remisit dolor: aut quod inter masticandum & loquendum, molestiam doloremque aliquem semper sentiret, ulcus in fistulam degeneratum per snnos quatuordecim apertum remansit. Interim etiam variotum Chirurgorum consilia auxillaque imploraret, multa tamen frustra tentavit. Nullus enim de extractione dentis cogitaverat, imò potius extractionem omnes dissuaserant. Ego cum ann. 1610. Sereniss. Princ. Janusio Radziwilio Lithuanie Duci, in difficili ac longo morbo operam meam impertirem, ad matronam quoque hanc (quæ jam feagelium annum ætatis prætergressa est) accessus fui. Tum superiorem partem dentis, ad cuius radicem fistula erat, ad alveolum ferè usque erosum inveni. Semel atque iterum expurgato corpore radicem dentis extraxi. Postea rursum unguento nostro ad callositatem absumendum imposui, etiam callositate pulverem præcipitatum quotidie inspersi, & emplastr. palmeum applicui, nec medicamenta hæc mutavi usque dum ulcus perfectè sanatum esset, quod intra mensem contigit. Radix autem dentis erola, inæqualis, & materia quadam lapidosa per laminas disposita, obducta erat.

Pro Fistula in dorso à Scapula ad lumbos pertingente.

Purgato corpore potionem hanc vulneratam præscripsi.

℞. Rad. consol. maj. ʒij. rad. bistort. aristol. rot. dictamo. alb. an. ʒiij. herb. pyrolæ ʒij. consolid. Suracen. ʒij. fol. alchimil. agrimon. equiset. beroc. ʒ. hyperic. ros. an. ʒi. sem. hyperic. pers. liar. an. ʒij. ocul. cancr. ʒij. F. omiojum pulvis: caput samaræ tenuis pars, & coq. in mensuris quatuor vini albi, & mensura una aq. plantag. coctus & fervetur ad usum, addendo Sacchari quart. j. aq. cinnam. ʒj. bibat de eo manè jejunos cyathum unum, & sub vesperam horis duabus ante cenam tantundem: ita continuando donec reliquæ pulveris partes consumptæ fuerint. Inretia dum hoc decocto nititur, injectionem sequentem per Syringam in ulcus indies infundat.

℞. Succ. apii officin. succ. plantag. & agrimon. an. ʒij. succ. rabacc. ʒiij. mell. ros. ʒij. vini rub. ʒj. dissolv. chalcane. alb. aluminis tartari, an. ʒj. vel plus dum sordidum adhuc est ulcus, & purgatis, autipigment. an. ʒʒ. F. inj. cito. Cum supra & infra pateret ulcus, ut siccaretur, fumus per canalem infundibilis in humilior ulcus fuit intromissus, tandem donec per superius ulceris foramen prodiret, sicque interioris omnes cavitates pervasisset.

℞. Mastich. thoris an. ʒʒ. myrrh. ʒij. benjoin. storac. an. ʒij. farcocoll. pic. resin. pini, gummi elemi, an. ʒj. F. Pulvis carbonibus inspergendus pro fumo. Postquam coram hanc per injectionem & suffumigationem aliquot septimanis continuasset, integrè sanatus fuit. *Felis Platerus obs. lib. 2. pag. 568.*

Scholiſtus quidam octodecem annorum in præſore dia habebat Fiſtulam, ex qua effluſus non tantum aquoſum pus. Hæc à me curata ſic fuit, mane & vesperti poſtquam exiit omne pus, legeri per Syringam oleum heraclinum, ac poſtea foraminis fiſtulæ rurſum magis impoſui, ut maneret aperta, atque tali proceſſu quotidie penitus conſanui. *Martius Rulandus, curat. 39. cent. 8.*

Dominæ quædam juveſcula fiſtuloſis ulceribus pluribus locis pronupentibus multum debilitata, poſt expertiſſimorum Chirurgorum irritos plane conatus, & cum ab omnibus pro deplorata haberetur, tandem brevi temporis ſpatio ſequentis remediî uſu integre curata eſt.

Abſynth. & menth. an. Mi. millepedum bene conſuſo, (dempsit prius capribus) 30s. Sacculo omnia includatur, qui ſuſpendatur in cerviſi, tenuis pinis verr petacta fermentatione, capiat hauſtum de ea his terve in die, plurimum præſtant millepedes la fiſtula & mammillis exulceratis, modò non ſint cancroſæ. *D. Rob. Boyle. lib. De Ulcer. Naur. Philoſoph. part. 2. ſect. 5. cap. 5.*

Cultri oblongi dimidium lumbis infixum, bienſio poſt extractam eſt, reliquæ inde Fiſtula ſanata.

Anno 1599. adit me juvenis tobaſſificus optime habitus laborans peranguſtâ quidem, ſed profundâ & perpetuò dolorificâ fiſtulâ, ad dextre: m. p. n. doſi pariem, circa quartam vertebram lumborum. Iſ narrabat, ſibi ante biennium colto illarum vulnus, in quodam romulo, quod à nemine hæcenus curari p. u. iſſet. Dilatata fiſtula trochileis de minio & ſpongis preparatis, itera radice gentiæ, iuveni in ſua parte oblongi cultri dimidium, cujus mucro deſixus fuit later terulam & quartam vertebram, reliquum callo obſectum, ſuſcio callo extraxi cultrum. Exin mundificati ulcere, com pulvere præcipitato, & unguento quod Apoſtolorum vocant, juvenis brevi tempore convaluit. Id autem hic inſigne eſt, quod à volente accepto, ad extremam curationem, via unquam ſubſtitit; nedum piſſus ſit inflammationem, ſpaſmum, dolorem acutiſſimum, & reliqua ſymptomata quæ ſolent ſaucio dorſo accidere graviſſima. Anno 1632. Cuiſiſtadinam proſectus eſſem, prædictum virum in arce Neſſitro prope Duſſeldorſiam, apud generoſum Virum Dom. Willhelmum Kell. rum & c. uſus tam temporis, quamvis fœx, erat domeſticus, vidi: qui & coram generoſo ſuo, omnia quæ acciderant expoſuit, ſeq. ab eò tempore, quo à me curatus fuit, quàm optime habuiſſet conſtante aſſiduâ Gualtero. *Fabius Hildau. deſ. Chirurg. cent. 1.*

Fiſtula ex parotide orta.

Senſoſus quidam circa annum 22. ſtatis abſceſſus ſub aure dextra (parotide vocatus Medicis) conceptus fuit, qui quoniam paulatim in fiſtulam abiſſet per tres integros annos ſiſtera à barbiton: oribus excruciatuſ fuit. Tandem 28. Julii Ann. 1720. cùm Bernam veniſſet, & mihi adductus fuiſſet, fiſtulam circuloſam, inveni; exterius in cute duo ſalem erant foramina anguſtiſſima, quorum unum ſuſum verſus cranium tendebat, & in duos ſinus dividebatur, alterum deorſum verſus jugulares venas deſcendebat. Sed omnia inus erant caſoſa, Optimi præſcripti victus ratione, ſemel quin etiam acque iterum expurgato corpore, equiſticò m. c. autem quæ

fiſtulis adquebat, eroſi, & deſtituti, nec non unguentum baſilic. ad caſum eſſe h. applicui. Deinde eodem cautiſcò, nec non pulvere anguſticò, diſtingenter rectificatò, callolitates omnes præſertim abſtinui, ita ut intra ſeptimanas ſeptem pleniffime convaluerit. Poſto in ejuſmodi curationibus diligenter attendendam, ne quicquam de cute à muculoſa carne ſeparata, & venis capillaribus deſtituta, remaneat. Conſolidationem enim impedit. Er quia illa in primâ applicatione in noſtro ag. d. propter callolitarum inſignem eroſa non fuerat, applicationem cautiſci aliquoties iteravi; ubi diligenter proſpicendum eſt, ut quærat cautiſci, cum cute, quæ erodenda eſt joſtem, & ut dicimus, ad pondus habeat proſorptionem. Et ita quidem ut partes integre & ſane conſerventur, male affectæ verò deſtruantur. Id autem rectè ut fiat, necesse eſt ut Chirurgus optionem habeat notiſſiam ſculturæ ſui cautiſci. Deinde etiam ut naturam ſubjecti cognoscat, hoc eſt, an molles raram, humidumque, an verò ſolidum, denſum & ſiccum exiſtat? 2. Quàm periculoſum enim ſit in applicatione cautiſcorum medicamentorum errare ſeſtor ex aliquot obſervationibus meis obſervare poterit. *Idem Centur.*

Fiſtula Præchi.

Valentinus Vogel calculum & ſeroto extraxerat; vicemini martii proximè præteriti iterum me iocia ſit, renuſſitque ſe ab eo tempore quo à nobis diſceſſit, iterum me inviit, quàm optime habuiſſet, & in diſſione Tigurina in pigo quodam ludimagiſtrum egſſe, jam verò propter inſanæ vet, atque æſtatem (quò tempore Ludimagiſtroſ ſuos abſe ant Helvetiæ uſſici) ut alibi ſe nutrit poſſit, proſpicendum eſt. Ante aliquot autem menses ulcus haud procul ſub ipſo umbilicò exortum eſt. Ex quo plerumque pars aliqua urinx, uſore ſubtilior, non tantum guſtatæ exiſtitat, ſed nunquam velui cum impetu erumpit. Uſus hoc ſine dolore fœx, moleſtiæ, & ſebre, ex tuberculo ad inſtar furunculi, factum eſt, ſanctè nobis aſſeruit. Ego ſtylam exploratorum per illud ipſum ulcus, quod valde anguſtum & calluſum, ad velicam ipſam immiſi. Ex quibus videre eſt Urachum in v. d. iſto prævium factum eſſe, tam ſagax ac provida eſt natura, in conſervatione ſui individui. Cum enim doctus urinaris calloſis ulceribus impeditus eſſet, illam ſibi pro evacuatione nrinx fabrica. it. viam. Clauſum Wicrius in ea ſuit ſententia Urachum in omnibus prævium eſſe, & proinde diſcretica maximo cum ſtudu umbilico applicati poſſe &c. *Idem Centur. vt.*

Fiſtula lacrymalis in puella, ſanata ſeſſione, cautiſcò, aliſque præſidiis, ex artis lege. Accedit, contra multorum ſententiam, vera & ſana fiſtula lacrymalis curandi methodus.

Quamvis omnes Medicinæ, & Chirurgiæ Scriptores, variam præſcribant curationem fiſtularum lacrymalium, ego tamen quædam à me obſervata proponam, licet ab aliorum methodo non aliena. Sanavi itaque puellam ſeptem annorum, Cuiſi meracioris ſilam, ab incurabilis fiſtula lacrymali laborantem, cujus à multis fruſtra tentata erat curatio hac ratione; ſequi mulierem ipſam, & quæ puella non ferebat diutius hanc operationem, uſque erat corruptum, quod ſimplici propterea ſeſſione abra. di non poterat, coactus fui illi adhibere cautiſcium, *Idem Centur.*

mixtum cum unguento ex betonica, & pulatim fistulam dilatare, quo totum ea corruptum eradi posset, quo sublaro, applicui supra ea superstes filamenta arida, quousque caro laudabilis ab ipso excrevit; præmissa tamen digestionem medicamentis propriis; postmodum supra labia vulneris unguentum ea tuchia, iacrosici loco, propter continuum ichoris fluxum ad angulum oculi; tandem induci cicatricem cerato ex Diachalcitide, filamentis tenuissimis arida, qua methodo multos curavi quam ocalefcente sinu, libentius inouisionibus fortamento cadente utar, si æger admittat, utpote quæ callum non modo atterant, partemque ipsam corroborent, sed etiam citius separant os corruptum, quicquid sentiant aliqui, perforandum scilicet os, quo materia illa purulenta per nates effluat & cicatrix æsteriali obducatur; qui tamen scuta sunt, quia os perforatum inuendum, ex illorum sententia, quo foramen melius pater, præbeaturque calius puri; ut quando os est corruptum omnino remouendum, cum alioquin fistula non possit sanari, neque ad cicatricem deduci æsteriali, atque ita hæc curatio futura sit palliativa, & intus, præterquam quod hujus perforationis non alius sit usus, quam ut os perforatum, & inouitum citius abscedat, cuius loco natura carnem prius aliquam generat, quæ progressu temporis evadit callosa, & durs instat ossis, qui curationis finis; quia curia cum carne subiecta, quæ ab ipso ossis excrevit, cum ipsa coalescit, atque ita fistula sanatur; non verò foramine superstitie, ex quo continuo emanat materia purulenta, qui antea parabat calius ea angulo oculorum per foramina, puncta lacrymalia dicta; progressu siquidem viginti, aut triginta dierum circiter, os inouitum, & perforatum, abscedit, unde foramen obstruitur à carne, ut dictum est, ex ipso pullulante. Graviter proinde errant, qui existimant, perforationem hoc commodum præstare, ut materia per nates effluat, licet hujus ope os perforatum citius abscedat; observandum tamen, non esse perforandum os, nisi patiente maxima ipsius corruptione, quæ perveniat usque ad cavitatem internam ipsius nasi; sola siquidem ejus superficiei corrupta, aut aliterata, si fuerit partem lesam scalpulo abrasorio abradere, dum pars cutis coalescat ossi, quod tamen, si fieri non potest, nisi sanum fuerit, & incolume, ejusdem autem corrupti, & scalpulo excisi hoc vobis fuerit indicium, cum spatio, decem aut summum, duodecim horarum, caro illi accreverit, quod nonnisi facta abrasione contingit, coalescente fistula. Quod si post abrasionem nulla caro subreverit, os corruptum adhuc subesse pronuntiandum, quod proinde dandum abradendum, quousque hæc signa omnino non appareant. Qua ratione feliciter semper, & rursus sanavi fistulas lacrymales, non solum puerorum, sed etiam adultorum, qui cum plures sint, eorum nomina seferre superfluo, quæ in memoriam revocare difficile est.

Quia verò non omnes fistulæ lacrymales sunt cum corruptione ossis, ideo istæ duobus modis possunt curari; vel incisione sola, & attritione calli, cum generatione carnis; vel secundò, absente callo, per compressionem ipsius partis, instrumento ab Aquapendente descripto, aut aliquo alio simili; quæ, quia à plerisque pertractantur, supervacaneum celeso repetere, cum mihi sit animus, proprias tantummodo in medium adducere observationes, his prætermittis, quæ passim ab omnibus proponuntur. *Pars de Alarconis in observation. Medicæ-Chirurgiæ. Sylloge.*

Fistula colli anterioris infra laryngem, ex tumore à barbitonfore incompositè sana. Observanda in curatione vulnerum colli, ne vena jugulares, & carotides arteria ladanur.

Multas sanavi fistulas colli potissimum verò quæ laboravit adolefcentia quatuordecim annorum, in parte ejusdem anteriori, infra laryngem, oborto primum ea contusione tumore, cui à Barbitonfore sanato, superstes fuit fistula inter utrumque anulum asperæ arteriæ, cum latione utriusque cartilagine, ea qua spiritus effluat. Habita itaque prius torvis corporis ratione, medicamentis humores peccantes purgantibus, deveni ad topica; & primo quidem quatuor integumenta dilatavi, tunc ea spongia; dinte scalpulo abrasorio partes ipsas cartilagineas utring; lasa accurate abradis tum filamenta arida supra eadem applicui; postmodum unguento lida, quod ocalefcente expectat in parte caniosa, arivi. Tandem globulia ex filamentis inbutis unguento ea tuchia, cum unguento lida, cavitatem opplevi; atque sensim & sensim immuniis globulis, cerato ex Diachalcitide, cum filamentis aridis cicatrice fistulam obtudi.

Hic autem observandum, quod si vulnera colli punctim inflata fuerint, nec statim mortem inferant, pro signo hoc habendum sit, venas jugulares, & arterias carotides illas esse, ac propterea maxima cautione curanda; quia licet non pervadant totum collum, tunc tamen non est imminenda longa, & crassa, sed brevissima, quæ integumenta non cædat, quæ principio imbueda ovi albumine, superinjecto postmodum lincolo duplicato per totum collum, eodem ovi albo intincto, cum bolo armena, & sanguine draconis; educto deinde sanguine, pro vitium tolerantia, atque exhibitio medicamentum leniente possit tot die; à quibus per duos dies non immutanda remedia parti vulneratæ adhibita, cum solum lincolium ex ulis sit spississime, quotidie prædictis pulveribus cum ovi albumine inductum. Victus sit solum pitina hordeacea bis per diem exhibita; potius verò aqua hordei pauca copia, quod si deinceps inflammationis metus ingrat, ex altero brachio sanguis ducendus, iusta quantitate, atque ingente dolore, viribusque permittentibus, diligente quin etiam cucubitalis, scitificat; omni quippe ingenio, & arte prohibenda generatio puris, utpote quod venas & arterias corodit, cum moris præsentis periculo, prout observavi in quibusdam ab imperitis male curatis, dum intrudente torunda longas admodum, à quibus puris copia congesta, venas, & arterias consumptis, mortisque causa fuit; ut propterea duobus aut tribus post diebus, removere tuncdam illam brevem, applicato deinde lincolo inducto cerato ea cetula; repetito alio perinde duplicato eodem modo, pulveribus prædictis, cum ovi albumine instructo, quibus spatio octo, aut summum decem dierum hæc vulnera sanare consuevi, servata tamen semper diata tenuissima, ne hamorea ad partem vulneratam conflant, atque in purulentam materiam converti vasa erodant.

Quod si vulnus traiciat collum, hæc methodo utor, impositis scilicet brevissima tuncda utringque eodem modo, quo superius proposui. Animadvertendum præterea, hæc vulnera nunquam esse tentanda speculo, ne, quod facile contingere potest, disrumpantur vena, aut arteria, cum vix proximo periculo.

Qua methodo multos sanavi, multosque quinque annos moruos vici, diversis ab hac curatos. *Idem ibidem.*

Dua Fistula sub axilla, variis remediis frustra tentata, igne actuali feliciter sanata.

Quidam laborans duabus fistulis profundis sub axilla me accessit, variis frustra tentatis remediis; quippe, quæ cum ad subjectas usque costas penetrarent, incisioes proinde non admittēbant sine valorum latione, ac præsentī vix discrimine. Cum autem Medici, fuissent primò uti corrosivis; postmodum verò compressionibus, ligaturis, & hujusmodi prædictis, in cassum tanto; ego corpore jam expurgato, statim ad operationem me accingens, utramque fistulam ad fundum usque inuasi, ferramento caudente, absque cannula, repetitis vicibus, donec omnino, & æqualiter toto fistularum sinu callus aneretetur; elcharæ verò detergendæ, turundis primò longis, & crassibus, postmodum digestivo usus. Pute verò apparet laudabili, alias inuasi, inductis unguento ex Bœonica, quas quotidie breviores paravi, quibus omnino remotis, pulvino ex linteolis sub alis, compressa parte ligatura satis arcta, (spatio vixinti dierum ægrium sanitati omnino restitit. *Idem ibidem.*

Qua ratione curanda fistula thoracis, cum laque ipsius ossis sterni, quod abractione solum, nunquam verò inuisione tentandum.

Fistulas sæpissime per manus habui, ex abscessu, aut vulneribus superfluis, quæ aut corripuantur, aut aliqua saltem labe afficerant os ipsius sterni, ex abscessu potissimum, ratione redundantis patris; quo casu, amplianda fistula, aut turunda ex spongia; tota postmodum pars ossis corrupti abradenda, dum caro laudabilis, paucis post horis illi accrescat; tunc verò imponendi globuli ex filamentis imbutis utroque ex Bœonica, aut Matricaria, arque carne indurata, cicatrix, medicamentis esciscantibus aliis propolis, obducenda; quod si caro parvo temporis spatio non succreverit, indicio facit, totum corruptum os non esse abratum, ac ptoinde operationem repetendam, donec caro optima adhaeratur, quo illis postmodum remediis detur locus. Nunquam ve obveniens ad inuisionem ipsius ossis sterni, qui non abscedit, aliorum more, quod licet ex toto corrupta non sint, sed aliqua tantum parte, si inuidentur, sola illa labefacta abscidit, superflua alia laudata, quod non contingit ossi sterni, quod lenius latis, non potest ita facile in squamulis distingi; quin potius inuisione ad internam usque ipsius partem pervadente, totam partem corruptam abscedere necesse est, non quidem spatio triginta, aut quadraginta dierum, proet alia ossa, sed trium aliquando annorum, unde consulto, ut nunquam os sterni inuatis; oblectavi siquidem in multis non abscessisse, nisi duobus vel tribus annis exstitit; ut propterea rutilor, & facilior sic curatio per abractionem, quam per inuisionem; quæ methodus curandi fistulam à vulnere; vulneris autem, quod non penetrat in cavitatem, principio statim ad internam contactum labia adducenda, & quidem si amplum fuerit, per fissuram, si verò angustum, per compressionem, prohibita partis generatione, ne os ipsum corumpat, aut saltem afficiat, qua ratione in his vulneribus non penetrantibus, sed ludentibus tantum os ipsum sterni, progressu octo vel decem dierum illud ad cicatricem perduci, sola appositio cerato ex ceris, & vel Diachalcitide. *Idem ibidem.*

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Fistula umbilici ad intestina usque serpens, diu frustra curata, parvo temporis spatio feliciter sanata.

Patrem quandam Thracium vidi, laborantem fistula umbilici, ad int. sinu usque penetrante, de quorum dolore erat quærela, ex deo illis statim in eandem specillo; quem hac methodo curavi. Facta scilicet totius corporis expurgatione, inuasi totum orificium fistulæ jam callosum, & induratum inuasi in illud parvâ turundâ, quo omnis crista simul callo attereretur, & quidem imbuta à principio huiusmodi, postmodum digestivâ, quam facta concolatione eduxi appositis filamentis, illis unguentis, ex Bœonica, & superdato & diachalcitide; æque octo post diebus cicatrix abstinui à filamentis, sicut contentus erat, quod cicatricem induci, æg. spatio viginti dierum sanatus, qui à Medici Muricenis multis mentes in cassum fuerat curatus. *Idem ibidem.*

Quinque fistulae femoris ex vulnere scloreti cum tumore, & osse cariolo, male curata, sublaro callo, & accommodatis remediis sanata quædam, ob extremum tamen os fractum supra aliud diutius coalescenti, aliorum Medicorum incuria, claudicante ag. Quod antiqua fractura ex vulneribus scloretorum sint incurabiles.

Memini me cutasse Illustrissimum Vincentium Bœti, sclopeto vulneratum in femore, novum mentis Venetiis frustra curatum. Laborabat autem quinque fistulis femoris, & insigni ejusdem tumore, cum osse cariolo. Illustrissimò æg. ad o. emaciato, ut ossa sola cute testa apparent, accedente fere fixa ex fistulis ora; quem cum interrogarem de remediis, & methodo curationis antea adhibitis, respondit, sine turundis processisse, applicito quidam cerato & cataplasmate ex farina lupinorum, thuris & vino malvatico; præscripta à Medici vicius ratione ex pane furfuraceo, & carnis loco, ut pote quæ vulneribus sclopetorum noxia, oleis, vel saltem aliquando follos vervecinæ concessio nisi; quod videt mirari subit, cum fistulæ, omnium consistenti, non farentur nisi sublaro callo, qui non solum his accedet, sed & ossis quinque annos corruptio accedebat. Tumores autem à cataplasmate calidiori, & nimis exsiccante, induratus ad o. fuit, ut resolvers omnino non posset. Ego verò hoc modo curationem sum aggressus, præscripta primò vici ratione, ex pane scilicet tritico purissimo, pollis junioribus, glandulis ac cerebis vitulorum, ovis fortilibus tremulis, præparata hordeacea, vino oligophoro & hujusmodi, exhibui quandoque ex pharmacis femioniam floribus casia noviter extractæ, præscripto aliquando clystere, aut glande ad alvum ciendam; à quibus quinque fistulæ prius dilatavi turundis ex medulla melli indurata, seu forgi, aliquando etiam ex spongia, & quia tumor, curationem impediebat, illi applicui aliquot dies cataplasma Galeni 2. lib. ad Glaucum, ex farina, triticea, aqua & oleo communi, quibus brevi temporis spatio ex toto discussus est & expurgatus quinque annos sensim mareta; prout in omnibus fistulis, in eo congesta, atque in pus convertis eorum dilutione. His petacis devoti ad abractionem ossis carioli, atque eadem opera ad calli anuisionem; cum verò hæc fistulæ à parte externa ad internam femoris penetrarent, & quædam multis oculis in se invicem hiarent his inuasi serram

ecum ex serico imbuto unguento lîdis, cujus prætilidius callus ex toto fuit sublatus; tum ferramentis totum os fistulæ subiectum erat; postmodum scroto celsi dimissis, sensim turunda immittunt, adhibitis medicamentis sacroscis, missis cum aliquo portulaculo lîdis, ne caro laxa, aut calius denuò succresceret, curantur impedimento sanata; applicui quinque spongiæ supra femur, madefactas nostris aquis thermalibus montis nempe Agrororum, atque modicè illud fasciâ constrinxit cum spongiis, ita tamen ut in quolibet fistularum orificiis brevem cannulam plumbeam immitterem, ne materia aut periculosa, aut serosa, alicubi hærens aliud sibi pararet foramen. Tandem sublatis cannulis, & artius alligatis spongiis, orificiis fistularum adhibitis filamenta arida, cum cerato ex diachalcyde, cicatrici inducendæ; cumque Medicorum Venetorum incuria externum ossis femoris fractû supra aliud coaliuisset, non potui aorticam hanc fracturam, novem nempe mensium, componere, cum ratione debilitatis virum Illustrissimi ægri à principio curationis, tum quòd fracturæ ex vulneribus scelopetorum, his quinque annis integris, cum initio non bene committuntur, difficillimè sanantur, quod nec quidem tendendum, ossibus frustillatim fractis, nisi præfendi vitæ discrimine; ut propterea nobilis claudicare coactus fuerit. Idem lîdem.

Ex Gonorrhæa veneris antiqua variis fistulis pertusa collum vesicæ, prope urethram, cum effluxu urina, non solum ex seroti pluribus locis, verum etiam ex inguinibus, præter spem sanitatis restituito ægro.

Cæsar Quojorus Rhodiginus, morbo detentus, meæ coræ se commisit, multorum frustra expertus, qui primò laboraverat gonorrhæa veneris, quæ longo temporis spacio sua acrimonia & mala qualitate, collum vesicæ prope urethram urinae petederat, ut non solum ex seroto pluribus locis urina, verum etiam ex inguinibus efflueret, variis proinde fistulis subortis, quas in variis prædixi, superfluit adhuc gonorrhæa; quarum tamen curationem aggressus, & primò quidem corpore quàm accuratissimè expurgato, illi exhibui decoctum ex ligno, & salis, cum sudore; turundis interim usus imbutis solo unguento ex beronica, minoribus primò, tum crassioribus, fistulas dilatandis; à quibus eorum primò sectionem sum mollius in linguæ, non ultra iurgentem quam pervaderet usque ad collum vesicæ, immittit postmodum turunda ad sanandum aliterius fistulæ, & quidem sub visis spermatidis ad testes delabentibus, per quorum ductum fistulæ urinæ sepebant, quia verò intro non poterant, eorum quod superest secare, illas valis transverfis, has propterea quotiesc hinc inde dñ tractavi, atque prædictis valis sine ipsorum labe, sub ipsis eadem foras, sensim & sensim dilatare facta, mihi viam paravi, impositis globulis imbutis unguento lîdis, & ex beronica similis missis, qua methodo multos dies usus, urina capite immittunt cessante gonorrhæa, atque eadem tres menses continuata, iniectionibus felici, aliquando ex aqua hordei & portulaculi Aegyptiaci, abundanter cam lîdici in quibusdam locis, atque alibi callo, non tamen valde duro, ob continuam urinæ & gonorrhææ fluxum; iniectiones, & iniectiones postea ex aquis montis Agrororum præscripsi, quibus progressu quatuor mensium circiter, non solum fistulæ inguinum sanatae fuerant, sed etiam tres aut quatuor ipsius seroti,

soli immittis turundis imbutis unguento ex Turbia & lîdis nobis, quas tandem eduxi sublata causa ipsius gonorrhææ & fluxus urinæ, incolunt multos annos ægro. Quam morbum, cum nunquam antea, nec dñm per oblitivætem, insaniabilem præinde existim. verum cum medicorum sententia in Medicina aliquando nascantur monstra, nunquam propterea insani ægrotum despondendum. Idem ibidem.

Fistula ani.

Ulcera ani, inquit Doctissimus Professor Hier. Fabr. ab Aqua pendente sæpe solent creare fistulas externas circa anum perforando intestinum rectum. Interdum verò circa anum obortuntur fistulæ rectum intestinum haud quaquam perforantes, sed circa anum consistentes, & in eam terminum habentes, quæ sæpe non sanantur nisi incisione.

Quam molesta sint, & dolorifica ani ulceræ simplicia, (ne de compositis quid dicamus) optime omnium experientur illi, qui sordida lintamina dolusque graves vestimenta suis occultare, imò toto vitæ tempore rotare maluit, quàm levem dolorem perferendo curationem expectare, lîris licet confici præteream, quæ ulcerum ejusmodi subiectum, proxiat valde est, non solum in corruptionem, sed ulcerum propagationem.

Inciso eodem ab Aquapendente anthote duobus modis, & duplici Chirurgia, absolvitur, hoc est filo s. Ano, & syringotomo.

Ad Chirurgiam antequam deveniamus, notandum nobis, quod si ulcerus adest fistulosum variis cavernis prædixi sine callositate aut intestini perforatione, Chirurgo variis curationem tentasse uti supposito-riatum ex unguento sulco Felici Wurzel, per evaporationem foduratum confecturam, sic enim ulcera ralla per liquefactionem unguenti manducata posse, efficaciter vi persuaserunt.

Hæc curandi methodus aridet nobis, utpote qua in non uno subiecto processu, imprimis ubi simplex adest ulcerus, idque recens.

At verò ubi ulcerum datur multitudo, maxime quæ occalluerit, etiam non perforato intestino recto, nullo alio medio ea curare nobis licet, quàm incisione, quæ aded ab H. Fabr. ab Aquapendente celebratur, ut, etiam intestino recto non perforato, exemplum aliorum secutus, cam insitui debere doceret.

Ipsa Authoris cap. 93. proposita verba hæc sunt; queritur quomodo curanda sit fistula quæ externis in tuberculo in cute oborto habet originem & versus anum permeet, non tamen intestinum penetret, sed ad usque intestinum pertingat.

Ad hoc respondet Vir experientissimus se in ejusmodi ulcerum curatione, etiam non perforato intestino, nequiquam veteri intestinum ipsum incidere, maxime ubi pudicæ circulo proxima. Extremum enim intestini recti, verba sunt Hippocratis, quæ habentur libro de Haemorrhoidibus, & secans, & resecans, & consuens, & utens, & putrefaciens, etiam si gravissima hæc sint nihil latetis. Consensit Aërius Ex leonid.

Ad Chirurgiam antequam deveniamus cognoscere Chirurgi intestini, intestinum rectum adhuc integrum an sit, an verò perforatum; eadem enim licet sit curandi ratio, læsum sive fuerit intestinum, sive integrum, facillimum tamen concepta, facillioris operationis perforationem cam esse quæ ubi intestinum foramen aliquod adest, per quod instrumentum ducl potest insinistur, quàm ea est ubi eodem per

per instrumentum sanum viam sibi facere tenetur Chirurgus.

Signa quibus intestini perforatio cognoscatur; Colvis sine dubio cognita; Certum est, si fluxus per extremum foramen exeat, certius si alviuorum excrementorum aliqua particula per exteriora exeat, certitissimum, si Chirurgus digito in anum immisso, instrumentum per fistulam infectum tetigerit.

Instrumentorum ad incisionem usualium primum filum est; huius ope quæ perat, itur Chirurgus licet minus dolofica, incit tamen magis evitatus est; Celsus ipse lib. 7. cap. 4. ubi incisionem per filum admittit, imo ubi ejus opera cum absolvi possit de spirat, fieri posse docet, ut curationis gratia cutellum hic assuere cogamur.

Filum quo in hoc casu utitur ex filis crassis, fortioribus, contortis, pilis equinis, & filis ferreis tubis crassioribus confectis, cetera hanc ad eam modum quo factores filis sua inania distillatque magis reddere solent, inersitris conchitur.

Filum hoc debet longitudinis exipiens foramine quod incit extremo uno (simile torantini quod in acu ea notatur, quæ ad setacea efficienda utitur) instrumenti exploratorii ex plumbo ad necessariam flexibilitatem parari.

Hanc digitorum indicem sinistræ manus, cujus unguis, movente Parzo lib. 13. cap. 24. trêchais, in anum immittimus, non manu dextra instrumentum digitorum filum intrudimus per fistulam anastomosis huiusmodi modis innotando ad locum cum intus stili qui perforatus est deducimus, ne ut auxilio digiti in intestinum hauriens incurvari, tandemque per anum exire queat.

Fili utrumque extremum conjunctum alligamus fillo cruidam tereti, sique ad eum modum, quo cum fistula sua processit ab Aquapendente, contorsione continua, fortique constrictione quicquid illo comprehenditur dividimus.

Operatio secunda Syringotomo perficienda certior est, minique dolofica, lino breviori absolvit et tempore, alii ea tamen abhorret magis solent ægotantes. Instrumentum hoc invenit Galenus, delineavit Aude à Cince, emendavit H. F. ab Aquapendente, approbavit Schultze; figura ejus quæ operi quam maxime accommodata est, in qua globus est, qualis etiam in instrumento exploratorio plumbeo supra indicato requiritur, ne, dum per fistulam, hinc intestinum ipsum, protrudimus, nocuere eum ei adferat, hinc per fistulam & intestinum ducitur, sic ut per anum exeat usque ad tertium sextæ longitudinis partem ubi acies incipit instrumentum, cuius dorsum obtusum, similiter ac illud quod est cultri domestici, quo pascui scindimus. Ad autem totum instrumentum ad instar falci invenit.

Instrumentum hoc per fistulam immisissim, digito in intestinum apprehensum ceteri manu exteriori ducitur, & hac ratione quæcumque attingit impetu uno discindit.

Sincere ut hic agamus, necessarium non modo qualiter instrumentum dictum tractare debeamus cognoscere, sed & quomodo ulcus tale fistulosum incipiat, procedatque, imo quænam de eo prædicari queant. Ad hæc cum sequentem exhibere vult erit.

Franciscus Vollbertus vir aliquomodo melancholicæ complexionis, exanimi affectu cachectici per sentientis destillationem, per dorsi longitudinem ad usque cruce, hinc ad natum concursum ubi intestinum rectum ossi dicto accumbit. Brevis tumor hic exortus, qui pinguedinem, marginem musculi glutæi, imo, quod adnatum, intestinum rectum, perforavit.

Accedens ægotantem, præter febrem, doloremque gravissimum, tumorem duriem, subedinem, ex-

tenationem, consideravi. Quod si aptiora alia, tumori adhiberi debere, certum. Cata, hæc hoc eadem applicari necessarium duximus, quo eo maturatio promoveretur.

M. Rad. Althææ. Brion, al. flor. alb. an. ʒi. ʒi. ʒi. Fol. Malv. Bismalv. Violar. an. M. j. Flor. Chamæmili. M. si. Sem. lini. ʒss. Coquatur & contrahatur, addendo Farinæ tannur Semin. lini an. ʒii. Axung. porcæ q. l. Buryr. recent. ʒj. Vitell. ovi n. j. M. F. Capulasma.

Calide hoc applicavimus tumori, secundo die cum apte consultum duximus, & effluat materis teretis, parulente insignis sanis quantitas.

Post hæc excrementa alvina, quibus fluxus permixti, sœuit se manifestantes, tumorem accedere notabamus, unde peritonium jam ab intestinum clare constabat, Multa equidem adhibebamus, quorum opera consolidare, cramentumque regnerat nos palle credebamus, alii frustra omnis labor; ad incisionem adeoque, modo in prægressis indicato perficiendam, devenerit coacti, quæ o. intestini reliquis partes sanas, & eorum musculofamque intus portionem adhuc integram distat, necessarium, distictione peracta, quod sanguinis fluxus gravis ex Venarum hæmorrhoidalium apertione adflet, medicamentum adhaerens ordinatum vulnerato loco applicavimus.

Die sequenti pus minus, solito in vincte tepere licuit, imo omnia sanitatem veram promittere videbantur, quæ etiam brevi tempore, auxilio divino, introducta.

Per animi aff. etiam excedentem in parte dicta humorem collectionem exoriri posse, non est quod mirum alicui videatur, etiam in aliis subiectis similia quæ in hoc observare licuit, notabimus; Ad ætæ vlti principalissima causa hæmorrhoides exacerbatæ, ex sanguine acris ortum ducentes, unde vicinarum partium corruptio. Exemplis variis quæ propolimus illustrare licet, nisi ægotantium phlegma impeditur.

Sunt, inquit ab Aquapendente, qui terram pertimescant & universi sinus incisionem a filo fieri expectant, quod non laudo, quia nimis molesta & tanta est incitio, & dolor assidui, & longa curatio.

P. trem hanc, in qua ulcera hæc fistulosi occurrunt, sensilem omnino esse, variis exemplis verum esse comprobamus; testatur idem memorabilis historia, quam Recitendus Paræ Aquapendens lib. de civit. Di. 21. cap. 8. de Innocentio homine dolores fugiente proponit; hanc rerum Chirurgicalium cultoribus eorumque loco communicare placet, cum voto curationis, similis omnino illi quam sanctus Episcopus addidit.

Quis, inquit, novit, præter admodum paucissimos, saltem quæ facta est Innocentio Advocato Vicarie præfectura ubi nos inierimus & oculis aspicimus nostris; venientes enim de tran matris, me & fratrem meum Alippium, nondum quidem clericos, sed jam Deo servientes; ut erat cum rora domo sua, religiosissimus ipse susceperat, & apud eum tuos habebatur; curabatque a medicis, propter fistulas quas immixtas atque perplexas habuit in posteriore atque ima corporis parte. Jam secretior eum, & aris lue cetera medicamentis agebant. Passus autem fuerat in sectione illa & diurnos & acris dolores, sed unus inter multos sinus scellerat medicos, atque ita laniat, ut cum non tangenter, quem ferro aperire deberent. Denique sanatis omnibus, quæ aperta curabant, ille remanerat solus, cui frustra impendebatur labor. Quis motas ille suspensas habens, multumque formidans ne iterum faceret, quod ei prædixit alius medicus domesticus ejus, quem non admittent illi, ut saltem, videtur cum primum factus est quomodo id faceret ita utique illum domo abjecerat.

abieceris, viæque receperas, erupit, atque ait, in eum me sectari celsi? ad illum, quem noluisti esse præsentem, verba venustus forma. Incidere illi medicum impetum ceperunt, merumque hominis verbis promissionibusque lenite, præterierunt & alii dies plurimi, nihilque proficiebat omne quod fiebat, Medici in sua pollicitatione persistebant, non illam sinum ferro, sed medicamentis esse clausuros, adhibebant & aliam grandævum jam medicum facisque in illa arte laudatum, adhuc enim vivebat, Ammonium dico, qui loco inspecto, idem quod illi, eorum diligentia periculaque promissit. Cujus ille factus autoritate securus, domesticus tuo medico, quod futuram prædixerat aliam sectionem, faceta hilaritate veluti jam salvis illis. Quid plura? postea tot dies inaniter consumpti transierunt, ut felli atque confusis faceretur eum nisi ferro, nullo modo posse sanari. Expavit, expalluit nimis terreatur turbatur, atque ubi se collegit, satique potuit, abire illos iussit, & ad se amplius non accedere imperavit: nec aliud occurrenti farigato lachrymis, & illa jam necessitate constituto, nisi, ut adhiberet Alexandrinum quendam, qui tunc Chirurgus mirabilis habebatur, ut ipse ea eret quod ab illis fieri volebat incutus. Sed postea quano venit ille, laboreque illorum in ciarradus, sicut amplex, vidit, non vixi functus officio, perivit homini, ut illi potius, qui in eo tantum laboraverant, quantum ipse inspiciens mirabatur, curationis suæ hinc fructuatur: adiciens quod terrea, nisi lectus esset, salvis esse non posset. Sed valde abhorrere à suis moribus ut hominibus quorum artificiosissimam operam, industriam, diligentiam, admirans in cicatricibus ejus videret, propter exiguum quod remaneret, palmam tanti laboris auferret. Redditi sunt animo ejus, & placuit ut eodem Alexandrino assistente, ipsi sinum illum ferro, qui jam consensu omnium aliter insanabilis putabatur, aperirent. Quæ res dilata est in sequentem diem. Sed cum abissent illi, ex nimio motore Dominus, tantus est in domo illa exortus dolor, ut tanquam funetis plandus, vix compinguerat à nobis, visitabam cum quodam Sancti Viri, Episcopus tunc Ufensis, beate memorie Sarmatus, & Presbyter Gelolus, ac Diaconi Carthagenensis Ecclesiæ. In quibus erat, & ex quibus solus est nunc in rebus humanis jam Episcopus cum honore à nobis debito nominandus, Aurelius, eum quo recordantes mirabilia opera Dei hac de te sape collocuti sumus, eumque valde meminisse, quod commemoramus, invenimus. Qui cum eum, sicut solebat, vespere visitaret, rogavit eos mirabilibus lachrymis ut mane dignarentur esse presentes suo funerali potius quam dolori. Tanti enim metus ex prioribus luvaretur pænis, ut se inter medicorum manus non dubitaret esse moriturum. Consolari sunt eum illi, & hortati ut in Deo fideret, ejusque voluntatem viriliter ferret. Inde ad orationem ingressi sumus. Ubi nobis ex more genua figentibus, atque incumbens terræ, ille se ita projecit, tanquam si fuisset aliquo impellente graviter prostratus, & caput orate. Quibus modis, quo affectu, quo motu animi, quo studio lachrymarum, quibus gemitis atque singultibus concutiebatur omnia membra ejus, & pene intercludentibus spiritum, quis ullis explicet verbis? Utum orarent alii, nec in hæc eorum avertetur intentio, nesciebam. Ego tum profus orare nil poteram, hoc tantummodo brevis in corde meo dixi, Deus quis tuorum preces exaudis, si has non exaudis? nihil enim mihi videbatur addi jam posse, nisi ut expiraret orando. Surreximus, & accepta ab Episcopo Benedictione discessimus, rogante illi ut mane adesset, illique, ut æquo animo esset, hortantibus, Illuxit dies, quem

metuebam, aderant servi Dei, sicut se aliquos esse promiserant. Ingressi sunt medici, parantur omnia quæ hinc illa poscebat, tremenda sacramenta profertur, attonitis, suspensisque omnibus. Eis autem quorum erat major auctoritas, desecum aulici epis consolando erigebant, ad manus lectus, membra in lectulo componunt, solvantur nodi ligamentorum, nudatur locus, inspicit medicus & secandum illum sinum armatus atque insensu inquit; tentatur oculis, digitique connectat, tentat denique modis omnibus, invenit fingissimam cicatricem. *Job. à Meeklen. in Observat. Chirurg.*

De Ulcere intestini recti Brasiliensis familiari.

Anno 1624, cum ego (Jacobus Lachmann) qui totius classis Batavice chirurgus constitutus eram, eum illa in regione Americæ Meridionalis, Brasiliam, profectus essem, militibus nostris in illa regione ulcus affebatur in intestino recto, eo modo, quo in nostris otis homines in digitis paratissimi corripit solent, quod ipsis maximos dolores afferebat, ita ut ferè infantem propter incusum acrius, antequam maturisceret & aperiretur. Et filiani hunc affectum, seu morbum, qui sape infestantur, vocabant Byctos. Remedium autem hoc erat: lutebant citrum pomum, quod in sex vel octo partes longas dissecabant, ex his particulam quandam, insilant suppositorii in intestinum interebant, & hoc sape iterabant recentibus pomis citis; hoc modo statim magni illi dolores sedabantur. Ego, cum Brasiliensium hanc medicinam facere viderem, pari modo medicas manus adhibui & dolori & morbo nostrorum milicum, qui hoc pacto patier convaluerunt. *Frederici Lachmann.*

De Calculis ex Ani fistula extractis.

Civis quidam Utatislaviensis, ob enormem corporis crassitiam, obesitatemque peroris stupendam tota Urbe famosissimus, nescio ex qua causa fistulam Ani contraxerat, inique insigni molestia aliquot annis toleraverat. Tandem agrius eam ferè incipit, doloreque indies inagis magisque exacerbat, tumorem inflammationem fistulæ ostendit, à parte sinistra sphincteris ani situm, extollemem sentit, qui ipsum neque sedere, neque ambulare, atque cubare permittit. Accersit Chirurgus Dn. Gottfried Schultz, Vir ob insignem industriam non vulgari petitiu junctam merito laudandus, qui lanceola tumorem, te sic ferente aperit,

Ex vulnere primò pus copia, mox quoque calculus prorumpit. Evacuata sic doloris & inflammationis causa, vulnus à Chirurgo debite tractatur, at tandem consolidatur, fistula, moxque Albuca, intacta relicta, utpote quam paries non admodum molestè ferret. Elapso autem abhinc circiter biennio, denuo inter deambulandum vexati, atque de die in diem dolores acerbiores sentire incipit, donec tandem nimis ingravescentes iterum Chirurgo manum in auxilium vocare eum cogunt. Hic, denud parata sectione, inter foveas varias ex vulnere emanantes, jam non officum calculum, sed geminum, & utrumque priori illo majorem invenit, ac deinceps vulnus ut antea cogit. Calculos istos, à Patientem magni habitos, Chirurg. a mihi videndos examinandolque obtulit; quorum primum redditus asper est & superficiali inæquali, lupini instar compressus, cinerei coloris, albis splendentibus variè insertis, sit elegans texture. *pr. viij. pendens.*

pendens. Secundus corum scilicet, qui secunda vice excisi sunt, major, avellana modiciorum mole æquas, formæque fere refert, levis est, pallidus, venalis rubentibus hinc inde plicis; fereque filicem mentitur, cui tamen & substantiæ similitudine multum cedit, & pondere, quo gr. xvi. non excedit, inferior est. Tertius denique postremo inventorum scilicet minor albidior est, colore & substantiâ tartarum; qui dentibus accescit, exacte refert; lavis maximam partem, nisi ubi fuleis quibusdam, sanguineum quid ostendentibus, quasi incitus est. Utique horum ea pars, qua mutuo se tetigerant, detritus est: atque ille in plano ab attritu factio lineolis ellipticis alligat, quasi in totidem laminas sive tunicas, successivè accretas, dissolvitur: hic verò in medio detritæ partis punicum quendam globulum ostendebat, qui distracto calculo nucleis cerasinis, circa quem cæteræ ista massa concurrebat, esse deprehendebatur. Integer adhuc pendebat gr. xiv. distractus verò & nucleis caesus, vix gr. viij. attollebat. *Gustafus Schulz.*

Fistula sub mamma dextra.

Fistularum pertinaciæ causa unde repetenda ostendunt allata exempla: Pertinacissimæ & tandem tamen inferentis, exhausto torvis cruore, exemplum mihi occurrit anno 1672. cum eo tempore incumberet cura Medica pauperum Gallorum advenarum, vel urbis incolarum, inter illos commissum habui quendam nomine Bourgeois, Prætoris Urbani Appositionem, Vitæ ræ texture, anno dixerat xxx. natum; Malæ illi, bene se habenti, leviter tuberculum; vino modice utebatur, in victu temperans: Morbo prehendus uritur calculariæ aggræ operâ, qui antimonio exhibito ipsam ad hypercatharsin deducit, unde vix naratæ debilis ad Orci fauces compellitur: Vix recreatum, pravoque victu deinceps sustinatum, pleuro-peripneumonia vehementer adortitur: E qua mea ope emerit, sed supersessit in pectore, sub mamma dextra, fistula, quam præcesserat abscessus labii excræns, quanquam univerſalem materiam pectore contritam exhaustissè videntur libera & liberalis purulenta anacatharsis: Adeo copiosam eructabar Fistula sanæm, ut illius occcludenda omne consideret consilium: Indito tenui stylo & longo, origo ejus superior esse deprehendebatur & inter musculos pectoris deerrare; qua de causa intro cum aliis consilio, difficilis est fornice (quantum alte progredi liceat) secundum longitudinem Fistulæ; sed cum ad claviculas usque factus esset progressus, nec exortus pateret; ingressus præterea, ob tortuositatem non pauerat amplius stylo, res naturæ committenda fuit, & usus decocti traumatici pectoralis, hydromelitis formæ præscripti, à cujus usu vitam per triennium produxit. Apparitoris officio ad ultimos usque dies functus æget. *Thioph. Boneti in Sepulchreto.*

Fistula quintuplex in pene & scrotis feliciter curata.

Clariss. Gustavi Casimiri Gabrielis Miscell. Cur. Decur. lib. An. 1.

Generosus quidam in Mattis aquæ ac Venetis castis strenuus & excellens miles, tot quæ commiserat posteroris hujus militariæ præstis solum promovebat stipendium, ac aliis inter bujas belli magnibris camincolam in urethra satis grandem, quæ urine transire quandoque sufflaminatæ, unde Natura, ut alia ratione huic necessitati subveniret, quin-

que, præter stillidissimam, quod pilius vix adhuc restabat, emiculis in ambra Penis atque Scrotis gestat, eoque callis admodum duris muniverat, qui totum illum animum furibundum plaud, imò fere fatum, reddiderant. Unde scrotis ille urinx latex & fusticulis quasi quinque, cum illam reddere cogebatur, non sine atroci dolore prosiliebat. Torturæ huic remedia præter vernaculâ hinc inde in Germania, Belgio, Gallia, sed frustra quaesierat, habito hoc malo ab omnibus, quos ubique exploraverat & consulerat maximè celebres, tum Medicis quam Chirurgis pro deplorato ac incurabili. Pædus ab hoc solvere, tandem & Chirurgum quendam ac Chemicum per Germaniæ quasdam præcipuè oras, quam sibi medicamentis nonnullis paraverat, quorum metacnam din exercebat admodum lucrosâ, hincque Mercatoris ut nomen habebat sic omen, famâ vix non super æthra votum, adicit. Ille veterem sibi oblatum ut arietem inde faceret quæstus, post varia tentamina frustra uno aut altero mense adhibita, eodem illum, si non pejor, in statu constantem tenuerat. Unde de recuperanda sanitate desperans denud se Chirurgo cuidam, satis aliis sagaci & experto, Gallorum Refingorum de numero, qui jam ante ipsum, sed & tunc frustra tractaverat, ut aliquid saltem mali levamen haberet, committeret: Qui postquam per aliquot illum rursus spiritum balneis aque tepida, pyralisimò, diartæ & similibus venetæ huius auidosis exercebat, sed etiamnum irritio successu, tandem me convocabat ac consilium efflagitabat, cûmque illud dare, antequam agri ac agnominis status mihi satis cognitus esset ac percipere regularem ad illum me tandem adducebat; Ubi tale, quale depictam hic addidi phenomenon oculis objicerebar, Pelâpum in fontem quinque Epistomis salientem Ovidianâ Metamorphosin transformatum distillis. Difficultate rei detectâ agroque indicatâ, fundebam ut ostendit fistularum oleo Antimonii, quod buyrum communiter vocant, singulari, & minora illius peculiari modo extracho, quod à me factum illi suppeditabam, semel iterumque leviter tangeret, non omnia simul, ne dolore simultaneo adeoque nimio succumberet æger, sed singula scrotis & successivè per intervalla satis longa, utque initium ab infimo faceret. Patebat Chirurgus & quidem optimo eventu; Ægro quidem initio de dolore aliquo non admodum atroci, sed pro rei exigentiâ tolerabili satis, aliquantisper conquerente; sed callo fistularum paulatim absumto & cum esthæra soblato, emiculis tum parietibus sponte coalescentibus ac consolidatis. Minori mali interni, ut & catenulâ urethra præcipitanti rubri Helmoniani, à me parati ac subministrati, atque tam interne exhibiti, quàm per tutandam urethra applicati beneficio, sensim immittens ac soblata, sic naturalis urine meatu deobstructo; Reliqua scirrhosa parrium circumjacentium duritie, Emplastri de Ranis cum Mercurio duplicato Vigonis, applicatione, singulis emollita & edomata, licetque exatissime quinque foras aut sex septimanarum spatio persinacæ. Aded ut Eques aniam Serenissimi Electoris, quætor milliaribus hinc tunc temporis distans, Potissimè nimirum agentem, inviscere, licet sanam & incolumem præter omnium tam Medicorum quam Chirurgorum ipem & opinionem, sistere posset, imò cûm res eadem omnino omnia speraret, etiam oculari corândem examini, quos consulerat submittere non veretetur.

Fistula Ilei extra abdomen pervia.

Clariss. Ioh. Conrad Wepferi, Miscell. Curios.
Decur. 4^a. Ann. 2.

Virgo quidam rustica N. N. annorum circiter 25. iturata mediocri gracilis, capillis nigris pedata, coloris fusci & a juvenatē constitutionis debilioris; etas in hac ætate jam edentula: laboribus rusticis tamen pro vitibus vacavit, quorum promiscuē diētiā etiam utebatur. Anno 1690, in vete, febrī continuā malignā, nunc ubique ferē grassante, graviter decubuit, nullis medicamentis baud profligate valuit, sitim durante febre maligna molestissimam, solā aquā limpida frigida compescebat, & aliquando in reconvalescentiā statū, adhuc tamen affluente corpore, plenius faucibus assatim aquam frigidam hausit, mox inde instat tympani abdomen inflabatur, ac tumorem durum tensientem, nucis juglandis magnitudine in dextro inguine prorumpentem observavit, qui indies crescens ad magnitudinem ovi gallinacis majoris excrevit. Intestina in hunc prolapsa esse, ipsamet animadvertēbat, nam aliquando hæc in abdominis cavum protrudebat valuit, quæ in quocunque motu rustic elabebantur. Satis diu Enterocœlem hanc elavit. Anno 1693, in vere prope hanc Anthrax cum insigni inflammatione enatus fuit, suppus per multa focamilla, ceu ex cribro multum puris fundebat, ac tandem extracti substantiā fibrosā, albā, crassā & tenaci ulcus satis magnum post se reliquit, ex quo aliquot diētum spatio ultra 20. Lumbicī magni proruperunt, imò aliquoties tales manē in lecto repentes invenit. Particulæ etiam ciborum ingestoium inā cum lumbicis & parte sæpius extrudebantur. Hoc ulcus per decem septimanas apertum mansit, ac sua sponte sine ullius operā sanabatur. Hoc autem sanato, Enterocœle multum increvit, duosque pugnos viriles magnitudine excedebat, ac maximos inde dolores patiebatur, anxietates scilicet, tormina &c. nec elapsa penitus in cavum abdominis immittēte auxilium valuit.

Horum dolorum petrasa tandem curæ Dn. Balthazaris Zehenderi Hetrinoromi nostratis expertis, se commisit, qui die 6. Januarii 1694. manū, horam circiter nonam, præsentibus Ext. Dn. D. Screta, cognato ac compatri meo colendissimo, aliisque Chirurgiæ Studiosis sectionem in dextro inguine suscipit, est, feliciterque eam petegit, in reponendis intestinis multum occupatus, quoniam hæc processus peritonæi firmiter accreta essent; attamen dextre separatā tandem æpōuit, vulnusque more solito deligavit, filum iusto tempore excidit, ac vulnus ad sanationem tendebat: nulla symptomata primis diebus supervenerant, excepto broncho, qui tamen adhibitis anticephalalibus, expectorantibus à laudato Dn. D. Screta cessavit. Die 16. Januarii, scilicet, decimā post sectionem diē, maxillam inferiorem ritē movere nequit, nec ab invicem diducere valuit, deglutitio difficilior etiam reddebatur, liquida facilius quam solidiora deglutiit. Dn. D. Screta acerrimis fuisse mixturam antispasmodicam ex cinnab. antidoniū, succin. alb. prep. ungu. alc. Gal. volar. Succin. aq. flor. Saturei, til. &c. coctilem sumendam, externē articulus maxillarum in utroque latere, ol. è flor. Slat. lumb. terrestr. & spic. lumb. &c. inungebat, deglutitio indies difficilior evasit. Die 19. Januarii, cum Dn. D. Screta ipsū visitans, reperit inter deglutendum fauces quasi confringi, joculariū deglutientiū viam præcludi: vi quadam & nixa satis forti ingesta iacula per isthmm faucium ad gulam protrudit; pletumque intet hanc actionem mucum pellucidum ex naribus

copiosum emittit: maxillas nec sponte diducere, nec vi live instrumento deutes divelli poterant. Pulsus etas celer & frequens, sudavit multum, appetit & sitit, urina iuste tinctior, cæterum naturalis. Totam spinam docti à nucha ad os sacrum ulque, punto alpero ficare curavimus, postea inungebat mixturā ex oleis laurin. lumbicor. Slocan. euphorb. castor. &c. collo fasciculus ex filis cradis in lœvia coctis circumponebatur. Die 20. Januarii, prægressa nocte nunquam dormivit, decumbenti convulsiones in toto imminēbant, propterea ei extra lectum sedendum fuit, & quidem incurvato corpore; erecta enim atrocissimos dolores experta est, us ejulandum fucit: in abdominis latere sinistro doluit: de Cardialgia etiam sæpius conquesta est: difficultas deglutienti angēbatur; à metidie omnia potulenta abhorruit, ac si Hydrophobia esset, quamprimum si-phose juculum injeçerit arant, mox & clamavit & hujus aduersionem nixu quodam secusavit. Convulsiones in toto, nunquam in nervum erumpēbant; vires singulis momentis deficiebant, mente tamen semper constante, articulāt loquebatur, circa horam 12. noctis, vivere desit.

Die 21. Januarii, abdominis tegumentis dissectis observavimus omentum macrum & tenue, cujus portio processui peritonæi in latere dextro, & Intestinum Ilicum in inguine dextro cum peritonæo ibi, ubi ante annum anthracem postea erat, firmiter accreta; heic etiam non late, ad 3¹2. longitudine cum mesenterio portio hujus splacēata & nigricans etas: ubi scēto petagebatur, hæc Intestini Ilici pars cum peritonæo etiam cohsit: Alibi Colon & Ileon in sinistro quoque latere, peritonæo, medianibus fibris p. n. accrescebant; in dextro latere colli portio peritonæo prope spinam ossis Ilei fortiter adhæsit. In portione Ilici, ubi exulceratum pedem fuit, lumbicis teres tepertus fuit. Intestinum rectum & portio colli scybalis duris repleta erant, reliqua intestina satis sana erant, in dextro latere, rubicundiora; Hepar pallidius: Vesicula fœllis extrēmē albicans & amplissima etas, ac si statibus tingeret, urab initio portioneum Coli pervenerimus, tacto percipimus calculos inclusos esse.

Frustram Hepatis cum Vesicula biliaria portioque Duodeni & Jejuni ac Pancreatis exploravimus fur, ut per otium Venerandus meus Dominus Patens in ædibus nobiscum has partes accuratius perlostrare vellent. Vesicula biliaria à cava parte Hepatis sine ulla læsione, vel sanguinis vel bilis emissionē integra separati facile potuit, nihil neque ex Hepate neque per tunicam vesiculæ transfudavit, inò tum Hepar incogens, tum vesiculæ membranz multò crassiores naturalibus erant, superficies harum quidem madēbat, ac nihil vel biliosi vel cruenti apparuit. Vesiculæ tunica secundum longitudinem incisa prope sextuplo crassior, densior, tenacior & scissā difficilior etas; Cavum vesiculæ repletissimum fuit humore albumini similimo: à calore inspissatus, gelatinæ similis evasit; siccatu flammam contraxit instar fœci exsiccati. Muci pondus prope 3¹4. erat: in illo natavit unus ex calculis, alter firmissimè ejus collo impactus etas, ut vi extrahendus esset; collumque ita obturavit, ut nec guttula quidem bilis per ductum cysticum ascendere & in vesiculam transfundī potuisset, quod inde manifestè patuit, quia macula flava à ductu communi per cysticum expansa eis calculum impactum habilitet, nec quicquam flavi trans illum in reliquo ductu & vesicula apparuit. Ambo calculi magnitudine nucis molliora erant, oblongi & rotundi, in utroque extremo obrui, levissimi, ex albo parum flavescētes, ceracei, Ochre

ochre similis, sed albicansiures. Mucus erat subalbus Inetna superficies vesiculae penitus glabra nullibique exulcerata fuit: circa collum vix quidem fuit textura quadam fibrarum reticulari, per tunicam internam transparentem integra membrana (ex quibus omnibus manifestum fiebat mucum instare lymphæ vel feri per poros ejus in cavitatem fistulae; cujus extrusioni fortè calculi ansum dederint, non secus ac calculi in vesica mucos, quemque hoc tormento obnoxii copiosè emingunt) inflato ductu choledoco communi. Implebatur vena Pancreaticæ affixa, portio Duodeni, ramus venæ Portæ & alia vena Pancreaticæ sustentia: nam tunc ductus Pancreaticus, cum tamen aqua siphoni injecta etiam in ipsius ramulos plures promptè injecta fuerit ductu communi foras pressa, ex ejus porulis aqua exsudavit.

Ulcus in cute ut & intestino, ex quo veteres, alimenta & pus pridem prodierant, penitus coalescent adeo, ut nec stylus nec stacus amplius penetrare valuerint. Ibi, ubi Fistula exileo extra abdomen pervia erat, intus in ileo scribiculus supererat: apicem parvi digiti admittens, Fistula veco arctissime coalescit, nec vestigium foris in vulnere apparuit. Verisimile est, juxta hanc Fistulam intestina & omentum novam viam pro elapsu illorum factum fuisse. in ulcere foras nihil p. n. apparuit, licet ileon ibi accretum sphacelatum esset, puke rubebat & mundum erat, ut & interna ilei cicatrix.

SCHOLIUM. I. Et hæc foemina exemplum suppediat fistulae ex intestino extra abdomen pervia, post inflammationem suppuratam & ruptam, in qua exiit intestinali portione, Peritonæo, musculis abdominalibus & communibus integumentis, contentis in cavo intestinalium exiit parvae extra abdomen cum hac singulari naturæ providentiæ, ut intestinum cum peritonæo agglutinetur & arcte coalescat; secus enim illi fieret, contenta intestino in cavum abdominalis effunderetur, non sine sevis & fœda ægri tubatione, ut ex aliis historiciis medicis notum est.

II. Herniotomia in utroque sexu & ætate arcti convenue plerumque functionem supervenire, frequenter observatum fuit. Idem quoque sectioni & ulioni in coxa profunde factis, denum die decimo, Scamandro contigisse, contractis maxillis post diem octavum, testis est Hippoc. Epidem. l. 5. An sectio hujus symptomatis d. 10. subsequens & moris post quintum diem ab ejus invasione causa fuerit? dicebat. Occasionem fuisse, negari non quidem poterat, cum circa sectionem fore illud nunquam observatum fuisse: artem & hoc notum est, citra separationem omenti & intestini à processu peritonæi hunc spasmus non raro evasisse, qui in re Herniotomi causabantur huiusmodi frigidos, exieruntque pedis extra lectum: & tunc potestate sectionis testes erant, vulneris facies pulchra, fistulae omnimoda consolidatio, cujus vinculi & abstercti omnium symptomatum, excepto broncho, qui tamen quoque sublevis fuerat diu ante obitum. Spiculi figura in aliis quoque ceptera fuerant in talibus cadaveribus, licet non necrum fuerit, vel omentum vel intestinum ante obitum separare, & si hæc in culpa fuisset, vix fistula cum ulcere consolidata fuisset, & foret alia signa periculum minicantia apparuissent. Quo concessu neci musculorum maxillam inferiorem atque lenticulum & pharyngem contrahentium & atrolleurium ad contractionem talem compelli fuerint? Judicium meum cum Commentatoribus in Histo-

riam Scamandi suspendo. Foemina istius Hydrophobia verisimilius evincit illam ab animali rabido demotus potius convulsioni alium pharyngis, quàm depavate phantasiae, & nescio quibus spectris in putulentiis apparatusibus d. b. c.

III. In contemplatione vesiculae biliaris non pauca notari digna occurrunt. Primum est, bilem non immitti ex Hepate, vel per poros, vel duobus peculiaribus, ibi ubi Hepatis caro adnata erat, nam in hoc cadavere facile separari potuit ab epate, manente eoque integrè cum membrana hepatis cavum succingens, tum tunica vesiculæ, adeo ut nec guttula quidem sanguinis profunderetur, nec ullibi vel guttula bilis transudaret: Superficies quidem utriusque maduit discillis vasorum lymphaticorum succinis, quibus abundat. Mucus, quem vesicula copiosum continuit, praeul dubio feri vel lymphæ loboles fuit, quia pellucidos & sapore salso præditus erat, in vasculo prunis ardentibus subiectis amplius inspissatus, in gelatinam mutabatur, planè exicatus, flammam contraxit more siccati feri humani. Non influxit ob internam superficem exulceratam, nam ubique glabra erat, nullibi aspera, etiam ibi circa collum, ubi per membranam internam superficem operientem fibre reticulatim dispositæ transparebat, sed per poros transudavit, ejus fibræ à calculis attritis, & ad aliquam corrugationem & expunctionem seu percolationem compulsi, non secus fieri solet in calculi vesicæ affectis, qui magni copiam talem mucum diu emingunt, salvis pectusque renibus & absente ulcere; unde etiam hujus vesicæ tunica multo crassior naturalis evasit, quod etiam in vesica urinaria observatur. Per porulos serum transudare potuit, quia semper maduit: inflato ductu communi, ipse cum intestino Duodeno & portione Jejunii ligata simulque vena insignis Pancreaticæ accumbens & carni aliquot venæ Portæ distendebantur, postea discisso ad duodenum ac digito imposito & fortiter pressato ex plurimis porulis clara lymphæ exsudavit. Quia vix & per quæ foramina staret ad Portam & illam venam Pancreaticam perveniret, indagate nequivimus, quia nuditer portione hepatis, intestinalium cum Pancreatæ excisis, vasa maximam partem lacera & detruncata erant: certò tamen conficitur statim, non per osculum ductus Pancreaticæ, utcumque hians esset, intrasse, quia ductus ab inflatione nec quicquam movebatur, cum tamen aqua siphonem injecta protinus cum multis ramulis impleretur & amplius crederetur. Denique Innocentius ductu vesiculari oculo scitum iterum non produci, dummodo communis parulus sit, ac bili per osculum exitus concedatur, nam nec ante nec post sectionem lacerata erat, & post sectionem urina prope naturalis mansit; Intestinaque potius rubicunda quam flava erant, & si tunc paulò fieret, illud tamen magis febri comit. quàm bili adscribendum erat. Qualia symptomata calculi vesiculae biliaris patient. Vid. Schenk. l. 3. Observat. Med. de Vesicula biliaris. D. Sorbait Operum Med. Tom. V. c. 5. p. 719. Meermann, Consil. Vid. Cl. Hagendorn c. 2. Obs. Med. Phys. 8. Miserandum calamitatem Chir. Gôdiz. simul calculi vesicæ & vesiculae biliaris affecti.

Fistula ossis squamosi sequens, auris abscessum, ac feliciter curata.

Clariss. Theodori Zwingeri, M.D.C.C. Caroli. Doctor. M.D. Ann. 5. & 6.

Vix annos natus 45, Europæ, labori deditus, vitæ copioso semper usus, sed, quod vitæ requirerebat conditio, humido frigidoque aëti multum expositus, per annum circiter integrum Hemis cranii lateris dextri laboravit, eâ tamen minus vehemente, nec nisi exiguum operibus domesticis impedimentum procurante. Tandem verò mense Anni 1691. Dolor capitis acerbior reddi, indeque noctes inquietæ ac infomes evadere coeperunt: dolor ille sensitivus fuit, & gravativus ad aurem usque dextram se extendens, ac modò mitius, modò vehementius Agram exercebans. Vatia hinc ab ipso primò remediis euphoris in usum trahebantur, sed sine morbi remissione: Vocatus autem ego in subsidium, dum ad Agram accedebam a viropis statim cum deprehendi, bene appetentem, digestentem & egerentem: utinus simul monstravi à naturali neque colore, & neque consistentiâ, neque enervatione deflecentes, unice conquestus est de insigni Hemis cranii per aliquot dies sine intermissione durante, totamque capitis dextram partem occupante, cum aliquali, sed vix adhuc perceptibili reddi autem tumore. Si res idcirco nulla, pulsus tantum non prostratus naturalis, vires satis constantes. Nares, impetibus dextæ, facis sicce manserunt, mucique naturalem & solidam quantitatem non exhibuerant, quibus singulis ritè penitatis, feri aliquis actis salo-fisi stagnationem in variis robulis supra aut infra cranium mihi imaginabar à quo fibre membranaceæ lancinarentur atque dolosificè tenderent. Ad istud ergo serum, partim edulcorandum, partim attenuandum, & resolvendum atque dissipandum, eam tota medendi ratio mihi diligenda videbatur, Curationis initium feci à Chymate emolliente & laxante, ex decocto herbarum emoll. & cephalic. cum Melle rosæ. & Elethæar. lenitio. parato. Hinc venam in dextro brachio curabam incidî & octo præter propter sanguinis uncias extrahi. Post aliquot etiam dies purgans à succino Cratanis pilulas cum Cinnamon. Animon. Milleped. preparat. Magis. Jalapp. & Oleo stillat. Rorsus, præscriptis. Deinceps quotidie Remedia intus absorbentia, incidentia & dissipantia obtuli, ex Animon. Diaphor. fuccin. alb. prepar. alb. prepar. Ebor. prepar. Corall. prepar. Ocul. Cancr. prepar. Diaphor. fuccin. Lumb. terr. prepar. Aqueopul. prepar. Cinna. nar. vel Animon. ops. salo volatil. fuccin. viperar. vel C. C. & similib. concinnata, nunc in formæ pulverem, nunc in pilulis cum Extracto Angelic. Beron. Lign. satybor. ac Oleo stillat. Amarac. adornatis. Quibus subinde Opota ad leniendam dolorum acerbicatem permixti, eamque parum levaminis ex usu talium Medicamentum deprehendens, etiam Tincturam Ammon. Effens. Beron. Zedæar. Croc. spirit. salis Armoniac. unguisum cum Oleo stillat. Ruta. Amarac. Rorimar. Succin. Olesum reddidum ordinavi, omnibus tandem Infusum fol. Thee addidi, utque latera extris primò quidam lintea, accensio Mastichis, Succin. Syrac. calamin. Thur. Sandarac fol. Menth. Solan. Flor. lil. versall. ac salu.

pulvere sumigata collidâ frequentè dextro capitis lateri applicanda, postmodum etiam facculus à Salvia, Majoran. Solan. Heder. terr. Melissa, serpilla, Oregan. Flor. Chamamill. Meliss. Prunell. Per. Bacc. juniper. Semm. Farnic. Carb. concinnatos, modò succos, modò etiam laiti iacochos, calidosque diligenter admoventes cutavi: denum & alia suis, quibus Lympham ubique stagnantem resolvî disicunque posse credidi. Sed his omnibus nihil obstantibus, juvenibusve, tandem Abscessus extra cranium formatus, atque in interioriorem Auris dextæ meatum apertus, laticum albam minus foetidam, nunc crassiorē, nunc aquosiorē fundere cœpit, non hinc insigni dolorem mitigatione. In usu hinc succuli in lacte decocti petteris Ager, simul ac mox fusu Olesum Amygdalarum amarar. Melque rosarum Auri sapidus immisit, ejusdemque caritum libi extingui curavi. Reiteravi tum etiam purans ex missipilul. à succino Croc. cum Atercur. dule. phories sublimat: Insuereque Decellum Lignarum aigue Herbarum traumaticarum per longum sit & rursus bibendum ordinavi. Nihilominus tamen ulceris curatio protrahabatur, dumque fluxus sinici cessabat, Hemis cranii statim in affectu lateris augebatur, manante dein iterum pute, dolor minuebatur. Tandem verò cum sanies per aliquot dies lenè prodiret, ac interdum profus subfisteret; tetrò autem, tumor apparere cœpit, quotidie magis dolens, citra tamen incrementum ceteris naturalem colorem; dolor verò pulsus fuit, uti in Abscessibus, locus autem durissimus. Cogitans hinc de loci ejusdem suppuratione, atque expectatione, pro conciliando facilioti puris effluxu, primum in rem præsentem vocavi jubebam Chirurgum, Dn. Joh. Conradum Zachmannum, cujus experta manus quotidie ulcus tractaret. Accedens ergo Chirurgus, Agram que examinatus, mecum animadvertit, tumidum tetrò & pondè autem, cutis; ex auris cavitate tum, sicut serè continuò manabat quædam aquosa & ichorosa materia, auditum in eadem autè penitus interceptis: formus à longo tempore vel perturbatus, vel nullus, vires Aegri atterebat. Dolore lateris, sive Hemis cranii nunc remissione nunc intensiore existente? Affectu lateri, minore cum incommoditate quàm suo incubuit? Appetitus valde immutatus fuit: sine tamen febris vel fici quadam molestiâ. Accutissimè verò locum dolentem examinantes, intumescentiam non levem tetrò autem dextram invenimus, quam licet primo aspectu datam ac remittentem deprehenderemus, nihilominus sanicim subitus latentem continere satis animadvertimus, ichoremque ex aucte jugiter profluentem inde velut ex fonte suo, sciantis conjecturavimus. Initio postmodum confidit, Abscessum tetrò aures rumpendum esse conclusimus, eaque propter irrus statim Laxans ac Infus. fol. sem. aigue Khabarb. propiuratum, atque postea Decoctum traumaticum ex Lign. & Herb. Pinc. persic. Pyrel. Alchimill. Bazu. Ulsnar. Scabias. Saneal. Anferis. Semin. Hyperic. Aquileg. Farnic. ordinatum fuit, de quo Aegri manè ac vespertî Cyathum plenum hauriet, si possibile, calidum. Extensè verò tamotem tetrò Aures emolliere, suppurare atque aperire conati sumus primâ nocte, imponendo Guaiaci ammoniaci aceto solutum, formâ Emplastri crassioris alute indurati. A quo possidie statim vidimus tumorem nonnihil

nonnihil fuisse auctum; cūque simul appareret mollis, adeoque sic parvis intus latentis indicia præberet, lanceolâ, à Chirurgo profundè factis adactâ, fuit apertus, bonamque coactâ sufficienter materiam quantitatem exhibuit. Ligaturâ minus morte solito cum carpiis lividis ægriore pulvere, ad impediendam hæmorrhagiam, respectu, superimposito *Emplastro Diapalmis*, atque sacculi ex *Dissensionibus & Transactibus odoratis*, vino ut incocto, ad præcavendam inflammationem. Subsequente nocte Ager quàm opimè dormivit, ac postridie retulit, sibi dolores insigniter lenitos esse. Tumor valde minimus apparuit, ac parum saniei pro tempore reddidit. Immissio autem in sulcus stylo, illud sinuosum deprehendimus, cūque introductum ulterius styllum ad cranium usque penetrare, ejusque supetficilem asperam offendere deprehenderemus, prolixius eò loci cariem quandam contraxisse credidimus, simul ac vulnus ampliandum magis struimus, quod cū novâ Chirurgus incisurâ postero mane effectui daret, iteratæ operationis negotium prosequeretur, cranium tandem dextra, led propter obtortam *Hæmorrhagiam*, nihil tum conspici poterat; quamobrem novum hocce vulnus struxi eâ, quâ pius, ratione tractatum & deligatum fuit, vicinis tamen etiam patribus, *Oleo resæto* atque *Chamæmelis caustico* inunctis. Sequenti die, cū secunda esset *Hæmorrhagia*, cranium immisso iterum stylo, exploravimus, ac prope sinuam squamulam in foramen quoddam incidimus, utrumque cranii tabulam petterebamus, per quod stylos caute transivissus, aliquotque inter Meningeam duram & cranium abique Agri dolore verius cerebrum prociudi poterat. Cū autem prima hac vice stylos paulatim extraheretur, notabilis ipsam quantitas feci cupisdam hævescentis scura est, quod tamen hinc confusio adhuc emanabat, Egro in strophilolum exhibitum cum nisu sustinente. Quo quidem sic observato interrogatus est æger, num aliquando itum in istam capitis regionem quacunque ratione accepisset, sed negavit, se tale quid intra proximè elapsos quinque vel sex annos passum esse. Quamobrem in hanc tandem conjecturam devenimus, Hydatidem fortè aliquam in etatis Menyngem enatam, vel Lymphaticum quoddam vas crustulosum sicut nonnulli insinuant & expansum, sternutationis fortiore alius eorum esse, atque tantillam quantitatem feci falsicis inter cranium & Meningem effudisse, quod tū non sufficeret ad Apoplexiam quandam, preliione forti bascos cerebri ac principii nervosi, excitandam, his tamen etat ad Hemiparalysiam, atque imbecillitatem quandam atroxem dextri lateris inducendam, tape enim de hoc conquestus est, quod in dextris artibus longè minis roboris, quàm in sinistris obducat. Sed insinui opinabamur, extravasatum illud serum acrimoniam suâ tenelotem cranii substantiam in loco situate squamosæ indurcti carie perfodisse, sicque factio foramine ulterius per extiores partes molliores penetrando, Abscessum illum ponè autem sinuiformeque ulcus progenivisse. Ad hoc verò probè detergendum, oleamque cranii substantiam ab ulteriore carie præcavendam, spiritus vini dephlegmatus tepide sub qualibet deligatione inspersus, itodeque iterum ab Egro ætrem inspiratum in strophilolum efflante, excussus fuit. Vulnus autem sive ulcus dein filis lineæ carpiis, *Spiritu vini*, *Essentiæ Myrrhe* inunctis replebamur, vicinis *Oleo* liquè dictis illinebamur, *Emplastro de Betonica* imponebamus, tandemque omnia sacculo superius quoque decipio cephalico traumatico, in vino albo

decolto & capello tegebamus. Cui sanandi methodo, cū per plures dies, mane aut vespertî insisteremus, tumor paulatim omnis, dolorque simul evanuit ac cessavit, sanies ex aute nulla amplius promanabat, appetitus somniveque naturalis redibant, omniaque bene satis cedebant. Accidit interea aliquando, ut, dum Chirurgus, more consueti, sub deligatione *Spiritu vini* ulteri inspergete conbatur, nil prius ex siphone produceret, nesciens, quid causæ subesse, pistillum S'phonis fortis adigit, unde confectum, & a peccatis expulsus Spiritus indignusque diffundebatur ac penetrabat; Egro quasi ætuntum subito reddens, vel ita saltem petentium, ut atrepto confertim strophilolo totam comprimeret antroscum nitentem latens. Sed teritus magis Chirurgus, qui menebat, ne qua fortè spiritus per ipsum cranium, Meningeque fortè etas periret, Apoplexiam promptè suscitaturus. Ager autem brevî caput rursus erigens conquestebatur, inspersum Vini spiritum in palatum & nates usque penetrasse, cujus veritatem vel ipse Spiritus per Nares in strophilolum penetrans, & odore se prodens, arguebat. Unde colligere necesse fuit, saniem Ulceris adhuc latentis caniculos egisse, & ad meatum auris usque penetrasse. Ex nocte Ager, à fortiore inspectione dolorem quandam sentit, qui tamen paulatim rursus cessabat. Paucis hinc elapsis diebus, varia cariosi cranii frustula una cum pure bene colto, seroque hævescente prodibant; cūque ab eo tempore ngreremus, ulceris interanea paulatim carne obducta, minoremque in dies quantitatem saniei profundere; loco *Spiritus Vini*, & *Essentiæ Myrrhe*, Decollum plantarum traumaticarum cav. Tinctura composui. *Myrrh.* *Alvæ*, *roci*, *Hyperic.* *Fryda* &c. postea inspersimus, sique tandem spatio quatuor hebdomadarum totum ulcus perfecte sanatum, ac cicatrice obductum fuit. Ab isto tempore Ager in hunc usque diem perfecte sanitate fruitur, recuperatam in artibus dextris robore integro.

Anatomica inspectiones.

Fistula insanabilis ex inspectione anatomica.

Filia Picioris, Nicolai Alie insecta aliquandiu acetho lumborum dolore, in eadē tandem in molestem Angulū fistulam, quæ perenni suo cursu usque eò consumpsit tenelli corpusculi vires, ut brevî exarcessit à vita.

Crius mortis causam inquisitione Anatomie, invenit evidentem eziem in costa spuria emittentem continenter in subiectas partes tantum actoris ichotis, ut filis etosis prodierit inde fistula, ut longe & anfractuosa, sic eludens quancunque opem Medicam.

Quam artis impotentiam non tardè quoque videte est fistulis prope anum exortis; Quatum principium excurrit nonnumquam altissime sive ad Lumbos, sive Thoracis vertebra, imo incedam ad ipsas scapulas, quas scopulâ operta vocat Corn. Celus; Quibus in locis equidem non semel occidit fontem remediis sanatum & immediabilem fistulam.

Earum inaccessa caries, quo minus exploretur specillo impedit tortuosus ipsarum flexus; qui etiam remoratur clysters eluendo ulteri dicatos; Excluditque manum excreant os intus vitiatum; quo tamen minus manare sublato, tollitur immatura morte homo, & obnox ne à Medico sanetur Fistula à remotiore

à remotiore carie originem trahens ? Cujus oras licet fornice diducas & amples (quod tamen ad cutaneas fistulas summe utile) operam nihilominus ludas, nec, pervenies unquam ad remotissimum sinu-
sorum flexuum pulcritimum, à quo descendunt tot ramuli, & tam frequentes rivi per profundiores musculos ac tendines, ut licet specillum vel dexterrim immittatur in tortuosam ejusmodi fistulam, nemi-
quam tamen attingit, nedum immutat, vel tollat eam genitalem petentis ulceris causam. *N. Tulpius lib. 2. observ. 28.*

Ex vulnere Thoracis fistula suborta, spatio aliquot mensium pervadens ad capsulam Cordis, hujus substantiam ad fibras usque cavitatis absumpsit.

Ex vulnere sterni ad quartam costam sinistra parte, suborta fistula in quodam Veronensi, cum per aliquot menses eadem laborasset, ad ejus curationem me vocavit, cujus corpore primò expurgato, nulla licet spe salutis, ratione maciei, qua confectus erat, nec non febris & virium imbecillitatis, immisit turunda copiosum pusculum, à quo aliquot post diebus syncope correptus arget vitam cum morte commutavit.

Dillecto cadavere, inveni capsulam, & fere totam cordis substantiam ad fibras usque ab ulcere cariam. Videant igitur an constare possit sententia Aristorelia lib. 3. de part. animal. cap. 4. quod cor nullum vitium grave diu patitur; siquidem hic putens diu vixit, quamdiu scilicet, ulcus & fistula penetravit ad cavitatem aut ventriculum sinistram ipsius cordis, *Parum de Marchetti in observat. Medico-Chirurg. Sylloge.*

Fistula Lumbaris à rene dextro calculoso. Et. cam Cadaveris Anatome.

Classif. Theodori Zwingeri, Miscell. Curios. Decur. ij. Ann. 7. & 8.

Johannes Boreardus: Pannitionor ac Civis Basilienus, statutz parvæ, choleico-pneugnacicus, hemio-
sus, *Mense Januario Anno 1693.* qui fuit ætatis ipsius circiter quinquagelimos, consilium auxiliumque meum in gravi, quo laborabat, affectione corporis imploravit. Accedens enim ad ipsum, prolata statim narratione mihi exponente capis, se ab aliquot jam retro annis, pro tenuioris sortitus exiguitate, vicibus rarioris sanguinis crassæ, crudæ, frigida æque salis uti quondam fuisse, eaque propter Lepia Nephralgia & Calculi laborasse, imò jam aliquoties calculos minores fibulosos cum Urinâ non sine cruciatibus excrevisse. Dum verò in Ageri præsentem magis inquirerem statum, audiebam mox ipsum de immensi quodam, transivo, pungente & palatorio dolore, dextra Hypochondria sub regione Hepatis occupante conquegentem; hunc verò dolorem jam ultra seculum annum, nunc inveniendus, nunc remissus durans, presentem; nunquam tamen acerbius hominem afflixit, quàm cum Urinæ prodibant clare, tenues, minus turbide vel turbate; si verò eadem crassæ admodum ac turbide existerent, dolor quidem remissior evasit, nequaquam autem perfecit remissit, atque tum Urinæ ab Agero excreta mediâ sui parte sedimentum efficiebat crassum, album, purulentum, sed neque fecundum neque viscidum, pulvis semper existit in isto debili-
or & crebrior; Alvus pænetra quotidie respondebat, & appetitas ciborum utrumque laudabilis manebat; Sitis verò modica sæpe urgebat. Somnus

fuit nec diu continuus; nec molis; vites evasibant paulatim debiliiores, & habitus corporis distindebatur. In hisce igitur cruciatibus Ager & medicis non facile sive externis, sive internis, quibus credebatur curâ vincendum ulcusque latens extirpi, & arque consolidari, eadem simul operâ dolorem leniri posse, aut in casum singula usurpabant. Ut prolix hæc ratione emaciatæ extirget & viribus maximè exhaustis, ubi mox Viræ halitus sperare videretur, eam interea in loco cruciatum luculentè perspicuum inflammatorius appareret Tumor, Abscessum penè maturum refertens, atque Regionem Lumborum & aram immediatè sub costis nothis occupans. Tumor hic primò durus fuit, atque parvus, sed auctus, brevi emineculam non levem acquisivit, mollisculam, tot quâ purulenta colluvies, admotis percipi digitis poterat. Præterite hoc Tumore, ubi pus jam altum querebat exitum, Urinæ & parioris, & clitoris mingeabantur, sedimento carens, quod jam v. h. u. præbebat affectionem antea Renem indicantem. In rupto verò parte doloris acres & palatorii immane quantum sequebantur, consueque doctetiam Convulsiones, sed lenes prælim illas, mox verò universales graviores excitaret, que licet non diu durabant, imminuentem tamen mortem facile prætingebant, nisi ano ynus citò remediis eadem anteverit, procul-
que adhuc acceri posset. Hoc igitur in statu cum inviserem Agerum, ac insinual Abscessus valde jam conspicui locum, magnitudinem atque pulcritudinem conspicerem, neque tamen signa deprehenderem ejusdem sponte cupuri & propolui statim illius incisionem minime differendam, cum Remedium ad præavocanda majora accidentia, leniendumque dolorem præsentissimum. Sed dubius aliquandiu hæsit Ager, utrum mortem scilicet valde propinquam, vel utrum admittit Apostematiz incisionem, miserioris vitz usum diuturniorem præferret. Tandem collecto jam vacillante animo, capite sub-
sequuntur inculcatis melioris spe, præsentem Chirurgum suum in Arce peritum Dr. Samuelum Braunium, iussu sine morâ lanceolam Abscessui infigere; quo confectissimo peractio, legitis potius sincere quæritas effluxit, Agerque levamen dolorum insigni conciliavit. Vulnus infidulum, Ulcusque subsequens pro more deligatum tractatumque postea fuit, sed, cum sanuosum illud fistulolusque esset, nullis sive internis sive externis detergentibus, stercantibus, consolidantibus, absorbentibus atque traumaticis, quomodocumque diligenter usurpatis, sanari potuit; quàn ab ipso adaptati Abscessus tempore ad ultimos usque vitz dies, ultra quadrimennium temper, nunc purulentus, nunc aquosus, nunc etiam tantillum sanguineus ichor copiosè effluxe; sed ita tamen, ut interea redeunte appetitu integro ad vites paulatim sufflueret, & vicesque tantum non prolix sibi naturalem musus deventit, utinam nunquam amplius purulentus, sed quandoque sabulosus, easque claras solididerit. Quæquam autem Ulcus in principio istius sanuosum cûctet, sty-
lum tamen profundius immittere hand potuimus, propter curvaturam sinuum, in occulto decurrentium. Verò simile tamen nobis ex ulceris situ & conditione visum est, sinum istius ad Renem usque ductum terminari, præterea, quoniam à tempore facti Ulceris, nullum amplius pus per Urinam defluere, quamvis languet defluente, & ad vesicam sine incommodo progredientem. Inò licet inter-
dum Fistulæ ostium, superinducti renni membranula, coalesceret & clauderetur, nullum tamen amplius se-
rum purulentum cum Urinâ excrebatur, sed illud omne intra sinuosos Fistulæ ductus coarctatum, dolores prius,

pilos humilissimos denuo fecit acerbissimos, usque tamdiu durantes, donec Fistula orificium, discipula membramula, iterum aperiretur, libertumque puri exitum denuo concederet. Temporis hinc progressu, cum Aeger, post elapsum annum ferè temper lecto assidue teneretur, litorum ferum paulatim subiret citim inter musculos Clunis dextro natus excavavit sinus, tandemque & ibi faciem ulceroformi fecit, quem profundius intra musculos abscondimus, cum natura aperire hand posset, scalpello idem aperiri, postque omne extrahi curavimus, fœnecum nam aliqualem concepimus, forte, ut pure jam vetus musculos femoris effluxum concuteret, luperius Fistula in lumbis orificium clauderetur, & perfectè consolidaretur; ast contrarium evenit: etenim ex utroque postea ulcere, continuè purulentes emanavit ichor, ut non tantum commacularet, sed & insinuat lecti stragula perpetuis fororibus madefaceret, citra notabilem fœtorum, nisi quando diutius in tibus fororibus immundus obhæret. Interdum autem tempore iterum emaciari Aeger, viribus exolvi, atque citæ initium Anni hujus 1698. simul vomitibus affligi coepit, primum quidem continuus, cum Urinx, Alique suppressione, anxietate præcordiorum insigni, atque Cordis palpiatione hand vulgari: postea verò ratiocibus, & neque tam crubid, neque tam acerbè excruciantibus. Symptomata verò illa per octidui spatium continuabant, & manifesta Nephritidis indicia præbebant; ubi usu autem Nephritico-Cardiacorum paulatim cessabant. Alvus denuo aperiebatur, Urinxque exierit narsus, fed modicè incipiebant, tandem & melius proficere: atque ita Aeger ferè exanimis ad se redire paulum videbatur: sed cum Appetitus intestina nihilominus maneret dejectus, & sitis augeretur, vomitus quoque interdum redierunt; orificia Fistulae claudiebantur, ac ne guttulam quidem Ichoris amplius funderent. Tum verò impetù noviter macie extremâ, dolores Aegrum universales, Pectoris anxietates, licet missis, palpiatio Cordis assidua, denique & acior Interitoeorum, cum crebris vomitibus, atque licturiâ novâ, adeo torqueret compertum petere: cumque, ut inde ad desperationem fere adductus militet, neciter prociis quid ageret, vel loqueretur, donec assumptâ sepe Escensâ narcotica, animi tranquillitatem rursus nancisceretur, sub qua dein ad beatam sepe analysin præparabat, eamque etiam ex voto, Die 28. Aprilis Anno 1698. consecutus est, postquam suum mihi cadaver illustrandum, vivens adhuc non semel commendasset.

Itaque postidie ad Cadaveris apertionem me contuli, in lustrationis consortium admissis Viris, Juvenibus Nobilibus, atque Præstantiss. Domibus, Joh. Henrico Homingero, Tigorio, Chirurgo, & Medico. Doct. Gabriele Bely à Belfers, Curio-Rheo, Medico. Cand. Maurilio Suter, Zessingensi, & Martino Legelino Bernensi, Medicis. Cultoribus. Cadaver autem primo nobis intuitu comparuit undique emaciatum, cum Abdomine depresseo penitus atque velut cullapso, in cujus incisione tamen adiposam adhuc tunicam, sufficiente axungia tepteram noxavimus. Musculi quoque Abdominis hand adeo macilentis fuerunt, quemadmodum atrea credebantur; imò appetito in cruceo Petrosano; Omentum neque consumtum, neque adipe, qui cineritici fuit coloris orbatum apparuit. Hepar autem iusto minore nobis mole percipit videbatur; substantiæ friabilis admodum minusque compactæ, sed fœderatè protius, intus extusque similis, coloris variegati. Vescicula Fellea autem valde ampla fuit, bileque fluida quidem, sed admodum nigricante repleta. Ventricu-

lus Interstinaque prociis exanimata, hinc inde fiduciat quoque. Cor, Pulmones, Lienem, Pancreas, Vescicam trinitatem omni libe enteria deprehendimus, nisi quod in dextro Cordis ventriculo, crassus fœtus, longue in Ventræ extra Cor prociis extiterit Polypus, sine dubio Palpitationis atque Anxietatis frequentis author, quam Aeger ante mortem expertus est validam. Ren verò simul et naturalis multo major, in pelvi quidem conceptum tenuit Lapidem, inæqualis admodum figuræ, asperum, angulatum, tubulosum, neque adhuc valde induratum, magnitudine Nuclei juglandis; per ipsam verò reliquam Renis substantiam, deprehendimus hand contemnendam fibulæ caleformis ac friabilis quantitatè; quæ sabulosa materia, viscido interpersa succo, & papyro ad exciccationem imposita, in Lapides suis duros concrevit. Præterea adeo numerolæ in quamplurimis ejusdem Renis tubulis extiterunt arenule, ut substantiam visceris ad tactum fere arenosam redirent. Ren dexter eo sumptus planè, omni que parenchymate destitutus, non nisi crassas quasdam, duras atque tenaces ut nicas, omni cavitate carentes, exhibuit, Integumentis Lumborum internis valde aduratis, atque intra se ramen adhuc quinque lapillos durissimos, siliceos, magnitudine Pisorum majorum continentes. Fistula autem, quæ Ager laborabat tandemque ejusdem Renis substantiam transibat, & ad lumbares usque vertebrae progrediebatur, jam jam cario infecta, exteriùs verò rancidas inter duas ultimas costas nuchas, obliquo admodum ductu petrexit, ac tandem cutim in lumborum latere dextro penetravit, hincque ultiores agendo cuniculos subter cutem divergata, plures sinus ulcerofofos, lutei eluvium musculos deflecentes, nobis conspicendos monstravit.

FOETOR Narium, Orit, Pedum &c. Fideo
Morbis specialibus eorum parium.

FOETVS.

Super eò videri possunt quæ sub titulo PARTUS hæc beneat: Hic tantum singularia quædam asseremus de Fœtibus extra uterum locatis, ac emigratis; imò & inde per Chirurgiam eductis; nec non de Fœtibus mortuis innoxie quandoque in utero per plures menses cominorante, aliisque non minus Chirurgo-Medico utilibus, quam curiosis. Veniant itaque primò hystorice factum extra uterum locatorum, ibique plus minus auctororum, ac etiam ad plenam propè maturitatem vegetantium.

Formationum Fœtus in Ovario Muliebri,
Historia tres.

Historia 1.

Petitur ex Epistola à Clariss. Dominò de St. Mauris ce M. D. ad Clariss. Dominum de la Cloisire, apud Petrocorios Medicinam facientem, 26. Aprilis Ann. 1682. conscriptâ.

Post id quod modo Nobili Matronæ de S. Mère accidit, de fœtus in mulierum testiculis formatione, ac proinde de Ovorum existentia, vix quinquam dubitare debere, credidit, Vit Clarissime. Matrona illa, cujus eximias novisti doctes, cum jam octies felicissimè peperisset, & ab annis quinque gravida non fuisset, atque propterea ejusmodi periculò desuntum se putaret; in illud iterum se incitasse autem eras claciet meo potavit: quia mensuris, quæ eam nunquam defecerant per mentem integrum & amplius,

de amplius; ceteri alii male non haberet, desinere fuerat. Sed cum paulo post aliquid sanguinis ex utero (per duos postremos vitæ ejus mentes jegeret iterò, abique tamen illò incommodò, stillaret, se pregnantem non amplius credebat. Vicesima secundæ autem hujus mensis die, postquam sana mane lux resillisset, & per horam præter propter usam scriptississet, in deliquium, quod pulsus omnino supprimebatur, incidit: loquebatur tamen, & cognoscebat. Dominus de S. Mére deliquium illud vapori cupiam mulieribus familiari adhibens, eò non multum commotus est, donec arretractò brachiò nullum invenit pulsium. Tum privatio illa, pallori læthali junctæ, cum ad eò terrefecit, ut emissò nuncio me festinanter acceriverit. Ad agram circa octavam vespertinam accessi. Eam frigidam & sine pulsù inveni. Facies decolor, sudore pingui & frigido madebat; ratione tamen & loquela etiamnum libere utebatur. De vehementi dolore colicò ab æquino dextrò ad teretes continuatò querebatur; & tantus ille erat, ut cum partem dolentem tangere voluissèm, ea me se attrectaret, præ syncopes meò, rogaret. Momentò post imminens partus omnia sensu præludii. Chirurgam suam vocat, atque inter ejus brachia, se peripisse exclamans monuit, nullò sanguinis effluviò, aut aliò mali ipsius statù indicio, extrinsecus apparente. Lethum ad eò inopinatum artemios omnes reddidit, & Dominum de S. Mére ad cadaveris apertionem, ut ejus causâ retereret, petendam impulit. Dominus la Chesle, Chirurgus ad id officii, me assistente, præstandum, electus fuit. Domini de Montanjon, Velanæ Petrocoriorum Advocatus, de la Perre, Eques Domini Comitæ de Taleran, du Pair, Pharmacopos, cum duobus famulis, testes fuere. Apertis Abdominis integumentis, intestina omnia, parte epigastriacâ, sanguini immerita visa sunt. Sanguinis illius ultra duas libras, cochleari, ne situs partium moraretur, extrahi curavi: ita tum prodigiosam ejusdem coagulati quantitatem, in dextro latere resistentem adveniens, cum manu auferre ipse tentavi. Quàlì verò stupore percussus fuissèm, cum inter priores grumos, lætum pollicem crassitie æquavim, longitudine verò eodem tertii parte brevioris, distinctè formatum, in quo levis musculinus facie agnoscebat, nudum ac sine integumentis invenit, judicet Vir Clarissimus? Fatum hunc quædam impoñum omnibus adstantibus ostendi, atque locum unde existerat percipiendi avidus, vicinas partes diligentiissimè examinavi. Duobus digitis ab eò loco in quo consistebat, distare utriusque dextram vidi. At ausculti est stupor, ubi testiculum secundum longitudinem per medium dilaceratum quâ parte rubæ non obverius est, adverti, ejusque capacitatem sanguine oppletam notavi, libi intactam formatum fuisse nullus dubitavi, similis, cum, nimium in eò locò incrementum adeptum, opportuno tempore exciderit non potuissè, sed tandem effractò carcere, erupisse cognovi. In meâ sententiâ confirmatus fui, cum testiculum hunc cum sinistro comparans, cum quadruplò crassioris invenit, ovum enim gallinaceum crassitie æquabat; sinister verò minoris castaneæ viræ magnitudine suâ ardegebat. Ille fortis & intus ruber, & præterea in se sanguinis grumos continebat; at sinister pallidus & granulatus, sebo luteo similibus effertus erat. Tubum dextram examinavi, nec factum eam unquam fuisse notare potui, quin ea sinistra omnino similis erat. Utrum tandem accuratissimè lustravi. Is nullatenus laceratus, sed in statu merè naturali mihi visus est. Notandum eum crassioris & molliorem, quàm in læminis non prægnavibus in-

veniri solere, fuisse. Talis omnino erat, qualis ab Harvæo præiò graviditatis mente descripta. Specillum per vaginam in uteri capacitatem introductum, huncque distendi curavi, insubique ne vel minimum concepionis indicium animadverti potuissè. Membrana interioris vasis sanguine turgida; & non parum varicosa mihi equidem apparuerunt; atque hinc dubio pectus parvus ille, de quo locutus sum, fluxus obortus est. Quamquam moritæ hujus matronæ causam aliorum inquirere ite necesse non esset; cæteras tamen, cum abdominis, tum etiam partes considerare volumus, easque optime & naturaliter constitutas reperimus, &c.

Historia 2.

Excerpta est & Dissertatione de Structurâ & Uti Uteri, quæ jam à duobus annis mihi fuit peramicè communicata à Præclarissimò Domini Vivusensi, Regis Galliarum Consultariò ac Medicò Ordinariò, & Illustrissimorum Academicorum Regiarum Parisiensis ac Londinens. Sociò dignissimò: quæcumque ego Dissertationem illiusm Clariss. Philippi Vesingii Anatomix Editioni, inscriptam traxidi. Historiæ autem de quâ hic agitur titulus & materia hæc sunt.

Oblatio Du. Du. Montagnier, Celeberrimo Mafsilensium M. dicorum Collegii Aggregat. super formatione Fætus Humanæ in lo. 6. insolitè.

Mulier 30. annos nata, temperamento secò & melancolicò; triginta ab hinc mensibus nuptæ, facili cum iuvene suo inuente mensis februarii anni 1697. filiam peperit. Menie verò post partum elapsò, è domo sua egressa, parum adhuc fluxuibus loculis, ipsòmet exitus die, horribitis internis corripitur, & biduo rursus elapsò, in febrem continuam incidit, quam comitabantur pectoris angustia, ut & tumor durus in mamma sinistra, à lætè diu intra ipsius texturam congesto ortus. Febre hæc cruciata, fuit per 30. dies: tumor autem evanuit post longam suppurationem, & inuente tantum Junii mensis tribus domesticis vacare potuit. Interim factum suscepit, quævis concepionis illius uesicia; liquidem hemorrhagiâ uteris lal orabor vites partum frangente. Octo autè obitum diebus, animi deliquium ita vehemens passa est, ut cadaverosam faciem præ se ferret; atque fumens algore fuere cætepi; pulsus explorationem omnem fugiebat; totus corporis habitus sudore frigido madebat. Ab his horrendis symptomatibus, per tertia à me præscripta, horâ secundâ pomeridianâ liberata visa fuit. Dein ordinariâ agendi methodò ad ultimum usque vitæ diem, citra ulum grave sanitatis dispendium, insistit; recidivam meruens medicamen purgans felici cum successu propinavi, quò exhibito, aquas de Myrs dictas, manû jejuno ventriculò per biduum, potavit; appetitus vigeabat, & lauto utebatur cibo; rebus domesticis ne antea vacare pteret; sed irritis omnibus meis conatibus, die sextâ Julii mensis, anni prætermorati, horâ quintâ pomeridianâ, iergens vomitus ipsam torit, ut & novum animi deliquium. Carollæa remedia in usum adhibita sensus externis succedunt; sed facies cadaverosa videbatur, & artus glaciæ instar algidi perterritabantur; pulsus digito exploranti se le quasi propitior; interinque summò cum virum languente de aliquibus internis conquebatur. In casum fuere exhibita omnis generis pharmaca, quinque enim horis post hypophysicæ prædictæ elapsi, vitam cum morte commutavit. Hæc tam stupenda quæ hæctenus memoravi symptomata,

symptomata, argumento mihi fuerunt, cur fami-
liæ illius cadaver apertiri rogaverim, eò fine ut ipsorum
causas indagarem. Facta fuit apertio, me præfente,
postidie mortis ejus, à Domino Monginotio, Lym-
becki peritissimò Chirurgo. Hic antequam ego arbi-
trabamur polyppum aliquem in cordis cavitatibus o-
culari: inò & in pulmone sanguinem aliquem ni-
mis condensatum contineri. Sed nos fecit hæc
opinio; nulla enim in hisce partibus animadvertenda
est alteratio, quæ sub seculo cadeter. Cùm verò
apertus fuisset sinus venter, ejus cavitatem vidimus
omnino repletam sanguine, partim concretò, partim
fluidò. Dum autem plenis manibus illum hinc
hauserat Dominus Monginotius, bimestrem, aut
circiter, sætum in eò satantem deprehendimus,
optimè jam efformatum, cum funiculi parte ma-
jori umbilico suo annexa, quatuor digitorum trans-
versorum longitudine. Exhaustò toto sanguine in
sinu ventris cavitare diffusò, & aqua optimè lotis
visceribus, illa omnia adhò integra servavimus,
ut nullum vas sanguineum in his apertum de-
prehendere potuimus. Exploratis itaque Jecoris, Sto-
machi, Epiploï, Lienis, Intestinorum, Mesen-
terii atque Renom Strati, Uterum à partibus vicin-
is separavimus, cum ligamentis suis & Vaginâ.
Cùm verò viscus illud coram ingenti testium nu-
mero attentissimè examinaretur, nihil in hujus na-
turali magnitudine, ut & in figurâ ac substantiæ
texturâ; immutatum reperiebamus. Testiculus si-
militer in naturali existebat statu: dexter verò, qui
ab utero corpore tribus transversis digitis distabat,
visus est nobis sexies similitò crassior; & cùm exi-
mam ejus superficiem examinaretur, plura inter
ejus binas membranas traspesimus ova, illarumque
quâ parte dextera Fallopii Tubæ Tentorio obver-
terit porsis lacerum invenimus. Hujus partes &
vasa cùm perscrutaretur, inibi carnem quandam
mollem, subrubicundam, vasculis sanguineis cou-
spersam deprehendimus; quæ tamen album acqui-
sit colore, simul ac aqua probè fuit abluta.
Cæro hæc intente ovarii membranarum superfiei-
ci adhærebat, ut eam pro pueruli placentali ha-
beremus. Darum Lambeski 17. Quantilis, anni
1697. Montagnier.

Præclarissimè postea Dominos Viruensis, Massi-
liæ Montepellum rediens, cùm Lambeski transiret,
sætum in præcedenti observatione descriptum, apud
Domium Monginotium asservare vidit.

Historia 3.

Habemus in Commentariis Illustriss. Academiæ Re-
giz Parisiensis, Anno 1701. & refertur à Præcla-
rissimò Dominò Liarte Academiæ illius Sociò di-
gnissimò. Hic etiam inter alia multa in Ovario
inistit mulieris cujusdam reperta, verba facit de
speciali quidam vesiculâ, quam tertiam dicat, quia
de duabus aliis jam locutus fuerat; à quibus hæc
ultima in cò differbat 1. quòd minoris esset volumi-
nis, seu molis. 2. quòd per membranas vestientes non
transparet. 3. quòd in capsulâ concluderet rotun-
dâ, è duabus substantiis constitutâ, & per sui
fundum ipsi ovario, vasculis multis, ac membra-
nacels fibrillis colligata. Cujus substantia exterior
tertiâ lineæ partem, exterior verò dimidiam, cras-
sitiæ æquabat: illaq; præterea tubra & musculosa;
hæc verò glandulosa & coloris subflavi erat. Ter-
tia autem illa vesicula, præterquam quòd liquorem
diaphanum ac mucilaginosum concluderet, exhibebat
etiam sætulum, lineam unam & dimidiam crassum,

Bibl. Chirug. Tom. II.

tres verò longum, interioribus vestit membranis,
per funiculum tertiam lineæ partem crassitiæ æqua-
rem, & lineam unam ac dimidiam longum, conne-
xum. In quò sætulo sensibilibiter distinguebatur caput,
& in capite parvula fissura, ibi loci ubi naturaliter
os aperitur: ac præterea ipsò nudi locò minima emi-
nentia, atque utrinque ad latus latera lineæ insculpta;
quæ oculi designabantur. In imi trunci ut digne latere
aderat eminentia rotunda, mediocri aculeæ capiti-
crassitiæ: Item ad latera superius ejusdem trunci,
utrinque eminentiæ itidem rotunda, sed inferioribus
minor; quæ eminentiæ procul dubiò rudimenta su-
periorum ac inferiorum artuum præbebant.

Hactenus de Ovis in ipsis Ovariiis sætularum facun-
datis ac in pleorè efformatis fecimus abundantius, ex dua-
bus altaris historiis satis. Jam videamus quid de hisdem
ovis ex ovariiis suis excelsentibus, & à naturali sui per tu-
bas in uterum viâ in ipsum abdominis cavum decipitis
præ aliis Historiis, plenè cum certitudine pronun-
ciare possimus.

Ex his quæ in Theatro nostro Anatomico, sub fi-
nem Capitis de Partibus Mulierum Genitalibus, super
Maurerâ Genevensi Phobica, 21. junii, anni. 1679.
à nobis apertè observatis, abundè constat, non raro
ova ex ovario in abdominis cavum delatâ, ibique
astricta ac frangente fieri, sive quod non satis facun-
datis sint, sive quòd in partes non devotiunt quibus
commode adherere possint. Verùm talis frangere non
est perpetua, signum illa ova aliquando in grandio-
res facti in eò abdominis cavò emissa fuerit, ut ex se-
quentibus patet historiis.

Historia. 1.

Reperitur in Diarîo Eruditorum Parisiensis, ex re-
latione Peritissimè Chirurgi Domini Saviard, nec
non famosissimæ Obstetricis Domini de Govei sub-
scribentibus isdem Solertissimis Chirurgis Domi-
nò de Isai, Dominò Hemmeret, Dominò Mau-
riceau & aliis. In illâ agit de Muliere, quæ
postquam in maximis doloribus extincta fuisset, in
suo abdomine resecratò exhibitè factum incorruptum,
cujus sola cuticula destructa erat, cuiusque placen-
ta tam validè alligabatur mesenterio ac intestiis
colo à parte levâ, ut ab hisce suis adhaesio-
nibus difficillè admodum separari posset.

Historia. 2.

Refertur à Præclarissimò Dominò Couriol. Medi-
cò Tolosate, in suis Observationibus Anatomicis, &
hæc est. Cùm Chirurgus quidam Tolosanus accersitus
fuisset pro operatione calcaræ peragendâ in Muliere,
quæ ipsò momento extincta fuerat: incisionem suam
instituit in abdominis parte dextrâ, quæ ipsi emi-
nentior visa est, utroque conspectò ipsum aperuit.
Ille revera magnus reptus est, scirrhosus, ac qua-
tuor digitos transversos crassus; sed cavitatis mini-
mæ, sanguine subnigrò & grumoso repleta, ac omni
procul ita vacua. Cùm interea Parentes mulie-
rem hanc gravidam esse assererent, totum ille ab-
domen resecavit, ac non parum percussus est, cùm in
latere sinistè sub epiplois factum perfectum observa-
ret. Itaque hæc novitate motus ad Scholam Med. cam
in quâ de carbedâ rum temporis docebat, depre-
cans ut ad se quantocius accederet, continuò di-
misit: cùmque advenissem eam mihi exposuit. Tom
ipse manum operi admoveans, infans hujus situm
exploravit.

exploitavi. Cubabat capite infra posito super lumborum spinâ ad levum latus, atque longitudine suâ tres abdominis regiones occupabat. Pedes sub stomacho ac intestino colâ, reliquumque omne corpus ommentis contectum, reperebantur. Funiculus umbilicalis ipsius collum cingebat, totumque corpus è membranis suis ac involutis excesserat. Funiculum resecti, infantulumque istum de matris sinu, in quò mox extinctus fuerat, retraxi. Observavi autem quòd ille sibi cubile quoddam depressum paraverat, ab ipso inferioris-ventriculi mediò, ad usque dimidiam pedem infra venem sinistram; quòdque ad latus dextram intestina omnia tenuia, medium abdomen ordinatim occupantia, propulerat. Masculus erat, in omnibus suis partibus perfectè conformatus, bene nutritus, ac maturitatem nonnisi faris plene adeptus. Funiculum postea, quem in matris abdomine reliqueram diligenter perquisivi, ac secundarias reperi è placenta è membranis constitutas. Eam autem placentam sub inferiori stomacho, ipsoque intestino colâ, vasis gastroepiploici adhærente observavi: verum cum illam adhesionem attentius examinare avetem, illud minimè licitum fuit, quia separatio horum corporum ab invicem momentò temporis facta est. Illud verò percepi, quòd placenta, secundum totam adhesionis suæ circumferentiam humidatibus viscosis maderat, quòdque inibi vasa sanguinea, & magis dilatata, & sanguine turgidiora, apparerent quàm naturaliter fieri solet. Interea tamen inæqualitatem aliquam notari dignam, ac sensibilibiorem in inferiori ventriculi superficie deprehendere nequivi; etiam hoc viscus, eâ in ipsâ parte, cui scilicet placenta adhæserat, paululum crassescitum animadverteterne. Opinatus sum quòd ille fetus ex utero, vel ejusdem tubis pertractis excesserat, ac propterea sedulus inquisivi unde demum elapsus esset. Uterum attentò oculò contutus sum, in totâ superficie exteriâ, quam æqualem & prorsus integram observavi: ejusdem interi cavitas itidem integra visa est, ut & tubæ ac testiculi. Hæc omnia peracta fuisse, pluribus assistentibus testibus, tum mortuæ confanguineis; tum aliis, &c.

Historia. 3.

Mihi petamice communicata est pinguis die Maii, anni 1714. à Præclarissimò Virò Dominò Johanne Baptistâ Bianchi, Medicò & Anatomicò Taurinensi, magnò sanè sub merito Celebratissimò. Acque hæc est.

Angela Francisca Marona, mense februario anni currentis 1714. subobscuro afflicta est in abdomine dolore, ac nobis asseveravit se nonnisi gravidiutatis tempus completisse. Quæverunt postea hi dolores; sed vehementius recruduerunt die quartâ Martii, unde se partui proximam credens obitricem accessit, quæ postquam eam in sinu apri collocasset, ac manum in vaginam introduxisset, sequuta est copiosa hæmorrhagia, vomitus; cardialgie ac febris intensa: illique omnibus, quod notatù dignissimum, adjunctus est dolor divulsivus in regione umbilicali. Verum & dolores & ipsi vomitus integ è sopiti sunt, eò ipso momentò quò factus vivere, seu potius moveri desit. Interea continuò apparuit tumor in umbilicò è quò stillabat humor fetidissimus. Chirurgus exploratò rumore ac dilatato ejus orificio, ex abdominis rotando cavitate, octodecim diebus postquam omnis morus intus cessaverat, eduxit fatum perfectæ maturitatis, cum suâ pla-

centâ, sed membranis omnibus destitutum. Mater huic operationi decem dies supervixit, & forsitan integrè evasisset, si illa maturam fuisset, antequam scilicet contrahi à fortè motu partibus sibi vicinis per longiorem moram communicata, lethalem ipsis labem impressisset. Fœtus ille ut apparuit in abdomine post mortem testatò, superficiei omnium intestinorum incubebat, istique alligatus fuerat mediante membranâ, in id à naturâ efformatâ, quâ etiam prædictâ infœcia veluti novò ac superadditò melenatium intestini connectebantur; & unde fœtus alimentum necessarium trahebat. Fœtus hic, ut iam dictum fuit, naturalis erat magnitudinis, ossa cranii per putrefactionem à suis divulsâ regementis reperta sunt, cerebrumque prorsus dissolutum.

Eadem hæc Historia fuit postea descripta fuit, Italicò Idiomate, à Petriissimò, & magni nominis Chirurgò Taurinensi, Dominò Paulò Bernardò Calvò.

Postquam huic usque per historias allatas satis confutis de Conceptione, ac fœtum ejus formatione, tam in ipsi Ovario, quàm in Abdomini cavò, superest ut jam transsumamus ad Conceptiones Testiculas, imò fœtum in hisce canalibus plenas efformationes; quod itidem pluribus perficiemus historiis.

Historia. 1.

Proponit transitum ovi ex ovario in tubam dextram, prout describitur à Solertissimò Anatomicò & Chirurgò Gallò; Dominò Bussière, in Epistola Gallicâ, Actis Philosophicis Anglicanis, mense Januariò, anni 1694. insertâ, quæque sic latine sonat ex translatione Præclarissimorum Collectorum Actonum Lipsienium.

Mitto Tibi, Domine, descriptionem Tubarum in utero mulieris corporis, à me non ita pridem dissecti deprehensarum. Mulier erat juvenis, 25. vel 26. annorum, quæ non multò ante fatalem horam ægrum fuerat enixa; ut observare mihi licuit 1. ex infimi ventris cicatricibus adhuc dum recentibus. 2. Ex disruptione fustillæ, ejus cicatrix admodum erat nova. 3. Ex uteri magnitudine. Denique ex aperiturâ Ovarii in latere sinistro, ex qua ovum quod inservicrar priori infanti exierat, quæque adhuc dum lata valde erat, & cujus extrema aliquatenus adhuc lacera cernebantur. Ea autem tamen non longò ante tempore peperisset, denuo, seu ex libere, seu quod speraret mortem, ubi gravida facta esset, illatum non ita, cum amico quodam, aut fortè aliò quò aliò ex his qui in publicâ custodiâ erant congesti est, ita ut conceperit. Verum mortis supplicium antea subit, quàm ovum à femine vili impregnatum in uterum deferri poterit. Eam verò, dum incisione factâ aperissem, deprehendi tubam dextræ lateris venâs extenuatam itam præter solitum distensam, quòdque ea distensio in maximâ suâ latitudine complectebatur paulò plus quàm pollicem unum in diametro, ac venâs utram sensim diminuta paulò ultra sesquipollicem præcedebat. Eæ pars hunc in modum dilatata se incurvabat, totumque fœtè amplexabatur ovarium cujus membranæ tam firmiter adhærebant, ut ab eâ non nisi vi divelli posset. Divulsa vero liquorum præbebat limpidum & pinguem, qui probabiliter isti fuit usui, ut vel membranas tubæ relaxaret, quò distenderetur commodius, ipsiumque ovulo concederet quò in uterum ptegeretur, vel fortè ut canalem istum,

ad parandum ovo faciliorem transitum lubricaret, vel etiam ut utrumque præstaret. Et illic quidem inquisivi, numquid dignosci in corpore tubæ posset, à quo liquor ille originem traxisset? Sed nihil tale in eâ deprehendi, licet multo crassior esset solito. Cuiusmodi autem illa proveniens ex ejus fibrarum intumescentiâ, quæ non minus carnosæ erant, quam ipse muscularum fibe. Id quod sine dubio acciderat, ut scia vitium ac morbi illi parti ad ovalom comprimeudam, postquam ab ovario separatum erat, atque illud in uterum propellendum impetret. Ego itaque judico, quid liquor ille in tubâ contentus ex ovario proveniat, quodque ex foris, parvisque vasibus lymphaticis & aliis, quæ ad transitum ovo impregnato apertiuscendum rampuntur, liquor ille defluat, addo ut licet laceratio ovarii vulnus sit ac symptoma, utilitatem tamen præbeat, effectusque fortæ necessariis producat, seu ad primam ovi nutritionem, seu ad faciendum ejus ad uterum transitum: ita enim natura novit cupida ad salutarem usum dirigere. Confirmatur sententia mea ex eo, quod in femellis brutorum animalium, ex quarum ovario plura ovula simul procedunt, maxima illic liquoris hujus copia deprehendatur. Tubâ tandem ab ovario separata, liqui itaq; delapsi, ovum apertè conspectui nostro fuit oblatus. Aequabat illud magnitudine avellanæ, liquore in mediâ tubæ cavitate dilatatâ conclusâ involutum. Tres hujus ovali quadrantes jam extra ovarium per factum illic foramen exierant, & illi non amplius adnexum videbatur. Nihilominus tamen cum illud auferte eniteret, adhuc adhærere illi deprehendi per peritolum satis datum, per quem decurrabant vasa sanguinea, intra ovulum, & etiam supra illud dispergenda. Per illa vasa fertur materiam sui nutrimenti ac incrementi recipere, non minù. In ovario quim in utero, siquidem periculosus ille placentalis rudimentum procul dubio continet; (si eam velis in ovario jam efformatâ) ac per illum uteri partibus adhærere. Atque hinc omnino intelligi potest quod seminalis maris sâctus ad usque ovulum in ovario ascendat, motumque illi ac succunditatem inibi concillet. Uterum quod spectat, nulla adhuc dum sensibilis in eâ advertebatur mutatio, nisi quod humoris mucosi plavulum contineret, quod cum naturali ejus statu multum non disconvenit. Tubâ sinistrali lateris naturaliter se habebat, ut & ovarium sinistram, si eam exceptis appeturam per quam exierat ovum unde priôr fœtus efformatus fuerat.

Hactenus Peritissimus Dominus Eussière circa ovum fecundatum ex ovario in tubam uterinam delapsis, quod idem evidentiissime patet ex observatione quam sub finem capituli de Mulierum partibus Generalibus in Theatro nostro Anatomico, attulimus. Hoc numm subjugimus, scilicet quod ex magnitudine ovi à Dominò Eussière descripti, atque ex vasibus quibus illud ovario adhærerebat, non tantum constat de ovo fecundatâ ex ovario in tubam sibi per corpus fimbriatum intimè connexam decedente. Sed etiam de conceptione non parum aucti, unde procul dubio fœtus efformatus in ipsâ ovarium inter & tubam intermedium, seu ejus placenta in ovario, maxima verò corporis pars cum suis membranis, in tubâ introitu, existisset.

Historia. 2.

Habetur apud Clarissimum Gracium, & reperitur in Theatro nostro Anatomico, sub finem Ca-

Bibl. Chirurg. Tom. II.

pitâ de Mulierum Generationis partibus, ejusque pictura explicatio traditur in illius Operti Tabulâ 78. figur. 1. ubi ex observatione prædictâ Clarissimi Graecii satis superque apparet conceptionem Tubarum illic deicibi, seu potius tubâ in talis efformari, ac non parum aucti delineationem contineri.

Historia. 3.

Commodè præci potest ex explicatione figuræ 1. Tabulæ 78. Theatri nostri Anatomici, nec opus est ut hic specialius illi enarrare immoretur.

Historia. 4.

Grandiorem sibi tubarum conceptionem ex Accuratisissimò Anatomicò Dominò du Perrey præstatam, cujus plena descriptio habetur in Theatro nostro Anatomico, Tabulæ 78. figuræ 4. explicatione.

Historia. 5.

Exhibet statim à Tabâ efformatum, atque inde multo superfluo à Clarissimò Arabani Cypriano, M.D. ac Anatomi & Chirurgi in Academia Francofurtensi Professore adductum illa autem, quæ à celeberrimò Virò referente, hæc est, prout in Epistola ad gloriosissimum Thomam Mollinierum, Equitem Aurum, Medicum Reipublicæ, & Collegii Medicorum Lugdunensium præfatum, referatur.

Cum tuo rogatu accessitque (Vir Clarissime) calculum è venâ tuâ feliciter excisum in corrente annò ætatis 68, Tibique post prædictam operationem ferè quosidie adhærentem, ut hic, inter vos festino incidit de tali rebus quibusdam casibus, qui inter medendum occurrerant, quique ad Chirurgiam imprimis spectabant; itaque dum inter alia tibi naturam de Fœtû ex Tubâ Uterinâ existit, matre etiam nunc salvâ ac supersistente, inque à me continuo quæreret, quid sit cum hanc historiam adeò memorabilem scriptis nondum mandavim: Hoc imprimis respondebam, me, tum ob ætatem, quâ duos abhinc annos natus sum, valetudinem, tum ob varias peregrinationes viâ tantum oculi nactum fuisse, ut quæ jam dudum in advertenti reulegam in ordinem quandam redigerem. Scitavimus enim non solum hinc causam merito inter rariores numerandum, sed & alias quamplurimas observationes & curationes Chirurgicas minus obvias publici juris facere. Verum cum amici quidam doctissimi à me impetrâs efflagitant, tuque possitimum Vir Celeb. auctor fueris ut hanc Historiam sigillatim typis manderem tuo imprimis desiderio morem gesturus eam commentariolâ illustratam Amplissimo tuo nomini inscriptam vovero, atque quæ soles humanitate æquâ bonique consulas crûe rogo.

Atqui verò hic interim dolendum est, Chirurgos pletoque etiam celebres & magni nominis, periculosas & difficiles operationes omni studio vitare, haud dubie verentes si res minus felicitet, & pro ægroci verò non successerit, ne quid detrimenti fama & existimatio apud vulgus ceperint. Hinc fit, ut morbis quotidie occurrentibus medentes, & contenti ire quæ itur, lucrum ex illis querant unde minus est invidiæ & periculi, difficiliora verò omnia reculent, nimium fortan illius memores, quod in

M 2 scholis

scholis inculcatur: *Incurabiles non attingendi, ne ars diffametur.* At si quæ difficultates sunt animosius aggredierentur, profectò multos à faucibus orci exceptos, vixæ valetudine optatæ restituerent, quos absque omni spe & solatio decerneret & insanabiles facis temerè aliquando pronuntiavit. Horum uti plurimum saltem videbatur, insanabilem, tum in Patenti tum hic Londini à me feliciter, Deo annuente, restitutorum, exempla non pauca, Tibi Vix Excellentissime, haud ignota sunt. Quod non idè hic memoro ut inanem gloriam aucupari videar, sed potius ut aliis calcar & stimulum addam. Et profectò quantum inter revera incurabiles morbos & tantum putatícios interit, vel unicuique hic casus palam omnibus faciet.

Uti verò corporis humani fabrica jam perfecta & numeris omnibus absoluta metirò omnes naturæ scrutatores in sui admirationem rapit, sic eadem dum in *fieri* est, hoc est hominis genitrici, summi videlicet Protoplastæ opus summum, mortali intellectui impetrabile, multò magis & attentionem & admirationem nostram metetur; inprimis si deviam, extraordinarium & anomalum ejusdem modum, cumque sæpius vel marci vel fœtus, vel utriusque simul lunestum spectemus. Quamobrem & si quas in materiali adè obsecrè & difficili conjecturas offeram censoribus quibusdam malevolis minus probatas scilicet non dubitem, spero tamen me apud æquos certum estimatores veniam facile impetraturum. Cum enim de accretione fœtus historia adhuc manca sit, & à supersis etiam Anatomicis penè intacta selinquitur; nec non in his quæ ad humorum thesauriam & ad ossificationem spectant conclusum sum *Avia peragere loca vix nilius ante pedibus vixit*; Equis in re tam aduâ demonstrationes à me erigat: Si probabiles rationes & verisimiles conjecturas proponam, si denique quod dubitante tantum adduco, Tibi & reliquis cordatoribus viris, quibus de *meliori luto fœtus procedit Titan*, non displicuisse sciam, erit quoddam mihi molitum gratuler.

Die 17. Decembris annò 1694. vocabat Francqueriæ Leonardiam invisitur uxorem Henrici Levvis sub signò Capitanei Peterson militis Prætoriani *Hermæne* seu *Beos* vocabulò nostro belgico appellatam Hæc Annos circiter 32. nata, & cessantibus menstruis jam certum imprægnata ad novum usque mensem se expecta est, quò ad omnia Ingravitationis signa in eodem statù ad dum alias urerò gerere, hoc unò exceptò, quòd totò illò tempore nihil lactis in mammis apparuerit. Molestiæ etiam ipsi videbatur & insolita gestatio, Inprimis cum fœtus vivacis morum fortiores & auctum perstiteret: Crevisque maxime molestia gestationis, cum locò non consueto sed paulò altiori situm esse fœtum deprehenderet, ubi verò instaret paritendi tempus tum magnos dolores sentit, tum etiam morus in fœtibus vehementiores, adè ut jam partus appropinquare videretur: verum omnia interit prorsus successu. Nam præter crebras & magnas inueto in locò moiones, nullus fœtum egerendi conatus adfuit; neque illa Aqua Annui effluxit. Exinde omnis spes partus legitimi evanescebat, & cessante tunc omni fœtus motu, ac paullatim melius sese habente ægrâ, fœtum in hoc instanti sacro cessasse non est quod dubitemus.

E lapsò mense decimò fluxerat de novò menstrua, per totam gestacionem suppressa, neque jam amplius motus aliquis in fœtù deprehensus, sed pondus tantum inter & incommodum. Hæc indies agebatur molestia, sed præcipue circa mensem decimum octavam ea fuit symptomatum Ingravescencia

ut lectò decumbere Mulletcula cogereetur. Paulo post de dolore acutò circa umbilicum partemque vicinam conquisi cepit; Huncque dolorem duobus septimanis ante fœtus extractionem ulcus fungosum in e regione umbilicali subiequebatur. In consilium vocatis Medicis ac Chirurgis in varias itum est sententias. Aliqui fœtum in aëre latere putabant repugnantibus aliis, quidam de Hydrote; quidam de exaltentia internâ loquebantur.

Mensis erat à primâ conceptione vigesimus primus, cum ego advocabar Leonardiam, comitante Cl. Collegâ P. Latané Medicinæ prælicæ Professore nec non quibudam Academicæ Francqueriæ studiosis, qui unâ cum Cellis, Principis Nassovix Medicò primario ac Chirurgis, & N. Simonide Chirurgò ægræ clinicæ operationis innotit, ac præsentem eventurâ felicissimè testes fuerunt.

Ego cum primùm ægram conspexissem, & tam præteriti quàm præsentis ejus statûs circumstantias omnes ad examen evocassem, tam fœtum moruum gestare asserere non dubitavi; neque de fœtus signa asseritionis meæ veritatem demonstrantia. Dum enim attentius omnia rimarer; deprehendi venter tumescens interius paulò in acumen delincentem, & corpus gravidum minus tamen tenum emolumentem. Insuper compressò fortiter utrinque ambabus manibus abdomine magnam tensi duritiem, quæ ad Peritonæum usque pertingebat. Hæc autem durities evidenter magis observabatur circa ulcus interius, quod fungosum existens stilum facile admisit, quò dum quid attingere mihi videbatur. Hinc dilatarè tantisper orificiò, digiti minoris apicem immisi, còque fœtus os parietale me contingere mihi indubitanter fuissebam. Ex his audacior factus, & de fœtù etiam securus fœtum in rubâ dextrâ uteri latere, nullâ morâ pronuntiavi, ægramque admoxi, si sectionem admittere vellet, ipsum adhuc aliquam latius superesse, cum ceteroquin mors miseranda eam præsolaretur. Ipsa interim jam sese movere non poterat, aut alimenta capere, verbò mortis vicina: itaque constanti animò se quodlibet passoram dixit, ut quamprimum fœtus eximeretur. Omnibus igitur ad excisionem paratis ægram cum lectulò in medium cubiculò parietem desecti jussi, ut non solum utrinque famulus auxiliatrix manus portigentibus locus foret, sed etiam ut cò facilis omnibus copia fieret novi luyus spectaculi. Et ut obiter hoc notem, cum ego non incurvatus sed sedens, sed pedibus stans atque erectus, operationes Chirurgicas majoris momenti peragere consueverim, utpote quod convenientissimum in similibus casibus multoties expertus sum, lectum in quò ægra decubebat ita elevavi jussi, ut pedibus insitendo sectionem commodè insisterem. Delude hoc modò procedam.

introducitur per ulcus stylò abdomen à latere dextro aperui, ac indicem digitem immisi: ubi verò me intra tubæ fallopianæ cavitatem pervenisse deprehendi juxta ordinariam lineæ albæ, forcipe supra digitum posito decodem verò seissum feci, quantum unâ vice poteram. Tunc fœtus illcò in conspectum venit atque juxta magnitudinis. Hunc ut facilis absque illâ vi eximerem, aperturam utrinque produxi ad pedalem usque longitudinem, manibus sinistrâ leviter premendo intestina, aliâs operationem turbatura, si motu diaphragmatis excluderetur, in cavitatem detinui, ac fœtum absque multò negotio integrum extraxi. Quin etiam in majorem cautelam, ne intestina delaberentur, ægram ita collocavimus, ut superiores corporis partes aliquantulum

quantulum essent depreſſe; imò in eòdem hoc ſe-
ſu ſitū permanſit Melicetula, donec prorsus con-
valeſceret ad vivandam ſcilicet Meritiam Ventralem.

Facta verò incifione caput ſecundū primò ſele o-
ſtendebat pedibus veſitis Diaphragma extenſis, Me-
diantè Placentā tenni admodum & maximā ex parte
conſumptā funiculū umbilicālis tubū ſalutari-
ter etiamnum adhærebat, uti mihi ulterius apparuit
cum eam & tubū digitiſ deſcorticare egreſſiſſem. Hu-
jus autem cavitatē undique mœcagine quidam ob-
ducebatur, materiā purulentā emulſante: Ve-
rū illa propius examinata non poſt ſed reſiduam
æque annū ſuiſe deprehendebam: utpote parte
nullā interiori exulceratā, ac materiā nullā pectō
ſecundū exiſtente.

Vacua jam infantis cella nobis ſe in conſpectum
dedit per amplā cavitatē magni inſtar maſtūſi, la-
tè patens. Hinc opere præſtito duſt ſpectatoſibus
demonſtrare eam partem, unde ſecum extraerant,
peritonæo adaptatū ita fuiſſe ut una quāſi videre-
tur membrana: D. inde partem hujus ſucci infectio-
nem dextro lateri Uteri circa fundum aſſervam fuiſ-
ſe; qui tubū locus cum ſit, atque ulla alia re-
periretur, maniſteſtum fuit in tubū dextrā ſecum
hæſiſſe. Datā etiam copiā utrum ſolum inſpiciendi
ac contrectandi, illum in ſtatū naturali conſti-
tutum cum ovario ac ſiniſtrā tubū prorsus illeſis
junctum fuiſſe omnibus oſtendere. Hiſque conſpici-
endis non vāto augurio, prout eventū docuit, pro-
nunciavi, ſi modo ægra ſanaretur eam denuo im-
pregnari poſſe.

Sed ut hitorie finem faciam; madeſcentiam aquā
repidā ſpongiā in cavitatē immiſi, eaq̃ mœcagi-
nem omnem abſterſi. Tum probe mandatum vul-
nus acu curvā qua uor in locis æquidistantibus con-
ſuſi, comprehenſo, præter integumenta & mufcu-
los, ipſo peritonæo. Duplici autem uerbat ſiſo cō-
ſtitū illud; imò ut ſimilis eſſet ſutura, laniam li-
gneam liſtē obductam quā ſecundū ora vulneris
occluderent totū incifionē ab utroque latere ap-
placavi, ac ſila ſupra lamiā, ſed non rectè liga-
vi. Ab eā ligaturā majorem quā ſiſiſ operatione
dolorem paſſam ſe fuiſſe dicebat ægra, quā alio-
quin vix de acutō dolore conquieſcit eſt. Cæterū
juxta Inferiorem partem vulneris appeturam reliqui,
eique tunandam ingreſſi, ut materiæ omni ſecernendę
exitus pateret.

Hiſ ſcilicet abſolutis dextrā tenuem ac con-
venientem præſcripti ex liquidis eucymis, &c. & poſt-
quam inſet me & N. Simonidem Chirurgum æ-
gri eluſicū de methodo ægram tractandi conve-
niſſet, reliquum curationis ipſi commiſi. Paruit om-
nibus ægra, & ſele obſequentiſſimam præbuit, tum-
mopere gaviſa eò uſque perductam eſſe operationem.
Exinde ſenſim indies melius ſe habuit vitæ etiam ac-
quieſcens. Pater Chirū gos quotidie eam inviſit D.
Potius Scenell' Principiſ Naſſoviz Medicus; quin
de liberalitate Ceſſiſſi Principiſſe ex ejus culina æ-
gri alimenta ſubminiſtrabantur. Ego ſepiſ & pro
rei neceſſitate ad eam acceſſi, & expertus ſum,
Vulnus ſiſt ordinario priuſiſ modō ſanatum, nempe
ſeparatione parietis interioris tubū Fallopiæ.
Quodcumque externebatur non tantum per ori-
ficium inferius effluat, ſed etiam per interſitiū ſu-
periorum. Separatio autem facta fuit non tubū to-
gitus ſed membranz ſolummodo interioris. Exterior
paulatim ſeſe contraxit, & loco incifionis perito-
næo coaluit, ac cartilaginea ſua emulſante; id quod vulnere nondum clauſo digito perſen-
ſibile fuiſſet poterat.

ſic poſt ſectiōnem quodammodo Cæſaream con-
ſiſt. Chirurg. Tom. II.

valuit hæc mulier, & ſecundū ab operatione mende
17. hæc Martii 1699. domo exivit, Eainde bene
ſe habuit & huc uſque hilariter & panceratè vivit.

Postiorem ne quidquam deſit caſui huic extraor-
dinarij, poſtſeide Kalendas Januarij 1696. filiam
ſcilicet peperit, itramque ſubſequentē anno 1697,
gemellos ſiliam & ſiliam enixa eſt, maximò ſaluti-
ciò, ſicut antea monui, tubam ſiniſtram integram
proſervit, & abſque inflammatione remanſiſſe. Quò
pectō autem inflammatione poſt diſſicilem partum ex-
citari, ac tubū oriſicium occludi poſſit, ex ſubſe-
quentibus palam ſcit.

Ad majorem tē ſedem atque certitudinem ſor-
tum ipſam nunc ante quinquenniū exſectam;
quem in liquore Balſamico etiamnum integram ſer-
vo, catiſolis omnibus & mixturarū ſtudioliſ oſten-
dere paratus ſum. Iconem interim hic ſubiungo,
quam vide in Theatri Anatomici Tab. LXXVIII. fig.
2. Formella autem fuit, eaq̃ ut antea dixi juſta
magnitudinis. Mānū eſt proſecto per duodūcū min-
ſes abſque putredine cadaver illud in tubū latere po-
tuiſſe; excepto enim capitis latere ſiniſtriſ ejusdem;
que lateris humerō, quæ partes cūm eſt regione ul-
ceris ſitæ eſſent jam à materiā purulenta corrodū cœ-
perant, reliquum corpus adhuc integram conſervavit.

Cūm eſt ibiſta hæc de materiā non adeo commū-
ni, ſed rariorē & verò extraordinariā tractet; non
abs re fore arbitror ſum, partes ejusdem aliquas,
quæ maioris eſſe momenti videntur, ad eamem re-
vocare, ſymptomatum quorundam rationem ſubijci-
re, & nonnullis hujus Epitheli articulari, communi-
tatioli in modum, ulceriſ immorati.

Exempli gratia.

*Quid totō geſtationis tempore nihil lactis in
mammiſ percepit.*

Plurima non tantum ipſi vulgo, ſed & aliſ Medico-
Philophis præconceptā opinione laborantibus
videtur eſſe abſurda; eaq̃ impemibz quæ ad ſtatum
gravidarum & puerperarum pertinent, quæ tamen ſi
accuratiſ examinantur, reverā non abſurda, ſed po-
ſſibiſ verifiſſimā & rationi conſentanea videbuntur.

Sic in præſenti caſu vulgo incredibile eſſe videtur,
femina ſortem vitalem interō continere, & tamen
lacte ſemper carere, ſorventē hanc opinionem eorum
hypotheſiſ errorē, qui lac eſt mammiſ ad uterum pro-
ſectū nutriendū conſervare ſtatuant, vel qui ex ſan-
guine menſtruū retentū lac generari credunt in mam-
miſ, adſuppulanteque quodammodò huic dicte opi-
nioni falſo, vel non ſatis intellēctō Aphoriſmō Hip-
pocratēſi Sect. 5. 39. ubi inquit: *ſi mulier qua nequī
gravida eſt, æque peperit, lac habet, et menſtra deſe-
runt*; Item aliō Aphoriſmō Sect. 5. 37. ubi in-
quit Cōs ſenex: *ſi mulier uterum generatū mam-
ma gracileſcant, abortit*. Quia inquit Ennius ſta-
tuens lac eſt mammiſ ad uterum ejusque membra-
nam Amnion hæc. Apolog. Digreſſ. 5.) nihil ali-
meoſi forni ſuppeditari poteſt; qui hūc de cauſā
tunc moritur & per abortum ejicitur. Sic vulgus
menſtruotum ſuppreſſionem in corruptis, ſignum
ingravidaſionis eſſe putat: Si morus infantis non
percipiatur; ejusdem mortem ſignificari; partuſ Oſſe
meliores non vitales eſſe pronunciat, & multa alia,
quæ tamen ratio & experientia clarè ſatis ſeſutant.
Rationibz adducendis & excutiendis inhæreſe ni-
ſis prolixum eſſet, ex enim ſuo loco apud Aucto-
res videri poſſunt: quid ab experientiā nobis con-
ſtet, ſatis patebit, ſi ſaltem Vicerum & Viſcidum
lactiferarum exempla conſulamus: Ex his enim Apho-
riſm

ritum adductum Sect. 5. 39. aperte deprehenditur non esse utrobique vitum, Aphoristum autem posteriorum citatum ex Sect. 5. 37. non semper experientie respondere, inter alius casus, historia ex relatione Viri cuiusdam curiosi & sibi digni mihi communicata palam facit. Noverat (inquit is) nobilem puellam, quæ deflorata & etiam ingravidata à sub amato, per omnis generis remedia sibi à veralis suppedirata, Cathartica, inquam, imò & venæsectionem profundissimam abortum facere conabatur, mens gestationis fere quintò : donec tandem eò res deventerit, ut motus infantis, non amplius perciperetur, & pubi moles incurreret inter plumbi ponderis instar; mammae conciderent, lac dispereretur. Hinc femina suspensò jam atque anxio animò, & de foris, uti putabat, mortuò excludendò sollicita, consiliis auxiliumque Medici exspectabat, aperte scilicet atque longè confessa suis conatus, quibus usà est ad factum evincendum, Ego itaque (pergit ille) iussu ut cibus euechymis & spirituosus reficiatur, potu ut quieti indulgeat & denique abstineat ab omnibus Catharticis & evacuantibus : quò factò infans demò se movere coepit, & decimò mense feliciter in lucem prodit. Ex hoc casu edocui sum (inquit) & mammarum concidentiam & lactis absentiam, & morum infantis abolitum non usque vera esse abortus, (juxta Aphoristum citatum) vel fœtus mortui signa, atque ex his nihil plùs ceritò argui potest, quàm fortis languorem & imbecillitatem.

Ut vel hinc patet falsam esse veterum opinionem, quæ decrevit ex sanguine mentitò reventò lac generari, fœtum lacte nutriti, nec non lactis defectum abortus esse causam, atque etiam lactis in mammis presentiam, menstruum absentiam necessariò arguere. Experientià enim constat, semina præ terore vel alià quacunque causà subitanè abortum passas, lacte non privari; Et quamvis mulieres, quæ præ solà debilitate abortiunt, lac non percipiunt generari in mammis, inde adèd hoc fit quod eadem sit causà debilitatis ac consequentis abortus, quæ simul lactis generationem impedit, nempe ariditas quædam & inopia succorum omnibus corporis partibus necessariorum.

Quæ ratio autem in præsentè casu sit, quòd femina totò ingravidationis seu gestationis tempore nullum in mammis lac senserit, id videtur ad conceptionem quandam intimam & sympathiam uteri cum mammis referendum. Nam antehac bis puertura cum in uterò ipsò fœtum gereret lac ipsi non defuit, quò nunc dum fœtus in tubà hæretet præteritis caruit. Itaque mihi videtur ad lactis generationem ipsiusque incrementum & copiam hoc multum contribuere, quòd uterus, imprimis circa finem gestationis, in tantam molem extendatur, ut vasa ad inferiora tendentia magis solitò inde comprimantur, hisque compressis sanguinis fluxus versus superiora uberior ascendat: sanguine autem copiosius affluente major iterum secretio in mammarum cellulis adiposus pinguedinem, & in aliis glandulis lympham separantibus oritur, eaque ipsa secretio vasa magis aperta & ad separationem magis prona reddit, accedente frictione, & imaginatione matris lactantis circa mammas destricta, quibus concurrentibus semel aperta & dilatata vasa in statò solitò conservantur, etiam uterò jam concidente & vasis non amplius compressis. Hòc, inquam, assertò facile apparet ex quà causà in præsentè casu lactis defectus oritur; nimirum quòd fœtus in tubà hæretis & consequenter à latere sitas, vasa sanguinea, versus inferiora tendentia morte solitò non compref-

ferit sanguinis, ut fluxus versus superiora solitò majorem non efficeret. Et verò quemadmodum secretio lactis à compressione arteriarum, sic in gravidis intumescere pedum à venis simul compressis oritur, unde major sanguinis remota circa glandulas & majores secretio; præcipuè in cellulis adiposis, ubi late tardior sanguinis motus superiora versus in causà est quòd loco pinguedinis, in istis cellulis, lymphæ secretatur, sicuti tardior motus sanguinis generalis causà est secretiois lymphæ in cellulis adiposis per totum corpus, ut patet in Anasarca.

Dati quidem lac in mammis extra statum ingravidationis & postea & solet; hinc danus non solùm Virgines & Vetula lactifera, sed & Viri lactiferi. Notabilis in hac rem-historia est quam recenset Cl. Diemerbroeck lib. 2. c. 2. Anatom. *Illud ipsam (inquit) liget Viana (quæ est apud nos propinquum) ubi ante annos virginia, præter præter in diversis ante partum suis, cui capus porcum pro infanti est, mulier capere, non diu post obitum mariti peperit, atque statim post præteritum exordia est superstitem relinquentem infantem suum sanum: cuiusque illi vas angustissimè domi superstiti, ejus mater nominata Johanna Wiltz, eò & ipsa egera præ paupertate nutricem conducere non posset, tamen infanti filia sua infusa, eundem emurandus suscepit, auctis sua annis fœtissimò sexto; cum, inquam, cum vagientem, semòdò cum commiseratione, mammis suis aliquantè appropinquasset, eigne papillam sugendam obtulisset, per foris illam imaginatorem, continuatam etiam succulentam, & concretionem, mammae lac dare coepit, atque panti diebus tantà copià, quæ nutriendi infanti abundè sufficeret, ita ut vix aliis alimentis indigeret; atque sic cum omnium admiratione infans lacte hujus nutritus (copiæ mammae à plurimis annis omnino exaruerat & conciderat, jamque variis, nunquam intercedens de novo intrinsecum) optime nutritus fuerit. Causa prædicta veritatem etiam non semel confirmavit lactifera ex prurientes virgines, quæ libidinibus cogitationibus ita intensas, atque tunc mammae suas sape conrellant, ac cum nullis pruritis fricantes, interdum virginitate elatas, lactifera evasunt, quales indubitatè publicæ lactiferae virgines mihi his videre contigit. Hac prædicta Cl. Diemerbroeck. Viri autem lactiferi hodie adhuc mihi noti, apud nostrates superest exemplum. Hic, inquam, alioquin furis obesus & pinguis (in macilentum idem contingeret via possibile est propter humorum defectum) continua illa pressioe mammarum ita eadem partes affuecit ut lac funderet quoties voluerit, sæpe cum distantium multietarum risu & admiratione. Est in omnibus his una eademque generatiois lactis ratio, & partes ad generationem lactis necessitate ubique eadem, nempe cellulae adiposæ pinguedinem per stratum suum glandulosum à sanguine separantes, & glandulae lymphæ ab eodem secretoria (statim enim lac nihil aliud est quàm mixturam pinguedinis cum lymphà) ubi solummodo requiritur tanta isthorum duorum humorum secretio, ut omnia quantitas quæ separatur eodem tempore in sanguinem iterum non possit reduci, & cogatur per papillarum tubulos, dum abundat, foras effluere, aut saltem si tantà copià non adit, ut multò facilius exprimi possit.*

Hæc interim omnia non obstant, quin simul vasum sanguiferorum uteri compressio supra allegata sit vera & sufficiens causà ad lactis generationem tempore gestationis. Possunt enim & solent sæpius dari plures causæ homogeneæ, subalterne, coadjuvantes & ad unum eundemque finem tendentes, neque sibi mutuo contrariantes.

Fœtus in tuba reperiuntur.

Postquam magna illa Analogia observata fuit inter partem generationi intervinientis ipsius hominis, & aliorum oviparorum, fortissime in tubis hærentes spectis cadaveribus sæpius reperi sunt, (quod & in hoc casu in muliere vivâ licuit observare) nullus est, qui amplius dubitet tubas uteri esse ductus per quos fœtus ab ovario ad uterum transit; sed quæ sit causa cur fœtus jam in tubam illam non semper ad uteri cavitatem usque protrahatur, sed aliquando in tuba hæreat & quidem ibi debet incrementum augeri, id quidem examinare oportet precium duxi. Hujus itaque rei duplicem statuius causam, naturalem nempe & accidentalem. Naturalem illam nominamus, ubi tuba vitio connata maxime conformationis non sit pervia circa uteri introitum, & sæpe admodum angusta, ut ne quidem fluxus circa extremitatem simbiatam immitti penetrare, & ad uteri cavitatem procedere queant. Accidentalis illa est, ubi à casu aliquo, v. g. post partum difficilem, vel aliâ quacunque de causa, tuba inflammatione correpta est, unde ejus insertio coalescit, transverseque ad uterum interceptus fuerit. Omnes enim partes & præcipue canales atque ductus corporis nostri, ubi privantur humore eos naturaliter humectante coalescunt. Sic etiam tuba Fallopiana constans tunica interna glandulis referta, cum in finem uti est glandulis hisce continuis exudante liquore conglutinatione præcavetur & ductus suis iunctibus reddatur, atque sic ovis in eandem devolutis facilis in uteri cavitatem pateat transire: si, inquam, in tubâ dictâ casu aliquo & violentiâ externa inflammatio oridatur, per inflammationem hanc secretio glandularum debita impeditur & sic coalescentia oritur. Casus autem similis ex violentiâ externâ sæpe numerò accidit illorum cuius, qui manus auxiliarias parturitibus præbere, præcipue ubi placentam magis solido adhærentem per funiculum umbilicalem avellere conantur, ignari interitum quis verus sit & maxime idoneum separandi modus. Hinc fit ut totum uteri fundum violenter interdum trahant, & consequenter tubis simulque alijs annexis partibus vim inferant; unde necessariò sequitur inflammatio. Inflammationis autem effectum esse coalescentiam, observantur hæud dubiè illi quibus licuit plurima cadavera aperire, sic semper videmus post picutidinem pulmonis eo loci plicatur adnatos, ubi plena inflammatione correpta sunt, sic post frequentia tormina ventris intestina sibi invicem & cum peritonæo sæpius coalescunt. Ratlo ubique eadem est, nam sicuti plures ita etiam peritonæi facies interior multis gaudet glandulis, quæ continuò partes irrorant, hinc dum vel plena vel peritonæum inflammatione corripiuntur, nihil huius humoris necessarii debet consistere à sanguine separatur & consequenter partes, ob defectum irrorationis atque lubricationis debite, medix collabuntur & coalescunt. Idem est de omnibus cavitatibus nostri corporis iudicium.

Tubas autem Fallopianas non solum circa uteri introitum claudi & cohescere observamus, sed etiam circa extremitatem eandem simbiatam, & magis apertam: id quod licuit mihi observare in foemina quidam, quæ cum quartâ jam vice pareret, ex difficili partu, sed multò etiam magis quòd ab impediâ obstrictæ dum Placentam paulo arctius Utero adhærentem extraheret, violentissimè traheretur, in tantos dolores infimi ventris ac præcipue circa lumbos incidit, ut totos ei, dies jaceret moribunda & pro deploratâ haberetur, verum ipsa fa-

tis robusta cum esset & doloribus ferendis par, adhibitis opportunis remediis, præter ipsam & expectationem omnium feliciter evasit, & decem post annos superstit; circa lumbos autem insignem debilitatem semper sentiebat, & exinde sterilis permansit. Ejusdem ipsa foemina, tandem mortua, cadaver cum mihi fortè fortuna liceret aperire ut subsistere mortis causam inquirerem; hanc integram notari dignam sterilitatis causam invenì nempe coactionem extremitatis simbiatæ tubarum, necnon inflammationem quâ partes otero contigæ corruptæ sunt post partum ultimum laboriosum & malè administratum.

Ex hoc & similibus casibus abundè liquet, quàm eximiosum sit in partu difficili obstrictibus utri imperitis, aut etiam Medicis vel Chirurgis non satis exercitatis: cum Patientes, etiam fortè supellicies manent, huiusmodi accidentia, & quandoque etiam pejora ad mortem usque committunt solent. Porro ab hac male administratâ operatione alia adhuc Tubâ imbecillitas accidit, quæ applicationem partis simbiatæ ad ovarium impedit, & propter quod Ova nequeunt ad uterum usque protrudere; paralysis nempe fibrarum motricium exteriorum Tubarum amplexationum earumque motui pessimalitico intervinientiam. Hæc, inquam, ab enarratâ jam causâ facillimè oboritur, nempe obi nervi in parte inflammatione correptâ coarctantur, & Injuries redduntur.

Prædictis jam causis quarum ratione quandoque fœtus in tuba hæreat neque ad uterum progrediatur reliquum est ut passim expendamus quomodo fœtus interiori tubarum tunica suis cum placenta affigatur, ibique æquè ac in utero suum acquirat incrementum.

Id quod ut facilius intelligatur, primò opinione meam quomodo id ipsum in utero contingat tradam, ac tandem analogiam inter uterum & tubas demonstrabo: ubi satis clarè lucefcerit modus incrementi fœtus in tuba. Postquam ergo tot Viri illustres circa enodandam generationem hominis in ovo laborarunt & illam satis clarè demonstrarunt, nullus videtur dubitandi locus amplius restare, cum manifestum sit, fœtum in ovo omnibus suis partibus absolutum & quidem membranis cum placenta munitum, (quod primam ideam & delineationem in gemine hac intelligi) ab Ovario per Tubam Fallopianam ad uteri cavitatem protrudi, ibi remanere & incrementum suum habere. Hoc autem incrementum Ovo accedere ab ipso loco cui ad incrementum Ovo accedere ab ipso loco cui adhaeret, seu uteri ipsius, seu tubæ, inde sequitur, quia illud Ovum non tantum substantiâ in se continet, quanta requiritur ad nutritionem lactescens fœtus, cuius contrarium quidem observare est quotiè die in ipsis propterea oviparis, quotum ova tantum spaci continent, quantum toti materis sufficit quæ in incrementum pulli in cicatriculâ hærentis converti debet. Ut ergo Fœtus ab Utero recipiat humores ad sui incrementum necessarios, debet illi quasi affigi & ut ita dicam quodammodo inclavari, adeo ut deinceps effluantur tubuli aut continuò ductus ex utero in forum, quibus mediantibus humores, imò ipse sanguis tandem communi-centur.

Quæ autem ratio illud fiat demonstrare, hoc opus hic labor est. Et certe dolendum est à cadaverum apertione populum usque adeo abhorreire ut non liceat satis frequenter inspicere ac perscrutari corpora mortuorum imprimis verò gravidarum. Neque enim dubito quin multò plura circa generationem possent detegi, si frequentius prægnantium cadavera liceret

examinare,

examinare, & præcipue quidem abortientium, vel aliò quocunque morbo ad uterum gravidum spectantem extindarum. Plerumque enim partium stru-
cturam melius observamus in corporum itarum præ-
ternaturali ac morbosâ quàm sano: cujus exempla
hic plura possunt adduci; sed ad rem. Itaque vide-
tur esse explicari admodum difficile quomodo ante
dicta illa infusio sive inclavatio placente in utero fiat.
Sententiam autem meam super hæc se breviter in se-
quentibus explicabo. Atque imprimis experientiâ re-
fere videmus, postquam ova aliquot dies nondum utero
alligata, sed libera ac mobilia fuerint, eorum
superficiem ætream, præcipue locò placente, vil-
losam fieri, ipsique filamenta quædam stucumæla,
levissimi musci ad instar, adnasci; quæ quidem fila-
menta, intra superficiem antea compacta, ubi o-
vum ad majus spatium, uteri nempe cavitatem per-
venit, humiditate ibi contenta lubricantur & qua-
si evolvuntur ac extricantur. Eadem hæc filamenta
pro tubulis esse habenda arbitror ad humorem peti-
ciendum apta, instar tenuissimarum fibrarum in
edificibus humoris nutritiois è terra ad corpus plan-
tis vel arboris defectuum: illos autem tubulos re-
cipiendis humoribus necessariò inservire qui in super-
ficie internâ uteri glandulosâ naturaliter secretantur:
Tunc præcipue ubi ovum morâ intrinsecò humi-
dum in se contentorum in tantam magnitudinem ex-
crevit, ne latera vicina uteri premat, utpote quo-
rum interna cavitatis subje majusculæ dimensionem
ordinariò non excedit. Ex hoc morbo atactu, non
sine aliquâ compressione, fit ut superficies externa
Ovi quasi detractâ pelle, præcipue locò placente,
superfici internâ uteri agglutinetur, & tubulorum
in ovoherentium pars aliqua (nempe quæ ad hanc
rem satis sit) cum porâ secretoriâ glandularum in
internâ facie uteri constitutarum uniat, tandemque
continui ductus fiant: eodem plane modò quò vi-
demus coalescentiam aliarum partium contingere: ex
gr. malarum cum gingivis ubi earum alveolaria est
ulcerata vel excoriata; (Id quòd semper accidit hoc
in casu, nisi frequentî lotione impediatur continuus
ille contactus) sed hæc dictis immorari superva-
cuum est, cum ex pluribus in Chinensiâ hujus ge-
neris exemplis idem placeat. Hæc verò filamenta
vel tubulos, venas placente ad venam umbilicalem
evidenter sublotare supponimus eodem modò quò
vasa lymphatica per poros obliquos foras intro tran-
scentes, in venas ingrediuntur, usque omnes hu-
mores in cavitatibus corporis nostri existentes inferunt:
Cæterum enim est serè omnes humores ad venas u-
sus secretos in massam sanguineam itetum reverti:
sic lymphæ ex superficie internâ peritonæi glandu-
losâ perpetuo stillicidio depluens ad facilitum par-
tium contentarum motum & earum concretionem
impediendam, in venas ubique per cavitatem infu-
si venis & superficem membranarum sparsas re-
dit: eosque meatus obstruendo pro ordinariâ causâ
Asketis habemus: eodem potius modò lymphæ in
membris glandulosi cerebri secreta, & in ventri-
culis & intestinis ejusdem contenta, in sanguinem
iterum regreditur, quò regressu impediò in infantibus,
quibus propter interstitia membranacea cranium
potest dilatare, Hydrocephalos oritur: in adultis au-
tem ubi cranium extendi non potest, hujusce li-
quoris circulatio impedita apoplexiam infanabilem
& mortiferam infert, cerebro à nimia ejus quan-
titate compresso. Denique eadem ratione multorum
morborum causa & origo ex hoc fonte derivari
potest.

Suppositis itaque hæc omnibus quæ superius re-

centia sunt, nempe siccum in superficie uteri in-
ternâ naturaliter secretum, venas placente subintra-
re, eumque ad foras incrementum & aquæ lo-
aminiò contentæ generationem inservire, sequitur cor-
pus uteri magis magisque debere exaridi, & ipsius
substantiam extricari & evolvi, vasque etiam ei-
dem inhærentis prius clausa & sanguinem nodum
admittentia, tum demum aperiri, atque eo pacto
circulationem per majorem peripheriam fieri. Omnes
enim partes totius nostri corporis esse valuitur
constare, quorum plurima semper humores vehunt,
ut majores Arterie, venæ, nervi &c. aliqua
autem earum in statu morbosò, ut in inflamma-
tionibus partium molliorum & in exostosi ipso-
rum ossium; ubi non solum vasa membranarum
sanguinea, quæ prius quàm in ossa morarentur
erant aperta, formati autem ossibus clausa & in-
durata, iterum aperiantur; sed & ipsi nervi in
substantia ossa, obliterati rursus spirituum influxum
admittunt ossibusque sentiam eundem reddunt, quò
antè sub formâ membranarum ante ossificationem
gaudebant: Alia tandem sunt Vasa quæ non cer-
tis temporibus dilatantur; sic videmus in foetu
nascendo & recenti natò sanguinem implere vasa
minima cuticulæ, in eoque circuli, & totum ru-
bore perfundere, quæ vasa tamen natò foetu, pau-
cò post tempore elapsò, ab aère ambiente, e-
ademque compimento ita clauduntur, ut rubor
penitus evanescat. Etenim enim hic aër sui
compressione sanguinem cogit versus interiora, ita ut
ille postea in minori peripheriâ circuletur, hinc
motus cordis & arteriarum sanguinem interiori pro-
trudere non valet, quò quidem poterat in utero
mattis adhuc foetu hærente, & nullò aère am-
biente unde Vasa capillaria comprimerentur. Hic
loci etiam observare est, vasa uteri quæ extra ita-
tum graviditatis membranarum fere exangum com-
ponunt, eadem tempore graviditatis evoluti uteri
tunicis aperti & sanguinem uberius vehere, eum-
que tantâ copiâ, ubi mensura statim temporibus
non fluunt, venis fortum dirigere propter vasa
jam magis patentia, ut major jam oriantur pressu-
ra in glandulas uteri, usque adeo ut quæ in prin-
cipiò lympham tantum foetui communicant, ab
inflante sanguine dilantur, & tandem ipse per
eos fluat, perque ductus jam descriptos ad venas
umbilicales delatatur, tantâ quantitate quantâ
ad foras incrementum liquorisque in amniò secretio-
nem est necessaria. Eiusmodi sanguinis transitus
per poros secretorios in pluribus partibus corpo-
ris nostri, quandocunque est in statu aliquo mor-
bosò, observatur, experientiâ & præci quodi-
nâ testante; v. g. in renibus, si forte exhibeat
nimis diureticorum acrum (uti cantharidam &c.)
quantitas. Neque enim est quò credamus tunc
extremitates vasorum sanguiferorum (quas non ad-
mittimus) uti volent aperiri, sed tantummodo
ipsius medicamentum acrimonia poros vasorum gla-
ndulas componentium, quasi rot ætibus ita dila-
tari, ut non solum humor secretandus, sed &
ipse sanguis transcat. Idem mihi licuit videre in
foeminâ cui à lochlis retentis sanguis tantâ violentiâ
& tantâ quantitate superiora ventris turbat, ut
per vasa oculorum secretoria locò lymphæ lacrymæ
sanguineæ magnâ copiâ effluerent. Idem observabatur
in ejusdem foeminae glandulis ad os penitenti-
bus & præcipue quidem ad gingivas, quæ instar spon-
gie compressæ nodique sanguinem emittebant; sic
sanguis locò sudoris excrevit, ubi per nimiam
aëritate major sanguinis determinatio est versus cor-
poris

poris peripheriæ, quorum omnium eadem est ratio. Hoc tantum differentia inter allata exempla & casum nostrum intercedere videtur, quod ille quidem sit naturalis, exempla autem de statû morboſo agant, ubi non tam facile remedia adhibita operantur, inde addo quod etſi jam causa sit ablata, pori tamen non facile clauduntur, & ad pſtiſimum ſtatum reducuntur; nulla, inquam, talis difficultas eſt in puerperis ubi excluſo ſortè de ſecundinis, brevi tempore uterus rurſum ita coarctatur ut vaſa illa omnia quæ dilatantur interò aperta fuerant iterum occludantur, eorumque tubuli & canales ad ſanguinem recipiendum inepti reddantur. Plura hic poſſem addere de menſtruorum & lochiorum fluxu; ſed eùm hæc non ſint huius loci, pergam ad examen tubatum, ut pateat quæ ſit analogia eorum cum uterò, & quomodo in iſdem ſortis etiam ſuum habere poſſent intermedium. Diximus uteri faciem inteream eſſe glanduloſam talique ſtructuram requiri ad inelavaſionem placentæ, eadem autem ipſiſſima conformatio repetitur in tuba; diximus exiguitatem cavitatis in uterò multum contribuere & neceſſariam eſſe, accedente mutuo illò & continuo contactu ut fiat coſeſcentia, atqui eadem cavitatis parvis minor eſt in tuba, ita ut facilis huic placenta poſſit accreſcere; diſimus vaſa dari in ſubſtantia uteri, quæ pro ratione dilatationis uteri aperturæ & ſanguinem recipiunt, eadem ipſiſſima repetuntur in tuba, quamvis non æquè magna, ſed interim ſatis patentia, ut docet experientia in præſenti caſu.

Hæc verò vaſa tam uterò quàm tubæ ſunt innu-mera, quorum pauciſſima pars in ſtatû non gravidò ſanguinem admittit, reliquis tunc non patentibus & viſum ſigientibus, quæ tamen ex imprægnatione dilatantur ac per appoſitionem particularem nutriticium ſanguinis ampliora & firmiora ſunt, unde in tantam molem in quam hæc tuba excreverat poterint extendi; cùm enim unquam vaſa in corpore noſtro formentur de novò, non poſſimus ſine admiratione obſervare ex quàm ingenti vaſorum impreſcibiliſſimâ copîa ſingulæ partes corporis ſuſtineantur, ſicut in hæc tuba naturaliter eriguntur, ſed in hoc ſtatû in immenſum extenſa, coſpicuum eſt: verum non ſemper, uti in hoc caſu, accidit ut vaſa integra maneat & abſque diſſipatione extendantur; dantur enim exempla, teſte Vaſſiô apud Dn. de Graef, ubi tubam (pro aliâ matrice habitam) ruptam fuiſſe poſt mortem apparuit, procul omni dubio à nimio impetû ſanguinis affluentis in vaſa ad ſubſtaneam illam dilatationem à natura non diſſimulata. Eidem de cauſa fœtus in abdominis cavitare reſertos ſobinde fuiſſe credo; rupta enim tuba, placenta, quamvis adnata, pondus ſortis non poſſet ferre; nam & in ipſo uterò, ſi fœtus ab aquâ amnio contentû cui ſonatur non undique ſuſtineretur, continuo fere ſomina abortum patenterent. Hoc incrementum tubæ, (id quod magis admirandum eſt) interdum contingere, etiam ubi fœtus in eadem reperitur diſruptis licet vaſis & diſtinctis partibus fere omnibus ex quibus componitur, non paucis exemplis poſſet probari: unum tantum inſtar omnium, hæc operæ precium duxi inferendum.

Filia civis cuſadum mediocriſ ſortis & conditionis, matrimonium inerat cum viro Nobili, ſed propter inæqualitatem ſtatû ab omnibus mariti conſanguineis contempſu habita, tandemque ab ipſo maritò deſerta fuit, addò ut per aliquot annos Amſtelodami ſub parvò late pauper & moerore conſecta viveret, tandem poſt aliquod temporis intervallum

cedit maritus, ſæpiùs inſiſtente fortunæ prius miſerationem poliicius; inter hæc blanditiis ex iteratò concubitu gravidam ſe eſſe mulier credidit, ſuſpicione hæc indies aucta ex veneris tumore & menſtruorum abſentia (etſi ex hac menſuum ſuppreſſione nihil certi colligere poterit, jam enim longè ante à regulari periodoſeſceſcant.) Conſanguinei hæc de re interim certiorem facti, maritum aggrediuntur, immittunt animum & conſue ſecum alienant à conjugio ut nec promiſſis ſaret, nec uſueram unquam amplius mulierem inſiſceret. Atqui poſtremo hæc maſtiæ avertatio, priore longè gravior, tantò moerore uxorem afflicta, ut ipſa totò graviditatis ſuæ (ſic quidem parabat) tempore triſtis ſemper & melancholica videretur, dieſque ſummo cum tædio teteret; Elapſis tandem novem menſibus nullum ſuccellit puerperium, ac obſtetrici marit inſerviens gravidam eſſe credebat, quamvis nullum infantis motum perciperet inquam, opinionis ſuæ rationem illam aſſertens, nempe quod fœtus unâ cum matre langueret, & præ debilitate ſe movere non poſſet. Cum verò elapſo tempore non pareret, Hydropes laborante putabatur, & quod ſequutum eſt totum biennium, continuoſa remedia varia contra hydropem locaſſim tentabat. Cùmque jam monſtri inſtar in lectò jaceret, & propter ventris incredibilem molem aliquæ tumorem, vix omnino corporis partes tam ſuperiores quàm inferiores conſpicui poſſent, advocat eſſe go ad paracenteſin iſtuticandam, ſimul autem ac ægram in hoc ſtatû viderem, manus ab operatione conſuliſſe equidem abſtinui (necpote qui ſumma pro temeritate ſemper habuerim in Actice ſimarò ſaracenticum artemate. Sed de his alibi) Fœmina huius cadaver, cùm paucos poſt dieſ ſatis ceſſiſſet, aperti, & vel minimam quantitatem aque in ipſa cavitare abdominis nullam reperi, ſed totum illam tumorem monſtruolum nihil aliud fuiſſe quàm tubam uteri in immenſum molem extenſam, atque in ſe continentem præter propter 150 libras aque quas inde exhauiſimus: ſed quò melius omnia & accuratius examinare poſſem, tubam hanc cum uterò annexò domum, datâ veniâ, micum retuli & ad vivum delineati curavi, poſſetque ipſa pictura apoſt me videri.

Subſtantia tubæ membranacea exhauiſta aqua ultra triginta libras predebat. In ejuſdem laterali facie diverſi generis ſubſtantia conſpiciebatur, nempe tumores carcinomatoſi à materiâ intra glandulas tubæ concretâ exorti. Nam inter ſcierbolium, cancroſum ſeu carcinomatoſum & alium quorundam tumorem in abſceſſum degenerantem, nullam protuſa diſtinctionem agnoſcimus, quam quid materia cancroſa effluens ſi liquor ſectetur adhuc in corpore glandulæ contentus & cum nullò aliò humore mixtus, obſtrecto vaſe ſectoretur, qui liquore ibi continuo creſcens & propter ſimilitudinem membranæ glandulæ completentis non erumpens, nullamque aliam viam in ſanguinem redeundi inveniens, non poſſet reſolvi, ibique craſſeſcit & glandulas induratas, nullique amplius emolliſioni aut diſſoſitioni concentorum auſcultantes efficit. Hinc in pus converti non poſſet; ad puris enim conſectionem acquirere mixtura diverſorum humorum, ut poſtea ſuo loco videbitur. Tumores autem in glanduloſis partibus ſuppuratorem ſubite apti, ſunt ab humoribus jam per vaſa ſecretoria extra glandulas productis, ibique extravatiſis, & cum diverſis naturæ humoribus commixtis, de quibus alibi ex profeſſo. Ac præter hæc tumores reperiuntur in eadem cavitare lymphæ in gelatinæ formam muſata, & procul dubio in glandulis tubæ ſecreta.

Antequam autem hanc historiam deferam, libet insuper quid sentiam de hujus tubæ in tantam molem intumescens causâ in medium proferre, & non dubito, quin in principiò gravida fuerit illa femina, & fœtus huclet in tubâ, ibique non magnum cepit locumtenentem, sed brevi post conceptionem extinctus sit, quem tamen propter exiguitatem & subtilitatem tubæ perturbatum chaos in diffinitione videre non licuit. Mortuò jam fœtù propter inclinationem sanguinis jam factam ad illam partem & valis jam aliquomodo magis dilatatis, tantus sanguinis fuit impetus in glandulas internam tubæ tunicam confluentes, ut continuo ibi facta fuerit secretio lymphæ, quæ tandem hunc Tubæ hydropem pepesit; nimirum quod lymphæ illa nullas in sanguinem redeundi vias invenire poterat, & tubæ insertio in uterum erat occlusa.

Placentam exsecratam in membranaceam substantiam mutatam vidimus.

Id quod necessariò debebat sequi: nam post elapsos novem menses, mortuò jam fœtù, nulla amplius sanguinis circulatio continuari potuit; Et quamvis placenta conatù fœtus exitum incassum querentis non esset separata à tubâ, ut ab uterò fieri solent in partu naturali, sanguis tamen in eâ circulari non potuit, nec ea parte maris, quia sanguis materiam ad venas placente præveniens atque ibi sanguinis factus jam stagnanti occurrentem motum proprium amittere debet: quia quamvis satis magna pressione in ductus communicationis jam descriptos inducere conetur, sanguinem tamen fœtus in motum cedere non valeret, sed jam extra peripheriam circulationis tubæ in ductus communicationis derivatus, ibique hærens & regredi nefcius, in membranaceam substantiam factus; eadem prorsus ratione quâ videmus, infante jam natò, simile quid fieri in valis umbilicali-bus; ubi nempe sanguis ab ipso umbilicò (jam scilicet ligatò) usque ad arterias cruciales stagnans, cum contra motum proprium per arterias umbilicales regurgitare nequeat, tandem exsiccat atque in membranaceam substantiam mutatur. Hujusmodi mutatio sanguinis pedecentum & gradatim facta in virulis (præ aliis animalibus) quotidie potest observari. Est porro quiddam (hic obiter notandam) quod ea prædictis quam claudius patet, nempe sanguinem rite mixtum & particulatim ipsum componentium debitâ proportionem constantem, quamvis etiam stagnaverit, non solum non mutari in pus, sed etiam non putrescere, de quibus alibi. Hæc placenta maximâ ex parte sanguis facta, & in membranâ mota, ac cum tubæ substantiâ quasi una effecta, non potuit aliâ, quam ex parte, à tubâ in operatione per me instituta separari, uti eam delineatam videmus. Denique hæc placenta & tubæ concretio, atque io unam tandemque membranam mutatio, non obscure demonstrat vasorum in his contiguitatem: si enim partes istæ tantum essent contiguae (ut multi volunt) & simplici solum suctione placenta aliquandò ab uterò vel tubâ reciperet, procul dubiò perfectâ hujusmodi in unam membranam mutatio, uti in hoc casu videmus, non oriretur, sed partes istæ potius, mortuò infante, sponte secederent, atque etiam in hac operatione facilius ab invicem separari possuissent.

Molestiæ ipsi videbatur gestatio.

Hanc molestiam à loci angustia & subtili corpore aequilibriò deducimus; tuba enim in quibusdam diversam plane ab uterò habet structuram, & vasa ipsius non sunt à narâ di postea ad facilem illam evolutionem quæ reperitur in uterò. Hic enim lineæ complicati & in parvam globum compressi ad instar facti in planum laius extenditur. Hinc vel minimus infans in tuba hærentis motus insolitam molestiam inferre debuit. Præterea corporis aequilibrium ablatum non parum molestiæ necessario creavit; scimus enim quàm molestem sit omnis aliquod inæqualiter à quicunque corporis parte externâ liberatum: quâ de re experientiâ quotidie docemur à bajulis, qui incredibile pondus dorso & capiti impositum commodè satis portare absque magnò molestiæ & defatigationis sentî, dummodo illud ipsi ad aequilibrium inponatur, quod si secus fiat impossibile est ipsi vel momemò temporis sustinere. Hinc ergo non est quod dubitemus, corpus infantis non in centrò abdominis sed à latere positum maximè ægre onerosum fuisse magnamque molestiam ipsi atulide.

Non est quod debitemus fœtum tunc mortuum fuisse.

Queritur hic: quare infans iste cui nulla exeat di pœbar via, cui nihil nutrimenti deciat, nihil, quæ æque effluat, unò verbò, cui nihil demum erat, non diutius vixit, sed præcisè elapsos novem mensibus mortuus est, cum tamen de parvulus decemtribus & undecimtribus &c. satis hîc digne historiz exeat? Respondeo, ubi patris tempus ultra nonnum mensum præteribit, ætrem est fœtum esse debilem, ejusque partum incrementum lentius solito fuisse factum, & hoc ipsum quidem foraminis ovalis tardiores in corde diminutionem atque consuetudinem arguit. Hujus enim foraminis minorætionem pro maiori maximeque generâ causâ motus eorum parantis seu calcitrantis fœtus & dilacerationis membranarum habemus. Ubi nimirum hoc foramen ovale fuit minus, tunc & sanguinis fluxus in pulmones necessariò debet esse major, hæcque major sanguinis quantitas non potest transire, nisi vasa pulmonis ab ære inspiratò comprimentate, sicque in illis acceleretur sanguinis motus & circulatio. Quod si secus contingat, cordis motus perturbatur, & functiones necessariæ irregulariter procedunt, tandemque moritur infans, quæ omnia etiam casui intra tubam conclusò necessariò accidebant.

Mense decimò iterum fluxerunt menstrua.

Cum jam mortuò infante nihil amplius sanguinis ipsi suppeditaretur, ille solitas vias iterum petiit & sese per vasa secretoria more solito menstruatim nempe exoneravit. Quæ autem sit propriè hujus mensis fluxus causa in feminis, variè apud auctores sententiæ proponuntur. Juxta alios, inquam, causa hæc assignatur, quod enim io uteri substantiâ interiore admodum pauca sit vera, per quas copie tantæ sanguinis, arteriarum beneficio affluentis (supponitur interim uterum plurimas habere arterias) circulatio commodè fieri non possit, & orificia rubulorum uteri sint laxa & molliâ, hinc fit quod redundans sanguis, qui ob copiam satis citò circulari nequit, per dehiscencia & aperta rubulorum

rum orificia, nec non per fines vasorum in collō uteri hererunt ut supravacuus & Naturæ suæ copiam molirentur, foras effluat. *Alia fermentum certum utrumque* pro causâ assignant & statuant materiam quandam fermentariam in liene, hepate, pancreate, glandulis, aliisque partibus propterea quæ unâ cum sanguine per arterias aut per vasa lymphatica ad uterum delata, atque ibi partem deposita & paulatim coacervata (semper enim in disiectis viscosus seu mucosus quidam humor invenitur) à specifiâ quâdam uteri proprietate peculiarem quandam qualitatem nascitur, sicut eadem in ventriculō aliam peculiarem qualitatem adipiscitur quâ chylus ex alimentis educitur. Itaque hæc qualitas à calore loci excitata humorem istum cui uti subiecto inhæret, in sanis, mensis spatio ad tantam volatilitatem perducit ut sponte suâ effervescat, specifiâque quandam fermentationem sanguini introducat quæ totum mollietia corpus, imprimis partes utero vicinæ (in aliâ magis, in aliâ minus) contrahantur, & sanguis superfluous turgescentiâ suâ vasorum orificia dilatat, foras protrahatur: qualitate autem illâ, aut dicti humoris fermentarii iustâ volatilitate deficiente (ut si in gravidis, in refrigeratis, aut longè morbo confectis &c. item in brutis) simul deficiat illa mensura evacuatio.

Alii Lunæ influxum menstruorum periodos, Lunæ, inquam, humorum dominæ assignant, unde trivium illud emanavit:

Luna vetus vetulas, juvenes nova lunare purgat.

Sed missis his & aliis opinionibus, ubi quisque suo abundas sensu, sententiam meam paucis subuectio, & iudicio idem hic fieri quod aliâs tempore gestationis fieri solet, modo ferus in utero sanguine maris nutritur. Sicut enim utero gerentibus per glandulas uteri sanguis locò illius humoris viscosi ibi continus fecerit soliti profusiole solet, ita eodem tempore modò in non gravidis fieri putandum est menstrua fluentibus, ubi portio sanguinis abundans exitum quaerit, præcipue circa illas glandulas quæ naturaliter ita sunt dispositæ, ut earum pori facile ab imperiū sanguinis aucto dilatentur, & sanguinis motu iterum dimissurò etiam facile contrahantur, ita ut tantummodo mucoso humori secretum transire præbeant. Sanguinem, inquam, menstruum hoc modò producere arbitror, non autem per extremitates vasorum apertas. (ut voluerunt veteres) Ea enim vasa semel aperta difficillimè iterum clauderentur: à posteriori vero satis clarè probatur sanguinem hunc menstruum effluere per poros vasorum glandulas componentium, nempe ubi examinamus statum partium v. g. in fonte albò, qui est humor in istis glandulis ordinariò modò secretus, sed majori quædam pars est quantitas: Dum enim humores motu solido augentur & aliqua pars eorundem debet evacuari, & motus sanguinis est tardior in corporibus istis fluere albò laborantibus, ipse sanguis per poros secretorios non prorumpit ob deficientem aut nimis languidum ipsius motum, sed humor ille ibidem fecerit solius majori quantitate labitur, atque in plurimis agris non solum certis temporibus sed continuò foras effluit, propter nimis flaccidos & apertos poros, à continuò illò humore acri transiente & contractionem potiorum (quæ naturaliter post fluxum mensurorum contingere solet) impediende, ita ut continuà evacuatione, famulæ fluxu albò laborantes præter modum enerventur, & tantum non ad tabem perducantur. Hæc cum ita sint, satis clarè patet quàm difficile sit etiam fluxum album curare, potiusque illos debito vigori restituere, ut sese iterum more solito contrahere possint, cui nemo Practicorum non facile assensuerit. Poterò ad hæc sententiam elucidationem multa possent adferri Phænomena quæ observamus sæpe numero in gonorrhæâ virulentâ feminarum, sed de his aliâ occasione. Fimentationem in sanguine aliâque causis ab antiquis recensitis pro verâ fluxus mensis causâ non admittimus, sed solummodo sanguinis bene constituti nimis magnam copiam exitum quaerentis, ubi nempe is ad certam quantitatem usque molestem pervenit & per illas vias quæ huic excretioni idoneæ & destinatæ sunt evacuati conatur, quales sunt ipse glandulæ uteri & vaginæ. Hæc exoneratio in feminis non gravis est necessaria; nam præter externa quædam conformationis discrimina inest virilis & femine corporis constitutionem, ea maxime naturalis est differentia quod in feminis, ita præcipue quæ ad pubertatem pervenerunt, sanguis cito fit copiosior quàm quæ ad nutritionem proprii corporis requiratur, adeo ut tempore graviditatis ferus fluxu sanguine ad hunc finem redeundem possint nutrire, in non gravidis autem illa nimis sanguinis quantitas, dictò modò debeat evacuari. Si enim hæc facultas plus sanguinis conficiendi tantummodo ubi ingravidantur in feminis viget, eademque mox à partu iterum cessaret, quomodo quæso id fieri posset absque magnâ & insolitâ naturæ femineæ mutatione? Verùm illa sanguinis superfluentis copia atque ubertas securi circa pubertatem primò oritur, ita logrescens atque in feminis senioribus tandem occidit, ubi naturâ jam non sufficit ad pleniorē illam sanguificationem. Dicimus potèr Mensis boni & laudabili sanguine constare & menstruali illâ evacuatione humoris corpori suâ qualitate noxios, uti volebant veteres, non excerni, sed verum & incorruptum sanguinem qui sola quantitate molestus sit Si enim qualitate etiam peccaret in gravidis, ubi nulla evacuatio sit, gravissima, ob retentos istos humores (ex hoc supposito) symptomata, occurrerent aut saltem cogentur statueri ferus impurò nutrirî sanguine: cuius contrarium tamen verisimile esse docet experientia.

Inula magnitudinis absque ulla putredine.

Cum jam semel fortis mediante placenta suâ tabet interiori tunica efflet affixus, & modò jam dictò sanguinem à matre recipere, ipsaque Aqua Amnii debet quantitate secretetur, ut tota necessariò inde debeat vel sufficienter extendi, vel tumpi, nihil erat quod nobiscum quin ferus in debicam magnitudinem excreteret. Angustia loci incrementum feris impedire nullo modò potere, cum non corpus ferus succrescens, sed aqua Amnii pro ratione augmenti sui, tam quantitate quàm humiditate tubam extendat, impediatque quominus ille à ruba comprimatur. Quod enim partes membranaceæ imprimis à contentò in se humidò facilius extendantur quàm dum eadem sicce, duræ & sibi resistæ sunt, quotidie observant v. g. in hydrocephalò faciliè & absque ullò ferè dolore dilatantur membranæ cranii & ossificatio impeditur; quia contentum illud humidum vasa membranas illas componunt, laiora efficit & influunt sanguinis promoveat id quod ossificationis impedimentum est. Contrarium videmus in eò casu ubi membranae dilatantur à corpore duro: Ex, gr. à calculò id necesse

metere hærente, à quò non solum difficile exten-
ditur sed intensissimos simul patitur dolores. Quem-
admodum autem Aqua Amnii incremento & ex-
tensionis partem faver, ita solum non ea sed san-
guine matris nutriti, & ipsius vasæ quæ corpus ejus
componunt, per appositionem particularum humo-
ris quem vehunt ampliat atque sic incrementum
corpori accedere omnino creditur, cum vasis san-
guinis, uti jam vidimus, ad solum fluat, & san-
guis humoreque ab eo fecerit ad omnium partium
nutritionem sufficiant. Atque hinc aquæ amnii alium
usum & necessitatem assignamus, nempe illam in-
servire uteri vel loci ubi fetus hæret extensioni, ut
partes abique impedimento incrementum capiant
suentque facilius sese movere possit, & à lateri-
bus uteri vel Tubæ non comprimat, tam præ-
terea quòd suos quoque habeat usus tempore partus,
labricando vias exitui feris destinatas. Aliquid hu-
jus Aquæ Amnii per os posse intrare non omnino
negamus, nempe ad humectanda intestinà & dilan-
tando intestina, ne illa nimis contraherentur, (con-
tractio enim Intestinorum ab intesti vel alià quâ-
cunque causâ nimis exsiccante oriri potest, quorum
quotidiana videmus exempla) vel pro attemperan-
dâ bile, succo pancreatico, humoreque & fermento
in runcis ventriculi atque Intestinorum secretis.
Qui humores cum à circulante omnibusque suis
partibus constante jam sanguine separantur, & ri-
dili inveniunt in quod agant, baud dubiè majorem
indici armoniam concipiunt, & hinc opportune
saris à prædictâ aquâ amnii attemperantur. Ab istis
etiam humoribus, in intestinis secretis meco-
nium, & non à cæcibus aquæ amnii oriri statu-
mus.

At fortasse quidam hic quærent, cur solum hu-
manum sanguine ipsò nutriti stent, & non aliò po-
tius humore, sicuti pulli in ovo qui nihil sanguinis
dum ova incubantur inscipiunt? Porro objiciunt alii
in broti, plerique animalibus coryledones ab utero
separati nullò sanguine prompteque, ideoque minus
verisimile esse sanguinem ipsam ab utero in coryle-
dones deferri, sed humorem prius alium in utero
substantià secreti ex quâ in coryledones translatò,
atque animationis geneti nutrantur atque incre-
mentum suum habere.

Ad hæc autem respondeo, analogiam in omnibus
animalibus per omnia similem non dari, sed tantam
potius differentiam, & tam multam plerumque varietatem
à summo Protoplastâ in rebus creatis esse constim-
tam, ut eò majore admiratione afficeremur, & ag-
nosceremus ipsius opera esse sine fine. Et quid que-
so tandem obstat quò minus etiam ovum in ovario
humano possit tantam materiz quantitatem à mate-
re accipere, quâ totus fetus possit incrementum
& nutriti, ac postea per ductum tubæ majorem ad u-
terum delabi & abique adhesionem ibi quasi incubari
& suo tempore excludi? Nihil præterea impedit
quin femine omnino ovipare esse possent. Ideoque
hoc unum ad prædicta respondere possumus, nimirum
Deo placuisse ut impersecurabile generationis
opus, in diversis animalibus hæc modo varietur.
Quocirca etsi verum esse concedatur bestias non san-
guine, sed solo humore à sanguine in substantiâ u-
teri secreto nutriti, hinc tamen non sequitur idem
contingere in homine. Ceteris enim animalibus nec
lochis post partum, nec mensura extra tempus in-
gravitationis fluere solent; at verò in genere hu-
mano separatâ placenta ante factâ exclusionem tanta
sanguinis profusio ex utero substantiâ fieri solet,
ut brevi moriatur mater ab illâ quam tunc patitur
hæmorrhagiâ, & supel fetus quasi submergetur,

nisi ab al-quò satis petito statim anteaque infans &
in lucem producat. Hòc autem factò, uterus exo-
neratur datæque copiâ sic contrahendi solum con-
cidit atque restringitur, denique vas ejus maxi-
mâ ex parte clauditur, & hæmorrhagia diminiui-
tur. Atqui ve. d. si nullus sanguinis ipsius transitus
daretur ab utero ad placenta, unde hæc tanta
hæmorrhagia posset oriri, & quare separatâ pla-
centâ, humor ille alter secretus non totus profusus
Sed puto hinc abique illâ difficultate posset conclu-
di, solum humanum ipsò sanguine matris nu-
triri, atque ab eo nutrimentum suum habere. Quo-
modo itaque fetus in præfati casu ad partem per-
venire & succrescere magnitudinem potuerit in tu-
bâ æquæ ac in utero jam vidimus: sed quomodo in-
compens & integer abique putredine ad tot menses
durare possit nulli mirabantur, imprimis illi qui
ante operationem factam illum hic omnino solum
fuisse negaverant, & porrius ratione persuasi,
quòd fetus tantò temporis spatio in corpore mater-
is delitescens necessario corrupti solet ac debeat.
Et quidem fatendum est hoc plerumque aut etiam
semper accidere ubi fetus in utero ipsò conditur,
ibique moriens non excluditur, nec datâ occasione
extrahitur: idque propter aeris introitum sese per u-
teri orificium internum insinuant: cujus plurima
exempla passim existant. Atqui verò hæc fortis in
tubâ hærenti, idem non contingit ob præfatum
omnem aeris introitum, qui si in robam oique pe-
netrare possit solum, corruptionem hanc dubie acce-
lerasset. Hujus autem rei veritas quotidiana fere
Chirurgorum observatione comprobatur, nempe
partes quæcumque per naturalem affectus & in
cavitate aliquâ corporis inclusas corrupti atque su-
perari, ubi aut externis illas attingere potest, sicuti
contrarium evenire solet ubi aer non potest intrare.
Utriusque habemus exemplum in præfati casu ubi
fetus incorruptus intra tubam uque laruit, donec
ulcus ab interiori Tubæ membrânâ exortum ad
exteriorem usque ipsius cutis superficiem periret,
cujus per fungulos & laxam substantiam particu-
lar æterz sese insinuantem primam putredinis labem
intulerunt; nempe partibus ulceri vicinis atque sub-
stratis. Hoc enim ulcus si non exstiterit, procul
dubio fetus integer atque ab omni putredine im-
munis permanisset. Sæpe enim enim repeti-
tus fetus in Tubis abique ullâ putredine omnino ex-
siccari, q. d. à plurimis annis ibi hæserunt atque in
globum omnis externæ figure expertem mutati, pro
mollâ vel frustò carnis informi haberi sunt: cum ta-
men in ipsis hujusmodi mollis, si bene examinaretur
& extriceretur, omnes partes fetus plerumque ap-
parere solent, & quidem debita proportione for-
matæ. Quæ partes suis membranis involute post
mortem fortis à contractione tubæ sæpe ita compri-
muntur ut figuram tantum irregularem & superfi-
ciem inæqualem præ se ferant: id quod frequen-
ter licet observare in vaccis propter sterilitatem su-
ginatis & mactatis. Idem certe ardidit & in præ-
fati nostri casu, si unus hateris os partiale ab in-
æquali pressione tubæ, idem os alterius lateris non
transcendisset, & suo margine ferre ad infus, pe-
ritorum vulnerasset, eique ratione ulcus fungulum
& aeris ad cavitatem tubæ transimigendo idoneum,
procreasset.

*Nihil aqua amnii reperiunt fuit, sed materia
quadam mucosa.*

Omnes liquores naturaliter in cavitatibus nostri
corporis contentos in membranis glandulosis quibus
consistunt

continentur à sanguine fecerit. & pro ratione quâ fecerintur etiam iterum in sanguinem modò super dicto reduci, nullus dubitandi amplius restat locus. Sic aquam pericardii in interiorâ pericardii superficie glandulosâ à sanguine fecerit & in venas penetrare credimus, eamque sic contineri quâdam vicissitudine quasi renovari; quæ si eadem semper remaneret ex stagnatione procul dubiò in d-rectis murata usui ad quem à naturâ destinabatur minùs apta redderetur, parte scilicet ejusdem subtiliore continuò per poros æquè lubiles volantes. Hinc enim crassior evaderet & cordi ad se faciliùs & libentius movendum non tam adjumento quàm impedimento esset. Similiter humorum aquam in oculò generari & circulationis legibus, more aliorum succorum subtili experientia docet, utpote quâ interitum regenerari solet, si quando, fortè casu aliquò efflueret & effunderetur. Pari ratione etiam aquam in annidò contentam totò gestationis tempore non semper eandem esse numero statuimus, eamque (præterquam quòd aliquid per os intrat) ope venatum, quæ reperiuntur in membranis, in sanguinem sæpius reduci & ab humore ex eodem sanguine in superficie placente internâ ac glandulosâ secretò denovo initiari, ut utrobique verum sit tam in microscopio quàm in macroscopio quod Poëta canit:

Ut vitium capiant ni moriantur aquæ.

Exemplum hujus rei evidentissimum in hoc nostro casu suppetit, ubi aqua annidò mortuò jam sæpiò non amplius circulans, partem suam subtiliorem per insensibilem transpirationem amisit & quod reliquum erat gelatinæ intus in tubâ concretæ; sæpiusque amplius à compressione satis tueri non potuit. Porro observamus etiam aquas præternaturaliter in pleurisque aliis caviaribus corporis collectas & stagnantes, colore mutari turbidas & concretas conspici. Reulie mihi Dn. D. Sylvester Med. Doct. Londinensis se hydropticum quendam vidisse, cujus abdomen gelatinâ quidam repletum esse observabatur; quin etiam ipse Amstelodami dum curationem palliativam cuidam hydrocæ laboranti, adhibebat, serorumque ipsius aucti Barbettianâ persorare, ut aquam ibi contentam emitteret, nihil extraxi præter aquam tenacem, quæ non sponte effluxe, sed manuum ope & pressu quasi emulsa exstillabat, adeò in eam solâ purgatione, quod tamen aliquoties antea in eodem ægrò cum successu tentaveram, evacuare amplius non possem. Quam obrem ipsi curationem eradicationis proposui, quam ipse æger antea recusasset, cum videret tamen se more solito sublevari non posse, jam faciliè admisit. Ubi ergo totam seroti cavitatem aperire ut separationem membranæ istius humoris continuò extirpanda expediret, & cecidisse impedirem, inveni aquam diversè coloris, turbidam, eamque tenacem: procul dudò quia pars subtilior ejusdem transpirasset, ob continuos foras quibus prædictus æger tunc usus fuerat per menses aliquot, ex consilio Medici sui: quod quidem cum antea non fecerit aqua etiam antehac magis fluida repta est. Quæcirca hinc jam satis clarè patet unde in nostro hoc casu illa materia mucosa foris ambiens totaque faciem tubæ interioris contegens ortum traxerit, quòdque eadem materia mucosa aquæ in annidò secretæ pars crassior fuerit, quæ per insensibilem transpirationem avolare non potuit, non autem materia purulenta, prout primò quidem fronte à nonnullis adstantium esse credebatur. Sic enim sæpius numero salutarè illi qui materiam similem mucosam in cadaveribus re-

peram pro materia purulenta habent. Sic meum me aperuisse abdomen quidam Hydropticus in quò parac. uelut antea fuerat instruita ad evacuandas aquas, sed pessimè (ut solet) cum successu. Inveniebatur, inquam, ibidem similis materia, omnia intestina & reliquis infimis ventris partibus repleta; adeò ut ex adstantibus aliqui statim omnia intestina & reliquis parvis necitatis pronuntiarent; atque hinc mali successus causam deducerent: ubi verò hæc materia spongia & aqua tepida fuit ablata, nihil in abdomine ulcero apparuit, omnisque partium in eodem contentarum superficialis intacta conspiciebatur: quod si nobiscum paulò attentius ceperemus; quid propriè & necessario requiratur ad puris confectionem, non tam faciliè discipiemus: quoniam in re paucis opinionem meam exponere non gravaber. Statuimus itaque nullos humores corporis nobis, quamvis extravasatos, esse mirabiles in pus, quamdiu illi serorum abque comminatione aliorum humorum sinceri permantent: Ideoque sanguinem extravasatum & eadem texturâ præditum quâ in vasibus suis, sanguine interstitiis partium inter se eundem commotionem, non mutari in pus omnino affirmamus; id quod experientia quotidiana nos docet in Chirurgiâ. Sæpius enim observatur sanguinem extravasatum inprimis in vertice capitis post casum aliquot septimanas incoagulatum repeti, & protinus humorem extrahi; ubi nempe foribus aliisque ad resolutionem topici frustra applicatis, tumore tandem aperitur. Omnis miratio quam soler & potest in tali casu sanguis subire est, quòd in quodam modo coagulatus interitum apparet, præcipue ubi continuò totum usque pars ipsius subtilior avolat per insensibilem transpirationem: Memini tamen me decinò nonò post casum die extraxisse sanguinem floridum & fluidum in vertice capitis naturæ extravasatum, qui cum esset ebrius ex summo navis per opusculum apertum, in ejusdem cavitatem vacuum ceciderat. Ille enim quamvis emplatrum de cumino continuò parti applicatum fuisset, tamen quæ capilli non fuerant ablati, sed forciè tantummodo abicissi, cutemque haberet maxime induratum, inde adeò quòd lingue deque habuisset omni aëre inclementia, capite apertò semper incedere assuebat, evaporatione partium subtiliorum sanguinis facta non est, eique de causâ sanguis fluidus perperus est. Aliud exemplum addam de sanguine coagulato incoagulato & inclusò in eadem membrana una cum tumore carcinomatosò glandulæ parotidis, quem Amstelodami extirpavi Anno 1680. Parte meò præfente. Ille æger postquam tumore carcinomatosò juxta aurem sinistram quatuor annos laboretasset, quâ magnitudine ovum gallinæcum exæquaret, ejusdem acerrimò dolore ex improvisò correptus est, quem dolorem tumoris incrementum satis insolitum sequebatur; adeò ut intra sex septimanas ad pugonem duorum magnitudinem creveret; quò tempore magnus is dolorem tenivum patiebatur, omnino distinctum à dolore lancinante, quem quandoque in tumore antea senserat. Cum jam per annum post incrementum illud subitaneum Chirurgi plurima emplatra & cataplasmata maturantia nullò cum successu applicuissent, sperantes scilicet, nec abique ratione, in tumorem ad suppurationem perducituros, propter subleantem illud incrementum, extravasationem humorum indicans; tandem ubi humorem post satis fluctuantem & maturum sentierunt, ideoque tumorem aperire non audebant, nihil præter extirpationem rotundæ tumoris (si vellet sanari æger) impetisse pronuntiabant. Tunc inter alios Chirurgos Patre meus quoque consulebatur, qui cum examinatis

N omnibus

omnibus idem sentire, nempe nihil præter extirpationem superest; eger operationi, cuiusque patet mel se submisit. Cum itaque ego, præter Patrem meum, extirpationem aggredere, & circa basin, tumorem more solito separarem, tanta sanguinis grumosi copia prorupit, ut in mediâ operatione sistere, partemque sanguine scintillantem abluere coactus fuissim, quò mihi copia melius videndi fieret quid posito agendum restaret: abluere itaque parte tumorem reliquum, ovum magnitudine æmulantem feliciter abstuli, ægerque brevi post sanatus est. Notandum hic quoque aliquid satis insolitum, nempe quòd sanguis ille grumulos extravasatus & in eadem membrana cum tumore carcinomatosò contentus, tam arcte conclusus, & tam crassa ingurgitione reclusus, ut sua duritie atque inæqualitate ipse tumorem carcinomatosum reterret, nihil in se tamen purulentæ materiæ continuerit. Plura hujus generis exempla satis insolita possem adducere, sed cum non dubitem quin alaxata abunde demonstrare possint, sanguinem extravasatum nullòque cum humore mixtum non mutari in pus, hæc superfedo. Sic lympham etiam omnis generis non mutari in pus quotidie satis superque observatur in hydropicis, in hydrocele laborantibus, in hydrocephalis &c. neque etiam lympham crassiorem in pus mutari observamus; ut lympham intra articulos reposita, ad faciorem motum ossium, quæ si per accedens detineatur & in tumorem exturgat, si sola & sincera maneat lymphæ specie apertò tumore effluet. Lymphæ albuminis ovi instat crassa Ganglion efficiens, nunquam ad suppurationem perducitur, cum sit liquor secretus in superficie internâ vaginarum tendinosæ amplexationem ad faciorem tendinum in suis motum procurandum; qui propter crassitiem istarum vaginarum non facile protrumpere potest, nec propter obstructionem positorum iterum in sanguinem redire. Eiusdem generis lymphæ tenax & crassa repetitur in tunica, tumore sub lingua oris, quæ nunquam mutatur in materiam purulentam, etiam per annum & ultra ibi extravasata continetur. Nec tantum in supra natis, sed in aliis etiam corporis partibus similes quotidie occurrunt lymphæ extravasationes, absque subsequente suppuratione.

Pinguedo si extravasata barreat & agnet, per se sola & absque aliorum humorum affludù, nullam ferè subit mutationem; præterquam quòd aliquando durior aut liquidior evadat, sed io pus nullò modò convertitur; uti observare licet in Atheromate, Stragmate, Meliceride &c. qui tumores per annos quamplurimos durant innoxii, nullâ interim subsequente suppuratione. Denique idem de cæteris humoribus in corpore repentis esto iudicium.

Ut igitur pus formetur, requiritur ut humores diversæ naturæ extravasati invicem miscantur & simul fermentationem quandam subeant; Hinc pro variâ miscelæ atque humorum diversitate, diversum quoque genus puris formatur. Si humores lymphatici diversæ naturæ colligantur extra vasa & miscantur simulque aclescent & fermententur, formatur pus ichorosum, si sanguis cum aliò miscetur humore, dicitur pus saniosum, verum ut pus laudabile fiat, & bonum, requiritur mixtio lymphæ cum pinguedine, qui duo humores si extravasati cæcâ proportionem miscantur, abscessus ut plurimum efformantur; unde etiam observatur illas partes quæ hinc humoribus abundant, magis abscessibus esse obnoxias, id quod quotidie conspicitur in mammæ multarum. Hæc enim cum præ cæteris partibus, abundant quobus illis humoribus ad lactis genera-

tionem necessariis, frequenter etiam abscessibus infestantur: Interstitia musculorum propter eandem rationem sedes ordinariæ abscessuum esse videntur. Quin etiam ipsa ossium medulla, in membranis glandulosâ ossa interiora investiente à sanguine fecera, & pinguedinis instar communis circulus in pus mutatur, quoribus lymphæ per ossa porosa facta ad eam penetrat: id quod observare licet in illis qui tephis laborant. Hinc enim in casu ossis dilatatur, molliora redduntur, [aperitis iterum valis eadem componentibus] transitumque præbent humoribus lymphaticis extravasatis & ipsis incumbentibus: id quod sepius mihi observare liceat. Hæc autem puris formatio, & eò loci collectio cum dolore præ ætatis acerbissimò fieri solet: cum enim dolor abscessuum æquè dependat à partis extensione ac ab humoris contenti acrimoniâ, videmus partes illas quæ difficilius extenduntur majore dolore affici: sic ubi semel pus in ossium cavitaribus formatur, si propter ossium nimiam resistentiam per membranam medullam cingentem non possit foras protrusum atque hinc per totum ossis longitudinem hæc membrana prematur, necessariò dolor intensissimus debet oriri, qui quidem nullis remediis cedit, nisi os ipsum in cavitatem usque perforetur, ut puri denur exitus. E contra verò partes hinc humoribus, lymphâ nempe & pinguedine non abundantes, abscessus non patiuntur, quale est ipsum corpus musculi carnosum, quod nunquam abscessu infestatur vel pure repletur visum fuit, & si aliquando pus intra membranas ferè collectum observetur, à petiendi id ut plurimum originem suam habere solet, adeò ut si probè hanc rem examinemus, patebit pus semper dictum solummodo ex lymphâ cum pinguedine mixtâ generari. Quòd si semotis omnibus obstructis spontè ex ulcere aut vulnere protrusum possit, sic pus laudabile sive balsamum illud quò natura in sanandis ulceribus ipsa utitur adeò ut nostrum tantum sit medicamentis topicis & instrumentis propiciere, ne aliquis hujus puris hæreat, ubi possit sui modò accrescere, & consolidationem quam natura molitur impedire; quod quidem bestia continè lambendo ex naturæ instinctu perficiunt, sed de his plura loco ubi de his ex professo agemus. hæc tantum ad elucidationem casus præsentis addenda sunt, & ad demonstrandam materiam illam in amnion repertam purulentam non fuisse.

Aperturam perduxit ad pedalem longitudinem.

Duplici de causâ hanc aperturam tante longitudinis feci, primò ut ablato (satis omnes partes separandæ facilius possent foras se se protrudere. Si enim tota cavitas ad imum usque fundum non sufficere aperta, pars cerè magna materiam separandæ simulque pus ex oris vulnucis continuò fluens, & propter ægræ situm ad cavitatem illam prolapsus, in ipsius parte infimâ subsederet, unde à naturâ difficilissimè superiorem versum rejici aut expelli poterant; donec purulentum ex morâ concepsissent, totoque hinc tandem sanguine infectò, certam mulierem atrolissent. Alia ratio fuit, ut fortum commoventibus absque omni violentiâ per vulnus possem eicere; si enim angustior fuisset hæc apertura, adeò ut hinc coactus esset vi aliquâ vulnere illac fortum extrahere, multa sane & graviora symptomata ex vulnere contusione, oris procul dubio partes vicinas tumefecissent febreque auterant, quibus ægra resistere tandem amplius non posset, cum eadem febre continuâ ante operationem afflicta, jam summe

summe debilis & mori proxima jaceret. Cæterum aperturæ atque incisiones ferè in omnibus operationibus chirurgicis, quoties corpus aliquod magnam extrahendum est, prælongas fieri oportere, nempe ad præcavenda symptomata graviora, quæ certò certis aperturæ minores comitantur, exemplis bene multis & observatiõibus confirmare possem; Atqui unum tantummodo hic proferam, quod pro norma esse poterit in reliquis id genus operationibus.

Scopetarius in urbe Frane, ætate degens & herniâ intestinali jam ab aliquot annis magnâ laborans, quam tamen pro lubitò reducere & ferè omnia intestina in abdominis cavitatem ubi velle reponere posset, negligenter usque sine ullo subligari incussit; addò ut intestinis suo pondere pectus tantum magis magisque indies dilataret. Hic cum die quodam extra urbem exivisset, sigoreque se corrumptum sensisset, domum rediens intestina non potuit amplius in suum locum deducere, propter inflammationem & tumorem circa anulum, quæ symptomata brevi ita increscere, ut extremitates non solum per intestina, quæ jam in scrotò continuabant transire non possent, sed illa quæ anulum usque pervenerant sursum regurgitarent & ab ægro evomerentur. Cum itaque in deploratò hóc statu veritaretur & spes vitæ vix ulla superesset, advocabat ego circa undecimam vespertinam, & ægrum agonizantem inveni. Parte aliedâ autem examinata maculas quasdam in scrotò vidimus, gangræne immineantis signa infallibilia: Hæc autem omnia symptomata à strangulâ intestini provenire discipulis meis aliisque astantibus denunciabam, neque ullum jam remedium præter reductionem intestinorum, factâ prius aperturâ, superesse. Cum fomentationes aliæque ejusmodi remedia in cassum fuissent applicata: denique pectus esse in morâ. Annuens itaque amicis ægroti, quamvis non magna spes boni successus jam tandem superesset, ad operationem me accingo, satis esse credens, anceps remedium adhiberi quam nullum, præsertim cum ægrum si fortè aliis de causis, at contra tamen in eâ operatione ipsâ non moriturum scis mihi constaret experientiâ edocto, operationem hanc in Bubonocèle, si rectè fiat, non esse lethalem. Paratis ergo omnibus in hanc rem necessariis ægrum cum lecto super tabulam eò in situ posui ut pedibus suis operationem possem perficere: Itaque à scrotò & productionis peritonei apertione incepti, ut intestina contenta degerem; quibus detectis digitis, conductorem omnium operum, & simul forcipem supra digitum introduxi, scrotumque & peritonæi productionem me secundum totam longitudinem aperui: quò factò præter expectationem apparuerit intestina crassa æquè ac tenuia; intestinum enim Cæcum cum magna parte Coli & majore adhuc illi portione nodum illic in conspectum venit, colore omnium mutato, æquè gravem & digitum illum strangulationem. Hic visò mayorem solitò aperturam esse institutam statim dixi, ut faciliè & absque ullâ vi aut pressione intestina in cavitatem abdominis reduci possent. Si enim aperturæ parva tantum fieret & intestina (quæ jam plus debuit antea, ubi reductionem tentabam, compressa fuissent) absque ulteriores compressione reduci non posset, procul dubiò mortificatio (quæ jam jam imminabat) evitari non posset. Apertò itaque scrotò supra stilum canaliculatum à latere intestinorum in cavitatem abdominis introductum, cultellò anulum eò usque dilatavi ut indicem manus sinistræ faciliè supra stilum potius introducere, quò factò extra stilum & supra digitum forcipè tantam aperturam feci per integritatem & tendines musculorum infi-

mi ventris (qui anulum, per quem peritonæum se prolongando unâ cum intestinis in scrotum debitor, component) atque etiam per ipsum peritonæum ipsi subijctum, ut absque ullo impedimento intestina tam crassa quam tenuia reducerem. Verum in reducendis illis difficultas alia inspecta mihi occurrit, Coli nempe intestini cum productione peritonæi in ipso anulo coactio; quam cultellò separare coactus sum, & quamvis operatio inde retardata multò difficilior redderetur, peregi tamen eò cum successu ut reductis intestinis & statim in anulo factâ paribusque reliquis incisus, æger statim sublevari se sentiret, vomitusque cessarent, placideque illa ipsissima nocte dormiret, magnâ cum febris, quæ antea adebat, diminutione, melliusque indies se haberet, & brevi, quamvis jam quinquagesimum ætatis superasset annum, sanaretur.

Ex hac historiâ non obscure colligi poterit, quantâ cum ægrum utilitate in hujusmodi casibus incisiones amplæ & majores sint, adeò ut antum asserere plerumque ob nimiam, hæc in te chirurgorum cautelam corationes ægrorum retardari, dolorisque augeri, denique panem dari cæius ubi largius incidere non liceat & profectò non profit. Hoc interim lubens concedo in facie id esse evitandum propter deformitatem, in collò vesicæ idem prohiberi, propter urinae incontinentiam, quæ frequenter nimis magnam incisionem eò loci factum consequi solet, ideoque in aut sphinctere (quantum possibile est) pari cautione procedendum. Quoties singularem hunc casum eò tantum sine hac propositi, nempe ut uris clarè patent, quàm necessarium sit quandoque largius incidere, & non tantum esse periculū ex incisione peritonæi, quantum illi perivadent illi, qui pro metu hæmorrhagiæ cautè nimis & parè incidendo symptomata intestini alia auget, non sine infelici operationis successu: Tantum absit ut existimandum sit Peritonæi vulnera esse lethalia. Non possum autem præterite quin hæc addam quod nihil observare licuit in hóc ægro post sanationem ipsi restitutam. Nempe hemiâs de novo propulsasse à latere factæ incisionis: cuius tamen cicatrix tam firmi- tatem ossi pubis locò incisionis adhærebat, ut oculus recidivæ metus superesse videretur. Huic tamen ut in postea cavet subligaculo se munire coactus est, quod quidem ipse antea ferè non poterat propter intestini-Coli coactionem eam ipso anulo. Cum, inquam, hoc intestinum nullò modo tunc temporis reduci posset, compressionem ejus immediatam tolerare non poterat. Notandum etiam in transitu, quàm inutilis sit operatio quæcumque in adultis, cum post incisionem, licet annulus vel ligatura vel cleatrice occludatur, plerumque, tamen vel à latere nova formatur hernia inguinalis vel à superiori parte hernia ventralis: eò nemp. in locò, ubi tendines magis laxi reperiuntur. Causa enim herniæ ordinaria est tendinum ad musculos abdominis pertinetium debilitas, qui relaxati, fibratum suatum separationem faciliè admittunt: peritonæum enim quia solum sui vi pondus intestinorum sustinet ipsique incumbens resistere non potest, paulatim extenditur, & per intersticia fibratum tendinorum scrotum vetus delabatur atque unâ cum intestinis herniam facit. In infantibus minus adhuc admittenda est hæc operatio, quia hi ferè omnes dum adhuc crescunt ubi robustiores sunt simplici subligaculo sanantur, dummodo hernia à prolapsu tantum impediatur, ut fibris anulum componentibus deus tempus sese contrahendi. Sed & hoc obiter notandum, nempe, in Gallia, Italis, Hispaniâ magnam partem hominum herniâ laborare ob utrum obei continuum (oleum apud ipsos idem usus est qui apud nos bœyeri) &

Fræqueſque in Friſiâ tertiam fere partem incolarum herniæ eſſe obnoxiam ex continuo lactis embuti uſu. Itali quidem & Hiſpani utuntur oliô, quia illô abundante, longè magis quam butyro: Fræqueſcentes autem dum volunt orio indulgere, malunt per deſidium tenui victû & lacte embutarè veſci, quàm labore & induſtriâ victum meliorem quaerere & mereri. Sicut autem oleum in Italîs, Hiſpanis & Gallis, ita lacticia in Fræqueſcentibus hœtulis frequentiores proceſſare poſſunt, corporis partes nimis humectando, lubricando, & relaxando.

Tubæ Faciæ interior ſub finem cura cartilagineæ amulabatur.

Tubam Falloppianam naturaliter conſtitutam, nunquam in os vel cartilagineam mutari ſatis liquet. Ergo ut explicetur hoc phænomenon, quomodo nempe in præſenti caſu hæc mutatio accidit, vel potius neceſſariô fieri debeat; demonſtrandum erit, quæ pars mutatio hic facta ſit, & quid requiratur ad partium conſtitutionem quæ in cartilagineam aut oſſeam ſubſtantiam mutandæ ſunt. Conſtat itaque quò magis humidi abundantes partes aliquæ, & quò major in illas humorum copia influat, eò tardius & difficiliùs easdem concretære in oſſeam ſoliditatem, & contra autem quò minus humiditas in eis continetur, eò tardiores eunt eò citius illas induræſcere. Sic videmus omnes partes ſecretionibus interſervientes, & per conſequens magnam ſanguinis affluxum, reſluxum, humorique ſecretio tranſitam præbentes in oſſa rariò aut vix unquam mutari, & contra obſervare eſt membranas illas quæ maximâ ex parte ex tendinibus ſunt conſtituæ, & tantam ſolummodò humoris quantitatem admittunt quanta ad nutritionem atque incrementum ſuum eſt neceſſaria ſemper ſerè in oſſa mutari. Hæc autem (ſi ita loqui liceat) oſſificatio quatenus vel citius vel tardius fiat tam in oſſium conformatione naturali quàm in accidentali, multum à ſicco, & figuræ diſcrepantiâ dependet. *Quand finem* oſſificatio retardatur vel acceleratur, prout membranae partibus magis aut minùs humiditate abundantibus ſunt appoſitæ vel impoſitæ, id quod clare patet ubi de oſſificatione à primâ conformatione ad adultam oſque ætatem poſthac fortè plenius tractabimus; ſed id non eſt huius ſortis. Hoc unicum pro exemplo addam, nempe epiphyſes cartilagineoſas ſubſtantiam oſſis molliorem tantum adipiſci; propter humoris magnam quantitatem continuo ipſas ambientem, & eò delatam ad ſcilicet motum; quæ tamen cartilagineæ, ſi caſu fortè aliquò humoris affluus impediatur, ſtatim in oſſa mutantur: id quod quotidie obſervatur in oſſium concretione & motus abolitione propter illius humoris defectum. Propter humiditatem nimiam quantitatem peccantem, oſſificationem in totum impedit in hydrocephalo jam ſupra diximus. Hinc jam deducimus partium ſiccitatem requiri ad oſſificationem, & omnia quæ ſiccitatem illam quòquoquodò immittunt, oſſificationem pariter impedire. Sic continuus olei uſus homines agiliores reddit, & in ipſi ſueſcitare tardiotem tendinum oſſificationem efficit, quia nempe vaſa illa ſanguinem oleoſum vehentia difficiliùs occluduntur, & diutius mollia, atque recipiendo ſanguini apta permanent.

Figuram oſſificationi vel celebriori vel tardiori aliquid etiam contribuere, demonſtrant totius corporis noſtri oſſa, quorum in primâ conformatione ea pars citius in oſſeam duritiem concretit quæ maximè elevata eſt atque gibboſa. Sic in cranio videmus in durationis initia eò loci primò apparere, ubi par-

tes magis ſunt prominentes & elevatæ, non autem in cæuro vel nadiò (nisi olim voluerint) capitis ratio eſt ſatis evidens ex prædictis: nam ubi ciculatorio pigrior & difficilior eſt in vaſa facilius concidunt atque occluduntur, & propter defectum humoris eò citius ſigſcunt atque in duritiem oſſis ſubſtantiam adveniunt.

Jam itaque tandem examinabimus quæ mutatio facta ſit in hac noſtrâ membranâ tubam adeò dilatatam conſtituente ut indurationis ejus ratio liquidius eluceſcat. Hujus igitur membranæ ſuperficies interna olim glanduloſa fuerat, quò meliùs ſecretionè interſerviret majoremque ſanguinis copiam admitteret, ac jam tandem, deficienti humore mutata eſt in aridam & exuſcam quæ ſanguinem vix ullum recipiat.

Extraidò ſiquidem fortè omnis ſuperficies interior glanduloſa fuit ſeparata, membranæ autem partes exterior quæ ſuperſuit vaſis jam conſtrictis & propemodum clauſa in liccam & ſerè exanguem pelliculam mutata ſenſim exaruit. Quæ quidem ſiccitas ex humoris defectu neceſſitate quâdam huic parti duritiem adferre debuit: nempe qualis in plurimis etiam cicatricibus eandem ob cauſam obſervatur, quia ubicunque partes conglutinantur, ſibi vaſa ſimul occluduntur uſque adeò ut humoribus viſ tranſitus præbeatur. Accedit & hoc quòd cutis inſtrumentum ſuſtorem ſecretionis fuerint del ta, unde & minor humoris affluxus & major penuria. Sed ut hæc noſtra tubæ faciæ interior cartilagineis ſubſtantiam præ ſe ferret, æquebatur adhuc partis figuræ gibboſa: hanc autem magnâ ex parte, ab interſtitiis alique partibus in ſi ſimò ventre contentis habuit Quæ (quia tanta in hoc caſu à ſerò crescente ipſiusque humoribus eſſentia non obſtite, quin ſui mole priſtinum locum facile occuparent) membranam Tubæ ipſorum ponderè & compreſſioni cedentem in partes conſiguas ita impulerunt, ut figuram abdominis gibboſam itaquam à prolapſum acciperet. Hinc major diſtinctiones tranſiunt ſanguini oborta majorique vaſorum occluſio & partis rigidiſſa facta eſt, quæ tandem cartilagineam hanc duritiem robæ induxerunt.

Hæc interim tubæ indurata membrana cicatricem præmunies, & per totam ejus circumſcriptionem ubique cum peritonæo coalceſcens tendinum in operatione tranſverſorum defectum ut neque ſupplevit. Hæc enim jam cartilaginea niſi à naturâ ſemper provida fuiſſet eſſormata atque ante oſſium illud collocata; proſectò hæc forma eò facilitate ſortus in utero geſtare non potuerat, præſertim gemellos quos triennio poſt curationem hanc peritiam peperit. Abſciſſis enim tendinibus qui abdominalis partes præcipuè continent ac cohercent, vulneris ora ſibi invicem ita appropinquata non poterant, ut abſque ulla interceptæ conglutinatione, obſtante partium ſuppuratione exitu per ipſa ſuturarum interſticia: ideoque eò loci à ſuturis ponderè & incrementò tanta extenſio acciderit ut vi expulſive ominò abollâ, hernia ventralis inevitabilis atque immenſa ſuccreviſſet. Quippe tendinum fines abſciſſi atque in hac parte indurati contracti, nec ſatis valiſſe fuerant & aſſuſi ad ſerum excludendum, & prolapſum inſteſtinorum in ſolito cæro certius lecturato reſiſtere non poterant.

Plura adhuc teſtant, Viſ ornatiſſime, quæ in hoc caſu notari digna commentarium plenius ſane & uberius poſtulent. Sed hæc hæcenus. Nam & ego Epistolæ modum mihi videt excuſſiſſe, nec te diutius morari deſeo gravioribus fortè curis & negotiis diſtinctum. Vale.

Fetus mortui, innoxia per duos menses in utero, gestatio.

Clariff. Christoph. Günsbergi Schelenhammeri, Miffell. Curiae, Decur. ij.

Fatus in Utero materno vermifecundus.

Clariff. Andreæ Stegmanni, Miffell. Curiae, Decur. ij. Ann. 7. & 8.

Nobilis quædam Matrona ab E. gravida, cum ad menses VIII. sortum suum gestasset, accidit, ut conspectu N. subito extitit, ex illo tempore infantem suum tenuit, sensim debilitari, & post aliquot dierum hebdomadas versus noctem, motu violentiore concuti, tremere, & se hinc inde jactare, tandem vero quiescere & in unum locum latere dextro collabi & emori. Nullorab eo tempore sensus amplius motus, nulla vitæ indicia, neque tamen symptomata, quæ conspici solent mortui in sortum, matremque affligere, observata sunt, sed pulchre valens, ad mensis decimi finem, sine ulla incommoda sortum portat suum perpetuo in illo loco, ut pondus inutile, cubantem. Completo partus tempore, dolores sensu confectos, romptur sortus membranae, aquæ effluunt, sequitur ipsum tenelli cadaver, funus in ipso partu representans proprium; Mater nihil mali admodum patitur, sed valens & felix deinceps aliquoties adhuc viros & pulchre sanos sortus parit.

Ex quibus colligitur: 1. Nom semper gravia symptomata mortem infantis in utero comitari, nec 2. semper mortuus sortus patrescere, sed tempus partus incognitus præstolari. 3. Falli illos, qui partus causam in sortu maturete querunt, & vel ejus magnitudinem, locique hinc angustiam, vel alimenti defectum cum ad exitum concepere arbitrantur. Nihil enim horum in nostro apparet, tamen legitimus partus justo tempore sortus est. Unica itaque sortis Naturæ lex est, à Creatore & conditore suo sibi imposita, quæ hæc ut cætera; gubernat, ac moderatur, ut, quotquot naturalem terminum ex causis mechanici explicare, sanguine, frustra le torqueant, et si negari non possit rubrum parvulum sanguine affluens & rumulu spirituum, & in angustia redactum calcitrare, seque jactare vehementius: At hoc est adjuvare partum non etiam efficere.

Fatus in Utero explicatus.

Clariff. Joh. Christoph. Ramzneri Miffell. Curiae, Decur. ij. ann. 7. & 8.

Anno MDC LXXXIX, circa tempus Paschæ, Uxor Tabellarii nostri Henrici Schröderi supradicti hæcenus mensibus & infensente nunti Embryonis, gravidam se, esse percipiebat. Circa festum autem Pentecostes, per duas noctes insequentis horrores febiles patiebatur, & motum Embryonis ab eo tempore Mater non amplius sentiebat, tumoque ventris indies subsidebat, adeo ut vestimenta stridiora, hæcenus temora, rursus capessere poterit, ceterum tamen nullatenus malè habebat. Quid it? mensi Julii fine, partum edebat mortuum, ita excisatum, ut ossis planè, cutæ saltem superduchus apparet, Lochiis parvis, aut ferè nihil fluentibus, nec Lacte in Mammis accrescente, nullisque aliis symptomatibus infestis.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Anne biennium & quod excurrit, rustica quardam ex proximo pago Hefsta me convenit & retulit: Se octavo mense jam gravidam sentire in infimo ventre motum vermifecundum: *Es sey nicht anders, als wenn der untre Leib voller Ameyen wære.* Gerebat quidem hæc fœmina ventrem pergrandem, sed ex toto marcidum, nec ulla sortis vivi, vel motus indicia edentem, hinc potius ex obstructione menium, quam ex ingravitatione tumefactum esse ventrem hœsitabar. Ne verò sortis, si quis adisset, noceret, corroborantia, utrum t-ispiciantia, & alia in ejusmodi casibus dubiis proficua illi ordinabam, & jubebam, ut si quid sinistra accideret, mecum communicaret. Absoluto nono mense accersitus ad rusticam hunc consultum sine intellectu & voce deprehendebam, propiusbam itaque illi optima quævis, ut aliquo modo resocillaretur. Hinc, cum ad tem ipsam indagandam, tam à patiente, tum ab adstantibus admoneret, tacto abdomine, observabam molem versus pubem prorumpere ingentem, atque admodum mollem, pates vaginæ interioris deprehendebam siccissimas, nullamque uteri aperturam vel patiendi conatum alium. Abiens suadebam, ut intem illorum incoquerent juri gallinæ, & oleo Amygdalar. pingue redderet, ordinabamque pœlentia cum confortantibus mixta per vices adhibenda. Altero die post revisibam Agram, illamque doloribus partus insubistentibus, languidis, & per longa intervalla recurrentibus onctam videbam, hinc sortiam pœlentia illi propinadam, itidemque fomenta applicanda & linimenta emollientia ad infumum ventem, lumbos ac regionem circa os sacrum, pœlinem, ossi pubis, pendendam cum cervicè il. linenda ordinabam, à quibus parturians in vehementiores partus dolores incidbat, quos non longè post hauria uteri allaque partus instantis indicia sequebantur. Cum autem Partus admodum debilis, nec tanta uteri apertura adesset, ut sortus ab obstetrice apprehendi posset, hinc illam supinam, reclinato capite, elevatis coxis & postterioribus locandam suadebam: Obstetricem verò instruebam, ut obstructicantem manum oleo delibutam sensim sentimque in uterum immitteret, alteraq. Patientis abdomen leniter compimeret. Didici obtemperans Obstetrici, referebat: Instare quidquidem utero, sed nullum esse partum, neque manu posse extrahi. Jubebam, ut quale quale unco apprehenderet, illudq. leniter & paulatim extraheret. Hinc maximo molimine & longo labore protrahibat sæculum quandam Obstetrici (qui membrana erit exterior sortum includens *chorion dicta*, admodum densa & p. n. crassa) ex quo innueta vermium progenies, figuræ laræ & coloris rubri in conspectum visibatur, qui totam sortem, exceptos paucis ossiculis, consumpsierat. Secundum admodum reorride, ac si in fornace pistiora rostra fuissent, adhererebant firmiter huic membranae, & vix 3j. ponderabatur. Nullam aquam purperalem oeq. ante, neq. cum, neque post partum exclusit hæc fœmina; Lochia verò à darts vermiculamentis demum post quintum ritè excrevit diem edidit; post annum, incoluiss & sana, sanum sortum tutus in lacem, cum quo iterum, quod mirandum, aliquot viginti ejusmodi supra dictorum vermium, absque tamen lésione matris & infantis simul exclusit.

N 3

Fatus,

Fetus, prater opinionem & intentionem parentum, admiranda in utero materno conservatio.

Clariss. Gualteri Casimiri Gabrielis, Assicell. Curat. Decur. ij. Ann. 7. & 8.

Decadis II. Ephem. Naturæ Curiosorum Anno VIII. Observ. 546. variaz adduntur historiz, quibus frustaneis in exutendo fœtu tam artis, quàm Naturæ conatus narrando, difficultatem provocandi vel directè vel indirectè abortum astruere satagit Author. Haud multùm abluens ab illis, notabile aliquod exemplum mihi quondam observare contigit.

Anno 1666. ad Juveniculum Professoris ejusdam juvenis sanguinei ac rosei uxorem, qui hanc compulsiōnem suam paucos ante menses duxerat, vocabat, de colicâ & motu quodam, ut agebat, præternaturali, in ventre & sub hypochondriis ac illis conquerentem, ac meum de illis iudicium ac consiliū exposcentem. Re probè pensatâ, & eûm constitutione utriusque Neonatorum ac tempore nuptiarum collatâ pręgnantem illam esse iudicabam, motumque à fœtu oriri asserabam, sed tam ab ipsâ quàm à marito, & quod miros à Socero & Socru, parte matreque nimirum utriusque conjugum, satis, ut sapienter, amiois non sine indignatione explodebat, imò, qui aliis familiis illius Medicus eram ordinarius, detrahebar, atque alius, me quidem senior, ut in hoc casu vix oculatior vocabamur; Qui assensum parentibus præbens, illam strenuè contra colicam, tam carminantibus, quàm purgantibus, nec veniſſionem omittâ, pugnando exercebar sed frustra. Motus illi & subinde quidam dolores continuabant nihilominus: Tertius itaque & huic adjuungebatur, & neque collato consilio nîl quicquam, quod vel alterando vel purgando, aut extreme etiam applicando ad colicam haec, uti illam vocabant fluctuantem & bellandam ullo modo facere posse videretur, intermittebant, sed haud majori quàm ante successu. Patentes præterea ipsi cum marito ex ambubajorum, Medicastrum & Medicastrum consilio tentabant quamplurima tam interna quàm externa, eaq. inret quodam satis violenta & peticulosa auxilia. Alia inter ad compescendum motum illum, uti ipsi putabatur præternaturalem, alio & angulo menie quadrata violentè impaſto ventree aliquandiu illam detinebant, donec nimirum lassatus ac debilitatus hac violentiâ fortis aliquantisper à motu cessaret, aliis homi, aut in lectum prostratis utroque genu incumbentes, alvum deprimebant, ut colicam illam extorçantem cohiberent, sed & hæc omnia irritis effectum. Unde suffraganti Medicorum illozam consilio Berolinum eam deducebant, atque illic celeberrimos Medicorum antesignanos in consiliū ascisciebant, qui sinistè relatione, Patientis, Mariti & parentum dementari aliquoties illam purgabant, & quidem satis largiter & copiosè & cum virium non exiguâ jacturâ, cet. nisi omnis fallor, venam secuturæ, ac sanguinis insignem copiam profuderant, præter omnem necessitatem in subiecto gracili ac nil minis quàm plethorico. Sed & hoc abique omni, quem intendebant & sperabant fructu; Reverti itaque, post exactum illic fœdè rimelleſſe spatium, domum coacti, rursufcente jam magisq. utro, ac tempore parvis paulatim appropinquante, non intermiſſâ tamen interea solici, quam

ante narraui tragediâ & toturâ, me rufus vocabant, spe forte mutandæ à me sententiæ, sed manifestioribus jam in illâ confirmans indicis, colicam illam brevi vitalem fore prædicebam, idèque denud cum indignatione demitor. Biduo vix elapſo, moruq. validiùs quàm ante continuante & perſeverante, Matrōna quædam è vicinâ, honesta, ac Lucinæ Myſteris satis imbuta, Conſulis cuſpidem vidua, invitatur, ut suum & illa de Colicâ illâ molestâ ſententiā ferret, hæc re prudentes expensâ, ſeruatim quoque ipsis Naturæ adytis, obſtetricem quantocius advocandam indicat, peticulum & quidem summum tam matri quàm infanti in morâ eſſe, indignatur & contradicunt & huic adhoc ſtupidi; Illa verò ſetis tam marium quàm patentes affata terminis, nîi matris & totius veline ſeti homicidæ, è reliſſio obſtetricem accerſiant, ad ſingula enim momenta partum imminere: Hac igitur cœſimè accurrente, vix dimidiis quadrantis horæ ſpatio præterlapſo, vivum ac vitalem ſatis grandem factum, nîl remoraſibus omnibus illis obſectis valde violentia ac peticulosis obſectis & obſectis enixa eſt. Maniſſimo exemplo Deum vix noſtræ ut Authorem, ſic fœdus in utero materno Conſervatum eſſe Omnipotentem, quem ſervatum velle ac vitalem, hunc contra nulla valere etiam violentiſſima mortalium machinamenta.

FOMENTATIO.

De ejus variis ſpeciebus, & applicandi ratione, conſulti poſſit Bibliotheca oſſia Pharmacutica.

FONTICULI.

De Fonticulis ſic ſcribit Hieronim. Fabricius ab Aquapendente.

Fonticuli vulgò appellati, ſunt parva ulcera dedita operâ facta, ad morbos, qui infeſtant, aut infeſtati ſunt tum curandos, tum cavendos, id quod præſtant tum evacuatione, tum reſiſſione, tum derivatione humorum, qui in corpore tu, evacui ſunt. Morbi autem quos præcavent, aut curant fonticuli, longi ſunt, non breves & acui; ratio eſt, quia cum evacuatione humorum id præſtant, quæ omnino exigua ab exiguo ulcere procedit, id. o ſenſim & ſpatio temporis commodum præſtant, quæ neque in phrenitide, neque in acutis febribus, neque to aliis, & repentinis morbis ſunt, ſed in chronicis tantum, tum qui ex abundantia ſup. evacuatorum humorum, tum maxime ex fluxione ſunt.

Conferunt autem primò evacuatione, quæ eſt exigua eſt, & ſenſim facta, quia tamen continua eſt, & continuo tempore fit, idè progreſſa temporis tantum juvat, quantum quævis alia evacuatio; quod aliz per longa ſine intervalla, hæc continue evacuat, & corpus ſanum conſervet. Ideoque Sicilorum pletique, etiamſi ſani ſint, ſibi tamen ſeti fonticulum volunt, ut ſani conſerventur. Preſter quam cauſam, cum in omni corporis parte ſeti poſſit fonticulus, ad humores tantum ab univerſo corpore evacuandos, ut pluriſimum tamen non ſit; propterea quod non ſolùm in genere evacuandi cauſa, ſed etiam reſiſſendi, & derivandi adminiſtrant, ratio è his elicitur, nam cum humores in corpore ſupervacui alii quæſi ſint, alii in fluxu, & motu cum fonticuli ſint, & evacuationis, & reſiſſionis,

ac derivacionis causâ, necesse non promiscue in omni corporis parte, sed potissimum aut ubi quiescent, & fluxerunt humores, ut in parte affectâ; ad eos solunt evacuandos; aut cum in fluxu sunt, & revulsionis, ac derivacionis causâ, ut in contraria parte, aut vicina, nonnuquam etiam interceptendæ fluxionis fonticuli fiunt, videlicet in parte, ante proflupsum ad partem affectam. Veruntamen potissimum usus invaluit, in contraria parte, fluxione laborante administrantur; propter quam causam fit interdum in occipitio, ad revellendos ab oculis fluxiones, anectius, retro; interdum in furca coronali, ad terrahendos humores, qui intrus sunt, extra; in brachiis, ad revellendos humores, qui à capite descendunt in fauces, laryngem, & pectus; sic in cruribus, ad tenes, hæmæ, uterum, & alia id genus membra juvanda, & humores tum derivandos, tum revellendos. Servatur quoque rectitudo partis affectæ, aut mitemis, ideoque in liene obdurato, in sinistro crure, in jecore affecto, in dextro patitur; sic sinistra capitis parte dolente, aut aliter affecta, in sinistro brachio; dextera verò, in dextro; quæ omnes sunt probæ revulsionis conditiones, ut si ante fonticuli, & in parte contraria, & è dextro. Quia verò distum est, fonticulos derivacionis causâ fieri, idem aurius affectis, non incommo- dum est in occipitio fonticulum parare. Fonticulum ergo felici successu in eadem parte fluxione laborante, tum ad evacuationem, tum ad intercepti- dum humorem indolentem, ante decubiti- um ad partem affectam, paramus, potissi- mum, cum humor fluens crassissimus est; unde in fene, in tibia valde tumida, & ulce- re affecta, factio fonticulo supra genu, in co- xa, sanatus est; quod humor propter sui crassi- tiam, & signitatem quæ revelli ad alterum crur possit, neque interea itahi ulterius ad locum affectum. Ultimo fonticulum aliquando, non qui- dem paravi, sed reliqui in parte affecta, aut ulcere, aut fistula, quæ esset distuma, & pro- pmodum incurabilis, ut in fistula præterni, aut ulcere, cum osse corrupto, spatio enim tem- poris locus sanatus est, tota materia noxia eva- cuata. Itaque consuevit fonticuli in genere, & perpetuo, evacuatione; speciatim verò evacuatio- ne, & revulsionem, evacuationem, & deriva- tione, evacuationem, & interceptionem; denique sola duatatur evacuationem. Sed hoc adhuc non est satis ad fonticulum recte parandum; sed cum hi fonticuli sint olceta, quæ indigent custodia, & desecione, ut plurimum bis in die, matu- tino scilicet, & vespertino tempore, propterea consuevit ipsos parare, potissimum quæ manus possunt commodè attingere, & oculi prospice- re; propterea non in dorso, non in pede, sed in brachiis tantum, ut plurimum, & cruri- bus fieri solent, hoc est, vel supra cubitum, vel paulo supra, aut infra genu.

Quia verò humores supervacui, quos aut eva- cuant, aut revellunt, aut derivant fonticuli, in duobus locis consistant, vel in vasis, vel extra vasis; ut plurimum autem consistunt, humores supervacui in vasis, aut magnis, aut minoribus, aut minimis, præcipue ubi tumor in aliqua parte non est, propterea bonus fonticulus exigit, ut sit propè vasa, quæ quæ majora sunt, eo mel- lior est. Ex quibus colligo, quod cum fonticuli sint tum in brachiis, tum in cruribus, non tamen promiscue in omni parte crurum aut brachiorum

parandi sunt, sed ne paucis comprehendam, ubi & venæ majores sunt, aut propagines earum; & ubi commodè à manibus regi, & mandati possunt; in venis, inquam, hoc est, propè ipsas, non supra venarum corpus.

Rursum altera conditio boni fonticuli est, ut cum brachia, & crura sint ad motum destinata, hæc verò sint olceta, quæ cutem præterant, & in musculos descendunt; & cum distici ea apertâ detinere oporteat, quod pila, aut ex ceta, aut pila, aut ex hedera tadice fiat, hæc cor- pora sapienter sua duritie musculos compri- munt, & motum, propter dolorem impediunt; ideo requirunt hæc conditio, ut locus seu spa- rium, seu interstitium inter musculos eligatur, nequaquam in corpore musculi, & ejus carnosâ parte, multo minus in nervo, & tendine, quâ conditioe deficiente, multi coacti fuerunt clau- dere tum lachos fonticulos; confecti etiam efficerent fonticulum in interstitio musculorum, ut humo- res, qui in spatis sunt, facilius evacuantur quod sunt interstitium, in brachio quidem, ex cubi- ti valida rum fluxione, tum extensione; in crure autem ex gyno, si supra, si verò infra fon- ticulus sit, ex pedis similiter tum flexione, tum extensione exploratur; interea apice indicis digiti in musculorum interstitio compresso; in brachio qui- dem, inter deltoidea musculum, & superiorem cubitum flectentem; in crure verò, ubi interstitium digito coarpiunt, ut in fovea. Ultima conditio est, ut cum deligare locum fonticuli oporteat, quo pila seu globulus detineatur, ideo necessarius est locus, ubi deligatur commodè consi- stat, neque decidat, ideoque vitamus omnes loci declivitatem; quo fit, ut in declivitate mus- culi deltoidei non detineatur fonticulus; sic su- pra genu. Itaque ut summam omnes boni fon- ticuli conditiones referamus, fieri debent ut plu- rimum in partibus oppositis partibus affectis, in- terdum in vicinis; nonnumquam in parte affectâ, & hoc dupliciter, vel paulo supra, vel in ipsamet parte affectâ, tum in his, quas oculi, & manus possunt prospicere, attingere, & mundare; tum prope venas majores, tum in interstitio musculorum, ubi deligatur contineri possit.

Propterea usus invaluit, ut fiant in brachiis, & cruribus fonticuli; & ut judicium faciat de ex- tra, & congruo loco, in brachio fieri consue- runt quatuor loci; vel posteriùs ad fines del- toidei musculi, vel in medio; vel anteriori; vel inferiori; atque olim ab omnibus fiebant aut in medio, aut posteriùs, aut in fine. Ego autem locum anteriorem elegi, & subtilit, quod alia loca opportuna non sint, ut ex conditioni- bus deficientibus patet, una tamen primò in om- nibus spectatur contrarietas; nam si posteriùs, des- sunt tres conditiones, prima, quod ligatura, & fascia non consistit, sed decidit; secunda, quia propè venas non est; tertia, quia aspicit oculis, & manibus mandati non potest; si verò fiat in medio musculi corpore, nota non caret, quia non in interstitio musculorum fit, neque propè venas, neque fascia consistit, quod si in fine musculi deltoidei fiat, dila detineti non potest; quod propter pilæ gravitatem deorsum excutatur, & supra musculos veniat, ac tendines, quos cum dolore comprimatur, & ita detineri non possit, quod si anteriori fiat, uti ego soleo, inter deltoidea, & alium, qui cubitum flectit, & vulgo vocatur, *st. Pscheyre*, hic exactus est fonticuli locus; quod videri, & attingi possit, quod inter musculos,

quod propè venam cephalicam fiat, & deligatura permaneat.

In cruce autem efficit fonticuli consueverunt tum infra, tum supra genu, tum extra, tum intra; si extra fiant, deest una conditio, quia non habet venas vicinas; in interna verò habet saphenam. Igitur melius est ut fiant in interna aut coxa, aut tibia, ea scilicet parte, quæ deligari potest, & deligatio contineri; nam nimis supra genu, declivitatem regio habet; si nimis deorsum, articulo, & tendinibus nimis vicinus locus est; præterea interna pars non habet larum tendinem; quam vitare oportet, alioquin graves inflammationes superveniunt. In mulieribus live supra, five infra genu fiant, perpetuò propter uterum, & menses intus parabuntur. Atque hæc de loco.

Fiant fonticuli vel caustico medicamento, vel ferro. Superiorem ætate, ferè omnes fonticuli caustico parabantur; sed experientia, tandem docuit, causticum non esse tutum, quod non solum mala qualitate præditum est, sed etiam quòd sepe magis comburatur, quàm est partis spatium, ut non raro vis ejus pertingat ad musculos, tendines, & nervos, ob quam causam, excitati sunt dolores, & inflammationes, inde gangræna, & sphaceli, & magna ulcera, ita ut nonnullis fuerit opus crus excindere totum; nonnulli quoque ex ea re interierint; quæ omnia hic Paravi contigisse. Propter has causas, usus jam diu invaluit, ut ferramento candente fiant, sed nonnulli sunt, qui ferramentum ægnum adeo formidant, ut nollint illud admittere, & caustico uti necesse sit; cupis oportet primò vires habere perspectas; inde in loco opportuno poni, cavetque ne spargatur, & majus ulcus quàm oporteat pareatur; quod sit operculo glandis supra posito. Sunt qui oleo de sulphure, aut de vitriolo, intincto in eo specilli mucrone, specilloque convoluto, supra cutem fonticulum excutiant. Sed quomodocunque caustico fonticulus pareatur, nonquam postea butyrum apponatis, quod sub caustico potest facit, & gangrænam excitat, cum etiam ubi in hydrope in crinibus fonticuli sunt, à butyro omnino abstinendum, sed solum diapalma utendum, & vino.

Sed potior, ac tutior modus est, qui ferramentis procedit; quæ duplicia sunt, alia candentia, alia incidentia. Sunt qui incidentia usurpant, duplicando eum, & ita incidendo, & pilam statim imponendo, sed ne dolor excutitur, dum inciditur, ego paravi duas ferreas laminas; quæ in medio scissuram habent. elevatus cutis, & duplicatur, & inter duas laminas, stringitur cutis, ut sensus ferè obstupescat, tum scalpello ad scissuram inciditur, & ita fit fonticulus per incisionem. Sed cum minori molestia fit fonticulus cum ferramenti candentibus, quàm incidentibus; quia incidendo dolor excitatur, & inflammatio, ferramenta autem varia sunt; nam tria quidem habentur, quæ tamen ad duo reducuntur; etenim ex duobus sibi ipsis similibus, alterum nota interdum non caret; quod patet circumstantes sub eo vim ignis perferant, dum ex compressione circuncircæ atrolluntur, & incallescunt; quod tamen sub altero non succedit. Itaque duo sunt instrumenta, quæ commodè usurpantur. In horum usu, quod præcavere oportet, ne scilicet vis ignis, & dolor perferantur, aut certe quàm paucissimè contingat. Præterea ne ignem ferramentum videatur; nam propter hæc duo multi formidant ferramentum ignitum, & propter dolorem, propter aspectum ignis. Tria enim sunt

incommoda, quæ molestant hominem, cui fonticulus innitur, calor, dolor & ignis aspectus. Ad hæc tria vitanda ars primò exigitavit laminam ferream, laram, & crassiam, in cujus medio fit foramen, ejus latitudinis, ut admittat cannulam instrumenti, quod finitæ manu derivetur, & comprimitur; quæ lamina, inferna parte, quæ corpori applicatur, circulum habet cum supercillio tenui, & quadratenus acuto, quæ ponatur supra locum fonticuli signatum atramento. Hæc lamina primò refrigerat partem circumstantem, & consequenter calorem ferramenti candentis; inde dolorem mitigat, obstupesciendo ipsam; quod facit tum frigiditate, tum compressione marginis acuti circuli; cui postea circulo, si supponatur instrumentum, quod ignem abscondit, erit abundè satisfactum tribus incommodis jam relatis; habetur enim instrumentum, quod aspectum ignis tollit, quod candens ferramentum intussum, & oculatum habet, in tubulo, aut ligneo, aut ossio, aut argenteo, quod altero extremo orbiculare foramen habet, parci apponendum; ex altero verò, operculum candentis ferro conjungitur, quod deorsum comprimitur.

Modus utendi est, ut ferramento candente cutem utram, & ipsam tantum attingamus, & leniter comprimamus. Neque in omnibus par comprimendi modus requiritur, sed variat, pro cutis varietate, videlicet mollitie, & duritie, tenuitate, & crassitie. Ideoque in puero minus, in adulto magis, in senè adhuc magis; item in brachio, ubi mollior, & tenuior cutis est, minus; in crute, ubi durior, & crassior, magis comprimendum ferrum est. Item variat, prout pars utenda integra est, aut allecta; propter quam causam in hydrope, & crinibus aqua tumensibus, vis attingitur cutis, & à butyro abstinetur. Item in cachymio corpore, aut cruce fluxione laborante, melius adigitur ferrum, & butyrum non apponitur; sed diapalma, & lineum vino nigro austero expressum usurpatur.

Combusto loco, si qui velis fonticulum parare, sine ullo dolore, & sine ulla locali alteratione, seu irritatione, quæ interdum causa est, ut fonticuli molestè gesserint, non est festinandum globulum præprepre imponere, sed cerea primum pila tunc imponenda est, cum crusta nigra, & alba decidit, & caro rubra, bonaque apparet, quæ omnino sit experta tum doloris, tum inflammationis, & laborum, & partium circumstantium, tunc enim ceream primò pilam parvam apponete; & supra, duriculum pulvinar, ex linteo factum, fascia angusta adstringere, & comprimere oportet, quousque descendat in profundum, & sedem congruam sibi patet; quo tempore jam hederæ folium, non rotundum, sed fissum, & inter duo lineola avertim ponere supra fonticulum oportet, & quotidie mundare. Sed quæ oratio post facto fonticulo conveniat, scilicet mea multis jam ante annos facta dilucide explicat.

Hic de Fonticuli ab Aquapendente accuratissime traditis subiungamus jam ea quæ rursus in hoc ipso argumentum habet diligentiss. Anatomicus, Antonius Nuck, in suis Experimentis Chirurgicis.

Fonticulū in Sutura Coronali.

Hæc Operatio Italici magis, quàm Nostratibus familiaris est, eamque in Oculorum affectibus, Ophthalmia, Guna Serena, Cathartis, Asthmate, Insulsiis, Epilepticis,

Epileptici, aliisque frequenter insiliunt, cetero si bi periculantes, noxios humores in Capite collectos, ad inferiores corporis partes descensum minitantes, hac vi commode expirari possunt.

Verum enim vero, pace florum statuimus humores noxios, Fonticuli beneficio e corpore eliminandos, non speciatim in Capite colligi, ibidemque solummodo hospitari, sed universis sanguinæ massæ permixtos, ope circularis ejusdem morbi per totum corpus oberrare, ac ubique obicem inveniant pedem hgere, variasque morbosum species producere. Si itaq; in itinere suo circulariter ad Fonticulum appellunt, ibidemque potius figuræ suæ proportionatos inveniunt, eos subingrediendo à reliqua sanguinis massâ separantur. Quam separationem prolixius explicatam videre licet apud *J. Astruc* in *Praxi Chirurg. Rat. De usu Fonticul.*, ejusque operandi ratione.

Sequenti autem modo locum Fonticulo huic conveniunt certo inveniri posse. Veteres contendunt: Abrasis nimium verticis capillis solum ducunt à natis ad verticem, deinde aliud à mediâ auris ad mediam oppositi lateris autem extendunt. Ubi verò hæc fila se mutuo interfecant, ibi foramen cuti imitandum videtur.

Ast per fila tali modo ducta veras sepe locus non assignantur; Coronalis liquidem Sutura non in omnibus craniis in uno, eodemque, semper repetitur loco, sed in aliis versus verticem elatior in aliis versus frontem declivior non raro conspicitur, quemadmodum diversorum cranium frequens inspectio ad oculum demonstrabit.

Verum locus iste digito melius, quam ullo instrumento explorari poterit: In quovis enim fere subiecto Coronalis Sutura inæqualitate quadam & protuberantiâ leviori se præstet; In nonnullis verò depressa quodammodo sentitur. Unicum proinde filum à nato ad verticem ducendum, quod digito pressum Sutura Coronalis oram, quâ Sagittalem tangit, manifestissime notabit.

Quoniam autem materia, quam Fonticulus hic plorat non ex cerebro, nostro quidem iudicio, sed ex paribus cranium ambiculis proficiscitur, uno eodemque recidet, sive supra, sive infra Suturam Coronalem, sive in eodem cautissimo applicetur.

Facili itaque negotio Operario hæc sequenti instituitur modo: Innotat loco quodam notato profundum satis foramen cautissimo quodam acuto, ab *Aquapendente* invento, à *Scuteno*, aliisque, præmissis à *Joh. van Mekeren* in Observationibus Chirurgicis distinctè admodum delineato. Postea effluat leparario promoveatur *Ung. Basil. Ruys.* recent. & similib. vel.

U. Unguent. Popul. ʒij

Sapon. Nigr. ʒj.

M.

U. Axung. Porc.

Ruys. ʒss.

Sapon. Nigr. aa ʒijss.

M.

Remota tandem Unguenti beneficio effluat, quod ut plurimum tertio quatuorve die observari solet, pilum, globulæve ex *Hedera arborescenti*, *Coris bovine*, *Aristol.*, *Gemina*, *trid. Flor.* & c. confectus cavitati indatur, ut locus apertus sitretur, potius nescienti patientes maneant. Deniq; (superimpolito jam Emplastro) fasciâ quadam *Cancer* dictâ, vel strophilioto deligato instituitur.

De Setaceo, è Fonticulorum Classe.

Praeter Fonticulum in Sutura Coronali excitatum, occurrit aliud Fonticuli genus, *Setaceum* dictum (quia

per foramina nuchæ infidela filum ex fetis contortis olim ducebatur) evacuationis gratia à Veteribus institutum. Hinc in nonnullis Capitis morbis, quibusdam Oculorum aëctibus, dolore Dentium, Obstructionibus, Animiata &c. magnæ utilitatis fuit habitum.

Et licet inter Neotericos non desiant, qui Fonticulum etiam hunc ut minoris momenti æ Medicinæ eliminandum volunt: multiplices tamen constat experientie magnam præter expectationem post alia incalum terata remedia) exiit ægros peticipisse levamen.

Est autem *Setaceum* nihil aliud præter ulcusculum, in nucha inter primam & secundam, secundam & tertiam & quartam vertebra excitatum, ex quo indica materia quædam lenta excretitur.

Hanc Operationem instituendi modus occurrit varius. Veteres magno cum apparatu stringebant cutem *Forcipe alata* ab utraq; parte foramen habente, per quod acus, interdum ignita, interdum non ignita, pro vario Medici scopo transmebatur, unâ cum funiculo è fetis equinis parato.

Nos verò simpliciori, commodiori, & patienti minus doctissimo methodo utentes, sequenti modo procedendum censuimus. Capite dorsum versus paulisper reflexo, abalique (si opus sit) capillis locum postea pertendendus atramento tali modo notetur, ut puncta notata non ultra pollicis latitudinem à se invicem distent; mox cutis duplicata alterâ Ministri; alterâ Chirurgi manu elevetur, & cuspidè acutâ ab anteriori parte parum incurvata, à posteriori rotunda ligulæque linea, vel serico non contorto (*Belgicè Ulsyde*) instrudæ perforetur, solumque ea pars, quæ sub cute latere debet, *Olæ Rosæ*, *Ung. Basil.* aliove digesto inungitur, ac sæpius horum votorum trahendo moveatur.

Alii *Lancetâ* cuspidè robustiori donatâ cutim elevatam petiunt.

Hicce ita peractis plumæcolum planum utrique foramini applicetur: dein *Emplastrum glutinosum*, duobus foraminibus pro fili extrusionibus transmissis donatum, imponatur, filumq; laxè ibidem confixum linguatâ, vel circa collum ducatur, ne ulceris latera dilacerentur, quæ denique compressâ impostæ fasciæ ope alligetur.

Si verò, ut non raro contingit, hocce Fonticuli genus patienti nimis sit molestum, simplex tantum hac in parte excitetur Fonticulus, solâ cutis incisione, globulâ cetæ aliorumque applicatione; quemadmodum Operatione sequenti sumus demonstratum.

De Fonticulâ in Artibus excitandâ.

Propositis Sutura Coronalis & Nuchæ Fonticulis; examini veniant illi, qui in frequentiori usu sunt & in artibus excitantur, quique ad varios capitis morbos tam internos, quam externos, infantum & puerorum motus Convulsivos, Ophthalmiam, Tumores Strumosos, Cephalalgias, Affectus Soporosos, Vertiginosos & Spasmodicos sæpius & cum successu in usum vocantur.

Excitantor istiusmodi Fonticuli in *Arabis* inter musciculum Deltoidem & Bicipitem. In *Femore* intertâ supra genâ ad tritum quatuorve circiter digitorum transversorum distantiam (si à genâ ipso mensurare incipias) inter Valtum internum & Sattorium musciculum. Id *Pedis pars superior* ad digitorum tritum quatuorve latitudinem infra genâ circa marginem Solci, vel inter Soleum & Gastrocnemium.

Parantur autem vel *Cauterio potentiali*, vel *Inscissum*; Cauterorum potentialium descriptiones passim extant apud

apud Anthores Chirurgo. Si cui verò simplex aliquod ardeat, quod tamen profundè satis & minori quidem cum molestia, quàm quæ magno cum apparatu præponuntur, partes corrodit, utatur Cauterio ex *Calce viva* & *Singulate Hollandicæ* parato.

Admittendum etiam *Cauterium Barbettianum*, quod sequitur, præstat usum.

℞. Sulph. Crud.

Arsen. alb.

Antimon. crud. aa ʒij.

Sulphuri lentò igne separatim liquefacto, & Spatulâ agitato addè Arsenicum, & Antimonium pulverificatum, quæ tandem agitando misceantur, donec cum Sulphure uniantur & rubescant. Dein

℞. Hujus Mixtur. ʒij.

Cap. mort. Pariet. ʒij.

M. F. Pulv. aliquoties Sp. Vin. lavandus & sic candus.

Hoc medicamentum non tantum ad Fonticulos excitandos, sed & in mali moris ulceribus, imò Cancrosis, carniculæ excrecentiis singularem sepius habet utilitatem.

Cui itaque *Cauterium potentiale* applicare placeat, Emplastrum in medio foramine donatum, parti apponatur, foramini dein pattem caustici admoveat, camque pulvillo, aliòve Emplastro tegat, tum tribus, quatuor aut quinque horis effusus emplastrum removeat, & escharæ, *Emplastrum Diapalm.* singulis diebus his, donec sepatatio perfecta fuerit, applicet.

Nos verò incisionem, curam videlicet manu elevando, & forcipe vel phlebotomo discissando præferimus.

Escharâ interim separatâ, vel factâ per incisionem Fonticulo, globuli ex plumaceolo formati, medicamentisque detergentibus innuncti, ulcers sunt apponendi, ulque dum satis excavatum fuerit. Cavitate itaque satis magnâ existente, *Globulus cereus*, *lignæ* aut *argenteus*, vel *psim* eidem imponendum, quod sæpius novo substituto auferendum: Hocque tandem continuandum ulque dum vel morbus curatus, vel virum debilitas ulceris pergere prohibuerint.

Notandum interitum dari patientes qui à Fonticulis excusari possunt ac debent: Illi nimirum in quibus hi Fonticulorum rivuli aut nimis aut nimis quàm par est excludunt, & quibus intolerabiles dolores excitant.

Quomodo inflammationes, vicinarum partium excisiones, ulcuscula, excrecentiæ carnosæ, aliæque Fonticulis nonnumquam supervenientia mala, tractari debeant, de his inter alios præpæmissis consule *Psyllismum*.

Quæritur denique an *Fonticuli ad sterilitatem disponent*? Resp. si gravidæ nihil à Fonticulis levaminis sentiant atque emaciantur, omittendis eos censemus. Si verò materia viscosa quotidie excrevit, concipere non possumus, cui Fontanellæ in his nocerent, quum tamen experientia nonnumquam contrarium monstravet.

De Fonticulis frustraneis, & salutaribus.

Clariss. Samuelis Ledebii, Miscell. Curios. Decur. iii. Ann. 1.

Ordinabam virgini nobili, in districtu Granbergensi, fonticulum ad brachium; apertum tenebar per annum & ultra, nec ullam sententiam affectus, ob quem adhibebamus, remissionem, idèò demum clauderebam abique periculo. Feemina alia, in loco consueto supra genu ob mala uterina gestabat fonticulum, me ordi-

nante, nec hic scopum attingi quem propuleram. Pastor scorbuticus & lincosus in viciis Marchia portabat geninam fontanellam in brachio & pede per plures annos, & quia absque juvenamine servabat, idèò sanabamus. Panthico Granbergensi, ob ulcus pedis instruebam fonticulum aulque euphoris. Idque quotidianam ferè est in foro Medico, ut quod huic prodest, secundo aut tertio nil emolumentum conferat. Hoc ipsum commovit plures ut penitus è campo Medico telegare ausi fuerint, generosum hocce Chirurgicum remedium. Non autem tam rigorosè hic opus est & tentat: Pluribus, si non proficere fonticuli, plures etiam enumerare possemus qui singulari cum levamine alie. Quem corripuerat Apoplexia Nobil, adhibito fonticulo, optimè habuit, & per plures annos supervixit: sponte autem exlicato fonticulo, Apoplexiâ obiit. Alius asthma serolo corripens, singulari cum emolumento per plures annos sanctè in brachio & pede servabat Iussinus alios non tango. Quemadmodum cum plurimis se res habet medicinalibus, ut Ionic laudabilia existant, & salutaria, alteri haud quaquam: & ita & hic esse deprehendes. Occurrit singularis valorum corporis constitutio, quæ in hoc & illo subiecto se exerit, in aliis non; applicatio quoque in causa esse poterit, ad imperitiam manu administrata, ut qualicumque effectum non attingamus cauterio nostro: vitiositas humorum incusanda scidem, & aliæ plures causæ, ob prædictam hic non tangenda. Lege si placet Dec. 1. Ephemerid. Curios. Anni 3. Observat. 156. ubi plures, quibus utiles fuerit fonticuli, consignatos invenies.

Fonticulorum utilitas.

Clariss. Joh. Ludovici Hannemanni, Miscell. Curios. Decur. iii. Ann. 5. & 6.

Satis mirari non possum, qui sit, quod & generosissima præfida artis Medicæ, quæ gravissimos morbos humani corporis curant, etiam lato calumnie subaceant, ut molit ea protinus è Republicâ medicâ eliminare & proicere velint, ac si protius inutilia humanoque genti damno forent, id genus sunt *vena scilla*, *pergamenta*, *effluvia*, *fonticuli*, *sestera* etc. Cum autem, si Medicorum Observationes consulimus, docemur eorum opè & tempestivâ illorum administratione gravissimos morbos fuisse curatos, si scire quid evenit, illud virum non ipsis præfidiis, sed prædictorum illorum abusus tribuendum est. Medicorum ergo ego, pro istorum medicamentorum autoritate & dignitate pugnare. Ego jam aliquot exemplis & historis hæcenus dignitatem fonticulorum coramdemque utilitatem asserui, aliâ alia descendenda summat. Fonticuli utilitati ascendendæ, ejusdemque commodo, quod in morbis curandis affert, commemorando, potè meum dicabo laborem. Quidam Generosissimus Dominus oculo rum laborabat caligine, capitis imbecillitate, ad hoc malum curandum fonticulum in brachio inni suo passus est, dicto facto evanuit malum. Curat ergo rursus fonticulum oculi. Quid sit? Rectroscit malum cum aliqua vertigine & pectotis angustia; patitur hoc malum per aliquod temporis spatium, tandem incidit in rursus cum gravissimo asthmate. Curat ergo rursus emunctorium artificiale fieri in brachio, experitur rursus magnum emolumentum, malo curato, postea rursus claudi fecit. Quid sit? post ejusmodi clausuram fontanellæ, rursus respiratio fit angustior, & rursus procul dubio incidisset in periculosissimum asthma, metuentes autem illud, rursus fontanella in brachio aperta est, quæ ipsi jam

jum valde prodest. Sic hic Generosiss. Dominus satis hoc exemplo expetitus est, quem usum & effectum haberi fontanella in curandis humani corporis morbiis, & quod fontanellâ oclusâ, materia peccans sese in pectus infundat. Minime itaque Excellenss. Alexelli opinio, (quem autorem cæterum ob curam Magneticam cuius & ego defensor sum, magni æstimo) complectenda, quam foret in sua magnetica Medicina. l. II. c. 4. p. 128. &c. Quem locum quoque citat Excellenss. Spleiffus in suis aureis annotationibus ad Zapata Mirabilia, cap. 52. pag. 440. Sed quid dicendum est quod legatur in Fortunius Fidelis relationibus: observatumque est à primissimis viris (Vicmercas. 3. de affl. mulietum 5.) eos quifonticulis in brachiis diu apertos tenuerunt, ut multum inde humores emanaret, aut qui cervicem trajecte foveas fauciatam gerunt, & magna ex parte steriles esse, lib. 3. c. 4. p. 364. Vcium respondemus (1.) fallaciam causæ, (2.) à paracelsi ad universale non valet consequutio, (3.) è contra multi habent fonticulos in brachio apertos, qui tamen copiosâ prole gaudent. Historium hanc transcriptum è nostris phisimathicis Chiliade 2. Cent. 6. Lemmate. 92. quo publico destinavimus. Similis farinx bistortiam commemorat Nobiliss. Pons Riedlinus, in suis Lineis Medicis, Mensis Martii Lemmate XXX. p. 91. Hæc vice in Apologiam & defensionem fonticulorum sufficiant. Et ex hac mea & Nobiliss. Riedlini historia quilibet Ager & Medicus hoc capiant monitum, ne temerè ista emunctoria, quæ aliquantulum temporis sparium aperta fuisse servata & humorem excreverunt, occludant. Et quamvis interdum hæc emunctoria huic vel illi damno fuerint, non tamen propterea illorum usus tempestivus improbandus vel damnandus. Quippe nullum corpus sub sole, quod non huic vel illi damno esse queat, licet aliis plurimâ maximè utile & proficuum sit. An fonticuli sterilitatem inducant? hoc quaesitum proliè definimus in nostris phisimathicis Cent. 4. Chiliade 2. Lemmate 41.

Fonticulorum applicatio, non omni tempore sua.

Clariss. Joh. Adam Lefpichlers; Ephemerid. German. Cent. 1. & 2.

Quales Archeus, modò timore, modò horrore subitoque concussus, nec non gaudio, ac ipsâ animi tranquillitate satisfactus, tenerissimis infantium corporculis, utro adhuc inclusis, susque deque solâ consuetudinâ suspitione, blandiendo quasi invocat immaculas, vix non integra loquuntur volumina, & quotidiane testantur experientie, sic etiam lumen soli apponatur, & nocturnæ Athenæ deportantur, enarrant hunc casum, eundem tamen, ob rei veritatem reticere nolui, etique hujus historia sequens.

Prenobilis quædam femina, temperamenti phlegmatico-biliosi, ac corporis obesi, aliquantum jam proliam mater noviter impregnata, eodem, quo semper utero gerens, correpta fuit capitis dolore gravissimo, appetitum adhibuit, nullo tum temporis medicamento remediabili, quam ob rem præcipitis præmiis, usus fonticulorum proponitur, admittitur unus, & doloris requies sequitur ex hac parte, applicatus & alter, siquæ roratum exat liberatur, interim tempore debito horum partus instat, & quidem felicissima, parturie ætenui felicitæ, ac infantem summi sexus, cu-

jus nates firmiter addo cohererebant & connectebatur, ut debita partium divisio nulla, loco aut consueti verò in plano nonnulli foramen parvulum ad iustar fonticuli signatum observaretur; at observabatur tantum, siquidem hæc ipsissima recens nata jam jam hydropica & summe debilitata inventa fuit, siquæ paucas post horas, accepto fletu fonte satis cedit, & vitam cum morte commutavit, hujus maris soror, elapsis antecedentibus aliquot anis conjugii fructum & effectum percipiens, de convivio quodam splendidissimo binis milliaribus distante, ac reliquis ferculis laudatissimis, in abundantiam rerum, & limacæ apponendas fore, certior facta, eo prout & appetitu vix non explicabili elum limacum phantasiæ impedit, ut hunc unicum cibum constanter tum temporis desideraret, & cum hoc ipsum desiderium occultaret, & alibi locorum hujusmodi cibum non ad manus erat, filium debili tempore peperit, cujus membri glandem formosissima limacis figura, quo ad omnia concedoratur, & hæc ob loci ac figuræ raritatem.

FORCIPES, sæpeque varia genera.
Vid. sub Titulo, INSTRUMENTA
CHIRURGICA.

FORMICA CORROSIVA AVICENNÆ

Est Herpes exedens.

De qua vid. sub titulo

HERPES, in CUTIS VITIIS

FRACTURA.

In Fracturis explicandis adhibebimus Celeberriss. Hieronymi ab Aquapendente, Librum de Fracturis, ut & illum quem etiam in eodem argumentò conscripsit, Clariss. Joh. Munnicks, quibus subiungimus varias Observationes &c.

Hieronymi Fabricii ab Aquapendente Liber.

De Fracturis.

Cap. 1. De Definitione, causis, & signis
fracturarum.

SI Continui solutio in osse fit à causa interni, id est, ab humoribus corporis etodens ribus, dicitur Carica; de qua oos capere so. lib. 3. in ulcerum doctrina, agimus; si fit ab externa, dicitur Fractura, de qua jam agemus. Definuit autem à Paulo, c. 89. lib. 6. quod Fractura sit solutio continui in osse, à violentia quâdam extrinsecus adveniens.

Differentiæ fracturarum, secundum Galenum cap. ult. lib. 6. Moth. sumuntur à figura, à magnitudine, ab ossium fracturæ varietate. A figura, fractura est. vel recta, id est, quæ sit per longitudinem; vel transversa per latitudinem; vel obliqua, quæ è prædictis quasi componitur. Secundò fractura est magna, vel parva. Tertiò, differentiæ sumuntur à subjecta, id est, ab ipsis ossibus fractis; vel enim fractum est femur, vel humerus, vel costæ, & cætera.

fractura
fractura

Inter

Iuxta causas fracturæ, rarissima est instrumentum erodens, ut ignis actualis, rata pungens, frequens, secans, & frequentissima, tum rumpens, tum contundens.

Fractura sine vulnere existens, cognoscitur primò de cavitate, quæ percipitur, si lub, & supra fracturam pars tangatur. Secundò, si contrectetur membrum fractum, & plerumque solet efficere crepitum, seu fraxorem, in loco fracti; ob dutorum corporum mutuam attritionem. Tertio dolor vehemens adest: ob divulsionem nervorum; aut ob distortionem corporum nervosorum, aut ob puncturam eminentiæ alicujus ossis in nervoso corpore. Quartum signum est impotentia sustinendi membrum fractum, & insistenti in ipsium. Postremum signum est, si præcesserint causæ fracturarum, & simul proposita signa adsint. Hæc signa perpetuò comitantur; interdum verò etiam adest membri torquositas, & brevitas, sed non semper. Si vulnus adjunctum sit fracturæ, præter signa proposita, digito, aut specillo immisso, ruptura vel asperitas ossis persentitur, & hæc de fractura transversa. Quod si os secundum longitudinem fractum sit, primò adest membri crassities, ultra naturalem statum; deinde dolor, tum membri inæqualitas.

Quoad prælagium, fractura ossium non valet periculo; quia necessariò solutio continui sit magna; in parte quidem carnosâ, si sit vulnus; tantum vulneratur, quantum instrumentum incidens vulnerat, non ultra, at si os tumpatur, propter frigiditatem, & continuitatem, non potest frangi, nisi totum frangatur. Fractura etiam periculosa est quia sit in loco profundissimo, ad quem Chirurgi manus pervenire non potest. Aliæ etiam aliis magis sunt periculose: nam fracturæ in osse magno, difficilissimè curantur, quàm in parvo, multiplex, quàm simplex; cum vulnere, quàm sine vulnere; iuxta articulos, quàm longe ab his.

Cap. 2. De arcenda inflammatione in fracturis.

C Uratio fracturarum requirit unionem, uno autem fieri nequit, nisi hæmorrhagia præceatur, & inflammatio, secundum Celsum, cap. 26. lib. 1. Hæmorrhagia quidem in ossibus non est formidanda, ut in carnosis partibus, nisi fracturæ sint cum vulnere; ad ossa enim non feruntur insignes venæ, & arteriæ; cum in durissimo corpore calor exiguus minimam de substantia dissipare queat; inflammationem verò hic summè formidamus, & quidem magis, quàm in parte carnosâ, propter doctorem enim sit atrocior, propter imbecillitatem, multa excrementa tum recipiuntur, tum generantur, quæ à parte fracta amplius extrahi non possunt; augeret periculum, quod ossa in multa carne sepulta jacent. Prohibetur autem inflammatio, remociis causis; ut abundè in vulnere carnis simplicis, supra cap. 4. lib. 1. ostendimus.

Cap. 3. De curanda fractura transversa; sine vulnere, & primùm de coaptandis partibus ossis fracti.

A Ccedamus ad ea, quæ tantum ipsius fracturæ curationem respiciunt, & primùm agamus de fractura transversa sine vulnere. In hac fractura indubitan uno ossis, quæ non per primam inten-

tionem, sed in instantibus, sed per secundam fieri potest, intervenit scilicet calli supplantari, & fractas partes circum alligantur. Secus ergo id proponitur; primùm fracti ossis partes rectè committere; secundò, commissas fovere; tertio, paritum adjacentium saluti consulere; quartò, callo generando studere; quinto, accidentia coercere.

Ut rectè committantur partes, opus est extensione, & coaptatione; quia enim in fracturis, potissimum transactis, ossi distorquentur, rectitudo membri perditur, accidit ut quædam partes emineant, & alibi cavitates contrahantur; quoniam verò una ossis fracti pars alteri superponitur, membrum necessariò fit brevius, quia musculi perpetuò membrum trahunt vetus suum principium, quæ de causa extensio est necessaria, quæ partes fracti ossis, quæ distoræ non jacent, in aliectum agat, & eminentias in suas cavitates recondat. Ex quavis interdum membrum non videtur brevius fieri, ut si è duobus constet ossibus, & alterum tantum frangatur, vel si una pars ossis fracti non superponatur alteri, nihilominus, si proba debet fieri coaptatio, necessariò in omnibus fracturis transactis fieri debet extensio, alias enim periculum est, ne eminentiæ frangantur; si absque extensione velimus os distortum dirigere, & circum rotare, aut conficere mutuo partes ossis fracti; nam si eminentiæ frangantur, tunc vel intercidunt inter ossa coaptanda, & sic coaptationem impediunt, vel precipitant extra ossa, & excitant doctorem tum distendendo, tum pungendo partes nervosas; hæc incommoda in artem vitari possunt, in extensione autem modus est servandus. Si enim validior sit quàm requirunt, oritur dolor insignis, unde febris, & convulsiones & resolutiones, interdum etiam musculos esse divulsos Gal. scribit. Com. 1. lib. 1. de fractur. Si mitior sit extensio, quæ parat, conficabuntur invicem ossis eminentiæ, & aut frangentur, aut in proprias cavitates non recondentur; proinde ossa grandia, & musculi magni, qui membrum robustissimè trahunt vetus suum principium, validissimam postulant extensionem, talia ossa sunt, primùm femur, deinde humerus, & tibia; tertio cubitus, post quæ in summa manu, & summo pede sunt. Præterea si utraq; ossa sunt fracta, minimam extensionem postular radius in cubito, id est, os superius; quia hoc os non habet musculos, qui sursum trahant, cum moveatur pronum, & supinum. Oportet etiam observare debitam figurationem, id est, ut membrum extendatur in ea figura quæ minimum facit doctorem, quod sit si fibræ musculorum in rectum intendantur, & musculus integer in una membri parte conservetur. Puci, & qui molli sunt corporis habiui, validiorem roborant extensionem; contra, aduli, & duri. Denique perpendicularis est fracturæ tempus, si enim Chirurgus primo die adveniat, validius extendere potest: at si post primam diem, aut non debet extendere, aut mitius, propter influxos humores, & metum inflammationis, secundum Celsum cap. 10. lib. 8.

Instrumenta extensionis sunt triplicia; Primum manus Chirugi, ad debilem, seu exiguum extensionem. Secundò, funes, & habent, ad medioctrem. Tertio, organa, & machinamenta, ad validam.

Laxitas igitur instrumentis extendentibus, optima fit parum ossis coarctatio; quam factam esse, tribus signis dignoscimus; Primum, si membrum fractum sano in figura respondeat. Secundò, si tactu nulla cavitas, asperitas, vel inæqualitas in ossi fracto noveretur. Tertiò si dolor misceatur.

Cap. 4. *Quomodo partes ossis fracti unitæ servari debeant.*

Secundus fracturas curandi scopus est, ut partes coarctatæ serventur; quod fit deligatura, quæ ita fieri debet, ut & partes commissas servet, & inflammationem arcuat.

Hippocrates tribus utitur fasciis, è linteo non nimis crasso, vel tenui, ne vel premat, vel rumpatur. Primam fasciam ter obvolvitur circa fracturam; deinde sursum circumvolvitur, usque ad bonam membri partem; ita ut tres, aut quatuor, vel plures circumvolutiones faciat.

Hoc modo stabilitur fractura, dum ter linteum obvolvitur; arcenitur etiam humores, qui inflammationem facere possunt, tum iostuui, unde retinetur circa partem fractam fascia volvitur; tum qui adhuc insuunt, maxime à partibus superioribus; vasa enim inferiora, sensim in nihilum terminantur, unde fascia sursum circumvolvitur. Secundam fasciam, primam duplo longiorem, contrario modo obvolvitur; si enim prius versus dextram, hæc versus sinistram obvolvitur; ut si musculus aliquis, nimirum per primam fasciam, ad partem aliquam sit attractus, restituantur in partem coarctatam, per secundam fasciam; quæ semel circa fracturam obvolvenda est; deinde, ut exprimeantur humores influxi, deorsum est circumducenda, usque ad aliquam membri partem, factis scilicet tribus, quatuor, aut pluribus circumvolutionibus, si opus sit; postea oportet sursum redire per ipsam fracturam, & præterire, circumvolvendo etiam ipsam fracturam, quousque tandem veniam sit ad finem prioris fasciæ, ubi & secundam fasciam terminanda. hæc fasciæ, vi dixi, primò obvolvitur circa fracturam, ut humores ab hac exprimat; deinde deorsum fertur, ad detrahendum humores, qui à partibus inferiis ad fractam partem fluere possunt, seu ad debilem; & quia timor est descensus humorum à parte superiori, ob id Hippocrates non terminat fasciam deorsum, sed sursum eam circumvolvitur, ut finem habeat, ubi prius finitur. Hæc duæ fasciæ inflammationem potius arcenit, quam fracturam stabiliant; ad hanc enim plures circumvolutiones requirantur.

His factis, apponit Hippocrates circa fracturam, pannos quosdam triplicatos, aut multiplicatos, ejus longitudinis, formæ, & cujus sunt fasciæ parti obvolvatur at angustii, ut 5. 6. aut plures possint circa fracturam accommodari; innunti hi cerato modico, si enim copiosius esset, ceratum diffunderent, non autem continent, apponuntur per longitudinem, circa partem fractam tot, quot requirantur, ita ut unus digitus vel duorum spatium inter unum, & alterum intercedat. Dicuntur plagule, & splenia, à forma oblonga; suppleunt vim glutinantis medicamenti; & præterea leniunt dolorem, dum compressionem fasciarum prohibent. Tertia Hippocratis fasciæ, plagulas jam dictas firmat; initium circumvolutionis hujus fasciæ fit à fractura; deinde alterum hujus fasciæ caput sursum, alterum deorsum volvitur. Id notandum, fascias ma-

gis constringi debere in parte fracta, quam alibi, ut pars fracta magis illæta servetur ab humorum deluxu.

Celsus alium deligandi modum ponit, c. 10. lib. 8. Primum enim circa fracturam injicitur lineæ, in oleo, & vino tinctæ; deinde sic ferè circundantur fasciæ, quarum prima est brevissima, & ter circa fracturam obvolvitur, ter etiam circumvolvitur circa partem membri superiorem, altera d'â medio longior, incipit à fractura, & deorsum circumducitur, postea sursum rediit, in parte superiori ultra priorem fasciam debet desinere, et hæc sunt duæ primæ fasciæ Hippocratis. Super has latus linteum cerato oblitum est obducendum, ut priores fasciæ contineant, & ubi os eminet, semper enim membrum fractum propensionem habet ad illam partem, ad quam in ipso frangendi actu propensionem habuit, semper apponendus est pannus triplex, vel multiplex, eodem vino, & oleo madens, ei parti, quæ illi contraria est in quam membrum inclinatur. Ego interdum pannis utor, interdum stupæ, quam madefacio in vino nigro austero, si volo roborare, & arcere inflammationem; vel in ovi albumine, si fractura dolore caret, & solum stabile volumus. Celsus madefacit in vino, & oleo, potissimum rosaceo, si dolor scilicet infestatur. Latiore linteo applicato, circumvolvitur oportet quatuor reliquis fasciis, ita ut sequens semper priori sit adversa, & tertia in inferiori parte, reliquæ omnes in superiori terminum habeant.

Celsi igitur deligatio ab Hippocratis deligatione differt; nam Hippocrates tribus utitur fasciis, Celsus sex; Hippocrates utitur plagulis, quarum loco Celsus latiora lineæ usurpat; Hippocrates cerato utitur, Celsus vino, & oleo. Si dolor aliquis momenti partem infestat, Celsi deligatura magis prodest; at si dolor est vel nullus, vel exiguus, præstat deligatio Hippocratis, quæ maxime à Galeno probatur, cap. 5. lib. 6. Meth. Recentiores statim sumpta fasciæ, è duplici initio deligant fracturam, non animadvertentes, quæ Hippocrates, & Celsus scripserunt. Nos autem medicinæ principes sequemur.

Terminus adstringendi debet esse bona laborantis tolerantia, ut deligatura leviter premat, & sic tum contineat, & stabiliat fracturam; tum humores exprimat. Sunt etiam alia hujusmodi signa; quæ alio die apparent; si enim æger eo die, quo deligatus est, sentiat se valentius constringi, postea verò die torpor laxus, mollius, & parvus appareat, in mano quidem, si brachium, in pede verò, si crus fractum sit, bona est deligatio; quia jam humores à parte fracta sunt expressi; si verò aut nullus tumor, aut magnus, & durus postmodum in manu vel pede appareat, prava est deligatura; quia illa non continet; hæc verò nimis arcta est, & inflammationem movet.

Tertio die, à deligatione factas Hippocrates fasciæ, resolvit, tunc enim incipiunt laxari, quæ prima causa est, cur solvantur; altera causa est, quod frequentissime in fracturis intolerabilis pruritus infestat, ob humores, & vapores per deligationem detentos, & actiores redditos; qui pruritus terminari solet in excoriationem cum dolore, & inflammatione; & tunc solvenda fasciæ, partique pruritus infestatur, sæpe aqua tepida perfundenda, ut sic omnia evaporent; postea rursus membrum

membrum deligandum. Facta bona deligatura, & prorsus non infestante, à tertio usque ad septimum, oportet agram deligaturam detinere; septimo membrum rursus solvendum, perfundendum tepida aqua, & ligandum.

Scd hoc tempore, vice plagarum, oportet ferulas, ita Hippocrati dictas, apponere, nostro tempore, quia non habemus copiam ferularum, chirurgi uruntur laminis de ligno factis, è quo sunt vaginæ ensium vulgò assulas vocant, quas stupi obvolvunt; alii ununtur charta, seu papyro crassissima; alii ligneis frustulis, digitum crassis, uruntur. Horum usus est, non solum immobile, sed etiam rectum tenere membrum; quod optime præstant ferulæ; quæ cum laxissimæ sunt, non premunt, nec inflammationem movent; quatenus verò sunt rigidissimæ, rectum servane membrum. Assula facili incurvatur, ut & charta illa crassissima oleo præferta, aut vino madafacta; ligna autem crassiora valde premunt, & movent inflammationem. his utebatur Hippocrates, demum post septimum; quia ante septimum magis urgebat intentio arcende inflammationis, quam intentio stabilendi fracturam; post septimum autem genera accidit.

Cap. 5. *Quomodo Osis substantia salubris conservari debeat.*

TERTIVS scopus curationis fracturarum est, substantiam partis salubrem conservare; natura enim, id est, partis temperies, os unire nequit, nisi pars sit sana, quia ergo pars fracta debilis est, ut corporis excrementa ad eam facili confluant, ut etiam ob coctionem debilem multa excrementa ferreamur, & expelli nequeant, & præterea, quia in osse fracto, etiam optime coaptato, cavernulæ tamen quedam remaneant, quæ postea sanie replentur; idcirco ut partem salubrem conservemus, opus habemus medicamentis, quæ materiam influxam deducant, & influentem repellant, uno verbo, adstringentibus.

Hujus præstati materia variz sunt: nam Hippocrates utitur cerato, deinde vino nigro austero. Celsus lineis, oleo, & vino tinctis. Recentiorum quidam sumunt linteum vitæum vino nigro austero expressum; quidam stupam pexam, vino nigro austero expressam; quidam vinum, & oleum sumunt, hisque admiscunt partes portiones pulverum boli Armeni, sang. drac. myrtillorum, balaust. rosarum rub. Alii præter hos pulveres, subigunt ovi albumen, & faciunt medicamentum instar mellis crassum, imponantque supra stupam pexam, aut supra linteum. Quidam sumunt ovi albumine, & vino nigro austero, admixtis pulveribus propolis, absque linteo, aut stupam, membrum fractum circumcirca illigunt; et hæc medicamenta, propter ovi albumen, statim sicantur, & valde parti adhaerescunt. Nonnulli fascias è vino nigro austero expressas circumvolvunt, ut firmius hæreant.

Quantum ad horum usum attinet; scopi considerandi sunt, nimirum primò, accere inflammationem; secundò, substantiam partis salubrem conservare; tertio dolorem lenire. Debet

etiam perpendi, tempus anni, habitus corporis, ætas, fracturæ magnitudo. Si ergo dolor urgeat, ceratum Hippocratis supra linteum convenit; supra ceratum autem hoc, aliud linteum è vino nigro austero expressum circumponi debet, ad inflammationem arcendam. Si fiat ceratum è cera, & oleo rosaceo, vel myrtilino, leniet dolorem, ratione olei, accipit phlegmonem, & stabiliet fracturam, ratione adstrictionis. Si dolor sit exiguus, non tamen omnino despicendus, magis incumbimus in id, ut phlegmonem arceamus, & fracturam stabiliamus; unde sumimus oleum rosar. vinum, & ovi albumen, his pulvetes dictos, ad mellis crassitudinem miscemus, & cum linteo, aut stupam apponimus.

Si nullus ferè adsit dolor; tunc tonis vitibus arceamus inflammationem, & stabilimus fracturam; idèque ab oleo abstinemus. Si habitus corporis sit durus, tempus æstatis, fractura magna, ut in femore; ovi albumini miscemus pulvetes constringentes propolis, additis corticibus granatorum, gallis immaturis, succo hypocythidis, quæ stupis imponuntur; supra stupam autem imponimus linteum linteum è vino expressum; aut si non placeat tot linteis obvolvete, primam fasciam, itemque secundam è vino nigro expressimus, & circumvolvimus. Et his medicamentis substantia partis salubris conservatur; quæ omnia ante deligaturam sunt imponenda.

Deligaturæ succedit positio, seu collocatio membri, lib. 13. de illis, quæ sunt in medic. Comm. 51. 52. & 58. lib. 2. de fract. Hæc secundum Hippocratem debet esse mollis, ne premdo dolorem inferat; æqualis, ne distorqueat; forsium versus, ne humores descendat. Hinc chirurgi membrum fractum collocant in lecto, & molli stragulo; vel pulvinar è molli lana, aut pluma, parti fractæ circumligant; vel chartam crassam, chartone vulgò, in canalis modum conformant, & linteis stupam subasciunt, in cubito, & in ossibus, in quibus æger non cogitur in lecto degere; si autem in lecto decumbat, nil melius est, quam formare capsulam è tabulis ligneis tenuibus, & stupam multa, aut lana implere.

Præterea, in positione, sicut etiam in extensione, & deligatione, oportet congruam membri figuracionem considerare; quæ scilicet dolore vacat, & mæculos integros servat ex utraque parte; hæc autem est figura media, in qua, dum otiamur, singula membra continere consuevimus; ut in cubito, figura angularis; in capro recta, &c. en ammiram, quæ inter extremos cuiusque membri motus intermedia est. Hæc figura nisi observetur, exiguo post tempore membrum dolere solet.

Cap. 6. *De Callo in fracturis generando.*

QUARTVS scopus est callum generare; quod faciendum, postquam timor inflammationis recessit, plerumque circa diem septimum, secundum Galenum cap. 5. lib. Method. Ucet interdum citius hæc fiat, interdum tardius, pro magnitudine fracturæ, anni tempore, ætate, habitu corporis, ut supra etiam de simplici carnis vulnere diximus; dum enim assluxum adhuc timeamus, non possumus studere generationi calli; quia natura parvis læsa non potest callum generare.

Generaturæ

Generatur autem callus, ex ossis alimento, quod à labiis fracturæ exsudans, circum ossa fracta concrevit, & licet non sit os, ita tamen durus est, ut si membrum illud rursus frangi contingat, potius in alia parte frangatur, quam ubi callus est generis. Duo igitur hic indicantur, primum, ut congrua materia suppedietur, secundo, ut à labiis fracturæ non eluatur, aut foras evocetur.

Quod calli materiam, cibi debent esse crassi, quia visus alimentum crassum est, & simul viscidum, unde utendum otyza, frumento in aqua cocto; faræ, pedibus, ventribus, & capitis animalium, potissimum vinorum, & castoreum; dabitur etiam curis hœdi, & vervecis, crura vaccina. Vinum tunc exhibendum omnino est, idque nigrum, & crassum; debet autem victus è tenui in plenitorem mutari.

Medicamenta etiam per os dari solent, quæ ad callum generandum, & induendum faciunt; ut succus pumule veris, pluribus diebus potus; pulvis radicis agelmoniz, in vino sumptus, aut succus ejus epotus.

Localis erunt emplastica; unde in poëris, & mulieribus, paramus emplastrum è farina volatili, & ovi albumine; In adultis, apponimus hoc emplastrum; R. boli Ann. thoris, myrtæ, aloes, acaciæ, tregacanthæ, ladanii, gallarum, nucum capivi ana part. æqu. in pollinem redacta, immiscetur ovi albumini, cum modica farina volatili. Utimur etiam perfusionibus, è decocto granorum, & foliorum myrti, radicum ulmi, radicum, & foliorum fraxini; item è succo foliorum vitis albæ. Hæ perfusiones sunt, quando ligatura resolvitur, antequam emplastrum apponatur, & deligatura solvantur. Inter crura à chirurgis utuntur emplastrum Barbarum; item oxycroctum, tempore Hyemis, Veris, & Autumni, quia sunt calida; Dispalma verò, tempore æstatis. Sic ergo materiam paramus aptam ad calli generationem, tum victu, tum medicamentis.

Ne autem materia hæc, è qua callus generari debet, foras evocetur, oportet deligaturam mutare, non enim amplius pars ita deligenda est, ut humores exprimantur, sed ut perstant, & concrevant circa fracturam. non ergo eam frequenter fractura est deligenda, ut prius, sed quinto quoque die, laxiores etiam debent esse circuvolutiones; at in prioribus deligationibus non est tantum intervalli interponendum, sed videndum, quomodo callus in fractura procedat. satis ergo erit, duos dies protrahere deligaturas sequentes, & integrum prospicere oportet, num tantas, talisque callus generetur, quantus, & qualis requiritur. Quomodo autem calli minores, vel majores occurrendum, infra paulo post docebimus.

In fractura per longitudinem facta, eadem prorsus curatio adhibenda, quæ in transversa, saltem ut deligatio magis adstringatur; alias enim facile posset decidere. cap. 5. lib. 6. Method.

Cap. 7. De Symptomatibus fracturæ super-venientibus.

QVINTVS succedit scopus, nimium correctio accidentium, quæ fracturæ solent supervenire, & curationem retardare; ea verò sunt, dolor, inflammatio, pruritus, excoctio, callus iustus

major, vel minor. membri debilitas, græcitas, depravata figura, gangræna, vulnus.

Si ergo dolor infestat, leniendus est anodynis; ut lana succida, infusa in oleo, & acet. tumul mistis, & coctis; spongia ex oleo rosarum expressa, & imposita, unguento ex oleo chamæmelis; & lumbri.orum; deinde linteum vino nigro austro imbutum, & impoitur, quibus omnibus acta calidis utendum. Hippocrates utitur etiam, quod prestantissimum est, si ex oleo rosato fiat. Convenit fomentum cum spongia expt illa in aqua, in qua malva, & chamæmelum bullierint.

Inflammatio nondum orta ut præcaveri debeat, dicitur; quod si autem oborta sit, apponimus hoc medicamentum. R. rad. althææ, storum chamæmeli, violarum, ans. M. j. coctis in aqua, & coctis. adde farinæ hordei unc. iv. sap. unc. iii. olei ros. viol. ana nuc. iii. vini nigri, aut aque hordei q. s. Misce pro caraplasmate. si calor magis utatur. R. fol. violarum, balsamiflorum, planaginis, an. Manip. item, storum chamæmeli Manip. i. decoquantur in aqua, & cum oleo ros. ac chamæmel. æquis portionibus simul mistis, fiat emplastrum, in infusario sit in declinatione, utriusq. fomenti è florib. chamæmel. & beti decoctis in vino albo, item fomento è rosis, & calaminta, similiter decoctis.

Si pruritus infestat, ob detentos humores, perfundatur locus aqua calida, ut poris aperitis, statim, & vapores diffentur: aut fovantur loca spongia aqua calida imbuta, & expressa, perfusio, & tamentum maxime confectum, ex aqua natassa, quæ propter saltem, expurgat, & poros aperit.

Neglectus pruritus tetinatus solet in excoctationem dolentem, & interdum inflammatoriam, cui occurrendum est excoctantibus, & refrigerantibus. Aestate igitur, confert unguentum de cerussa, & in calore insigni, unguentum de cerussa eaphurum; si æstas sit, & corpus calidissimum, convenit unguentum populeum; item linimentum simplex diluendum, tectus; aliis temporibus, prodest unguentum è lithargyro, unguentum de minio, hæc omnia sunt refrigerantia, & siccantia; sed differunt secundum magis, & minus.

Callus interdum iustus est, vel minor, vel major. si minor, signa sunt, quod pars ad motum rediendi debilis, & si pars fracta rursus, callus aut nullus, aut exiguus sentiat. Fit autem hoc, vel quia rursus tenuis usus est victu, vel cibis aut non crassis, aut non viscidis, sed friabilibus; deinde, quia fasciæ nimis fuerunt adstrictæ. Debet ergo major reddi, per vitium pleniorum, fasciæ sunt laxandæ, medicamenta adstringentia mitiora reddenda; attrahendi etiam humores perfusionibus ex aqua calida, non admodum tamen, ne artus citius evaporent, donec pars rubefcat, & in tumentem attollatur, tunc enim deligendum; Si callus supra modum fu austus, signa sunt, quod tunc non ipse, & comprimendo musculos, parietur ut in rivos, dolorem infert. Denique pars redditur inopes ad motum, propter dolorem & compressionem. in hoc casu omnia contraria sunt faciendæ, quo ad vitium, fasciæ, &c. deinde callus molliendus, & deligendus: unde sunt emplastica è medicis à hæz, foliis malvæ, & mellis, decoctis in aqua cum ænina anatis. Antequam autem emplastrum apponatur, sunt perfusiones ex eodem decocto. Factæ emolliuione sunt postea perfusiones à aqua, in qua decocta sit betonica, scabiola, scorðium, paretina;

& eandem sunt, donec non tantum pars rubefiat, & in tumorem attollatur, verum etiam decidat, & corripatur.

Si gangrena oriat, statim initio partem debemus perfringere, & ablucere lixivio, in quo decocta sunt scordium, & plantago, deinde apponendum emplastrum, factum è farina lupinorum, pulvere scordii, & oxymelite, cum modico lixivio.

Si membrum gracile reddatur, vel remaneat, propter nimiam, fasciarum additionem, aut propter nimiam perfusionem, aut nimis moras, aut paucitatem viscosi alimenti; æger nutriendus est; deinde administrandum balneum ex aqua dulci, in qua si aliqua portio carnis decoquatur, erit melius; præterea, picatio efficienda apposita pice, supra linteam ducta, & multoties velociter ablata, ut dolor quidam exciteret, ratione adhesionis, & pilorum; quo quem dolorem alimentum attraheret, & patituratur, tandem perfusio facienda est aqua calida.

Post curatas autem fracturas, sæpe membrum in figura depravatum, & distortum manet, quoniam ossa non bene sunt coaptata, id quod fit, aut propter incircum medicum, aut propter motus ægi inordinatos; aut pravam deligaturam. Si ergo læsio membri in suis motibus non sit effatu digna, æger forte sua contentus esse debet. Si effatu digna sit membri læsio in suis operationibus, & æger sit senex, ac debilis, callus venustus, os fractum magnam; æger similiter forte sua contentus erit. At si æger sit juvenis, & robustus, callus recens, os fractum exiguum, unicum erit refugium fracturam denuo tumpere, ubi tamen prius per multos dies, quantum fieri potest, callum molire debemus, perfusionibus ex alihæa, & malvis, lulis, thermalibus D. Petri & D. Bartholomæi, vel lotura lanarum, æsypo; multæ frictiones fient, digitis æsypo inunctis; fient perfusiones ex aqua, cui incocta sint folia cicuræ, utimur etiam emplastro è foliis cicuræ, cum arungia porcina. deinde tutius os frangitur, manibus, vel digitis impellendo, seu comprimendo.

Si callus fuerit durior, frango, instrumento attrahente in diversas partes; deinde sano, ut hæcenus docui.

Cap. 8. De Curanda Fractura cum vulnere, in qua nec os nudatum est, nec aliquo ossis frustulum abscissum expectamus.

IN fractura cum vulnere, vel os nudatum est, vel non est nudatum. Præterea, vel frustulum ossis abscissum esse opinatur, vel non. Nos primum de ea agemus, in qua nec os nudatum est, nec frustulum ossis abscissum putamus. In hac satisfaciendum est & vulnere, & fracturæ scopis, idque alternatim.

Prinò enim coaptanda sunt ossa, per extensionem, ut supra docuimus in primo scopo fracturæ.

Deinde satisfaciendum secundæ, & tertie indicationi vulnerum, id est labia vulneris ad mutuum contactum adducenda, & adducta conservanda, quod fit surculis, aut fibulis.

Postea incumbimus tertio scopo fracturæ, & quatuor scopo vulneris, id est, substantiam fracturæ, & vulneratæ partis salubrem conservamus, imponendo medicamenta supra vulnus confutum, & fractu-

ram coaptatam, quæ cum dolore lulant, si adsit, cum inflammatione ardeant, id est materiam influentem repellant, inflammationem extinguant, & procul à parte expellant, qualia sunt adstringentia, & glutinatoria, de quibus supra fusi. In presentia si dolor adsit, & sit hyems, utendum est cerato picato, quod, secundum Hippocratem, dolorem lenit si æstas, cerato rosato aliis temporibus, cerato simpliciter. Si dolor non adsit, magis est incumbendum stabilizandæ fracturæ, & inflammationi accendæ, unde superponere debemus stupas peccatæ, & ovi albumine illitas; vel linteam è vino nigro, & oleo rosato expressum. Si pars omnimodò sit experta doloris, possumus etiam uti pulveribus adstringentibus supradictis, ovi albumine subacto permixtis.

Post hæc, explendus aliter scopus fracturæ, id est, deliganda est fractura, sicut supra docuimus. hæc tamen norandum, ut fasciæ sint molliores, & laxiores, quam in fractura sine vulnere, ut oras vulneris utrinque comprehendant, & sic labia vulneris constringant, non comprimant; minus etiam stringendæ sunt fasciæ, quam si vulnus non adsit, ne compressio vulnere, dolor, & phlegmone oriatur; unde Hippocrates, & Cælius, plures circumvolutiones faciunt, cum melius sit ipse circumire, quam addringere. Debet autem fasciæ tertio quoque die solvi, & semper minus comprimere, quando duræ timor inflammationis.

Ferulæ vel non apponendæ, ne vulnus comprimant, vel si apponantur, supra vulnus apponi non debent: magisque hoc in casu, multitudo fasciarum probatur, unde Cæli deligatio, quæ sit 6. fasciis, convenire videtur. Et hæc hæcenus.

Cap. 9. De Fractura cum vulnere, in qua os nudatum non est, aliquod tamen ossis frustulum abscissum expectamus.

OS recedere, seu abscedere intelligimus, quando ossis portio à reliquo ossis separatur, & foras à natura extruditur; quod fit, primum cum è veteri vulnere ossa emarcuerunt, aut atrecta sunt, & marcidia effecta; tunc enim à facultate partis expulserunt, marcidum os à probo separatur, & sic in abscisso, seu desquamato ossis; quæ etiam si sine fractura contingere potest, ut in fistulis, & verrucis ulceribus, propter multam sanie diutius cum ossis commorantem, & corrumpentem; potest etiam hæc desquamatio ossis contingere in fractura non conformata, propter multam sanie collectionem. Secundò etiam abscedere ossa, cum ob fracturæ firmetatem, aliquod ossis frustulum, aut è toto à reliquo est separatum, aut ita concassum, ut parum absit quin sit separatum.

Causæ ergo sunt, vel imperis externæ, vel ossis corruptio, aut à sanie diutius commorante, aut ab alteratione ætæ externi, quæ & ipsa ossa corrumpit, & à naturali temperamento depicit.

Signa verò, quibus os abscissum significatur, sunt plura. T. 18. lib. 3. de Fract. Primum enim sanies copiosior effluit, non respondens magnitudini vulneris; unde os corruptum, & abscissum indicat. Deinde vulnus gliscere videtur, id est ad excretionem incitat, unde labia vulneris non coherent, sed potius invetuntur, & æger in hanc rem intentus, morosam quandam tacitam in membri parte indicat.

intima sentit. Tertium signum ponitur T. 44. lib. 3. de Fract. si ossa conformatio frustrentur; enim tunc propter moram saniei os corumpitur, abcessum est ossis frustulum. Quartum signum, si os carne nudatum sit, necessarium abscedit; quia non amplius porrigi potest alimentum, cum venæ, & arteriæ non amplius ad parrem nudatam excurrant; quia etiam neri externo os exponitur, & ab hoc corumpitur. Quintum signum ponitur à Paulo c. 107. lib. 6. nam caro, quæ accrescit super labia vulneris, est laxa, hebes, vacua, spongiosa; natura enim non sanat vulnus, ubi aliquid intus habet, quod non potest decedere; ea igitur parte, ubi caro laxa est, os abscedit.

Citissima autem abscissionis signa sunt, quando citissima sit suppuratio in vulnere, & citissima, atque pulcherrima carnis excrecentia; non enim alio modo os abscedit, quam dum natura carnem in labiis ossis sani creat, quæ os superpositum suspendit, & propellit, os quidem magnam, solidum, ætate adulta, tempore hyemali, tardius abscedit, ut totus ejus circulus 60. diebus, ad medioem, laxum, senex ætate, & æstivo tempore, citius, ut 40. diebus, sic pars ossis citius abscedit, quam totus circulus.

Quantum verò ad curationem, si os necessarium omnino à reliquo ossis separatum sit, & intra vulnus incidit, ibique consistat, vellellæ est apprehendendum, & foras trahendum, si autem ossis frustulum, per tiam, undique à reliquo ossis sit separatum, in suo tamen adhuc loco delinearur, nihilominus, quoniam nunquam cum reliquo ossi glutinari potest, apprehendendum est, & extrahendum, si citra violentiam fieri potest; si abique vi magna fieri nequit, non debet extrahi; quia excitaretur dolor, inflammatio, febris, convulsio, & ulcus redideretur fistulosum; cum extracto ossi, cavitas illa sanie repleatur, quæ corrodendo, carnis generationem impedit; tunc ergo negotium hoc ipsi nature permittendum, quæ sensum carnem in labiis ulnæ, sani gignit, facitque ossa abscedere, quemadmodum in vulneribus capitis diximus.

Considerandum etiam est, num ossis frustulum abscissum sit magnum, aut parvum, quod è signis propostis ingeniosis, & remissioribus cognoscitur; si enim suppuratio tardius fiat, & multa saniei copia conspiciatur, copiosa etiam caro laxa, & hebes generetur, majus frustulum est abscissum, si contra, minus. Cautelam autem utriusque fracturæ tradit Hippocrates T. 20. & 21. L. 3. de Fractura.

Si parva est ossis portio abscissa, primò cavendum, ne pus collectum diutius moretur, intra vulnus, & os etiam bonum corrumperet; evacuandum igitur pus est, non quidem expressione fasciarum atque adstringentium, sicut in fractura sine vulnere; sic enim dolor, & inflammatio oritur, sed ita vacuandum est pus ut ipsum è vulnere fluat. Alter scopus est, ut ossa abscissionem juvenus; quod tamen negotium in ossi parvo, ipsi nature committendum est; in magno autem, medicamentis juvandum. his de causis, Hippocrates probæ deligaturam laxiorem, ac frequentiorē; ne pus intercludatur, sed facili effluere queat; ferulas non apponit, ne comprimendo dolorem exciteret; reliquum nature committit. Id notandum, licet ossis abscissio expectetur, vulnus tamen consui debere; nec enim natura sanat vulnus ea parte, qua os abscissum est; stabili etiam potest fractura fasciâ pluribus, ne supra diximus.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Si os magnum est abscissum, curatio in duobus differt à prædicta: nam & medicamenta adhibentur, & modus deligendi peculiaris. Indicationes sunt, ut pus non intercludatur, sed effluere possit, stabilior fractura, inflammatio arceatur, dolor non exciteretur, denique procuraretur citissima ossis abscissio.

Ad hæc omnia præstandum, quoad deligaturam, multæ sunt tumendæ plagulæ, & panno lino duplicato. longiores, quam ut semel membrum circumdant; nam breviores non conservarent fracturam stabilem; breviores autem, quam ut blamētrum circumdant, longiores enim non essent commode; dum membrum, propter medicamenta renovanda, resolvitur, oportet enim membrum attolli, & dimoveri, ut sic fractura contineatur, & immoto membro, laxatis ambobus capibus, ipsi sunt vulnus solvendo appareat. Latitudo plagularum, non minor est dimidio palmo, in summa, tanta, ut labia vulneris sufficienter apprehendant, circumducentur sunt è duobus initiis, ut decussim se intersecant, crucis modo; vel, ut paulo longius ab extremitatibus sele decussent, in opposita parte. Tot autem debent esse plagulæ, quot sunt necessariæ, ne ullus vacuum deret locus, & sæpe ego expertus sum, fasces esse plures ponere, quam pauciores, pro fractura stabilenda; ita tamen, ne gravando comprimant. Madefaciendæ sunt in vino nigro, austero, crasso, sic enim melius adherescunt, inflammationem arcent, substantiam parvis salubrem conservant; quibus de causis, postmodum propter phlegmonem, Gal. non tantum plagulas ita madefaciunt, sed etiam per totum diem, & noctem, viso illo partem pedunt; aut lintola, & spongia imponit in eo madefactas: ne autem vinum defluens madefaciat totum cubile, & stratum, subjicit cotium, canalis modo figuratum, quod extrum dat vino influenti.

Verùm ante admoitionem plagularum, necesse est medicamenta apponere; quæ in principio, id est, quando durat tempus inflammationis, & dolorem leniant, & inflammationem arceant; ut ceratum rosatum, laudatur etiam ceratum picatum, eo maxime tempore, quo pus conficitur; juvando enim coctionem, & faciendo suppurationem, arceat phlegmonem; quoniam suppurata materia, nihil mali evenire potest; Com. Aphor. 23. Sect. 4. Contra dolorem etiam, & immineentem convulsionem, Hipp. incidendum utitur lineolis madefactis oleo, & vino, simul mistis.

Si tempus inflammationis præterit, omni industria attendendum est, ut os recedens, citissimè foras trahatur, quod licet à natura fiat, hæc tamen medicamentis juvanda. Manifesta qualitate hoc faciunt calida; ut oleum vetus, cera citrina, sodities vasorum apertæ, ad ignem liquata, cui admiscebitur pars una euphorbiæ, duæ cithymali, tres aristolochiæ; hoc medicamentum urendum hyeme, in corporibus adultis, & duris, & laudatur etiam ab Avicenna aliis temporibus. & corporibus prodest Ammoniacum, & Bdellium, dissoluta cum oleo liliaceo. Proprietate quadam occulta, os recellum extrahit, cinis lumbicorum terræ, mellis admixtus, & impositus. Ceratum etiam factum calore ossis extrahit.

Cap. 10. De Fractura cum vulnere,
in qua os nudatum est.

O S nudatum omnino ab aeris alteratione defendendum est, ne putrefcat, & recedat; proinde si os nudatum non eminet extra vulnus, coopergendum est, non medicamentis abstergentibus, quae irritant, & dolorem excitant; nec oleosis, & mligantibus, quae sordidam reddunt vulnus, t. 47. lib. 3. de fract. sed naturali tegumento, id est cute. Labia igitur vulnervis adducenda sunt ad mutuum contactum fororis, & fibulis, deinde curatio instituenda, ut in fractura simplici, cum vulnere.

Si os nudatum extra vulnus emineat, si quidem facile in propriam cavitatem restitui possit, beneficio debet extensio, citra violentiam, urique substituendum; postea vulnus consuevendum, ut paulo ante diximus. Quod si eminentia ossis nudati, ita foras proruerit, ut sine violentia in locum suum reponi nequeat, tunc è duobus malis minus est eligendum; & os praecidendum, vel limâ, ferrâ, aut alio instrumento aliquantulum brevis reddendum; & postea coaptandum, modica facta extensione, hoc enim melius est, quàm hujusmodi ossa non coaptata relinquent; vel extensione violenta ægrum ad convulsionem, & mortem deducere. Si os retulim, & præfectum adhuc difficile coaptari queat, & meruit validam extensionem, in qua propter vulnus, multum fibres distrahuntur, & dolor insignis excitatur, ut convulsio sit expectanda, tunc Hippocrates reponit fracturam, quantum potest, & ferramenta quædam, vulgè *Scapelli* dicuntur, altero extremo latiora, & tenuiora, inter ossa fracta inponit, cum canes quosdam, & modo vectis insectit; ut sic ossa, magis quàm musculi extendantur, & reponantur.

Hallenus Aquapendens: Sequitur jam Job. Munnich de Fracturis Liber.

Cap. 1. De Fracturis in genere.

Quod in parte molli est vulnus, id in dura & ossa est *Fractura*, propriè Græcis αἰμα καὶ ῥήγμα, quæ est ossis divisio seu ruptura a causâ externa violentæ irruente. In fractura Definitione omnes fere auctores sunt concordantes, quod sit *Continuus Solvutus Osse facta*. In hoc verò differant, quod Galenus, Paulus Ægineta, & alii Græci, per Fracturam intelligant *quæcumque Unitatis suæ Continuitatis Solutionem in Osse, à re extrinsecâ violentâ factam, tam ab instrumento incidente, quàm contudente, vel rupta. At verò cum de Fracturis tantum sumus dicturi, quæ à re contudente vel rupta sunt; idem cum Guidone de Cauliaco Fracturam definimus: quod sit, *Osse Continui Solvuti absque incisione, violentè extrinsecâ à re ruptum, vel contudente vim habens facta*: vel potius dicamus, *Fracturam esse Continuitatis Ossium Solutionem, à violentiâ quâdam extrinsecâ irritante, accidentem*.*

II. Sunt autem variae Fracturarum Differentiæ, quas tradit Galenus lib. 6. *Method. Med. cap. 5.* Franguntur namque Ossâ vel simpliciter, vel cum adjuncto vulnere, extremis acuminatis fractis ossis musculis, cutemque pettorantibus. Idem contingit, cum à glande plumbea vulneratur caro, & subiectum os frangitur. Simplex Fractura tribus modis contingit: vel enim franguntur ossa transver-

sim, quæ imprimis & propriè *Fractura* dicitur. Et quidem si ita franguntur, ut nullo pacto extrema cohercant, atque e directo non jaceant; in speciem hujusmodi Fractura *transversa*, à fracti causâ similitudine appellatur. Dicitur etiam *impars* & *excentrica*, à similitudine fractæ radicis & cuniculæ. Vel franguntur ossa secundum longitudinem instar aliquis asseris; atque hoc Fracturae genus *Figura vulgo*, Galeno *γυαλντο* nuncupatur. Vel franguntur cum contritione in plures partes, & talis Fractura *εὐσχημα* *Comminutio* appellatur; quæ & *σπασθὲ* *nucatis* à quibusdam dicitur, quod sit facta in modum contularum nucis testam.

Dein à parte affecta variz penant Fracturarum Differentiæ. Alia enim est cranii fractura, alia humeri, alia brachii, alia femoris, alia alius partis. Insuper alia fractura magna est, alia parva, alia simplex, alia multiplex, alia sola, alia cum carnis contritione & vulnere, alia cum luxatione, inflammatione, gangæna, &c.

III. Causæ autem Fracturarum Internæ nullæ sunt. Externæ verò ea omnia, quæ contundunt, vel ossa tumpendi, ac dividendi vim habent: sive sit cuspis, sive ictus quidam violentus, qui sibi vi & violentiâ os transigat & comminuit, ac continuitatis solutionem, quam *Fracturam* appellamus, efficit. Facit tamen ad facilitatem ossium fracturam corundem constitutio fragilis, ut etiam leviori impactu sustinere non possit; sive ea sit naturalis, sive à carie (in primis lumbarum) venerem, ac inunctiones mercuriales subseque) acquiratur. Enim verò ex luc veneres, arthritide, aut inveterato scorbuto cariosum os, levissimâ accidentè causâ externâ, fractum fuisse aliquoties notatum est. Memorandæ & rariæ singulæ hystoriæ existant apud Maecellum Donatum de *Hist. Med. Mirabil. lib. 4. cap. 5.* Schenkium *Libr. 5. Obs. 8.* Hildanum *Cent. 2. Obs. 66. 68.* Qualem & nos observavimus in muliere scorbuto graviter affecta: cujus hystoriam asserere haud gravabo. Mulier septuagesimum septimum ætatis annum scorbuto, postquam tum brachiorum tum crurum doloribus lancinantibus ac rodentibus diu fuisset afflicta, vasculum quoddam è pavimento atrolens, mox vehementissimam in crure sinistro sensit dolorem, ob quem deponere vasculum, & proximo in loco sedere fuit coacta. Dolor hic indices augebatur, variâque ei sedando per quinque hebdomadas impossita fuerunt remedia: quæ cum nullum adferret levamen, ecce a. Junii 1688 per gradus descendens eadem in parte osium crepitum patientiebat, ab eoque momento omnis incendendi potentia cessabat. 14. Junii vocatus cum Gerardo Dompelaat, Medicinæ Doctore, & Chirurgo N. Schur, cum omnino distractum observavimus. Fracturam composuimus, & deligavimus, litreaminibus madefactis Epithemate ex æqualibus partibus *Aqua Puræ, Aeris Fuscæ, & Spiritus Vinæ*, addito tinctillo *Salsæ Coromæ*. Sed penitus emaciata quum esset Ægra, nulla succrescentis calli indicia unquam apparuerunt: quin potius, labefcentibus indices vitiis, tandem ad plures abiecit.

IV. Ad Dignoscendas Fracturas jubet Hippocrates, partem sanam cum ægra conferre, ut discernimen, si quod sit, facilius intelligatur. Nam si partis affectæ figura fuerit irregularis, upotè in loco percusso cava, & in opposito tumida, Fracturam suspicari licet. Insuper transversum vel obliquè factâ Fracturam faciliè cognoscitur, quia ossis fracti extremitates separata rectu deprehenduntur: si membrum fractum contractum ac variè dimoveatur, crepitus ac fragor in affecto loco, ob ossium mutuum collisionem, ac adhesionem, auditur; dolor vehemens adest, ob divisionem ac distortionem partium

pagium nervorum, aut ob puncturam eminentia ossis in peritæio. Adhuc Fractura femoris, tibiae, aut pedis, omnino incessum tollit, quem aliqualem, admodum licet dolorificum, luxatio concedit: Et hoc certum Signum distinguens Fracturam & Luxationem. Adhuc quoque interdum membri tortuositas, & brevitās, dum inferiorem ossis partem musculi convulsi sursum trahant, sed non semper.

Si verò fracturæ Vultus sit conjunctum, non solum dictis signis ea cognoscitur, sed etiam tactu, digito vel specillo intra vulnus immisso, quibus fractura vel ossis asperitas persentitur.

Fracturæ autem secundum longitudinem facile diffidit cognoscuntur, deprehenduntur tamen ea membri præternaturali crassitie, inæqualitate, dolore. At Communio tactu explorari facile potest; varis enim in locis os digitis cedit, exasperatur valde.

V. Ceterum Ossa fracta nunquam verè reperiuntur, & sicut caro non coalescent secundum incisas partes; sed ob osium siccitatem ac duriatē, duntaxat secundum exteriorem superficiem mediante callo, circa oras ipsorum oborto, consolidantur. Facilius autem curatur fractura ossis transversum facta, quam quæ oblique contingit, quæve inæqualitatibus prædita est; nulla neque facile committitur, & nullo tensio innituntur; carneque, interdum & nervum quoque, & tendinem vulnerat; sunt namque illæ fracturæ, in quibus capita fractorum ossium sunt reclusa, minus periculosa.

Difficilis item curatur fractura, ubi os in minuta fragmenta divisum est, quoque plura sunt fragmenta. Etiam quò fractura major, & ossa fracta majora, eò difficilior & tardius consolidatur.

In illis partibus, ubi bina sunt ossa, ut in brachio & crure, si alterum tantum frangatur, facilius fractura curatur, quam si ambo hæc fracta, cum intus muscoli contrahantur, sed ab altero ossis integro tensio servetur, atque integrum os fracto sit veluti sustentaculum. Facilius item consolidantur fracta ossa, quæ suis sedibus mota non sunt.

Ossa autem minora periculose in medio franguntur, & facilius curantur, & quò proprior fractura capiti, vel superiori, vel inferiori ossis sit, eò peior est. Celsus lib. 8. cap. 10. Enimverò & majores adfert dolores ob nervorum, tendinorumque partium læsionem, & difficilior curatur. Quæ verò fracturæ articulis spatio trium vel quatuor digitorum proximè sunt, non solum periculosa, sed & curari difficiles, cum commodè ligari nequeant, ac ut plurimum tales difficilem juncturæ motum relinquant; vix, ob callosam inter tendines, articularumque ligamenta concretentem substantiam.

In genere tamen recens fractura ad consolidationem apertissima est. Si verò tempus præteritum, curatio difficilior redditur, Arabum Princeps, Avicenna inquit; quanto scilicet fracturæ restantur, tanto peiores sunt; cum spatium illud aliena substantia repletur, & in restitutione, majore extensione egeant, magnæque extensioni sæpe spasmus seu convulsio accidit.

Quæ porro Fracturæ cum Vultore sunt conjunctæ, periculosa sunt eò periculosiores, quò majora fuerint vulnera; ac sensibiliores partes retigerint;

cum in hujusmodi fracturis dolores, inflammatio, nec gangrena supervenire solent, & letalis, alitque sublethalis uti vix queamus.

Denique de tempore consolidationis fracturæ nihil certi prædicti potest, cum id variet secundum ætatem, habitum corporis, anni tempus, ac alias circumstantias. Ut plurimum verò nati, maxilla, juguli, pectoris, scapularum ossa, costæ, ossa spinæ, tali, calcis, manus, & plantæ pedis, intra viginti, vel viginti quatuor dies consolidantur. At crurum & brachiorum intra triginta quinque & quadraginta dies, &c.

Circa tempus verò, quo ossa fracta confirmantur, ac firmo solcant obduci callo, observavit Fabricius Hildanus *Cent. 6. Obs. 63.* tibiam gravidarum fractis, quamdiu uterum gerunt, mediante callo coalescere non posse. Tota enim natura, inquit, cum circa formationem foetus occupata sit, materiam pro calli generatione destinant ad uterum mittit, & ossa fracta negligit. Cujus rei memorabile exemplum refert *Cent. 5. Obs. 87.* de matrona gravida, quæ tibiam frangerat; ubi tantas circa generationem calli habuerunt difficultates, & labores, aded etiam, ut tertio & viginti hebdomada, post contractam fracturam, movendo & circumagendo pedem, ossa contracta adhuc vacillarent. Tandem tamen, scilicet à tertio & viginti ad triginta septimam, fractura fuit confirmata. Causam autem tardioris generationis calli in foetu querendum esse judicat. Quamdiu enim in utero fuit foetus, alimentum pro calli generatione destinatum, ad sui nutritionem per vasa umbilicalia attrahisse putat.

Cap. 2. De generali Fracturarum Curatione.

L AT Fracturarum Curatio, cum in ruptis, fræctis ossibus adunatione ac reductione; tum in illius consolidatione & conglutinatione consistit. Ossis verò Adunatio Chirurgi operi & deestitute efficitur: Consolidatio autem & Agglutinatio vitæ ac vitibus Naturæ, cumque Balsamo suo Naturali; glutinoso nempe humore, ad coadunanda & consolidanda ossa accommodatissimo, efficacissimo. Enimverò cum Fractura sit Ossis Contractui Solutio, pro ejus Curatione finis ac prima intentio erit Unio. Hanc tamen Unionem Medicus facere nequit, sed solius Naturæ opus est; quæ in junioribus nonnuquam per interitum & omnimodum partium disjuncturam unionem; in adultis verò, in interveniente *træpa* seu Callo, tanquam Glutine, conjungente fractas extremitates solet. Est autem Callus idoneum ac proprium fracti ossis alimentum quod ibidem effervesceat dum concoquitur, & in tumorem artollicæ substantiæ ossis, haud secus ac in talcolis arborum per infusionem adaptatis contingere solet. Atque hic Porus seu Callus, licet non sit os, ita tamen durus est ut si idem membrum denuo frangi contingeret, potius alia in parte frangeretur, quam ubi callus genitus est.

II. Verum enim verò Unio illa, etiam Naturæ opus sit, tamen ut Ea scopum suum assequatur, plura adhuc necessaria sunt. Nimirum cum ossa fracta plerumque suo loco dimoveantur, si id accidas, ea restituenda, & ad amulsum coaptanda. Deinde hoc modo conjuncta servanda. Quæ si deest à Chirurgo sunt,

Unio postea Offium seu Calli Generatio opus Naturæ est. Medicus tamen & hic Naturæ opem ferre debet; quod fit; si partis naturalem temperiem conservet, & Inflammationem, & omnia symptomata, quæ naturam in opere suo turbare possent, avertat.

III. Primò itaque, ut Corn. Celsus lib. 8. cap. 7. docet, animadvertendum & considerandum est, utrum ossa fracta proprio loco exciderint, nec ne, cum non semper, ubi transversum frangitur ossa, suâ naturali sede excident. Cognoscitur autem ossa suo loco dimota non esse; si in fracturæ loco nulla cavitas percipitur, nec punctio sensus adest, nec membrum brevius apparet. In hac ergo fracturæ specie non opus est, ut membrum extendatur, & de ossium repositione ac coaptatione laboretur.

At verò ossa fracta si loco suo exciderint, ita ut unum supra alterum efflueret, prima cura esse debet, ut restituantur. Fit autem hoc duabus Operationibus, quarum altera *Extensio*; altera *Confirmatio* seu *Offium in suum locum hæpso* appellatur.

IV. Igitur in fracturæ ossium restitutione opus est membri *Favensio*: cum enim musculorum fibræ, ossis robore destitute sequantur naturalem suam determinationem, & in se contrahantur, necessum est per vim eos, simul cum fracto, tantum elongare, quantum à naturali statu recesserint. Alioquin, si non recta fiat extensio in fracturis, ea attritione rumpeantur ossium eminentiæ, quæ dein suas in cavitates reponi non possint; sed vel extrius ad ossium latera hærent, vel inter ossa fracta remaneant, ossisque fracti coaptationem impediant.

Ut autem iusta fiat Extensio, danda opera ut fiat minimo cum dolore. Fit verò hoc, si membrum extendendum ea figurâ collocetur, in qua musculi non agant, sed otiosi, & omnes laxati sint, hoc est, membri talis sit situs, qui ipsi sano omnium familiarissimus, quivè nullam ipsi adferat laesuram: quo modo & minore extensione opus est, minore cum dolore opus perficitur. Extensio interm sit neque validior neque debilius, quam requiritur; sed moderata: quoniam ex validiore extensione insignis oritur dolor, ex quo postea febres, convulsiones, & resoluiones sequantur: in debiliore verò ossium capia committi nequeunt; sed eorum eminentiæ simul conficiuntur, vel franguntur vel in proprias cavitates recondi ac reponi non possunt.

Cæterum sit Extensio hæc aut solis Manibus, idque unius vel plurium; vel Habentis, sive Linthei, Fasciæve circumpositis; vel per Trochilum tracto fune, quale exemplum habet Fabric. Hildanus (Zur. 3. abs. 86. & ex eodem Scultetus Armatum. Chir. Tab. 21. Fig. 1. Extensio namque major vel minor requiritur pro diversitate temporis, ætatis, magnitudinis ossis. Fractura recens, æger debilius, ex callo, leviorum exigunt extensionem; vehementiorem verò fractura jovetata, æger robustus, os magnum. Sic minimam postulat extensionem radius; majorem ossa, quæ in summa manu & summo pede sunt; adhuc majorem ossa cubiti, validiorem humerus & tibia; validissimam femur.

In genere autem cognita fracturâ mox instituat Extensio; si namque id non fiat, magnus ob dolorem vehementem fit humorum affluxus, & musculi versus sua principia retrahuntur, hinc extensio difficilis evadit, & si instituantur, ossa fracta adjacentes partes carnosas pungunt, ac sequenter inflammationes, convulsiones, aliaque mala accidentia, „ Quidquid suo loco motum est, ante inflammationem re-

ponendum. Si verò convulsio oriat, ossibus in suam sedem restituitis, rursus ea (si commodè fieri possit) suis locis propulsabimus, Chalm. in Enchir. Chirurg. lib. 4. cap. 2. Quod idem docet Hippocrates Lib. de Fracturis. § 35.

Si cum fractura Luxatio incidit, primò luxatio, modo fieri possit, dein fractura erit curanda; quod majorem vim in restaurando postulat lussu, quam fractura. Targautius lib. 5. cap. 4. Anton. Chalmæus Enchir. Chirurg. lib. 4. cap. 2. Orribius Lib. de Machinamentis, Vide Interpret. pag. 493.

V. Extensioni succedere debet *Confirmatio*, quæ est ossis fracti in suum locum repositio, & extremitatum recta coaptatio; quæ musculorum legitima figuratio optimè determinat, sic ut nulla in illis contortio noceat. Ea fit, si postquam membrum extensum est, ut in reponendo ossa se tangere nequeant, Chirurgus membrum, utraque manu comprehensum; studeat ad pristinum figuram reducere, impellendo hinc, inde, ante, retro, ad latera, donec eantes particule in suas cavitates & pristina sedes fuerint reductæ. Non sunt autem eminentiæ ossium cum impulsu vehementi in suas cavitates intudenda, ne rumpantur, sed potius sponte sua, extensione laata, manus Chirurgi leniter directæ in suas sedes recedant. Repositionem verò probè factam esse, ex doloris cessatione, ossis fracti in superficie æqualitate, & comparatione cum sano membro factâ, elucet; siquè membrum reductum post fracturam longius appareat, id violentæ extensioni tribuendum est.

VI. Ossa si probè coaptata exactè conjuncta sunt tenenda, quod præstat *Deligatio*, quæ ita fieri debet, ut & parva commissa feriat, & inflammationem arceat. Sed priusquam Fascia membro facto incipiamus ad humorem affluxum & inflammationem prohibendam, atque patrem affectam robotandam, linteum reduplicatum, *Oxynera* aut *Vin Ru bræ Adstringentis* madidum (omissis Oleis, Emplastris, & similibus, utpote inutilibus, ac non tarò admodum noxiis) imponatur; dein Deligatio instituat, quæ nec nimis laxa sit, ne ossa suo loco iterum dimoveri possint; nec nimis arcta, ne alimenti affluxum prohibeat, & dolorem exciet. Perficiatur verò duabus Fasciis, paratis ex linteis vestitis, aliisque usibus ea parte attritis, ut sint tractabiliores, validis tamen, nec eantes lacerentur; nullas confusiones aut eantes habebunt, ut æqualiter, ac sine dolore constringant. Prior Fascia supra fracturam injicienda, & circa eam modicè comprimendo ter involvenda, dein sursum versus ducenda, usque dum ad sanam membri partem, quatuor quinque, vel pluribus circumvolutionibus perveniat, paulatim immittit compressionem. Ubi autem sursum de sana parte fuerit comprehensum, ibi deligationem terminare oportet. Dein altera Fascia, priore duplo longior contrario modo involvenda: si enim prior versus dextram, hæc versus sinistram avolvatur; ut si forsan musculus aliquis per primam fasciam nimium ad alteram partem fit attractus, restituantur in partem contrariam, per secundam fasciam, quæ primam fracturæ injicienda, &, unâ vel alterâ circumvolutione factâ, ab ea incipiens deorsum aliquoties circumvolvenda, similiter paulatim compressionem minuendo, iterumque supra fracturam ducenda, ita ut ultra primam fasciam in partem sana terminetur.

Maximè igitur diligentia opus est in fasciis arctandis, cumquæ ex incipiunt, Patientem interrogare oportet, qualem

qualem circumquædam fasciam feriat, & si premi le discreti, laxari debet; sin vero fasciam ita laxam affuerit, ut minime fractum membrum sustineat, additingerè est opus. Moderatè ergò fasciæ adstri gi debent, magisque in parte fracta stringi ac coarctari, quàm alibi, ut ab humorum deluxu ea defendatur.

VII. Quoniam verò hæc duæ fasciæ, jam circumvolutæ, ad fracturam continendam debiles sunt, addenda insuper *Splenia*, seu panni lini ipsius compliciti, oblongi, crassi splenis brutorum intus *Compresse* barbaro vocabulo, latino *Pulsilli* vocantur. Hæc circa fracturam, & totum membrum, per ejus longitudinem arribenda, ut unum alteri non superponatur, sed inter ea digiti transversi ipsam circumcirca intrecetur: quæ timentis appositis *terebinthi*, ex ligno tenui lavigato, aut pottius charta crassiore parantur. Et cum cum fasciæ & splenia nulli viliâ non sint, fracturam firmam & directam servare nequeunt: sed facile fieri possent, ut tota vigilantiâ, tum duriscentibus membrum moveretur. Ut igitur in moribus membrum fixum teneatur, opus est ita, quæ rigida sunt, & non fluctuant, & tamen minus ponderosa. Quem in finem Hipp. elegit *terebinthi*, quæ & tigris urit, ac inflexilis, sed lævis. Quod si ob membrum inæqualitatem fræte præri non possint, partes cavæ splenis inspersione sunt, ac membrum æquale reddendum, ut ferulæ commodè applicari queant. D. Ipsi *Viscula* alliganda admodum laxa, sic ut ipsos ferulæ cum splenis continerentur, nec quocquam partem addistingant, ac comprimant, sed ut tutum, inmobile, ac in dubita figura membrum servetur. At verò in scrocularum appositione cavenda sunt ossa prominentia & excarnia; illis namque appositæ dolorem, nec non alia inferrent graviora symptomata.

VIII. Signum autem congruæ deligationis potissimum ipse *Agger* indicare solet, ubi, nam prematur, rogaverit, atque is respondeat, se premi quidam, sed leviter, idque præsertim, quâ fractura est. Si vero *Paciens* fasciis nimis prematur, ex celeritè solvenda & aptius deliganda, ac ex artionis vinculo prava evolvant symptomata. Sin fasciarum circuitus paulo laxiores, & nihil se premi respondeat *Paciens*, artibus vincenda, cum laxa viscata non prohibeant membrum, quò minus, quâ fractura est, depravetur.

IX. Congruæ deligationi succedit bona membri *Repositio*, quæ sit mollis, æqualis, saltem vergens, sic ut nec protuberantia, nec sinus in loco fracto noceat, neque dolorem & inflammationem excitet. Præterea in *Repositione* oportet congruam membri figurationem conservare; quæ scilicet dolore vacat, & maculos ex utraque parte integros servat: hæc autem est figura media, in qua dum otiamus lingua conquire conserimus, ut in cubito figura angularis, in capto recta, &c. Ea nimium, quæ inter extremos cuiusque membri motus intermedia est. Hæc figura nisi observetur, exiguo post tempore membrum dolere solet.

Parti igitur deligata in Capsula Ligneâ, qualem depingit *Hildanus lib. de febre & Melicæ. cap. 29.* & *Scultetus Armen. lib. 2. cap. 56. fig. 1. 2. 3.* Suprà lineam involutâ repleta, sive in pulvisi molliculo deponatur, atque hic in tertium usque diem relinquatur, si *Paciens* eo, quo deligatus est die, & sequenti nocte sentiat se valentius stringi; postero verò die minus, nec non in parte extrema tumor laxus, mollis, & parvus appareat: si verò aut sit nullus tumor, aut magnus & datus postillide in manu vel pede, prava est deligatura; quia illa non continet; hæc nimis ne-

cia est, & inflammationem moveri, atque gignere nam mox ratio minatur, unde nullâ interpositâ morâ *Agger* solvendus, ac demum, sed moderatè, deligandus est.

X. Igitur si probe deligationis signa adint, nullusque dolor insignis, nullavè inflammatio suspensa sit, reliquum opus, quod est callus, per quem fracta ossa conjunguntur, gignere, nature committendum, & deligatio apte tertium diem non solvenda. Tertio autem, post primam deligationem, die, quæ laxiores videntur fasciæ, solvantur; cumque fuliginibus ac vaporibus ob deligationem exhalare prohibitis, & per motum ac stagnationem actionibus redditus, ita inordinabilis non ratiò excutitur præstat, ut in doloresam exortationem, ac inflammationem terminetur; hinc præsertim pars *Agg. Tepida* ætione profundius, ut apertis partibus detentis, ubi cum fuligines evaporari queant; deinde membrum ligaturâ, quæ mollior paulo melleior sit, contringat, ac potius ut prius deligetur, inque capsula seu molliculo pulvisi deponatur in tertium usque diem; nisi purior vel inflammatorius vel dolor, vel quid aliud intellat. Sepimo die fasciæ iterum solvenda, membrum *Agg. Tepidè* profundius, & deligandum, artibus additis fasciis, ita tamen, ne sanguinis circulatio, ipsi-umque vitalium ac animalium radiorum prohibeatur.

Membrum ita deligatum desineatur immogetur ad duodecimum circiter diem, quo fasciæ demum solvenda, & membrum deligandum. Si namque tardius solvatur deligatio, magna sæpè incommoda (qualia sunt, patia exulceratio, putredo, gangrena, &c.) inde oriuntur, quorum exemplis notavit *Fabrigius Hildanus Cent. 2. Obs. 91.* qui propterea monet, ut secundo aut saltem tertio die semper deligatio solvatur; & quanquam post septimum non sit adeo necessarii toties fracturam solvere, se tamen de quatuor in quatuor fasciis solvere, partemque additam inspicere solet, scribit. Atque hæc: Deligatio continuanda, (paulo laxius tamen fasciis & ferulis iocidit adit ictis, ut mundamentum ad ossa fracta magis consorte, & callus gigni, firmosque reddi possit) donec callus genitus, & fractura finita sit; quod triginta aut quadraginta intra dies plus minus fieri solet.

XI. Interim ad Calli Generationem alii exhibent *Pulsilla*, in quibus bulliant *Folia Agrimonie*, & *Radices Consolide Majoris*. Nonnulli *viscidum Cili* præbent. Alii *Lapidem Officinalium pulverisatum* cum *Jusculo* exhibent, & cum *Cervæ extrinsecus* applicant. Sed cum Calli Generatio, adeoque fracturam ossium mediante callo unitio, solus Naturæ opus sit, hæc omnia, ut intellat ac planè inepta, merito rejicimus. Nihilominus tamen, ut omnia quæ Naturam in opere suo turbare possent removeantur, bona *Diera Egrotanti* præstibenda: Venesectio aliquandò instituenda & sanguis nonnunquam depurandus. In partium inferiorum fracturis Purgantia rarius, sed sola Suppositoia usurpentur: in superiorum autem partium fracturis Purgantium atque Emeticum usus necessitas admodum est.

XII. Quod si Fractura per longitudinem ossis facta sit, fasciæ artibus stringenda, quoniam in reliquis, ut ossa fracta, quæ secundum latitudinem à se invicem recesserunt, ad murum conactum ducantur, & remove-ri nequeant. Ceterum ea omnia agenda, quæ in trans-verse fræcturæ curatione dicta sunt.

Cap. 3. De affectibus præter naturam, qui fracturæ accidunt.

I. Quoniam verò Fracturis non raro quædam accidere solent, quæ aut curationem remorantur, aut post curatam fracturam remanent: ut sunt dolor, inflammatio, pruritus, exoratio, membri debilitas & gracilitas. hec depravata, &c; quæ ideoque Medici operam requirunt, de his pauca dicendum.

Dolor igitur si adsit, ne in causa sit, ut humores in partem affectam confluant, & inflammationem vel quid aliud ex. itent, omnino leniendus ac tollendus. Ut verò tollatur, considerandum, à qua causa proveniat; quæ statim tollenda. Perpendendum ergo, an ab osse aliquo pungente Dolor sit, an à fasciis nimium adstrictis. an ex pravo membri situ, an ex humorum affluxu.

Si ex osse pungente Dolor sit, (id quod ex levi partis contusione, & pungente dolore cognoscitur) fasciæ solvenda, & os pungenz vel in locum suum reponendum, vel, si fieri possit, extendendum, aut prædandum. Sin ex fasciarum nimia adstrictione Dolor oriatur,prehenditur id ex tumore, qui in membri extremitate apparet, ægerque se vehementer premi conqueatur: tunc quamprimum fasciæ solvenda, & laxior deligatio instituenda. Sed ob malam membri situationem si Dolor fiat, id æger facillè indicat, & si- tus mutationem postulat, quæ ita instituenda, ut jam sine dolore se esse fateatur.

II. Verùm ex humorum defluxu quom pars doleat, Tumor, & inflammationis signa apparere incipiunt. In hoc casu si membrum devinctum sit, quamprimum solvendum, & cum linteo duplicato vel quadruplicato calido imponendum. Oxyeratum, vel vinum Rubrum Adstringens vel applicetur Fomentum Anodynum, Retolvens, leviterque Repellens, ex Malva, Althæa, violaria, Scordis, Floribus Sambuci, Camomilla, &c. Rosarum Rubrarum, &c. in Lacte Dulci, vel Cerevisia Tons decollis. At priusquam sedata fuerit inflammatio, pars affecta non deliganda, saltem arte non stringenda.

III. Pruritus cum partem inficeret, & ægrotantem torquet, cessabit si Aqua Tepida pars inter deligandum foveatur, ut aperitis poris materia pruritum efficiens diffusi possit. Quod si locus affectus Aquæ Tepidæ assuersionem commodè non admittit, ejus vaporis suis utilis, apponitur: prohibenda interim Acribus scalpura, eo quod pessima, & præter exoriationem dolorem exciet graves. Si tamen ex improbitate scalporea, vel ex fasciarum resolutione diutius, quàm par est protracta, dolores oriantur Exoratio sanatur assuersione Aquæ Tepidæ, ut pruritus, & Lint ex Urineæ de Corolla, Albo Camphorato, Nutris, vel similibus.

IV. Non raro quoque Fracturis, vel ex attritu, vel ex actionibus veniculis, vel qualibet alia de causa Gangrena accidit. Quæ quâ ratione tractanda sit, lib. I. cap. 17. abundè dictum fuit.

V. Sed nonnunquam post Fracturam membrum fragile & debile manet: quod fit ob alimentum penuriam, dum à nimis fasciarum strictura partis affectæ vasa & porositates admodum constringuntur, adeo ut sufficiens alimentum affluere nequeat. Id quando fit, pars Aquâ moderatè Calidâ fovenda, donec tubercat, enque laxius deinceps vincienda. Insuper commendatur à nonnullis Picus, quæ fit Nigra Pic supra Linum distilla, poris mulieris applicata, & violentius, velociterque allata, ut ratione adherentiæ, pilorumque evulsionis, ac doloris, alimentum allicitur, ca-

vendo postmodum strictam fasciarum circumductionem, quæ affluens alimentum iterum repelleret.

V. Etiam contingit, ut postquam Ossa Fracta iterum coaluerint, pessimum & convenientem figuram non recipiant, sed Dist. ita sint, unde membri motus impeditur, & elaudicatio in pede oritur, vel in brachio apprehensio laeditur. Fit autem hoc, vel ob Chirurgi ossa componentis & fracturam deligantiam imperitiam aut negligentiam; vel ob ægrotantis vitium, quando membrum fractum ante calli constitutionem movet, aut ipsi iunietur: vel ob ipsius Fracturæ culpam, quom ossis frustulum inter ossa fracta continetur, quod motuum eorum contactum impedit.

Emendatur autem hoc vitium, si quidem læsio membri fit magna, continuoque punctiones, ob acuitatem caputem ossium non rectè compositorum, persentiantur. Patiens sit juvenis & robustus, callus recens, & non diu concretus, os fractum non adeo magnum; si callus iterum frangatur, & ossa rectè coaptentur & componantur. Verùm ut tuius fiat hæc calli fractio, is emollitur multis dies Fomentis, Balneis & Linimentis. Callo satis emollito, Chirurgus membrum fractum genu suo imponat, & os utrinque utraque manu deprimat, ac denuo frangat; deinde ossis fracti partes manuum palmis coaptet, & fracturæ novæ convenientem curam instituat. At verò si Patiens fit senex vel debilis, callus vetustus & induratus, os magnum, quale est femoris vel humeri; optimum est illi manum non admoveere, ob periculum, quæ hanc curationem sobigne solent, Symptomata: scilicet enim est vel desursum vel claudum multos adhuc annos vivere, quæ ni cradeli curâ, lethalia, provocare symptomata. Etiam si læsio membri in suis functionibus non sit admodum magna, æger forte suâ sit contentus.

Atqui si ossis frustulum membrum totum distorqueat. Incisio fiat ad os fractum usque, & Volsella ossis portio glutinationem impediens extrahatur, dein Fractura per extensionem coaptetur, deligatur, & depuratur, eodem modo quo recens fractura.

Cap. 4. De Fracturis cum Vulnere.

I. Sed Fracturis non raro conjungitur Vulnus: quando ossium fractorum eminentiæ, acutæ incumbentem carnem perforant. Atqui in hisce interdu os fractum nudatum est, interdum non est nudatum; Quinque denudatum est, nunc extrâ vulnus non eminet, nunc verò eminet: deinde interdu os, seu fragmentum aliquod abscisum esse metimus, interdum nihil abscisum speramus. Quæ omnes Differentiæ cum variæ sint, variam sanè expostulant Curationem.

II. Fractura cum Vulnere Simplici, hoc est, in qua nec os à suis tegumentis denudatum est, nec aliqua ossis portio abscissa, duas habet pro sui curatione Indicationes. Prima est, ut Ossa Fracta loco suo restituantur, & conjungantur. Altera, ut Vulnere Labia simul reuniantur. Quod si os fractum, & unâ cum ossis fractura etiam muscoli & corpora adjacentia vulnerata sint, tunc curationis incerto oritur duplex, quinam altera quidem circa ossa fracta, altera verò circa corpora adjacentia vulnerata versatur. Galenus lib. de Arte Med. circa cap. 91.

Primum ergo, erroris fortibusq; deteris, membrum congruè extendendum, & ossium fractorum capita debite coaptanda, haud levis ac in fractum sine vulnere. Hic tamen notandum, ne Extensio sit adeo valida, quod partes carnosæ ac membranosæ admodum læter, contusa,

congesta, & attrita plerumque sint; alioquin dolores ingentes nec non convulsionem exciterentur, non raro cum viræ discutiunt. Et quidem Extensio hæc, Ossiumque Repositio statim, & primo aut ad summum secundo die fiat, potiusquam parti gravis superveniat inflammatio.

Extensio peracta, Ossique reposito, Vulnere Labia ad mutuum contactum adducenda, adductaque servanda per Lintheola Emplastica cruciatim imposita, & Fasciam. Dein Vulnere ea applicentur, quæ conglutinandi ac vulnera consolidandi vim habere suo loco docuimus.

Post hæc Fractura Deliganda est, petendū ac si ossa citrà vulnus essent fracta. Fasciæ tamen hic sint molliores & laeviores, ut oras vulneris utrinque comprehendant, & sic labia ejus constingant, non comprimant, angustiores namque si essent fasciæ, tunc vulnus claudum tenerent, & dolorem inferrent. Cæterum minus etiam stringendæ sunt, quam si vulnus non adesset, ne compressio vulnere dolore & inflammatione oriatur: unde Hipp. & Celsus plures faciunt circumvolutiones, cum melius sit sepius circumvolvère, quam additingere. Nonnulli autem hujusmodi fracturæ deligationem insinuant per Asciale Fasciarionem, (de qua Scultetus *Armentum. Chirurg. lib. 27. fig. 1. & tab. 28. fig. 8. 10.*) ut crebrior fieri possit partis affectus inspectio.

Tertio, nonnunquam secundo, à prima deligatione die pars solvatur, iterumque deligeretur; ita tamen, ut deligatio paulò magis comprimat, quamvis ducat timor inflammatorius, nisi dolor prohibeat. In secunda verò, & tertia solutione laxior semper fiat deligatio, ut libera omnino sit sanguinis, pro futuri calli materia, circulatio. Reliqua curatio eadem erit, ac fracturæ sine vulnere; nisi quod Ferulæ non sunt ad vulnus apponendæ, ne id comprimant: si verò apponendæ, adhibeantur ad vulnera latera & partem oppositam, donec sanarum sit vulnus. Raro autem contingit, simplex vulnus, si fracturæ conjungitur, secundo vel tertio apparere cicatrice non obduci, vel saltem carne non repleti. Sapato vulnere si nondum confirmatum sit os, eadem agantur, quæ in fractura simplici.

III. Interdum tamen accidit in Fractura cum Vulnere, ut os nudatum non sit; ossis tamen frustulum abscissum metumus. Id quod fit, cum ob fracturæ impetum aliquod ossis fragmentum ita à reliquo osse separatum sit, ut cum eo demum conjungi nequeat. Tum enim natura id quod sibi molestum est, aliisque ossibus uniri non potest, foras protrudere conatur, neque finem facit, donec expulsum sit; id quod longiore demum tempore non raro perficere solet.

At verò abscissum os indicat sanies, quæ copiosior, quam pro magnitudine & constitutione vulneris, effluit. Deinde labia vulneris non coeunt, & si coevertent, iterum dehiscit, & ad excretionem stimulari videntur, & laxa quasi ac spongiosa evadunt; nec non tacita quædam motio in parte vulnerata percipitur: Neque enim natura vulnus integrè sanat, ubi aliquid intus hæret, quod reliquis agglutinari non potest. Adhuc ossis abscissura indicatur, si in plures particulas os comminutum sit; neque enim tunc omnia facillè conglutinantur.

Citè autem futuram abscissionem suspicatur, si caro laudabilis in parietibus ossis sani generetur. Enimverò non alio modo os recedit, quam dum natura carnem in labiis ossis sani erant, quæ os superpositum attollit, atque propellit, maturum quæ exitum, præter probabiles quasdam conjecturas, inde cognosce-

re liceat, si os samel, iterum, atque tertio quis possit percutiunt enim si clangorem, & vacui resonantiam reddat, apertum de maturitate testimonium dabit. M. A. Severinus *Efficax. Chir. part. 2. de iis, quæ ad ossa spectant. cap. 11.*

Tempus verò, quo ossa recedere soleant, varium est. Enimverò ætate tenera, tempore ætivo, siquæ os non adeo magnum sit; viginti, triginta, aut quadraginta dierum spatio abscidit. Si verò sit magnum, ætate adulta, tempore hyemali, viæ sexagesimo die, aut etiam tardius, os separatur. In magna ossium contritionibus, etiam post multos annos fragmenta ossium prorumpere, exemplo demonstrat Hildanus *Cap. 4. Obs. 97. Quod & in Praxi frequenter observari solet.*

Si igitur os abscissum loco motum sit, & in vulnere consistat, statim volvellà extrahendum. Si militer sit ossis frustulum per rimam undique à reliquo osse sit separatum, in suo tamen adhuc loco detineatur, nihilominus quoniam nunquam cum reliquo osse glutinari potest, apprehendendum & extrahendum; siquidem sine dolore & violentia extrahi possit: atque magna vi si id fieri nequeat, non debet extrahi, quia facillè excitantur dolor, inflammatio, febris, ulcusque fistulosum redditur, cum extracto osse cavitas illa sanie repleatur, quæ corrodingo carnis generationem impedit. Hinc potius Naturæ negotium tunc committendum, quæ sensim id, quod agglutinari nequit, separet. Interim tamen opus naturæ à Medico juvandum, & properea deligatio laxior insinuanda, sepiusque (de tertio sc. in tertium solvenda) ne plus detineatur, sed facillè effluat. Ferulæ etiam eo loco, quo os abscissum, non imponendæ, ne dolorem comprimendo pariant. Insuper Medicamenta vulneri admovent, quæ ossa & omne alienum è vulnere expellant. Quæ in finem Barbette *Chir. par. 1. cap. 34* sequentia proponit:

℞. Cineris Lumborum. Terrest. 3ij.

Mellis Virginis 3ij.

M. F. Unguentum.

Vel;

℞. Aloës, Myrrhae an. 3b.

Rad. Cusculid. Maj. Aristoloch. Rœz. an. 3ij.

Euphorbi 3j.

Theriacinæ, Cera q. s.

Ol. Liliorum Albor. parum.

M. F. Unguentum.

Ossiculo tandem omulino separato, ac citrà violentiam extracto, Ferulæ adhibeantur ad latera vulneris, donec id consolidetur. Si autem, vulnere ad cicatricem perducto, fractura nondum fuerit confirmata, ferulæ undique etiam apponendæ, ut in fractura simplici.

Veronimvero si ossium fragmenta, quamquam à suo toto separata, perfoltero tamen adhæreant & adhaerent, nullo modo sunt educenda, sed potius in suum locum, situmque naturalem apertè reducenda, cum coalescere & conglutinari quant.

Atamen inignis ossis portio si sit abscissa, idem quod ossis fracti partes non poterint cum aliis componi, tales partes vulneratæ omnino leniter trahendæ sunt. Enimverò propter motum & compressionem dolores accidunt vehementes, pungentibus ossis disticti partibus non rite compositis partes vicinas.

Si verò non statim, sed demum postea, os abscissum appareat, Deligatio hæc (ut membrum quoddam deligari & solvi commodius queat, absque eo quod fractura moveatur) muret in Asciale Fasciarionem, donec os abscidit. Osse autem abscisso, ac in conspectum detruso, eoque volvellà, si citrà violentiam fieri possit, extracto a vulnere consolidandum.

Quo ad cicatricem perducto, membrum in quiete conservandum, donec fractura confirmetur, appositis undique ferulis.

IV. Ceterum in Fractura cum Vulnere si os periosseo suo denudatum appareat, videndum, utrum extra vulnus emineat, nec ne. Extra vulnus si non emineat, curatur moderata membri Extensione, convenienti Coaptatione, Labiorum Vulneris ad motum contactum adductione, apta Deligatione, & congrua Depositione. In Deligatione tamen denudatum os cute, musculisque quamprimum coaptandum, sicque ab aere externo, quantum fieri possit, defendendum, ne alteretur, & postea abscedere necesse sit: hinc considerandum, an aliqua ossis portio sit recessura, vel nulla? nulla abscedet, si os nudatum istam cruris operculo fuerit resectum: aliqua recedet, si os diutius aëri fuerit expositum, quamquam & hæc regula non ita universalis, quis sæpius observatura sit, ossa propter causas tum externas, tum internas denudata, non fuisse allectata, nec squammam abieciisse, uti variis exemplis ostendit Fabricius Hildanus *Crit. & Obs. 95. & 96.*

Si igitur nullum aut parvum os abscessum sit, Deligatio peragenda, velut in fractura cum vulnere simplici, & in qua parvi ossis expectatur separatio: sin magnum sit abscessum, Alesali Deligatio pars vincienda, uti in fractura cum osse magno abscessu.

At verò os fractum, nudatumque si extra vulnus emineat perpendendum, an in propriam cavitatem, beneficio debite extensionis, citra violentiam & convulsionis periculum, restitui possit, nec ne? si possit, restituitur, sin minus, non restituitur. Periculosam restitutionem indicant, prominentia magna, inflammatio, & pars ob musculorum contractionem dura: faciliem veni, os eminus parvum, absentia inflammationis, & partis mollities.

Cum igitur os emineat citra violentiam & periculum convulsionis reponi possit, primò membrum moderate extendatur, deinde fractura componatur. Quod si ossa extensione difficulter coaptari queant, ob itmorem magni doloris, & periculosam convulsionis, validior ne fiat extensio, sed Vecte seu Scalpro quodam Incisore, inter ossa fracta immisso (vid. *Sculpt. tab. 27. fig. 9.*) extensio juvetur, donec ossa à directo collocata videantur: deinde paulatim extensio relaxetur, & vectis extrahatur. Verum enim verò si os, cui innititur vectis, in superiore parte, multa fragmenta, vel aliquod acutum habet ossiculum, ut vecti non deat commodus locus, illa Scalpro Rasorio auferenda, hoc autem Forfice prædicendum, ut vecti tuta comparetur sedes. Ossis reposito, considerandum, an fragmentum aliquod abscessum sit, nec ne? si nihil sit recessum, pars affecta (vulnere apposito conveniente Digestivo) deligatur, ut fractura cum vulnere simplici, sin verò aliquid recessum, deligatio instituitur, ut in fractura cum magno ossis separatione.

V. Quod si eminentia denudati ossis ita foris protuberet, ut sine violentia in locum suum reponi nequeat, tunc è duobus malis minus eligendum, osque emineat & nudum Forfice prædicendum, vel potius subtili Serrâ amputandum, & postea fractura per modicam extensionem coaptanda: hoc enim melius est, quam huiusmodi ossa non coaptata relinquire, vel extensione violenta. Aegrum in periculosam præcipere convulsionem, & ad mortem deducere. Fractura coaptata, membrum deligatur, ut in fractura cum vulnere simplici, ita tamen, ut vulnus quotidie sine crura com-

motione inspicil possit: atque hinc suadet Scutellus, ut fasciis & emplastris foramen supra vulnus incidatur, ad Medicamenta vulnere magno quotidie applicanda. Rationem potè fasciatum perforationis addit: „quia vulnus magnum, & „idè per secundam intentionem curandum, co- „piolam generat saniei, indeque citius san- „quirit inspectionem; os autem comminutum, „ob metum novæ musculorum contractionis, fre- „quentiorem membri elevationem, fasciatumque „relaxationem prohibet, unde media via, ut „vulnere & fracturæ satisfiat, incendendum.

Vetustatatem cum emineat os resecatur, ià ut os brevius fiat, multi Aegri prædicendum volunt, partes fractas futuras esse breviores: quæ prædictio ex Hippocrate & Galeno vera est, quod femur vel humerus fractus particulam ossis amiserit, sed cum tibia vel cubito portio quadam absindatur, brevis membrum semper timenda non est: os enim sanum conservat membrum distantum, donec natura defectum abscessu portionis callo compensaverit. Cuius rei memorabile in Nobili Viro viduosis exemplum. Is è curru, equis in furorem incitatus penitus distracto decedens, tibiam cum fibula citrè in medio diffraxit, tanta cum violentia, ut superior tibiae pars cutem ad duorum digitorum latitudinem perforaret, atque omni periosseo privaretur: vocatus cum Cornelio van Best Medicinæ Doctore, & Chirurgis Herbetto à Ravensteyn, & N. du Pré, suavisime unanimiter emineat illius ossis, periosse penitus denudati, ablationem, dictum factum, & altero die os illud subtili Serrâ amputavimus, crus ad pristinam longitudinem extendimus, & in molli pulvinari æqualiter deposuimus, vulnus quotidie inspiciendo; atque sic ex utroque ossis fine paulatim succrescens calus tandem coivit, sensumque in ossam duritiam firmatus est, ita ut crus pristinam longitudinem retinuerit, & ubi ablatus sit, nunc videti vix possit. Haud absimilem historiam rececit Cl. Dierwbroeckius *Anatom. lib. 9. cap. 1.* nec non Scultetus *Anatom. Chiræ. tab. 28. ex quibus insuper patet, Aegrum è duplici fractura cum vulnere & deperditione ossis, restitutum nonnumquam non claudicare. Inò femur licet, vel humerus fractus particulam ossis amiserit, non tamen semper sequitur, partem illam futuram fore breviorē: ita videtur observasse Doctissimus Lindaus, qui *Plysiol. cap. 16. artic. 21.* hæc habet: „memoria „ià dignum est, quod meus pater vidit Euchariz, „Puero sexenni comminatum est os femoris: frag- „mentis arte & naturâ sequestratis, medio ossis ex- „spatium erat quatuor pollicum, id visum est re- „liquis pluribus ossis sensim adunatis & tandem „coalescentibus ita impleri, ut dicere non liceret, „ubi abfuisset, aut quod incommodum haberet ex „fractura.*

Cap. 5. De Fracturis in specie

I. **I**gitur de Fracturis in genere, cum satis nunc dictum sit, cunctaque ossa quæ franguntur varia sint, & secundum osium fracturam varietatem curatio nonnihil variet, haud abs re erit, de his in specie quadam superaddere; saltem proponendo differentias, quæ à subiecto, & osium fracturam diversitate sumuntur. Ex quâ frequentissimè franguntur humerus, brachium, manus, femur, crus, patella, ossa pedis, de his primò dicemus; postea & reliquorum osium fracturas subungemus.

II. Enim verò *Humerus*, cum externis injuriis ex-

positus sit, Supra frangi solet. Appellatur autem *Humerus* Os id, quod inter Cubitum & iunum Humectum interfacet, & superiore ejus capite cum Scapula committitur, inferiore vero Ulnæ & Radius articulat.

Cognoscitur ossis hujus Fractura non solum ex parte dolore & actione laesa, cum cubitus amplius sustineri & elevari nequeat; sed etiam tactu, cum, si pars hæc prematur, ossium fragor ac strepitus audiat, & inæqualitas percipiatur.

Humeri os, ut Hippocrates *Lib. de Fracturis*, §. 9. Paulus *Ægineta lib. 6. cap. 100.* & Celsus *lib. 8. cap. 7.* inquirunt, quadraginta diebus coalescit. Cum autem sit grandius, longiore ad callum generandum opus habet.

Fractum vero Os Humeri ne restitatur, brachium incurvetur, sic ut incumbat pectus, mox humerus circa articulationem inferiorem comprehensus deorsum ducatur: facti hac extensione, ossa convenienter manuum opera comprimantur, quod haud ita difficulter fieri potest. Sedulo tamen hic curandum, ut semper in hoc sito servetur, ne iterum, quod levis moratio efficere valet eo cecidat. Chirurgus iustitiam, p. si secundam præter propter deligationem, quavis vice brachium in rectum prudenter extendat, ut tendines ab humero ad cubitum recutientes citius ita quiete contrahantur, si que rigiditas acrida brachio. Si vero hæc tendinum contractura relinquantur, haud difficile est eam curare, si quotidie ingens pondus gestet *Æger*. Chirurgus autem rigidum membrum frequenter illinat Unguento Emolliente & Relaxante.

Hippocrates *Lib. de Fracturis* §. 8. alium proponit modum, quo humeri os fractum extendi & componi debeat, de quo inspicitur Sculteti Anatomiarum Chirurgicarum Tab. 23. Fig. 1. Vult enim Sapientissimus Sena, ut rotundum lignum cubiti longitudinis paulo brevius ab utroque capite habenulis alligeret, quæ trahi, vel alicui sublimi adhererent, sique equaliter ac firmiter lignum suspendatur, ne iustum vel deorsum ferri possit: Deinde *Æget* brachium super dictum lignum imponat, id est, ut transversum lignum alæ subiciatur; cum Patiens fedat ita sublimis, ut parum abste, quin suspendatur; interim aliquid aliud patet, cui brachium inhaeret, pulvinari non vel pluribus brachio suppositis, ita ut ad eam altitudinem perveniat, ut cubitus ad rectum angulum collocetur, vel à minimo ita detineatur. Deinde cubito valida, mollis, & iara habena circumderet, cui magnam pondus appenderet, quod extendere convenienter possit, aut robustus aliquis partem inferiorem, cubito cum humero ad rectum angulum fixato, cogat, ac trahat. His factis, Chirurgus stans, altero pede super te quapiam sublimiori collocato, prominentioribus palmarum partibus fractum os componere debet. Alii autem Scalarum gradu suspensi ligni vice utuntur.

At vero Manubius non ratio fieri potest hæc Extensio, præsertim in pueris: respiciant enim *Ægrotante*, ne molestia aliqua afficiatur, & aliquid ac suspensum ipsius manu ex cervicæ, ita ut angulosa figura servetur, aliter ex ministris ambubus manibus humeri superius caput apprehendendo, alter inferius in diversa extendendo. Quod si manuum opera capediti non possit in adultio-

ribus, ob musculorum crassitiem & robur, laqueis extensio fiat, quorum alterum supra, alterum infra fracturam brachio circumligate debemus, sique duobus ministris (quorum alter ad caput, alter ad pedes *Ægrotantis* consistit) ut in diversa equaliter & simul extendant, prædicantur.

Facta quovis modo Extensione, ossibusque convenienter compositis, Fasciæ injiciendæ, incipiendo à fractura, attendendumque, ut semper in ea figura ligetur membrum, in qua manere debet, id est, ut robur cum humero rectum angulum constituat. Cetera potèr eganeat, ut in generali fracturarum curatione superius diximus.

III. *Brachium* propriè dicitur illa pars, quæ est à Cubito ad Carpum. Constitat duobus ossibus, quorum alterum *Radius*, alterum *Ulna* dicitur. Atque frangitur nunc utrumque, nunc alterutrum tantum.

Fractura Brachii, ubi unum saltem os fractum est, facilius curatur, ac utrumque si fractum sit; pessima est, & difficillima curatur: majore namque extensione tunc opus est, cum ossi fracta nullum sulcum & sustentaculum habeant; atque adeo musculorum fibre, ossis robore penitus destituta, naturalem suam determinationem omnino sequantur, & in se contineantur. Ut plurimum tamen Brachii Ossis intra triginta præter propter dies coalescunt, quoniam ætas ab ætate, natura à natura differat. Verumtamen si alterum saltem brachii os fractum sit facillor est curatio, cum subiectum habeat alterum, in quo plus opis est, quàm in scapula, scutuloque. Et si Radius tantum frangatur, faciliorem admittit curationem, si Ulna, difficillius curatur.

In Curanda Brachii Fractura haud secus procedendum, ac in aliarum partium fracturis curandis. Ad Extensionem vero minore vi opus est, ubi Radius fractus fuerit, majore, ubi Cubitus seu Ulna, maxima, ubi utrumque os. Et quidem si ambo ossa sint fracta, equalis Extensio scienda: si alterutrum solummodo fractum sit, ea in parte, ubi fractura est, fortior Extensio, instituenda. Atque hæc actio ex sententia Pauli *Ægii netæ lib. 6. cap. 101.* fieri debet inflexa manu ad angulum rectum, sic ut pollex omnium digitorum altissimus, contra minimus digitus omnium infimus habeatur. Fieri autem potest extensio Manibus, à duobus ministris in diversa extendentibus, & si videretur hinc extensio opus est, utriusque præsegrum ossibus fractis, & in valde carnosus. Habentis scienda, alligando unam supra fracturam, alteram infra. Extensione facta, admotis prominentibus palmarum partibus os fractum dirigendum & componendum, atque in pristinum sedem restituendum, si quæ ossium adfuit eminentia. Ossis fractio repositio, fractura Fasciis circumdanda, & alia, quæ in genere de fractura curatione dicta sunt, præterenda, tandemque brachium rectè collocandum ac fixandum: quod fit, si incurvatur imponatur pectori, sic ut manus paulo altiore occupet locum, quam brachium ipsum, nec non mitella commodissime accipiat, ut cervicæ suspensum in ea figura, hæc est, quæ rectum angulum referat in cubiti curvatura ut conjuncta ossa nullo modo dimoveantur. Post hæc singulo bido aut triduo leniter brachium extendatur, quò affluentes humores non nimis diu in articulis detineantur, ad-que non efficiant harum partium coitum, & hinc membri rigiditatem. Similiter si superius Ulnæ inter cubitum,

Oleranum dictum in ipsa Cubiti flexura fractum sit, qualibet vice, inter deligandum, lruiter brachium extendatur & iterum cubitus ineueretur, ne in ipso articulo, viz. inter ejus tendines & ligamenta, callosa concretio substantia junctura difficillem motum, vel omnimodam rigiditatem relinquant.

IV. *Manus ossa* sunt octo *Carpi*, quatuor *Metacarpi* seu *Palmæ Manus*, & quindecim *Digitorum*. Hæc ossa, Digitorum viz. & præsertim Metacarpi, fracturam nonnunquam patiuntur; at verò *Carpi* ossa conciduntur magis, quam frangantur.

Cognoscitur autem fractura in hisce ossibus facile, visu & tactu; cum hæc ossa fracta vel ad exteriora ut plurimum desilient. Non difficiet tamen, & quidem intrâ viginti præter propter dies, perfectè coalescunt, & sanantur.

Quando ergo quoddam *Manus Os* frangitur, *Patientem* lesam manum super æqualem & levem tabulam deponat. Deinde minister ossa fracta extendat: Chiturgus verò manu suam sedem ea restituat, hinc convenienter Fasciâ partem obvolvât. Et quidem si *Digiti* fracti sint, excepto pollice, vicinis sanis alligandi, ut ab his in suo loco, quasi à festula apposita, continerentur. Tandem Glomo ex Linteo Convulso manus vola complenda, ut hoc modo ossa composita facilius continerentur, & *digiti* in media figura conserventur. *Manus* quoque cum brachio à collo idoneâ fasciâ suspendatur, ac in quiete detineatur, quousque fracta ossa consolidentur; dein tertio vel quarto quoque die vincula solvenda, & pars *manû Aquâ Calidâ* fovenda ac perfundenda, cum dixerit Hippocrates *Lib. de Fracturis*, „ In omnibus autem, qui iuxta Articulos sunt, „ affectibus, liberaliter Calida Aqua perfundenda „ est, deinde Medicamenta applicanda, & tutius „ pars deliganda. Et sane multum hoc modo praecebeatur, ne *digiti* vel *extremis* vel contractis calulis tam facile generetur, adeoque ne manus officium in comprehendendo laedatur. Hipp. *lib. 6. Epidem.* navæ cujusdam historiam refert, cui ob fracturam mediî *digiti*, exortæ inflammationi gangræna successit, tandemque spatio epithoracii correptus interit.

V. *Femoris os*, licet ceterorum ossium, quæ in corpore humano sunt, maximum, crassissimum, & longissimum sit, nonnunquam tamen frangitur, vel in medio, vel in extremis, locique vicinis.

De Femoris Fractura Hippocrates *lib. de Fracturis, ex edit. Londani*, §. 23. ita scribit: „ at „ verò si femoris os fractum fuerit, extensionem „ præ omnibus facere oportet, ita ut ne defectuosus fiat. Amplius enim fasciâ nihil laeserit. Nec „ que enim si quis distantia ex vehementia extensionis ossa deligaverit, fieri poterit, ut deligatio ipsa teneat, ut ita distent: sed coeunt inter se ossa quam citissime, ubi inferedentes ipsa semiserunt. Crassissimæ enim ac fortissimæ quæ „ sunt hac parte carnes, deligationem superabunt, non ab ipsa superabuntur. Hoc confirmare videtur C. Celsus, dum *lib. 8. cap. 10.* id scriptum relinquit: „ si femur fractum est, fieri brevius „ oportet, quia nunquam in antiquam sedem reverti, „ tur summisque digitis postea ejus curvis insitit. Sed „ multa tamen femori debilitas est, ubi fortissime „ negligentia quoque accessit. Et Avicenna *lib. 4. Fem. 5.* tradit, raram admodum esse femoris fra-

cti integram curationem. Quibus verbis nos monent, ut integram femoris fracti curationem nunquam promittamus, sed omnem potius diligentiam adhibeamus claudicationem dubiam prædicamus, ne ex fracturæ natura, aut ex ægrotorum impatientia superveniens, multo adscribi eturi, & præmi loco famam minuat possit. Scribit quoque Fabricius Hildanus *Cens. 5. Obs. 8.* se neminem unquam vidisse, qui ex hujusmodi fractura sine claudicatione valeat, præter unicam puellam, cui novam & peculiarem curandi rationem adhibuit, quæ ibidem videri potest. Id autem præcipue accidit, si semur in loco superiore iuxta coxam frangatur. Sin verò genu versus, aut in medio femoris os frangatur, & diligens cura adhibeatur, nun aded difficilior, & sine claudicatione fractura sanari potest.

Ubi igitur femoris os fractum est, valenter omnino extendi debet, & recto tramite, ita ut in neutram partem convertant: violentia extensio convenit, quoniam maximi sunt musculi, qui semur circumstant, & magnam versus suum principium contractionem faciunt.

Respiratio ergo ægrotante, & extensis cruribus, valida Extensio fieri debet, vel Manus, vel Habentis, nec videtur esse apud Scultetum *Artem. Chirurg. tab. 26. fig. 1.* vel Instrumētis vix Machinamentis, Glossocomo pura, vel trochili à tracheo Fune, qualem depingit Fabricius Hildanus *Cens. 5. Obs. 86.* nec non Scultetus *tab. 22. fig. 1.* Extensioe sufficiente fasciâ, musculi, uspotè validissimi, facile fracti ossis partem inferiorem ad superiora adducunt. Id tamen ut citè & decenter fiat, prominentibus palmarum partibus, ut in aliis fracturis, os dirigitur & comprimitur, adeoque ossis fracti capira coaptentur. Interim memiserit Choleurgus priusquam operi se accingat, semur anteriore & exteriori parte gibbum esse, interiore & posteriori erectum, ut ad eam figuram, semur reducat, ne superveniat claudicatio. Hipp. *de Fract. §. 24.*

Reductum semur apud & conveniente Ligaturâ deligetur, qualis est Fascia Ascialis, quæ simul & in orbem circâ coxam & ilia, ut inguina etiam, & quod inter anum & genitale est, involvatur; cum ob alias causas, tum ne exteriora scilicet nudam partem offendant.

Insuper fractum semur conveniente fasciâ obligatam longo Canali, qui popliteum excedit, imponatur. Nam si canalis femori adaptetur, qui popliteum non excedit, is noxam potius, quam upem adfert: prohiberi enim non poterit, quin corpore aut crute moro semur quoque moveatur. Poplii etiam molestus erit, & genu curvari permittet: si verò quis genu quodammodo flexat, femoris quoque vineula moveri necesse est, & musculis alio atque alio modo figurati, adeoque & ossa fracta disjuncti. Ideoque utilissimum videtur, semur in canalem conjici, qui à coxa ad pedem usque pertingat; & præcipue, si ad popliteum cum canali fasciâ laxa circumjiciatur, velut infantes in curvis fasciari solent. Enim verò ubi femur in partem superiorem, aut ad latus disorietur, ita cum canali rectius constituitur. Canalis igitur à summo ad imum usque, aut nullus adhibendus.

Ceterum imò calci magna habenda cura, ut tum in femoribus, tum in tibia fracturis aprè collocetur: etenim si pes dependeat, tibia reliquâ obstrictâ, ossa in anteriore cruris parte gibba apparere necesse est, idque eò magis, si hominis calx suapte naturâ grandior fuerit. Hipp. I. de Fracturis §. 26.

Sed distortio femotis præcavebitur, si membrum in, ante, & post deligationem instrumento Glosocomo (vide Scholium *Artem. Chir. tab. 21. fig. 4.*) conservetur extensum, usque ad perfectam fracturæ confirmationem. Ne autem instrumentum hoc patrem suâ duritie atterendo lædat, idèd aliquid molle subiciendum, uti est lana carpa, mollis flupa, vel simile.

VI. *Patella* etiam interdum frangitur, & quidem nunc secundum longitudinem, respectu totius femoris, nunc in transversam, nunc in obliquam; & nunc in duas, nunc in plures partes comminuitur; insuper nunc cum vulnere, nunc sine vulnere.

Hujus autem ossis fractura facillè innotescit ex tactu, eùm partes divite persensiantur, cavitas appareat, & crepitus in contractione audiat, nec non omnimoda agilis incedendi impotentia.

Patella equidem, ut alia ossa rara, facillè coalescit, modo rectè conjungatur, & conjuncta servetur. Et si secundum longitudinem fracta sit fractura, sine manu operâ solâ musculorum tibia extensionem contractionem, ossa conjunguntur, & conjuncta pulvis, splenis, fasciis non difficulter in suo loco timentur, ac uniuersæ viginti circiter diem spatio; atque ita nulla calli exuberantia, & hanc subsequens claudicatio, facillè metuenda. Ambrosius Patrus tamen *Chirurg. lib. 14. cap. 22.* neminem sibi visum fuisse scribit, cui os hinc fractum esset, qui non per vitæ reliquum claudicaret: idque idèd, quod facta calli conceptione consolidatio liberam genu flexionem impedit. Verum etiam hæc de transversa fractura facillè concedi possunt; tamen rectè statuit Fabricius Hildanus *Cent. 5. Observ. 88.* non semper, præcipue in fractura patellæ secundum longitudinem fracta, id esse necessarium; eùm non semper callus ita protuberans nascatur, ut motus impedimentum in genu, & claudicationem afferat, videamusque in aliorum ossium statum, naturam tam eleganter callum generare, ut sæpe vix fracturæ appareat vestigium; quod in primis accidit, ubi priusquam integrum est, quod materiam calli retinet, ne nimis excrecere, & protuberare queat.

Si verò Fractura transversam vel oblique facta sit, difficulter admodum curari potest, ut incedendi impotentia, vel saltem claudicatio non cessent. Enimverò eùm musculi tibia extendentes sursum versus, & pedem moventes deorsum trahant patellam, ossa fractæ patellæ ita disjunguntur, ut hæc facillè conjungi, aut conjuncta traherentur queant, unde callus exuberat, qui cavetatem inter femur & tibia os adèd adimplet, ut articuli istius motus impeditur. Nihilominus symptoma hoc prudens Chirurgus non raro prohibere solet, si qualibet vice, inter deligandum, fractam patellam digitis (ne fragmenta composita denudè dimoveantur) firmiter apprehendat, & undique loco prudenter moveat.

Itaque in hujus ossis restauratione, crur primò extendendum est; dein à Chirurgo Patella seu in duas, seu in plures partes fracta conjungenda, & secundum naturalem figuram æquanda, nec non convenienter ligaturæ continenda. Totalis verò impositio, stramineis, ut in fractura cruris fieri solet, membrum immobile tenendum, & omnino cavendum, ne crur flectatur. Hoc enim si fuerit, fragmenta composita suo loco lectum dimovebuntur, quæ in sinum poplitei cavitas rotundis implentis exactè implenda, ut genu curvatura impediat. Religiosè interim observet Chirurgus, ut inter deligandum fractam patellam prudenter ultro citroque moveat, ne inter tendens & ligamenta, quibus continetur patella, callus concreseat; hinc & articuli latus motus difficilis, vel omnimoda rigiditas, atque adèd incedendi ferè impotentia, aut saltem claudicatio relinquantur.

VII. *Crus* illa pars appellatur, quæ à Genu ad Pedem extenditur. Constat duobus ossibus, quorum quod crassius est, & internam Cruris tegionem occupat, *Tibia*; quod tenuius & exterius, *Fibula* nominatur. Franguntur hæc ossa interdumambo simul, interdum unum tantum; & Fractura accidit vel in medio, vel in superiore, aut inferiore parte.

Si unumque os fractum sit, facillimè id cognoscitur: cum totum crur inglecti possit. Nec difficulter cognoscitur Tibiæ Fractura, si ea tota fracta sit; quoniam totum hoc os in conspectum, utpote in loco exarcti, facillè venit. Si verò Fibula sola frangatur, id non ita facillè cognoscitur; quoniam multâ carne tegitur: fracta tamen pars ad interiora inclinata solet.

Si ex ossibus hiis ætatem fuerit fractum, facillior curatio est: præsertim si Fibula tantum sit fracta, curatur facillius, & æger citius pedi insisteret potest; cùm facillius crur extenditur, & tibia maximam oneris corporis partem sustinet. Tibia verò si fracta sit, curatur difficilior, quia trahitur, & vice fundamini totum corpus sustentat: hinc & majore extensione opus est, & homo tardius incedere audeat. At utraque ossa si fracta sine difficilis admodum est curatio, tum quia validior requiritur extensio, tum quia omni tutelo destituta est pars affecta.

Sive ergo utrumque, sive unum os frangatur, curis, quantum opus est, extendendum; ut line læsione ossa suo loco restitui & conjungi queant. Quod præterquam duo vici tostanti (si aliter in partem inferiorem, alter in superiorem Crur trahatur) manibus præstare possunt. Quod si id exquiri nequeant, Habentis vel Machinamenti utendum. Et ubi satis extensum crur fuerit, ossa fracta reponenda. Deindè Fasciis crur involvendum; quæ & latiores & longiores esse debent, quam in brachio: & omnino ita situandum ac componendum, ne in ullam partem perverti possit, neque ossa fracta depravari queant. Tandem crur rectum & extensum super pulvinari, aut te molli & plana collocaudum, & Feculæ, ac Canales adhibendi, ut Cap. 2. de Generali Fracturarum Curatione diximus. Quæ in te observandum, ne supereminentes ossium extremitates applicentur, vel super magnum musculorum Gastrocnemii ac Solis tendinem, qui calcaneo inferunt. Hæ namque partes, cùm sensum habeant exquisitum, compressionem non ferunt, sed compressæ dolent, ac inflammantur. De sin autem tibiæ fractæ hæc habet Fabricius Hildanus *Cent. 1. Observ. 93.* In fracturis

tibiæ curandis, nonnulli Chirurgi non levem committant errorem, quem volunt tibiæ etiam ossifrete talo, ex qua situatione hæc sequuntur incommoda. Primò quidem fit, ut æger necpotis progressu majorem dolorem patiarur in talo, quam in ipsa fractura, idque propter tendines maguos & nervos, qui talo inferuntur. Dolor autem ille multos ad se trahit humores, qui in ipsa junctura, & spatii inter ossa pedis fracta, atque ligamenta retineantur. Et quia ex hac situatione venæ & arteriæ comprimuntur, & proinde pars affecta suo calore quodammodo destituitur, necessarîo condensantur & resurgunt hi humores in ipsa junctura, & spatii inter ossa pedis. Inde curatâ fracturâ, pes novam adfert molestiam, æger enim & difficulter movetur junctura, sequuntur & nonnullam alia quàm pessima symptomata. Id quod idem Hildanus memorabilis exemplo confirmat, quando subiungit: prospiciant igitur Chirurgi, ne nimis cutiosè situationem hanc in fracturis tibiæ observent. Involunt autem tibiæ fasciis, splenis, & stupis, & in capsula idonea collocatâ; ex eligenda est situatio, quæ minime sit dolorosa. Itaque modò in hanc, modò in alteram partem collocanda est tibiæ, ut æger nunc in hoc, nunc in illud latus decumbere possit: sic enim multa accidentia evitantur. Hæcille.

VII. Hominis pes, sicuti Manu, ex multis miouisque, nec omnî duris constat ossibus, magnitudine & figurâ diversis. Sunt autem ea, septem *Tarsi* ossa, quinque *Metatarsi*, quatuordecim *Digitorum*. Ossa verò Pedis & Manu non frangi scribit Hippocrates *lib. de Fracturis, paragraph. 10.* nisi acutâ vel gravî quæpiam res carnosæ partes valuerentur. Sunt enim duriora: & quæ acuta sunt, & gravia, si ossa hæc frangant, eorum incumbenter salvam non relinquunt. Et Paulus *Ægineta lib. 6. cap. 106.* scribit, Talum nullo modo frangi, non tantum ob duriem: sed quia undequaque ab ossibus eminentibus est munitus. Similiter Albucasis *lib. 3. cap. 18.* inquit; ossi Calcis nullo modo accidere fracturam, aliis verò Pedis ossibus fracturam accidere posse, ac etiam ossibus Digitorum; sed raro hoc evenit, potiusque hæc ossa atteruntur, quàm franguntur.

Si autem Pedis ossa frangantur, visu & tactu idprehenditur; cùm hæc partes exanthes sint.

Horum ossium Fractura per se periculosa non est, sed quia non nisi à valida admodum & violenta causa franguntur, partes incumbentes, & vicinæ carnosæ ac tendinosæ simul contunduntur & vulnerantur, unde dolores gravissimi, inflammationes, aliæque superveniunt accidentia. Diebus tamen præter propter viginti conferent & occalescunt; nisi quæ crui vicina sunt. Ea enim cùm sint majora, longior tempus requirunt.

Curatio fere eadem est quæ ossium Manu fracturam. Commoda similium faciendi Extensio, & ossa, sive in superiore sive inferiore partem emineant, in naturalem sedem compellenda: quod commodius fit, si æger pede fracto tabulæ planæ panno obductæ insistat. Deindè fasciis pes involvendus. Et cùm pedi Ferule ob loci inæqualitatem commodè admovei non possint, Splenis *Oxyprate*, vel *Pino Rubro Adstringente* madida loco affecto imponenda, Fasciisque locus vinciendus, ut ossa composita in sua sede contineantur. Situatio tamen & collocatio aliter hic instruenda, quàm in manu. Enim

verò cùm manus datæ sint ad apprehensionem, curvâ signâ digiti collocandi sunt. Pedes verò cùm ad ambulandum & standum dari, rectâ signâ sitandi, non curvâ, ne eorum actio depraveretur.

IX. Insuper & alia nonnullam franguntur ossa, inter quæ Nasi primo loco occurrunt. Constat autem *Nasus* ex ossibus & cartilaginibus: ossa ejus propriè franguntur; cartilagines contunduntur, deprimentur, distorquentur.

Fractura verò hæc ossa ex signis manifestè innoteſcunt, quoniam si adversâ fracta sint, nares desidunt, & sinus nasus apparet, difficulterque spiritus trahitur: si à latere os sit fractum, is locus cavus apparet: Sin cartilagines contusæ sint, earum distortio, & in alteram partem inclinatio adeit.

Commodissimè ex sententia Hippocratis *lib. de Ariculis, ex edit. Linden. 6. 31.* testatur Nasus fractus eodem die, vel certè paulo post, nec differenda curatio, quia in nris callus citò generatur, intrâ decem dies, nisi corruptatur. Subiungit tandem sapientissimus Senex: „Nasus ex omni corporis partibus facillimè componitur, & nisi protinus dirigatur, dirigi postea non potest, sed pervertitur.

Itaque si Nasus fractus in inferiorem partem æqualiter dimittatur, simusque reddatur, quampetuum quicquid in cartilagine incidit, leniter excidendum, ac sublevandum, ut sublatum postea decenter coalescat: viz. in nares aliquid intromittatur, quod dirigat, ut Specillum ad digiti formam fabricatum, ex Buxo, vel Ebore, vel Ferro: aut quod fractum est, cleveit Digito in nares immisso, atque in naturalem sedem restitueretur. Extrinsecus etiam ab utraque parte Nasus apprehendatur, ac lursum ducatur. Ubi autem probè conformatus fuerit nasus, ut naturalem figuram, conservet, longa linamenta contorta in Nares immittenda sunt, quæ nasum cavitatem implent, vel perforata Cannula, aut Penna introducatur, superimpulso exteriori Emplastro Defensivo, vel simili.

Si verò in uno tantum latere Nasus fractus sit, dirigere etiam convenienter ab ea parte, quæ declinat, & in naturalem sedem restituere oportet, cum Digitum vel Instrumentum commodum in nasum, quæ parte levis est, immittendo, cum extrinsecus dirigendo. Et ne quod compositum est, lenuim depraveretur, in singulas nares (at crassissimam in nares latam) Linamentum, vel Penna Austera grandior molli pellicula obducta, vel Filula aut Cannula de Plumbo vel Argento, itidem pelliculâ obducta, immittantur, ac tamdiu intus relinquantur, donec os aut cartilago suis roboretur. Neque multum refert, quid immittatur, modò prædit, ne fractum nasi os subideat, & molle sit, odorifere gravis exers. Monet tamen Hippocrates, nullo pacto Spongiam esse immittendam, quoniam humorem imbibit, atque sic erigendo, partem diffundit, cunctaque dissolvit. Etiam Degligentem improbat, quam C. Celsus proponit, quia magis nocet quam confert, cùm similitur, & majorem amplioremque distortionem adferat. At de necessitate ligaturæ in Nasum Fractura Curanda disputat Guido de Cauliaco in sua *Chirurgia*, qui videti potest.

Si juxta cartilagineum Nasus fractus sit, & in obliquum distortus, post congruam conformationem, Habena digitorum lata, Glutine aliquo illita, naso ea parte, in quam inclinat, agglutinata, postea intendenda, quantum expedit, ut nasus rectè dirigatur. Longa autem sit hæc habena, ut circa

cicatræ autem obducta circum caput obducatur. Hæc iussu dicitur nasum, & remitti ac intendi potest. Et si intra nates impositæ turunda dolorem excitent, tollendæ, & tamidiu nates habendæ directæ servandæ. Post quartum decimum diem habendæ demendæ, & Emplastrum aliquod Catagmaticum imponendum.

Si autem Nasus ossa minutim fuerint fracta, quantum licet, singula in suam sedem reponenda, vel idoneis Instrumentis compellenda, neque facili, & nisi nullo modo agglutinati possit, os aliquod eximendum, eum semper deformitatem pariat. Postea Ceratum vel Emplastrum ad ossa confirmanda imponendum. Plura de Nasum Fractura videntur apud Hippocratem *Lib. de Articulis, artic. 30. 31. 32.* 33. 34.

X. Interdum & Inferior Maxilla frangitur, vel transversim, vel in plurima fragmenta, ossibus semper inter se aliqua ex parte coherentibus, raro penitus disjunctis, & dissolutis, ut in aliis.

Facile autem Fracta Maxilla cognoscitur, quoniam si tantum extrinsecus ossa fracta sint, tactu appareat, & in interiore oris parte aliqua gibbositatis digito sentitur. Sin verò transversim fracta fuerit, interosum manifestata cavitatis sit, & in interiore oris parte ferè dens super proximum dentem excedit.

Maxillæ ossa, si primis diebus inflammatio non accedat, intra viginti præter propter dies consolidantur, & dentes integri remanent. Sin verò cura diutius protrahatur, dentes viciantur, & inutilis redduntur, auctore Hippocrate *Lib. de Articulis, artic. 29.*

Si igitur Maxilla ita per transversum fracta sit, ut ossa inter se aliqua ex parte eadem cohercant, digitis utrinque, tam ori immixtis quàm extrâ applicatis, os comprimere & in suam sedem compellere oportet: Interius namque tuberculum, foras propellendum, & alterâ manu ossa inæqualia complananda. Maxillam verò in suam sedem esse restitutam, ex ejusdem, nec non dentium æqualitate apparet.

Si verò Maxilla tota transversim fracta sit, quod tamen raro accidit, sic ut os super os emineat, & dens super proximum dentem excedat, digitis ori immixtis, & extrâ manu adhibitis, ossa fracta componenda: & nisi simplici compressione id fieri possit, primum extensio, ministri retrò continente & Chinergo ante extendente, fieri debet, hinc & ossa super se componenda. Deinde dentes qui sunt ad fracturam, non tantum binis, verùm & plures inter se colligandi, donec ossa firmata sint. Hipp. filo autem utitur: cuius defectu vel filum seticeum, vel testa equina usurpari poterit. Si Maxilla in mento fracta fuerit, quæ parte ambo colligantur ossa, ambabus manibus inter se coaptari & diuigi debet.

Ubi autem fracta ossa fuerint reposita, quod ex æqualitate dentium cognoscitur, ut suo loco conserventur, extrinsecus Ferula, ex corio seu alia conveniente materia, maxillæ longitudini correspondens, apponenda, hinc convenientes Deligaturæ instituenda; quæ fiat Fasciâ duabus extremitatibus fissâ, duos digitos latâ, mediâ quoque fili parte in longitudinem incisâ, ut utrinque mentum complectatur. Cum ergo fasciæ in extremitatibus fissæ quatuor sint, capita duo inferiora ad summum caput deducantur, ibidemque deligentur, vel pilolo nocturno alligantur; duo superiora transversum traducta

Bibl. Chirurg. Tom. II.

ad inum occiput deligentur, vel eidem pilolo alligantur.

Si tali fracturæ Vulnus sit conjunctum, Specillo explorandum, an minucium, & in plures partes diffracta sint ossa; & si ossis fragmenta separata inveniuntur, aliisque conferminari nequeant, idoneo Instrumento eximenda; sicque vulneris orificium angustum sit, ampliandum; deinde vulneris labia ad mutuum contractum adducenda, & appositis Linimentis Emplasticeis adducta conservanda, atque dicatum cruentis vulneribus Medicamentum superponendum, donec consolidentur. Interim ne decumbat Ager in partem maxillæ fractam, sed in suam; at non hinc, sed capiti innixus, ne ossa composita iterum distorqueantur. Maxilla quoque immobilitate servetur; ideoque Ager, non multum loquatur, nec durescens cibos masticet, sed mollioribus & liquidis nutriatur, donec callus obducat. Et si aliquid denud suo loco motum fuisset observetur, tertio præter propter die diligatior solvenda, & si quid exciderit in suum locum reponendum.

XI. Clavicula Acromio & Sterno articulata movetur; quæ parte autem jungitur sterni manifestius agitur, obcurius & ferè insensibiliter cum acromio, quia scapulæ motum sequitur. Idcirco fracturæ claviculæ pars acromio iuncta summa movetur, in anteriorem, vel posteriorem vel inferiorem locum conversa, alterâ ejusdem parte semper immobilis.

Frangitur verò Clavicula vel transversim, vel oblique, vel per longitudinem. Si per transversum id accidat, vel præp. humeri articulum, vel magis versus articulationem cum sterni distinguitur.

Cognoscitur ossis hujus Fractura tactu potius; quam visu; ut & ex dolore.

Si per transversum frangatur Clavicula, facilius curatur; difficilius autem, si per longitudinem. Nam quod transversim fractum est, facili extensione, & digitorum compressione in naturalem sedem revertitur: reliqua fractura semper quid emittentis habet, quod argere conspici potest. Perficitur tamen Claviculæ Fracturæ Curatio quatuor & viginti circiter diebus.

Igitur ut hæc Fractura curetur, ministri duo ad extensionem requiruntur, quorum unus utraque manu humerum, qui claviculæ fractæ adjacet, ad posteriorem, alter caput in latum oppositum ducat; interea Chinergus digitis id quod prominet propellendo, ima foras attrahendo, & quæ deorsum tendunt, sursum, & quæ sursum, sunt deorsum compellendo, fracturam componat. Aliqui autem, ut facilius fiat restitutio; Glorium Lineum alie subiciunt, hinc trachium ad costas comprimunt, atque ita os suæ sedi restitunt. Si verò ossis fractæ extremitates ita depreßæ sint, ut sursum reduci hoc modo nequeant, Ager relinpiendus est in pulvinari duriore, spinæ inter scapulas subiecto; humeri interim manibus sic deprimendis, ut ossis fractæ extrema depreßa eleventur eoque, ut in naturalem sedem restitui possint.

Compositis fractæ Claviculæ ossibus, Plagulæ tres convenientes crassitie & longitudinis, ut cavitatem, quæ supra & infra claviculam est, repleant; parandæ, quarum duæ lateribus, tertia crassiori prominenti fracturæ imponenda, ita enim & os fracturæ eminentia deprimetur, & nec sursum, nec deorsum, nec ad latera & suis sedibus ossa fractæ composita dimoveri poterunt. Hinc Deligatio instituenda; quæ fiat Fasciâ

P 3

palmari

palmum latâ, debite longitudinis, duplex caput habente, decussatim insertâ quæ sæpius circumducenda, & obvolvenda ut brachium ad posteriorem deducat: Interim cavitas sub axilla lineamentibus convolutis replenda; sic namque facilius deligationem sustinet Pariens.

XII. *Scapula* etiam qualibet sui parte frangi potest, rarius tamen in processu illo, qui *Acromium* dicitur; sæpius juxta *Spinam*, & in aliis extremitatibus. At si *Acromium* frangatur, visus & tactu percipitur, præsertim si pars ægra cum sana comparatur: sin verò latior ejus pars, & in extremitatibus frangatur, tactu cavitas quædam deprehenditur, & punctior dolor in parte percipitur.

Fractura quæ in Summo Humero seu *Acromio* est, difficilior curatur, quàm in aliis *Scapulae* partibus. At in *cervice Scapulae*, aut circa articulationem ejus cum humero, quæ est Fractura, ferè incurabilis est.

Si ergò os fractum *Scapulae* adhuc cohaereat, manu Chirurghi in suum locum restituendum. Quod si non facile fiat, & majore vi opus sit, *Pila* ex lino sub axilla ponatur, & minister deorsum humerum trahat, cubitum ad costas adducendo, Chirurgus verò manu Fracturam comprimat & componat. Sin os fractum *Scapulae* non cohaereat, modò ligamentis & periosteis quodammodo adhaereat, & pongo admodum molestum non sit, etiam suo loco restituendum. At si penitus & ab ossis, & à periosteis ac ligamentis separata sint fragmenta, sic ut carnes pungant, cute incisâ, eximenda. Sin verò non pungant, relinqnenda: natura namque quod reliquum non cohaereat, tandem spontè expellit, celsi interdum post longum tempus id fiat: sic refert *Ambrosius Parvus lib. 14. cap. 9.* eundem *Marchioni* è *scapula* vulnerata ossium quædam fragmenta post annos septem, cicatrice resectâ, erupisse.

Ossibus ritè compositis, Deligatio conveniens instituitur, sicque summum *Humeri* fractum sit, *Pila* sub ala vincienda, & deligatio non frequenter solvenda: Ager interim in opposito latere cubet, & partem in quiete derelinat.

XIII. Interdum *Costa* ex causis violentis quoque franguntur; casu vix, aut contusione. Et quidem fractæ *Costæ* interdum intèr declinant; interdum extrâ eminent, interdum, etjâ totæ franguntur, proprio loco non dimoveantur; nonnunquam & caro circa costas colliditur.

i *Costa* & tota fracta, & extremitates loco mortæ, quædam inæqualitas & cavitas tum visum, tum tactu deprehenditur, & strepitus auditur. Quibus accedat & alia symptomata; adeit vix, dolor gravis, pleuritico dolore æmulans, respiratio difficilis, tussis molesta, & non raro quoque sanguis spumens, dum ex vas ruptis effluentem sanguinem pulmo imbibit, nec non febris. Si tamen *Costa* quidem fracta sit, at fractæ extremitates neque intèr cessent, neque in exteriorem partem compellantur, pauci febriant, aut sanguinem spumant.

Costarum Fractura si simplex sit, absque partium vicinarum gravi contusione, aut inflammatione, periculo vacat, & intèr vigesimum diem non raro curatur. Sin verò caro circa costas atteratur, periculosum malum est, & non raro lethale, teste *Hippocrate Lib. de Articulis.* Etiam periculosa est Fractura, si *Costa* intèr compellatur, & pleuram pungat vel vulneret, tuncque eadem ferè symptomata, quæ pleuriticis insensate solent, superveniunt; ac longius protrahitur curatio.

Si ergò *Costa* fracta sit, proprio tamen loco non dimota, nec incumbendum, vicinarumque partium consensu adlie, per se facili consolidatur. Sin extrâ promineat, manu comprimenda, & in propriam sedem reducenda, ac æquanda. Si intèr vergat, Ager tussis, ac spæritus, ore clauso, retentione eam extrinsecus compellat; Chirurgus verò Agerotanti manibus, quantum fieri potest, succurrat. Quod si non succedat, nonnulli Emplastrum cuti validè adhaerens censent imponendum, idque aliquoties cum impetu auferendum, donec in locum suum *Costa* sit restituta. At quandò *Costæ* fragmentum membranam pungant, atque acerbissimi inde dolores, aliaque prava symptomata oriantur, cutis incidenda, & apertis fragmenta vel eximenda, vel paxidenda. Plura de *Costarum* Fractura videantur apud *Hippocratem Lib. de Articulis. §. 51. 52. 53.* Insuper de felicissima curatione fracturæ *costarum*, in qua nonnulla notata digna occurrant, videatur *Fabritius Hildanus Cent. 5. Obs. 85.*

XIV. *Dors Spina* est *Vertebrae* omnium contextus, & sicut quædam corporis catina, quæ consistat septem *Cervicis Vertebrae*, duodecim *Dors*, & quinque *Lumborum*, nec non *Ossis Sacri*, & *Coccygis*. *Vertebrae* Corpora raro admodum Fracturam patiuntur; eandem tamen Processus à causis externis & violentis nonnunquam franguntur. Id autem tactu facili deprehenditur, cum huc atque illuc moveri perferantur diffraetæ *Apophyse*.

Vertebrae Processum simplex Fractura simplici lenique manu operâ restituitur, ac consolidatur viginti circiter diem spatio: sunt namque Processus hi ossa spongiosa & rara. Sin verò per vim admodum violentam totæ *Vertebrae* frangantur, adeò ut medulla spinalis simul patiantur, declinet *Paralyti* afficiantur brachia, pedesve Agerotanti, ac utina faecæque alvi retineri nequeant, mors in propinquo est. Intèr tamen ne Ager sine auxilio deficiatur, nil faciendorum negligendum, & factò Prognostico cutis incidenda, ac libeta fragmenta eximenda, hinc vulnus curandum.

Ad Fracturas *Spinæ* pertinet *Ossis Sacri* & *Coccygis* Fractura; quæ si ita sit, ut & *Spinalis Medulla* lèdatur, lethalis est. Sin ea non lèdatur, adeoque salutis spes sit, immisso in anum digito usque ad locum affectum, os fractum expellendum; extrinsecus verò alterâ manu ossa æquanda, & in suum locum reponenda. Et si aliquod ossis frustulum abruptum perferantur, cutis apertione, id eximendum, ac portò vulnus ex arte curandum.

XV. Os *Innominatum*, quod ossibus tribus; *Ilio*; *Coxendicis*, & *Pubis*, simul unitis consistit, frangitur ut *scapula*, vel in extremitatibus, vel secundum longitudinem, vel in medio.

Cognoscitur Fractura hæc ex dolore, qui tactu, & compressione imprimis exasperatur; nec non cavitate, inæqualitate, punctura, nonnunquam stupore in cute ejusdem lateris.

Exigit autem Fractura hæc celerem restitutionem, pethicisque consolidatio quatuor & viginti præter propter diebus. Interim si sit in *Ossis Innominati* extremitatibus, digitis vel manu ossa fracta componenda ac æquanda.

Si verò frangatur os per longitudinem, vel ad interiora declinet, ità stuerit, Patiens ut super ventrem decumbat, Chirurgusque manibus, uti potest, fracta ossa componat.

Sin os fractum comminutum sit, Apertio faciendâ, sicque & fragmenta libera auferenda, & alia reponenda. Verum cum vix sub cute solùm, sed sub ipsi mulculis talia fragmenta plerumque

rumque lateant, sine periculo hic Sectio non instituitur; hinc omnino cavendum, in faciendâ hac apertione, tendines, vel vasa quæpiam majore lædantur, sicque graviora exciterentur symptomata.

Hallenus de Fracturis Clariff. Joh. Altmann; circa eas varia

Observationes.

De fracturis ossium, nulla accedente coalitione.

Contingere non raro observamus, ossium extrema in fracturis haud reuniri, quæcunque etiam externa æque ac interna adhibeantur medicamentâ.

Exemplum hoc faciens considerabile, non nisi semel (quod in Chirurgia adeo exercitatio admiratur) vium proponit Fab. Hildanus obs. 91. cent. 3. his verbis: Ante duos menses ex Germania rediit, Basileæ fracturam observatione dignam in quadragenario vidi. Hujus viri brachium unistrum cum ante annos decem rota molendina apprehenderet inser cubitum & carpum ossa in transversum adeo confregit ut omnino inter se disjungerentur, curis quinquetiâ & musculi minime in modum dilacerarentur. Dolor supervenit maximus inflammatio & inrumescitio totius brachii, non solum ob magnitudinem morbi, verum etiam quod ossa in suum locum reposita non fuerant, carneque continuè compungerent. Multum puris per menses aliquos effluxit, multaque officula à Chirurgo extracta fuerunt; tandem remiserunt symptomata, & consolidata fuerunt vulnera, sed ossa disjuncta remanserunt, & ita quidem ut eo in loco veluti alterum articulum constituerent. Manum enim dextram si adhibet, sinistrum brachium antrosum & retrosum ducit, non fecus ac si naturalis priore in loco articulus esset, idque sine ullo dolore. Ossa se invicem non attingunt, sunt enim extremitates ipsorum callo obducta brachium aliquo modo extenuatum est. Cubitum quidem movet, sed difficulter, quapropter brachium ferè inutile est. Cæterum quid causæ sit cur ossa in hoc viro per callem connexa non fuerint, profecto me laret; nisi fortasse improprium nutrimentum ossis, ex quo, teste Galeo callus procrearet, in pus conversum una cum pure efflueret, aut caro & membrana aliqua inter utramque extremitatem ossis intercederet. Adeoque natura adeo est diligens atque provida, ut extremitates ossium confractionum, licet levissime se contingant, statim conglutinet, atque conjungat.

Exulcerationes fracturis supervenientes quæcunque à causâ, primitiva sive fuerit, sive antecedens, sive etiam conjuncta, impedimento esse posse, quo minus ossium datur coalitus, maxime cum alimentum ossium suffocationi, consumptioni, corruptioni, aut cum pure evacuationi antea præbent, haud impossibile nobis videtur; at quis rationem dabit unde eveniat quod ossa fracta haud reunantur, ubi exulceratio nulla adest, imo nulla vel in cure vel in musculo continui observatur solutio? Notare etenim nobis docuit, non solum in ulna & radio, ossibus adjutoris, riba & fibula, sed & (in duobus licet subjectis) ossibus femoris, per infortunium fractis, quæcunque etiam usurpantur medicâ, interna æque, inter quæ considerabilis Ichthyocolla, ac externa, emplastra, splenia, ligamenta, nullam securam extremitatum unionem, etiam omni exulceratione absente,

Causa hujus rei quæ sit cum prædicto Hildano, me ignorare fateor, nisi dicamus, deligationem in fracturis usualet, non urgente dolore, tumore, inflammatione, aut gangæna, frequentius iussu suffile solutam, vel etiam humores ad calli concretione promovendam necessarios plus debet attentatos, splenia brevia nimis aut molliora applicata; imo fractum partem, ad arcendum incalcescentiam quandoque supervenientem, nistum humectatam. Et harum ultimam calli geetationem impedire satis constat. Spleniorum nimis brevium, molliorumque applicationem, hinc deligationem minus arctam effice posse, quo manus extremitates ossium fractorum coeant, in nauta quodam, cui ex itinere rediit os humeri dextrum distrahatur, in quo quod splenia mollia nimis usurpata, nec manus extrema cum ulna extremitatum coalitio secuta.

Extremis impedimenti sic consideratis, Chirurgus in arte exercitatio interna adhuc varia occurrit, quæ ad id ut extrema ossium fractorum callo nullo obducantur plurimum facere possunt. Tales humores nutritii os accedentes minus pingues, aquosius; corropi, imo etiam nonnunquam omnino maligni, habita tamen obvis consideratione fracturæ corporis & ossium.

Observare nobis huc in aliquo, morbo gallico quasi tabefacto, ossa adeo fuisse exsiccata imò arefacta, ut ad quemvis attractum frangerentur, sic enim claviculari in patris variis contractam in eo vidimus, dum thorace pedus vestire conabatur.

In tali casu ubi ossium extrema uniri recusant; nil conveniens, quam, instramento quodam apto, ex ferro confecto, utrinque membrum comprehendere, extremitate conjungere, ne in motu vel incellu incommodum aliquod agrotanti adveniat. *Joh. a Malvern in observat. Medico-Chirurgi.*

Pro Fractura Brachii in Senæ decrepito.

Cautationem hoc modo institui, clementer ex purgato corpore, illam victus rationem, quæ maxime nutrit (omnibus tamen cibis viscosis, qui mihi in fracturis mirum in modum suspecti) languinemque optimamque procreat, calidum nativum & humidum radicale instaurat, præscripsi. Singulari quoque diebus jejunio stomacho, ad 3 ij. sequenti pulveris ex jussulo carnis recentis exhibui.

℞. Lapidis osteocoll. diligenter præpar. ʒij. cinnam. cl. ʒijj. Sacch. ʒij. M. F. pulvis tenuissimus. Brachium usque ad scapulam sequenti linimento quotidie bis unctioni.

℞. Ol. lumbic. ʒij. ol. gran. junip. ʒij. succi lumbic. ʒij. M. F. linimentum. Sed ante omnino primò oia in locum suum, ea quæ fieri potuit diligentia repositi. Post unctionem lequeos applicui emplastrum.

℞. Empl. Vigonis ad fractur. ʒij. empl. oxyroc. ʒij. lapid. osteocoll. præpar. ʒij. lumbic. præpar. & in subtilissimum pulverem redactor. ʒij. cum q. l. ol. lumbic. si emplastr. fracturam de tertio in tertium, aut de quarto in quartum diem solvi, & medicamenta renovavi, reliquum verò brachium quotidie semel aut bis, ut dictum est, ad scapulam & nucham usque unctioni; hisce adhibitis remediis, callus intra paucos dies, usque adeo procreatus fuit, ut collisio ossium non amplius perciperetur, & brachium intra quatuor septimanas restitutum fuerit: & sic natura in hoc decrepito veluti assopita experta, & calor

narius fere extinguitur in ista parte, iterum beneficio prædictorum medicamentorum accensius fuerit : quantum valeat in fracturis ossium osteocola seu lapis ossifragus non raro experiri sum : reperitur in campo quodam arenoso prope Duxmildium. Eligitis qui sub terra absconditus, extra terram promineat est invalidus nulliusque momenti. *Gul. Fabrici. Hildanus Observ. 90. Cent. 3.*

Lapis osteocola, qui & Sabulotus dicitur, singulari quadam virtute & prosperitate oculis generandi callum prædixit est : Idque ego cum in aliis rum præcipue in quadragenario quodam observavi, in quom ntraque facilia ad malleolum sibi transversum confregisset, me advocandum iussit. Ossa in situm naturalem reposita, singulis matutinis horis jejuno stomacho 3j. huius lapidis in martore cum aq. rad. lymphat. præpar. exhibui, primis diebus cum pitana, aut iusculo carnis recentis, postmodum vero cum vino : ita quæ fracturæ applicui eundem lapidem pulverisatum & præparatum admiscui : inde factum est, ut spatio triginta dierum plenissime restituta sit tibia, ut sine admiculo incedere potuerit. *Gul. Fabrici. Hildanus Observ. 90. Cent. 1.*

Lapis hic caute & in senibus tantum, aut extenuatis, & quibus languet calidum nativum adhibendus est, ne aliàs callus superfluous generetur multo labore diminuendus. *Gul. Fabrici. Hildanus Obs. 91. Cent. 1.*

Ego jam à multis annis magno cum successu sequenti utor emplastro in fracturis.

℞. Emplastri Strozani 3vi. cere nov. 3ij. coloph. gummi elemi pinguisimi an. 3j. dulciol. lento igne. Postea infirge sequentes pulveres, rad. consolid. maj. balauit. nuc. cupress. ros. an. 3j. mastice. thuris, an. 3ij. M. addendo ol. rosace. q. l. ut F. ceratum. In adultis & extenuatis ad 3j. huius emplastr. tantundem osteocolle præpar. admisceo. Singulis quoque diebus manè tribus ante pastum horis, de eodem lapide cum iusculo carnis vel vino albo exhibeo : multum enim curationem lapis ille accelerat. In juvenibus vero, & qui optima corporis sanitate fruuntur, lapis ille sive per os datus, sive exteriori adhibitus minime convenit : non aures statim ab initio, neque primis diebus applicandum est prædictum emplastr. multo minus oxycroceum, ne effluxus humorum ad partem læsam sequatur : ab initio itaque postquam os fractum in situm suum repositum est, sequens applico cataplasma.

℞. Rad. consolid. maj. tormentill. bistort. an. 3ss. boli alb. 3j. balauit. 3j. nuc. cupress. gallarum, ros. rub. an. 3ij. F. omnium pulvis tenuiss. cui admisceo farinæ hordei 3vi. huius pulveris acclipe quantum opus est pro membris fracti magnitudinæ, ex quo cum postea torquetur cataplasma in mortario vel alio vase sine calore ignis, addendo vitellum ovi cum albumine, parumque olei rosace. applicetur membro fracto & renovetur ab initio, tertio vel ad summum quarto quoque die, donec symptomata non amplius sint metuenda. Tunc emplastr. Vigonis, vel meum applicari poterit, & de sexto vel decimo in decimum diem reiterari. *Gul. Fabrici. Hildanus. Cissa militæ. classis 15.*

Emplastri palmei sive Strozani qui primus ejus author fuit, hæc est descriptio.

℞. Adipis porcin. sec. & fragrantis, minit, an. 3xvi. chalcidit. ust. fed. uon ad tubedinem, aluminis usti, an. 3ij. adipis cervini 3iv. mastic. thuris in tenuiss. pulver. redacti, an. 3ij. fiat emplastr. S. Angustando bacillis siliicis & succulentis. *Gul. Fabrici. Hildanus.* in consilio de conserv. valenadine, in epistola ad Croquerum.

Curationes illas ossium contracturæ per lapidem, quem Erasius bubulolum vocat, quis non penè fabulas esse indicet ? Multo etiam magis unguentum illud, quo telorum inunctioe, vulnecui tanantur, ridiculum videatur : & tamen fide digni amici nostri utrumque sanctè asserunt. Sunt alia lexena, quæ fidem omnem superant, non tamen ideo falsæ sunt quare vehementer in his trix, & ubi ratio repugnat experientie, cum admiratione sublebo. *Andreas Dudithius, epist. 21. lib. 6. consil. & epist. Crævis & aliorum à Scholæ editorum.*

Pro fractura humeri.

Ossæ per Chirurgum reposita, emplastrum hoc adhibendum est.

℞. Farin. fabar. ciceris, hordei, farin. volatit. molendini, an. 3ss. mastic. tragacanth. gummi arab. mummiz, bol. atmen. myrtill. pulvis. an. 3ij. album. ovor. v. conquassata in vino hyppico nigro : fucci plantag. aut vini hyppici q. l. ad incorporandum. I. emplastrum. Hoc contrigit, reprecutit, robotat, & firmat. Deinde supus longas, lazas, aqua prius balneatas & expressas toti brachio circumvolvatur, & fascia latitudine quatuor digitorum, aut quandoque duobus præparatis a ligament. dicta, adjecti. femoris quatuor aor flex, interim facta restauratione, etiam pannus lineus insulus in ol. ros. prius apponatur. Deinde aliqua jam dicta, ut emplastr. supæ & ferulæ injectis fasciis ut mox est : non solvatur ad quinque dies. Interim brachium innigatur, nec non & ipsarum & loca vicina aliquo deterfivo, & sanguis detrahitur ex brachio opposito : atque ita Chirurgus procedente, ut in reliquis fracturis, hic tandem curatus est. *Petrus Fargus. obs. Chirurg.*

In principio fracturæ dislocationis & torsionis juxta Jo. de Vigo hoc medicamentum apponi potest.

℞. Album. ovor. nu. 3. ol. rosace. onphac. ol. ros. compl. an. 3x. ol. myrtill. 3ss. farin. volat. farin. hordei. an. 3vi. bol. atmen. subtiliss. triti, sang. drac. an. 3ij. M.F. Emplast. Est mirabile primis diebus. Transacto autem nono aut decimo die ; nullo contradicente symptomate, ut est dolor, apostema, pruritus, tunc supra fracturam & dislocationem utilissimum est hoc intrascriptum apponere.

℞. Albumin. ovor. nu. 4. ol. myrtill. ol. rosace. an. 3ij. rectib. clare 3iv. myrtill. al. es. an. 3ij. sang. drac. bol. arm. an. 3ss. far. volatit. 3ij. m. & utere, in fractura & dislocatione est singulari tamen. *Perr. Forest. obs. 3. lib. 8. Obs. Chirurgie.*

Ubi callus juxta magnitudinem generatus fuerit ; medicamentis roborantibus confirmandus est. Ideo tale emplastrum imponendum est.

℞. Ol. rosace. 3ij. cere 3ij. resine pulvis. 3ij. coloph. mastic. thuris, an. 3ss. nuc. cupress. rad. eustirodian. id est tibia rinctor. an. 3j. croci 3ss. M.F. ceratum, quod super lineum vel alnam extendatur, & applicetur. *Daniel Sennertus, præf. lib. 5. part. 5. cap. 1.*

De situ tibiae fracturæ.

In fracturis tibiae curandis, nonnulli Chirurgi non levem committunt errorem, cum volunt tibiae etiam insistere talo, ex qua sinuatione hæc sequitur incommoda. Primò quidem fit ut arget, temporis progressu majorem dolorem patiat in talo quam in ipsa fractura, Idque propter tendines

tendines magnos & nervosos qui talo inferuntur. Dolor autem ille multos ad se trahit humores, qui in ipsa junctura, & spatis inter ossa pedis fracta atque ligamenta retinentur. Et quia ex hac situatione venæ & arteriæ comprimentur & proinde pars affecta suo calore quodammodo destituitur; necessarii condensatione & resigescunt hi humores in ipsa junctura, & spatis inter ossa pedis. Inde curata fractura, pes novam addit molestiam; Aëre enim & difficulter movetur junctura; sequuntur & nonnunquam alia quam pessima symptomata.

Ante annos aliquot cum D. Jano Ant. Saraceno, Marco Officini, Andrea Bonetto Medicis. Doct. cutandum habui Nobil. Henricum Balbanum. In olecris nonnullis in tibia laborans ea erecta illa situatione pedis, gangrænam ad talum correptus fuit, quæ ipsi & nobis non parvas attulit molestias, ita ut tibiam abscideret: coacti fuimus. Erecta autem situatio pedis primaria hujus mali causa fuit. Primò enim dolorem tali excitavit, qui ad se humorem & sanguinem attraxit, unde consecuta est inflammatio. Secundò contusus & quasi compressus talus ex erecta illa pedis situatione. Tertiò artus & compressæ factus ea eadem situatione venæ & arteriæ, quæ per ipsum eris & tibie pulsam descendunt; ita ut sanguis & spiritus ad talum libere descendere non potuerint. Alitudo quoque tibie carentis, non parum huic fecit; differentis enim vas, innatum calidum & sanguis non possunt descendere in partem affectam, unde tandem ea resigescit & interit. Ea porò extensione vasorum, posse frangere partem affectam, ex eo intelligitur, quod equitando per frigidam tempestatem, pedes si diutius intra fulera equestria contineantur, frigeant intensissimè, si extra fulera propendant, per se ocyus intalescant. Sanguis enim & calor, patentibus ipsis vas, illico ad pedes recurrent.

Prospiciunt igitur Chirurgi, ne nimis curiosi (ut hujus artis imperiti solent) situationem hanc in fracturis tibiarum observent. Involuta autem tibia falsis & stupis, & in capsula ad id apta collocata: (ut Galenus docet Meth. Med. l. 6.) eligenda est situatio, quæ minime fit dolorosa. Itaque modò in hanc, modò in alteram partem collocanda est tibia, ut æget alius in hoc, alius in alterum latus decubare possit. Sic enim malis accidentia evitantur. *Fabricius Hildanus Observ. Chirurgicæ.*
Cent. 1.

Brachii Fractura admiranda.

Vit quidam Lugdunensis seagenatus ea archetide pleuritici in articulis humeri & cubiti deareti, jam ferè bimense spatio obus dolore torquebatur: nullis obtine remediis. solum sibi partis illius quietem impetavit, dum brachium affectum fasciâ obvolutum, & pedes innuam continuò habebat. Is alioquin sanus & valens, in pubertem horà circiter diei octavâ progressus, dum chirothecam in manum affectæ par se induere levissimò conatu adnuitur, brachii os quatuor aut quinq; digitis infra humerum transversim effregit.

Vocatus ego confestim, rem non sine admiratione conspicio, exploro & per Chirurum os ipsum testium, quæ conveniebant remedia jubeo adnovari. Elapso triduo ægrotum revisto, num appropinquasset essent omnia explorata, remoris fasciis & assulis, naturalem ossis suum rediisse vidimus, & appressis digitis percussimus. Sed ecce paulo inferius circa cubiti articulum, nova se & nondum

conspicua obtulit ossis ejusdem fractura, dolores urgent elamosi, testificationem inde sedulo incombimus. Inde placeat omnia, & nunc bellè quiescit, nondum tamen ab eo tempore explicata fasciæ; nec visum, uti se habeat pars ea. Mirum sum diu tantum ossum fragilitatem in eo homine, qui se ullis ossium affectibus, vel à lue venerea, vel àli unde contractis, laborasse permegavit. Percutitur tamen animo meo, quæcumque à veteribus medicis circa fracturas adnotata fuerant, sed nihil quod longè abissimile esset, mihi occurrebat, nà excepta historiâ, quæ apud doctissimum Joh. Schenckium, observationum rararum & admirabilium lib. 5. observ. 7. huic non valde dispar recenseretur. Hanc ab ipso auctore tibi petendam relinquo. De hoc inausito caso quid tui iudicii sit, velim si placeat, audire. *Idem Obs. 3. Observ. Chirurgicæ. ex communicatione D. Saraceni Medici Lugdunensis.*

Reverendus Dominus Wulstbrandus apud Durburgenses Cliviotum Verbi Divini Minister fidelissimus ac primarius, homo pietate, virtute & doctrinâ præstantissimus, ætatis consistentis, robustus & obelus, cum anno 1581. (si rectè memini tempore hiemali, terrâ congelatâ in proximum pagum ad agrum quendam inviscendum & consolandum ipsi abeundum, domumque redeundo ex aggrete quidam tres circiter pedes alto, delitendum esset, deatrum pedem adeo sibi torse ut fregit, ut integrum os tali actu astragali, non solum ex suo loco dimoveretur; verum etiam abruptis & abstractis ligamentis, quotum beneficio, reliquis ossibus alligatur; sibi interno malicolo per cutem ipsam etumperet, & foris propenderet. Ad ades suos & potatus, Chirurgus accersitur, is videns os omnino separatum, & fibris nonnullis tantummodo adhærens, ipsum abscidit, & ea quæ sanguinis fluxum impediuntur, plicuit.

Atque die Christi mi, Viti, Domin. Galenus Wierus, illustriss. Cliviaculum Juliacens. Montensium &c. Principis Medicus ordinarius atque primarius, & D. Cosmaslotanus pie memorie ejusdem Principis Chirurgus, præstantissimus, Preceptor meus plurimum honorandus, in consilium vocati fuerunt. Qui victum tenuem præciperent, corpus à pravus humoribus evacuaerunt, venam incluserunt, vulneri anodyna & pus momenta applicuerunt. Repellentibus item seu defensivis, ut vocant, allutunt humorum prohiberunt. Curatio difficilis fuit, dolorosa atque longa. Intetih tamen amici & quidem viti docti ipsi non defuerunt. Esi enim propulum suum Chirurum Durburgensem; nunc & in arte non mediocriter versum habebat, atamque nunc Joh. Wierus; nunc Galenus Wierus, nunc Reinetus Solenandæ, omnes prædicti Principis Doctores Medici longè celeberrimi, ipsum inviterunt, omniaque quæ necessaria videbantur præciperent. Ego quoque non raro, nà cum præstantissimo Dom. Cosmo Slotano Dusseldorpio, ad ipsum profectus fui. Sic divino solo minime tandem iam convalescit, ut & sine Scipione incedere possit, uti ego cum incedentem anno 1599. cum Colonia Durburgensem ad plium & honestum viam D. Simonem Englæstam, acane graviter motum, vocatus essem, ipseque viti. *Idem ibid.*

Quidam ex domesticis D. Samuelis Moratelli, civis Paterniacensis, vir robustus & optimo corporis habito præditus, ætatis tempore brachium sibi ad cubitum fregit. Et quia tunc temporis Basilicam profectus eram, tubicum quendam; (qui in hoc tractu præ aliis etiam exercitatus Chirurgis in fracturis ac dislocationibus repandis extollitur) ea pago proximo accersivimus. Conjur

Confix quoque mea, quia, non tard, me absente fracturas ac dislocationes repolasse, & sanitati restituerat, simul vocata fuit, ad meum quoque finem, ut domestici mei vulnus, quod fracturam comitabatur (cujus curam rusticus ille Empiricus aggredi volebat) curarent. In locum suum fracturæ repoluit, emplastrum ex pice flavâ applicuit, fasciavit, & splenis omnia deligavit, (relictis tamen foramine pro vulneris mundificatione & ne ante decimum tertium diem solverentur fasciæ, splenia, & emplastrum amoveretur, jussit, domumque se contulit. Quid sit? Alterâ die post denuo dolor supervenit qui paulatim auctus erat. Inecum domestici mei, qui vulnus quotidie curabant, ægrum & adstantes, ut emplastrum amoveretur, admonuerunt, sed frustra: Maluerunt enim impostorum quàm in arte versatorum consilium sequi, dolente tamen magis magisque aucto, tandem pariete coacti fuerunt. Præsentibus itaque D. Morazello, aliisque fide dignis hominibus, fracturæ à domesticis meis soluta, emplastroque ablata, brachium non solidum tribus in locis exulceratum offenderunt, verum etiam ferens, ut hinc inde vermes, quales in carne putrida generari solent, conspicerentur: Imposito itaque unguento nostro Ægyptiaco, & cataplasmate aliquo, putredini resistente, applicato, curationem feliciter absolverunt, brachiumque pristinae sanitati domestici mei restituerunt. *Idem ibidem.*

Sabaudus quidam, Vir Senex ac decrepitus, Genevæ in ponte Rhodani ex equo delapsus, tibiam sibi paulo supra malleolum fregit. D. Job. Griffonius mecum advocato, fracturam feliciter repoluit, omnique dolor protinus sedatus fuit. Tertiò die post, cum fracturam solvere vellemus, recubabat: aiebat enim, sibi à quodam amico, & in arte versato (erat autem ille empiricus) significatum, fracturam ante septimum diem non esse solvendam. Quinro tamen de morbi dolore exorto & propter serias admonitiones D. Griffonii, in præsentia D. Jani Ansonii Sarazeni Medici Regii, soluta fractura, pusillus mox ablivide, quæ gangrenam proximam significabant, conspectæ fuerunt. Scabificata tamen tibia, & medicamentis gangrenæ adversantibus applicatis, tandem coavaluit.

Rusticus ex pago quodam in agro Paterniacensi, sub plaustris lignis onusto, pedem aded sibi fregit, ut à junctura separatus, & minus in modum contractus esset. Advocatus ego, antequam manum adhiberem, utique opprobrium omne præcaverem, additantibus sequentia significare visum fuit. Primum etiam summa adhiberetur diligentia, curationem nihilominus, propter magnitudinem morbi, ante menses sex vix absolvi posse. Secundò quia fractura ingens, claudicationem impediri non posse. Tertiò, quia ego tum temporis cum aliis quoque ægris occupatus, necesse esse, ut ægrum ad me adducerent; Ad hæc cum parentes & adstantes consentirent, fracturam repolui, & demum tedii, expectativæ donec ægrum adducerent, sed frustra. Tanta enim superposui eos negligentia, ut ægrum apud se retinerent, neque quinquam alium quæ fascias medicamentaque mutasset, advocarent. Post itaque dies aliquot, rursus dolore acerbissimo, inflammationem item ac furore subortis, miser ille extinctus est.

Ego quoque quum in solutione fracturæ cuiusdam Nobilis Belgæ non satis diligens essem, ac à decimo quarto ulque ad vigesimum primum diem,

medicamenta nihilominus mutasse, callus aded magnus procreatus est, ut inde maxima deformitas tibi sequuta fuisset, nisi proximus callum perficimus. Quæ verò methodo id factum sit, lector ex Observat. gr. Cent. 1. colligere poterit.

Ut itaque cautè ac secutè agamus, secundo aut ad minimum tertio quoque die, Hippocrate & Galeno docente, fractura solvenda est, idque in eam finem, ne in membro, præter solum cooperio, dolor aut præteritus subortatur, neque ejus humoris qui jam parti affectæ infixus est, perspiratio prohibeatur. Post septimum, etiam si, non usque adde necesse sit toties fracturas solvere, pariterque affectionem inspicere solius sum. *Idem ibidem.*

Fractura costarum felicissima curatio.

Portò casus, quem in præcedentibus meis ad litteris promisi, talis est. Decimo novis mensis Decembris, superioris anni, interm dum ego Soloduri apud Dum. Kallenbergium ægotantium habui, quadragenarius quidam hujus urbis, Michael Hilberger nomine, Vir robustus & plethoricus, cum in propugnaculo extra urbem noctu excubiis perlustrasset, & forte fortuna super congelata terra, terd io capulum gladii cecidisset, nonam decimamque costam lateri sinistri prope spinam confregit, ita ut partes contractæ, ad exteriora vergerent. Deportatur à commisionibus ad mædes suas, quæ extra mænia sunt: ubi noctem in maximis doloribus contrivit. Summo mane cum uxor mea accersita esset, hominem in maximis angustiis invenit.

Dolor enim & pungitius & maximus erat, cum pectoris angustia & tripitandi difficultate. Præparatis omnibus quæ ad operationem necessaria erant, contracta ossa feliciter in sinum naturaliter repoluit. Torum latus oleo rosaceo inansit, & emplastrum ex farina hordei, pulvere rosarum, balsamum, nucum cupressi, gallium & tormentilla, cum posca & ovo integro confectum applicuit; ferulas quinetiam & pulvillos prout ad ossa continenda necesse esse videbantur, apposuit, omniaque convenienti ligatura constrinxit; leviter tamen. Acta enim ligatura quàm sit periculosa in fracturis costarum alia eorum ex me intellexisti. Costis contractis sic repolitis dolores reliquique symptomata protinus ex parte remiserunt. Statim quoque post repositionem costarum contractarum, haustum aque prunellæ & sionis, paribus æqualibus commixtis exhibuit. Victum quinetiam tenuissimum præscripsit. Sequenti die venam secari jussit, & de tertio in tertium diem fracturam delipavit, & curavit. Interim bis in die haustum de prædictis aquis in octavum usque diem bibendum dedit. Post decimum cum ego domum reversus fuisset, ægrum ab omni periculo liberatum reperi. Tum curationem prædictis remediis & emplastro ad fracturæ ossium, spatio quatuor hebdomadarum plenissimè & feliciter, absolvimus.

Cæterum in hac curatione annotatione dignum fuit, quod in cure ne minimum quidem iudicium, ut fieri solet, confusionis apparuerit, sed sanguis ille contritus per alvum effluxit & quidem in copia. Testatur enim ægrus, testantur & adstantes, uti quoque domestici mei, ad aliquot libras sanguinis confusi & triumphi per fecessum effluxisse; idque hoc modo.

Tertiò die cum suppositorio ducenda esset alvus, insurgit natura, & per se alvum illa res quæteve ducit, ac ultra libras tres humoris viscosi, nigricque concretæ, & excrementis mixti, respicit.

Fluxus

Fractura illæ ad sex fecundæ dies continuavit, ita tamen ut per totum bîduo, numero solum ac quantitate excrementorum viscosorum & sanguinis graviori paulatim adauscus fuerit.

Bîduo autem intermedio fluxus neque artus neque immixtus fuit, sed in eadem quantitate & numero permansit. Ultimo tandem bîduo sensum iterum decrevit, donec ad naturalem excrendi modum rursus pervenisset: visibus interum satis semper constantibus, neque anquam admodum immixtis, ut nec ager ab ulla febre infestato.

Hæc omnia domesticæ mei mecum, videlicet, Dn. Joh. Burgoverus, & Dn. Franciscus Monhemius, qui & operationi interfuerunt, diligenter observaverunt. Vides clarissime mi Domine Doctor, quam provida & sagax sit natura in conservatione suis individui, quæ meo quidem iudicio per venas & arterias lumbares, ad intestinum colon, & in partem, ubi è regione tenis sulcitur petionæo annexitur, viam sibi quaerit.

Sic, procul omni dubio advenisset, si in dextro latere fuisset contusio, id enim ante duos annos hic in fuisse quoddam, *Hans Ruff* nomine, vidi. Hic enim ex minori contusione, quam non fuerat hæc, lateris dextri, & sine ulla fractura collarum, talis sequuta est Ecthymosis, ut totum latus ab axilla ad clunem, umbilicum & spinam dorso occuparet, & maxima gravissima symptomata excitaret.

De quibus tamen tandem maxima adhibita diligentia, Deo benedicente remediis curatus fuit & satis commodè vixit, usque ad nomen huius mensis: tum inter pocula accepto colapso, cum retro in pavementum hypocausti cecidisset, & posteriori partem capitis cum aures commovisset, aliquantisper veluti exanimis remansit: ad se tamen cum redisset, surgit & ad ædes suas se confert, ubi cibum indigestum evomit. Circa primam noctis apoplexia corripitur, & sequenti die debitum naturæ persolvit. Post obitum multum sanguinis & pituitæ viscidæ per os rejectæ. *Idem Casus. j. Observatio. Chirurgæ.*

Quadragesimarius quidam, vir robustus & optimo corporis habitu præditus, domesticis peribulstris Principis ac Domine, Dom. Annæ Landgraviæ Hassiæ, &c. Commisit in Soleus, Labach; ex casu sibi patellam in transversum fregit, cum maxima contusione genu. sine vulnere tamen. Ab initio etiam ex arte curatus fuisset ager, nihilominus tamen dolores acutissimi aliæque symptomata supervenerunt. Tandem dolore, reliquique sedatis symptomatibus convalescit quidem, sed claudicatione ac iunctura imbecillitas roetus cruris sequuta est, ita ut inonissi maxima cum difficultate ambulare & tibiam, ascendendo, vix sublevarè possit. Ego ante paucos dies ex Hassia rediens, cum Fridbergæ in Wetteravia apud Dom. Georgium Fabrum, Landgraviæ Hassiæ, & castri Fridbergensis Imperialis Doctorum Medicum ordinarium; ac longè celeberrimum amicum meum singularem; per dies aliquot detentus essem; ad prædictam Domini Commisissam consilii causâ simul vocati fuimus; ubi virum istum vidimus; & quæ ipsi acciderant, ex ipso coram collegimus. Præteritissimum & nonnulla ad partes nervosâs corroborandas; sed veterat, ne frustrâ omnia adhiberentur. Occurrebant tunc ea, quæ tua Exc. l. de ossibus parte 4. cap. 4. ex Amb. Patro recenser, qui 15. cap. 22. testatur, se neminem cui patella fracta fuisset, vidisse, qui non claudicaret. Tu cum Domino Baaro ex mamas, causam claudicationis ad callum, cujus beneficio patella

fracta conceditur, referendam esse; cum videlicet capacitatem articuli subter patellam implet, inonumque articuli impedit. Esti verò opinionem hancæ rationi consentaneam esse, in dubium revocare minime conabor; unus tamen restat scrupulus, videlicet, in fracta patella, exuberantia collis talis esse possit, ut cavitatem hancæ (quæ inter femur & os tibia magna est) adedè adimpleat, ut motum actionemque genu impeditè possit? videmus enim ut plurimum in reliquis ossium fracturis; [nisi contusio ossis & periostii fuerit maxima] naturam decenter & eleganter connectere ossa, ut ratio relinquatur veltigium fracturæ. Periostium enim, quando integrum est, materiam calli tenet, quominus in exuberantiam accrescere possit, nisi ea adhibeatis, quæ ex proprietate quadam specificæ generationem calli promovent, uti ego adhuc juvenis in Belgio feci, & quidem paucos cum successu; quemadmodum videre poteris. *Centur. primæ Observat. 91.* Deinde in hoc nostro agero, callum non fuisse causam claudicationis ex sequentibus apparet; quapropter distinctione hic opus est. De quibus plura vide apud *Hildanum Observat. Chirurgicæ. Cent. 5. p. m. 435.*

Mira ossium fragilitas.

Serpissime cum admiratione legi, Vir Ampliss. ea quæ de mira & fere incredibili fragilitate ossium, cum apud Matcellum Donatum mihi lib. 52 cap. 1. scribuntur, tum etiam à temetipso, & à Dom. Joh. de Burgo observata, mihi quæ communicata, necnon *Cent. 2.* Observationum mearum inserta fuisse. Cum enim ossa partes sint corporis omnium solidissimæ, ex substantia quin etiam crassa & terrestri ita compactæ, ut etiam per multos annos illæ in ipsa terra remaneant, impossibile mihi videbatur, tam facillè ea disrumpi ac frangi posse: sed experientiæ aliter edocuit, adscribam exemplum unum aut alterum.

Superiore anno 1620. Materona quardam honesta & robusta, quæ nondum 30. annum ætatis attigerat, Dom. Philippi Thomæ, huius urbis Senatoris filia, cum quodam die circa tem familiarem occupata esset, & in ipso hypocausto fortè fortuna in pavementum cecidisset, tibiam dextram circa popliteum sibi fregit. Vocantur Babiltonides duo, qui quidem fracturam se rectè reposuisse assertuerunt, interim tamen infectus est dolor adeo magnus, aliæque symptomata adeo læva, ut quom ego septimo mense post acceptam fracturam, in consilium adhibitus essem, ipsam veluti in agone teperissem. Quapropter manum adhibere tectulavi, corroborantia tamen quædam præscripsi, & assensibus significavi, ipsam brevi finem viæ facturam. Post paucos dies paulatim, & veluti lumen cui deficit fones, exincta fuit adeo consumpsit atque extenuata, ut ossa vix cune obtegerentur. Nec mihi: propter gravissimos enim, continuos ac longos dolores & concussiones, quos ex inepta deligatione & siutatione tibie petpella fuerat, propter diuturnum item decubium, quam de universalibus toto isto tempore morbi, ne semel quidem fieter mentio, calor nativus labefactus, & humidum radicale absumptum, obstruções quinetiam quàm gravissimæ hepatis, lienis, & venarum melancolicarum sequutæ fuerunt.

Ante annum, sexagenarius quidam Solodunensis, ex Senatorio ordine, Dn. Ursus Rouchti nomine, ab aliquot annis catarrhis admodum

obnoxius fuerat, ut maius inde vitium, totiusque corporis labefactio, etiam æternarum partium, sequuta sit. Die quodam lectum egrediens, cum per cubiculum deambularet, vestelque indueret, nec non inopinato pedem dextrum non satis apte deducere, protinus in pavimentum decidit, non sine maximo dolore, alitque signis, quæ os fractum esse arguebant. Advocato Empirico quidam, cuius consilio & remediis in fracturis ossium plerique illo in loco uruntur, semel seu frangit os, ad quatuor circiter digitos, in latitudinem posuit supra genu in transversum fractum esse, repositum fuit. Reposuit quoque idem fracturam, si Empirici iactantius credendum: dolui enim verissimum signum, os non satis recte fuisse repositum, non remisit, sed potius ductus fuit, donec tandem, quum universaliter planè neglecta fuissent, exorta esset phlegmone, & ex inde ulcus circa fracturam, quapropter ad menses aliquot decumbere coactus fuit. Tandem cum utrunque restitutus videretur, & innixus sustentis per cubiculum deambulare posset, paralyti alitque gravissimis symptomatibus (de quibus posthac data occasione ad te scribam) correptus fuit, et, na nre d bium solvit. Os autem verissime fractum fuisse, testis sum ocularis. In postremis enim morbo suo, non diu ante obitum ulcus ipsum adhuc ad os usque pertatum, insuper, osque fractum fuisse, manifestè cognovi. De causis huius fragilitatis ossium inter se non conveniunt Medici: ego libentius tuam intelligam mentem, quæ imqueam hac de te impræsentiatum proferam. Vale Vir amplissime & cum tuis omnibus æternumque felicitate vive. Raptim Bernæ Helvetiorum, 18. Februar. 1731. *Idem ibidem.*

Mira femoris fractura.

Petrus Kerler Ulmenus, stricilli Murari, mense Novembri, anno 1614. Argentinæ per lapsum femur institum dupliciter transversum fregit, ut postea partibit. Adhibitis adhibendis, per semel tre teri penes Chirurgum decumbit, donec fractura consolidata, nec femore brevitate reddito respectu alterius, hac Ulmam pedes sese confetter; ac de abscessu circa locum affectum, nec non ulcere fistuloso conquereretur: adveniens itaque medicam implorat opem, ubi partem am aliquam ossis fracti distormioris istius abscissas causas statuit. Hinc igitur ulcus fistulosum ampliandum, & naturæ, quod citius ab aliena materia liberetur, succurrendum esse putavimus. His itaque continuatis tandem femoris fracti partem insignem trium digitorum transversorum longitudinem æquantem, chirurgus uoster Boulterus, 18. Augusti 1615. extraxit, non absque singulari naturæ miraculo, quæ callo tanto spatio istud intermedium in femore fractu repleverat, ut etiamnum absque claudicatione, b nē restitutus, dictas juvenis ambulet. & in longitudine huius femoris nihil quicquam decedat. Hoc pedetentim diuturno isto tempore factum fuisse test, quo semur ad longitudinem alterius solvitur à Chirurgi semper eximium fuit, particula separata interim ad intermedia musculorum spacia per naturam remora quæ postmodum abscissus sibi solisque ulceribus anam præbuit. *Gregorius Horstius operum medicorum tom. 2.*

Patella fractura à causa notata digna.

Patellam propter duritiem suam hanc frangi posse nonnulli perveris assunt. Nos verò, eandem non

solum à casu grandiori in genu frangi, expectamus; verum etiam sine casu; cuius rei historiam teculere animus est. Ante res præter propter annos visitavi cum Magistro Petr. Adriani filio, virum ista robustum, quæ è ponte descendens in terram sese ceciderat, imò pede subico, resistens, tamen quatuor pnuat in terram non fuerat prolapsus, sed ab illa resistentia transversim fracta ejus patella, & adeo quidem evidenter, ut inter utramque partem locati poverit manus, una enim supra, altera infra genu sensibatur. Fracturam, ut artus est, deligavit dictus Magister penitissimus. Quid sit Patiens, rectius dixerim impatiens, consulit esse secundo die igitur, unde incurtili post aliquot septimanas it. it. claudicans in hunc usque dicit. Mirabar olim patellæ mollem in cadavere, & duriciem ejus in seculo, & quantum hæ ab invicem differant, sit accendi cum Doct. Viro Marthæ Slado, Medicinæ Doctore Celebratissimo. Investigavimus, repetimus quæ eas duritie toto celo intere distat. Ania ergo erroris, quo nonnulli patellam frangi posse negant, exinde orta videtur, quod patellas scelerotum solum inspe erint. Quippe per excitationem ita indurantur, ut difficile sit eas frangere, recertis non item; quicunque enim utraque rite examinavit, & prius recentes extrinsecè tantum duriori lamina obductas, extrinsecè verò substantiâ osseo-spongiosâ prædiatas, iustas dispositas in cransio *Freder. Ruysch. in Observat. Anatomice Chirurgæ.*

Fractura ossium duorum carpi post tres annos nondum coacta.

Fracturam magnorum ossium, præ brachii, femoris &c. aliquando talem esse, quæ nunquam consolidetur, quantumvis in arte tractetur, noto notus est. Alii mirandum, ossis carpi, quæ admodum sunt cælia, fracta ex casu ab illo non iternum coacta. Ann. 1681. nebulonem quendam (nonne *Slagerie*) ob furum ad suspensionem condemnatum, in carcere viitavi, & in illo morbi genere antea hac fuisse vexatus interrogavi.

Vixi, inquit, & per pancreatice, & nullis fere morbis me unquam infestavit, præter febrem, quam ante aliquot annos perpassus fui: Præterea dextram, aiebat, in mensa planam reddere haud unquam potui, postquam scilicet cecidi ab alto. In huius suspensio cadavere repertis membranis hincm sibi tenem (quæ in naturali constitutione tennissima) in sui medio, dupbus in locis, ita incrassatas, ut maximi scriptoris calami crassitiem æquaret. Hanc crassitiem à progressu inflammatione ortam fuisse, dubitandum non est, quia ipsissime ab ea ita incrassati membranas observamus. An verò inflammatio ista hæc à fite supradicta aut febris ab inflammatione pro enitit, me latet. Posthac manum ejus cultro anatomico subjeci, & ex antecoribus carpi ossibus duo fracta inveni, quorum fragmenta, juncturam manus violentiâ, obacula fuerat ut manum in mania planam reddere non poverit: ut quod magis mirum est, ossa dicta à triennio fracta, nondum etiam feminata aut conjuncta nec callo obiecta, quemadmodum adhuc videtur est in nostro musæo,

De fractura tibia.

Vir triginta annorum è curru desilens fracturam passus est obliquam in medio fere ossis tibiae, ad

etiarque

aderatque cruris inæqualitas, crepitus ossis, dolor & motus inbecillitas.

Una nempe fibiæ extremitas, ob fracturam acuta in hanc, altera in illam partem vergebat, unde cruris inæqualitas, & dum illic extremitates ad se invicem allidebantur, ossis crepitus exortus est, ac dum periosæum, parietique vicinas acie sua premebant, prima doloris causa prodibatur, secunda autem tunc, quando extremitates ossis disrupti pressione sua coegebant humores, ut in tubulis partium vicinatum stagnarent, accelerent ac fibrillas irritarent.

Dum autem fibrillæ hoc pacto ab ossium acie & humoibus acidis vellicantur, spiritus animales non poterant potius in hunc quam in illum musculum determinari, sed sine discrimine prominebant ad omnes partes vellicatas, & si qui adhuc in parva quantitate ad certos musculos accidebant, eosdem tamen irritare & inflare nequibant, ob tubulos ipsorum musculorum ab humoribus stagnantibus obstructos, & si qui spiritus eodem musculos adhuc intrarent & inflarent, tamen nihil agerent aliud, quam ut unam ossis disrupti extremitatem scindentem in hanc, aliam in illam partem moverent, unde nil nisi vellicatio, pressio, novusque dolor proveniebat, atque ex his factis manifestum redditur, quæ causa extiterit inbecillitatis motus.

Ego accersitus ossi fracta statim reposui, atque uno temporis hoc agere præcipi volui, ut restituerem impeditam circulationem humorum & sanguinis, cui absque dubio hæc atque illæ etiam itagnavit, ideoque ad acidum peccans temperandum partem affectam lavi spiritu vini, in quo aliqui gammæ ammoniaci dissolutum erat, ac in eundem finem imposui emplastrum ex diaplasma, bolo, spiritu vini ac oleo camomillæ compositum, tandemque ad ossis reposita retinenda ligaturas, atque idem applicui, atque hæc per intervalla quædam renovavi, atque ita pateris intra sex septimanas iterum incressit.

Non dicam hoc in loco, quod fractura per transversum facta facilius possit reitari, quam obliqua, nec etiam, quod pro signo bonæ restitutionis in fracto tibiæ ossi plerumque habeatur, si pollex pedis directe respiciat genu, quandoquidem hæc nimis nota sunt; nec magis causam reddere conabor, cur dolor post os repositum mitigetur, quoniam liquidum est, hoc fieri, quia prima doloris causa, de qua modo locutus sum, auferretur tunc temporis, sed antequam finem explicare decrevi, quo pacto callus producat: qui ossi fracta conglutinat.

Quando sanguinis & humorum circulatio restituitur iterum tam in ossi fracto, quam alibi, tunc particula quædam ex poris arteriarum egressæ transeunt per tubulos ossis, & cum præveniant ad extremitatem ossis disrupti, amplius pergere nequeunt per lineam rectam ob tubulos à fractura interruptos, ideoque defleunt ad latera, ubi ossi & sibi invicem adherentes constituunt tandem callum, qui ossi iterum conjungit.

Callus hic in senibus & debilibus tardius generatur ob sanguinem viscosum & crassum, qui per angustos ossium tubulos transire non potest, atque ideo in tali casu crassiores sanguinis particule debent attenuari per lapidem osteocollam dragmæ pondere quoties summus, imo nocere non possit, si lapidis ejusdem pulvis committeretur etiam cum emplastro, quod externe imponitur.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Sed in ægroto nostro res longe aliter se habuit, nam callus indecoram molem excreverat, quamvis brevis imposui emplastrum de tanis cum mercuro & strictum ligaturam, ut scilicet emplastrum hoc particulas quidam calli ita attenuaret, ut avolarent, & ligatura callum ita comprimeret, ut nova apponi non possent.

Atque ita finem imponam huic observationi, postquam dixerò, quod crux ægroti semper saten- sum fuere tibi, & curam gessi, ut calx pedis ini- niaretur pulvinari parvulo, in cuius medio toramen erat, nam aliis contingere posset, sicut ex- perientia testatur, ut gangrena invaderet calcem, quia vasa & tubuli partium à longo decubitu vehementer comprimebantur.

Reperiuntur nonnulli, qui in fractura tibiæ com- mendant viscosa, quæ ego, ut noxia, rejicio, quan- doquidem in corpore se non exstente obductiones non parum augere, quæ è coacta potius diminuen- dæ forent. *John. Almy in prax. Chirurg. nationa- li.*

De Fractura tibiæ cum vulnere.

Virgo 20. annos. ictu flospei parvis globulis plumbeis onerati & continuis impetu a se nescio quo inferuntur explosi in interiori cruris parte paulo infra genu vulnus accepit, quod longe lateque egregie patebat, imo in tantum ut valmæ spatium superaret; aderatque ingens ossis tibiæ in valde par- va fragmenta distracti consurgio & comminutio, quæ se per totam vulneris longitudinem atque ossi tibiæ crassitiem extendebat; hinc dolor atrocissimus as- fugebat ægrotam, quæ ideo multas noctes insomnes transiebat, aut si per exiguum temporis interval- lum aliquando dormiret, mox vigilabat non sine summo terrore, ac quasi cum convulsione cruris vulnerati, unde ossa distracta non raro distorque- bantur.

Ossa contracta absque magna extensione repone- bantur, & fragmenta quæ ab aliis partibus pro- fusæ erant separata, soluta & libera, & vestigio blan- de eximebantur, reliquis adhuc aliquatenus adhe- rentibus relictis, donec progressu temporis separen- tur.

Tunc digestivum confectum ex thebæthina, si- tello ovi, pulvere radicis iris, aristolochiæ, myrrhæ, aliisque imponebatur cum emplastro ac lavamento a- cidum temperante; deinde adhibebatur communis li- gatura, tandemque crux affectum capsulæ lignæ in- clusum concinne collocabatur in lecto, supra quem funis suspendebatur, quo ægra corpus aliquatenus, ubi necessitas exigebat, posset exigere; ac ad pedes ægrotæ in lecto ponebatur erectus fémiculus lig- neus, ne scilicet strigulosum gravitas crud affecto aliquam crearet molestiam.

Venaesectio, quam plures commendare solent in tali casu, omnino omissa fuit, quandoquidem oi- hil utilitatis inde promanare potest, nec magis se- cundum methodum vulgarem hic in osium evocata sunt purgantia, quia hoc in malo quiete nihil ope- rabilius, atque nihil perniciosius quam motus, sed ubi ægra nonnumquam alvum exonerare tenebatur, lineum quadruplex supponebatur natis, quod al- vi excrementa excipiebat.

Pateris interea temporis comedebat cibum con- coctum haud difficilem, bibebat exercitium recen- tem ac primis lingulis vespertis assumebat blandum

Q aliquod

aliquid anodinum ad mitigandum dolorem ac tollendum illam terrorem, de quo dixi.

Ossa reponebantur, quoscunque post terrorem nodurnum reperiebantur dislocata.

Vulnus ob magnam puris copiam quotidie bis scilgibatur, atque ita progressu temporis complura fragmenta separata sunt, tuncque calli generationem ac accretionem quotidie conspeximus propullulantem, non ex medulla, sed ex ossis rubulis, valde angustis, per duos humores nutrientes ex arteriis egressis defertur.

Vulnus hoc, periculosum adhuc, intra semestrem spatium coaruit, ac paries fere iterum tam belle incessit ac obambulavit, quam fecerat, priusquam hoc vulnus infligeretur.

Simili cum successu aliam feminam eodem malo decumbentem à potu meo sanatam esse recorder; sed hæc duo exempla aliquem adeo securum reddere non oportet, ut fracturam cum vulnere parvi faciat, nam illam plurimam necem intulisse comperimus habeo; sic ubi in nosocomio Rotterodamensi aedam cum aliis quotidie per rotos ferme dies curandis plurimis vulneratis, qui ex obfisione ubis de Graaf appulerant, omnes, qui fracturâ tibiæ cum vulnere laborabant, è vita abreptos esse novi, ac inter alios unus affligebatur fracturâ tibiæ cum vulnere, in quo plurimos vermes laeos, crassos & albicantes non sine admiratione conspexi; sed unde hi vermes suas traxerunt originem? scilicet ab ovis ex aëre in vulnus delapsis, ex quibus exclusi sunt vermes, ubi quædam in humoribus stagnantibus exorta fuit fermentatio. Sic ova non paucæ ex aëre decidunt in lac, ex quo postea conficitur caseus, & quandiu hic recens est, ova non excluduntur, sed ubi caseus putrescit, hoc est, ubi fermentatio quædam progressu temporis producit in caseo, tum demum vermes prorepunt ex ovis.

Sic in valde magna ossis contusione fracturam cum vulnere eo comitante cras paulo infra genu exspiratum esse meminimus.

In fractura tibiæ cum vulnere quidam adhibere consueverunt ligaturam octodecim capium, quæ Belgicè nominatur *ten beenvoisse ligatuur*, sed nos feliciter illi sumus communi, quam bis quotidie mutavimus ob ingentem puris profluens multitudinem.

Novi chirurgum, qui loco capsulæ lignæ, de qua dixi, in usum revocat instrumentum quoddam ferreum, cui crassum affectum imponitur, & constructur ita extensum & immobile, sed illud instrumentum hic, verbis exprime: non possum.

In simplici fractura tibiæ apponantur plerumque ferulæ ex charta crassa confectæ; illæ verò in nostra ægrota profusus omitebantur, quia in vulnere tam vasto minime videbantur convenire.

Digestivo nostro, quod vulnere imponebatur, nulla admiscebatur pinguedo ob ossa demodata, nam quod pinguedo nocet ossibus experientia abunde testatur, ejusque rationem reddidimus antea.

Patrus de praxi chirurgica bene meritus est, multumque habuit experientiæ, atramentum perspetam in fractura cum vulnere commendat asstringentia, quæ quare & quantum noceant, sæpius diximus. Non puto autem, aliquem in malam partem interpretaturam, quod tantum vicum andream reprobendam, nam quod clarior est aliquis, eo periculosiores sunt ejusdem errores, quia plurimi sola auctoritate tanti viri permoti, exco quodam imperu eandem sequuntur, euntes quæ scum est, non quæ con-

Notandum est callum difficillime produci in fracturis gravidarum & lactantium; quia materia idonea à foetu aut infante callo subducitur. Sic Fabricius Hildanus refert in Cent. 5. Observat. 87. quod hæc de causa in fractura tibiæ cum vulnere vigesima tertia septimana ossa adhuc vacillarent.

In fractura tam simplici quam composita, ubi callus ossa contra fracturam conjungit, ægi plerumque molestiam quandam perferunt in motu, quod contingit, quia callus recens generatus occupat locum musculorum hanc aut illam partem moventium.

Antequam huic observationi finem imponam, duo problemata valde intricata, extricanda superesse mihi videntur; primum est, quare ossa, dum hiems est serena, facilius ac citius distinguantur, quam alio quovis tempore; alterum verò, unde proveniat terror post somnum brevem ægros tam simplici quam composita fractura laborantes plerumque invadens.

Ad primum aliqui fortasse responderent, glabrietem glaciæ effluere ut homines sæpius prolabantur in terram atque hoc pacto facili venire, ut ossa disrumpantur; verumtamen verò hoc nodum non solvit, hoc difficultatem nondum tollit, nam ossa non tantum, sed & ferum, lignum aliæque dura corpora brumali quàm alio quovis tempore facilius disrumpuntur. Unde igitur hoc contingit? dicam, ausulta pauciper. Quo partes corporum durorum perinacitas & firmis conjunguntur inter se, eo difficilissimum distinguantur; hoc certum est: sed quoniam est illud, quod in partibus durorum corporum efficit coherentiam: non quies, ut quidam opinantur, quoniam illa non est aliquid positivum in corpore, sed tantum privatio motus, ideoque hoc effectum non producit quies, sed ær comprimens partes durorum corporum conjungit ac coherere facit, ut patet ex experimento in observatione septima retro decadis citato; ær autem, dum æstas est, magis premittit quàm media hieme, partim quia tum temporis à calore solis validius agitatur, partim quia tunc gravior existit ac admittit plurimos vapores ab ardente sole sursum propullos; atque hic jam manifestum evadit, quare ossa aliæque dura corpora hiemali tempore facilius frangantur quàm æstate; hinc etiam facili colligi potest, quare ligna in foco multo citius comburantur, cum rigida premimur hieme, quæ dum æstas fruius æstate; nimirum ær brumalis debiliore sua pressione non valde perinaciter particulas ligni conjungere potest, unde hæc particule à ligni corpore facili separantur, dum vim patiuntur à particulis quibusdam terrestribus soli materie mundi subtilissimæ inasautibus, ideoque rapidissime agitantur. Huc accedit, quod ær hiemalis, ut potest minus premens & pauciores continens, flammam liberius divagari permittit.

Veniamus jam ad alterum problema, quo quaeritur, unde oriatur terror in somno, non autem in vigilia, ægros ossis fracturam patientes invadens, ac ossa disrumpata non raro iterum dislocantur.

Patrus magnâ experientiâ in arte chirurgica locupletatus, qui ipse aliquando fracturam tibiæ ac fibulæ cum vulnere passus est, ac in proprio corpore hunc terrorem vivide suis perferent, ut ait, hujus phenomenon rationem reddere conatur in capite vigesimo sexto libri agentis de fracturis, sed misere philosophatur ibidem, non nisi rugas ac chimæras in medium profert.

Videamus

Videamus igitur, num nos rationem magis verosimilem afferre valeamus; tentabimus saltem. Ubi vigilanti agroti, videtur, audiunt, edunt, bibunt, agitant brachia atque hinc modo multum succi net vel consumunt, sic ut ille haud adeo magnā copiam profusum in partes irritatas ex cerebro, sed cum somno sua membra demulcent agri, loquē aliter se res habet. Antea non audirent nisi temporis, oculi ocellati sunt, nates confuso nigredo non vacant, lingua filit, brachia quiescent; ubi igitur illo tempore humores circa fracturam tibie stagnantes ac coactos diffensione sua siccillat affectum molliam, ac eadem scissione sua irritant, tunc inquam, succus nervus, qui jam ad negotia in vigilia peragenda non impenditur, magnā copia prolabitur in mactulos irritatos, qui hinc pacto insani erus vehementer movent, ac unam offisi diffusi extensitatem in hanc, alteram in illam partem miserē distillant, unde dolor satis atrox exoritur, & sic patiens post brevem somnum non sine terrore expersgillat. Ut autem hujus phænomeni rationem, quam tibi, facillius fidem adhibere, consilium iudico, ut ad punctula verba sequentia attendas. Dum vigis & vigilas, dum vehicula ruz feminatiz multum fecundis seminis continent, imagnatiz, quam vidē poteris, pulcherrimam quandam puellam, hoc pacto tamen te semen ejaculaturum non optat, nisi alia moliaris; verum si tibi somno placido finem aut imaginationem obversetur haud iniquis formae puella, & si interea temporis vesiculae ruz feminis suis diffentia sint, semen non raro summa cum voluptate hoc pacto prolabitur, quā scilicet vesiculae feminatiz valde contrahuntur a succo utero, qui magnā copia, dum dormis, a cerebro in vesiculas feminatiz a femine diffentat & valde irritatas defertur, quia jam non impenditur ad alia per multa negotia, dum vigilas, peragenda.

Sic ovi doli Epilepticos, qui nunquam, dum vigilat, sed semper, ubi somno sepulsi jacent, patosissimo corripuntur, quod sementiam meam non parum confirmat, idem idem.

Fractura tibiae & fibulae cum vulnere.

Filius Domitii N. N. quatuordecim annorum, cum facili ludens, tibiam & fibulam dextram confregit, ita ut profundissima haec ossi musculorum Castoreum & talem cum ventis quibusdam petuolus: per exten in per primarios foras & in aquila hujus decursum erat, usque dum utraque manu Chiturgus membrum comprehensum ad pishiam figuram rediit, & impellendo hinc inde, ante, retro, ad latera extantes partes, in suas concavitates, & pishias sedis rediit; quo doli magna ex parte cessavit, osque fractum in superficie aequalitatem adiecit, & raro membro simile reddiit est; vulnere tom imposte Cetorum Galii, & desuper emplastrum adstringens, deliquit pedem fasciā tres ferme diuas mutatas longa, ter fracturam circumvolvendo, & versus genu sinendo, aliamdein fasciam ostēdo pedi bis circumdixit, versus malleolum sinendo; Hic fasciis impostis compressis per transveriam & pishia membri longitudinem, ut inaequalitas omnis caveatur, & deligatio super fracturam firmetur: propterea compressis has epideismo retinuit, & Syndesmo theca chartacea munivit, tandem pedem dextrum, ut calcaneum ab omni compressione liber fuere, capsula lignea impostit. Modus hic deligationis per duas hebdomadas continuatus fuit; post instituta a fasciis fasciatio octiduum

Bibl. Chirurg. Tom. II.

capitum dicta, ob copiam puris, & crebre patiens inspectionem: post tertiam hebdomadam in melius profectus est ager, calloque fracturae conglutinata, & perfunata.

In fracturis ruz sanandis Chirurgus officio suo nequitiam satisfecisse dicendum est, si ossi ab invicem disjuncta rite iterum coaptaverit, cum & eadem debite ligando ac tependo, ut concreverit denovo queant, apta reddere teneatur, non solum coalescentiam aliis impediens, sed pluribus etiam aliis incommoda argum expulsiurus; quae inter sphaeculus crudellissime eundem & vita tollere valet, cuius exemplum, praeterep Epilepticum nosti. cutiol. dec. 1. ann. 2. obf. 248. Phil. Hochstetterus decad. 3. obferv. med. cas. 7. exhibuit, ubi cruris fracti ab impudente facta artiori ligatura sphaeculum descripsit; qualem etiam in alio calcaneo non tite collocatus concitaverat, quem sistit Joh. Hellyvigius obferv. med. 154. Prour vicissim a xaminis ligatura coalescentiam offum impidiri, Joh. M. xeramus cap. 68. obferv. chirurg. nos immerito admonet. Scilicet fasciae membri partes diffusas iterumque in naturalem suam locatiz, conservare in eodem debent, quo ita particulae glutinosae exsudantes, ossum alimento aliis solentur, te invicem constringere atque coagulare, callum constituere queant, unde laxiori ligatura extensitatem ossium fractorum & loco suo moveri facile cum possit, uno sperata impeditur: & e contra si striciori ligatura, aut inconcinna reposhione spiritibus animalibus ac sanguini aditus redditusque, compressis scilicet nervis & arteriis, denegetur, partem tandem emangi necesse est. Gluten verò illud nutritium & sanguine deposit, particulae ille viscosae, in ejus sero abundantes probabile reddunt, ut ita a nervis illud spectare, cum aliis, haud opus habeamus. D. Joh. de Adralto.

Fractura costae & cruris in gravida.

Anno Christi 1681. die 29. Decembris, honesta matrona, Dn. Naurath, t. t. Praefecti in Dirmshaus trans Rhenum, Uxor, io glacie cecidit adeo periculosa, ut in dextro latere transieret costam, io sinistro utrumque focile cruris paulo supra malleolum; nihilominus (ne jam a semetipso esset gravida) rite curabatur utraque fractura intra tres menses; donec tandem feliciter enixa esset factum, qui adhuc tum ultra triennium superstitis est. D. Georgii Franci.

De miro effectu tabaci in fractura femoris cum vulnere.

Chirurgus mihi notissimus, & a mea directione dependens, curationem suscepit quidam juvenis Rustici, cui in terram lapso femur dextrum a rota curcus onusti ita contusum & coarctum fuit, ut caro musculosa denudata ab ossibus quasi disjuncta ceciderit. Diu adum fuit manifestantibus, siccantibus, scarificis, epuloticis; sed continuus humorum affluxus omne operam & vim medicamentorum eludit. Pulverem tabaci, utpote herbae vulneratiz asperit parti laesa, sed vix hoc factu, patiens ad eorum vomitum fuit concitatus. Retulit mihi inopinum hoc symptoma praedictus Chirurgus, quod ex naturali causa forsitan ortum suspicatus, iussit ut inspectionem hujus pulveris

Q 2

repereret;

repereret; Dictum factum, semper infestationem immediate sequebatur vomitio. An vellicando nervos, hæc anacardis excitata? utrumque videtur probabile; totum enim corpus, ex doctrina Hippocratis, & ab experientia unguentorum Mercurialium, est conspirabile & confusibile.

Fartor equidem & mihi stomachum moveri, si odorem fumi tabaci naribus etiam à longè excipiam. Eliminarem sanè & proferberem ex toto medico hanc herbam; si in mea potestate foret, propter tot nocumenta, quæ à Simone Pauli Commentar. de abusu tabaci allata sunt; sed nolo offendere Clarissimos Viros, Thomam Bartholinum & Diemerbroekium, quos esse tabacophilos testentur; illius Consilium de anat. pract. fol. 18. hujus verò tract. de peste Cuique placet fumus odorque suus. *D. Adami à Leberowald.*

Herba Osisfrage

Fertur in Norvegia nostra plantæ cotinidam osisfrage vis singularis emolliendi ossa fumentotum, quæ illa vescuntur. Et quod mirum ex eadem incolæ unguentum conficiunt pro ossibus glutinandis, Sulphuratur D. Simon Pauli noster, mercurii vel plumbi subesse mineram, dedique id negotii petitis loci Stenifil. Rex noster, ut de veritate inquirant, & quid terra illa, ubi plana nascitur, sine suo oculi condas. Quicquid rescivero posthac scribam. Vidi plantam siccam apud Clar. Borrichium Collegam, quæ proprius ad junctum accedere mihi visa est D. Barthol. in litter. ad D. Sachsum misiss.

[Herbam hanc à nemine Botanico compendiatam vocat Gramen Norveg. *valpigg, osisfrage*. Ex D. Simon. Pauli Prof. Regius. Hafnens. in quadripart. novæ edit. clas. 4. pag. 519. Norvegiis dicitur *Reygras*. Herbam istam secum anno 1641. è Norvegia primùm adduxit D. Jacob. Fabricius Med. R. Christiani IV. narravitque eidem Generol. D. Janne Bielke Rega. Norveg. Cancellarius compertum esse ejusdem herbe efficaciam, ut si boves eo vescerentur, ipsos usque ad ambulandum fieri inepros, ut elumbes viderentur, nec velligium facere possint. Imo ut *Gerg. Arichvén* Generalis Major Philobotanica, retulit in litteris ad D. Simon. Pauli, adeo ossa mollescent, & conteruntur, ut baculo possit quasi circumvolvi animal, non tamen moriunt, sed curari potest, si ipsi ossa exhibeantur alterius animalis, hujus herbe esu perempti. Conjecturam facit D. Simon Pauli pag. 532. dellescere fortè ibi, ubi crescit herba hæc, in istis terræ visceribus mineram saturati vel mercur, currentis, quæ secundum Kircher. art. magnet. l. 3. p. 5. c. 3. omnes plantæ alimentum vetè magnetici ex terra trahant & naturam metalli supra quod creverint assumant. Contra meminit Jacob Bontius J.V. med. Indor. cap. 33. f. 86. herbæ, quæ semen ferit instar hordei, sed nigrius & hirsutius in Malacca & Continentis quibusdam Indiæ locis crescentis, quæ ossa adeo firma & roborat, ut si ejus succo solummodo dentes imbuantur, silicem in polinem redigere possint. *Thom. Baribolini.*

De gramine osisfrage.

Graminis hujus originem Norvegiæ debemus, quod ea virtute vel malignitate præditum dicitur, ut jumenta, quæ vescuntur, enervet, ad motum inepta reddat, ut velut exollata videantur. Hinc

conjectura ingeniosa suppicatur Celeberrimus noster D. Simon Pauli, magnum illud decus & anaromæ decus, subesse illis locis, ubi geminat herba, sodinas vel plumbi vel argenti vivi, unde vitum hoc ossifraga herba trahat. De quo argumento evidenter epistolam ad me publice laudatus magno suo merito Senex exaravit, ex qua excerptam quæ ad hoc negotium spectat, ut Lectoribus curiosis satisfiat: Ita vero ille:

Potèrò, Celebratissime Bartholine, vicio minime mihi videretur, si insuper graviter ac oblinare, te exorare contendam, consilio, studio, operâ ruis, mihi non des, sed ut defesso Atlanti, impiger succellat Hercules? ita tu mihi in Statine mea succellor, patriæ in honorem & commodum, suppetias fetas; & pluvibus te rogemus hæc omnia, nisi scires, Ciceronem à Platone prædare scripturam putare in officiis: quod non nobis solum nati sumus, sed ortus nostri partem patriæ sibi vendicat, hinc eundem quoque statere, quod omnis o. niam caritates patriæ una complectatur, pro qua quis bonus dubitaret mortem opperire, si ei sit profuturus? Quæ cum ita se habeant, egoque compluribus abhinc annis in eam devotum sententiam, & adhuc in ei permancam, cetero quodam in tractu Norvegiæ, novo & in-udito exemplo, dellescere fodina vel plumbi vel argenti vivi; æque ac prædem Dei gratiæ omni populo innotuit, argentum aliæque metalla in ea reperti ac effudi; quæ omnia Celeberrimus Joh. Laurentius, populis meus, quæ Poëta ad Maronis, quæ Mathematici ad Euclidis famam pergens, suo Heroico, meo honore dicato, cum horam meam Danico idiomate 1648. publici jure facerem, universo orbi asseverare studui. Atque interim non immerito, meæ conjecturæ, de inveniendis plumbo ac argento vivo, in Norvegiæ & occasionem & rationem præstiterit exigit? Nisi ergo grave molestumque tibi, perdocte Bartholine fuerit, quamnam partem quadripartiti mei botanici posterioris editionis, & quidem in ea historiam grandis evolvere (hæc alios librorum qui es, si tam honesta in te, hoc loquendi modo cum Cicerone aut mihi liceat) unque nullus dubito, quin illic exacto & persolito judicio suo abunde satisfaciat, præsertim cum Nobilissime Europæ Nationes (quas Inter Gallicam & Britannicam recenset) studium hoc meum sive collaudent sive tacite approhent; Sed in fidem priorum omnium Nobilissimi ac maxime strenui Domini Georgii Reichsvén, natione Catti, chiliarchæ literas, Germanico Idiomate ad me dadas, ex meo quadripartito hæc accersam, quæ meritisimo, cum adhuc supercellet, ad civem appellas Diocleidem, adeo subiectus eras, non solum in militari disciplina, sed quoque Botanico studio, ita ut si nonnullis Medicinæ Candidatis, negotium facillime ipsi placuisset, herbam illi ultro ei portassent, & quidem presso pollice. Sed linguam hæc illius verò ad me datarum literarum verba ita habent (Latine versa in gratiam exteriorum.)

Honoratissime Dom. D. Simon Pauli. Quandoquidem editum herbarium tuum perveni, Intellexique Te D. Doctorem, Herbarum apprime esse peritum, & ex Te ipso audivi plura meditari hæc illius verò ad me datarum literarum verba de eis in publicam lucem profectendis: reterere non possum multas in hoc regno elegantes & mirandas species inventiri, quarum quædam quidem cum aliis conveniunt, sed singulari figura & colore, aliæque verò proprias rare, & me consilio (qui tamen in juventute in a. istius sibi diu maximam culturam, plurimisque

cultor sui, plurimisque cum Medicis præclaris familiariter contraxi, meque ex parte in iis exercui, & adhuc data occasione & temporis opportunitate summopere oblector & rectro, à nullo descriptæ anquam. Inter alias, duas species tibi conatabo, & quod fieri potest describam, & futuro anno, si Deus vitam protogaverit, & valitudinem indulserit, ad vivum depictas & compatas, vel etiam, si possibile, recteque & vivis me missurum promitto, quia huc tempore haberi non possunt, cum distitis abhinc locis crescant, sexaginta circiter leuca, neque alia negotia impediunt, quinominus illas affert ad me jubent, nec enim libenter uniuersique revelarent.

Prima species similis est apio risus, sed radices habet crassas & nodosas, iuxta radicum seu rapum rosfeldianarum. Si belia, ut cignus, vacca, bos, ovia, vel potius illam deovent, (cujus tamen apparet etiam, unde russici ubi hæc herba crescit, ista loca circum septime in quibus copiose luxuriat) statim moritur, & distumpitur, venenam quæ quoque tam vehemens, ut avia si cadaver inolet, pariter concidat confectum, & si inde repellatur, statim ex arte decidat morantemque, hanc plantam incolæ hujus regionis, appellant, *Sylvestrabæ*.

Alterius speciei hæc est historia: gramen est, longis acutisque foliis instans. Si eo pecudes vescantur, sicut de priori dictum, confingit & conterit illis statim omnia ossa, ita ut ossa fracta intra pellem circa bacillam circumvolvi possint, non statim tamen expirant, sed curari possunt, si illis exhibeantur ossa confusa alterius, autem his ex usu hujus herbe moriunt. Hinc etiam fucolæ sedulo provident; ut semper in promptu habeant hanc medicinam. Saepe hinc pla-tam beatus Dn. Cancellarius Jan. Bielecke & ego habuimus, qui nomen ossifragi illi dedidit & imposuit. Quando ad manus tuas pervenerit ipsa planta, de ea ostentia inquires, ejusque decentem anatonem ipse suscipies. Christianæ 24. Augusti anno 1661.

Posthabita ergo tanunculi venenata specie, contra illa graminis maxime meretur eius ut hic loci habeatur ratio, quam Percussit ad Generos Meiol ac Dn. D. Jano Bielecke, Norvegici Regni quondam Cancellario dignissimo, elegantius mecastor, ingentis & effectui illius conveniunt Vo-abulo, Gramen ossifragum appellare alibi: reu qui periclitissimus non literarum solum, sed insuper quoque rei herbariæ ac medicæ erat: quin & ille, in utriusque his septem telonibus subijedis regnis; suam senectutem istem stidius hoc seculo hæc oblectavit, ac multis retro actis seculis Orientales sive Reges sive Reginas se oblectasse accipimus; hinc ego sequens incomparabilis rerum naturalium indagatoris Athanasi Kischeri, è societate Jesu Conclonatoris, aliorumque cruditorum vestigia, ac postis illorum rationes & observationes, scilicet; in terræ visceribus profundis in Norvegia deliteret vel plumbum vel argentum vivum, quo quorum minerales exhalationes, cum utraque insidissimæ nervis sunt, jumenta veluti ement, dum pascuntur hoc gramine ossifrago eo in tractu, ubi alma marem terra, veluti ex gremio suo, hoc genua graminis, in jagia vel hariolor, profert, ne ergo te, cruciellissime Polyhistor, te compello Bartholine, amicorum intime, æque ac me ipsum pro te nata male habet, quod Nob. D. Georgio Reichvein, verbulo non meminerit tractus istius Norvegiæ, ubi ho. graminis genus pubescit ante pulsat, sed solum ad me scribat loca illa circiter 60. milliaribus Christianis distare, Dolendum sane ob publica commoda, hunc

prisca virtute & fide Virum, ocyus vitæ præsumentis foz, quam in tem ea confere possit, qui in suis ad me datis literis mihi pollicens est: adovenum illud nostri Hippoc. occasione præcipiem, ac pindari quoque illud; hominea quotidie eum arhorum folia cadere. Quæ cum ita se habeant, jam nostrum est, ut pro te nata Christophorum Columbum imitemur. Qui sic inquit? ut enim ille ratione & sagaci conjectura, æterna sui laude Americam sive primus invenit, sive detexit, ita adderet graminis ossifragi subsidio; nondum detectas, sive plumbi, sive argenti vivi fodinas, in muscis nostris luescentes, conjectura, ratione non cassa, indagat ac affiqui, mor talium nostra, Deo fortunante, dicta metalla veluti effodere. Etenim nullas dubito, cum aliquot exemplaria typis expressa hujus mentis epist. nomini ac honori tuo dicar, Christianiam, Bergas, Stavagiam, Nidrosiam aut Dronhemium, data in tem oportunitate, mittere mediet, ut in Norvegia & præteritum celeberrimis his emporis, distrahantur & divulgentur; Quia Reverendi D. Episcopi, Pastores, Vestri Divini Ministri, ac alii honesti Viri, passim in Nob. Septentrionali hoc Regno habitantes, ubi intellexerint, quam pericacis studio ac opera contendam, alteri huc parit, in qua quidem educatur, tu verbi Celeberrime Bartholine, natus es, prodesse, nobiscum sagaciter loca illa indagare, aut requirere in istos tractus occipiant, ubi gramen ossifragum germinet, tibi verò amabilissime Bartholine, Domine Collega, Assinia ac Computar honoratissime, cum plura rocam præ me, vel notis vel almitate junci sunt, proin q. ælo te, publico hoc in negotio, tradamus opetas matras, ego publicis his ad te davis literis, tu ad mea privatim davis. Ego inserim hic loci, priscam aut more majorum, acclamo feliciter! &c.

- Plura senis discreti & erudit. D. Simoni Pauli verba, in epistola parametica publici legi possunt, quo Lectorem amando, ut ad ipsam tem veniam quam nos curare per amicitiam intinam pro publico bono publici amantissimi fatigat.

Ne votis tanti Viri deesset, cum ille ad Episcopos Christianiensem & Nidrosiensem litteras cum sua parametica epistola mitteret, ego ad Episcopos Stavagiensem & Bergenensem commissum negocium cum officiosis literis deruli, ut & per singulas Reges Norvegiæ discretos exquiri sedulo possit, an in locis, ubi gramen ossifragum provenit, minera aliqua plumbi vel argenti vivi enatur. Revertitatem tempus aperiet, quo suspicio Magni Viri roboretur. Certe probabiliter non levi se tuerit, cum plerumque herba locorum suorum vim reddant, & qualem ex terra succum quæhor, talem vescentibus præbent, sibi que afficiunt, apud Achillem Tarium elegans locua occurrit lib. 4. de Cloroph. & Leucip. Amor. de Elephante bene olens te, quia vescinat nigri rosi. Autorea verba hæc sunt libro donata: Indurum fons est, quem nigram rosam vocant. Hæc elephantes vescuntur, quemadmodum, gramine apud nos boves. Igne à primo fere ortu pabulo ejusmo. i enutrit bellua cibo similem odorem reddi, halitumque odoratissimum ac imm, ubi ei stielis fons est, illar ad equis quæ hæc designari Salmasius in notis docet per rosam nigram, quæ in India ex Græco nomine, folia sunt, in Græcia flores nigri. Quale igitur alimentum, talis corporis habitus. Alio vescentes Orientales, hileum olent. Venenatis herbis pascit puella, Alexandrum inficere possit. Purgantibus usum, lac purgatram exhibet. Rosmarino, thymo, Q. ali.que

aliqui odoratis herbis pasta oves in Provincia Narbonneis lapidissimas carnes nobis exhibuerunt. Infinita in eam rem exempla suppetunt. Herbas denique ex terræ visceribus imprægnari tam notum, quam olim Martis lucas. Hinc uvæ Aurelianenses ex sulphureo solo infames cum succo suo ex menta Regia exsulant. Vinum quoque alfaricum glebæ suæ gravitate notum calculosus efficit. Ne plura exempla afferam, sufficit, quia de mineralibus sermo est, Pechlini, nuperi de purgantibus scripseris secundum, observatio, qui ex relatione Nicolai de Pont Medici Colonienfis, scribit offensatam fuisse Lugduni Baravorum arboris patriculam vivo obitum mercurio: posse quoque pessilentem afflicti auram à metallis partibus ex eo constare, quod in Polonia in graminum radices irepere vivum mercurium testetur Beguinus, & in Dalmacia arborum truncis infillatum mobile metallum oculorum se judicio agnovisse testetur Chymici. Simile quid in Norrvagia metallis forunda pari potest gramen Olfissagum, ne non tam ossa pecudum, quam nervi, quibus mercurius vivas inimicus est, afficiuntur, tendinesque contrahantur. Sunt, fœtor, etiam exvegetabilium classe, quæ ossa emolliunt, folia nempe cicute vesicentibus caproper excoctis, hinc pro callo ossis emolliendo tale remedium proponit Chalmereus l. 4. Enchirid. Chirurg. c.

Æ. Fol. cicut. m. xv. f. decoct. pro foru. Folia terrarum cum æruginis fœcula vel gallinacea, fœcata: ista post forum applicandum. Aut verò ossa pecudum ab esu graminis ossifragi ita emolliantur ut fragilia sint, sicut narrat Reicovveinius, vel potius nervi debilitentur, quod verò sit mihi similis, & suspicatur quoque experientissimus noster D. Simon Pauli, accuratiorum relationes, quas ex Norrvagia expectamus, edocebunt. De his aliisque ad ossifragum gramen spectantibus dum solliciti cogitarem, ecce viderem graminis historiam Bergis Norrvægorum ad Amplissimum Virum D. Rotlinum, in Collegio Commerciorum assessorum bene meritum, Hafniam transmisit Excellentissimus Medicus D. Joh. Frid. Treublerus, amicis noster, cujus Viri in Re Medica versatissimi, adeoque fide pleniorationem hic subjungam, ut ab omnibus intelligatur, laudis consuetudine donatam.

Micro una caulem graminis desiderari in frusta quod dissectum, ut angustia epistolæ caperetur, quod rustici nostri (quorum non paucos hac de re examinavi) *Sorregras*, flores flavos jam amissos, plenum seminibus adhuc tamen immaturis. Locis paludosis & humidis crescit inter alia dumea prope omnes villas colonorum, Primum gramen est, quod vere prodit, unde avida sunt pecora ad decerpendum, quam primum verò alia gramina copiosius prodierint, hoc gramen avertantur, forsitan propter caulem durissimum. Ex esu hujus pecora male habent; macie confecta, spina ægri exta protuberante, (unde rustici dicunt, quod dorsum sit factum,) pedibus ossibusque debilibus, ut ægerimè incedere queant. Quod autem prostris mollia sunt ossa, vix fieri potest, alioquin omnia animalia perirent, & humi posternerentur. Pro aridoto rustici semper habent exsiccata ossa in promtu, quæ quotannis conservant ad hunc usum, quando carne prius ablata usi sunt, eadem quoque ossa in plateis & adibus colligunt, quæ exsiccata in parva frusta confringunt, & mox ab animalibus magno appetitu in minima dentibus comminuta devorant, unde quasi salivatio subsequitur, multumque aquæ ex ore profuit, ut statim melius habeant pe-

cora, & protius convalescant. Aliqui pro remedio in pharmacopolis emunt radicem tormentillæ; plerique tamen & pene omnes ossibus acquiescunt. Videtur (quæ rustici rationem nullam dare solent) quod pecora plerumque primo vere, terrâ adhuc humoribus nimis fœtâ, ex hoc gramine præcoci tantam in se humiditatem superfluum sorbeant & devorant, quæ deinde per ossa exsiccati debet. Unicusque tamen suum relinquendum, Ad suscitandum curiosum animo, gramen hoc in particula terræ, in qua crescit, servavi, & in vase collocari jussi, idque juveni cuidam Pastori Jano Daniellus tradidi, cujus navicula in portu medio milliari hinc disisto hæret Hafniam cogitans, adunisque particulam graminis ipsius in charta configuratam, ut petitioni satisfacerem.

Tandem de gramine ad amicum laudatum perscripsit Dn. Treublerus, magus cum sua medicum Artem Bergis exerceans, ut plenam ex illo graminis ossifragi historiam jam habeamus, cui nihil addi potest, nisi uberior subreptæ rationem investigatio, ut de mercurio vel plumbo forsitan lateant, vertiores sumus. Ex salivatione subsequente suspitionem suam de mercurio confirmari credit Dn. Simon Pauli. Quam tamen nimis graminis devorati humiditati ascribit D. Treublerus, per ossa exsiccatæ. Sola quidem humiditas herbe ista symptomata inducere non videtur, quæ patiuntur pecora, nisi alia maligna quædam adiungatur ex quocunque principio derivanda, quod dies docebit. Figuram graminis integram confeci ex frustis à Treublero missis, & ex aliis non ita pridem mihi à Cl. D. Borrichio communicatis, accuratorem daturus cum ex confecto D. Treublerus vos miserit integra herba terræ suæ immerita conspiciam.

Idem D. Treublerus 24. Octobr. 1673. huc porro ad amicum laudatum scripsit: de gramine hoc tantum testat ut dicam, copiosum in omnibus villis reperi, mihi quæ affuisse duos Chirurgos cum plantam hanc in menta mea reperiissem, qui existimabant esse Centaurium minus, assuebantque diu pro ista herba se in vitiis suis traxisse, nec exinde quidquam mali profuissse. Unde non video ex gramine vel herba, provenire Januinum, sed ex humiditate, sicut antea dictum. Idem *idem*.

De Gramine Ossifrago.

Quocunque de Gramine Ossifrago dici poterant in Actorem nostrorum Volum. II. absolviatur. Pauca hic reliqua commemorabimus. Competimus exinde non in Norrvægia tantum istam plantam provenire, sed et Chibria quoque nostra luxuriare in locis paludosis, & sine ullo damno à jumentis consumi, ut credere fas sit plantæ hujus naturam, sicut aliarum, variare pro locorum diversitate & climatum conditione. Ingentem copiam exsiccatæ plantæ ad nos ex Chibria nuper attulit Pharmacopæus Urbis petitiſſimus Christophorus Heiford Senior, ut omnibus curiosis satisfaceret. Forma florum elegantissimorum eadem est, quam figurâ expressimus ad Obſerv. 43. Volum. II. nisi quod in acumen magis desinunt, & densiores sint. Centaurium non male referunt colore sanguato. Experimentum decantatæ virtutis emolliendorum ossium frustra in brutis nostris tentavimus. Fors in exsiccatæ plantæ, qualis ad nos delata fuit, cum olea volatili, vis expiravit, quæmadmodum in nonnullis aliis, ut rura similibusque exsiccatis evenit.

Meminerunt Curiosi Parisienses in Diatio, Euditorum, quod *Journal des Sçavans* vocant, Anni 1675, hujus plantæ ex nostris Actis, sed non satis mentem nostram videatur affecit, digni tamen omni laude, quod tanto judicio seligant ex variorum scriptis quæ & prodicisse possint & delectare curiosum Lectorem.

Ita verò illi pag. 192. §. 3. de nostra herba ex nostris Actis scribunt.

Ce qu'il dit (aſſ. Bartholin.) d'une autre eſpece d'herbe qui vient auſſi de la Norvegue, & qu'il appelle eſſifragum, eſt encore particulier. Car il aſſure que quand les chari en ont mangé, les os de leurs jambes ſembleront ſortir de leur peau, & ils ne ſçauroient marcher en cet état. Pour les guerir en leur donne de os ſecs & broyez ce qui leur excite une grande ſalivation qui les guerit enſuy. Et il croit qu'après cette guerison une vapeur mercurielle ou quelque autre vapeur maline paſſe dans cette herbe.

H. e. Id quod natrat (Bartholinus) de alia specie herbæ ex Norvegia advectæ quam *Oſſifragam* appellat, ſingulari quoque eſt. Nam ille aſſumat ſi ſolæ eam comedant, oſſa pedis videri extra pellem prodire, ut occurrent tali ſtatu incedere. Pro curatione illis exhiberi oſſa ſecata contrita, quibus ſalivatio ſuccedit ingens, qua tandem cunctetur. Ceditque petachæ hac curatione vaporem quoddam mercurialem vel alium vaporem malignum traouit in herbam hanc.

Felus) De felibus quæ herbis non veſcuntur, nihil dixi, ſed aliis pecoribus animalibuſque in paſcuis herbas decerpere ſolent.

Oſſa extra pellem) Oſſa tantum debilitati uſu herbæ ſcripti, ut ad inceſſum inhabiliores reddantur.

Vaporem mercurialem) ſuſpicio ingeniola eſt D. Simonis Pauli, Viri ſummi, exhalationes minerales ſeu plumbi ſeu argenti vivi in terræ vicinias profundis Norvegiæ ſontē deliteſcentis, jumenta enervare. Quam ſalivatio confirmare videtur. Ante curationem hæc fuit, neſcitquam petachæ curatione. An verò talis minera lateat in Norvegia, ubi hæc herba creſcit, necum experientia conſtat. In Cimbræ, ubi quoque uberior eſt ejus proventus, nulla minera obſervata, nec captopter illis ſymptomatibus inſeſtantur pecora innoxie iſto gramine veſcentia.

In cæteris Eruditi Parisienſes tem æta terigerant.

*De Gramine Oſſifrago, Appendix Ex Episto-
la Ulſtriſ & Magnifici Cancellarii
Norvegiæ Joh. Frederici Mar-
ſchke, Bergiſ ſcripta ad
D. Simonem Pauli
Medicum Regium.*

Quandoquidem intellexi Te adhuc ſollicitum eſſe de herba vel gramine, quod ex relatione beati Generalis Majoris Reichovii, oſſa confringere animalium quæ eo veſcuntur; inſolivi diligenter in illam rem, & tandem iuveni gramin illud, quod in his regionibus appellatur *Smir*, cujus ſpecimen miſto, forſan minus, quæ pro naturali magnitudine, quod hujus anni frigenti imputandum. Quando æſtas calore ſuo graminis hujus flores protrulerit, vivis coloribus delineati curabo, captabo-que occaſionem commodam, perfectiorem plantam Du. Doctori tranſmittere. Alias intellexi feminas

quæ pecus cuſtodiant & curant narrare beſtias oſſium dolores experiri quando eo gramine veſcuntur, ſanari-que exhibitis oſſibus comæris aliorum animalium, non eam aſſervi exhiberi illis oſſi animalium eodem gramine occumbentium, ſicut Reichovius beatus ſcribit. Vale. *Idem ſiſdem.*

Obſervatio Fracturæ brachii, in quâ novâ quadam eſſormata fuit articulatione, communicata à Clariff. Dom. Sylveſtræ, & ex Diarii Reipublicæ Literariæ in Acta Lipſienſia tranſſata, ac in ſuâ latina ſacta.

Anni ſunt plures, cùm Vir quidam ex caſu ſibi brachium ſiniſtrum, ad quatuor à corpore digi-
tatos ita fregit, ut utramque ulnæ & radii os tranſverſim diſtinctum, & omnino diſjunctum foret. Mox equidem Chirurgi pro brachio reponendū fore accetheri; Vir tamen hic doloris vehementioriſ mētē tangi ab iſſilem plane recuſavit, abnuendo anā facias ipſas, quibus brachium commodè deligatur. E diverſo brachium potius commovere incepit, buleque poſtea motui tali cum ſuccēſſu aſſervit ut brachium vel in ipſo fracturæ ſteſſeter locū. In quō ſtatu, commovendo ſcilicet manum, ac duobus in locis abſque dolore vel incommodō ullō, cubiti os ſteſſentū, ſatis diu vitam protraxit. Poſtquam verò eſſet deſanctus, unus è Chirurgis qui ipſum viſitaverant, brachium hoc ab ipſius pectore agnovit, muſculique reſciſſis oppiōd novam in fracturæ ſactum invenit articulationem, ſequenti diſpoſitam orſione. Scilicet ex parte flexus cubiti, in utriſque oſſis extremitate, caput quoddam rotundum, apophyſeos nomine inſignium, occurrebat; ex parte autem capri duæ aderant cavitates ſatis profundæ capiebant oſſis cujuſlibet excipiendis interſerviret. Dehinc ipſum perſoſium, quod fracturæ tempore fuerat laceratum, circumſcriba majori prædium obſervabatur craſſitie, ad eū ligamenti vicem pro articulatione firmandi præſtaret. Tandem cavitate harum oræ à parte anteriori multo minus elevatæ advertebantur, quàm à parte poſteriori; unde duo notabiles producebantur effectus: Quippe ex una regione latius erat oppoſunitatis pro meliori flexionis motū inſeundū; Ex altera verò oſſis brachii extenſio impediabatur; ſimilem ſerē in modum, ac in cubiti flexuræ contingere deprehenditur.

Duo hæc ſe ſe offerant conſiderandū digna, & quorum rationes accuratam omniōd merentur indagatiōem. Primum eſt, quomodo articulatione hæc nova fuerit conſtituta? Alterum verò quod nodo Vir hic cubitum eō in locō ſteſſeter potuerit, cùm abſque dubiō muſculi novi, motui iſſi interſervientes formati eſſent nulli. Quæ mox circa utramque queſtionem ſint conjectura, eā mihi proſeram lege, ut aliorum majori me perſpicaciſ poſſeſſeſium ſubſciam judicio.

Quò intelligatur ratio qua articulus eſſormetur ſuit, animo concipiatur oportet, oſſium brachii, poſtquam utrumque tranſverſim fractum ac penitus diſjunctum eſſet, extremitates nihilominus ſibi ſerviænt oppoſitas, unam ſupra alteram ita manſiſſe adaptatas, ut calli materies & qualibet oſſium extremitate ſtillans, hæud dubiè illas eundē conglutinatura fuiſſet, niſi brachium in conſtanti agitatione permaniſſet. Hic ſiquidem motus in cauſa fuit quod calli materia à fracturæ lateribus diſſuens, quandoquidem viciſſa ac glutinoſa eſt,

est, ossium fractorum marginibus adhaerit, ubi temporis accessu limbi quædam species, cum ad modum qui etiamnum in ossium capitibus cernitur, fuerit efficta. Qui limbus cavitatis loco fuit, ex carpi ponas quam cubiti parte, ob declivem carpi intum. Cavitate verò sic efformata; in ipsius ossium extremitatibus ex parte cubiti, capituli seu apophyseos figura necessario erat recipienda, quoniam calli materies tota exudans, mollis atque fluida, dum motu brachii ad alteras ossium extremitates vehabatur, non poterat non ad eam rationem quâ illæ erant dispositæ, formari, id est propterea concavam cavitatis figuram evadere conveia.

Sed penitusque motus qui in nova hac articulatione libæa enodet, duo veniunt consideranda. Primum, musculorum pleniorque ulnæ ac radii ossibus superstrato ubique ferè duobus hinc ossibus annexis & agglutinatis. deinde carpum, veluti partem mobilem respectu cubiti, versus hunc, secundum motus musculorum regulas flexi. Quibus supposito, si nova quædam forme ut pars mobilis, seu quod idem est, si duo ossa penitus transierant, musculi agentes pro flexura naturali cubiti, necessarii etiam agent pro flexura novæ partis mobilis ulnæ motu. Extremitates quippe ossium eorum quæ sunt ex parte carpi, eodem modo ac si nova essent ossa evadunt mobiles respectu cubiti; unde oportet ut ratione adhaerentium musculorum fluctante conformationis tempore, quia scilicet illi partes divinas, quibus adhaerent, necessitudo tum adducunt. Atque hæc motus ratio verè est mechanica, musculorum cum ossibus connexioni tota superstructa. Verum etiam talis non daretur connexio, idem tamen motus adhuc procedere possit, quia ossium ulnæ ac radii extremitates, quibuscumque corpus articulatur, cum non sint stabiles, carpi motum necessitudo legari debent; idem musculi carpi, dum agunt, trahere omnino debent partes carpi fulcientes, veluti mobiles scelas.

Meum non est in consequentias hic inquirere, quæ ex hac deduci queant observatione. Chirurghi interim exinde poterunt discere, quam necessarium sit ossa fracta, ut reconvalescant, fuscis deligari, atque immobilia servare. At altera verò parte ubi evadunt inde Physici, quod natura in rebus extraordinariis iidem semper inhiat vias, adeoque minimè credendum esse, quod omne monstruosum nobis vium, sit fortunæ quidam effectus, aut nature aberratio: Sed quod omnia potius in munibz hanc per constantes moris leges, à Deo pro corporum generatione ac conservatione stabilita, præterea certis sum alias adhuc inde sequelas, quoad sicut ossium nutriti motum, & quoad rationem quâ eorum formantur articulationes, posse inferri. Verum hic locus non est hanc excutendi materiam.

Ad nostram jam regredior observationem, quæ rarissima videtur, maxime singularis, cui similem apud Antorem neminem legere sicut. Venit est quod Guilhelmus Fabricius Hildanus Censur. ubi. Observ. 91. refert, quod in Virò quodam postquam brachium sinistrum inter cubitum & carpum fuisse confictam, duxit: ossi protus disjuncta, cum insigni carnis conformatione, ingens orta sit suppuratio, quâ durante multæ prodierunt officula: remittentibus verò symptomatibus, ac vulneribus consolidatis, ossa nihilominus remanere disjuncta, ac ita quidem, ut novum quendam veluti constituerent articulum. Virum etenim hunc, ubi dixeram exhiberet manum, brachium sinistrum in ipso fracturæ loco anteorum & tertiorum duxisset. Unde cernere est, inagnum quidem inter utramque histosiam intercedere convenientiam, verum eandem

propterea rem nolitans esse. Cernam est in Virò de quò Equit Fabricius Hildanus, ossa haud denud fuisse conjuncta, quæ fuit ratio cur brachium in fracturæ loco flectere potuerit, verum idem non sequitur articulationem aliquam inibi fuisse efformatam; quia scilicet tali in casu Vir ille abique dextæ manibz auxilio brachium sinistrum movere minime poterat, ut commodè faciebat ille de quò jam differimus. Quicquid itaque inde inferre licet, huc recidit; nullum callum, cum insignis facta sit suppuratio, nullaq; unâ prodierunt officula, in casu Fabricii Hildani, fuisse generatum, pro ossibus reunendis, huiusmodi extremitates exsiccatas induruisse, abiq; eò ut invicem essent conjunctæ, vel se invicem tangerent, quomododum id expressis ibidem innotuit verbis Hildanus, dum addit, ossa se invicem non attingere, quæ eorum extremitates callo sunt obductæ. Inde etenim vera quidam partium ossis arguitur separatio; sed de articulatione subsequente nihil subiungitur.

Fractura ossium cruralium multiplex, cum junctura tali dislocatione felicitè facta.

Clariss. Theod. Zuingeri Aethest. Curis. Decur. ij. Ann. 7. & 8.

Hiericus Planter Capto Pagj *Laufen* in Urbis nostræ ditione, Horreum quoddam edificaturus, Die 28. Decemb. 1697. à prandio in vicinam exierat sylvam, Fabros Lignarios in cædendis quibuldam arboribus ipsi necessariis adiuturus. Accidit verò tum; ut dum cæla jam arbor prosternebatur, ejusdem truncus Campanis incanti, nec satis celeriter ad latera fugientis, etus dextrum arripere, atque super integrum ferè simul humi prostrati hominis pedem devolvendo, in Femoris eadem ossè, paulò supra genà, Fracturam transversam sine vulnere, hinc maximam conuersionem in Genà; porro in mediâ Tibiâ fibulæ conuersionem insignem cum vulnere, atque spinarum ossium prominentiâ, tandem & in Tali juncturâ dislocationem atque vulnus, cum Malleoli iuxta cartilagine obtecti expulsiore, atque prominentiâ visibili extra vulnus luxaret, sique *Aggus* rigidâ hæc anni tempestate, post largam sanguinis à vulneribus profusionem, tertianum cessaret. Cuiq; Locus tanti Infortunij dimidie propinquitatem horæ spatio ab ædibus Patiensis distaret, bihorium elapsum est, antequam domum reportari, atque Chirurgorum curæ submitti posset. Facient autem illi de proximo nostratis Ditionis Oppido Lucis vallensis *Martini* & *Samuel Gysi*, in Chirurgia Artis præxi satis bene versati, qui reflecto primum nonnihil per propinata iulcula, atque *transtratum Decolium* Aggro, foribus è *Desolatione Herbarum Nervos Armatice-Vulnerariorum* in vino succi, lais undique refrigerataque partes probè calciferunt; ac interea, quæcumque ad ipsam delationem tot fradumatur necessarii virobantur, præparant. Tandem ad Aggum accedentes ante omnia elapsam Malleolum, quomodocunque poterant, in pristinum locum reponunt, vulnere capta linteorum filamenta Tinctore *Mirrhæ*, *Albi*, *Alyssibz*, &c. intestina applicuerunt, *Emplastrum Opodeldorch* tectunt. Postea Fracturam Tibiæ, abscissis, quæ prominere, Spinis ossis, post extensionem debitam factam, eo modè suis adaptant, vulnus sui prius deligant; ac postmodum *Emplastrum dysentericæ*, quod poros minimè infasciet,

infarciret, non ferre præ circumposuerunt, hincque Linea quadruplicata Vino, cui traumaticas atque balsamicas Herbas incorruunt, immersa ita applicuerunt nudiq; ut sine pedis commotione admi atque bis quotidie mutari, simul ac ipsa Vulnera probe mundari, novisque remediis foveti possent. Tandem Splenis Albulisque injeperunt, & medicoriter ligarunt, ita ut sanguinis circuitus per Vasa commodè hinc pergeret. Quibus ita secundum Artem, & quemadmodum patris multiplex læsio ferebat, inlinitis, (ubi fascia novem utrinque capream sic dicta maximum præstabat commodum, ut pote quod præfente membri elevatione sub deligatione necessaria non fuit) ad Femoris procielli fuit Fracturam, quæ, licet in transversum courigerat, multum tamen negotii Chirurgis facesschat, dum propter genu contusionem, reliquamque adhuc graviozem pedis læsionem, necessebant commodè membrum extendere, siquæ fractum Os præ adaptare, scissilem tamen reddere operationem vulneris absentia, ita quidem, ut extenso tandem quomodocumque membro, fracti Ossis extremitates adaptarent, statimq; Membum Spiritu Vini Camphorato probe lotum, superimposito Emplastro contra Fracturas cum Oleo Rosæ nonnulli macerato, ac Splenis assilisque præbè manerent. Et postquam sic quoque ipsum Genu Transversatè dissicente decolito vinolè fovissint, totum Crus longe admodum cavæque Albulæ in rem præsentem accommodatz imponebant, ac fissilis in genu allicque locis ita ligabant, ut nequaquam sive vigilans sive dormiens Ager genu flectere posset. Argue ita diligens probe misit Caupo doctum, antea propè intolabilem, levamen sanguine percipere, meliusque habere coepit; præcipitis càm jam Lecto suo penitenti impudicus fuisset, ita protius accommodando, ut affectum Crus per totam suam longitudinem rectè lineè pulvinari et pilis facta incuberet, & quietem prius inante posset.

Peracta sic primè deligatione, conciliariq; ut moris est decubitu, quo minus p.s. extrinsecus ad quancumque rem datam allidere valeret, nox inquieti valde succellit, & sequenti Die 29. Decembris fibrilitate jam Ager incipit, sileto, cibos omnes fastidire, malique accipere enormitatem graviter sentire. Quamobrem Chirurgi, præter uisum Jussulorum candelæ optimorum, Decoctioz traumaticæ, suorum, ad Venæ sectionem procielli sunt, quam non sine ratione crediderunt Agerum quadragenarium, & satis altis plethoricum, athleticum, balsamicè Maltâ humoralis textorâ præditum, probe ferre posse; Sanguinis hinc unicè sex vel septem elicite, ante mentis adventum, & venâ brachii dexteri sciatè extractæ fuerunt, citra Imbecillitatem Aegrotantis ullam, qui vires per noctem, licet iniquitiam non parum recolligisse videbatur. Ego vero ad Agerum hac die, vocatus accedens, eundem suis vegetum adhuc præter spem reperi, sed febricitantem, inspiciaque mitere affecti Pedis deligatione, omnia secundum Artem, & Maltâ ipsius conditionem requientem, indistincta peracta esse vidi; quamobrem Chirurgos ad continuandam suam industriam ferè admodum extrinsecè præter Tuniculam alicuius vulneribus continuè immittendam, adhuc Vigintiannum salsum Pteridii digestivi loco, nec non Symplicum Cralli Emplastrum illud superimponendum commendavi. Interne vctò præter usum Decoliti vulnerarij quotidianum, ad plures hebdomadas, imo menses continuandum, simul puzleris blanda Diaphoretica, sanguinis exitum, insensibilemque transpirationem jugiter

conservanda enà cum Mixture Cardiacæ Diaphoreticæ atque Antispasmodicæ pro cochlearia lumenâ, tripluq; repetendâ. u. Antimon. diaphoret. Oculer. caner. ppt. Rosæ. eler. ppt. Ungul. Alt. ppt. aa ʒb. Coarab. Antimon. ppt. ʒj. Mijæ. F. lutois, in 6. doses equal. divid. & aliquoties repetendum. u. Aq. Borrag. Flor. Tilia. Ulinar. Scabior. aa ʒij. Symplic. Idci ʒij. Confell. Alk. inc. ʒi ʒ. Cera. C. Phleg. ppt. ʒj. Bezaard. uin. ʒb. Mijæ. ad Flor. & singulis horis aut bihoris exhibeatur cochlear. sim. Decolium traumaticum pro interno usu fuit sequens, u. Rad. Caryophyllat ʒj. Herbar. Virga aurea cura Florib. Pyral. Sarsapar. Alchymill. Beton. Card. bened. Veronic. Agrimon. aa. Mj. Infusa probe mixtaque in pulverem grossum redacta, dentur ad Scand. De hoc pulv. dein pusilli dos sumuntur, atque Vini albi cœteris & Aqua fontan. aa. it ʒb. incoquantur aliquandiu in Olla probe clausâ, postea de calido decolito mane ac vespri cyathus unæcum quatuor exhibantur. Externe ordiem Herbz uni cum Salsis, Maderis. Aljamb. Scordis. Marrub. albo permixta, Vitis albo semper incoquebantur pro fomentatione pedis. Dietam præscripti tenuem satis, à Vini, Acidorum, Fiatulentorum, Salsorum valde, Dyspeptorum usu; à Tristitia, ab ira, commotione corporis noxiâ, protius immunit. Pro potu ordinario concessi Decolium Rad. Faler. Herb. Agrimon. & Tussilag. minor. Alius libera servabatur Clysmaribus subinde, & interdum suppositoris, quancumque frequentem ejus solutionem hand procreabamus.

Uti itaque tallum, atque intermorem ac extenorum medicaminum diligenter continuato; itera spaciū quinq; vel sex hebdomadarum, quod in talo erat valus, cicatrice prius obductum sanctumque conspicebatur, redeunte interea simul ad digitos pedum sensu tactus, qui antea protus absuerat. Fractura Femoris rursus vter iterum elapsa rursus debuit, ut pote satis firmam propter mala inferioris pedis ligaturum minime ferens, nihilominus tandem intervallo trium mensium calillum nacta est sumum. Tibia autem Fractura, propter magnam ossium in minuta frustilla, sensim ac sensim producentia, contritionem, ante elapsum semestris integrum neque calillum satis validum, neque consolidationem petfectam admisit, tandem verò etiam integrè curata, & proba cicatrice obducta fuit, siquæ Ager post semestris demum pedi tantillum insidit, nondum tamen fere in Talo, sive in Genu flectere poterat; quæ tamen flectendi potentia in Talo satis commodè, quod tendines hand essent multum disrupti, in Genu autem tantillum saltem hucusque redit. Argue ita per Del Gratiam, atque inde festum præsentiam Chirurgorum industriam, Crus illud integrum fuit servatum, & vix semipollicis latitudine lano erare brevius remansit, quod certè plures alij Chirurgi, in Gallia præfentim; statim in principio amputatum voluissent.

Anatomica inspectiones.

Vincentius Balduinus, Vir infractæ ætatis, vixit aliquandiu miserandum in modum, ob humeros intra annos quindæm quater effictum, quod punctum intrensens, sive ex vlcido confusi ossis succo, fere sanguine eo ubertius affluente in eam tandem devenit molem, ut nec pectus nec scapula immodicum ipsius pondus fuerit amplius ferendo, exaceratis non solum maximis nervorum doloribus, verum etiam summa spiritus dihenkate, ob luxoriente pondus

pondas thoracis motum continenter impediens, cum indefatigabili vigilia. Quibus à salubris quo evaderet, usus fuit consilio variorum Chirurgorum, quorum alii tumorem emollire aque in pos. convertere; alii contra luxuriam ipsius ardore falcia coecere: ac nonnulli vitium os ferulâ prædite admitti fuisse, sed omnes successus infelici: Venæ enim ac arteriæ hujus tumoris latiores erant quàm ut pollice humano possent obcurari, ac proinde magis impedimento quàm auxilio fuisse falciæ: mortemque adeo non distulisset, quàm maturasset amputatione improvide instituta.

Facto autem vivendi sine, docuit asarome omnia sub cute vixi crassitiam ac sciatomagis indulsit naturam, parumque discrepassit à materia veri cancri, ejus nomen fortassis propterea huic offis vitio haud male impositum ab industria Celso. Ipsa verò ossa erant non modò à se invicem scjungata, verùm quasi malleo minutatim confecta, ac per iniquo madore adeo tertia, flaccida ac mollia, ut insitæ ceteræ scalpello facillime ceciderentur. *Tulpius observat. lib. 4. cap. 12.*

Seenuo militis duci globulus plumbus à bombardâ hostili emissus, utrumque os brachii sinistri propè carpum perfregit, & vulnere penetrante laucavit brachium: Antequam pugna excederet, statim intolerabiles sensit dolores, qui frigore hyberno exacti sunt, cum quatuor horas equitando in via impenderet, antequam sit proximam civitatem delatus, Chirurgi manus subsisteret. Sedula opera in hujusmodi casu difficulti adhiberi solita, non impedit gangrenam partem lævæ imminuentem, quæ in externa manu & brachio se non prodit sanorum similis, sed cum intolerabili cruciatu interno interfora pertragebatur, & dolores sensim ad totum brachium & scapulam sinistram diffunderet, cum tumore, sed stilis quibusdam lividis sanguinis secundum brachii longitudinem ascendentibus: Ampliato demum vulnere, immisitque manu Chirurgus observavit interfora frigida & sphacelata manuum assistentes vidimus: cumque nihil in medicamentis spei amplius speret, de manuum operatione cogitatum mature fuit, ipso etiam viro genitolo n. gente, ne sepelet ulterius malum, quod interne latius procrevit videbatur. Quamquam vetò parum proliuam morbi læsi amputationem judicaretis, anceps tamen remedium cum prognostico dubio expectari statuimus.

Brachium medium lætâ testatum prognosticon omnino confirmavit: Primò quippe copiosus ichor flavus effluxit ex musculorum interstitiis, cui tandem sanguis succellit ex vasculis, qui facile aquâ stypticâ coarctat: Septimo hæc dæ peragebatur, & eodem circa vesperam expiravit æger.

In amputato brachio vulnucis conditionem interius timati, vidimus ulnam fractam, & lesum quoque radius, fragmenta ossium tendinibus musculorum manus incumbens & vellicans, amplum hiatum forentem, sphacelata omnia.

Dolorum magnitudo ex tendinam punctura ab offe fracto & aculeatis ejus frustulis, necnon pilis in vulnere latentibus, à tunica pellicæ sine dubio abralis, repetenda est: Sphacelus verò à venenatoglobuli icu ortus, sive venenica qualitate naturæ suæ debet globulos à natato pulvere protusus, sicut plurimis persuasum: sive globulus iste fatalis veneno per artem fuerit imbutus. Hisce sane vulneribus, præsertim in nervosis partibus,

malignitas ferè semper conjungitur, quod ex partium affectuum decoloratione, mortificatione, leiposthymis, & celesti fæto colligimus: imo febribus in nostro agro vel nulla vel exigua, moere sibi semper ad extremum spiritum coustant: Ex observatione *Placens* l. de Vlnere, sclop. cap. 30. Vlnus à sclopeto unâ cum ossis fractura illatum, si minutum sit, certissimum genus fracturæ existit: Nam canosa & nervosa substantia non solum à qualitate venenica, actione, confusione & attentione læditur, sed etiam propter ossis fracturam partes magnopere altentantur, hinc & vehementer inflammationes, dolores, convulsiones & gangæna oriuntur, quæ omnia ut plurimum motum ipsam inducunt: à convulsione tamen noster æger immunis fuit. Cæterum de globulo veneno imbuto magna nobis oborta suspicio, quia statim ab icu accepto de immodico dolore conquectus fuerat, stremis Dax & miles: & cito ad cor pernectavit mali vis: Variis tingi solet, etiam succo allii, ne vulnere admittant curationem. Globulus nobis visus, isofortis causa, aliquod monstrum videtur: alere: Insuper enim multa distingebantur, arte fatis, ipso sine nescio, certè non bono: uni inclitæ adhaerebat stultulum ossis, ab ulna fracta fragmentum. Ichor verò ille flavus copiosè ex brachii amputati trunco stillans infectum purium argumetum erat & potredudicinarum: digito compicere voluit Chæmrgus, sed eo temoto fontis insitæ promptis ferum: Haec quoque ex vulnere sclopeti, puris loco, stillabat: Quicquid sit, ex levi, ut videbatur vulnere, sed lethali, magna tragedia excitata: Lethalissima vetò hæc vulnucis globulo. promouant artis perit, quod non solum cervicis partes solvantur sed & lacerentur, & affectio non tantum cerebro communicetur, ratione vulnucis, sed quod magis est, ratione nervorum venenica qualitas immediatè cerebro communicat potest & ægum subito interficere: Non vetò per nervos solos cerebrum inficitur, sed per vasa sanguinea, hic quoque affectu, cor ipsum infestatur. Hinc in nostro agro leiposthymis anxietateque frequenter, & ad ultimum halitum recurrens observatur, nec cerebrum læsum ex actionibus apparuit: Fortan nifi fatum præcipitalis cor affectum, etiam ad cerebrum serpendo p. oentallit venenatus vapor. *Th. Bartholinus in Actis Medicis annor. 1. 74-75-76.*

Anno 1629. sub finem Martii, visitavimus mortuum ex vulnere femoris cum omnimoda ossis fractura. Invenimus os cili pessime repositum, ex parte tamen coaluisse: Maxima & acutissima osium fragmina in vulnere relicta, ad minimum corporis motum dolores læro summos conclabant, novamque movebant hæmorrhagiam, unde post longam atrophiam, gangrenam totum crus occupante, septimo à vulnere mense mortuus est. *H. ab Heers observ. Med. xxv.*

Lites sequente ingrant, Chæmrgi enim ex vulnere motuum testabantur: Negabant Medici dicentes à petio æris curari potuisse, nec ullum vix, sed claudicationis periculum adire potuisse: Ego ardire à Dom. Scabinis adhibitis, mihi ex tempore qui Hippocr. meum afferret, statim exhibui textum qui est l. 1. de morb. sect. 5. *Hæc autem cum sunt ex necessitate contrariæ in vulneribus quidem si crassæ actvi, & musculorum capita in febribus præfectum valous acceptum, necessaria est claudicatio: Mortis etiam si quis vulnucratum habet cerebrum, aut spinalem medullam, aut*
jcor,

jecut, aut septum transversum, aut vesicam, aut Venam multam sanguinem effundentem, aut Coti; Ex vulneribus autem minime mori contingit, si his partibus vultus acceptum non fuerit. Hæc verba omni luce clariora, quoniam Legulei litterarum aucupes torturi sunt, tempus nos docebit, *Idem ibidem.*

Obiit puer annorum 12. in Xenodochio Basileensi 20. Augusti 1673. qui saltando fregerat femur, in quo fissura, facta, Per biduum magno tamen dolore, scelus descendit & ascendit: Non observata fractura, à quodam Mago male curatus: Tandem Chirurgo accersito, omnia semper in pejus ivere, ut pure collecto febris accessit lenta; hinc excochymia, defusiones ad partem debilem, os ichii & caput femoris, non sine magno dolore; Tandem luxatio ossis femoris ex acerbulo, & facto ulcere paulo infra trochanterem majorem, dolor mitigatus est: febre non cessante, & materia purulenta in femore multiplicata, tandem obiit.

Secutus fuit à D. D. Glasco, qui ulcus foetidum deprehendit, & secundum ductum vasorum & interstitia musculorum cavitatem magnam, ut & musculi ab ossis femoris omnino separatos; In hac cavitare ingens puris copia visa est, quæ à genu, ubi primò tumorem scie, premendo, ad ulcus ascendit, nec subsistit prope genu, sed protrahit se secundum ductum nervorum, & musculorum interstitia ad talum usque, ubi etiam humor & pus observabatur. Separatis à femoris ossis cute & musculis, fissuram ossis deprehendimus, secundum longitudinem simul & transversam, ut in margi e patet: musculi omnes lati ex humoribus madefacti erant, imprimis vasa confluentes: in acerbulo erat mucosa substantia indurascens: prope genu sub patella similis mucus erat: In imo ventre oculorum ingens malum inventum est, nisi quod à cacochymia viscerata essent debilitata & pallidiora, aliam in statu naturali plane consuebant. *Ex communicatione B. D. Jo. Georgii Mangaldi Basiliensis, in D. Henrici Sepulchre.*

Hinc ratio datur totius morbi, hic puer hinc inde petulant: saltans fregit os, unde derепente ingens dolor orhoribatur; domum rediit inoletabili dolore semit, tenens saltem, per biduum tamen adhuc (quoniam erat fissura, & dimidia pars ossis consuebat) per scelus ascendit & descendit, sed tantum extremis digitis pedis (qui dexter fuit) innoxius; Modò decumbebat modò non, dolore interitum continuante, tertioque adeo incensu est, ut sic amplius consistere non posset, propter solutam unitatem periostii & tendinum puncturam ab ossis fracto: Ob istum motum autem fissura se magis dilatavit, & musculi profuit punxit, unde motus lesio & genu incurvatio, quod musculi genu flexentes affecti essent ab ossis fracto. Quoniam autem fractura non esset nota, & parentes pusillit pueri à Lega mali quid accidisse, acerrime signum, qui talis sanare profectebatur, sed hic nil profecit cum malum ignoraret: adhibuit fœdè fortis remedia & malum auxit, si quidem intumuit genu & totum femur usque ad caput femoris, nec dolor mitigatus est, tandem frustra accersito Chirurgo perito, nomine Schvartzæ, pure jam presente, dolore aliquatenus mitigato, (nam pure facta omnia misoria sunt) & præsertim febre lenta, à materia purulenta excitata, ulcus factum est à natura paulo infra trochanterem majorem, unde puris copia quotidie evacuebatur, hinc tumor prope genu, & dolor plane incepte evanescere, sed diuturnitate temporis, & imbecillitate corporis secundum musculi & vasa, per infra genu ad talum us-

que intumescere cepit: propter copiam puris ulcus toto reliquo tempore apertum servabatur; à pure musculi ab ossis separabantur & semiputredine erant, quod fenor esset fractum, ideo exterius tangetudo apparuit duplex os esse, aut instar ossis quoddam materia juxta tendines musculorum orta, Interim cacochymia orta fluxiones ad partem debilem fiebat, hinc musculi laxi, & tandem luxatum est caput femoris ex acerbulo; Interim febre omnino consumptus & emaciatus tandem obiit. *Idem ibidem.*

Dominus Marchandus, Jurisconsultus Paduensis, passus est deflexionem in genu articulum toto octimestri ipsi molestem, quæ de causa usas est opera plurimorum tum Medicorum tum Chirurgorum, ut sine fructu, quod malum ab ossis ducet originem: Dum quadam die in lecto de latere in latus se convolveret, effractum illi est os tibiae juxta genu, morte paulo post subsequens.

Apertum fuit femur, repetitæque fuit fractura & separatio apophysis ossis illius, quod carie & putredine infectum erat, quamquam luc nunquam laborasset. Ideoque recte ab antiquis traditum ossis triplici morborum genere affici posse, luxatione, compositionis & solute unitatis.

Notent Tyrones ossium apophyses sæpe divelli, quod luxationis quoddam genus est via sanabilis, teste Culumbo Anat. cap. 2. quod epinodi ossium conjunctio & separatio non fiat ossis unico capite acerbulo subeunte, sed pluribus tuberculis totidem sinus subintantibus, cujusmodi reductio difficillima est, à causa interna vel externa: externa, quandoque Chirurgi errore, interna humoribus quibusdam illapsis in quæpiam articulum insinibque retentis; quod in hie Venetia & Variolis sæpenuero accidere videmus, vel ob alium aliquem humorem luc non inquinatum, quod accidit prædicto Jurisconsulto, *Parvus Operum lib. 15. cap. 21.*

Io Fractura, ut aliorum ossium, ita & femoris curandis sæpe vicia advertuntur, primò in figura; deinde in callo: In figura, dum non recte extenditur, conformatur, deligatur, deponitur. In Callo, dum ille sit nodosus, ubi conjungitur, & monstroso callo, qui insigni eminentia nodis in artubus ramis subinde comparentibus respondet, similis est. Talis monstruosus callus apparebat ubi utroque femore Pilæ magistri aulici lutorie.

Ex fortè fuscato, & post amotum, cocto ad seculi structuram, uterque ab iuvicem abscedebat callus, *Resolucus Differtus. Anat. lib. 2. cap. 93.*

Scriba rusticus cum Norvvgiam, sylvis asperis collibus & montibus horridis, equo circumiter, proci Bergis lapu graviore Fracturam tibiae sinistrae passus, dolore sensit gravissimos: Vicini rustici hominem miserum luspicio excepere, & pedem fractum sine excubione instrumentum ligneo excavato firmiter incluserant, summamque cum diligencia oleo ex cicoribus inunxerunt: Hinc in modum lecti affixus Inter rusticos nonum complevit, & tandem magna cum difficultate ex Septentrione Bergas delatus fuit, Ad consilium vocatus Medicus, deprehendit os tibiae cum fibula esse fractum, quinque digitorum latitudine supra malleolum, ita ut pars tibiae inferior fractæ, cum parte superioris calli ad latus firmissime conoexa fuerit, latitudine trium digitorum, fibula autem fracta inferior nupquam firmata in musculis obeierat; ut modo pene exacte sensiti posset: ob callum firmitorem extensionem nullam fieri prædixi, ad rogatum amicum instrumentum efformavit, quo utrumque os id

directa

diversa trahebatur, sed frustraneo conatu, cum curis sola eo usque extenderetur, ut jam dissumpi videretur, illa præsertim in parte, cui extuberantia ossis superioris fracti adhequebatur. Ideoque & hoc in loco, & alibi, vulnus metuendum esse adstantibus monstravit, jussuque ut Chirurgi Instrumentum remitterent, quia nec æger amplius perficere posset: Inflammatio statim oborta, cui hâcandæ externa applicabatur, & ad dolores mitigationem interna propinabantur: Ipsius abscissionem pedis suscitavit Medicus, ut ad officium de lecto eediret: Sed æger acetibus credens multari quàm extingui, maluit, persuasus quorundam gygnarum blanditiis, ut instaret ossis fracti, jamque in summo locum repositus, parâ deligatur fortioribus adstringentibus, atque emplastro catagmatico, quod absque ulla ratione, aucto consensu Medici, approbavit Chirurgus, unde dolores fere intolerabiles cum tumore novo surrexerunt: Quibus nihil proficientibus, sed æger à doloris acerbitate & longo decubitu fere infans, rixis magis amissionem optabat quàm cruciatum diuturniores: Die itaque 5. Martii 1655. operatione commissâ est Chirurgo petissimò, qui, carne prius ad os incisa, nudatum os feliciter abscidit.

Petâdis deinde petagendis, Dissecti membri cutem cum muscularis aperuit Medicus, calli formam Instruatur: Ossis tibiæ fractæ tanta similitudine connexa erat, ut parvo cultello dissolvere nequiret: Ossiculum autem acutissimum cuticula adhaerebat tenuissima ossi infectio: Fibulæ ossis fracta nullo modo conjungebatur, id quod ex commotione presentiebatur antequam essent rescissa: Inferior pars ossis tibiæ, ubi quædam cavitas conspiciebatur, nigrescebat & sphacellum minitabatur: Optime inde convulsit æger & artificioso pede anilli damnum compensat. *Th. Bartholinus cent. 2. Hystr. 85.*

Nob. quidam Pometanus annos 44. natus, citra solitum hybernium anni 1593. gravissimis in dextero humero, nullo vel tumore vel qualitate p. n. affecto, doloribus, nocturno potissimum tempore torqueretur: Quorum leniendum causâ primum Toniforis cujusdam operâ usus est, qui neglectâ morbi causâ, parâ affectu multis septimanis medicamenta calida attrahentia, & exaltantia applicavit: Sed magis subinde accitis doloribus, & succedente insuper femoris dexteri dolore, à me consilium petiit: Uxor tamen erat æquâ & cunctis, appetitus mediocri, mens integra, vires tantæ ut interdiu cum doloribus remitterent, in aëre domus obambulare posset, Et si verò ipsi convenirent quædam remedia adhibebam, tamen parum aut nihil proficere: Cum post me aliorum quoque Medicorum auxilium frustra expertus esset, omnem deinceps recuperandæ valetudinis spem abiicit: Porro Dominica Exaudi anni 1594. matutino tempore de lecto in scissam sublati, maximo tremore & concussione totius corporis oppressus, eoque simulac lectum repeteret, iterum relevatus est: Eadem die circa vespertam doloribus Femoris ingravescens, contenta voce exultare cepit: hâle! hâle! hâle! Uxor itaque ipsius ad eum in lecto decubentem accurrens, femur affectum utraque manu comprehendit, idque mediâ parte introclum, versus sinistram pedem subito infecti arque ineurati sensu, sic ut genu dexteri pedis inguen sinistram respiceret: Vita tam est ægro arbor in pedem decidere, ejusque casu, in quo se manifestum fragorem percepisse aiebat, contingit. Cùmque uxor & alii eadem

eum ægro opinione essent, ac semper plane confectum esse arbitrantur, sequenti die Chirurgum pro curatione accersiverunt, qui affectum locum diligentissime inspicens atque concredans, præter inflexionem, quæ postmodum in dies magis augique aucta est, nullum vel fracturæ vel tumoris p. n. indicium in eo deprehendere potuit. Hanc femoris inflexionem octo diebus antecesserat, & totidem etiam consequentia sunt urine cruentæ, quæ tamen postea ad naturalem statum redierunt: Raro quoque circa illud tempus ut plerumque turbata fuit, vires profuse, rejectio appetitus: Facta inflexione, æger cruciatus in femore sensit intolerabiles ut se loco dimoveri non pareretur, sed quinque septimanis continuâ in loco immotus jaceret, donec tandem ipsa solliciti assidui de vita cum morte computaret.

Mortuo ægro semper ineuratum nullo negotio extendi atque in pristinum statum reduci potuit, ac tum demum fractura, media ipsius regione, se conspicendam exhibuit, commissura partium fracti ossis adeo æquali ac si scissâ esset incisum: Similis fractura, mortuo jam ægro, in medio quoque ossis humeri dexteri deprehensa est, cujus tamen nullum ipsio adhuc vivente vestigium animadverti potuit, & simi hoc ante obitum amici adstantes utrumque brachium citra omnem difficultatem ab ægro elevari atque extendi videbant, *Jacobus Seidelius observat. Medec. vi.*

Ossis femoris caries ac fractura.

74.

Infractum dexteri genu querebant cum dolore ingenti: hocce interbo octo mensibus affligitur. Ad se iterum doctissimos Medicos ac Chirurgos vocat, sed nihil auxilii auterant. Postea cum lecto decumbebatur, ac de latere in latus se veriebat, os femoris in duas partes prope genu diffractum est, & brevi post obit.

Post mortem femur apertum, ejusque os in duas partes, circa genuum apophyses disrumpit cum carie inventum fuit.

Prudentissimus vir citra genu ex obstructione vascularum quorundam tumorum habuit, liquor obtuens acridus factus periosseum extoluit, unde gravissimus dolor: cotidie tandem ipsum os invasit, idemque totum carie usque ad incima consumpsit, cum jam consultissimus vir se de latere in latus volveret, non disicil se conciperet, id pro corpori onere, quod sæpe femori innititur, in partes duas rupisse. *Stephanus Blancard in Anatom. Præli.*

Fractura brachii à globulo sclopetari.

Nobilis quidam per os brachii sclopetari globulo ictus. Vulnere accommodato, sine dolore, tumore aut inflammatione se primis viginti diebus bene habuit. Postea febre vehementissima correpsit: trigessimâ die obit.

Exnecrato cadavere pulmones putridi, & schirrosisibus duris pleni. Ren dexter ulceratus, ejusque purulenta in vesicam deposita.

Liquet in hoc nobili morbi causam lincis oculis latuisse; non enim vulnere obit, sed à malo intestino. Multa facta involuero testâ jacent, nequissimis mortalibus omnia scite fas est. Inest namque sæpe in incredibili verum, & in vetustissimi mendacium. *Idem ibidem.*

Fractura costarum, quam subsequēbatur hydrops Pulmonum, & Mors.

Clariss. Theodori Zuccheri, Mssell. Curios. Decur. ii. An. 5. & 6.

Maurus Lang. Civis Basiliensis, annorum circiter 50. fortunæ tenuioris, obesus quidem, sed ad Cachexiam inclinans die XIII. Junii Anno 1678. Molitoris equum fortē petterefectum, ac citato admodum cursu pē plateas unā cum alligato sibi curru profugientem, arreptū rursus habentē cohibitus humi prosternitur, & paritē equi pedibus calcatur, paritē eorum cutrūs onusti super dorsum solum devolutam expetire, ita ut simianimīs in proximam Chirurgi Tabernam deportatus, vix spiritum ducere valeret; paulatim tamen ad se rediens ope *Aquæ Regiæ Hungariæ* Capiti & Naribus applicatæ, conquestus est de contusionibus in Capite, Pectore atque Dorsō acceptis, gravibus satis atque dolentibus, alī nihil tamen rē. tus in corpore statim à Chirurgo videri, neque ad primum attactu visumque fractæ potuerunt deprehendi costæ; supurationes tamen mox cum cutis intranscenscia sepe conspicendas præbebant. A Chirurgo hinc confectam venā sinistri brachii fuit secta, & sanguis ad octo ferē uncias extractus; extrēmę verō partes contusæ ubique fomentabantur decotto *Herb. Betoniæ, ferri. Mstisi. Scabios. Aljuth. Chamomill. Salv. Arimmon. Bacc. Laur. Juniper.* in vino factō; *Emplastrum discutien* dorsō applicabatur, unā cum fomentis superimpositis. Lintheis quoque Fotui calcafacto immeris atque cuculis capressis, inspergebatur spiritus vini Camphoratus spiritus volatili *Lumbricor. terrestr. acutus*, & ita admovebantur. Tandem ego accessius statim sequentem positionem discutientem ordinavi. *Æ. Aqu. Card. bened. Charfil. Scabios. an. 3j. Pulv. camra Casum 3℔. 3℔. diaphor. 3℔. Rub. samlac. 3℔. M. F.* Potio, quam una vice hausit. Præscripti quoque species pro *Decotto vulnerario*, in media parte vini albi & aquā coquendas; *Æ. rad. Virg. aureæ. Confid. maj. an. 3j. herbar. Sanguic. Pyrol. Alchymill. an. Mj. Semin. Persilii. 3℔. Lucis. & carnis. d. ad ebull. pro decocto*, de quo mane & vespertī quatuor vel quinque hauriantur uncie, idque tepide. Cūque Ager debilis esset, de quo continuā pectoris anxietate & tussicodis quodam conatu quætelus moveret, sequentem simul tulit, cochlearitque sumpsit *Mixturam Cardiacam*; *Æ. Aqu. Fumer. Cardiac. effe. ana 3℔. Symp. Rub. Id. de Juvab. an. 3℔. Confell. Alkinc. 3℔. spirit. Olcor. 3℔. Animon. diaphor. C. C. phil. præp. an. 3℔. Mst. ad vier. D. XIV. & XV.* Petierit in usu periclitatorum diligenter, cum aliquantillo levanine. Pro potu ordinario sufficiens bibat *Decoctum Agrimonie, Liquiritiæ atque Hordel.* D. XVI. eōdem de Agryppia, Tussi sicā, eāque maxime molestā, Doloribus pectoris dōrtique pungentibus, tussicodis conaturū impediticibus conqueretur, simul ac febriatet; præter consiliorandum *Decotto traumatico*, atque Mixturæ cardiacæ unā, simul adhuc sequentem *Pulverem* ordinavi *pectoralem demulcentem, anodynum, diaphoreticum & expectorantem*, singulis dihoris vel trihoris dosi scrupulorum duorum circiter assumendum *Æ. Pulver. Liban. per. 3℔. Pulv. folior. Perenn. 3℔. C. C. Philon. præp. Diaphoret. Jovial. an. 3℔. Semin. Papav. alb. 3℔. sacch. candi alb. 3℔. Bibl. Chirurg. Tom. II.*

Mst. F. Pulvis subtil. detur ad statul. D. XVII. Anxietate pectoris semper urgente, lequos colostrum dubios dosibus noctū scilicet & sequenti mane sumptis; *Æ. Anody. canin. 3℔. Spermat. Ceti recent. 3℔. Effent. Crac. 3℔. Mst. detur ad statul. D. XVIII.* Omnibus lo pejus rueribus sequens talis *Ectegma Cardiacæ* Pectorale cochlearitum sumendum; *Æ. Aqu. Perenn. Plantag. Symp. de Erysim. Lobel. Symp. Bellid. min. 3℔. Confell. Alk. inc. 3℔. spirit. sal. Armen. vinos. 3℔. Diaph. Jovialis, Oculor. Cancr. præp. ana 3℔. Mst. d. ad v. D. XIX.* Elellarium confertum pnenomum Agro magis anilis, in pejus continuē ruerit, & jam Disabrā laboranti; *Æ. Confell. Bellid. min. Beton. Refor. rub. an. 3℔. Rad. Symplic. candi. Nict. India. candi. an. 3℔. Confell. Hyacinth. inc. 3℔. Boli. Armen. pp. Unicorn. fossil. ana 3℔. Animon. diaphor. 3℔. Symp. Papav. rhoad. q. f. M. F. Elellar. ad formam Opior. d. ad Oll. & inde sumatur sape, quantum culpis largietur culci capere valet. Herba præterea *Traumatico-Pectorales* unā cum *Juvabio & Papsili majoribus exarantur* in Aquā solā per botam decoctæ fuerunt, ut inde manē ac velperi cyathus unciarum 5. vel 6. calidē bibeteretur. Extrema remedia intesti tumorem omnem ubique discusserunt, sed cæculeas tamen supurationē color adhuc subsistebat. Vulnus nullum in dorso vel pectore compansit; licet facile se movere Ager, inque Lecto steteret corpus haud posset, ob dolores thoracis inde acerbiores redditos. D. XXI. Symptomatibus continuē exacerantibus & magis magisque auctis, quanquam sedatā diarrhæā, nunc per biduum copiosum phlegma limpidum, cruentum; minime autem pus coctum cum Tussi expoebat; sequenter deniq. præscripti *Mixturæ cardiacæ* cochlearitum caplandam *Æ. Aqu. cardiacæ. officin. Scabios. Ana 3℔. Symp. de Juvab. Rub. Id. an. 3℔. Anodyni an. 3℔. Confell. Alk. inc. 3℔. Refor. Ebor. pp. Antimon. diaphoret. Ana 3℔. Mst. ad vier.* Intet usum verō bujus, aliorumque Remediorum, parum levaninis opportunitatem, Ager D. XXIV. Junii, postquam fortē è lecto fuerat, inopinata suffocatione prehensus, miseram cum beata morte vitam commutavit. Cadaveris hinc iustitandi facultatem à Viduā consecutus, eō me conatū, idque cum commensalibus atque Discipulis meis, ut & Rerum Chirurgicalium petito Du. Theophilo Frenlero Republica nostra Senatore. Eius itaque in cutanea corporis expansione, à scapulā sinistra usque ad Os innominarum, Inflammatio vel Gangrena certē & sideratio apparuit. Abdomen verō apertum nihil nobis iolalubre aut præter naturale obtulit, nisi Hepat schirrhosum, durum, friabile tamen; & in cujus cavo Cystis fellea densa valde ac omni bile vacua existit. Pinguetudinis interea sat fuit ubique circa viscera; Intestina flaccida expansa apparuerunt; in osse sterni autem inferiores sinistri lateris costillagines disruptæ planē notavimus. Thorace post aperto, Lobus sinister Pulmonis maximē, tumidus, expansus, corruptus undique Mediastino, Pleuræ, Diaphragmati, atque Pericardio ita fimitur coarctare, ut sine dilaceratione inde divelli minimē poterit. In ipsā verō substantiā hac Pulmonis vesiculosā atque corruptā, postmodum apertā, plures amplos majores minoresve datum est cernere loculos, coisue omnes sero evento, pituitosis, fordidis purulentisq. p'enos, quale serum in cavitatē ipsā pectoris nunquam conspeximus. Remoto parum Lobo isto Pulmonis, Spinz prodibant osseæ, valde acuræ, à fractis tribus Costis supetioribus, propē*

sinistram Spinæ dorsæ lateris intercostium trusus, atque in ipsam Pulmonis substantiam adactis; oriundæ: quam Fracturam, lethalem certe, incisi postmodum Docti cuncti ad hoc melius conspeximus, instictam vel ab ictu pedis equini, vel à contusione per rotam Currus acceptâ. Intus Pericardium maximè densum ac firmum, ad quinque vel sex uncias feri purulenti iovenimus, æque insuper in dextero cordis ventriculo Polypum maximum deteximus tribus appendicibus præditum. Denique Lobus Pulmonis dexter ab omni corruptione liber & immunis exstitit.

Fractura dorsæ in quinquagenario, post octo decimum annos, Anatome detecta

10

Clariss. Gustav. Caspari Gabriel, Ephemerid. Germanicæ. Centur. 1. & 2.

Decuræ secundæ Ephemeridam Medico-Physicam, anno decimo Observ. 80. inter alia de Cypio singularia, Viri eiusdem eruditione ac prudentiâ pollicâ apprimè nobilis mentionem feci, quâ ut & aliis insignibus virtutis rogatæ meritis Consiliarii aulici titulo ornatus, ac nobilitatus, à qua prædecessores ejus bellorum Germanicæ diurniorum calamitatibus absque persecutionum injuriis, patenti exules ac sedibus suis avitis exui delicerant, institutionem Regis sui Serenissimi gratiâ, æger licet & valerudinarius in Equestrum Ordinem paucis ante obitum annis evehi promeruit, qui continuo Opti & opiatorum usu valitudinem admodum assiduatam, per plures annos aliquatenus tolerabilem sibi reddidit. Hic paucis ante obitum diebus mortis se vicinum animadvertens, seriò aliquoties post obitum cadaver suum appetit, ac in causâ mille malorum, quibuscum valudo ejus tot annos confictata fuerat, inquisi mandaverat, inprimis quid dorsæ sui Spinæ annos ante ciciter octo acciderit, & unde dextrorsum ac sinistrorsum obliquata & aliquatenus incurvata, statorum sui corporis tres penè digitos transversos breviter quàm antè fecerat. Medio enim sanitatis adversæ studio, cæteras inter afflictiones tussis ferinâ correptus, interpestitâ aliquando nocte exitus vehementissimè tussens, violentâ illâ thoracis ac dorsæ conqussatione fragorem in dorso cum dolore, quasi baculus aliquis confingeretur, auditu perceperat, sed præter dolorem, quem sanè acutum senserat, quid actum nec ipse, nec quisquam alius vel conjecturâ assequi poterat, quibusdam vetebrarum dorsæ exarthrosion quendam insignem factam suspicantibus, sed asseverare non audentibus. Fatis itaque postquam 20. Augusti An. 1704. cessaret, Ego, qui per plures annos illi, usque assinitate mihi satis propinquè juncto, Medicus fueram ordinarius, & Dominus D. herch; Aulæ Regiæ Medicus, qui postremis morbi diebus curæ ejus rationem quoque habuerat, ut eviscerationi ejus interessimus, vocato Chirurgo Aulico *Fulspax*, unâ cum filio meo Medicinæ tum Studioso, nunc Doctore manus sectioni adhibentibus. Abdomine primum aperto, Omentum pinguedine flavâ vestitum, intestinis detectis ac aliquoties detectis, extra naturalem situm, sinistrum versus latus pro-volutum ac quasi conglomeratum, intestina sa-

ris bene constituta invenimus, nisi quod qua parte Cystidi, felle ferè vacuæ, vicina à bile effusa flavo colore tincta essent; Verùm cum diutino morbo, ob prout corporis ærum, thoracis regio & costarum unâ cum diaphragmate dorsum solito magis vergeret, ac viscera abdominis postiora, ventriculorum nimirum & hepatis, aliquatenus reteret & absconderet, sicque illa ulteriori liberâ lustrationi quodatenus subtraheret, hinc pectus simul apertendum erat. Quo facto Venericulus cum Hepate primò se offensus, superficie exteriori præter naturam rubente, inflammatus quasi apparuit, tunica ejus admodum erant tenuis, charæ panis robustioris crassitiem viæ æquantes, interior hinc inde albicans, maculis nigricantibus variata, ac venulis livescens hinc inde disseminatis interstinctis, plicis autem omnino destituta. Quæ facies omnibus ferè Thee potius helioconibus continuis ac diuturnis, me sapius hoc in cadaveribus illorum exenteratis, ipsius quoque Doctores Bontekoe, Magni illius, dum viveret, Thee Parroni & Encomiazæ, observante, familiaris & quasi propria est. Epar equidem quoad cætera sanum, nisi quod circa cystidem gylvum, ac parenchyma ejus exiguis sparsim calculis distinctum. Pancreas sine notabili labe; Lien flaccidus ac livido fuscoque colore scedatus, Renum uterque copiosa pinguedine stipatus, sinister dextro minor, bene aliis constitutus, paulo tamen flaccidior, dexter debito major & turgidior, plurimis per substantiam hinc inde purulentam disseminatus exiguis candidantibus glandulis fortis, cujus pelvis, quatuor diversæ magnitudinis calculi, quorum maximis quadentis, sed læqualium lareum, ad pisi mediocri ferè magnitudinem ascendens, inhaerebant. Reliqua contenta absque insigni vitio. Quibus omnibus tandem ætremis, diaphragmate quoque à costis prius, rivas & à mediastino & pulmonum Lobis, quibus in dextero præsertim latere firmiter valde coalescerat, ægrè separato, ac sterno perinde ad claviculas usque levato & reclinato, pulmonem tam sinistram quàm dextram, & colicis exterioris lividi & parenchymatis ratione planè à naturali statu alienatum, ductu quibusdam gromis, glandularum instar schirrhosatum seferum; dextro imprimis lateri mediante pleurâ, hic admodum crassâ, tam validdè connexam, ut vir, nisi insigni moliminimine, scalpelli & digitorum ope, ab illa divelli ac separari posuerit, uterque pbligmate viscido & penè purulento scatenis. Tenuis in superiori dexteri pulmonis regione prope claviculam separatione, cum scalpello, quod digitis non valuerat, perficere Chirurgus anniteretur, ac incassum illud profunde nimis adigeret, ex apostemate illic latente & casu hoc aperto, magna puris sinceri copia regurgitare coepit, cujus scaruignem ulterris indagatori in sinum incidimus fistulosum, pulmonis circa tracheæ insertionem continuam, ac summam pleuræ) membranz aliis instar factis tenuis, hic verò & in toto pectoris latere dextro præter naturam admodum densæ ac tergo-ris bovini mediocri crassitiem æmulantis) ex una parte pulmonis, ac alterâ costis firmissimè coherentis, ac quasi duplicatz, cujus per medium, tumoris laccati specie, superne ultra pollicem latum, paulatim procedendo expansiorem, sub & à claviculâ ferè, ad diaphragma usque deorsum versus descendentem, ibique infernè

palmum

palmam latitudine ferme æquantem, acque spinae dorſi contiguum, hic luci & ad medietatem uique ſux longitudinis materiã ſpĩdã ac ſebaciã, quale ſtatomacium contentum eſſe ſolet, inde vetò paulò liquidiore, ac ſuperne plane purulentã aliquouſque reſectum, niſiſ illius circumſpectis ac diuturne, ut & doloris ac ardoris in dextro thoracis, quem inter ſcribendum, qui labor ipſi officio eſſigitante ſeſe perpetuus, jugiter preſſus fuerat, latere menſe incumbendo molliſti fomitem, & ingentis illius, de quã mor, rupturæ originem atque cauſam. Cot tandem in mediſtino ac peticardio bene ſanis conſtitutis, magnam, boviũ ſitè proportionẽ æquans, ſed flaccidum paruit. His demũ omnibus ſeparatis ac è cavitatẽ thoracis exemptis, ſpinæque dorſi ſimul ab integramenti ac adſcendentib; vaiſ majotibus, ut & ductu thoracico nuatã obſtupuitus attoniti, dorſi nonam clecter vertebtam cernentes non luxatam, ſed in ipſo medio tranſverſum fractam, non exigũ ſiſũ à haud ſuperficiali, ſed grandi, totam vertebur parcom ſupietutem ab inferiori divaricante, adũ ut earum interſtitiũ extremum digitũ miniũ apicem ante pennam aſcendam facile admitteret, margine utriusque tũ ſuperne quã internẽ alapis & oculatis à rupturæ apicibus armari ac quali denſari; explorantibus ſpĩcolis ſuis obnoxi, ipſa ſubſtantia interna & ſuperior & inferior cuore à recentĩ quã fracturã torans, nullo tot annorum ſpatio ſubſiſſeſcentis cilli vel viſigio apparente, unde præſentium nonnulli carſei aliquod indicium ſuſpicari ſunt, indeque fracturæ initium deducere ſatgerunt, meum tamen id hebeſcentem jam viſum eſſigillẽ ſatcor. Res ſunt ſummẽ admittenda, & quæ omne ratiocinis acumen eludit, qui calamitoſo hoc ſpinæ ductũ fracturæ ſtatu octo clecter annos æger hic vivere ac ſuperſeſſe poterit, nullo ſpinali medullæ læſe aut intercepit manifeſto apparente indicio, nullo externo inſigni incommodo, niſi quod, ut ſuprà reſertum, ſtaturũ ob curvaturam ſpinæ parum decurtatũ, æternũ aliquantulum incedere ac ſedere cogereſcit. Ceteras tamen tam naturalis, quã animales corporis, ut & animæ functiones & actiones durante valetudine tam enormiter aſſiſitã, ut ut patienter admodum toleratã, rite ſatis, imò valde exactẽ obire atque exequi valuerit; Nonnumquam etiam eſtate, ſudo ac ſereno celo, libertatis acis capiendi ergo eſſido extra pomoeria vehi ſuſtinet. Num compar huic exemplo Hiſtoria Medica ullum habeat, ergo ſiltem valde dubio.

FRENUM PENIS BREVIUS

Vid. *Penis morbi.*FULMINE ICTI. Vid. *Combuſio.*

FUNGUS.

Fungus eſt mollis excreſcentia, ſenſim incrementum capiens ex dilatatione aut laceratione membranarum, & circa has collectis & evaſiſis ſuccis, imptimis nutritio, & ut plurimum circa articulos oborta.

Ut plurimum circa articulos apparet fungi, & membranarum radicitus inherere ſolent. In genu læſiſti. *Chirurg.* Tom. II.

piſſime apparent quimodũ tumores, & dum hac ſcribo ſtans trium annorum & juvenis 20. annorum ſilidam affecti mihi curatodi offerbantur.

Pet ſe patet huiusce morbi diagnofis, nam excreſcentiæ fungoſæ facilẽ in viſum noſtrum inciderunt, & ex tractu ab aliis haud difficulter diagnofici poſſunt, cũ ſubſtantia habeant ſpongioſiũ; mollem atque albicanem & imptiſũ digito ulla remaneat forca, nec ægri magnũ inde percipiant dolorem. Ut plurimum vetò incrementum capiunt, & circa articulos obſervantur; imptimis circa genu, & molam ſeu pællam; hinc genu loco ſuo ſepe adũ dimovetur, ut extenſioni ſeu deambulatio obſtẽ pedemque ad ambulandum faciat ineptum. Cũ tamen & aliæ partes carnoſiores non ſint ab iſis immunes, ſed membranarum quibuſcunque inherere queant, & à valentatione membrana cranii fungum enatum non ita pridũ in milite obſervavimus. Fungoſi hi tumores ſimiles ſunt ſtrumis glandularum.

Fungi ut plurimum circa articulos oborti. Eunt ex violenta diſtentione, dilatatione ac laceratione membranarum, vel ex luxatione violenta ſubrum tendinolarum, hincque eſſiſit ſucco nutritioſo & quidem in maxima copia, ex quo caro mollis, rara & laxatans ſquamoſa generatur, quæ diſcitur fungus, qui ut plurimum poſt vulnera membranarum ematgete ſolet; quod ſi accedat acceſſentia & corrolio, ſiogi excutuntur cancrioli.

Prognofin quod concernit, Fungi ſepe etiam per plures annos aſſiciunt homines, ſed præter incommodum & dolorem; niſi ſi contingant in articulis, morum ac ſentum, premendo nervos; aliquo modo tollunt. Ob ſignatorem vetò diuturnam ſuccus acrior redditur, qui facilẽ tumorem cancroſum producere poteſt. Corpus quoque ad tabem diſponunt omni ſucco nutritio in fungo diſperdido. Aliquando malum hoc lethale eſt.

Quod dietam reſert, iſta eſt dirigenda, ut ſucci rici conſiſtunt alique ruptione tubulorum circulentur, in quem finem æt eligatur calidus ac temperatus. Frigidus vetò admodum nocet, quoniam incitat ſuccos noſtros, tranſpirationemque impedit. Alimenta ſint facilis digeſtionis, exlent acida, acris, ſaliua, morarica, corroſiva, exinde enim ſuccus nutritioſus peſſimus partibus aſſeſtur, & ſic ruptio tubulorum, & evaſio ſucci nutritii facilẽ produci poteſt. Porus ſit calidus; imptimis porus theæ, vel coſſex, vel ſuccoladi, vel vinum Gallicũ, Hiſpanũ, aliudque non acidum. Vinum enim Rhenanum, Franconicum, imo iplum ſepe Moſellanum, quatenus acido & tartaro abundant, coagulandũ, ſuccos maxime nocet; eligatur potius cereviſia tenuis ritẽ defecata, & herbis volatilibus ac aromaticis maritata. Vigilet & ſomnus, item motus & quies ſint moderata; & modum ſolentem haud excedat, motus enim ulmius, ſi mox à paſtu ſit, chylum crudum & cum impturitatibus per alvum expellendis, permiſtum, in ſanguinem pellitur, quies vetò immo dica, ut eſt vita ſedentaria, quæ expectantur ſaroztes, nocet, quibus propterea vetruce fungoſique tumores familiares ſunt. Animus ſit hilaris, nollis paſſionibus obnoxius. Animi enim paſſiones vehementiores, ad affectus hos excitandos aſſam dare poſſunt, quæ ſulminum inſtar ſanguinem percutiunt, & inter ea poſſimum quæ ſpiciunt ſignis.

legunt, debiliorem eorum ex cerebro in partes subiectas emanationem sanguinis ac succorum circulationem impediunt, & per consequens facies crassas ac acidis, implemibus nutritio, corrigendis aniam præbent; cuiusmodi sunt trinitia, motor, cura immodice, odium, terror &c.

Fungi coratio difficilis est, eo autem strenne incumbendum, ut obstructions referentes & evasio facci nutritii anse omnia impediantur, quod obtinere possumus, si particulæ acres, scindentes, ac corrosivæ, è succo nutritio eliminantur, in quem finem conducunt interia sudorifera, & pro se nata interna laxantia mercurialia, v. g.

℞. Rad. scabios. enulæ camp. ana ʒss. sarsapar. ʒ lii. herb. scor. fumar. nummular. veron. scopulend. cererach. ana M. ʒ. flor. sambuci p. ij. hyperic. p. r. rasul. fantal. citr. ʒv. lassia. ʒss. guaiac. ʒij. cortic. ejusdem ʒij. vitr. mar. ʒss. sal. tart. ʒss. sem. danci ʒss. M. pro mensura ʒss. vini. Dein exhibeantur Tinct. antimon. tartaris. essent. vipetar. essent. lignorum, aliaque. Chalybeata hic præcipue egregia sunt, nodulo propterea includenda, & potui ordinario indenda.

Cura autem præsertim externis peragitur topici. Thermae pte aliis conducunt, in quem finem artificiales facile parari possunt. Saepè etiam adferendum est accedendum & excidendum est fungus, in casu ubi inclinât ad cancerum, & cum hoc sit periculosum, pro partis affectu ratione, pulveribus acidum temperantibus incrementum eius quantum possibile impediendum, in quem scopum conducunt omnes pulveres ex sale saturi, camphor. calce viva, tuchia, lapide calaminari, myrrh. succin. thure, C. C. usto parati. Spongiosis his tumoribus item inspergi possunt, vitriol. alum. nstum, vel pulvis ex aristoloch. rotund. calam. aromat. caryoph. concinnatus. Applicetur etiam spiz. matricalis, oliban. cum calce viva, imò infirmantur varia suffumigia ex succino, sabin. oliban. matriche &c. Vel ex herbis sale volatili gaudentibus patiente focus, cataplasmata, & calide fungosis imponantur tumoribus. Nec negligenda sunt emplastrâ optimè resolutiva, ut sunt emplastrum de thea, divin. de labdan. de ran. cum meteur. & vitriol. alio parat. vel cataplasma egregium ex cucumere asinino, lllac. rubr. coctis in vin. gallic. addendo pulver. rad. jalapp. & byron. f. q. Emplastr. de cicuta & de emmno itidem conducunt. Frequenter tumores hi non deligandi, nec, quod Chirurgicis notandum, aperiendi sunt, hinc etiam à cauteriis abstinendum est, quare ex hujusmodi tumore improvise aperto mors sequuta est. *Joh. Dolani in Encyclopædia Chirurgic. rationali.*

Quemadmodum in stirpibus arborum humores semipitridi per corticem exuberantes in fungos coalescunt; Sic fracta exemptaque portione aliqua erant, ac dura matre laia, statim humores cerebri circa plagam affluunt, qui sive ossis (ut Alexander Aphrodisias voluit) sive acris frigida condensati, instar fungi concreverunt, atque interitum adeo intumescunt, ne extra cranium per foramen terebrâ factum emineant. Affectus autem ille Galen. lib. 1. de loc. affect. & 3. epidem. fungus ex similitudine nuncupatur; est enim caro mollis, levis, pallida & spongiosa, quæ quidem citò extrescit, lento verò pede retrocedit. Potest & ex sturn procreari. Si enim calor cerebri imbecillus factus in materiam quæ circa vultus collecta est, aliquid agere intendit, statim procreat qui cum per tenuem meningem exspirare nequeat, cum in altum elevat. Observavi enim

hactenus in his qui fungis affecti mihi occurrerant, tenuem meningem, ut plurimum integram, crassam autem dilupram fuisse. Crassa enim disrupta, factaque digelione vulneris, natura statim incipit carnem supra tenuem meningem generare, quæ loco tegumentis incumbit, ne ex acris injuria nocumentum contrahat. Si namque humores copiosi, aut status circa plagam colligantur tenuem membranam simul cum adnata carne facili, instar fungi in altum elevant quia caro est mollis, & radix sublimis, fungi instar, supernè latior, infernè tenuior. Argetur verò & decretesit pro materie affluente copia, & chirurgi arte incrementum interceptis. Fœnet valde hinc caro; vulgo sicutum sancti Fiacri nuncupant, qui Galeni lentitudo, partium quibus adnascitur notatam & conditionem redolet; quanquam in genere; sit de natura vitreorum malignarum.

Ad ejusmodi fungorum dissipationem vendenda sunt remedia quibus specifica facultas insit absumende carnis superficialis, quæ sunt quæ validius exsicant, & blandius atterunt & credunt, quæ est quod sequitur.

℞. Sabin. ʒij. ochræ ʒj. pulverizantur simul & aspergatur caro excreta.

Vel, ℞. hermodact. combust. ʒss. fiat pulvis in eandem usum.

Vel, ℞. Fol. & flor. beton. & chamem. orobil. rosar. summit. major. torilmar. ana Mj. sem. anis. & fenugr. ana ʒj. incidantur & contundantur pro toto. Harum herbarum q. f. indatur sacculo ejus magnitudinis, ut instat fœt partem capitis cooperiat, qui filo intertextus coquatur in vini & aq. comm. partibus æqualibus, & applicetur calide. Post soctum abstergendum est caput lintis calidis, deinde sequentem pulverem insperge fungo, atque toti vulnari.

℞. Rad. caryoph. angel. calam. arom. ana ʒss. rad. aristol. rot. iros Flor. lign. guaiaci ana ʒij. flor. salv. summit. major. & rot. mar. ana p. ʒ. f. omnium pulvis subtilissimus.

℞. Emplastr. de beton. ʒij. gum. elemm. dissol. in aceto rosar. ʒj. pulvet. ros. robt. myrrill. ana ʒj. matich. calam. aromar. ana ʒss. olei rosar. q. f. Emplastrum. Quod si ejusmodi caro fungosa, è ut sape fit incrementa veniat, ut ovi magnitudinem sequat, quem proximè radicem ferico filo ligabis & confluges ætlicus, càmque vi constitutionis deciderit commemoratis pulvisculis asperges. Sic enim certius quàm acritibus catharticis prodigatur. *Joh. Figerius in Chirurgia sua magna.*

De Fungis tam carnosus, quàm ossis, in diversis corporis partibus nascentibus, ad Clariss. D. Danielem Sennertum.

Guilhelmus Fabricius Hildanus.

Affectus quos communicasti, tecum fungos appello, & fungos appellari posse, non est ut quispiam in dubium revocet. Etiam enim Auctores tantummodò de fungis in capite denudatis membris nascentibus, mentionem faciant, atramen diligenter exploratis crasis fungorum, cur & in aliis corporis partibus nasci nequeant, nondum video. Sed quia id rarissimè accidit, & sæpissimè ad aliquod aliud genus humoris hujusmodi excretae carnosæ referri possunt, ut postea dicam, visum est Auctoribus, illis solummodò excretae

excrefcencias carnofas, quæ exemplò cranio, ex membranis, aut cerebro ipfo propullulant, fungos vocitant, quum tamen, fi (ut dixi) caufas & generationem fungorum fpedare velimus, in aliis quoque corporis partibus, non minus quàm ex ipfo cerebro, aut ejus membranis, nafci poffint. Hujus fententia quoque ex antiquis nonnulli funt, & quidem præfantiſſimi Chirurgi, Bruno in pſiſis, Theodorici & Berrapalia. Quandoquidem Bruno fub nomine *Naila*, nihil aliud intelligit, quàm fungoſas hæc excrefcencias. Sic enim verba ejus fonant. *Plerumque accidit in quibusdam hominibus ſuperfluitas quedam, quæ vulgari nomine dicitur Naila: & eſt apoſtoma carneum, magnum, molle ut pluriſimum ſicut fungus, & non eſt cum eo dolor, aut ſi eſt dolor in eo, eſt parvus, neque calor, neque puſſatio, &c.* Theodoriciſ enim habet verba, non tamen *Nactam*, ſed *Naptam*, ejuſmodi excreſcentiaſ Berrapali verò *Natcam* illas appellat. Ex diſcreto dicit, eſſe apoſtoma glanduloſum five carnoſum, & rectè quidem. Aliquando enim hujusmodi excreſcentiaſ (de fungis in capite non loquitur) malignam aliquam in ſe continentem gylitatem, duræ inæqualeſque ſunt. A glandulis tamē differunt, ut idem Berrapalia teſtatur. Ex ſupradictis itaque deſcriptionibus, hæc deſinitio rectè elici poſſe, mihi videtur, nimirum, Fungum corpus quoddam eſſe carnoſum, ut plurimum laxum, molle, ſerè indolens, ex humoribus ſuperabundantibus & ſtatoletis, ſubito & parvo temporis ſpatio, progreſſum. Ut plurimum, inquam, ſepiſſimè enim non laxa aut mollis eſt excreſcentia hæc, ſed dura, & glanduloſa, inæqualiſſe, non indolens, ſed cum dolore, præcipuè ſi malignitas aliqua adſuerit, quemadmodum in ſurgis, qui in inimicis corporis partibus naſcuntur, ſæpiſſimè adſcit. In membranarum verò cerebri non ita hit, & rariſſimè fungi maligni, niſi inſignis aliqua contuſio adſuerit, & proinde putrefactio, inveniuntur: craſſas enim humor, ex quo fungus malignus generatur, non facile ſuſum aſcendit poſſeſt. Materia enim fungi citra meningis, aut cerebri ipſum ut plurimum benigna eſt, & ut Joh. And. à Cruce teſteſt, aëreæ, nec non vaporoſa, ideoque excreſcentiam minimè malignam procreat. Excreſcentia autem illa, quia ſæpiſſimè parvo temporis ſpatio prorumpit, mollis eſt, Galeno à ſimilitudine fungus appellatur. Quemadmodum enim fungi qui celo exiſtente calido & humido, ut plurimum una nocte à terra proveniunt, ſpongioſi ac molles ſunt, ita etiam fungi citra meningem aut cerebrum ipſum, ſi humor aliquis benignus copioſe affluerit, citiſſimè exoritur, & quidem propter ſummenaturæ providentiam. Cum enim vix aliquid reperiri poſſit, quod adeo fit inimicum cerebro ejuſque membranarum, aquæ aër & æthereus, illa eſt providentia naturæ, ut quamprimum ipſas tegamēto aliquo maniat obtegatur ideoque copioſe aſſentire humore aliquo (non tamen putrido, à quo fungi teſteſtrentes & arborum enaſci ſolent, ſed benigno & laudabili) proſundè & caro copioſe emiſcatur. Quid ſi igitur aliqua generationem prædictorum fungorum ad humores ſecundarios, rorem, glaciem, & cambium teſteſtente velle, meo quidem iudicio non multum à via recta aberrant. Eandem naturæ indiſtinctam in oſſibus quoque denudatis conſpicimus, quibus, cum aër ſimiliter ſit inſenſitiſſimus, natura ex quamprimum fungoſa quadam carne tegit. Hinc fit, ut fungus nonnunquam, duræ membranæ exiſtente integræ, enaſcatur, pro ejus ſollicitæ præſervatione, ne uti dixi, ab aëre externo lerdatur. Si enim natura eadē providentiā in oſſibus denudatis, quæ corpora ſolida, ſicciſſima, pau-

cis venis, artcriſque prædita, miniſque partes nobiles ſunt, utitur, nonne multo magis in dura meninge, membrana nobiliſſima, innumerique venis & artcriſ prædita, præſtabit?

In dura tamen meninge, quamdijū integræ fuerit, rariuſ & vix (excepto, ubi contuſio & affluſus humorum ſupra modum fuerit magnus, & reſolutionis ab initio non adhibita) fit fungus ingens, & qui extra vulnus erubere poteſt, quum propter ſpſitudinem ſuam diſſiculiſ in altum eleveſtur dura meninx. Rupta verò dura meninge, pia mater, anā cum adnata carne fungoſa faciliſſimè, ſi ſtatuſ aliquis ſubter membrana collectuſ fuerit, in altum elevarur, ut etiam extra vulnus proderet. Clariſſimus atque doctiſſimus vir Dn. D. Jacobuſ Aſcheruſ Vindo, pie memoriæ, Medicuſ apud Lauſannēſ longe celeberrimuſ, ſautor meuſ chariſſimuſ, fungum fieri vult repēſ dura meninge, & tenui ſi altum elevari, ſubſtantiſque cerebri tepleſſi. Sed hæc cum diſtinctione intelligenda eſſe, nec ſimpliciſter de omnibus fungis intelligi poſſe, planè mihi perſuaſum habeo. Sciunt enim Prædicti & in primis ſi, qui aliquam in Anatomicis enſiſtentionem habent: cerebri ſubſtantiā etiamſi mollis & laxa ſit, non facile tamen ita diſſolvi aut relaxari poſſe, ut fungum hunc implere poſſit. Vilem itaq; fungum cerebri ita diſtinguere, nimirum in ſimpliciſ & compoſituſ. Simpliciſ voco, qui (ut dixi) pro conſervatione membranarum aut ipſuſ cerebri, tumenaturæ beneficio atque providentiā protegetur. Compoſituſ verò, qui aut maximam contuſionem, inflammationem, & intempetiſtivum humorum affluſum, aut ſimile aliquod ſymptoma adjuſcunt habet. In ſimpliciſ fungo præterea cerebrum iſo loco non moveſtur, ſitque fungus ex adnata carne ſpſituſque aëre, qui membranas ipſamque adnataſ carnem in altum elevar. In compoſito autem, ubi propter inflammationem, & colluviū adjuſcentium humorum cerebrum citra vulnuſ veluti corruptum, & in pus converſum eſt, membranaſ ipſe in altum elevar, etiam ſubſtantiā cerebri liquefactā & diſſoluā, impleſi poſſunt: fungi ejuſmodi ſurgis periculoſiſſimi, & ut plurimum lethaleſ. Ideoque horum ſolummodo mentionem fecit auctor modò citatuſ, Reliquoſ verò, quiſ non uſque adeo periculoſi, faciliſſique citantur, propter brevitatē (quam in iſto libello ſubſtantiſ obſervavi) omiſit. Hoc quoque modo, (meo quidem iudicio) locus in Paræ de ſortore fungi inſeribendus eſt. Simplex enim fungus in capite, (ut ego ſæpiuſ expento ſum) minimè lætet, nec uſque adeo (ut Bruno & Theodoriciſ teſtantur) doloſ. Quod ſi acciderit putrefactio aut corruptio aliqua, tunc ut ſerret quoque ſuperveniāt, necēſſe eſt. Præterea fungi ejuſmodi ex humoribus lempitridiſ ad inſtar fungorum arborum, originem atque ortum habere, rectè docent Paræ & alii, Joh. And. à Cruce in fungis duræ meningis motum naturalem deperdi, ſcriptum teſtelligi, quam opinionem eſſe abſurdam, aliqui exiſtimate poſſet. Non enim deperdituſ motuſ, ſed teſtigit atque abſconditur propter adnatam carnem: ſed auctor hie excellenſ de eo loquitur fungo, ubi motuſ eſt in propinquuſ, ut ex teſtatiſ illiſ libri faciliſ colligit eſt. Hæc ego propterea ſcribo, ne aliquiſ opinionem horum doctorum virorum, & de Chirurgia bene meritorum, ridiculoſam eſſe exiſtimate.

Cæterum de curatione fungorum, citra membranas cerebri nactentium, ſuperſum eſt hic diſſertere, cum de ea in prima Centuria Obſ. 15. teſtigit, ex qua reliqua faciliſ dijudicari ac peteſpi poſſant. Hoc tantum addo, fungoſ ruptā dura meninge diſſiciliſ curari, quā illaſ illaſ: cauſa eſt in promptu. Cū enim dura meninx exquiliſſimo ſenſu prædita ſit, ac continuoſ moveatur, & diſrupta ut ſanciatuſ fuerit, continuoſ

continuo quoque affluunt humores, ex quibus incrementum fungi, nec non symptomata vasa oriuntur. Quapropter & majorem requirit diligentiam.

Ante omnia autem prospicere convenit, ne summo studio humores illis qui totum ascendunt, deorsum trahantur: Deinde quoque, licet Galenus in carnia excrecentia acrimia præscribat medicamenta, hic tamen minimè esse applicanda, multò minus excisionem, quæ novacula fit, remittendam, imò neque ligaturas, quæ filo serico fieri solet, tuta est, propter gravia, quæ inde sequi solent, symptomata. Ubi tamen putredo aliqua circa membranam adhaerit, tunc Ægyptiacum applicat Prædicti, in exigua tamen quantitate, & quidem cum cautione, de qua re consule tractatum incum de Gangrana, Germanicè editum, cap. 28.

Hactenus ostendimus, fungos circa cerebri membranas ratò malignos esse: fungorum verò in infimis corporis partibus nascentium alia est ratio: humor enim, qui adhuc, non semper benignus est, sed ut plurimum crassius, faculentus & malignus, ex quo corpus non molle, sed plus aut minus durum, prout humor, qui adhuc, plus aut minus crassus fuerit, procreatur. Nihilominus tamen, possumus ejusmodi excrecentias, cum propter formam, tum etiam, quòd in momento, sit ita dicam, excrecant, fungos appellare, cum illa tamen distinctione, ut alios simpliciter fungos, alios verò, qui duntaxat aut malignitatem aliquam adjunctam habent, fungos malignos, aut etiam cancerosos appellemus. Exempli gratia: Ante annos aliquot, quinquagenarius quidam mihi adductus fuit, cui membrum virile in tantam molem excreverat, ut magnitudinem capitis infantilis, recens nati, ferè adæquaret. Hæc excrecentia dura erat, & hinc inde ulceribus putridis scærens. Et hæc excrecentiam fungum cancerosum appello: fungum à forma: cancerolum verò ab essentia, datus enim, lividus, putridus, malignusque erat. In articulo quoque, vulneribus, nonnunquam substantia quædam modò ex albedine rubescens, modò livescens, subtili exercit, & fluxum illum serosi humoris, quem Germanici nostri Chirurghi, iocundissimo vocabulo, dæ *Gliederstier* appellant, ut plurimum præcedere, vel etiam comitari solet. Nec solummodò in vulneribus articuloz, verum & in aliis circa nervos, hujusmodi fungos excrevisse, cum aliis, tum etiam ante mentes quatuor Paterniaci in quadam puella chachymica observavi. Propter doloris enim vehementiam, sanguis & humores affluunt, qui diversa progignunt symptomata, veluti inflammationes, phlegmones, herpes, fluxum serosi humoris, & ejusmodi quæpiurima. Quod si sanguis benignus, laudabilis & stantissimus admixto humore pituitoso affluerit, ac natura, quæ nunquam ociosa est, ex eo aliquid procreare renaverit, sequitur exuberantia excrecentiaque carnis fungosæ. Ante dies quatuordecim Augusta Vinelicor, tediens, Lavange à viris Clarissimis & Doctissimis, Dn. D. Bartholomæo Metcklino, atq; Valenzino Rulando, Medicinæ Doctores, juvenis quidam mihi videntis exhibitus fuit, cujus lingua in fungum cancerosum, qui totum fere os implebat, excreta fuit. Cujus historiam integram, qualinam tandem casus erit, à Clarissimo Dn. D. Rulando expecto, camque in tertia Centuria, Deo volente, videbis.

De Uvula scirrhosa, & veluti in fungum excreta, exemplum in Observatione 19. hujus Centuriæ vidisti. Ficus ille cancerosus, cujus in prima Centuria Observ. 1. sit mentio, nonne poterit quoque fungus cancerosus appellari? Itaq; subjectum fongi non totum cerebrum, ejusque membranas, sed & omnes corporis partes stragendas esse, existimo: imò & circa anam aliquando fungos nasci, testatur PARACRUS lib. 12. cap. 24.

Difficunt tamen prius, quoad causas: circa membranas enim cerebri ut plurimum ex sanguine benigno, aëreo, & minimè maligno generantur, in reliquis verò corporis partibus, una cum sanguine faculentis quædam imò & aliquando maligna, corruptaque materia adhuc. Difficunt deinde in cutatione: circa membranas enim cerebri præter universalia, blandè, uti antea quoque monui, fungus tractandus est, nec ullo modo medicamentum acre est applicandum, quemadmodum ex Observ. 14. & 15. Centur. 1. colligere licet. In reliquis verò corporis partibus, præter medicamenta acia & insigniter escaccantia, imò & erodentia, aliquando quoque & ferrum & ignem applicari posse, sapienter cum fructu expertus sum. In vulnere articularum fungis, quia simul dolor ingens & adfluxus humorum adeo, victus tenuis instituendus est, corpus à pravis humoribus expurgandum, vena quoniam etiam incidenda. Ab initio Topica, quæ dolorem leniunt, sunt applicanda, veluti sequens linimentum.

R. Cerae novæ &
Gummol elemi ana ʒiij.
Therebinth. locæ ʒ ij.
Ol. rosæ.
Butyri recent. non saliti
Ol. de vitell. ovor. &
Amygdalar. dulc. ana ʒvj. Liquefiant omnia lento igne, & coentur. Deinde admisce
Croci ʒj.

Vitellum unius ovi. Misceatur & cum filamentis imponatur. Postea applicetur sequens Cataplasma.

R. Mice panis albi ʒiij.
- Farinæ sem. cydonior. &
Fenigræci ana ʒiij. Coquantur cum lacte vacchino neque ad consistentiam cataplasmaris, tum admisce butyri recent.
& olei rosæ.

De vitell. ovor. ana ʒj.
Azang. hum. ʒ. l.
Croci ʒ. l.

Vitellus ovor. Na. Misce, fiat Cataplasma, quod calidè una cum præscripto unguento tinniper applicetur, donec dolor omnino fuerit sedatus, neque interim circa fungum multum laborandum est: quod enim magis urget, ei inprimis & ante omnia incumbere convenit. Sedato dolore, & humorum affluxu, sequens pulvis fungo inspergendus est.

R. Pulv. præcipitani,
Alum. viti ana ʒj.
Vitrioli viti ʒj.
Pulv. radic. angelicæ
Aristoloch. racem.
Caryophyllar. &
Iridis Florentinæ ana ʒj. Misce.

Postea applicetur sequens cataplasma.

R. Farinæ fabar. &
Lupinor. ana ʒiij.
Fimi columbini ʒij.

Pulv. mār. rubrar.

Myrrillor.
Balsustior.
Ahsyuch. ana ʒij.

Salis marini ʒij. cum lixivio fiat Cataplasma.

Si autem durities aliqua aut malignitas, quæ naturam canceri sapiat, adhuc sit, tunc reverà levioribus hisce medicamentis non cederet fungus, actionibus verò, velut arsenico, oleo vitrioli, & hujusmodi septicis, rickaroticis adhibitis: magis imitatur malum, nec non malignius efficitur: quemadmodum Observ. 1. Centur. 1. monui. Quid igitur inquit, faciendum? Profecto quemodò hujusmodi excrecentie, nisi radicibus excindantur, tunc, citò, & absque magno dolore, & periculo

& periculo curari possint, nondum video, quoniam, quemadmodum dixi, ab aculeis medicamentis ituritur, & majorem malignitatem acquirunt. Hoc modo ante annos decem fungum illum malignum ac deploratum, in membro visibili existentem, cujus antea memini, feliciter extirpavi, multumque sanitati restitui, qui & ad hunc usque diem in agro Lausannensi vivit, nūc fufus in 3. Centuria declarabo. Sed prospicere convenit, ut hujusmodi fungi radicibus extirpentur, alioquin mox repullant & recrescunt, quemadmodum & in poella illa, cujus Excell. T. in prima sua historia mentionem fecit, fungum repullulasse, intelligo, quod & mihi aliquando observare contigit. Clarissimus ac doctissimus Dn. J. Martinus Chmelcius, Medicus Basilienfis celeberrimus, amicus meus plurimum honorandus, cum hīc diebus Exc. T. literas vidisset, casum sequentem, annotatione d'gum, mihi communicavit. Virgo quaedam ex honesta familia Basilienfi oriunda, necare in tibia dextra, longo temporis spatio laborabat, pro hoc autem ulcere caro fungosa adeo copiose erumpbat, ut Chirurgi aliquando illam pondere durium libratum absciderent. Quamvis autem funditus abscissa esse videbatur, mox tamen cum impetu deorsum proveniebat. Tandem tibia ex consilio Medicorum ad poplitem abscissa fuit. Post operationem abrasa carne, & osse denudato, foramen torquendum, ad medullam usque penetrans, in ipso reperitur fuit. Operatio ad votum successit: sed quoniam cuncti ipsam evasisse sibi persuaderent, ecce fungosa caro, quæ deorsum ea repleto ipso propullulavit, easdemque fere, ut antea, molestias parit: ad annos tamen exierat duos post operationem factam supervivit, & quidem utcumque commode, adeo ut in publicum prodire, atque exercitiis sacris interesse posset. Ex his, quæ dixi, apparet, mirum non esse, si fungi oris, imprimis magni, incurabiles sint, quoniam neque radicibus excindi, neque causticis excori possint.

Aque hæc sunt, Vir Amplissime, quæ in præfens de fungis carnosus ad te scribere posui. Addam & aliquid de fungis ossis, quæ etiam omnium partium corporis sint densissima, & paucas venas, ac arterias, easque exiguas habeant, nihilominus tamen interdum ad instar fungorum excreverit, sequentibus exemplis confirmare tentabo.

Anno 1600. propè Lausannam ad nobilem virum, D. in Goumains vocatus, & per dies aliquot, propter adversam valetudinem filix suæ ibi commorata, Interea temporis ad poellam quandam subditorum suorum 20. circiter annorum ætatis suæ, accessit sui, eumque unà cum genete & vicitate nobilissima Domina in Goumains in-visi. Laborabat autem poella ista, gravissimum in tibia sinistra affectu: pars enim illa subter genu adæquabat fere crassitatem illam, quoniam eius in coxa habere debebat, quoniam tamen à geou usque ad coxam potius extenuatum esset crus, infinitis præterea ulceribus puridissimis, malignis & dolorosis tibia hæc scatebat. Sed quod admiratione non vacat, in omnibus ulceribus os ipsum denudatum, spongiosum, cariosum, & hominis ante rectum cerebratur, adeo ut ulcera in ipsum penetrarent, & manifestè appareret, ossa tibia in istam crassitatem spongiosam excrevisse. Causa hujus excreverit hæc fuerat. Laboraret poella hæc ante aliquot annos morbo acuto, eoque gravissimo, ex quo naræ potius, quam medicamentorum beneficio (nullus enim adhibitus fuit Medicus Rationalis) ut videbatur, cutata, de dolore gravatissimo in tibia conquerere cepit, paulatimque natura sese in tibia hanc exoneravit. Ab initio tamen actionem morantem ejus non aboleverat. Tandem vero cum in diversis locis ulcera sese prodidissent, lecto as-

sera fuit, nec amplius incedere potuit. Volebant autem parentes, ut tibia amputaretur, sed cum maximam vim imbecillitatem, ac summam totius corporis extenuationem (tibia tamen hæc excepta) adesse animadvertet, ipsamque in ipsa operatione interitum veteres, operationem hanc aggredi ausus minimè fuit, itaque post paucos dies naturæ satisfecit.

Hæbo in Mulso meo, ossa tibia, hominis medicis satoræ, quæ apud nos in venusto monumento reperta fuerit: sunt illa duplo crassiora quam naturaliter esse deberent, ita ut omnino appareat, illa præter naturæ ordinem excrevisse. Præterea materia quædam ossæ, per laminas disposita, illis adhæret, non aliter ac tartarus dolis adhæret videmus, sunt tamen ossa hæc tibia dura ac solida. Hæbo & aliud os tibia, similiter duplo crassius, quam naturaliter esse deberet, sed id spongiosum fungosumque est.

Ante aliquod tempus à nobili viro Dn. Jacobo de Bruel, os epe de bovis mihi communicatum fuit. Est id durum, nec ullo modo male affectum, præterquam quod à latere ejus ossis fungus ossis magnitudine ovi a-natis excreverit. Fungus ille ad instar spongiæ porosus est, durus tamen, insinuatque hinc inde ductibus, in quos venulas ad ejus nutritionem inferas fuisse apparet, prædixi.

Hæc Basilæ inter multas occupationes circa Serenissimum Principem ac Dominum, Dominum Janatium Radzivilium &c. graviter laborantem, rapim ad te scribo. Quapropter h. Excell. T. expectationi minus plene satisfecit, ut me excusatum habeat, & defectum occupationibus potius meis excubare velit, etiam atque etiam rogo. Vale Vir Amplissime, & me quod facis, ama. Basilæ 17. Junii, Anno 1610.

Fungus Scirrhosus, ex aere propullulans quomodo sanatus.

Clarissimo Dn. Petro de Spina

Guilhelmus Fabricius Hildanus
S. P. D.

Te Chirurgicis casibus, imprimis raris, Vir Amplissime, non solum oblectari, verum etiam non mediocriter in fidem versatum esse, cum ex variis nostris colloquiis, Anno supra millesimum quingentesimum nonagesimo quatto, primò Aquisgran, deinde quoque Heidelbergæ habitis, tum etiam ex literis, quas ante annos quatuordecim fore nos de rebus Chirurgicis, & præcipue de vulneribus scelopetorum communicavimus, abundè mihi cognoscere licuit. Atque hæc est causa, cur ad continuandam inceptam nostram amicitiam, sequentem casum chirurgicum, & quidem non vulgarem, tecum communicare constitui, quem ut hilari fronte accipere, & impolito stylo ignorare velis, ob-nixe rogo. Animus enim dolet, & tremulenta manu hæc ad te scribo. Ante paucos enim dies, duæ ex filijs meis, pette (quæ hic & in vicinia gravissimè grassantur) obierant, quorū mea charissima ex ea convulsa, sed filius meus major natu etiam nunc vehementer laborat.

Cæterum, Vir amplissime, in auri meatu vasis oritur affectus, & quidem gravissimus, omnium vero difficilissimus est, si excreverit aliqua carnis profundè ex auri meatu excreverit. summamque requirit diligentiam. Cum enim pars sit exquisitissimo sensu prædita, neque caruncule aliquæ causticis & erodentibus medicamentis absumi possint, facillimè ex eorum usu dolores acerbissimi, aliæque graviora symptomata suboriri solent. Hanc ob causam, cum præsentem casum publici juris facere constituissem, illum in auri chirurgicæ studiosorum gratiam, paulò prolixius & diligentius conscribere volui. Tu vero, Vir amplissime, ne prodixitum agere feras, obsecro,

Cucietur annuum itaque 1594. genere & virtute vera nobilis puella, *Margaria de Marinis*, Nobilissimi ac prudentissimi viri *Dn. J. Francisci de Marinis*, Domini in *Burgona & Pally*, filia primogenita, ætatis annum octavum agens, vasculis coarctata fuit; ex quibus eò gravius laborabat, quia pulsula ad extremam cutem nihil ferè eruperant. Porro quia materia variolaram non satis ad partes externas expulsa, puella quinetium à teneris annis scabie in capite, & circa emunctoria, parum obnoxia fuerat, non diu post, nimirum Anno 1595. qui fuit annus 9. ætatis, dolore capitis, eoque acutissimo coarctata est. Dolor in meatu auris dextræ præcipuè acutus & pungens erat, ita ut tota illa pars faciei in tumorem elevaretur. Auri oleum Chamomelinum tepidum, doloris leniendi causa, gossippo imponebant, faciemque eodem oleo inungebant. Post dies aliquot in ipso meatu auris rupus est abscessus, ex quo primis quidem diebus materia subtilis & lotior carnis insat, deinde postea crassam (pissumque) extrillabat. Dolor capitis & auris paulatim cessavit, tumefactio quinetiam faciei evanuit. Tribus elapsis mensibus, iterum materia subtilis extrillare cepit, & deinceps continuò extrillavit; absque tamen dolore: quapropter nullum ex hoc malo sibi accidere posse incommodum, cuncti arbitrabantur. Circa annum verò 1600. quum audiretur paulatim diminui viderent parentes, atque hac de re solliciti essent, meatumque auris inspicere, in profundo ipsius excrescentiam quandam cernentem, ex meatu auris propullulantem, viderent parentes, attoniti se perturbati fuerunt, prociulque Medicos, eoque doctissimos, inprimis verò *D. Marcum Officium*, & *D. Andream Benetum*, apud Genevenses Medicinæ Doctores longè celeberrimos, hac de re consuluerunt, illi quum affectum difficilem esse, & manum diligentem requiri cognovissent, ut ego vocarer, suaserunt. Vigesimo itaque tertio Decembris 1604. cum in Perroy, ad lacum Lemannum, ad prædictum Dominum de *Burgona* pervenissem, & aures inspicere, excrescentiam in ipso meatu auditorio, magnitudinis castaneæ minoris inveniri.

Caput externam cavitatem auris ejus, conchulam dictam, planè implebat. Non autem omnino rotundum, sed secundum cavitatum figuram formatum esse: cujus amplior extremum, sive posteriorem ambitum auris: minus verò ampla faciem respicebat. Dura præterea, irregularis, lividaque erat extruberantia hæc. Reliqua pars hujus fungi, secundum capacitatem meatus auditorii, tympanum versis in apicem definebat, habebatque planè formam fungi, nondum tamen, propter extruberantiam ex parte integrit, sed tantummodo conspici potuit.

Superficie sive extruberanti hujus fungi, uti postea dicemus, ablati, quod reliquum erat, paulatim usque ad ipsius radicem, quæ prope tympanum erat, in conspectum veniebat: A forma itaque & duritie, excrescentiam hanc fungum scirrhosum appellare libuit.

Propullulabant præterea circa ipsius radicem, alia duo parva germina, ex quibus procul dubio etiam fungi procreari fuissent, nisi angustia meatus auditorii obfuisse. Est tamen notandum, meatum huncce ætatem altero aliquomodo ampliorem apparuisse,

Videbatur enim dura illa excrescentia, interum dum accresceret puella, impedimento fuisse, quominus proportionem suam observaret motus vite.

Porro quum ex colore livido & duritie, affectum huncce difficile esse, & periculo minimè vacare, viderem, denud, ut prædicti Medici in consilium adhiberentur, auctor fui. Ex quia Nobilis Dn. de *Burgona*, aliorum negotiorum causa Genevam profecturus erat, voluit ut cum prædictis Medicis de affectu filiz suæ plenius consulere possem. Convocatis itaque Medicis, & diligenter explorato & perquisito morbo, deliberatum fuit, ut cantario, propter maximum frigus, usque in proximum Ver protraheretur.

Vigesima itaque septima die mensis Martii 1595. cum iterum in Perroy pervenissem, sequenti die hoc minorativum exhibui.

R. herbarum Agrimonie,
Betonice,
Veronice,
Scabiole,
Florum primulae veris, ana M. g.
Sem. Anisi,
Fœniculi ana ʒij.
Liquiritiæ rale ʒi.
Foliorum fenæ mundat. ʒij.

fiat decoctio in aqua, ut colatura cum forti expressione, redeat ad ʒiiij. In quibus dissolve.

Elect. diacrythami ʒiij.
Syrapi rosali solutivi ʒi.
Misc. fiat potio.

Porro quum nihil magis in hoc affectu verendum esset, quàm affluxus humorum, visum est, uti diversione aliqui insigni & continui; Minorativo itaque præscripto expurgato corpore, postmodò cucurbitulas scapulis, cum flamma magna, & scarificatione, posuero verò die, nimirum 30. mensis, setacem verticem adhibui. Deinde pro corroboratione cerebri, & in eo humorum superfluatorum desiccatione, sequens præscripsi & exhibui electarium.

R. Coniervæ Rosarum rosmarini,
Salviæ,
Betonice,
Summitatum majoranae ana ʒj.
Ligni Gassiphrae subtiliff. pulver. ʒi.
Specierum Atomacii rosali ʒij.

Cum syrapi conservationis corticis citri, fiat electarium: de quo explebat singulis diebus, tribus horis ante prandium, ad magnitudinem castaneæ. Sequens quoque pulvis quotidie semel capiti inspergebatur.

R. Corticis citri siccatum.
Radicum Iridis Florentinae,
Radicum Cyperi an. ʒiij.
Thuris,
Masticis,
Sandatacæ,
Succini,
Granorum kermes,
Rosarum rubearum an. ʒj.
Florum betonice M. g.
Storacis calamitæ.
Spicz nudi an. ʒj.

fiat ex illis omnibus pulvis, inspergendus futurae corosali, & quotidie renovandus, deterio pectine priore pulvere, fungo verò bis in die lineam usque multiplicatum, & aqua nostra ad ulcera maligna, (cujus descriptionem pete ex Obs. prima cent. primæ) imbutum, tepide applicari: neque aliud quicquam usque ad mensem Majum cum fungo tenacè volui: quò natura ante omnia ad ablegendas superfluitates cerebri, versus stractum sese assuefaceret. Interim tamen, uti & per totum tempus curationis, optimam victus ratione observabat.

Hic, uti dixi, infusus, sicrum me domum con-
tali, usque ad 13. Mensis Maji, tum denuò ad ipsam
profectus, 14. sequentem exhibui poricunculam.

R. Rhabarbari electi ʒiij.

Agarici trochiscati ʒj.

Cinnamon ʒj.

Infundantur in aqua Cichorii & Betonicæ, per ho-
ras duodecim. In forti expellione dissolve syrupio-
sati solutivi ʒj.

Elect. Diacatholici ʒij.

De Citro solut. ʒiij.

Decocti laxativi ʒij.

M. s. r. p. o. s. o.

Postridie medianam dextram incidi, sanguinemque
ad uncias septem extraxi. Decimo sexto, 17. & 18.
sequens exhibui apozema.

R. Radicum oxalidis,

Cichorii,

Graminis,

Passulorum &

Liquiritiæ, aa. ʒvj.

Botraginis,

Scabiosæ,

Agrimoniæ,

Betonice,

Pimpinellæ,

Melissæ an. M. j.

Capillorum omnium;

Attemliæ an. M. f.

Florum cordialium;

Geniænæ,

Hordel integri an. p. j.

Coricum & seminis citri,

Oralidis,

Melonum an. ʒj. ʒ.

Fiat decoctio ad lb. j. in qua colata & clarificata,
dissolve,

Syrapi de fumaris, &

De Cichorio simp. an. ʒj. ʒ.

Misce, fiat apozema pro tribus dosibus matutinis:
atomizetur ʒj. cortlandri preparati.

Decima nona ad drachmas sex sequentis Elechna-
ti, quatuor horis ante prandium exhibui.

R. Elechnati diacatholici,

Dialebsen, an. ʒj.

Elect. de Citro solutiv. &

Diapruni laxat. an. ʒvj.

Diacarthami, &

Tabellarum de Rhabarbaro, an. ʒʒ.

Cum melle rosato Laxativo q. f. fiat opiatum, de
quo per totum tempus curationis, per intervalia ad
drachmas sex vel septem, pro dosi sumebat; modo
in forma boli, modo in forma potionis, cum de-
cocto aliquo convenienti dissoluto. Singulis quoque
septimidis cucurbitulas magnas scapulis semel ap-
plicui.

Omnibus istis, uti dixi, adhibitis, ad fungi
exspirationem transfundendum fuit: ex autem, quia
aut abscessione, aut erodentibus & causticis me-
dicamentis, vel ligatura fieri debebat, ante omnia
nobis explorandum perpendendumque erat, quanam
fuit & securior esset via atque methodus? Exci-
sio adstantibus propter hemorrhagiam suspecta erat,
& ægra illam abhorrebat. Erudentibus quoque &
causticis medicamentis massam illam fungi, qui
externam partem ausis adimplebat, absque pericu-
lo absumi minime me posse sciebam. Insuper verò,
quia ex colore livido, duritie, & inæqualitate tu-
moris, malignitatem aliquam subsesse apparebat,
verbar, ne ex usu medicamentorum causticorum
magis irritaretur malum, & humor ille acris, qui
post applicationem causticorum ex ulceribus efflueret
solet, vicinas partes simul exulceraret. Maior itaque

ligaturam institueram. Singulari enim, & ad hanc ope-
rationem perficiendam commodissimo à me excogita-
to instrumento quodam, fungum istum satis pro-
fundè in ipso meatu auditorio amplecti & ligare me
posse, sperabam.

Instrumentum autem hoc ex lamina cuprea, aut
argentea fabricatum esse debet, ita quidem, ut per
se aperitum sit, extremitates tamen digitis facile com-
primi ac claudi possint. Prædictæ extremitates quo-
que aliquomodo excavatæ esse debent, quo catun-
culam, quæ lubrica est, eò melius amplecti possint.

Vigesima itaque tertia Maji, electo loco splen-
dido, ægram in sedem collocaui, & ita quidem,
ut radii solares in auris meatum penetrare possent.
Postea caput, sive extremam fungi extremitatem,
filo apprehendi. Hujus eodem filii beneficio caput fun-
gi suspensum tenebam. Interim funiculum cum semel
nodo, intromisi, & cum Stylo quodam explorato-
rio, tam profundè, quantum fieri potuisset, intromi.

Deinde ambas extremitates hujus funiculi, per
foramina, instrumenti mox descripti, traxi.

Postea instrumento tam altè, quantum fieri po-
tuit, in meatum auditorium, & quidem ad utrum-
que latus fungi intromisso, extremitatibus funiculi,
ambobus indicibus apprehensis, & fortiter traxis at-
que confectis, fungum arctissime ligavi, in pedun-
culi sui parte citius media. Interim autem dum filius
simul & instrumentum, introductum, minister filius,
extremitatem fungi clementer leviterque in altum
traheret: idque in eum finem, ut funiculus simul &
instrumentum, eò facilis & profundius intromitti
posset.

Facta ligatura instrumentum clementer extraxi: si-
cutum verò suspensum reliqui. Deinde lineum cedai
plicatum, & sequenti liquore G. notato, intusstratum
applicui:

R. Aquæ nostræ ad ulcera maligna ʒj.

Aquæ tantum aequalium

Plantaginis,

Rosarum an. ʒ. ʒ.

Sem. Cydoniorum subtiliss. pulverti-

cati ʒ. ʒ.

Cornu cervi ussi & ppe.

Tutir &

Plumbi ussi an. ʒ. ʒ.

Misce.

Monitum autem velim lectorem, funiculum ita bu-
jismodi affectibus nullo modo. (ut in aliis quidem
corporis extrinsecis aliquando fieri solet) aqua forti
intaccandum, multò minùs Arsenicè illiuscundum
esse, propter gravissimam, quæ inde sequitur sym-
ptomata; Funiculum tamen, ut fungum parlatim
abscinderet, singulis diebus iterum immisso & adap-
tato instrumento, clementer contraxi, nodumque
magis magisque confinxit.

Cùm exuberantia fungi ita ligata esset, paula-
tim flaccescere cepit, emanavitque ex illa humor
putridus & foetidus, is verò ne in meatum audito-
rium ausis deflueret, quotidie ter, quaterve peniculis
ex spongiis paratis, absterxi.

Deinde exuberantia undique spongiis, in prescri-
pto liquore madefactas iterumque fortiter expressis,
suppositas, idque in illum finem, ut humorem il-
lum putridum fetidumque absorberent exciperent-
que; ita paulatim abscessus est exuberantia fungi,
ita ut 17. ejusdem mensis absque dolore & hemor-
rhagia excideret.

Sed quia fungum ad radicem ipsius, propter an-
gustiam meatus auditorii ligare non posueram, quod
reliquum erat, erodentibus, ut postea dicam, absumere
cogebat

cogebat: pelâs tamen, nimirum 24. ad drachmas sex electuarii superius descripti, & B. notati, exhibui: quo optimè expurgata fuit ægra. Ad maiorem quoque humorum exsiccationem sequens exhibui decoctum.

R. Radicum satsepæpillæ ʒj.

Ligni isâphras minimè dissecti ʒiij. Radicum chinæ in tenuis orbiculos sectæ ʒj.

Macerentur horas viginti, in aquæ fontis tepide ʒiij, & coquantur ad duarum partium consumptionem. De colatura moderatè calida ad ʒiij. hora quinta matutina exhibui, interim dum utebar præscripto decocto, victum utcumque tenuem & exsiccanem observabam, à iurculis, & fructibus horariis, humidisque abstinēbar, eorum verò loco uris passulis, & amygdalis tollis utebar. Pro potu ordinario sequens decoctum præscripsi.

R. Residuum prædicti decocti,

Psyllarum,

Liquiritiæ an ʒj. ʒ.

Aquæ fontis ʒiij.

Macerentur per horas quindecim, deinde coquantur ad unius tertile partis consumptionem: patet potio gustui grata, & aromatizetur poco coctandæ preparato.

Hoc decocto, & victûs ratione, per mensem integrum utebarur, interim quoque decima quasque die, corpus Electuario B. notato expurgavi, cucurbitulasque scapulis, uti dixi, per intervalla, cum levi scarificatione applicari iussi.

Ab initio dixi, extuberantiam fungi usque ad medium ejus pediculum, beneficio ligaturæ excidisse, novæ quibus remediis, quod reliquum erat, usque ad ipsius radicem, (illa autem prope tympanum erat) absumpserim, dicendum est. Statim itaque postquam extuberantia exciderat, iterum ægram ad radios solares in fœdile collocaui: mox laminas parvas tenuissimasque, à cera fabricatas, & aliquantulum incurvatas, undique circumcirca carunculam imposui: idque in eum fœnem, ne medicamenta acria, quæ imponenda erant, meatum auditorium attingerent exulcerarentque, deinde penicillis exspongiis paratis, absterge humiditate, Electuarii nostri, ad magnitudinem capitis aciculæ imposui. Postea filamentis, & spongias meatum implervi, & lintum reduplicatum, nec non liquore superius descripto, & C. notato, exterius auri superimposui. Medicamento quotidie bis, nimirum hora septima matutina, & quarta pomeridiana, (ad candelam enim huiusmodi operationes minimè sunt tenendæ) imposito, 23. ac 29. electuaria induxi, illa verò ut abiceret, sequens medicamentum filamentis in ipso intinxisi, applicui.

R. Mucilaginis sem. cydoniorum, extract. æqualibus partibus, squæ Arnoglossæ majoris, & ranarum squaquillum ʒj.

Corni cervi usi & preparati,

Tutæ pp.

Lapidis calaminaris ana ʒj.

Crocii Maris,

Saturni calcinati ana ʒss.

Misce, sicutque medicam. ad instar collytii utcumque liquidi. Signetur D. Medicamentum hoc, propter meam absentiæ usque ad quartum Junii impositum fuit. Tum uri & sequenti die laminis ceteris iterum investitis carunculâ, denovo de prædicto electuario bis in die applicui.

Sexta die ejusdem mensis, ad drachmas septem Electuarii superius præscripti, & B. notati, cum decocto Bertonice, Agrimonice, Veronice, Rosmarini, Salyiæ, & sem. Anisi, exhibui, quo & op-

timè expurgata fuit, nihilominus tamen medicamentum electuarium ea die bis imposui. Septimo 8. & 9. ad casum electuariae collystium D. notatum applicui. Decima electuaria denovo exempta, laminâ quæ novâ imposuâ, electuarium ea die ter, undecimâ verò bis iteravi.

Duodecima die mensis, quia electuaria satis magna apparebat, necque pingula ut imponeretur, consulum mihi videbatur, separatim cutellâ in cuspidem ad instar hani incurvato ipsam excidi.

Excisa electuaria, quia propter angustiam meatus auditorii, laminas ceteris difficulter impositæ mihi licuit, electuarium applicatæ ausus non fui: globulum itaque lentis magnitudine, ex filamentis contextum, & sequenti pulvere immersum, carunculae applicui: & spongias laevi superiori medicamentum D. notato, madefactis, iterumque expresse, electum auditorium adimplevi. Spongias autem in purulentis ausibus summoptè convenienti: materiam enim purulentam ex profundo attrahunt absorbentque, partemque affectam ab injuria aëris vindicant.

R. Pulveris præcipit. optimè rectificati ʒj.

Lapidis Bezoardici diligenter pulveris.

Saturni calcinati & abluvi ana ʒj.

Misceantur, sicutque pulvis signetur. F.

Decima sexta, cum beneficio speculi auris ad tympanum ferè usque infixissem, & nonnihil de radice fungi superius probè cognovissem, sequenti die iterum laminas ceteras, & quæ fieri potuit diligentia, infixi, & medicamentum electuarium applicui. Verum decima septima, quomodo domum proficisci eoactus essem, sequentem pulverem præscripsi, & me absente imponere iussi.

R. Croci Maris optimè preparati,

Cornei cervi usi & præp.

Saturni calcinati & abluvi

Lapidis calaminaris præp. an. ʒj. ʒ.

Misce, sicutque pulvis tenuissimus, qui filamentis Collytio D. notato madefactis, usque ad tertium Julii impositus fuit. Quarta, quomodo ab nobilissimæ ægram rediissem, & radicem fungi nondum penitus absumptam esse, imò & præter radicem duo parva germina, in prima figura E. notata, adesse cognovissem, iterum pulverem E. notatum, & spongias madefactas imposui.

Sexta Julii, speculi & radio in solis beneficio, nonnihil portis in profundo meatum auditorii oculis sese offerebat, in quo motus, veluti diastole & systole arteriarum, conspici potuit. Abstergo pure, quia radicem malinam omnino absumptam esse nimadverti, iterum laminas ceteras, cui ex una parte nonnihil medicamenti electuarii annexeram, ad radicem ipsam applicui, & spongias madefactas super imposui. Radicem præterea fungi cranio adherentem, imò ex ipso cranio originem traxisse, bellè apparuit. Septima, de eodem medicamento electuario ad magnitudinem capitis aciculæ bis applicui.

Octava, electuario superius descripto, & B. notato ægram expurgavi, post prædictum, cum radiorum solis & speculi auris beneficio meatum auditorium inspicissem, fungi vestigium nullum nobis apparuit: quæ de te in posterum nihil, præterquam passillos Andronis, tyrope de rosis siccis dissolutis, imposui. Post dies tamen aliquot, quomodo in profundo auris, & illa quidem in parte, quæ radix fungi fuerat, os denudatum invenissem, sequentem pulverem caragmarum, melle rosaceo parumque spir. vini mixtum, per mensem ferè integrum, me absente imponere iussi.

R. polv. florum Bertonice

Rosatum an. ʒj. ʒ.

Rad.

Rad. Iridis Flor.

Angelicæ

Cariophyllat.

Mallicis an. ʒ. j.

Benzoi.

Syracis calamitæ an. ʒ. j. ʒ.

Mille.

Post mensem quem ad ipsam rediissem, nullam amplius ossis densitatem inveni: quæ de te ut in posterum pro corroboratione & exsiccatione partis affectæ, linimentum ex pastillis Andonis, & Symplo de ossis siccis imponeretur, corpusque per intervalla expurgaretur, ac optima victus ratio observaretur, continui. Sic divino aspirante numine pristina sanitas restituta fuit, quæ & ad hodiernum usque diem 24. Octobris, 1613. (quo hæc scripsi) feliciter utitur, & quidem in matrimonio non infelici, proles præterea aliquot progeniuit: & audimus, qui antea per annos aliquot perditus fuerat, magna cum admiratione multorum recuperavit. Tam providi & diligens est natura, præcipue si in juvenibus diligentia Medici interveniat. Plura non adducibo, quandoquidem nobilissimum simul ac doctissimum virum, D. Johannem De Mercurio, ægri nostri fratrem (qui ribi, dum Heidelbergæ vixit, familiaris fuit) integram historiam, & successum curationis aliquando coram te narrasse, non dubito: quapropter ne prolixitate epistolæ metas transgrediar, subito, *Deum. Opt. Max. suppliciter oro*, ut te tuamque iustissimam uxorem & liberos, quam diutissimè conservare velit. Vale Vir amplissime, & æternum vive, cum tuis, quos tecum ex corde saluto. Dabam Lausannæ Equestrum 24. Octob. Anno 1615.

Ex fungo cranii mors.

Cosmus Sloeannus, Chirurgus præstantissimus Juvenem nobili familia natum, cui cranium fractum, porioque ejus quedam exempta fuit, unde fungus exortus, curandum habuit. Ille ab omni propemodum periculo levato egro, & sedulis sympsomatibus à curacione continuandâ desisteret coactus fuit, quod aulam Principis sui sequeretur. Barbijonior cui erat demandata, contempto consilio & medicamentis Slenæ, nullaque habita ratione loci affecti pulverem aluminis & vitrioli usui inspersit fungo. Inde exortis statim dolore vehementissimo, febæ acutissima, delirio & inflammatione, paucis post diebus mors subsequuta est. *Hildanus in Observ. Chirurgicæ.*

Legitima fungi curatio.

Anno 1601. 9. februar. Dom. Francisci Crosetani Lustriacensis Patricii ac rebusi filius, Petrus nomine, 14. annos natus, vulnus ex casu lapidis, ex alto dirui (cujus pondus librarum duodecim cum uncis decem) in dextro bregmate cum insignit cranii fractura accepit. Ego ad curacionem vocatus, parum invenio sine loquela, visu, auditu, & ex breviter, dicam, semelantem. Vomitus aderat vehementer & continuus, & sanguinem epistebat, rumpet os, nates, tum etiam per aures. Abrasis crinibus, dilataroque vulnere, impressum cranium alius in substantiam cerebri & duram matrem disruptam, conspiciebatur. Exemplis eadem nocte cranii fragmenis, curacionem aggredior, prout necessitas urgebat. Et quamvis gravissima essent symptomata, ita ut de recuperanda sanitate parum superesset spei, tandem nihilominus paulatim & ante vigesimum diem, morbi ex toto fere remiserunt. Pars quoque dexte maris ab impresso cranio disrupa, sensim naturæ & medicamentorum beneficio suavitatem exci-

dit, ita ut sperabamus jam procul abesse à periculo. Sed elapso vigesimo die morbi, ecce novum malum, exortas cuius est vulnere fungus insignis qui intra viginti quatuor horas ita excrevit, ut magnitudine ovi gallinæ extra cranium eminceret, quæst divino favore infra scriptis medicamentis feliciter pertransi.

In principio, deinde alternis, ac tandem tertio quoque die, sequens enema inject.

℞. Radicum & foliorum altheæ, malvanæ, Patenariæ, mentenalis, florum Chamomillæ M libris, florum & foliorum betonicæ ana m. f. femina, semina græci, lini, anisi ana ʒi.

Coquantur in aqua ad consumptionem tertie partis, in lib. j. colature dissolve benedictæ laxæ, & hinc per picæ compolæ an. ʒiij. Vitellum ovi, filis p. Olæ chamomillæ ʒij. miscæ fiat enema Bis verò in die fortificationem sequente vulncri applicui.

℞. Foliorum & florum betonicæ, salviæ, chamomillæ, meliori, rosarum, summitatum majoranæ, rosæ marini ana m. j. sem. anisi ʒi. fenigræci ana m. j. sem. anisi & fenigræci ana ʒi. Incendantur & contraindantur pro fortificationem herbarum q. f. indant sacculo ejus magnitudinis ut mediæ fere partem capitis cooperiant, qui filo intertextus, coquantur in vino & aquæ communis partibus æqualibus, & applicetur calide, post fortum diligenter abstergendum est caput lintris calidis, deinde sequentem pulverem inspersi fungo atque toto vulncri.

℞. Radicum cariophyllat. Angelicæ, calami aromati an. ʒi. Rad. anisi. rotundi, Iridis florum ligni guaiaci ana ʒi. florum salviæ, summitatum majoranæ, rosarum ana p. i. fiat omnium pulvis tenuissimus & deinde sequens emplastrum applicui.

℞. Emplastri de betonica ʒi. Gummi elemi dissolut. in oleo rosaceo ʒi. pulv. rosarum, myrrillo. ana ʒi. mallicis, calami aromati ana ʒi. cum f. q. ol. rosacei fiat emplastrum.

Hic fungus paulatim & intra quatuordecim dies subsedit. Oscula quoque quæ cum aliis prima nocte extrahi non poterant exierunt, ita ut intra hebdomadas d. cem plenissime convalesceret. *Fabriz. Hildanus in observ. Chirurg.*

Facis in observationibus tuis Chirurgicis mentionem fungorum, & lesis membranis cerebri, ex humoribus ad locum affectum affluentibus eos nasci doces. Quæ & aliorum Chirurgorum est sententia, ubi in mentem mihi hoc incidit dubium. An solùm membranis cerebri affectis generentur fungi? Faciunt quidem, ut vides, Medici solùm fungorum in vulneribus capitis mentionem: sed in aliis quoque partibus fungus nasci posse, hæc dux persuadere videtur historici, quæ superioribus annis, dum hic VVierberge Medicinæ operam darem, acciderant. Prior hæc est: fuer quidam annos natus elector decem, ex salia pedem finitum ad terram vehementius ius allicit, atque in planta à regione minimi digiti, læsit. Hinc tumor primò supra malleolum externum confectus fuit, qui à Rustico quodam imperito (foran luxatione alicujus reponendæ gratiâ, adhibito) postea deorsum pulsus fuit. Hinc tumor paulatim incrementum summis, ita ut totum pedem prehenderet continuoque ingrederet distenderet, & pedes digitorum magno intervallo ab ramorum intermedium distarent. Cutis tamen colore sanæ parti plæoe fuit similis. Tentata, ut fieri solet, à vasculis varia, sed omnia frustra. Tandem ad Chirurgum pervenit: qui cum suppurationem ob insignem loci molliem

faciunt

tactam esse crederet, & dolores increscerent, aperuit locum. Parum sanguinis, pusis verò nihil effluxit: mox verò profusus quasi pinguedo quædam quæ vulnus claudibat. Sequenribus diebus spongiæ, nigro ieroso sanguine plenæ copiosis erompete cæperunt: & in plana pedis versus digitum minorem una nocte quasi *repus* incidit tanta, quæ dimidium thalerum æquaret. Aperta illa nihil tamen putridi decidit, & nihil mortue carnis separari potuit, sed fuit caro quasi spongia adusta, cruenta, sanguine turgens & stillans. Cæperunt & alii in locis, ad latera, & supra talos fungi se efferre sedo & horrendo aspectu, ut pars illa pedis magnitudinem capitis fuparet. Tandem ad sectionem ventum, & præcisum esse pedum usque ad os naviculæ & calcis: quod abscissum est, caro fuit tota fungosa, partim putrida & corrupta, partim coagulata, densa & viscidæ pinguedini porose similis, pondere fere lb. liij. Verùm sequenribus diebus spongiola caro, iterum magna vi prorupit, & quantum interdiu auferebatur, tantum noctu iterum succrevit. Denique tumor magnus ad sinistram inguen loco, quo glandulæ sunt, in femore exortus est, specie plane similis ei, qui in pedo ab initio conspiciatur, qui & ipse postea, sua sponte rupit. est, ex quo magna spongiolæ carnis copia excrevit. Non ita multo post puer in vivis esse desit.

Altera hystoria hæc est: Puer duodecim annorum, dentium dolore graviter vexatus est. Deventum tamen ad extractionem: extractus est unus ex dentibus superiotibus. Orinut postea tuberculum in palato prope illum dentem, magnitudine nuclei pruni. Isthuc cum esset molle, nec sponte aperiretur, pus subesse credidit: aperitur, sed nihil eruit, nisi aliquot sanguinolæ guttæ. Postea verò caro spongiola, nigricans prorumpit; quæ usque adeo increvit, ut non solum per os prominere, sed & per nates excreveret, puerque tandem mortem assestet. Parentes primum mali causam suspicaverunt hanc fuisse. Puer istus fuit pilis niveis qui lapillis inclusus fuerat, ad interiorum oculi angulum. Eo loci post menses res ortum fuit tuberculum, quod postea præsentem illa carne spongiola in fistulam quasi degeneraret. Hæc eo fine ad te vit Clariss. scribo, ut ex te audiam, quid tibi de generatione fungorum videatur. Faciant quidem antiqui Chirurgi, Guido, Theodorici, & alii mentionem extremitatium, næstem, seu næparum, ut appellant, quæ apothema magna, carnosæ & mollis, esse dicunt: fungorum tamen, quædam quidem memini, mentionem faciunt tantum in vulneribus capitis. Itaque ad me præscribas velim, an hi, quos in duabus hystoriis descripsi, veri fungi fuerint: si non pro fungis habes, ad quod genus tumores pertineant. Si verò pro fungis agnoscis: quæ sit, quod authores, scilicet in capitis vulneribus de his mentionem faciant? Verum itaque fungorum subiectum scire velim. Quid, si illud in membrana in genere aut quodcumque corporis membranosum? Sed nihil definire volo: verum tuum ea de re, & aliquod etiam de vera fungorum curatione (si quid præter illa, quæ in observationibus sunt, habes) expedo, idem ibidem.

Fungus ex capitis vulnere pulveribus ex spica, Et scharnacho inperfu sanatus.

In consilium vocatus, vidi patientem vulneratum in scynipite, cuius vulnus ad cranium usque & duram meningem pertingebat: cum verò ægrum aliquot post dies à vulnere infuso reviresceret, observavi fungum avellane magnitudine. Consului ut insper-

gerent pulveres ex spica, & scharnacho, quorum usu, sequenti die curius est, & brevi etiam propriis remediis vulnus sanatum. Quo remedio sapius fungos sanavi, ac proinde tanquam arcanum vobis propono. *Dein. de Machinis observ. Medice Chirurgicæ. Sylloge.*

Fungus Palati cum carie, scalpello & cauteriis feliciter extirpatus.

Multi magni morbi sapius à nobis curarentur, si magis fiderent Medico, minusque meticulosi forent afflicti. Nobiliss. Dominus Collin, Juriconsultus, dum viveret apud Amstelodamenses metulissimus (cujus nomen propter raram & inauditam animosissimam in administrandis & suscipiendis remediis, licet durissimis, præter mortem appono) ante aliquot annos me convenit, dicens se aliquid incommodi in postica & laterali parte palati sentire; quo viso & bene explorato, hinc usus sum verbis, Noli Spectatiss. Domine hoc malum flocci facere, & nullo minus unicuique revelare; vetebar enim ne in manus iticideret eorum, qui omnia generis remedia nil profutura illi præscriberent, nisi peticulum, quod erat præ fortibus, interim augerem. Hinc audisti, rogavi me Dn. Patiens, qualis esset affectus, quomodo & quibus remediis morbo occurrere vellem? R-spondit malum consistere in carie posticæ & lateralis partis ossis palati cum carnea excrecentia fungosa eandemque excrecentiam esse expandendam, & ossis cariem inquerendam. Patiens generosissimus hanc curam diu non distulit, est verò quamprimum vocari jussit Alstantum Cyprianum, Petrumque Addiani filium, Chirurgo Cyrenarum; qui eandem à nobis propositam commendatam curationem. Itaque confectis cauteriis loco affecto appropriatis, universilibus præmissis uti & dentibus aliquot molatibus qui nobis in ipsa operatione obstitissent, evulsis, aggrediebamur curam ut sequitur. Omnibus prospectis de rite præparatis, monuimus patientem, ut digitum elevarit simul ac inausu suffocationis peticulum assestet, & diutius non esset ferendo, Ipseque respirare vellet; nam experientia eramus edocui totum fumum oriturum, quantum in renovandis saleis equinis excitatur. Hinc molatibus frustum ligneum digiti crassitie inter utraque maxillam immisimus, ne in operatione os clauderet; posthac scalpello acuto, recurvato, & secundum palatum accommodato, abulsi alter Chirur. totum tumorem, alter interim buccatum partem interiori spatula admodum laxa muniebat, ne à cauteriis nimis læderetur, in quem finem etiam splenis è lintheo corpore confectis & aq. frigidi madefactis buccis prospiciebat. Ablato tumore cauteria cadentia successivè foriter unam post alteram adacta sunt, donec videretur sufficere: cum interim palati digitum attolleret, eduximus dicta cauteria candentia. Hinc peractis compulsiuimus ægrum in lectum, non sine faceris verbis, quibus subsidens non alloquebatur. Interim præscriptis hordiatum ad ardorem compescendum, ut & otis collusum dolorem leniendi causi. Sequenti die invenimus afflicti nemini magis esse dissimilem, quam sibi ipsi, ita totum erat caput, propter inflammationem immanem, unde etiam à febre hæc molester immunis. Hæc omnia remediis inflammationi resistentibus oppugnantes, brevi inde cessavimus & inflammationis & febris. Interim ad eichaz casum promovendum, decoctum malvæ, siccum &c. niupavimus, addendo sufficientem quantitatem mellis rosacei, quod pro re nata mutavimus. Post eichaz separationem omnibus rubicundis apparebimus, videbamus in portu navigare.

navigat. Paulò verò post exigua particula carnis fungosæ in conspectum sese dedit, quod nudis oculis deinde cogitanti malum non esse in totum eradictum; Itaque novam inuisionem commendavimus, quam æger nequitiam tenebat, dicens facere quod artis est. Proximo die institimus novas inuisiones cum simili fere eventu, caput enim rursus vehementer intumuit, gonale febricula, quæ illidem prodigavimus remediis, brevique post in totum convulsit patiens, qui postea per plures annos incolomis vixit. *Ruysh. observ. Anatomica Chirurgie. Centuria.*

Similis casus, dissimilis verò eventus ob Medicamentorum insitiam.

Eodem fere tempore quidam contra fungosum palati sui sarcomam, junctamque ei cariem, remedia quævis apud Pharmacopœos, & audaces medicos, quorum cæca & stollida temeritate malum eò ducebatur, ex propemodum asser inespugnabile. Tandem scilicet istorum nugatoris remediorum fastigatus me alioque acceperat. Audire verò, sine inuisione nil boni esse sperandum, recusat nobis obediens, eo magis quòd non desesset, qui cum spe temporandæ valculdinis inestabam, solia scilicet medicamentis loco affecto applicandas, quæ tamquam secretà nec ulli revelanda sciebant. Post aliquod tempus me de novo consultare consulgentem, dicentes ægrum inuisionem admittendum: quid sit? Chirurgus, qui curationi præerat, inuisione partem affectam volens, cum in sinu cauterium, quo dentes cariosos iuvare solemus, attulerat. Rogatus quid facere vellet, respondit, palati cariem inuisione. Quam verò audiret, qualibus cauteriis indigeret ad opus illud petendum, animus fere illi defecit; & se patiens defectu requisitorum remedium miserimè per aliquot hebdomadas adhuc vixit, doctevitam cum morte continuat. *Idem ibidem.*

Fungus ex vulva excisus.

Fungum primum indolentem vidit Medicus; Sed mox non fuit alicujus doloris sensu. Qui eò plenumque sit gravari quo plus estu eò à præstata bile; Cujus uberior affluxus, exciuit in ipso non modò dolorem, pruritum, ac inflammationem, sed interitum utriusque livorem, & post illum, veram carcinomatosis naturam. Ut evidenter demonstrat mamma, lingua, labia, guttur, vulva; alixve partes, vel rare ac teretes; vel glandulis ita repletæ; ut faciliè degenerent in fungos; proximum carcinomatosis subiectum.

Ex cancro oris fungo, sequitur præter atrox, ac doloris sensum, frequens ac molitum illud spiritum: quod Hippocrates in coarctis præmotionibus, cap. 16. aph. 26. *στυγναιον* vocat cujus naturam alicuius in eo consistere, quod præcedat pus, ex thora eruptum. Sed in uliginosa nostra Hollandia, terminatur plenumque, seu fulissima crisi, febres etiam vichemissimas. Utique variolas interneas, & interitum contumacissimos, obitruenti lenis, affectus. In quibus nonnumquam epimodi pyralis excutitur, ultra mentis cuticulum.

Quòd si verò fungus aliquis vulvam occupet: irritat illam continenter, & effundit menstrua ipsius non minùs copiosè, ac si instaret verus partus: à quo tamen fixus hic tumor minime quon expellatur; necesse est rapidè confugere ad scalpellum & ejus ope radicem evellere: quod nequille exstipare latus ejulcmodi partus.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Sed artis est talem sectionem vel audere, uti perficere, in tum obfuscis tenebris, in quibus tamen illam bis vidi, non minùs secus institutam; & fungum ejus loci à Bernardo Ollulatio, Chirurgo dixerim: sine ulla partis offensa; non secus ex vulva excisum ac si subdus & in loco maxime obvio scalpellum ipsum dirigit.

Matrona pia ac reverenda, lactesca aliquandò ab immo dico multitudine profluens, incidit tamen in urgentem urinx difficultatem: & ex illa, quasi in veri partus conamina, à quibus licet nihil expelleretur solui, dilatabatur tamen inde usque eo angustum vulvæ: ut obstitit in auxilium vocata, potuerit illi scilicet fungum vulvæ tam firmiter basi sua, adnatum; ut nulla vi inde disoveretur.

Quæ propterea desperata, itum fuit ad Chirurgum jam nominatum qui (explorata convenienter tumoris natura) scalpellum suum nec timidè dilavit in sinum pudoris; nec infeliciter excidit fungum hunc utri, æquantem magnitudine sua ovum gallinaceum: Mirabatur amici præsentem, hinc fiduciam æger, alia maxime veterunda: illic verò, non minùs audaciam fecantis, egrediens tanti animi præsentis, tam inaudium, ac insolens opus.

Cujus ope ubi excisisset fungum hanc excrescentiam, cessabant illico dolores, menstrua inordinata, sed præcipue indefatigabiles illi conatus, quibus continenter stimulabatur uterus ad expectandum onus; plus æquo sibi molestum; quod tamen post anni circulum tenuit iterum illi increscere. Sed morabatur brevi in pus; quo cum, frustratus ibi cecideret, inhibuit ipsam à repetenda sectione, fed nequaquam à continuo fetore, vehementibus angustis, & frequentibus animi deliquis. Quorum symptomatum ergo, necesse habuit deinceps integrum decennium, immundam hanc vulvæ illuvem, aliquoties ablueri per insequentem dyctem.

U. Herbarum plantaginis, boni Heritici, singularem manipulum, Solani, pyrolæ, veronice singularem manipulum medium. Seminum lactuce, edoniorum, singulorum dragmas duas. Decoquantur ex aqua hordei, admiscendo novam ipsius ubi, succi sive petri vel majoris unciam unam, mellis rosæ, uncias duas, myrtæ dragmam mediam, melle, fiat dyctem utrinus. *Nicolasus Tulpus observ. Medicin-Chir.*

Fungus cancerosus in interiori matricis colli parte.

Honestæ quædam Vidua hic Hagæ habitans quædraginta circiter annos habens, temperantemque castam, ac fœcile, nec non ita (quam jam olim dixere) infestabile de tumore quodam extra corpus propendente mihi quæstæ est, quem non parum incommodi sibi adiecit, quoque velut stimulis assidue se pungi dixit; fuxore insuper ingenti illum abundare; ac instantibus caramentis, extendi, multoque ampliori fieri, asseruit.

Quamobrem non parum sollicita meum imploravit opem, ipse autem suavi, uti, præparato, posuideret, corpore, quicquid hoc esset, tumoreis (maligini namque perperam) Manuali Chirurgi opera tolli deberet. Cùm itaque (nec enim aliam viam finem videbat) consentiret, rem cum fratre *Joh. Stalpario vander wiel*, nec non cum tunc quidem Chirurgo, nunc autem & Medico *Cornelio Solingio* communicavi.

Tumorem itaq; hunc exactè persequam, fungum si ve colli matricis excrescentiam cancerosam esse comperrimus, antequam quidem parte latiore, posteriori verò angustiores. Scaturimus scilicet basin bujus excrescentiæ, si contingere daretur, valido cingere hilo, ac quotidie paulò atcius vincire, ut siquidem heri posset; tunc

à sana parte separaretur. Rem itaque agresti duplici fili circumcincto antelotem, crassiorumque excrecentiarum citissimam partem; Chirurgus autem, quod utramque manum eodem tempore vagina non admitteret, digitis insim eo usque promovit solum, ut basio attingisse crederet: tum verò ob viæ angustias præpediebatur vinculum contrahendi facultas. Id tamen ut perficeretur, oihili consultius duximus, quam si utramque fili extremitatem crassiori firmiorique aligatissimum specillo, ut hoc constricto, illud contraheretur, comatissimam excrecentiam; hoc autem ita succellit, ut illa intra quatuor, vel quinque dies alimentum desituta protinus decideret. *Stalpartius Vander-miel in observ. Medico-Chirurgic.*

Calum huic nostro admodum similem refert G. Segnerus *Miscell. med. phys. Germ. dec. 1. an. 2. obs. 21. fol. 200.* de honesta & pia videri, atque temperamento melancholico prædita, annorum circiter 47, cui excrecentia fungosa, fortens, & sphaerico postmodum coarctata, uterique prolapsam meioris propendebat de vagina, post cujus extripationem agra & vita discessit, cujus cadavere aperto sphaerolam illam substatiam oihili aliud fuisse competum est, quam excrecentiam fungosam ex uteri collo majori prope vesicæ ostium enatam, ac à mensium & corruptorum humorum affluxu procul dubio ampliatam, atque dilatam. Ejusmodi ferè excrecentiarum mentionem faciunt distæ *Ephemerides German. dec. 2. an. 2. obs. 186. fol. 413. &c.*

De maligno fungo scribit N. Taupin in *obs. Med.* qui è vagina excelsus gallinaceum æquaret magnitudinis ovum; ex hoc autem proximè sequenti anno eodem apparente loco temporis tractu malignum, scitidumque utrumque ovarium, cui purgando, abluendoque mulieri assidue syphone aqua repleto opus fuerat, addit, cap. 34. agens de maxima uteri excrecentia, quæ excelsa pugno magnitudinis par esset; hanc autem crassa, firmique exterioris cinctum membrana, at interioris albescentem, ac glandulosam fuisse scribit, ac postea oio rediisse.

Theod. Kerkriogius *obs. anat. 53.* de muliere quidam memorat Colocoe Agrippinæ habitante, cui in interno uteri ore carnosæ fuerit excrecentia, quæ per totam sese diffundens vaginam, atque extra corpus propendens molitis oreli prociencia crederet sit.

Plura ejusmodi habere *Vid. Trincavellus lib. 9. cap. 15. Arctæus cent. lib. 2. cap. 11. Hieron. Fabr. ab Aquapendente oper. Chirurgic. cap. 85. &c.* Idem in Schölii observationis mox allatæ.

De Fungo Microscopico.

Juvenis XVII. anorum in sinistro hypochondrio primùm, post circa geno illius lateris levis quosdam ultra meosm incurrat dolores, quos, cum negligere, à tumore circa geno oborto claudicare incepit, donec dolor & tumor totum femur occuparet, & omnimodum pedis istius usum auferret. Ad parentes suos Chemmicium delatus, & acetibissimis doloribus affectus, chirurgi nostri Theophilii Voigtii opem implorabat, qui, ut dolori occurreret urgenti, varia cataplasmata, vesicatoria tandem, & potentiale cauterium sensorio applicuit. His nil juvenis, ubi & ego vocor, ægrum à coeionis doloribus tandem non exanimatum invenio. E sinistro hypochondrio materiam calidam & acrem ad genu defluere querebatur: tactu locum affectum exploranti humor supra genu fluctans occurrit.

Præmissis igitur prætermissis, sequenti die, ut aperiretur tumor, jubeo. Effluit cum impetu ad

tres fere uncias materia ferola crocei coloris, qua evacuata, & tumida molli vulnulo occluso, ultra horam quiescebat æget. Rediit doloris acerbitas, materia tamen ista evacuata remittit, & exhibitis anodynis patiens placidam transigit noctem. Dolor sequenti die recrudescere tumidam iterum removere jubeo, & serum loturam carnis referens, elevari vesperam autem portuicula fungosæ sero isti junctæ evacuantur, ex quo causam illius doloris singularem, & vix erabilem affectum, cum à fungis intra cavitates musculorum latrantibus dependere videatur, enuncio. Nec fessille propolisicum; non tantum enim singulis diebus notabiles fungos extrahebat Chirurgus, sed & cum post obitum femur illud & genu ipsi Cal. Mail 1673. dissecarem, musculos omnes emaciatis, & serè tendinosos invenimus, intra eorundem autem cavitates varios fungos, tumores & doloris auctores: Consumtum præterea in ossis femoris conspiciebatur periositeum, nec ossis superficiem pepercerat humoris acrimonia, absque tamen nigredinis aut putredinis alicujus ootis: ubi caput supra femoris inferior cum tibia per *σύνδυμν* articulatur, cartilago lumbians tumoris io genu causa deprehendebatur, quæ molam vix patellam genu loco moverat, & extensioni & ambulationi pedem fecerat ineptum. Infimum ventrem aperire etat animus, sed patentes illi placulum reputabant, quo circa mali fontem timad non liceat.

Occurrunt hic quædam, quæ considerationis utique merentur. Materia è qua fungi generantur, aliquando è loco, in quo propullantur, aliquando è locis remotissimis featurit, illaque haud raro actis existit & corrosiva, quod non solum dolor evocit, verum etiam ossium, solidissimorum corporis nostri partium, absumtio. Faver huic pronunciatum etiam subsequens historiaram biga.

Femina quædam fungum io pollice pedis dextræ gestabat, qui à linimentis & emplastris à balneatone quodam illis & applicatis irritatis, & sensibilibus fumebat incrementa, & dolores inferrebat intolerabiles. Hic unclam pendens, unà cum pollicis anteriore articulo, amputatus, non solum ungum, sed & ipsum os in sui substantiam corruerit, immo in ossis radices egisse, aut ex ossis in mucorem resolutum, aut tabescente, hauri fecit ac ex C. C. tali sanie *(vid. Verulam. Sylv. Syb. var. cent. vi. n. 546. p. 864.)* prognatus videbatur, eo, quod radix illius cartilaginosa præ se ferebat duriciem.

Idem mihi videre ante triennium fere contigit in quodam hujus loci pannifice, quem etiam fungus io pollice pedis dextræ mirum affligebat in modum, qui unà cum pollicis articulo dextræ ablatum, eandem totius ossis propalabat consorptionem, ut adeo mirum non sit, si ipsi fuogorum substantiæ aliquando ossicula impacta compareant. Infelicio erat pannifex illa feminâ, quod facta articuli diminutione non tantum non minuebantur dolores, sed & è vulnere alii nascebantur fungi: illius verò vulnus post duarum septimanarum decursum perfectè consolidabatur. Causa fuit non alia, quam quo materia fuogorum in femina in loco affecto delitescerebat; in vivo in inguinis dextræ glandulis, quas duras tumidasque instat bubonum ostendebat; perinde ac juvenis istius in parte abdominis interna. Referebat Chirurgus se in alio, cui in digito sinistri pedis excreverat fungus, inguinis glandulas similiter rumidas observasse, quo unà cum fungo pedis digito ablato vulnus quidem ad cicatricem perducebatur, è sup.

ē suppuratio aciem postmodum glandulis erupisse fungulos, moris lentæ, acerbissimæ tamen, præcursor autemque. Agyratarum præterea, barbitonorum & balneatorum gloriatio est, se curasse, aut curare posse, si fomenta non juvent aut emplastra & cauteria, immo ipsa sectione illos, quos vocant *des Gled - Schvammne*, genuum tumores. Ego vero in his tumoribus semper carthiligerum excrescentiam adverti, qua & patellam loco movet, & pedum usum sufflammat, & proinde illis, qui curati nequeunt, annumeravi. Quadricennium est, cum in vicinia nasutulus quidam mulieri cauterio potenciali circa genu applicato consulere conaretur, sed non multum aberat, quin inflammatione, tumore & doloribus excitatis gangrena superveniente in vitæ discrimen conjiceret alias miserrimam. Interim tumores genium à flatibus & humoribus ortos curationem admovere neutiquam nego. *Christophor. Frider. Hermann.*

FURFURES Vid. *Pileum Pitia.*

FURVNCVLVS.

De Furunculo vid. præcipue sub titulo Tumor, Hic tantum de eo pauca ex Clariss. Job. Munnicks.

FURUNCULUS Latinis, *Adelo* Græcis, Nostratibus *Eisen Blasen*, est Tuberculum in aciem protuberans, cum inflammatione, duritie, rubore, ac summo dolore, ovem columbinum magnitudine non excedens. Similiter C. Celsus lib. 5. cap. 28. Furunculum definit, quod sit, tuberculum acutum cum inflammatione, & dolore, maximeque ubi jam in pus vertitur.

II. Species autem Furunculû plures sunt: Alii enim benignus est, ac mitis: Alius malignus, ac vehementius dolens. Idem observavit Paulus Aegineta lib. 4. cap. 23. sic inquit: Furunculorum alius est, clemens, alius maleficus: Clemens quidem cum in sola cute coeſcit; Maleficus autem, curatque difficilis, cum alijs radicibus actis in cutem erumpit.

III. Fit vetù Furunculus è crasso, impuro, acidiori, aliisve modis depravato sanguine, quem natura à reliquo puriore læcens, tanquam infernum & inutilem in corporis habitum criticè expellit.

IV. Signa quibus cognoscitur hic affectus sunt externa inflammatio cum pustula, & vesicula sensum increscens, cum dolore, duritie, & rubore, cum Statum attigerit, qui paucos intra dies absolvitur. Porro tuberculum in acutum tendit, & columbini ovi magnitudinem non excedit. C. Celsus aliud signum adjungit, dicens: „ Qui ubi adpettus est, & exit, super

„ apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta „ subalbida, subrubra, quam ventriculum quidam tumuli nominant.

V. Idem Celsus loco citato docet, in furunculo nullum esse periculum, etiamsi nulla Curatio adhibeatur. Matureſcere enim per se, atque erumpere. Sed dolorem elidit, ut potius. Medicina sit, quæ maturius libere.

„ Dicendum ergo furunculum periculo vacare, nisi morbo grassante maligno in Anthracem degeneret. Sed quoniam Cacoehymia soboles est furunculû, hinc tam fit, quod solutius erumpat, sed ferè multis corpus scateat, atque inquinetur.

VI. In curatione furunculi, quum humor hujusmodi tumorem efficiens crassus sit, impurus, acidior, & aliquando malignus, nunquam Repellentibus utendum est, sed ex sententiâ Galeni, & Pauli Aeginetæ, furunculus coquendus appposito Pane masticato, & in Cataplasmati formam redactis, vel Diachilo cum gallinaceo adipe; vel ex C. Celsi præscripto, Gummi Galbano.

VII. Igitur applicandum mox emplastrum diachylum cum gummi, vel quid simile facillè confici potest, ut Puris generatio promoveatur & acceleretur, v. gr.

℞. Picis navalis, liquide an. 3j. Gummi Sagarini 3℔. emplastri diachyli cum gummi 3℔. M. F. S. A. emplastrum.

Vel ℞. Rad. lilior. alb. rec. 3ij. caprarum sub tenebris affiat. 3j. fol. althææ, flor. camomillæ & meliloti an. Mj. Coctis in aqua pura, vel cerevisia tenui ad mollitiem, & in mortario conſusu adde Faring Secaliginis, mellis virginei an. 3ij. unguenti Basiliconis 3℔. vitellos duorum ovorum M. F. S. A. Cataplasma. Furunculo aperto, & expresso omni Pure, vix ulla ultra Curatio necessaria est. Equidem Puris extractio ut facilius fiat, imponendum porro emplastrum diachylum cum gummi, cum angustia basiliconis, aut alio quodam mundificativo: postea emplastrum diachylum simplex, vel diapalma.

VIII. Sed malignus si sit furunculus, & ex venenata materia exciteus, malignitas illa, priusquam applicentur remedia, foras trahatur, admotâ cucurbitulâ cum multa flamma.

IX. Ceterum ne percaveatur ne sepius ejusmodi tubercula infestent, præcipiunt multi ut ovis moscharum mas vestibus inferant. Sed qua vi & proprietas amuletum hoc ab istis satellitibus immune corpus reddere queat, sagacioribus expendendum relinquo. *Job. Munnicks in Praxi Chirurgica.*

Finis Libri Sexti.

à sana parte separaretur. Rem itaque agresti duplici fili circum anteriorē, crassiorēque excrescentiæ cinctum partem; Chirurgus autem, quod utramque manum eodem tempore vagina non admitteret, digitis tantum eo usque promovit solum, ut basin attigisse crederet: tum verò ob viæ angustias prædixebatur vinculum contrahendi facultas. Id tamen ut perferretur, nihil consultus duximus, quàm si utramque filii extremitatem crassiori femiotique albigereamus specillo, ut hoc contortio, illud contraheret, coarctaretque excrescentiam; hoc autem ita successit, ut illa intra quatuor, vel quinque dies alimentis destituta protinus decideret. *Scalperius Pandermiel in obs. Medico-Chirurg.*

Casum huic nostro admodum similem refert G. Segnerus *mystell. med. phys. Germ. dec. 1. an. 2 obs. 21. fol. 200.* de honesta & pia vidua, atque temperamento melancholico prædita, annorum circiter 47, cui excrescentia fungosa, ferens, & sphacelo postmodum correpta, uterique prolapsum mentiens prepedebat è vagina, post cujus extirpationem ægra è vita discessit, cujus cadavere aperto sphacelatum illam substantiam nihil aliud fuisse competum est, quàm excrescentiam fungosam ex uteri collo majori prope vesicæ orificium enatam, ac à mensium & corruptorum humorum affluxu procul dubio ampliatam, atque dilatatam. Ejusmodi ferè excrescentiæ mentionem faciunt dicitur *Ephemerides German. dec. 1. an. 2. obs. 186. fol. 413. &c.*

De maligno fungo scribit N. Tulpus in *obs. Med.* qui è vagina excelsus gallinaceum æquaret magnitudine ovum; ex hoc autem proximè sequenti anno eodem apparente loco temporis tractu malignum, feridumque vicus natus, cui purgando, ablucendoque mulieri assidue syphone aqua tepleto opus fuerat, addit, cap. 34. agens de maxima uteri excrescentia, quæ excelsa pagno magnitudine par esset; hanc autem crassa, firmaque exteriori cincta membrana, at interiori albescente, ac glandulosam fuisse scribit, ac postea non rediit.

Theod. Kerckringius *obs. anat. 53.* de muliere quidam memorat Coloniae Agrippinæ habitante, cui in interno uteri ore carnea fungus excrescentia, quæ per totam sese diffundens vaginam, atque extra corpus propendens multis uteri prociencia credita sit.

Plura ejusmodi habent *Petrus Trincavellus lib. 9. cap. 25. Antons acut. lib. 2. cap. 11. Hieron. Fabr. ab Aquapendente spec. Chirurg. cap. 83. &c.* Idem in Scholâ observationis mox allatæ.

De Fungu Microscopico.

Juvenis XVII. annorum in sinistro hypochondrio primùm, post circa genu illius lateris levis quosdam ultra mensē incurrit dolores, quos, eum neglexeret, à tumore circa genu oborto claudicare incepit, donec dolor & tumor totum femur occuparet, & omnimodum pedis istius usum auferret. Ad parentes suos Chemicum delatus, & acerbissimis doloribus affectus, chirurgi nostri Theophilus Voigtel opem implorabat, qui, ut dolori occurreret urgenti, varia cataplasmata, vesicatoria tandem, & potentiale cauterium femoti applicuit. His nil juvantibus, ubi & ego vocor, agrum à continuis doloribus tantum non examinatum inventum. E sinistro hypochondrio materiam calidam & acrem ad genu defluere querebatur: tactu locum affectum exploranti humor supra genu fluctuans occurrit.

Premissis igitur præteritis, sequenti die, ut aperiretur tumor, jubeo. Effluit cum impetu ad

tres fere uncias materia strosa crocei coloris, quæ evacuatâ, & turunda molli vulniculo ocluso, intra horam quiescebat æget. Rediit doloris acerbitas, materia tamen ista evacuata remittit, & exhibitis anodynis patiens placidam transigit noctem. Dolor sequenti die recrudescente turundam iterum removere jubeo, & serum loturam carnis referens, citra vesperam autem portunculæ fungosæ sero isti junctæ evacuantur, ex quo causum illius dolentis singularitatem, & viz curabilem affectum, eum à fungis inter cavitates musculorum latitantibus dependere videatur, enuncio. Nec sefellit prognosticum; non tantum enim singulis diebus notabiles fungos extrahebat Chirurgus, sed & cum post obitum femur illud & genu ipsi Cal. Maii 1673. dissecaremus, musculos omnes emaciatis, & ferè tendinosos invenimus, intra eorundem autem cavitates varios fungos, tumoris & doloris auctores: Consumtum præterea in ossæ femoris conspiciebatur periosorum, nec ossis superficie perperat humoris acrimonia, ubique tamen nigredinis huc putredinis alicujus notis: ubi caput seu pars femoris inferior cum tibia per 365. articulat, cartilago luxurians tumoris in genu causa deprehendebatur, quæ molam sive patellam genu loco moverat, & extensioni & ambulationi pedem fecerat ineptum. Infimum ventrem apertis etiam animis, sed parentes id piculium reputabant, quo citra mali fontem timari non liceat.

Occurrunt hic quædam, quæ considerationem urique merentur. Materia è qua fungi generantur, aliquando è loco, in quo propullulant, aliquando è locis temeriosis ferunt, illaque haud raro acris existit & corrosiva, quod non solum dolor evincit, verum etiam ossium, solidissimarum corporis nostri partium, absumtio. Favet huic pronuntiatio etiam subsequens historiarum biga.

Fœmina quædam fungum in pollice pedis dextræ gestabat, qui à linimentis & emplastris à balneatore quodam illis & applicatis irritatus, & sensibilia fovebat incrementa, & dolores inferebat intolerabiles. Hic unciam pendens, unâ cum pollicis anteriore articulo, amputatus, non solum unguem, sed & ipsum os in sui substantiam converterat, immo in ossæ radices egisse, aut ex ossæ in mucorem resoluta, aut tabescente, hauri fecus ac ex C. C. rasi sanie (vid. Verulam, Sylv. Sylvar. cent. vi. n. 546. p. 864.) prognatus videbatur, eo, quod radix illius cartilagineam præ se ferebat duriciem.

Idem mihi videre ante triennium fere contigit in quodam hujus loci panisfere, quem etiam fungus in pollice pedis dextræ micem assilgebat in modum; qui unâ cum pollicis articulo dextræ ablatus, eandem totius ossis proplaxat consumptionem, ut adeo micrum non sit, si ipsi fungorum substantiæ aliquando ossicula impacta compareant. Infelicio erat panisfex illi ferminâ, quod facta articuli diminutione non tantum non minuebantur dolores, sed & è vulnere alii nascebantur fungi: illius verò vulnus post durum septimanarum decursum perfectè consolidabatur. Causa fuit non alia, quàm quo materia fungorum in fœmina in loco affecto delitesceret; in viro in inguinis dextræ glandulis, quas duras tumidasque instat bubonum ostendebat; perinde ac juvenis istius in parte abdominis interna. Referebat Chirurgus se in alio, cui in digito sinistri pedis excreverat fungus, inguinis glandulas similiter tumidas observasse, quo unâ cum fungo pedis digito ablato vulnus quidem ad cicatricem perducebatur, è sup.

ē suppurata autem postmodum glandulis erupisse fungulos, mortis lentæ, acerbissimæ tamen, præcursoris eumoreque. Agrytarum præterea, barbitronum & balneariorum gloriatio est, se curasse, aut curare posse, si fomenta non juvene aut emplastra & cauteries, immo ipsi sectione illos, quos vocant *die Glind-Schwämme*, genuum tumores. Ego verò in his tumoribus semper cartilagineam exactitudinem adverti, quæ & parcellam loco movet, & pedum usum sustinuit, & proinde illis, qui curati nequeunt, annueravi. Quadriennium est, cum in vicinia nasirulus quidam mulieri cauterio potentiali circa genu applicato consuleret conaretur; sed non multum aberat, quin inflammatione, tumore & dolibus excitatis gangrana superveniente in vitæ discessum conjecisset aliis miserissimam. Interim tumores quædam à statibus & humoribus ortos curationem admittente neutiquam nego. *Christoph. Frider. Garmani.*

FURFURES Vid. *Plerum Fura.*

FURUNCULVS.

De Furunculo vid. præcipue sub titulo Tumor, Hic tantum de eo parca ex Clariss. Joh. Munnick.

Furunculus Latinis, *ὄζον* Grecis, Nostratibus *Few Bles-his*, est Tuberculum in aenmen protuberans, cum inflammatione, duritie, rubore, ac summo dolore, ovum columbinum magnitudine non excedens. Similiter C. Celsus lib. 5. cap. 28. Furunculum definit, quod sit, tuberculum acutum cum inflammatione, & dolore, maximeque ubi jam in pus vertitur.

II. Species autem furunculi plures sunt: Alius enim benignus est, ac mitis; Alius malignus, ac vehementius dolens. Idem observavit Paulus Aegineta lib. 4. cap. 23. sic inquit: Furuncularum alius est clemens, alius maleficus: Clemens quidem cum in sola cute coletur; Maleficus autem, cutis que difficilis, cum aliis radicibus actis in cutem erumpit.

III. Fit verò Furunculus è crasso, impuro, acidore, aliisve modis depravato sanguine, quem natura à reliquo puriore secernens, tanquam inferum & inutilem in corporis habitum etinere expellit.

IV. Signa quibus cognoscitur hic affectus sunt externa inflammatio cum pustula, & vesicula sensum interfectens, cum dolore, duritie, & rubore, cum Statum attigerit, qui paucos intra dies absolvitur. Porro tuberculum in acutum tendit, & columbini ovi magnitudinem non excedit. C. Celsus aliud signum adjungit, dicens: „Qui ubi adaperus est, & exit, super

apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, quam ventriculum quidam furunculi nominant.

V. Idem Celsus loco citato docet, in furunculo nullum esse periculum, etiam si nulla Curatio adhibeatur. Marcescere enim per se, atque erumpere. Sed dolorem effugere, ut potius. Medicina sit, quæ maturius liberet.

Dicendum ergo furunculum periculo vacare, nisi morbo grassante maligno in Anthracem degeneret. Sed quoniam Cacoehymie soboles est furunculus, hinc raro fit, quod solentius erumpat, sed ferè multis corpus scateat, atque inquinat.

VI. In curatione furunculi, quem humor hujusmodi tumorem efficiens crassus sit, impurus, acidore, & aliquando malignus, nunquam Repellentibus utendum est, sed ex sententia Galeni, & Pauli Aeginetæ, furunculus coquendus appposito Pane masticato, & in Cataplasmatris formam redacto; vel Diachylo cum gallinaceo adipe; vel ex C. Celsi præscripto, Gummi Galbano.

VII. Igitur applicandum mox emplastrum diachylum cum gummi; vel quid simile facillè confici potest, ut Puris generatio promoveatur & acceleretur. v. gr.

℞. Picis navalis, liquidæ an. 3j. Gummi Sagæ panni 3℔. emplastri diachyli cum gummi 3℔. M. F. S. A. emplastrum.

Vel ℞. Rad. lilior. alb. rec. ʒij. caparum subijeribus assar. ʒij. fol. althææ, flor. camomillæ & meliloti an. Mj. Coctis in aqua pura, vel ceterisvis tenui ad mollitiem, & in mortario contusus adde Farinæ Secaliginis, mellis virginel an. ʒij. nungen-ti Basiliconis ʒi℔. vitellos duorum ovorum M. F. S. A. Cataplasma. Furunculo aperto, & expresso omni ni Pure, vix ulla ultra Curatio necessaria est. Equidem Puriseductio ut facilius fiat, imponendum porro emplastrum diachylum cum gummi, cum nunguento basilicone, aut alio quodam mundificativo: postea emplastrum diachylum simplex, vel diapalma.

VIII. Sed malignus si sit furunculus, & ex venenata materia excitatus, malignitas illa, priusquam appliceantur remedia, foras trahatur, admotâ cucurbitula cum multa flamma.

IX. Ceterum ut præcaveatur ne sepius ejusmodi tubercula infestent, præcipiant mellei ut uox moschata mas vestibus infusant. Sed quæ vi & proprietate amuletum hoc ab istis satellitibus firmare corpus reddere queat, sagacioribus expendendum relinquo. *Joh. Munnick in Practi Chirurgica.*

Finis Libri Sexti.

JOH. JAC. MANGETI BIBLIOTHECÆ CHIRURGICÆ LIBER SEPTIMUS

De Affectibus & Operationibus Chirurgicis à Litera & incipientibus.



ALLICA LUES Vid. *Lues Fœneus*.
GANGLIUM.

DE eo videatur caput de Atheromate. Hic tantum observationem adducemus de Ganglio Nemausi mense Novembri ann. 1688. morbo viperæ curato, quam benignè nobis communicavit Clarissimus D. Rivalier, qui illic per plures annos Medicam Artem cum magna celebritate exercuit, nunc verbò Patria sua Religiosis ergo exul, Laufaux pro tempore commoratur.

Ganglium in sinistro capso gerens Pharyngopola Nemausensis, Farle nomine, nullius non generis remedia, ad fastidium usq; per sex aut septem annos, importuno tumori adhibuerat. Fermenta, purgationes, thermas, emplastra, gammi, hydragium, omnia frustra. Mactandis aliquando viperas incane transiens, in pollice finitæ manus comœcios est; sed ita leviter ut nullo affectus dolore, oculorum testium solum vix sequutus, idem se fuisse crediderit. Sed cum inceptum opus intentioni animo prosequeretur, necensissimum, tamè pollicis & brachii, innolenscens evanescens, sed satis huius consulendum esse docuit. Jam interiora pervadens, humoribus pestifero fermento coinquinis, vitales partes adoriebatur, spiritibusq; præ auni terrore, aut ob humorum depravationem, in confusionem actis, apertum mortis periculum impendebat. Permultis igitur medicis certatim Pharyngopola saluti studenter, multaque promissæ antidota propinantibus, ipse unum aut alterum viperam super craticula tollam deorabat, incisio sæpius vulnerato pollice, haurisque cardiacis, imprimis verbò sale viperarum volatili; ganglio penitus evanescente, peribilibi periculo perfungebatur.

GANGRÆNA.

De Gangræna & Spachelô, sic accuratissimè scribit Gulielmus Fabricius Hildanus Tractatus singulari.

Cap. 1. Quid Gangræna & Spachelus?

BENE Citero, Omni inquit, quæ à ratione suspicatur de aliquo re incognita, debet à definitione præficta, ut intelligatur, quid sit id, de quo disputatur. Omnia autem definitione fuscata tractatio. Est autem definitio generis duplex, unum quo rei, nomen declaratur, & nomen illustratur; velut cum Erymi ratio additur: alterum, quo plenius rei natura & essentia absolvitur. Illam Nominis, hanc rei definitionem vocant Dialectici. De Gangræna agenti nominis erit definitio illa latior Etymologica: Gangræna est morbus canem credens: siquidem Græci vos γανγκρηνη deducit est à verbo γανγρην, sive ut Hesychius γανγρην, hoc est, excedere, live rodere. At essentialis Gangræna definitiones plures sunt, apud idoneos scriptores Medicos utiturque ævi; quarum tamen nonnulli descriptiones potius, quam definitiones. Medicarum definitionum Auctor ait: Gangrænam esse mutationem colons naturalis, in colorem præter naturam, & mortificationem, sive adit exulceratio, sive abscessus. Galenus se videtur definire, initium mortificationis in parte ægra, quo paulatim se invadit & occupat partes vicinas, & adjacentes, ut nisi adferatur remedium, perfectæ sublequatur mortificatio. Idem Galenus dicit Gangrænam esse dispositionem mediam inter summam inflammationem, & Spachelum, eumque inflammationibus tantò deteriorem, quò magis est Gangræna Spachelo. Idem Galenus de Gangræna,

que inflammationibus accidit, ait: tum credi membrum Gangræni affectum, cum propter summam inflammationem tendit ad mortificationem, nec tamen planè mortuum est, & sensu expers. Alibi dicit, locum centri Gangræni affectum, cum propter summam inflammationem incipit mutari color, & perire sensus, tenditque ad mortificationem. Omnes omnium definitiones, aut descriptiones adferre, inquit, fuerit: superiores latius sint, cetera ex quibus etiam relique omnes derivat, ac penè transcripsit videntur. Nos quidem ut eam Gangræna definitionem colligamus, quæ & brevis & accommodata sit omni Gangræni, ex quacumq; causa orit, statimus Gangrænam esse principium mortificationis, eamque ut plurimum magnas inflammationes signi, atque æcerumpere partes molles corporis humani, veluti cutem, musculos, venas, arterias, nervos. Vel Gangrænam esse incipientem & imperfectam supra dictarum partium mortificationem.

Similiter & Spacheli nobis tradenda est definitio, quandoquid de eo sumi auctori; cum haud dissimilis sit affectio, imò in eam superior sæpius degenerat. Spachelus igitur sive Spachelismus & Syderatio Latinis, est plenus, perfectæ & absolute mortificatio, non solum supra dictarum partium, simul & ossium (uti sæpius usurpatur apud Hippocratem) verum & cæterarum omnium plus minusve solidarum. Itaq; in Spachelo cutis, caro, venæ, arteriæ, nervi, tendines, & ipsa ossa putrefacta sunt, ac magis magisque putrescunt; quemadmodum Galenus & experientia ipsa testatur. Et in summa, membrum Spachelo affectum planè mortuum & frigidissimum est. Ideoq; Gangræna & Spachelus à Clarissimo Viro Dn. Jacobo Auberto Viudone, olim Amico meo familiarissimo, quem honoris & amicitie causâ huius nomino, non immerito inter tumores frigidos numeravit.

Cap. 2. Differentia Inter Gangrænam & Spachelum.

PONITUR quamvis ex superiori definitione Gangræna & Spacheli differentia satis manifeste sit: attamen quia nonnulli, & præcipui hi, qui nondum satis sunt versati in cognitione morbi, & præterea, vocabula hæc adeò confundunt, ut ne ipsi quidem sese extricare possint: atq; nunc Spachelum Gangrænam, nunc Gangrænam Spachelum, nonnulli quoq; indifferenter, & sine distinctione tum Gangrænam, tum etiam Spachelum, aut Gangrænam, aut Spachelum vocant, atq; hoc modo non solum nomina, verum etiam (in perniciem damnum) maximum egorror, & sui ipsorum ignominiam) curatorem ipsum confundunt, visum est, distinctionem horum affectuum paulò prolixius declarare, atq; ob oculos ponere.

Licet autem tum Gangræna, tum Spachelus non ex diversis, sed ex eisdem causis originem trahant, nihilominus tamen non exiguum inter se differentiam habent, & requirit uterq; propria sua remedia, que curandi methodum. Primum dum membrum aliquod emoritur, nec tamen planè est mortuum, sed sensu aliquo adhuc prædictum affectus ille à Galeno aliisq; Medicis Gangræna appellatur. At quia præ affectu in Gangrænam ut plurimum maximo ardore, inflammatione, dolore, tumore, reliquisq; signis, calorem ac alium maximum signis ægræ afficitur, & inflammatio arg; inflatio hæc inflat ignis adjacentes partes invadit, rectè Gangrænam Germanice adjectes, Heiss Brand appellare possumus. Quamprimùm verò inflammatio atq; incandens hoc incensum ac ipsum calorem humidumq; radicale absumpsit, ita quidem ut membrum planè sit emortuum, tum ab Hippocrate, Galeno, alijsq; Medicis Spacheli nomen fortuitus. Nos verò, quia in Spachelo membrum in greffat, ac frigidissimum est, nihilominus tamen (propter putredinem) proxima adjacentes partes invadit, erodit, atq; devorast, Spachelum tum quibidam Medicis celeberrimis, Germanicè (Kalten Brand) occupamus.

Gangræna

Gangræna ut plurimum est in superficie, atque (ut superiori cap. declaravimus) cutem, musculum, aliasque partes molles afficit. In Sphacelo verò non tantum hæc partes molles, verum etiam ossa læduntur. In Gangræna cutis tubet propter inflammationem maximam, in Sphacelo verò fit primò pallida, deinde livida, & mox nigra. In Gangræna nullus adeest fœtor, in Sphacelo verò putrescit membrum & pefissimum emittit fœtorem. Interdum Scalpello adhibito æger sensum exquisitum habet, Gangræna, dum verò nullus amplius adeest sensus, Sphacelus, appellari debet. Membrum enim planè emortuum est: cautus tamen hæc in re ut sit Chirurgus, necesse est: frequenter enim ægri existimant, sensum novum expectare esse membrum, digitos quoque & pedem ut plurimum movent, ulque dum tibia ad genu fræc planè sit emortua. Sensus autem ille non verus est, sed fit per imaginationem præcedentis doloris, & Sympthiam partis vivæ cum illa, quæ jam emortua est. Digni quoque & pes moventur, quoniam membrum omnino sit mortuum propter ea quod, dum nervi, & musculi saniores, & circa genu moventur, nervos digitorum & pedis quoque movent, & ad se trahunt, deinde & ultimum differunt Gangræna & Sphacelus curatione. In Gangræna enim totum negotium in hoc consistit, ut præcaveamus, ne putredo aliqua membrum invadat, occurratque, aut si jam adfuerit, ulterius non progrediatur. In Sphacelo verò superfluum est in hoc impendere laborem, quandoquidem pars illa, quæ emortua est, reviviscere non potest, ideoque ut prolixius auferatur, sive id novacula & ferrâ, sive cauterio actuali aut potentiâ fiat, necesse est.

Cap. 3. Gangræna & Sphaceli causa Universalis.

Gangrænam & Sphacelum definitivum mortificatione, hinc quidem perfectâ, illum autem imperfectâ. Cum autem mortificatio sit vitæ extinctio, ne proinde calidi innati destructio, ut pote in quo vita verissime consistit, videndum quod modis, & quibus ex causis contingat innati calidi extinctio & deperditio. Nam eadem cause, quæ corrumpunt membrum, aut partem corporis, prout plus minusque sunt efficaces, parti illi vel Sphacelum vel Gangrænam inducunt, ac plerumque ut augentur, Gangrænam quidem prius, deinde verò Sphacelum.

Non potest autem calidum innatum existere sine humido ino radicali, & Spiritibus, scilicet in omnibus corporis partibus: Ad id ut gravior læsio humido radicali, innati calidi fontis & aleam, læta item Spiritibus, in quibus tanquam in subiecto hæderet, ipsum quoque lædatur innatum calidum. Humidum autem radicale resolvitur, dissipatur & absumitur cibo quotidiano non satis reparatum, & restauratum: vel si occurrat illi alienus calor vehemens & diuturnus: Aut etiam si contorqueatur, & veluti fixetur, cognatque acerrimo frigore. Sic etiam Spiritus, qui partibus affiat, ipsum tum humorem radicalem, tum innatum calidum committunt, possunt vel dissipari, vel suffocari, vel infici. Dissipantur negrâ refrigeratione & recreatione, per inflantes Spiritus, qui a partibus primariis continenter communicant, ac distribuunt reliquo corpori per nervos, venas & arterias. Suffocantur abundantie humore, siquidem innatum calidum assidue ventilationis egens, non potest integrè conservari. Inficiuntur denique à materia profluens maligna, venenata & corrupta. Hinc quæcumque cause possunt exsiccare, aut coagere humorem radicalem, quæcumque item dissipant, suffocant, aut inficiunt ipsos Spiritus, humores

radicales comites individuos, eadem sunt interceptendi ac destruendi innati calidi cause, ac proinde mortis. Et verò interitus omnis, sive naturalis, sive violentus ad aliquam ex his causis revocatur. Nam verbi gratia, qui leotes, aut violenta febris, aut ignis, aut fame, aut lentio intereunt, illi, hæcque, moriuntur ex dissipatione & absumptione humoris radicalis, quæ in his lubidè & repente, in illis fit lentius. Sic & qui rârâgidissimo algore pereunt, dici possunt interire propter congelatum, coagulatamve humorem radicalem. Quæ ex ingenti aliquo vulnere, cum insigni hæmorrhagiâ vel secus pereunt, illi procul dubio extinguuntur propter magnam dissipationem simul & scem factam. Qui strangulantur, aut submerguntur, vel qui ex hydropse, aut ingenti insignique contusione pereunt, eos verò dicimus mori propter suffocatos eodem spiritibus. Postremo, qui isto mortis venenato, aut toxico sumpto pereunt, in his maligna spirituum insectio moriem creat. Quod si totum corpus hoc modo interit, innato calido sic affecto, uti supra diximus, sit ve penitus humoris radicalis, sive etiam inopis spirituum eum comitantium, haud dubiè quædam illius partes possunt pariter mortificari, ubi similes defectus innato calido accidunt. Tum enim necesse est illarum crasin & harmoniam dissolvi, sive subito, sive sensim. His ita constitutis, dicimus membra sive partes corporis mortificari, seu potius extinguî posse, ab aliquâ ex his tribus causis. Primò quidem ex vehementi alteratione qualitatibus manifestâ, qualis est interperies calida, frigida, humida & sicca. Deinde ex qualitate occulta, hoc est, materia maligna & venenata, sive corpori ingenti, sive extrinsecus contractâ. Omnis enim hujusmodi materia totâ sua substantiâ corruptit innatum calidum, & spiritus inficit. Tertio denique cum partes corporis patitur afficiuntur, ex spirituum maximeque viraliū infestatione, aut interceptatione. Atque hæc cause dum extinguunt innatum partibus illâ calidum, prout sunt magis minusve violentæ, efficiunt in eis primò Gangrænam: deinde si eis non satis rectè occurratur, aut occurrî non possit, Sphacelum. Hæc in universum sunt cause Gangræne & Sphaceli: Clarior tamen doctrinæ gratiâ tres hæc cause tribus subsequentibus capitibus ordine, & paulò prolixius declarabimus.

Cap. 4. Prima particularis causa Gangræne, alteratio videlicet vehementer ex qualitate manifestâ, puta interperies calida, frigida, humida, & sicca.

Siquidem res omnes, auctoritate Galeni, conservantur proprio calido temperato & naturali, contra externò & præter naturam corruptionem, utique parte aliqua diuturnâ inflammatione affecta, per affluxum aut congelationem humoris sanguinei, aut bilioli, desinit tandem in Gangrænam, aut etiam Sphacelum. Nimirum quia humor radicalis à calido extraneo, & præter naturam exsiccat, & absumitur, unde & ipsius tandem innati calidi extinctio. Uta venit id quod tunc phlegmoni temerè adhibetur frigida, & adstringentia, aut etiam emplastica, à quibus spiritus influentes, ipsorumque nutrimentum primò arcentur & repelluntur, ut Fernelius & alii docent, à parte affectâ ipsique ad id portis eorundem medicamentorum usu constitutis, humores extrinsecus illi parti impinguntur magis, ac veluti incutuntur: Atque ita obtruitur profoccaturque quævis humuncque inest innati calidi. Ideoque non immerito hæc de re nos monet divinus Hippocrates, inquit: *Frigida, & aliud quæcumque corporis malum, ab exterioribus & ignobilioribus partibus, versi ad interiora, ut ad partes principales & nobiliores non est bonum, quin vitâ*

particulæ adfert. Nam quicquid est illorum, humorum à quibus *Erysipelas* nascitur, ad partes principes, ut cor, pectus, cerebrum propellitur & protunditur. Ab interioribus autem ad exteriora converti *Erysipelas*, & aliud quodvis malum interius effusum, bonum est: vocatur enim ad superficiem cutis superficialis & malignus humor. Adtipulatur & *Arterena*, cum ait: malignos interitus oriri dolores ex repercussionem uis, ipsumque humorem sapius inter pelli, unde pars affecta livida & nigricans evadat, denique computrescat. Quidquid enim transpiratione minimè ventilatur, putrescit facillè, teste *Galeno*. Cum enim phlegmonis antecedens & continens causa sit sanguis calidus & humidus, quiescente aut qualitate peccans, hic alio quovis humore citius putrescit & corrumpitur; Si repentinè nobis, aut Emplastricis inter pellitur, aut aliquo retinetur in ima parte affecta: hac ex causa inflammationi plerumque Gangræna succedit. Hic nonnullorum Chirurgorum ignorantia, quod in magnis inflammationibus frigida lina, & emplastrica cataplasmata, ex farina hordei, bolo Armeno, albumine ovorum, aceto, & similibus frigida, frigida applicant, merito est notanda. His enim calidum innatum non solum debilitant & imminuunt, vetum etiam ut plurimum extinguunt suffocantque: ita ut Gangræna & Sphacelus necessarid sequantur.

Altera causa, cur ea usu frigidorum medicamentorum in magnis inflammationibus Gangræna sapissimè consequi solet, est, quod humidum radicale gelatum, & ineptum ad caloris pabulum factum sit: quemadmodum oleum & pinguedinem frigoris vehementer condensari videmus, ut postea fusius declarabimus. Ut autem in inflammationibus adtingentia & emplastrica periculosa, sic & præter modum calida, pinguis item & oleosa. Olei enim & similia pinguium usus nusquam inflammationi, teste *Galeno*, convenit. Arteria vulnerata, cutis superjecta coalescit, Et arteria propter continuum motum, & duplicem ac durissimam, quæ prædixi est, tunicam serius agglutinetur, & coalescit, ita extravasatur sanguis, & sic tumor Medicis Aneurysma dicitur. Tum sanguis ille extravasatus corrumpitur, auctoque calore putrescit, unde sepius Gangræna & Sphacelus. Id accidit, quoties improvidè Chirurgus tendens brachii Basilicam, non eam modò, sed & arteriam illi subiectam percutit. In sectione itaque huius venæ ubi quoque medianæ, adhibenda est diligentia: Basilicæ enim arteria, uti diximus, medianæ verò tendo musculi Bicipitis subjacet. Quare periculosa autem harum partium sit punctio phlebotomia facta, ea sequentibus appareat exemplis. Anno 1587. Genevensi cuidam à bubionifore luesi basilicæ, arteria simul percuta fuit. Non diu post infatum, dolore item & inflammatione correptum est brachium, Advocato Johanne Antonio Saraceno Medico celeberrimo, ac Joh. Griffonio Chirurgo longè ingeniosissimo, inventum est Aneurysma quod in Gangrænam degeneravit. Removente verò xgro amputationem brachii, intra paucos dies naturæ satisfecit.

Ante annos aliquot Colonie in ædibus *Remondii Ringius* phararmacopolæ vigilantissimi, puellæ caspædam ex domesticis à juvene bubionifore, incisi medianæ, subiecta cauda musculi bicipitis simul puncta fuit. Hinc statim exortus est dolor vehemens, totius brachii inflammatio, & convulsio periculum. Ego cum Clarissimo & Doctissimo Viro Dr. *Hendrico Bettero* Illustrati, Jullacensis, & Montensi, Ducis, nec non Illustr. Hassæ Landgravi Doctoris Medici ordinario atque Celeberrimo, vocatus, illam purgavimus, brachium Anodynis inunximus, & ca-

taplasmata ejusdem inventionis applicavimus, venam in malleo incidimus, ita, ut tandem Dei beneficiis convalescit. Hæc ea de causa recitare volui, ut Chirurgus in sectione venarum cautus sit & prædixi, ut rectè monuit *Celsus*.

In Articulorum & nervosarum partium vulneribus, & si Chirurgus propter impetium, aut negligentiam, vulnere simul & corporis rationem non satis diligentem habuerit, oriuntur dolores maximi, sequiturque Inflammatio, inprimis si plenitudo ad vasa, aut ad vires advenit. Tandem quoque humor acris, subtilis, & indigestus, quem *Celsus* hydropem & meliceriam, nostros verò Chirurgi ineptissime vocabulo *Glandmaster* hoc est, a quam articulosum appellant, & esse arbitrantur, sed falsè, quemadmodum in tractatu nostro penultimè, de hoc affectu scripto fusius declaravimus. Essint autem humor ille aliquando tam copiosus, ut *Langius* tectatur, ut pars ita affecta emoriatur, & Sphacelo corripatur. Insignes contusiones quales ex scopetorum vulneribus, & aliz undeunque factæ partium carnosarum, inprimis, si ossa simul fracta fuerint, non tardè desinunt in Gangrænam & Sphacelum; præsertim verò si longo tempore adtingentibus curentur, uti fit ab impetibus. Cum enim impeditur digestio, quæ fieri debet medicamentis calidis & humidis, caro contusa, & sanguis coagulatus facillè corrumpuntur, tandemque putrescentes ipsum innatum calidum extinguunt.

Accidit etiam Gangræna infantium pudendis, si ve obstrictis, dum ea necto prodeunt, coram lumbos duris atrectaverint, si ve in ipso partu nimium compressi fuerint. Pudenda enim, cum mollia & spongiosa, facillè suscipiunt sanguinem contusum ac livescerentem, qui inibi corrumpitur, unde dolor & inflammatio, quæ demùm suffocat ingratum calidum, id quod non ita pridem mihi apud diversos infantes videre conigii.

Enormes unctiones interdum excipit Gangræna, vel etiam Sphacelus, quemadmodum accidisse comperi honestissimæ matronæ apud nostros Hildanos, illa enim tempore hyemali, quodam die propter domesticæ negotia defessa, ad focum sedens, & Syncope correpta, in terram, & una quidem tibia in ipsas penas cecidit, illamque antequam domestici accurrerent, graviter sibi intulit. At quia hæc matrona obesa valde & pravus humoribus non parum onerata fuit, secutus est affluus humorum, dolor, inflammatio, non diu post Gangræna. Illa nihilominus, Dei beneficio, & medicamentis à me adhibitis feliciter curata, & in integrum restituta fuit. Quod autem magnæ unctiones interdum in Gangrænam terminantur, hisce sit de causis, primò quia vasa cotruntur unctione, & constinguntur, si que via obstruitur spiritibus vitalibus, ut nequeant libere permeare: secundò, quia humor radicalis partem adunatur, & excruciat ignis vehementior. Cum enim destitatur innatum calidum humorum suo radicali, necesse est partem afficere interire. Est & recta causa, nempe quod tum empyreuma, tum etiam contragatio cutis summum accendat dolorem, ac proinde humorum affluum exciet, quibus in parte affecta incallescuntibus, & inflammationem concipientibus, excruciat humor radicalis, ipsumque innatum calidum suffocant.

Gingivarum inflammatio maximè in infantibus, in gangrænam interdum degenerat: partim propter abundantem oris illorum humiditatem; partim, quod non possint ad justam morbi necessitatem medicamenta apponi. Morbus enim magnus, vehemens, & præ-

& petracina, magna quoque requirit remedia; sed quis illa in ore adhibere usus? Accedat & alia difficultas, nimirum, quòd magna illi abundantia salivæ medicamenta potius abluantur. Hujusmodi Gangrænam non solum in Scorbuto, verùm etiam aliis ois affectibus, & præsentim inflammationibus gangrænam laborantibus, me vidisse memini. Inflammationes quoque internæ non raro desinunt in Gangrænam & Sphacelum: cuiusmodi vidimus in ipsis etiam cerebri membranis, ut patet ex sequenti historia. Fuit apud Delphinates Helveticis Anno 1587. quendam ex eo numero cutavi, robustum juvenem, bono habitu, ac capite sacrum, hunc in modum. Ensis Helveticus scio scia illi fuerat pars ossis parietalis, cititer palmam lera: hæc autem cuti musculosæ adhaeserat. suoque loco erat reddita: quin & sanguinis & pilorum in eruvia concreverat veluti crusta, quæ totam illam partem contingens, impediatur, quo minus ulla materia fere diebus totis ab accepto vulnere promanaret. Postò abluas cinibus apertoque vulnere, inventa est inter partem ossis lapsum, & duram matrem, plurima materies graveolens simul & ossium tenuia aliquot fragmenta; prætereaque, quòd majus est, vermes grandisculi quatuor aut quinque. Insuper & dura mater denigrata & infecta erat puritudine, tam diu insidente. Eget nihilominus convalesce, (latissimè Jani Antonii Saraceni M. D. Consilio, & Joh. Griffonii Chirurgi longè pretiosissimi op. a. a. quæ in dultis: quibus & ego interfui, Uxor Judicis Oberadeniis ad Coloniam 24. annis scitico hepatis laborans, tam multa subinde adhibuit emollientia, ut tandem inflammatione, deinde etiam abscessu maximo in hepate facto, abdominis musculi & cutis labem, ac demùm etiam exultationem sensit. Adhibitis in consiliu cum Domino Arnoldo Mantho Medice facultatis in Colonienfi Academiâ Professore primario, deprehendi maximum tumorem in hepatis regione, paulo ante ruptum, quàm adversissimè, cum tanto fæore, ut nihil suprâ. Inibi exitum est ulcus ingens, ex quo plurima materies farginolenta, lubilis & graveolentissima, simulque plures omenti particule, ut & hepatis loborum, planè discederent: unde paucis post diebus obiit. Ex quibus perspicuum fit, scitico tumores emollientia non esse adhibenda, quæmadmodum Galenus de simpl. Medic. facultat. lib. 5. c. 7. rectè monuit. Nec solum scitico tumores internorum, verùm etiam externorum parium, ex usu emollientium exasperantur, & in cancro convertuntur, ut in meis Observationibus vatis exemplis demonstratur.

Filio meo septenni accidit magna ex cerebro defluxio in æteter: unde urinae obstructio tanta, ut ne guttula quidem permeare posset, & quantumvis sitis variis adhibitis remediis, senâ die obiit. In cæto apertoque abdomine coram Clarissimo Joh. Stano M. D. inventi sunt cæces cum vicinis partibus inflammatis, & Gangræna correpti. Cæterum cum hic de inflammatione renum sermo sit, sequentium eorum exoticum, quæ mihi à Clarissimo Domino Dno. Bartholomæo Merckelino Medico Palatino & Laugingono longè celeberrimo, & amico meo singulari studio observando, per epistolam communicatus fuit, in gratiam Scodiosorum rerum rararum hic insereere viliu est. Reman, inquit, frustra, pollicis magnitudine, per virgam maximo tormento & dolore exteriora vidi in Archimagistro Dillingano, & Selz dillio, Anno 1593. tandem tamen 24. Julii mortuo. Testes oculati sunt heredes, imprimis Chirurgus partif. Genus Dni. Michael Bercholdus Dillinganus, qui perperu ipse adfuit. Hæc Mercklinus:

Nobilis quidam sexagenarius Dysentericus, cum quinta die morbi vitam cum morte commutari, & veniet ipsius à Dn. Claudio Chapuso (chirurgico celeberrimo apertus fuisset; interitum undique Gangrænosâ reperta fuisse, procul dubio propter ingentem inflammationem. Historiam hanc ipsemet Dn. Chapusus ad me scripsit Anno 1615. die 25. Februarii. Aperui olim corpora ex illa passione defunctorum, in quibus omentum & intestina tota Sphacelo tenebantur: ex his factor gravissimus venit peniculus morbi causam indagare Breviter; nulli non corporis parti Gangræna potest accidere: Illius quoque inflammationibus, ut pote Erysipelati aliquando succedit Gangræna: sed ineptius quando frigidis adtingentibus, & emplastris medicamentis calor ille adventitius intro repellitur. Hinc extincto calore nativo, & assumpto humido radicali, emouitur pars ita affecta. Pinguia quoque & oleosa, ut Galenus testatur, hic misimè ex usu esse debent, ut antea quoque monuimus.

Hæcuna de Gangræna ex Intemperie calidâ: nunc de illa, quæ ex altera activa intemperie, nempe frigida oriuntur, agendum. Talis ea est, qualis quæ sæpè extremæ partes corripitur, dum lumina vi frigoris humor radicalis & spiritus ædè frigesunt, ut cogantur atque concretant, quomodo pinguedo, oleum, & ipsa aqua frigore densantur & congelantur. Humore radicali sic indurato, calido innato suum dicit alimentum: & adde quod externum frigus spiritus devios ad interiora pellit. Tum vitò natura novos spiritus, parti affectæ subsidios mittit, qui quidem in illa compositam partem harmoniam nacti, illud ad suam originem recurrunt: a que ita pars affecta calido proprio delitescit lotet. Idem usu venit hyeme iter facientibus per nivem, glaciem, & aquam frigidam, maxime in regionibus alij, Alpibus inquam, Islandia, Norvegia, Livonia, & cæteris Septentrionalibus, quippe lis in locis frequent, ut Olavus Magnus & alij testantur, hyeme moruorum ex frigore occurrat. Plurimis extremâ concidum antum, narium & digitorum.

Hic memini, me Anno 1588. mense Decembri cum Clarissimo, & longè celeberrimo Virò Dni. Jano Antonio Saraceno Medico Regio, curasse Comitum Mansfeldium, cui Gangræna ex frigore utriusque pedem invaserat; unde & digit aliquot perierunt: antea brevè pertransiit est. Curabam quoque tum temporis supra quinquaginta Equites & milites Germanos, hoc ipso morbo, ex eadem causa contracto, laborantes: ex quibus complures restitui, nec tamen sine tribzium aut pedum, manuumve detrimento. Eo tempore (proh dolor!) dissipatas magnas illas Germanorum nobilium in Gallia copias, hostis in Sabaudiam usque ita persequatur, ut plerique milites natalis amicitias, aliisque locis nivolis superis, vitam fugâ redimere cogerentur. Eadem ex causa paulo post obierunt plurimi Lipothymia, Syncope ac sudoribus frigidissimis; alij Verò Gangræna & Sphacelo correpti. Hos interem boni Geneveus (quod commemorare juvat) benignè & Christi ne amplexi sunt, nonnullos Xenodochio suo, alios privatis ædibus excipientes, sique liberaliter Medicos & Chirargos suos adhibentes, ac inter cæteros præstantissimos Viros, Janum Antonium Saracenum Med. Doct. & Johannem Griffonium Chirurgum longè præstantissimum: Sed & plerisque finitimi retribuitis, & in patriam remigrantibus suppeditaverunt tum etiam vestimenta, quoniam spoliati nudatiq. veniant:

Medicamenta Narcotica, velut Opium, Cicuta, Hyoscyamus, Mandragora, temetè inflammatoribus adhibita, videntur cogere humorem radicalem, ipsumque aded innatum calidum extinguere, quod & ipsius aquæ frigore usâ venire observavi. Siquidem Anno 1591. sub Canicula Hildense in parva, puella, Sophia nomine, laborans febri continuâ, eâque ardentissimâ, dum die Critico sudore & calore summo aestuat, deducitur ab imperita quadam femina à lecto ad putrum: hinc humida frigidissima (qualis est ferè putrorum id temporis) immersisque manibus ad tritus captandum, statim exortus est dolor, quodcumque aqua attingerat, cum tumore, cui paulatim succussit livor. Propinquâ neglectis remediis initio salutaribus, post octavum decimum diem, me consulente: tum deprehendi dextram puellæ ad carpum usque vesicis lividis exinflatam, extrema digitorum arida, & ferè deserta: adhibitis tamen scarificationibus aliisque idoneis remediis tantum effecti, Deo sic favente, ut tota propemodum manus conservata fuerit, exceptâ primâ digitorum articulatione. Altera verò manus initio quidem tumore dolentque affecta fuerat, sed postmodum omnem malignitatem in dextram quali deposuerat. Vixit puella usque ad annum 1607. mensem Augustum: obiit peste Hildense apud Rev. Virum Dn. Joh. Alte Steidamm, ejus loci verbi divini Ministrum fidelissimum, cujus per annum integrum fuerat ancilla. Is mihi affirmavit, illam omnia officia rusticana quàm optimè & absque impedimento peragere, imò & nêre potuisse.

Esti qualitas humida patiens potius est, quàm agens: tamen (ut supra cap. 3. attigi) spiritus infirmi humorque radicalis, & cum his innatum calidum, possunt ab ea suffocari. Itaque quoties pars aliqua corporis, ac potissimum tibiæ, & pudenta insigni aîqua intemperie frigida & humidâ, eâque diuturnâ, constitatur, facillè possunt Gangrænâ & Sphacelo pectiendi. Verùm hæc Gangrænâ species vix aliâ accidit, quàm qui diutius morbo aliquo laboraverint, velut hydrope aut alio quopiam gravissimo parium internatum affectu. Neque verò existimandum, isolam per se id genus intemperiem, partem exitum occupantem, insibi Gangrænam efficere: ut præcipua causa innari cãssid, spirituum item & alimentis penurie adscribenda. Illa enim morbi diuturnitate & accretione plurimum imminuuntur, maxime in partibus intimis, & organicis: aded ut partes remotas iis tandem distantes necesse sit interire, ut Lepius hydropicis accidit: mirum in præcipue si adnectat scirrhosus tumor in hepate. *Ita enim, ut testis docet Vallieria, Vasa de latioris sanguinis ocellud, ita ut sanguis bonus ad partes inferiores deferri minime possit. Unde fit tandem, ut insigniter refrigerata parte Gangræna emascetur.*

Sic & pudenta cùm sint vicina hepatis emunctoris, prætereaque suapte natura, raris & molliâ, facillè imbunant humoribus serosis, quibus redundantibus suffocantur innatum calidum, hand secus, ut exigua flamma aquâ copiosâ infectâ facillè restinguitur. Quod si quis imperitus admovent Emplastica, ut fit interdum, tantò citius accidit ipsa suffocatio.

Ex eadem causa Gangræna in ore infantium occidit, quotiescumque humor serosus ex capite copiosè exillat, & gingivas palatumque occupat, uti accidit iis, qui cerebrum præter modum humidum habent, aut hydrocephalo tenentur.

Esti sicca difficil: corruptum, est tamen Gangrænâ species, quæ non nisi ad intemperiem siccam revocari possit: & nihil est aliud, quàm absumptio humoris radicalis aique exsiccatio, & quali marcor venarum & arteriarum, ex eo contingens, quod nullum accipiat à partibus organicis sanguinem: hinc enim fit, ut cùm innatum calidum, & spiritus infirmi non alantur & foveantur amplius sanguine nutriti & vitali, necesse sit partem sensum emori, quomodo lucerna oleo aut ignis signo deficiente restinguitur. Hæc Gangrænâ solis co potius extremis partibus videtur accidere, præsertim digitis, ribis, & pedibus eorum, qui morborum vi extenuantur, & constabescunt; verbi gratiâ, febrium tantum acutiarum, quàm diuturnarum, atrophie, phibitos, & similibus internorum affectuum. Idem senio, aut longâ diuturnaque fame confectis venit. Nam & his partes intimæ & organicæ, cùm extrema sufficiens sanguinem & spiritus suppeditare nequeant, non vasa modò, sed & ipsâ integras partes excari necesse est. Sed & partibus deflatis humore radicali innatoque calido, sensum accenditur calor præter naturam, qui quidem eas corrumpit & putrefacit.

Majorum item articulationum, puta scapularum aut coxendicum luxationibus (sive à causa externa & violenta, sive ratione affluxus humidiorum & viscosorum humorum fuerint) malè constitutis, sequitur atrophia, & macis brachii, aut tibiæ: cùm quis mucoris copia frigiditate sua obstructionem parit, atque aded impedit, ne nutrimentum illuc deferatur, tum etiam, quod caput ossis tuo loco movum comprimat ipsa vasa, prohibeatque, quo minus sanguis & spiritus ad partes subiectas deferantur, unde atrophia. Quod si hujusmodi ægri ad senilem ætatem pervenerint, aut longiori morbo consueverint, tandem ferè in Gangrænâ discrimen incurrunt. Idem accidit obstructâ venâ cavâ, ut ante aliquot annos observavi. Quidam alloqui bono temperamento præditi, & ætate integra, incidit in Gangrænam unâque tibiæ, latente causa, nisi quod antea tibiæ & pedes afflicti frigebant, ingravescebant, & quasi stupore tenebantur. Ut ut sit, illi supervenit Gangrænâ, nulla præcunte febre, aut causâ extrinsecâ: ita paulò post obiit, oborio ad uigne genus Sphacelo. Aperto cadavere, invenimus tumorem scirrhosum circa venam cavam descendentem, nempe intra renes, ubi hæc vena ad utramque tibiæ bifurcatur. Scirrhus in magnitudinem auctus, ita constrinxerat venam cavam & arteriam, descendentes, ut nullus sanguis ad citra nutranda & vivificanda permeare posset. Hæc igitur due posteriores Gangrænâ species possunt quoque ad spirituum interfectionem, seu causam referri. Brevisari studeo hæc cetera similis Gangrænâ exempla, quæ habeo. Ex superioribus autem omnibus colligo omnem intemperiem poss: esse causam Gangrænâ: nec ita tamen, ut omnia intemperies necessitò in Gangrænam degeneret, sed ea tantum, quæ & vehemens est, & diuturna, aut contra artis præcepta tractetur.

Cap. 5. *Secunda particularis causa Gangrænâ, nempe alteratio vehemens ex qualitate oculis.*

Suprà de Gangrænâ, quæ oritur ex qualitate manifesta, hoc est, ex intemperie aut calida, aut frigida, aut humida, aut siccâ: quibus etiam compositas complectimur: quando

raro tota & simplici Intemperies occurrir, ut annotat *Galenus*. Nunc tradenda est altera causa, qualitas videlicet occulta, idem sic dicta, quod non agat in corpore calefactione, refrigeratione, humectatione, aut escificatione manifesta, quemadmodum superiores Intemperies, sed modo quodam occulto, & menibus nostris impervelligabili, subitò corruptat corporum substantiam, ut sit in Gangrenis compluribus. Unde intelligimus, quàm sapienter *Hippocrates* divinum quiddam inesse morbis pluribus dixerit. Quamvis autem in Gangrena à medicamentis septicis, aut à motu ictere venerato, potest pletumque notari causa aliqua manifesta, nempe Intemperies: est tamen præterea quiddam aliud peculiare, & supra naturam ac mentes humanas, quod vel mediocriter in Chirurgia cognoscitur licet animadvertere: Quibus optimè cognovimus est, quàm severissima symptomata ea minima portione Arsenici, aut Meteorii sublimati, via granum hordei adæquante, ulceri alicui in crure, pedibus, manibus, aut digitis imposita, non raro subitò, omnesque partes corporis, imprimis princeps, commovere atque alterare soleant. Ita enim partes nobiles preit, ut in cerebro delirium, in corde lipothymiam excitet: calefacta deinde à venenosa ipsius qualitate massa sanguinis Intemperies calida in toto corpore & febres, quin etiam nausæ & cibi fastidium, eructationes, aliasque symptomata suboriuntur, ut *capite* 13. fusiùs declarabimus.

Potèd materia huiusmodi malignitatem committi, aut corpori innascitur, aut extrinsecus advenit, ea motu ictere virulenti animalis, aut ea adhibitis septicis. Ingenua causa dici potest, verbi gratia, cum grumus aliqua sanguinis extravasatus, aut alia quovis materia corruzione tantam venenositatem & malignitatem adsciscit; ut postea, si naturæ vires tulerint, in extremitates recollat & translata, ibi suffocet innatum calidum, adeoque breves partes eas petat atque corruptat. Tale quid observavi in tuffica puella, ad Ductulordium. Huic enim pelle antea confissata, cum perfusa, ta videretur ab omni bus suis symptomatibus, puta bubonibus, carbunculis, febris, &c. subitò tantus exortus est dolor in utriusque pedis digitis, ut sydetati fuerint illi: adeoque ad ultimam usque articulationem amputandi fuerint. Quo facto, & adhibitis remediis, tandem convalescit. Verisimile, reliquum illi fuisse à pestilentia mæstem quampiam malignam, quam velut per crisi naturam huiusmodi extremitates excussit.

Idem vidimus in minus malignis, ut in Variois, natura cricis exonerata mæstem penitus malignam in extremitates & articulos: unde & ipsa ossa cariosa evaserunt. Huius rei exemplum singulari videre licet *Observ. meum Chirurgicarum* 80. Censuræ primæ. Vidi in severissima pestilentia, quæ Novilunio Germaniæ, & quidem Archiepiscopi parisi Colonienfis Oppidum infestavit, aliquot Anthracis, qui, siquam partem carnosam invaserant, vii clunes, femora, scapulas, mammæ muliebres, ejus bonam partem intra horas 24. ita supescerent primum, & deinde etiam planè corrupterent, ut tandem pars tota excideret. Age, quis valeat tamè malignitatis causam reddere? Et verò omnes pestilentes carbunculi, quoniam momento partis, quam occupant, nativum calorem extinguunt, malignitatem addunt & oculum, quæ corâ substantia agit, in sese continent. Nunquam in fine morbi alioquin acuti materia quodam venenosa & maligna ad pedem descendit, ibique

calorem innatum extinguit, harmoniam partis destruit, & Gangrenam inducit, cujus rei exemplum mihi communicavit Clarissimus & doctissimus Vir *Dn. Janus de Burgo Medicus celeberimus*, cui lector videre poterit. *Observat. 3. Cent. 3.*

Anno 1587. Nobili cuidam Obhati Helveticorum *Dn. Johanni Tomacero*, Viri Genetæ & Virtutis, imprimis verò pleræque verè Nobili, & mihi familiari, idem accidisse memini. Ia enim, cum ex febre continua & acuta curatus esset, & paulatim vires suas recolligeret, post duos menses dolore acutissimo in ipsa planta pedis sinistri correptus fuit, cui mox inflammatio, Gangrena, & Sphacelus sequebantur. *Dn. Jacobo Auberto*, & *Dn. Abrahamo Matello*, apud Lausimenses Medicis Doctoribus longè celeberrimis, in consilium adhibitis, & ad poplitem amputato crure, brevi convalescit, & ad hunc usque annum 1616. optima valetudine fruitur. Ex ligno autem grallam in formam crucis cum elegantem effingi atque fabricari curavit, ut ab altero crure vix discedere posset, tibialibus enim & calgis grallam illam quoque indidit, in d & occitis quando equum condendere animus est. Post Dyenteriam pecto cuidam idem accidisse, lector in 4. Centuria Observationum nostrarum videre poterit.

Ad hanc quoque causam revocanda Gangrena ex motu & icte bestiarum venenatarum. Quamquam enim quarundam venenum est calidum, puta viperæ & basiliscæ Marini, quippe quod calidam Intemperiem isti parti imprimat: aliarum verò frigidum, proindeque sanguinem in venis congelens, uti Scorpionis & Aspidis venenum, habet tamen particularem quandam & occultam vim potest faciendorum humorum, & inficiendorum spirituum. Idem constat ea rabidi canis morsu. Equi & leonis morsus nonnullis venenatus creditur, ob gravissimam, quæ citè, symptomata: sed dixerim potius has bestias ceu longè robustissimas, vi sua contundere, & conterere musculos, venas ac nervos, imò & ipsa ossa interdum: unde acutissimus dolor & inflammatio, ac tandem Gangrena & Sphacelus, ea vehemensissima (nisi credo) contusione; non quod venenum illud latere comparere. Si enim morsus horum animalium per se venenosus essent, tum parva vulnera, non minus ac magna, essent periculosa, quemadmodum in morbo canis rabidi fieri videmus; ubi minimam quidem vulnus, si neglectum fuerit, mortem infert. Contra verò in prædictorum animalium moribus, vulnera ingentia, præcipuè ubi ossa simul sunt fracta, tantummodo periculosa, exitiosaque esse, & aliquando in Gangrenam degenerare, experientia testatur: idque præcipuè si fractura nimis arcte ligata fuerint, ut sequens historia fidem faciat. Cuidam in Belgio brachium ab Equo morsum fuit, cum maxima contusione, & ossium fractione. Fractura hæbarionore reposita & arcte nimis ligata, post paucos dies brachium inflammatione & Gangrenâ corruptum fuit, ut in nostris Observationibus fusiùs declaravimus.

Luporum morsus venenosus tradit *Cervus Stephani* in venatione liporum, quia quæ momordere animalia agrè faveant, ac sepe numero demorse partes compurrescant, hanc opinionem etiam alias in dubium vocaverim, rationi tamen consentaneam esse, & motus hujus setæ aliquid venosus vulnere imprimere, ac post se relinqueret, ante annos aliquot experientia me edocuit, quemadmodum in quartâ Centuria Observationum mearum exemplo quodam memorabili demonstrabo. Deinde Lepica, in primis

Attenendum

Arsenicum, Sandatacha, Alie petree Ros, aqua fortis, ol. vitulosi, & huiusmodi, temerè admodum locis calidis & humidis, verbi gratia, oii, emunctoriis, pudendis, & infanum carni molliculæ, foeminarum itidem & eorum, qui in otio degunt, aut sedentarii vitam agunt, creant interdum Gangrenam & Sphacelam. His epim oculata vis ex tota sui substantia liquando & putrefaciendo carnis, inhis vapor dum ad partes principes fertur, spiritus insidit. Memini, ut antea quoque monui, cum vix granum Arsenici, quantumvis aliorum millione circum, applicatum esset pleuri tibiæ, subinde accidisse deliquia, Syncopen, febrem, delirium, & inquietem, ex quibus symptomatis facile erat coniecere, tres partes corpora primarias, cerebrum, cor & fœcur labem aliquam sensisse, transmissâ nimirum Pharmaci malignitate per arterias, venas & nervos. Sic mihi retulit Clarissimus Dn. Janus Antonius Saracenus Medicus Regius, Genevæ intra paucos dies sublatum robustissimum Helvetium, cui, cum tumore caneroso ad carpum laboraret, Chirurgus quidam aliqui doctus, & in arte sua versatus, pulverem ad cancerum, qui recipiebatur Arsenici cantillum, quoque aliis in ulceribus putridis & malignis, non tamen canerosis, feliciter usus, adhibuerat. Liquefactâ enim, & putrefactâ carne vi arsenici, venenum simul & vapores putridi & maligni à carne liquata & putrida per arteriam, que in carpo est, ad cor ascendere facile potuerunt. Monitos etenim velim Chirugos, ne huiusmodi medicamentis septicis & venenosis, nisi summa cum prudentia & moderatione utantur.

Cap. 6. Tertia & ultima causa particularis
Gangrenæ; nimirum interceptio
spirituum.

Tertia & ultima causa particularis Gangrenæ est interceptio spirituum, sanguinis & alimentis, quod videlicet accidet ac vix quancumque ex causa obstruuntur, ita quidem, ut spiritus illi & sanguis nequeant permeare, fovendo partium humoris radicali, & innato calido, unde necesse sit eas Interire. Tale quid nimium frequenter accidit, dum Empirici, & ceteri improvidi homines, atque luxuriosæ artis offæ fracta constringunt. Sic enim dupliciter peccant: Primò, quia maiore copia, quam par sit, sanguis & reliqui humores ad locum affectum attrahuntur, quemadmodum videre licet in venarum sectione, nisi enim arcta atque stricta ligatura injecta fuerit, sanguis vix adfluere cessat. Secundò constringuntur vasa, puta venæ & arterie imprimis per istam ligaturam, hinc fit, quòd nihil humoris aut sanguinis in partem affectam influere aut effluere possit. Necesse itaque est, ut lingua, sive extraneus, sive quovis alio modo corruptus, aut sleratus fuerit, in parte affecta inclusus atque incarcerationis temeretur cogatur. Idèd Hippocrati aliquæ vestres non solum ventant, in his curationibus tam arctis vinculis fasciæ constringere partem affectam, sed & ferulas ante septimum aut undecimum diem apponere. Hoc tempore eam dislocationes & fracturæ ossium, affluxu humorum, dolore, inflammatione, aliisque symptomatis inprimis sunt obnoxie. Prohibetur quoque spirituum & alimentis ad partem quampiam laesam transire, quales luxuræ parti sopietior perpetua restituta est. Tum enim os, quod ex sua sede naturali excidit, vasa velut venas & arterias, comprimit, impeditque, quo minus spiritus vitalis, sanguis licet pro nutritione permeare

possint, sequiturque atrophia, extenuatio, ac scissimè Gangrena, atque mortificatio. Idem accidit quoriscunque schiroti tumores circa vasa magna indurescunt, eaque vasa constringunt. Multò verò facilis pars aliqua Gangrænâ atque Sphacelo corripitur, si vas aliquod insignis, veluti arteria, aut vena, per transversum abscessum fuerit. Immoderato quoque usu adstringentium, que prædictis Defensivas dicuntur, interdum adeò constringuntur vasa, ut inhibeantur, arceanturque spiritus & alimentum; refrigeranturque simul & semel insiti parti affectæ spiritus, et elanguis tandem fiat, & sepe occupetur Gangrænâ & Sphacelo.

Ex interceptione spirituum animalium, Avicenna Gangrenam oriri statuit. Hanc sequitur scoticorum nonnulli, Gangrenam paralyticorum ex interceptione spiritus animalis provenire arbitrantur. Verum Gangrenam hanc ex interceptione spiritus animalis simpliciter non fieri, in ipsis paralyticis apparet, quos indies videmus paralyti corripri, ac per multos annos laborare, Gangrenam tamen inde non subsiqui. Gangrenam enim & Sphacelum ex alimenti, & spirituum vitalium penuria, interceptione, corruptione, suffocatione, &c. fieri, luce meridiana clarius est! At alimentum hoc, & spiritus vitalis, à corde & hepate per arterias & venas, non autem à cerebro per nervos partibus insinuat. Possit itaque pars aliqua corporis vivere, & calore suo naturali prædita esse, interim tamen levis, & motu, aut utroque carere; quemadmodum in paralyti fieri cernimus. Quomodo autem in paralyticis fiat Gangrena & Sphacelus, ex seò quænti observatione facile colligere licet: quæ est in observationibus nostris commemorata fuit, non erit tamen contra scopum, si eam hic summariè recensuerim. *Surgen vix Ransiel* vir robustus, altitudine sedecim pedum in terram cadens, paralyti ab umbilico ad pedes ipso momento correptus fuit. Ego tertio die morbi vocatus, invenio ipsum maximis doloribus ventris affectum, quòd à principio morbi neque urinam neque alvum exonerasset. Exhibitis suppositoriis & clysteribus, urinam reddidit, & alvum exoneravit, dolor cessavit, sed utina guttatim exillavit, nec excrementa retinere potuit. Ego ex consilio D. *Caspi Storeri* Illustrissimi Clivensium, Jolicensium, Montensem, &c. Principis Archirurgi, illam, quam potui, diligentiam adhibui: oibulominus tandem Gangrena nates invasit, quas necesse fuit dissecari, ita ut 25. die à morbo contracto è vita discesserit. Causam autem huius Gangrenæ non paralyti, sed decubitus, & exstillationem urinz fuisse, rationi consentaneum est. Urina eam, quæ guttatim effluebat, & quæ propter decubitus in dorsum exalefacta & acris reddita fuit, cotem exulceravit, hinc secuta est inflammationis, atque affluxu humorum. At quia corpus à morbo usque ad pedes, suo spiritu animalis, ac proinde facultate sentiendi destitutum erat, redditum fuit grave & immobile, hinc propter decubitus in dorsum, & molem corporis, nates contritiò compressæ, exalefactæ & ab urina & excrementis humefactæ fuerunt, inde Gangrena & Sphacelus; quod mirum nemini videri debet. Vidimus enim scissimè in diuturnis morbis, coccygem non solum ulcerari, verum etiam Gangrænâ corripri, ut *Observatione 3. tenor. 1.* solius atque ettemplio declaravimus.

In Anorectæ tre hernia intestinorum sit quoque Gangræna, interceptis spiritibus & nutrimento, cum intestini pars aliquantisper intra scrotum continetur, quæ statum & excrementorum copiam plurimum diiudicat, in ipsa autem rupti peritonæi relaxati angustis ita arcte comprimitur, ut spiritus & alimentum intercludantur; sic enim necesse locum Gangræna & Sphacelo prehendi, quemadmodum frequentissime mihi videre contigit, præcipue in Nobili matrona Margarita de Glasse, quæ septendecim annorum spatio insigni hernia laboraverat, Anno 1597. verò torminibus maximis correpta, intestinum in abdominis relaxationem cum doloribus maximis, inflammatione, febre aliisque gravissimis Symptomatibus impulsam est, Ego tandem vocatus, inveni dextrum inguen Gangræna affectum; adhibitis tamen remediis convenientibus, caro putrida, & callositas ruptæ exciderunt. Excrementa quoque intestinorum per ulcus exercebantur celeriter menses duos; ægra tamen divino favore, ministrantibus adstantibus, tum ab ulcere, tum etiam à ruptura optime sanata fuit, nullâ reliquâ fistulâ ut *Obs. 55. Cent. 1. declaravimus*, Recensuimus & alia exempla *Physiur. 72. ejusdem Cent.* quæ Lector ibi videre poterit.

Corripit & ralum Gangræna, qualem nuper observavimus in Omatissimo Viro Dn. *Henrico Balbani*. Quoties enim propter fracturam, vulnus ulcusque tibia per diutius erectas insitit talo, inde talus conrunditur & comprimitur, atque ex ista contusione & compressione, tandem oritur primò inflammatio, dolor & affluxus humorum; secundo comprimuntur ex ista situatione tibiæ venæ atque arteriæ, quæ ipsum crus & tibiæ pulpam decurrunt, ita ut spiritus & sanguis nequeat liberè ad ralum penetrare. Hæc quoque facit assidua tibiæ extensio, per quam distensis etiam vasis innarum calidum, & sanguis nequeunt descendere in partem affectam, unde tandem ea frigeſcit & interit. Ea porò distensione vasorum posse frigeſcere partem affectam ex eo intelligitur, quod equirando per frigidum tempeſtatem, si pedes diutius intra fulcea pedum equitibus continentur, frigent impensissimè: si extra fulcra propendunt, per se ocyus incaleſcunt. Sanguis enim & calor nervus parentibus ipsis vasis, illico ad pedes recurrunt. Videat itaque Chirurgus, ne tibiæ contractas aut vulneratas diutius talo insistere permittat; sed tunc in hanc, tunc in illam partem disposat.

Cap. 7. Signa Gangræna ex intemperie.

Verrissima est sententia ab *Hippocrate* prolata: Medicus si quidem susceperit ad cognoscendum, sufficit etiam ad sanandum. Tanta enim cognitio morbi est necessitas, ut sine ea methodica curatio intrinsecus non possit. Si enim prima curandi indicatio à morbi naturâ sumenda, Medicus ut morbi notitiam habeat, necessariò requirit: id quod passim *Galenus* in libris meth. med. aliisque in locis suis demonstrat. Quicunque verò Medici aut Chirurgi in hac parte Medicinæ non satis sunt edocti, atque exercitati, multos gravissimosque circa ægros committunt errores, ut in observationibus nostris de quibusdam Chirurgis, qui tumorem cancerosum à Phlegmate, & cicatrice ad papillam cum ungula non distinguabant, aut porius inter se non cognoscebant, annotavimus. Sic accidit D. *Elie Bangueto*, Paterniacensi Senatori, is inflammatione hepatis cum maximis doloribus & torminibus ventris correptus, incidit in manus pharmacopœ, quæ cum colicâ laborare arbirratur, quapropter fustures avenarum in fastigia calefactam, & in sacculum projectam loco do-

lenti applicuit: hinc dolores, febris, vigilia, atque symptomata adeò aucta sunt, ut de vira periclitaretur. Quibus verò remediis Dei singulari beneficio sanatus sit, lector ex 2. *centur. observat. 48. Chirurgie* videre poterit. Recensere hæc historiam breviter vilius est, ut iis tyrones ad studium Semeioticum invitentur. Ut itaque hujus tam magni tamque gravissimi morbi Chirurgus pleniorém notitiam habeat, signa ordine recensibimus, & quidem à Gangræna ex intemperie calida, ut quæ omnium est frequentissima, incipiemus.

Signa autem Gangræna ex inflammatione sive intemperie calida sunt hæc: dolor pulsans, qui præcessit cum inflammatione, multo remissior est; Mutaturque rubicundus inflammationis color in pallidum, salsum, & livescens. Exoritur & pustulae grandiores plene ichore, loræ carniū similes. Hæc autem omnia contingunt, quod locus affectus tendat ad mortificationem, sanguinisque & calor partium recurrant ad centrum & originem suam, cor & jecur, partium corruptantur. Inde enim pallor in parte affecta, remittitque dolor pulsans, qui ante existit, ex elevatis propter conflictum innati calidi cum calido, præter naturam vaporibus humorum putrescere incipientium. Nisi verò superat præsentis remedio morbus, revocato innato calido ad partem affectam, & expulso eo calore, qui est præter naturam, evacuatique simul & sensu humoribus jam corruptis, tum quoniam definit arteriarum pulsus, quia spiritus non transmittitur, aut si transmittitur, invenit partem tam malè affectam, ut ab ea recipi nequeat. Sic deficiente spiritu vitali, pars oppletur excrementis & humoribus unde ea mollescit & relaxatur, atque adeò si comprimatur, remanet impressam vestigium, ceu à compresso ordemate; Quod tamen vestigium diffucilet, & nonnisi tractu temporis propter spirituum & caloris nativi penuriam in aliam elevatur. Denique sensus nervorum minuitur, ut tandem secati, vellicati & uti possit locus abique ægroti sensu, aut perceptione distincta. Huiusmodi res accidit Nobili femine Quatensis, cuius tibiæ Gangræna affecta tria aut quatuor cauteria actualia applicui, coram Clarissimis Medicis Doctoribus D. D. *Henrico Botero* Illustrissimis Principibus *Jaliscoensis*, *Clivenis*, *Monensis*, &c. & illud sit. *Langavii Medico*, & D. D. *Job. Kuente Bridbachio*. Tamràm verò abest, ut conquereretur de cauteriorum visione, ut contrà subside exprobraret, à nobis applicatam nivem, glaciem aut frigidissimum quippiam; Eas enim tempore hyemali. Hæc privatio sensus non Gangræna tantum, sed & Sphaceli, adeoque imminenti mortis signum est longè certissimum; Eo quod putredo tanta venit, arteriæ & nervi concepta est, ut inde non minima portio ad partes principes deferatur. Hanc quoque ob causam febris acutissima cum syncope; dolor capitis, delirium, vomitus eructationesque, aliæque & pessima & graviora symptomata, & oriuntur & augentur.

Signa Gangræna ex flava bile ortæ, à superioribus non multum discrepant, nisi quod in his insano aut tumor non æquè ac in phlegmone sit magnus. Pustulae quoque minores sunt, sed plures in numero, ex quibus aqua, quæ effluit, multò subtilior, magisque flavescens, quàm in pustulis ex phlegmone ortis, cernitur.

Gangræna ex frigore facile est indicium. Ex frigore enim subito magnus dolor oritur pungens & mordax, ac initio rubor cinisillans, eo quod cutis meatibus, frigore contractis, calor abundè concurrit;

concurrunt, atque in ipsa parte retinetur: aut paulo post locus ex rubro fit lividus & frigidissimus, frigore depellente sanguinem, & innatum calidum, adeoque refrigeratis & dissipatis lassis spiritibus. Itaque pars privatur motu & sensu, accedente horrore, hinc tremore, qualis solet quartanam precedere. Præterea ex ipso ægro scire poteris, utrumne vires, aut aquas frigidiore traiecerit, ex quibus frigida contaxerit. At si tam diu morum sit frigus, ut loci innatum calidum nequeat amplius resistere, superveniet Sphacelus, & omnimoda mortificatio. Frigidum enim ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ (ut potius quæ sint aut ex semine, aut exiguæ calore prædiæ) adeoque viræ nostræ, quæ quidem in calido humidoque temperatis consistit, adversissimum & inimicum esse, nos docet Hippocrates.

Signa Gangrænæ ex intemperie humida sunt hæc: Locus jampridem affectus fuit ingenti tumore, aqua & humoribus fetosis, ac ordematissimis referto, ita ut compellat digito, relictum sit vestigium atque fovea, quæ tamen paulatim demum in pristinam altitudinem elevata fuit. Æger præterea est debilis, macilentus, cachecticus, imò etiam pletumque hydropicus. Talis ferè Gangræna pudendis & tibis accidit, nullum tamen antea dolorem magnum passus est æger. Neque enim humida intemperies dolorem gignit, nisi extensione ob ingentem humorum copiam. At tamen membro extinctioni proximo, dolores acerbissimi, non secus ac in aliis Gangrænæ speciebus, ut plurimum supervenire solent: tum quia humores illi ex corpore ad partem affectam confluunt, atque sensus organa, membranas scilicet, nervos & tendineas distendunt. Tum quia propter putredinem maximam, calor præter naturam exoritur, ex quo dolor augetur. Postremo arteriarum pulsus desinit, livescitque locus, ac sensus paulatim immittitur, deperditurque. Malum hoc, si facibus & gingivis acciderit, quemadmodum aliquoties in pueris evenisse observavi, ruat genæ antea simili tumore inflammato affectæ fuerant. Puer ut plurimum cachecticus est, aut hydrocephalo laborat.

Gangræna ex intemperie sicca, deficiente videlicet alimento, eò primum cognoscitur, quod nullus addit dolor, inflammatio tumore ab initio, deficiente nimium affluxu sive copia sanguinis, aliorumve humorum, inflammationi consensiente paratorum. Deinde hæc Gangrænæ species accidit corporibus macilentis, infirmis, & extenuatis, sive senio, sive diuturno & gravi morbo quorum, vires elanguide, alimentumque absumptum est. Testis, pars statim à principio refrigeratur, ac stupescit, eò quod spiritus animales, vitales, & nativi in ea minime vigeant. Quando hæc Gangræna extremis accidit, puer tibi & pedum digitis plurimum, alia etiam manus digitis, extremo naso, & auriculis. Interim æger morbum vix sentit: ac ubi tandem exoritur pulsus, aut bullæ aqua rufa plene, quarum ima pars, si exciderit, conspicietur livida, nullo aut exili sensu, cum acutissimi dolores, febres aliæque symptomata ut plurimum superveniunt, arteriarumque motus & pulsatio sistunt: ut plurimum, inquam; Aliquando enim rotem ferè crux, in hac specie Gangrænæ, quæ ex intemperie frigida & sicca, sive penuria alimentis & spirituum, ortum habet, abique dolore mortuam fuisse observavi. Præcipue autem in Do. Jacobo Marquardo, Archigrammate Moravensi, huic cum in decrepita ætate frigus molestem, & stupor in crure subito exortus esset: Gangræna secuta est. Ego cum tandem Anno 1611. 5. die

Si precebris advocatus essem, tum etiam in ipsam lucam utique Sphacelatum, & inflat carbonis nigrum, frigidum item & rigidum inveniri: dolor tamen nullus, neque ab initio morbi ad illud ulque tempus adfuerat: & vix abstratio in pulsu petipiti poterit, uti solius in 4. cent. Observationum mearum Chirurgicarum declarabitur. Henricus Smertius Comes Palatini ad Rhenum, & Electoris Medicus ordinarius; ac longè celeberrimus, mihi quæ familiaris, hæc de re observationem singulari in sua miscellanea habet, quam hic in gratiam lectoris adscribere placuit. Verbalis in principatu Clevensi, inquit, contacti cuspida Galli uxor, alterum pedem acutum, nigrum, abique tumore emortuum, utempe syderatum, aut sphacelatum, sine ullo morbo, aut sensu aliquamdiu gestaverat, abique separatione à parte sana, quam tamen multo post factam intellexi, & speciem linguæ, borillæ fumo indurata, præ se tulit.

Cap. 8. Signa secunda speciei Gangrænæ, nempe ex qualitate occulta.

Quancum ab Gangrænæ ex qualitate occulta, videat Chirurgus, ut eas diligenter, & accuratè distinguat à Gangrænâ ex frigore aut intemperie sicca: quia, ut dictum est, si intemperies in causa est, symptomata interna, puta febris, syncope, deliria &c. obscura erunt, nec prius esse patefacient, quam pars externa corruptionem patefaciat: At si qualitas occulta, materia videlicet maligna corpori ingentia, quam ab initio corpore ad externas partes depellat natura, tum erit ingens natura cum morbi causa constituit: unde etiam subito febris, algectio, syncope, nauca, eructationes. Postea vetò pars externa, in quam humor malignus atque pestiferus decubuit, primò livida, postea nigra fiet, tandemque emoriatur.

Sic Gangræna fuerit ex motu, aut ita bestie venenatae, aut carboniculo pestilenti, aut septici alicujus applicatione; Id per se facile & ægi, & adstantium sermone intelligi potest. Et ut pauci multa comprehendam: Si Gangræna marcescens inata sit corpori, symptomata interna apparebunt primò, antequam Gangræna sese patefaciat: si extrinsecus aliunde advenierit veni, nata marcescens, contrà evenit.

Cap. 9. Signa tertia & ultima speciei Gangrænæ, ex interceptione spirituum.

Signa Gangrænæ ex spirituum interceptione, maxime ex ardore ligatura in trachæis, & luxationibus hæc sunt: Pars parumida est, dura & distensa, nempe quia coarctatione illa plurimum sanguis, alique humores evocantur, qui vehementia dolores faciunt, & inflammationem. Exoritur etiam bullæ majusculæ, ichoris plene, lousiam tantum teperecentes. Præterea pars affecta ingravescit, & fit immobilis, quia deficiente spirituum ex eadem etiam causa impressi digiti vestigium in ipsa parte remanet, ipsique cutis à carne diduci videtur. Dissendunt & nonnunquam pars flans, ita ut si conerces, non aliter cepit, quin virulina earo, quam laniis suo flatu impleverit. Si pangat scalpello, exit status, cum humore pango stidens, hand secus atque eum ex ferientis ollæ angusto foramine quidpiam effunditur. Hæc omnia sigillatim Colonia Agrippina observata Anno 1595, cum à meipso, tum à classis, mo & celeberrimo Viro Dom. Johanne Koenig, Briddach.

Brennæus Med. Doct. in famulo ornatiſſimi Dn. *Guſtavi à Præſ.* p. m. compariſ mei longè clariſſimi, Denique ex ægro ipſo etiam poterit reſciri, non quod ingens vulnus acceperit, ex quo vaſa, arteriæ nimirum & venæ, per tranſverſum ſecta fuerint: aut cum luxorio malè fuerit reſtituta, utrumve adſtingenda emplaftra diu geſtaverit.

Cap. 10. Signa Sphaceli.

T Ribus præcedentibus capitibus ſigna Gangrænæ diverſa notavimus, prout ex cauſis quoque diverſis orta erat: at Sphaceli quantitas & diverſitas orti cauſis, illa planè eadem. Nam ſive ex calida, ſive ex frigida, ſive ex humida, ſive ex ſicca deniq; inſtemperie, aut ex ipſa ſpituum interceptione oritur Sphaceli, omnes ſunt inter ſe ſimiliſſimi, hoc uno excepto, quod in Sphacelo ex qualitate occulta, graviora cernuntur ſymptomata, febres, inquam, ſyncope, delirium, &c. quàm ex cauſa manifeſta, ſive fuerit inſtemperies, ſive interceptio ſpituum.

Sphaceli autem ſigna ſunt. 1. Pars affecta multò quàm ante gravior eſt, ita ut æger etiam vix, aut omnino nihil poſſit movere; idq; properea, quod ſpicius, ſanguis, & cum eo calor natus & vita, non amplius in partem aſſe tam inſtaunt. 2. Rubor & genius color deperunt, ſiq; pars livida, atra, graveolens, inſtar cadaveris, 3. Pars antea, dum vigeret Gangrænâ, mollis, per Sphacelum calcæſcit. 4. Cuius præſentia & digiti in aliam ſublata videntur à ead. & deducti. 5. Senſus exquiſitus & perfectus nullus amplius adeſt, ita ut facilè fit ſecare, ligare, utere, & quamlibet operationem molli, cetera ſenſum ægri. Quod ſi quid æger ſentire videatur, id proſectò non aliunde acciſit, quàm ex prius doloris phantafia, aut ex expectatione, quæ fieri debent, apprehenſione. Præcedentis enim doloris tanta apud ægros eſt efficacia, ut non ſolum ante abſciſſionem membri, quantumvis jam planè mortali, & revera omni ſenſu deſtituti, vix etiam per multos menses, imò annos poſt abſciſſionem, ingentes parti dolores ſibi imaginentur, cuſus vel exempla Lector in ſecunda Cæſaris Obſervationum meorum videre poterit.

Quod ad mortuum extremorum, qui diuſſimè peſſet, prudens Chirurgus propter eum non diſſet amputationem. Cùm enim muſculi caput moveret, eas tunc ompe tendo mortuum eum ſequitur: Sic cùm moveretur tibie muſculi, pedis inſequuntur digiti, quamvis fortè ante quadriduum mortui ſint digiti. Prudenter ſcilicet hac in parte ut agat Chirurgus, atque tum ſaluti ægri, tum exiſtimationi ſuæ conſulat, neceſſe eſt. Quapropter quamprimum cognoverit digitos pedum, & manuum emortuos eſſe, præſentibus adſtantibus & familiaribus, ægro tamen ſolito, emortuas particulas, novacula nudiſque pulvere & ſecare debet, ut nullam amplius adeſſe vitam, amputationemque perneceſſariam eſſe, cuncti adſtantium agnoſcere poſſint. Poſt etſi Sphaceli ſigna quorundam cum Gangrænâ ſint communia, veluti color lividus, gravitas, ſenſus depravatio &c. ea tamen in Sphacelo, quàm in Gangrænâ evidentiore, & longè vehementiora viſuntur.

Cap. 11. Prognoflica Gangrænæ & Sphaceli.

C OGnita Gangrænâ & Sphacelo, antequam Chirurgus curationem aggrediatur, proſpicere debet, quæ morbi futurus ſit exitus, utrumve ſanabilis ſit, an etiam diuturnus futurus. Omnes enim morbos curare impoſſibile, teſte *Hippocrate*, quamvis illud operabilis foret, quàm præſagire impoſſedum eveniunt. Atque id, cum fieri nequeat, Medicus ut utatur.

Nihil. Chirurg. Tom. II.

tur providentiâ neceſſe eſt. Significare itaque Chirurgum oportet ægri familiaribus, quia futurus ſit morbi eventus. Quia autem malum hoc adeò grave, ut plerumque de recuperandâ valetudine, nulla amplius ſuperſit ſpes, queſtio eſt, ſint ne deſperati ſtringendi, nece & Nonnulli ex antiquis, quibus nomen divinum treſcunt, abſconditumq; fui, deſperatos teliſquendos eſſe voluerunt: Idque illam ob cauſam, ne inſtamentis præſidia, quæ multis aliis proficiunt, neve videantur Medicus cum occideſſe, quem ſors peremit. Ego vero Chriſtianam charitatem aliud non jubere, planeque inhumanum eſſe, ægrem ſine artu auxilio deſertire, aſſero. Quod ſi tamen Chirurgus affectum planè inſanabilem eſſe cognoverit, cavere debet, ne ea, quæ præſtare non poſſit, promittat. Hoc enim faciunt non vix boni, atſique pretii homines; ſed Empirici, atque inpoſtore, qui lucrum proprium potius, quàm ſalutem ægrotum querant. De periculo itaque ac immediabili malo admoniti amici, atque adſtantes ægro, ſi illi cognov. invocato prius auxilio divino, ſuſcipienda eſt curatio, talis curatio, quæ ſi morbum tollere non queat, ejusdem tamen acceſſitatem atque tyſtanidem, quantum videri licet poſſit, teneat, doloretque leniat, demoleſcatque. Iſq; præcipue in eum ſinem, quò æger ſu ipſo quoq; mortis anguſtiâ Deum Creatorem, atq; ſuum Chriſtum Salvatorem ſuum acclamaret; peccata quo etiam ſua, & anteaſum vitæ ſue miſericordiam ſtatua, ſimul & myſteria ſalutis ſuæ, rectè perpendere, tandemq; vitæ ſuæ ſinem piè imponere poſſit. Quia enim hominum hæc præſtare poterit, qui peccata ſua enumerabit, ſi corpus doloribus acerbiffimis, extorqueatur, ſi vigiliis, inquietudinibus, naufis, æſtu febrili, aliſque graviffimis ſymptomatibus, quæ dolorem veluti umbra conſequuntur, vires proſternantur, menſique ſimul & intellectus invertantur? Atque hæc prima & præcipua eſt cauſa, cur deſperati minime teliſquendū eſt. Accedit & alia cauſa, nimirum quod ſapiffimè obſervatum ſit, deteſtibus, & pro deploraria habitos, adhibitiſ diligentiâ Medici, in integrum reſtitutos fuiſſe. Tertiâ cauſam addit Ampliffimus ac Doctiffimus Vir, Dn. Petrus Pavius Anatomicus & Notandus longè celeberrimus, amicus meus ſingularis. Nam vel hoc, inquit, morientem accelerare ægro poſſit, & Medico ac Chirurgo ſe deſeri ſi animadvertat. Sane itaque attingendi, non autem teliſquendi deſperati & de emittenti tamen periculo, ut antea quoque monui, prius factâ prognoficatione, quæ hic ſimul & in omnibus morbis graviffimis neceſſaria eſt: quandoquidem quæ ex arte ſunt præſagia, primò Medico, ut docet *Galenus*, à mortis crimiſ vindicant. Tanta enim eſt impudentia, ne dicam impletæ apud indoctum vulgus, ut ſi quando res pro voto non ſuccederet, & mala, ut *Hippocrati* verbis utar, malis neceſſariò ſuperaccidant, omnem culpam, imò & cauſam mortis in Medicum tranſferant. Si verò prædixit Chirurgus, quæ ſuperveniunt ægro, cum nihil illi ab ægro, aut adſtantium turba, utpote qui ex arte omnia, quæ ſuperveniunt, prædixit, imponi poterit, omnique proſus culpi vacabile. Secundo, reddunt præſagia ægros obtemperantiores, & magis atque libentius, ut *Hippocrati* docet, ſe concedunt Medico. Percipimus enim ægri Medicum penitus agnoſcere naturam morbi, ac proinde ſympromatibus, quæ veniunt ſunt, atque periculis obviâ ite poſſe conſidant.

Potè bene prædictum, atque prognoficatum Chirurgus, tria conſideret, primò Eſſentiam atque naturam morbi, hoc eſt, gravis ſit, an levis; ſecundo vires ægri, aut vegetas, an imbecilles; tertio partem ægram. Nam ſi levis eſt morbus, &

T. quidem

quidem in membro à paribus principibus remoto veluti in brachiis, aut tibis, vires autem vegetæ & firmæ, facillè sanabitur. Si omnia hæc conditiones, aut earum pars contra sint, æger in viræ, aut diuturnioris morbi periculo, versabitur. Verum hæc fusius & accuratius declarantur hunc in modum. Gangrænâ, aethore *Celsi*, si nondum planè tener, sed adhuc incipit, curæ non difficillimam est, præcipuè in corpore juvenili. Attamen summa diligentia & industria desideratur; corpus icidem vegetum, ac robustum esse par est; alioquin frustra nesciente Chirurgo desinet Gangrænâ in Spachelum & eum quidem insanabilem, aethore *Paulo Aeginæ*, nisi tota pars visâta amputetur, atque separetur.

Gangrænâ in partibus humidis, gingivis, palato, naribus, pudendis, osculo oteri, & intestino recto, rarè sanabilis: in Spachelum autem degenerans insanabilis: propterea quòd partes illæ sint & humidæ, rarè, spongiosæ, adeo: plurimis humoribus, & excrementis suscipiendis opportunæ. Præterea verò ipsam innatum calidum, cum facillè succumbat in illis partibus, co etiam citius suffocatur.

Gangrænâ partium internarum, jecoris, lienis, renum, &c. non solum periculosa, verum etiam lethalis est, quemadmodum quatuor capite exemplis nonnullis declaravimus. *Quibus cerebrum Spachelatum est, intra triduum perit.* Si verò hoc superaverit, sanum sunt, inquit, *Hippocrates*. Tum enim sperandum est motum declinare, & vires esse validas, quæ corruptionem vincere possint. Attamen *Galenus* in commentario istius aphorismi negat, *Hippocratem* intellexisse, quem non Spachelum vocamus, sed Gangrænâ potius, aut ingentem aliquam inflammationem: atque ita Spacheli nomine præficti Græci dictam interdam Gangrænâ testatur. Si enim: inquit *Galenus*, *Spachelus est corruptio partis cuiusque quam is occupat, insanabilis est: ut Hippocratis Spachelus sanabilis est nonnunquam.* Non est ergo verisimile eo loco propterea significato accipi Spachelum, sed pro Gangrænâ potius verè dictâ, quæ est quali via ad Spachelum, & illius velut antecambulo.

Gangrænâ hydropicorum tibis superveniens, rarè sanabilis, sepiusque in Spachelum degenerat. Quod si relevetur æger, restabit tamen ulcus, non nisi longo tempore sanandum, teste *Hippocrate*. Cum enim non sanentur ulcera, nisi exactè prius desiccata, quod in hydropiciâ fieri nequit, propter nimiam humiditatis copiam, necesse est hydropicorum ulcera difficilè sanari, quamdiu saltem eorum corpora ita affecta sint.

Petrificosa est talis Gangrænâ, propter symptomata, quæ secum invehit, ratione magni tendunt, acutissimo sensu prædicti. Quod si os tali corripitur, ut plurimum æger pedis actionibus privatur: tum quia corruptio ea non nisi difficillimè corrigi potest: Os quippe molle & spongiosum cum sit, facillè humores alliciat, & combibit, qui calorem augent ac fovent: Tum quod tendo ille à talo veluti solvitur, atque ita divellitur, ut ipsius pedis motum deperdit necesse sit.

Spachelus à pede, aut tibia ortus, indeque genu ipsum transcendens, lethalis ut plurimum pars enim illa femoris carnosa, putredo facillè serpit, & in musculis sese infundit, ut nequeat penitus tolli, quantumvis tibia ipsa amputetur.

Gangrænâ ex causâ primitiva, puta contusione, unctione, fracturâ, &c. ferè sanabiliores, & minus periculose, quàm quæ ex antecedente causâ ortum ducunt. Huiusmodi enim Gangrænâ interna viscera testatur adeò malè affecta, ut medicamentis vix ullis sit locus.

Gangrænâ ex siccitate, & atrophia, difficile & rarè sanabilis: in Spachelum verò desinens penitus insanabilis est & lethalis; maxime si æger sit introductioris ætatis, debilis, & macilentus, morbus autem in tibis sit, & pedum digitis. Id enim extremam siccitatem arguit, quæ insanabilis est, *Galenus*.

Gangrænâ ex qualitate occulta pemiciosissima, ac plurimum deplorata & lethalis, præcipuè si in Spachelum transeat: siquidem ex partibus Spachelo affectis virus, sive vapor quidam venenatus attollitur, qui partes nobiles plene sufficit.

Gangrænâ ex prohibitione ac interceptione spirituum vitalium, & naturalium, ac potissimum quæ luxationibus malè relictis superveniunt, & quæ à vasis transversis sectis proficiunt, difficillimè sanantur; in Spachelum verò degenerantes, lethales. Rei causam præcedentibus capitulis declaravimus.

Gangrænâ quoque, uti & alia vulnera quemadmodum docet ostendit clarissimus *Dn. D. Parvins*, loco præallegato, pag. 63.) ætate superveniens, periculosa, quàm quæ hyeme. Primò, quòd innatus calor ætherior, & plus possit hyeme quàm ætate. Secundò, ætati ætatis non ambients ætus evocet, dissipaque nativum corporis calorem. Tertiò minus periculi est à calamitosis, quæ ætate tempore supervenire solent, symptomatibus.

Ulcus in Gangrænâ & Spachelo considerandum quoque diligenter. Nam si sit lividum & ædum, aut nigrum & ædum, parum aut nihil egerens matetis, pro magnitudinis ratione, inclinent autem ægri vires, certa mors intra paucos dies expectanda: quippe adeò immutatur alitrix facultas, ut nequeat amplius transmittere sanguinem, aut alimentum partibus affectis, sed eam siccat finat. Quod si qua forte materies corrupta intrat corpori, antea evacuari solita per ulcus, cum sit facultas expultrix infimior, quàm ut valeat transmittere, & propellere ad partes remotiores, ea manet in corpore, & partes primarias lædit: unde interim & ipsum quoque ulcus siccat & aridum conspiciatur.

Ex Gangrænâ, & imptimis ex Spachelo moribundis, plurimum adeit frigidus sudor universalis sive quia totum corpus ita abundat humoribus frigidis, ut neque nativo, neque febili calore possint incallescere: sive quia natura vel juxta *Hippocratem*, perquam imbecille est. Accidunt quoque syncope & cordis palpitaciones, exhalatis ad cor vaporibus putridis, interim pulsus obfuscissimus & vermicularis est, propterea quòd artitius vaporum copia appetitis prohibetur diastole, & systole. Adsum quoque delirata, & paraplentisidæ propter vapores copiosos sublaros ad caput, & cerebrum offendentes. Ut autem Gangrænâ variæ sunt causæ, ita & varius est etiam motusque status. Alii enim veluti sopiti moriuntur, alii etiam inter loquendum: pleticos tamen comitantur acutissimi dolores, spasmus, deliria, &c. Quibus enim Gangrænâ orta ex intemperie sicca, aut quibus ætas grandior, & extenuata mollis, hos ferè mors opprimit loquentes. Quibus autem Gangrænâ ex intemperie calida, ferè morte violenta perimuntur, quam comitantur febris, syncope, deliria, paraplentisidæ & spasmi, præsertim si juvenis, & robustus æger fuerit. Contrà quibus intemperies humida in causa est, hi somnolenti, & sopiti preunt. Huius rei exemplum Anno 1604. Paternici in sexagenario Viro *Dn. Philiberto Rurici* ibidem Patricio, & Senatore Prædilectissimo, mihi videte contigit. Is enim despecta hydropie laborans, cum suo & adstantium despecto, atque efflagitatione maxima, crura (non tamen sine prognosticatione de futuro atque præseni periculo) scarificasset, ad tempus quidem levamen aliquod

aliquot precepit, quoniam etiam rusticula, quæ antea laboraverat, multum immutata fuit, tandem uli-
lominis Gangrænâ correpta fuerunt crura, ex qua
12. Novemb. Anno 1604. quasi somno & sopore
corruptus, placidissime & pie naturæ satisfecit.

Cap. 12. Gangræna curatio universalis.

Probè cogniti Gangrænâ, ac de ea prudenter prognosticatione factâ, ad curationem deveniendum est, ea verò in remediis tum universalibus, hoc est, Gangrænâ, cum aliis morbis communibus, tum particularibus consistit. Universalia sunt; verbi gratiâ, diæta, evacuatio corporis, adhibitis purgationibus, phlebotomiâ, cucurbitulis, sectionibus, &c. Particularia traduntur scarificationes, cantharida, live potentialia, live actualia, & quæcumque hujusmodi putredini & malignitati repugnant, caloremque nativum, ac humidum radicale rescitant, aque instillant, de quibus infra fusiis. In administrandis remediis universalibus accuratè persequenda est causa antecedens five interna; ut ab ea sumant prima curatiois indicatio. Nam si Gangrænâ proficiat ab influxu humorum calidiorum, & humidiorum, oportet diætâ, & sex rerum non naturalium usum tendere ad refrigerandum, & escandendum: si verò adfoerit febris (tardè autem occurrat Gangrænâ, quæ non sibi adjunctionem habet febrem) tum diætâ paulò humidior præcipienda est ægroti, juxta illud Hippocratis: Vicius humidus, addè & frigidos febriacibus ut contrarius conficit, præterim pueris, & qui tali victu uti consueverunt, consuetudo enim consimilibus indiget, naturam imitans. Eadem quoque victus ratio convenit, si materia calida & siccâ fuerit. Purgatio siquidem erit necessaria, persciant Chologogis, uti electuariis Diacubæ, Diaprunis, solutivis Mesue, de succo colarum, syrupo rosato solutivis simplicis, & compos. cum rhubarbero, agarico, & senna, castia, manna, & similibus. Phlebotomis, & cucurbitulis, hirudinumque applicatio conducibilis, cum ad revulsionem, & detractionem, tum ad humoris peccantis evacuationem, præsertim in Gangrænâ ex affluxu sanguinis, Venæ sectionem enim, ut docent celeberrimi Medici, præstebimus, ut morborum incrementum impediamus, inflammationes vitæmus, meatus apertissimos, transpirationem liberam reddamus, peccentem materiam minuiamus, corpusque refrigeremus. Illa autem vena secanda est, ut Galenus docet, quæ ab ipsâ affectâ partícula sanguinem celestret averat: In primis si præter affectum externum internâ inflammatio quoque adfoerit. Ceterum etsi nonnulli etiam in non plethoricis, non secus ac in plethoricis corporibus, venam secare solent, in ægris tamen Gangrænâ laborantibus, cautè hæc in agendum est. Si enim Gangrænâ ex interperie frigida & humida, veluti in hydropicis accidit, venæ sectio vix locum habebit. Multò minùs adhibere convenit, si Gangrænâ ex interperie frigida & siccâ, aut propter penuriam alimentis vel etiam propter senectutem decrepitam, originem traxerit. Sin mæra bilis flava, hoc est humor cholericus præ aliis abundaverit, phlebotomiâ pascendum est: quippe Enguis veluti frenum humoris biliosi est Hinc fit, quod Galenus in erysipelate & herpete venam minime secandum, sed corpus à flava bile potius purgandum esse doceat. In erysipelate tamen phlegmonoso venæ sectionem rationabiliter adhiberi posse Tergantius, & alii restant. Sed quia hæc de apud classicios auctores varias sunt opiniones, nec cuivis Chirurgo datum: ut possit distinguere, an sola bilis prædominetur, an verò alios sibi adjunctos habeat humores, perquam necesse est,

ut Medicum in consilium quoque adhibeat æger, quo omnia ritè & cum præmeditatione adhibeantur. Unum tamen ut sciat Chirurgus (non enim semper sibi adjunctionem potest habere Medicum) necesse est: nimirum si in facie fuerit erysipelas, & suffocationis periculum, sanguinem detrahendum esse. Cum enim erysipelas, non tantum ratione qualitatis humoris, & sanguinis, verum etiam suæ qualitatis, vehementissimâ inflammationem excitet, insignem refrigerationem requirit. At refrigeratio illa, quam periculosa sit in facie, etiam tytonibus notum est, quandoquidem refrigerantium, & repellentium vi, materia ad partes nobilissimas in primis ad cerebrum, protrudunt. Quapropter non solum Topicis, verum etiam victus ratione, internis medicamentis corpus refrigerandum est, & enemata congruatâ alvo, sanguis ex brachio lateris dolentis detrahendus; & quidem copiosè, ne inflammatio in Gangrænâ transeat. Id enim eisdem tæmèz 24. citat annorum ætatis, in pago Psilli prope Lausaniam habitantibus, quæ advenit, parum abest. Hic eisdem 10 & 15. mensis Aprilis materia quædam catarrhosa in dextram partem faciei decubuisse, & circa labium superius pultis cum ingenti dolore exorta fuisset, odora die morbi me accessivit. Tum totam faciem, imò & ipsam linguam & collum adò intumescens inveni, ut vix cibum, aut potum deglutire possit. Febilis adterat continua, navica, & capitis dolor. Inflammatio erat maxima, cum quadam lividitate, & ita quidem, ut nihil aliud, quam Gangrænâ in proximis esse, & de vita periclitari ægroti videret. Curationem potè sic institui, laxatâ alvo, venam in cubito dextro petendi, & ad uncias duodecim (erat enim plethorica) sanguinis extrahi, mox sequens est aplasma applicoi.

R. Sempervivi minoris

Gerauci ana Mj.

Farinæ hordei 3iij.

Commisceantur diligentissimè in mortario, factâque cataplasma, addendo aque rosatæ q. s. applicetur tepidè. Eadem nocte melius habuit: postea diè corpus chologogis expurgavi, tenuissimamque victus rationem præcipi. Primam porcionem propter colicam præventam humorum in ventriculo collectionem, cum vomuisset, sequenti diè illam iteravi idè maximo cum successu. Intra paucos dies enim summa cum admiratione adstantium pectus saniesi restituta fuit.

In Gangrænâ ex qualitate occulta venæ sectio vix locum habebit. Verendum enim esset, ne maligna illa qualitas ab externis partibus, ad partes nobilissimas rapere, mortemque acceleraret. Quapropter sanguis præcipue in plethoricis, scarificationibus, sanguisugis, cucurbitulisque ex parte affectâ potius, quam alibi incitè venâ, evacuandus est. Quod si Gangrænâ jam in Sphacelum abiit, maximam putredinem adfoerit, eandem ob causam venæ sectionem vix administrare licebit, quemadmodum capite 18. declarabimus.

Porro scideram adspicias, an in venæ sectione obstandus, inter se discrepat Medicis. Alii enim inquit *Homerus Aigeum, diem quendam infans & infantes observant, tum per purgationem, tum etiam per venæ sectionem. Quam opinionem ab Aegyptiis proditam fuisse, idem Aegæus, post Galenum & alios testatur: & Proletius hæc habet verba: Membrum inquit ferro ne percutiatur, cum lura signum, quod ei membrum dantur, obinet. Hæc cum totum corpus humilis, præcipue verò membrum signi subiecit, quod cum ipsa percutitur, eius præfata largiore humilatione magnum illi necemum adferunt, si ferro tunc idem fuerit: Hæc Proletius, cui & nonnulli ex necroticis adspiciantur*

aditipolantur. Apud Hippocratem verò & Galenum ne verbum quidem de huius observationibus Astrologici me legisse memini. Legimus apud Galenum suo tempore vixisse Medicos, qui ante tertium diem morbi venam non fecabant. Non quidem ratione fiderim, sed ne dignitatem aliquam habere, & qualis sit forma & morbus, totaque sua natura morbus. Hi Diacritici appellabantur contra quos Galenus disputat, loco prælegato, tandemque hæc addit verba. Quoniam verò, inquit, temporis progressu in plurimis morbis virtus exolvitur, ideo mendum sanguinis occasio dictum numero amittitur. Hæc si quis ad observationes Astrologicas quoque referre velit, meo quidem iudicio à via recta minimè aberrabit. Dum enim benignum vulnus fiderim expectamus, occasionem, & quæ præcepti est, amittimus. Quapropter non immerito Herasius Augustinus loco aenea citato hæc protulit verba: Ego, inquit, nihil conferre ejusmodi observationes non raro sum expertus, & merito quidem. Primum, quia eorum universali est causa, quæ non agit, nisi causa particularis bene disposita fuerit: tum etiam deinde quia Astrologia iudicia plurimum incerta sunt, varia, ambigua, fœque opifices illudentia, ob diversitatem proximorum causarum. Idcirco in agrote humore temere eam admittimus, cum plurimum argere occidat. Hactenus Augustinus. Hujus quoque sententia fuisse insignem illum Philosophum ac Medicum Levinum Lemulium, patet ex libro ejus 4. de occultis naturæ miraculis c. 15. ubi hæc habet verba: Ceterum cum luna decursus magnâ ex parte damna ex detrimenta corporis infirmis & valetudinariis inferat, in tenebrisque, ac dissipatam vocari possit. Aut in ea parte quæ consistit ex moratur luna, incidendum nam in hac re plerique medicos fuisse, nec tale quiddam tentare audent, etiam si morbus arguat, atque hujusmodi prædictum consilium exprobat. Ego verò utrepidi, magnæque subsidii, morbi præsupponendo fiducia, maiore id aggreddendum iudicio: acuti enim ceterisque morbi, nullas admodum inducias, nullas vias, aut deliberandi spacia: sed ut hostem in bello, in incendium in altum, pectus in urbe, in agere ac seque rubigo & depopulatio grassatur atque in periculum præparant. Nec quis etiam deterri debet, aut ab incipere desistere, etiam si adverso, aut maligne fidei id tueri videatur. Sic in pleuritide, angina, pulmonis acque hepatis inflammatione, urethrae aliorum anxia observatione, ac fiderim adspicere, maiore ad venâ sectionem præparandum, etiam in ea membri parte, quam luna occupat. Plura hæc de re lecto videte poterit apud Arnoldum de Villa nova, Guldenum, Iohannem, & alios.

In extirpatione morborum Gangrenâ affectorum, cum imperitis de electione signorum consilium, non raro mihi certare quoque opus fuit: etiam si periculum quàm maximum in mora esset. Sed laus sit Deo, qui semper mihi suâ gratiâ ita adhibuit, ut etiam in gravissimis operationibus, & in diebus infansis (ut loquitur vulgus) imò & in ipsissimo membro, cujus signum tunc Luna obsidebat, administratis, omnia tamen ad votum successerint. Et sincerè dico, ne minimam quidem alterationem post venæ sectionem, aliasque operationes contra regulas Astrologicas factus, unquam fecit in rota præmi me obsecrare potuisse. Vident igitur tyrones, ne ab insuetudo facili deterrantur. Si enim præclara illa lumina Hippocratis, Galeni & alii, quos clarissimos, observationes illas Astrologicas Bocci fecere in venæ sectione: quanto, queso, minus in aliis quam plurimis gravissimis periculosissimisque operationibus, ubi minime procrastinandum, & benignus aspectus fiderim expectandum, locum habebunt? In petaculis enim morbis vel purgandi, vel venam secandi opportuni-

tatem à cælo, petendum non esse, docent vni docti.

A vino quoque, ceterisq; generosa, & calidis omnibus, abstinere ager: bibat verò Prisanam, cui sine incoctis Tamarindi, Oculis, addito Symplo citriortum, aut de succo limonni, de acetosa, aurantio, maceololum, granatorum, & finilium. Aut utatur decocto Agrimonie & venosæ cum super dictis Sympis, emulsionem seminum figulorum, & hac amygdalum, hic lumimopere conveniunt.

Sin ex causa frigida & humida sit morbus, dicta, & sex ferum non naturalium ulus vergit ad, mediocrem calorem & licetiam. Quam obrem addantur in cibis rosmarinus, hyssopus, thymus, majorana, cinamomum, macis, crocus, & similia. Apozemata quoque alterantia, & obstructionis operticia exhibenda sunt. Postea pissa pargenda electuario Iacobi majore, & minore, diuturnis, diaphanico, diacathartico & similibus, pro ratione ægis, ætatis & vitium. Tandem quavis arte corpus à gravibus humoribus evacuandum, & exsiccandum. Partes item oboles, impietis jecur, trochiscis de tharbaro, de eupatorio, diarrhod, Abbas, confessione aliteris, & similibus roborandæ sunt. Venæ sectionem quoque nisi particularis aliqua occasio intrevenerit, non ulque adeo hic, propter hepatitis ut plurimum imbecillitatem approbare possum.

Predominante humore melancholico, sive atra bile, abstinet quoque eger à cibariis crassioribus, & concoctis difficilibus, iactis & fumo exsiccat caribus, picibus, aromatis, leguminibus, seminibus aquatilibus & similibus. Ac ubi præparatus fuerit humor Sympis de epithymo, & humida, & lupulorum, sumptis cum aquis distillis, aut decocto earundem herbarum, purgare discit lenit. pulv. senæ præpar. confect. Hamch, aut pilulis de fumo terre. Dissolvemat sibi hæc electuaria in decoctione fumariæ, epithymi, rad. polyposii, lappat. acuti, & corticum radicem siargulæ.

Si Gangrenâ profluat ex licetate, & ex atrophila, erunt interius partes humectande bono albenito, veluti siccis. Eadem, recentium pulorum, gallinarum, caponum caltharum & similia. Totum item corpus oleo amygdalarum dulcium, liliatum alborum, violarum, pingued. gallinæ, & similibus, ut calor nativus concutiat, inungendum est. In hic Gangrenâ specie nocet vniatili, itemque frigidioris, & cucurbitæ: nisi forte ipsi parti affecta adhibeantur, alliciendum gratiâ spirituum & sanguinis, quo ipsa alant. Hæc quoque, temperies corporis, sexus, ætas, & anni temperies indicant, quid facto sit opus. Amplius enim refrigerantia desiderantur in habitu bilioso, a quovis regione, tempore, & anni temperie iisdem calida, quàm si omnia secus habuerit.

In topicorum quoque usus habenda erit ratio, nempe 1. causæ. 2. ætatis. 3. sexus. 4. vitium. 5. partis affectæ. 6. omnium verò maximè vehementiæ, & magnitudinis morbi. A causa morbi, quemadmodum ab initio hujus cæ; itis quoque mensuramus, præcipua de prima sumitur indicatio. Nam si fuerit affluxus plegmonicus, potentius refrigerandum est, & evacuandum, quàm si causa in humore puritudo consistat. Præterea humores accendi sunt de sensu. Si veri causa Gangrenæ incemperies siccæ, & deficiens nortimur, atque sanguinis fuerit, quoque modo id fieri poterit, ad partem affectam nutrimentum atque sanguis attribendus est. Evaporationes quoque corporis, venæ item sectio, & usus cucurbitularum, atque defensivorum hic minimè conveniunt. Enim si causa sit ardior ligatura, ea solvenda, & tridicem adhibendum.

ambus, tam incidentis, abtergendis, & deicandis humoribus, recentis circa ligaturam, quo patet spiritibus via. Si erit luxurio, aut ossium eminentia, suo quoque loco restitui oportet, quod ad fieri poterit. Tumores schirrhosi, alique preternaturali, si circa vasa magni induruerint, sanguisque & spiritibus, ne perissent, impediendo fuerint emolliendi, & discutiendi sunt.

Secunda indicatio ab ætate desumitur. Nam juveni ægroto caro, & partes omnes mollicule: sunt proinde medicamenta adhibenda minis efficacia, quam quæ proveciores. Horum enim caro & partes duiores, verbi gratia agricolarum, nautarum, venatorum, bosporum, & aliorum ejusmodi laboriosum vitam agentium. Et ut verbo dicam: necesse est, ut medicamentum cum natura, ætate, ac viribus egræ suam habeat proportionem.

A seculo scilicet indicatio. Ferè namque delicatius tractanda mulier, aut puella, quam vir quispiam, aut habilior adolefcent: similiter & mollius orisio, ac delicatior omnes: Itemque Eunuchi, quam superiores illi agricolæ aliisque id genus.

Ab egræ quoque viribus quarta sumitur in fictio. Nam si firme fuerint, Chirurgum integrum erit applicare valentia remedia, & necessarias operationes exequi. Sin morbo jam dejecta vires, vitæ præstare poterunt, quæ aliquam necessaria forent. Est itaque prudens humanis, quemadmodum Celsus docet, dum, qui servari non potest, non attingere, ne videatur occidisse, quem fors ipsius peremit.

Quinta indicatio petitur à parte affecta. Nam oculi, os, pudenda, uterus, anus, articuli, ventres, & alia id genus, itemque partes exquisitis sensu præditæ, sunt mollius tractandæ, quæ sunt masculolæ, uti brachium, tibia, &c. Ita sese gerat Chirurgus, quoad ejus fieri poterit pro ratione indicationum, quæ sese offereunt.

Sexta & postrema supersit indicatio, quæ prope modum omnia subvertit, nempe morbi magnitudo. Itaque si recens est morbus, & potendo tantummodo superfluitas: sit est, leviter scilicet partem affectam, & adhibere Ægyptiacum nostrum suo loco deliriosum, vel simplex vel melle rosaceo temperatum, pro partis affectu natura, proque ætate & sexus ratione. Sin gravis sit morbus, minuterque Sphacelum, scilicet, & incidentia est pars alius, apponendumque Ægyptiacum, aut raporia, & cauteria potentialia: aut ipso ætali cauterio, si quidem fieri potest, asufferendum quicquid corruptum est. Nihil enim in tam atro morbo, in quo non solum de parte aliqua, verum etiam de toto corpore agitur, clementer agendum; maxime cum degenerat in Sphacelum. Quapropter si superiores indicationes vel tantillam spem faciunt, protinus adhibendum est extremum remedium, juxta Hippocratis Aphorismum: *Extremis morbis & maxime, quales sunt peracuti, quibus periculum imminet, extrema remedia, ut est vitæ remississima, & alia præstidia maxima, sunt adhibenda.* Interim tamen nihil temere de omnia secundum rationem, & non nisi factâ prognosticatione, coram assistentibus facienda sunt. Non enim agitur hic de corio bovis, sed de homine, ad imaginem DEI facto. Attamen remedium simul & operatio si cum morbo Analogiam habuerint, non possunt non esse utilis, quantumvis violenta fuerint. Sic Helvetio illi in capite vulnerato, cuius capite quarto mentionem facimus, vidi præstantissimum Dn. Johannem Griffonium Chirurgum longè excellentissimum adhibuisse supra datam matrem Sympum ex unguento

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Ægyptiaco, liquidissimum scilicet ipsius unguenti partem quæ pulveticibus subsidentibus immiscetur: unde larum cohibita est putredo, quæ duram naturam occuparat: alioquin remedio imbecilli nihil fuisse effectum, erat verisimile: Sicque extremus morbus extremus curatus fuit remedio. At Ægyptiacum hac valentissimum, aut extremum apponendum remedium, habita parvis ratione, cui apponendum, quod alioquin extremum dici non possit. Monitos interim velim Chirurgos, ne hæc aliave id genus valentia remedia adhibeant: cerebri membranis, nisi manifestâ putredine seu corruptione tentatis, qualis in illo Helvetio cenebatur, in qua medicamentum suas operationes cum fructu perficere potuit. Deinde ut illi parces utantur, ac cum primùm vehementia morbi inhibita fuerit, ab illis desistant. His itaque aut ad summum ter membranis cerebri imposito Sympo id Ung. Ægyptiaci, & quidem in maximis putredinibus, subicit. Deinde mitiora applicanda sunt. Filamento autem equæquam applicandum est medicamentum hoc, modum enim excederet, & ad partes finas delinqueret, maximeque symptomata excitaret: sed penicillo minime pictoris, prædicto Sympo intus superficiei membranae parces, uti dixi, leviterque illinenda est. Est enim medicamentum summe acris, respectu membranarum cerebri, quæ exquisitissimo sensu sunt præditæ. Quapropter graviter erant turbationes nonnulli, quorum nomina, studio hac supposito, qui oxymel in vulnibus capitis, & quidem detectis membranis, copiose applicant. Propter actionem enim aceri gravissima excitat symptomata, præcipue autem dolorem ingentem ac maximum; quem è vestigio membranarum inflammationis, seu delirium, spasmus, paralysis, tandemque mors sequuntur. Quapropter ego in detectis membranis cerebri vix melle rosaceo per se, nisi cum aliis mixto, uti ausus sum. Meninges enim cerebri, quia exquisitissimo sensu sunt præditæ, nihil acris sustinere possunt.

Potest, quia omnis in universum Gangræna & Sphacelus, putrefactionis ratione, veni plus minusve participare est, pro ratione morbi majoris minorisve conservandæ, firmandæque partes primariæ, cerebrum, cor & jecur, ut ne vaporibus & exhalationibus, à putredine ista subortis tententur, idque remediis tum internis, tum externis.

Cum omnesque partes nobiles egregiè corroboratæ, easque à vaporibus malignis tueretur lapis Bezoar, cum aqua aliqua appropriata, veluti baglossæ, botraginis, cardui benedicti, aut mellis exhibitus. Ego ut plurimum nonnihil confectiois Alkermes, & aquæ cinamomi destillatæ sine vino addo; non solum, quod cor partesque nobiles roborant, verum etiam ut sua veluti vehiculum lapidis, qui alioquin tardè operatur. De Dosi hujus lapidis auctores inter se non conveniunt, cum alii magnam probent, alii verò ipsum in exigua quantitate exhibeant, de quo vide Dn. Casparum Bauhinum. Ego à granis quatuor ad sex vel octo extorbo. Sequens quoque pulvis cor partesque nobiles mirum in modum roborat.

R. Lapis Bezoar

Ovis de corde cervi ana ʒj.

Margaritæ. preparat. ʒij.

Cornu cervi ubi, preparat.

Terræ sigillatæ ana ʒj.

Sacchari candi ʒij.

Misce, fiat pulvis, de quo drachma una, cum aqua appropriata, ut dictum est, exhibetur.

Os quod in corde cervi reperitur, insignem hæbere vim corroborandi cor hominis, indubium vocare

T 3 minimè

minimè contendam; sed quia in corde boum hujusmodi ossa quoque repetiuntur, & plerumque à Pharmacopolis pro ossibus de corde cervi subsistantur; Videat Medicus ne decipiat. Ego expertus loquor, pharmacopolam enim & aromatarium quendam celeberrimum familiariter cognovi, qui quorundam laniones mactabat boves, eorum corda sibi adferenda cubabat: à quibus extracta ossa, pharmacopolis in mundinis pro ossibus de corde cervi vendebat. An autem crudum, aut potius usum & præparatum exhibendum sit, postea dicam. Quibus non suppetit Bezoar, per intervalla scrupulus terre sigillatæ, aut boli Armenæ aut cornu monocerotis exhibendus: bulæ tamen, ut testantur viri docti, cervi cornu haud multum credit eorum venena, & venenatos morbos: à malignissimis vaporibus cor defendit, & ut *Gregorius Horstius* testatur, vilcositatem humorum incidit, interiorum viscerum obstructions aperit, & vi sua penetrandi putrefactibus humoribus resistit, adeoque Balsamica quadam virtute malignitatem humorum corrigit: unde *Joubertus* maximè Cardiacum dicitur.

Calcinationem autem & præparatum, teste *Horstio*, loco ante citato, non crudum exhibendum est, cum crudum propinatius frequenter eodem modo, ut fuit exhibitum, per alvum, sine omni alteratione reddatur. Spirituosa enim substantia, omnis actionis causa, per fœculentam materiam additam, colligata, impeditur quo minus virtutes suas exercere possit, ita ut in crudo vis illa quasi sepulta jaceat: imò sal etiam balsami sui vires exercere nequit, nisi terrestribus suis vinculis expeditur. Cum igitur vis illa diaphoretica, inquit idem *Horstius*, quæ propter salem fixum inest huic remedio, non cum aliis qualitatibus ad impedimentum suis post calcinationem, & præparatum maxime liberata sit, idem conclusionibus, magis conveniens esse cornu cervi usum & præparatum quam crudum, imò tam intus & succidendum in gravissimis quibus morbis hoc medicamentum est, ut omni aevi, ipsi etiam recens natis commodissimè, necessitate urgente præbeatur. Hæc tenet *Horstius*.

Eodem quoque methodo in exhibitione ossis de corde cervi (quod hominis cor, ut testatur *Quercianus*, quadam substantiæ similitudine roboret, & ad cardiacam affectionem, syncopeque inprimis utile est) procedendum esse existimo. Illud enim nisi prius calcinatum, & præparatum fuerit, propter supra dictas causas veluti inutile esse, & vires suas minimè exercere possit, sed cum excrementis sine omni alteratione per alvum eacerni, quis quæso in dubium vocare poterit?

Hæc autem negligentia, aut potius imperitia quorundam Pharmacopolorum notanda est, qui cornu cervinum non in catillis sutoriis, aliisque vasibus ad præparationem medicamentorum aptis, sed simpliciter inter carbonem comburant: præparatio profecto, quæ uti compendiosa, & Pharmacoporis facilis, ita etiam fordida ægrisque exitiosa est. Quandoquidem carbonem malignum & pestiferum in se continere vaporem, inde manifestum fit, quod accensum in loco aliquo occulto dolorem capitis, nauseam, & lipothymiam exciet, mortemque aliquando immaturam acceleret, ut Colonie Agrippinæ circa annum 1593. duobus accidisse memini: qui eodem nocte in platea, dicitur *Kloster Gasse* appellata, vigiliæ agerent, & in domuncula quadam ad id extracta, carbonem ligneum incendissent, mortui reperti fuere: tertius vero etiam velut in agne versaretur, ad ætherem tamen deportatus, adhibitisque ipsi, quæ adhibere debuerant, pristinae sanitati restitutus fuit. Ceterum cornu cervinum, dum in carbonibus istis comburitur, cineresque undique ipsi adherent, facillè aliquid malignitatis ab ipsis carbonibus retinere possit, ratio suadet.

Succus clivorum cum saccharo, & prisana, aut decocto agrimonie & veronice, in eundem usum ef-

ficacissimos, Theriaca, & Mithridatium laudantur, si solvantur aqua, aut decoctione cardui benedicti, & ægro præbeantur à scripto uno ad drachmam unam. Sunt quoque conservæ rosarum, violarum, buglossi, & nemapharis utilissimæ. Et si vehementior sit febris, cordialibus (Theriaca, & Mithridatio) addendum est aliquantum throscifcorum de campora. Camphora enim inter fortissima alexiteria non immeritò à viris doctis numeratur: putredini enim mixtum in modum resistit. Quapropter non solum vapores, qui ex corrupto & putrefacto membro versus cor ascendunt, repellit; verum etiam maximum illum calorem internæque partium temperat. In magnis tamen capitis & ventriculi doloribus hæc causæ utendum esse monet *Mindererus*: Licet inquit, extrinsecus frontis embrachis splentis & perfusionibus inditus, semper nobis visus sit plurimum profuisse. Sequens itaque potuncula per intervalla ægro exhibenda est:

R. Theriaccæ optime ʒij.

Cornu cervi usi & præparati ʒß.

Syrup. de succo citrionum ʒj.

Trochiscot. de camphor ʒi.

Cum aq. card. bened. fiat. potuncula.

Pueris delicatulis, qui præcipitiam potionem propter saporis gravitatem bibere non possunt, detur sequens potuncula.

R. Lapidis Beznandici,

Margarit. præpar. ana gr. iij.

Cornu Cervi usi & præpar. ʒß.

Cum decocto agrimonie & veronice, fiat potuncula.

Confectio Alkermes quoque per se cor patteque nobiles roborat, & malignos vapores repellit, præcipue si scrupulum unum, aut alterum cornu cervi usi & præparati admiscueris.

Eatinsecus applicandum est sequens epithema:

R. Aquarum rosarum.

Buglossæ

Borraginis ana ʒij.

Vini Malvatici ʒj.

Aceti ʒß.

Speciegem diamargar. frigid.

Ligni Aloes.

Corticum citri

Rasuræ cboris ana ʒß.

Croci gr. vj.

Misce, fiat epithema, applicetur tepidum cordi regioni, cum panno purpureo.

In pauperiorum gratiam ætate accipitur borragio, acetosa, & mellisa; contundantur in mortario cum cyatho vini albi & paulillo aceti rosati, expressio addatur cinnamomum & crocus, pulverulata, oleo applicabuntur, ut supra.

Contemperandus quoque vehemens jecoris calor idque exhibito ægrotanti Syropo citrionum, granatorum, acetosæ, violarum, oasidis, de agrestis, aut de ribes, cum aqua buglossæ, borraginis, aut acetosæ; Aut denot cum decocto agrimonie, veronice vel cum prisana. Potent quoque parum speciegem diamargariti frigidæ admisceri. Interim à vino aliisque calidis potibus abstineat æger. Extrinsecus jecori sequens epithema tepidè applicetur.

R. Aquarum endivæ,

Agrimonie,

Cichorii,

Lactucæ,

Abinthil an. ʒij.

Aceti ʒß.

Speciegem diarrhod. Abb. ʒj.

Sensillæ rubri ʒß. Misce.

Si tueris tui, desinque aquæ destillatæ, hanc loco herbe illæ aut omnes, vel pleræque omnes usurentur: succos exprimat, aut fiat eorundem decoctio, deinde addito paulillo aceti, & capitur, applicetur tepidè jecni cum panno rubro.

Si capitis dolor vehementer sit, nec æger somnum capiat, vapores clysteribus & suppositoriis revellantur: inungantur tempora, & frons unguento populeo, vel sequente.

R. Ol. rosarum,
Nemphatis an. ʒ. ʒ.

Caphuræ

Opii dissoluti in aqua betonice an. gr. vj.

Misce, fiat linimentum.

In eodem usum applicato frontale ejusmodi

R. Aq. Rosarum

Betonice ana ʒij.

Aceti.

Ol. Rosacei.

Misce, applicetur tepidè.

Si dolor capitis, vigilie, & inquietudines maxime fuerint, detur ægro aliquid laudani, aut triphæ magn. cum opio.

Æger, uti dictum est, abstineat à vino & cæteris rebus calidis, aut concoctis difficilibus, quippe ex his vapores ad cerebrum copiosi transmittuntur: quos ut inhibeas, post cibum sumere poteris aliquantum ex miva cydoniorum sive speciebus, & conserua rosarum, rob de ribes aut bethenis & similibus.

Defensiva loco affecto applicata impediunt quoque, ne vapores ad caput ascendant, sed cautè eis uti licet. Ex immoderato enim usu adstringentium, aliquando Gangrenam fieri cap. 6. declaratum fuit.

Cap. 13. *Curatio Gangrænae particularis, nempe ejus, quæ ex alteratione vehementi per qualitatem manifestam oritur ducta.*

Iam proximo procedente capite attingimus, quæ in genere ad curationem Gangræne pertinent: sed cum non veniat in Chirurgi manus gravior, aut difficilior morbus, hanc erit ab eo, eundem paulò susciù persequi. Ubi igitur ex ante commemoratis signis perpereris, orti Gangrenam ex intempestivo affluxu, & inflammatione sanguinis, perpendendum est, sistaturne materia, an verò adhuc dehiat in partem affectam. Materiam autem desfluere judicabis, si dolor ingens, inflammatio item magna, ac vehementis febris tuerit, axillarumque, aut ilium glandula submaxillæ sint ac dolorificæ. Tum quavis arte primò inhibenda est desluxio: deinde eadem aliò derivanda: tertio & evacuandum, quod in loco affecto jam congestum est.

Primum illum scopum assequemur adstringentibus, sive defensivis, quibus desluxio potest arcei à parte affecta. Chirurgus itaque statim ab initio post præscriptam victu rationem, qualis antea proposita est, applicet loco affecto defensivum sequens.

R. Boli armeni ʒijij.

Terræ sigillatæ ʒij.

Cornu cervi usi &

Rasur. eboris an. ʒij.

Caphuræ ʒij.

Ceræ ʒij.

Ol. rosati ʒij.

Aceti ʒijij.

Aquæ rosar. ʒij.

Album. ovorum num. ij.

Misce, fiat unguentum, quod diu servari potest. Aut quod parabilius est, impensiusque minoris.

R. Fatine hordei ʒijij.

Boli armeni albi ʒij.

Pulv. gallarum virid.

Nucum cupressi

Corticium granatorum an. ʒj. f.

Caphuræ ʒj.

Cum oxymelle, fiat cataplasma.

Altero in eundem usum promiscuè, aut aliò quopiam ad arbitrium uti potest Chirurgus: mihi posterius usitatum est. Oleola enim mihi omnia, aut quovis modo pinguis suspecta sunt in Gangræna: poros enim obtinendo, transpirationem inhibent, & vapores putridos in parte affecta retinent. Cessante deluxione, possunt defensiva intermici, ut innatum calidum viscosum negotio penetrae queat in partem affectam. Sin aliquod corruptionis principium sese patefaciat, tum erunt continuanda defensiva, ad arcendos vapores, qui ex putredine ad partes primarias attolluntur.

Alteri scopus est aliò revellere, & derivare humores in partem affectam affluentes idque quam citissime, adhibitis purgationibus, phlebotomia, escuthis, hirudinibus, aliisque id genus remediis. Cor pus purgandum medicamentis lenioribus, pura bolose sequenti:

R. Cassie recens extractæ ʒij.

Elect. diacathol. ʒ. ʒ.

Cum sacch. fiat bolus.

Aut dissolvendo in aqua hyssopis, aut decocto endivie, lupul. scabiose, cichorii, & florum cordialium, fiat portio. Alvus laxa servanda: lubrica reddetur quoad ejus fieri poterit usu, seu clysterum & balneorum, seu etiam prunorum dulcium decoctionum in infusione senæ, meeboacan, & rhubarb. si animus est purgare validius.

Secunda vena, nisi ætas, tempus, aliudve quippiam obstituerit, & multum sanguinis extrahendum à sumpta indicatione à magnitudine morbi, & vitium ægotantis. Vena aperitur, quæ consensum habet cum parte affecta, observari interim fibrarum tectitudinem.

Hic quoque utiles escuthis, his præsertim, qui phlebotomiam fetes nequeunt: Sic & hirudines aut adhibet, ad evacuandum humorem atrabiliarium. Atcrior quoque ligatura remotarum partium utilis: ac frictions, quæ sunt manu, & linteis calidis, novæ, sanguinem enim & humores subriliores & actiores reddunt.

Tertius scopus est, ut pars in pusillum, ac naturalem statum restitatur. Id fiet evacuato accuratè sanguine, & cæteris humoribus parti affectæ impactis, ac in ea conclusis. Itaque quamprimum prospiciendum est, quid facto sit opus, & scalpelli acie tenendum, sit ne gangræna profundior, an superficialior: tum pro diversis ratione scarificationis levius aut altius imprimenda: dein satis magna sanguinis quantitas sinenda effluere. Quin etiam si qua sit in parte affecta grandior insigniorque vena, ea quædam, & sine mora incidenda: sic enim sanguis & humores exonerantur, pars affecta refrigeratur, & aperitur pororum obstructio, quæ arteriarum systolen & diastolen inhibeat. Id tamen nequaquam aggrediendum, nisi morbus gravissimus, & æger juvenis: & vires firmæ fuerint. Nervos autem majores, tendines & arterias, necas attingere, nisi maxima & insignis adfuerit corruptio: alioquin memetipsum à convulsione, motus deperditione,

dolentibus sentitissimis, sanguinis profluvio, & spirituum vitalium resolutione, syncope, imò & morte.

Præter scarificationes Avicenna & alii scriptores jubent apponere hirudines, quo plus depleatur sanguinis & humorum: id quod & ipse soleo facere, quoties potissimum sanguis paucus educitur scarificatione. Si desint hirudines, aut si æger eas respuat, soleo tres, aut quatuor cucurbitulas minores applicare: majores enim cucurbitæ vehementius attrahunt. Hirudines tamen aptiores, proposito convenientiores. Evacuato sanguine sbluenda pars aceto, & sale marino simul liquaris: hæc enim putrefactioni plurimum repugnat; At si profundior fuerit Gangræna, efficacior adhibenda lotio, qualis ea est, quæ sequitur.

R. Lixivi fortissimi

Aceti optimi ana ℥iij.

Scordii utriusque

Abſinthii

Rutæ

Lupinorum contusorum ana Mß.

Rad. Aristoloch. rotund.

Vincetoxici ana ʒß.

Salis marini ʒiij.

Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, in colatura dissolve.

Aloë

Myrrhæ ana ʒß.

Aq. Vitæ ʒij.

Camphoræ ʒß.

Quoties remedia permutare necesse fuerit, lavare oportebit partem foveo illo tepido: nam præterquam quod plurimum resistit putredini, etiam revocat innatum calidum, resolvit & exciæcat corruptos humores inibi conclusos. Insuper toti parti afficæ scarificatæ imponendam unguentum Ægyptiacum Mesues, quod componitur hunc, in modum.

R. Æuginis ʒv.

Mellis optimi ʒiij.

Aceti ʒvi.

Coquantur omnia simul donec fiat unguentum spissum & purpureum.

Quod si corruptio major est, soleo idem unguentum sic componere.

R. Æuginis ʒv.

Mellis optimi ʒiij.

Aceti ʒvi.

Coquantur omnia simul donec fiat unguentum spissum, & purpureum.

Quod si corruptio major est, soleo idem unguentum sic componere.

R. Æuginis ʒiij.

Mellis optimi, & cum decocto abſinthii, & scordii despumati ʒxvj.

Aceti stillitici ʒvj.

Aluminis rubræ

Salis ammoniaci ana ʒj.

Suci rutæ

Scordii utriusque

Alliariæ ana ʒiij.

Coquantur ad spissitudinem mellis, deinde admisce

Thiacæ optimæ

Mithridati ana ʒiij.

Camphoræ (plurimum enim penetrat, & putredinem inhibet) ʒj.

Sic præparatum unguentum non solum resistit putrefactioni, sed & temperat, ac minuit vaporum malignitatem, qui perpetuo attolluntur à parte obfessa Gangræna, & vixit principis. Breviter Ægyptiacum præstantissimum & primum est in Gangræna remedium, separatæque mortuam carnem à viva & laudabili

gignens escaram. Ubi tota pars Ægyptiaco correctæ fuerit, insuper applicanda cataplasma sequens, quod & ipsum resistit putredini, exciæcat humores extremities, dolentesque sedat.

R. Farinæ lupinorum

Lentium

Fabarium

Lolii

Salis marini an. ʒiij.

Pulv. Summicat. abſinth.

Scordii utriusque

Alliariæ

Rutæ ana ʒj.

Coquantur in oxymelite simplici, & fiat cataplasma. Refrigerato sode

Aloës

Myrrhæ ana ʒj.

Aq. Vitæ ʒj.

Misce.

Pædiciæ autem farinæ, imprimis lupinorum, mirum in modum in Gangræna, aliisque putridis ulceribus conveniunt: exciæcant enim, discutiunt, & putredini adversantur. Quenamodum Dioscorides, Galenus, & alii testantur. In præparatione autem & usu farinæ, sive lupinorum, sive lentium, aut fabarum fuerit, diligenter prospiciendum est, ne dñs cum teliquis pulveribus coquantur. Fiet enim nimis viscosum, glutinosumque, ac proinde inutile cataplasma. Viscosa enim omnia, quæ poros obstruunt, vaporesque putridos in parte afficæa retinent, in Gangræna, omnibusque ulceribus venenosis ac putridis exitiosis esse, siliâ quoque monui. Atque ego hanc autum causam esse, cur Niclaus Gaddius in Chirurgia militari has tepudiat, utpotè ad Gangrænam inutiles: siquidem emplasticas putat. Quamobrem levissimè tantum excoquendæ cum pulveribus. Hæc autem remedia omnia, ablutio, cataplasma, &c. tepidè sunt admovenda, hisque præterea calidis obvolvenda pars affecta, etiam si Gangræna orta sit ex inflammatione. Sic enim penè extinguendam, & intermortuum innatum calidum, revocatur, & quasi rursus accenditur in parte affecta.

Chirurgus, quoties ad ægrum accedit, his remediis exciæcat escaræ summam partem tollere conabitur: aut scalpelli acie incidat, usque ad partem sanam, quo dñs medicamento quacunque penetrandi via, ad corrigendum, quicquid depravatam, & corruptam est: nec alla procedat methodo, donec videat morbum superatum, & evictum. Id verb ex eo deprehendit, quod malum non latius serpet: & circa ipsum apparebit circulus exarè rubens, & exquirit sensus: Separationem enim carnis mortuæ à vivæ naturæ & medicamentorum beneficio fieri indicat: præterea in illo circulo rubro, materia spissa & alba reperitur. Conspicuntur etiam corruptio & caro emortua cautio, tum potentiali, tum actuali. Pro cautio potentiali Johes de Pæo, & quidam alii voluntur krenito, & sublimato, aut per se, aut cum unguento Ægyptiaco misto, in hunc modum:

R. Floris æris

Aluminis,

Mellis,

Aceti ana ʒj.

Arsenici pulverisati ʒj.

Sublimati ʒj.

Bulliant omnia simul, prius pulverisandis pulverisatis, usque ad spissitudinem.

Sed videamus nunc, an arsenicum sive putum, & in pulverem redactum, ut docet Fallopius, loco allegato, sive unguento Ægyptiaco permixtum tunc in Gangræna applicari possit? Constat autem Arsenicum in numero medicamentorum, quæ à Galeno & aliis

& aliis septica dicuntur, hoc est, putrefactis, & ulteriori vim habentia: Colliquare enim, ut *Galenus* loco proxime allegato addit sunt nata, & possitimum carnem troulam. Hujus quoque sententia fuisse *Avicennam*, ipsius scripta testantur, his verbis: Putrefactiva verò est illa, videlicet medicina, cujus proprietas est, ut corrumpat complexionem spiritus, perveniens ad membrum, & complexionem humiditatis membri ejus cum resolutione, ita quod non est conveniens, ut sint pars illius membri, & non pervenit ad hoc, ut adurat ipsum, & corrodatur, & resolvat humiditatem ejus: Imò dimittit in ipso humiditatem coactam, in qua agit aliud à caliditate naturalis, quare putrescit. Et hujusmodi quidem exemplum est Arsenicum. *Hastenus Avicenna*. Quibus verbis quid de Arsenico censendum, & quomodo periculosus ipsius usus sit in Gangræna, satis superque docet. Gangræna enim cum nihil aliud sit, quam putrefactionis principium, quæ et calido & humido gignitur, ac similia similibus consequuntur, augeranturque, ut *Galenus* multis in locis testatur: non videtur, quomodo arsenicum, cum putrefaciens sit, & humiditatem corrumpat, ut *Avicenna* testatur loco præallegato in membro relinquatur, qui quoniam laudabile hoc esse potest, cum sit potius putrefactionem promutuum. Ex his apparet, *Fellipsum* aliis vitiis de Chirurgia optime meritu, sibi ipsi contradicere: Læto enim de morbis. c. 26. hæc habet verba: *Est quædam*, inquit, *Gangræna, cum medicamentum crudum parti applicatur, ut risgalium & faciliæ, cum sine ratione applicatur, tunc introducit intemperies calidæ, deficiens caliditate naturalis parati*. Hoc in loco applicationem risgalii, hoc est, arsenici, veluti causam Gangræne ponit. At paulo post & quidem eodem capite jubet in Gangræna arsenico, & sublimato pari pondere pulverisati, & commixtis scissuras explere, imò & leuoldi iterare, & si prima vice non talis operatum fuerit.

Antreas Vesalius institutionum Chirurgiarum lib. 5. de tumoribus cap. 12. eadem verba. Verum opinio nem illam non genuinam, & *Vesalio* *Profriso* à *Berzario* falso ascriptam esse existimo. Ut autem sit, non video, quomodo Arsenicum, si in membro alicui corporis, Gangræna minime obfessum, applicatur, Gangrænam procedere, eamque introducere, & e contra Gangrænam jam factam vincere atque exipare possit. Præterea prædicti, qui necilibus, trochiscis, & fistulis applicuerunt unguenta & trochiscos ex Arsenico paratos, facile potuerunt observare, quàm gravia exoriantur ab eo symptomata, nempe dolor ingens viginti quatuor horis ad minimum perseverans, febris, delirium, deliquia, & syncope. Hæc autem symptomata ex eo sunt omnia, quod Arsenicum transmittit vapores suos malignos ad partes principes, liquat præus carne in materiam corruptam, quæ illi pro velleculo est, ad deferendum illius qualiter malignam, ad eas partes primarias, & quamvis ulcera sint remota à partibus primariis, & ejus tamen malignitas ad eas facile pervadit per medias venas, nervos, & artérias: cujus rei exemplum lector cetera sine quinque capitulis videre poterit. Hinc intelligimus, Arsenicum nihil ad Gangrænam conferre: Quapropter *Paracelsus* hujusmodi caustica ex Mercurio sublimato, & similibus parata, artes camificas appellare consuevit, itaque si quando applicanda sunt cauteria potentia, scilicet & citius mihi insuperari posse videntur caustica, parata ex fortissimo lixivio, è cinibus fermentorum, & calce viva. Hujusmodi enim ruptoria operantur presen-

tissime, & levium dolore, quippe vix ad beatissimum spaciū perleverat: contra Arsenico cauterium autem vix ad viginti quatuor horas, imò & totum biduum una symptomata longè gravissimis. Adhuc cum Arsenico dissolvantur, liquaturque cauo, ruptoria cuncta eximentur, deficiunt, & dissipant humores superfusos: itum cum maligna & venenosa qualitas soletat pervadere ad partes principes, ut dictum est, ruptoria, cum sint caustiora talitatem, in ea tantum agunt, quæ proximè contingant. In applicatione autem causticorum sive ruptoriorum, magnitudo quoque morbi diligenter perpendenda, & per ipsius ratione ruptorium aut paræ, aut copiosius applicandum est: quapropter Gangræna an profundanda, an superficialia sit, imprimis acie scalpelli per vestigare convenit. Facili elicitur excidenda est ipsius superficialis, ut carnem vivam proximè attingat, si non dum factis profundaverit ruptorium, denovo illud applicare convenit. Deinde medicamenta, quæ escelaram curesunt, applicanda sunt, de quibus postea dicemus.

Sequitur nunc coniectura æquale, nempe ferrum ignitum, quod uti supremum remedium, ita quoque maximum iuramus, quapropter non immerito in curatione Gangræne & Sphaceli potentiali, ab authoribus classicis, diligenter videlicet & præstanti proponitur. Primum, quia potentia ignis, testatur *Albucasi*, simplex, & omnis aliene qualitates expulsi est: quapropter nihil aliud præterquam calorem, & unguentum post se relinquit: cum potentiale è contra, ipsiusmodi arsenicum, sublimatum, & hujusmodi venenatum & malignam qualiter habet, & post se in parte affecta reliquant. Secundo, quia ignis actionem habet determinatam, quapropter ferrum candens non ultra arbitrium Medici operatur: cauterii potentialis verò operatio, nequaquam in potestate Medici, sed in ipsa proprietate medicamentis sita est. Tercio, præfertur cauterium æquale potentiale, quia propter ignis vehementiam è momento operatur: Potentiale verò, quia ipsius vis atque usus facultas in potentia rationis sita est, tardè. At cum Gangræna sit morbus peracutus, quique non dat inducias, promptissimum quoque remedium celeriter, & absque cunctatione secundum *Hippocratem*, adhibendum est: tale autem est ferrum candens. Quarto, cum ut plurimum in Gangræna & Sphacelo sit humorum excrementorum abundantia, medicamentum in summo gradu solidum requiritur: At tale est ferrum ignitum, non autem cauterium potentiale, præcipue arsenicum. Etiam enim calidum sit, relinquit tamen post se humiditatem corruptam, ut *Avicenna* loquitur: Quinimò, cum pars, quæ Gangræna laborat, supra modum sit debilis, & propter excrementorum humorum abundantiam, laxa, in corroborentur, & exsiccetur necesse est. Corroborat autem & exsiccet cauterium æquale, humectat, & debilitat, ut dictum est, potentiale, cum, quia loco affecto malignam insigat qualiter, tum etiam quia ipsius operatio tarda est, simul & dolorosa: hinc sit, ut humores ratione doloris copiosius affluant, partemque magis magisque laxam ac debilem efficiant. Dolor verò cauterii æqualis momentaneus est: quamprimum enim ferrum candens amovetur, desinit, præcipue si sanodynnum aliquod applicetur. Quid plura? *Canonicus* (*Avicenna* verbis lib. 1. fen. 4. cap. 29. mihi pag. 156. not.) *est medicamentum valde utile, iavens ad prohibendum, ne corruptio spargatur & ad conservandum membrum, cuius complexio est frigida, & ad refrigerandum sanantibus succum*. His verbis quatuor utilitatis, in curatione Gangræna

Gangræne maximè necessitas, ex cauterio provenire testatur *Avicenna*. Docet enim, 1. cauterium prohibere ne corruptio vicinas partes invadat, 2. ipsum confortare membrum, cujus complexio frigida est. At in Gangræna, etiam si ex interperie calida orta fuerit, confusio tamen partis afflicte frigida est, propter caloris innati defectum atque imbecillitatem. 3. resolvere materias corruptas in membro contentas. 4. & ultimum docet cauterium actuale sistere sanguinis fluxum. Atque hæc omnia in curatione Gangræne summopere sunt necessaria. Ex quibus error simul & incertitia *Felici Wirzii* luce meridiana clariùs apparet: Libro enim 1. cap. 4. de hoc à tot seculis, & à tot viris in arte Chirurgica eruditis, approbatissimo remedio loquens, ad illam usque impudentiam devenit, ut illud à carnificibus inventum fuisse, & non nisi lætonibus adhibendum esse, scriptum reliquerit. Nullam tamen aliam causam adfert, quàm quod nervi à cauterio actuali lædantur, contrahanturque: quasi Chirurgus rationalis, & in operibus artis exercitatus, confusus, & absque iudicio & ratione operaretur, neque discrimen ullum inter nervos, aut nervosas partes, & venas aut arterias faceret. Venæ & arteriæ ne anatomis notum est, cui proximè, nervi verò multò altius jacent: quomodo igitur cauteriando venam, aut arteriam, nervi læderentur. Deinde non erimus cauterio actuali ad sanguinem sistendum, nisi maximè urgente necessitate, & ubi reliqua medicamenta frustra adhibuerit, & æger de vita periclitatur. Sed & ex duobus malis, ut sonat proverbium, minus semper eligendum: Si itaque contractio aliqua nervorum perimiscenda esset, nonne tamen præstaret incommodum hoc, quàm mortem subito? Desinant itaque *Wirzii* Avorum nostrorum divinam scientiam, quæ tot ægri conservati fuerunt, stultè scindere, desinant inquam, remedium hocce, cujus efficacia talis est, quemadmodum divinus *Hippocrates* docet, ut quæcumque ulcera putrida ab ipso non sanantur, insanabilia putare oporteat, contemnere, & indubio afficere.

In Gangræna tamen ex interperie calida sine affluxu, uti quoque in illa, quæ ex siccitate, & penuria alimenti exiit, cauterium actuale mihi suspensum est, ut suo loco fusius declarabitur. Eucharæ his remediis facta, curandum quamprimum excidat. Id tamen fieri non debet remedia, applicari solitis ad relaxandum Eucharæ, puta butyro recenti, basilico, oleo dulci, adipe suis, anseris, caponis, & cæteris id genus: quæ cum sint calida & humida, possunt novam generate putredinem, simulque ulcus fortissimum reddere. Itaque ex *Galeni* sententia applicanda est succos porcorum cum sale: hic enim penetrat & excidat plurimum, sicque putrefactioni repugnat. Adde quod relaxat, & adjuvat Eucharæ calum humectatione sua, ut testatur *Hippocrates*.

Morbi vi superata, Paulus Ægineta vult applicari farinam hordeaceam decoctam in hydroleo, aut, (quod magis probatur) farinam orobi cum melle. Utile quoque ad Eucharæ calum unguentum sequens, itemque ad ulcus abstergendum, & mundificandum.

R. Farinæ ervi
Rad. Aristoloch. rotunda
Iridis Florentis
Vincentoxici
Angelicæ ana ʒʒ.
Thiactæ ʒij.

Cum f. q. mellis rosæ, fiat unguentum.

Verumtamen hic meminisse oportet eorum, quæ supra magnitudo, videlicet non expectandum, dum parum beneficio, aut medicaminis ope Eucharæ se-

paretur. Namque enim cum sit debilis, tardius efficit, ac interim posset regimini nova putredo sub Eucharæ. Adde quod Eucharæ, cum non debeat humectari oleis, pinguedine, & similibus, exsiccatur, ac proinde contrahitur & contrahitur, idque non sine dolore.

Si fuerit Gangræna ex cyssiplate malè curato, aut ex proprio partis calore incenso, diæta percipiant frigida & humida, exhibenturque sæpe bordeacea aliqua jussula, aut vervecina, aut volatillum carne, in coctis lactuca, portulaca, acetosa, borragine & similibus. Corpus quoque sic purgandum.

R. Catholici ʒvj.

Rhabarbari in ʒijij. aquæ codivæ cum paululo cinnamomi & anili iulij ʒj.

Syrupi rosati solutivi compositi cum Rhabarbaro, agarico & ienna ʒj.

Misce, fiat posio.

Pars afflicta sanificetur ad vivum, eam lavetur decoctione sequenti

R. Aquarum endiviæ

Lactucæ an. lbj.

Aceti m℔.

Lupinorum ʒj.

Rutæ

Scordii utriusque

Salis an. M. f.

Coquantur lento igne ad consumptionem tertie partis. Parti ad hunc modum lotæ applicandam Ægyptiacum nostrum, deinde cataplasma sequens

R. Farinæ fabarum

Lupinorum

Mordei an. ʒijij.

Scordii pulverisati ʒj.

Cum cymelicis q. f. fiat cataplasma.

Si propter doloris, reliquorumque symptomatum violentiam, ac continuationem pars afflicta repletur humoribus, quantumvis prima causa fuerit humor billosus, aut inflammatio sine affluxu, nempe ex proprio partis calore, ad valentiora remedia progredendum est, nempe cauteria actualia, vel potentialia: Eucharæ item calus procurandus ad modum antea propositum. In cauteriis actualibus tamen applicatione caute hic procedendum, ac non nisi summa urgente necessitate replicandum est. Billosæ enim inflammationes, cum laque natura sint calidæ & siccæ, ea cauterium magis magisque desiccet, & maligniores reddat. Sin autem quemadmodum antea dixi, propter doloris vehementiam sanguis & humores copiose effluerent, putredinemque procreant, tunc cauterium actuale locum hic quoque habere poterit.

Si ex congelatione sit Gangræna, propter universalia (quæ iudicabit nova Chirurgia) videndum est accuratè, incipiente tantum atitudo, an iam aliquantisper perseverarit: id autem ab ægro & astantibus simul ex sequentibus signis promptum est rescire. Morbus enim potest intelligi incipiens duntaxat, si pars eximio rubore scintillet, dolot autem sit vehemensissimus, punctior & extrinsecus. Sin verò uremque inveteratus est morbus, pars erit livida & frigida, ut cap. 7. diximus. Ergo si incipiat tantum morbus, non statim admoveendus ignis, aut calida quælibet apponenda: quin potius aqua frigidissima irriganda est pars, aut nivo perspicanda: sic enim ea poterit restitui, & paulatim incallescere. Hoc ipsum quolibet facili hyme experitur, si manus frigore propè congelatus friget nive, aut aqua gelida: sic enim subito incalescunt, at igni admoto magnum sentient dolorem cumque punctionem. Preterea si quis poma aut rapas congelatas injiciat in aquam frigidissimam, videbis ipsum gelu internum foras quasi efflari, ita ut stultus illi redeant ad suam naturam

prostant.

pristinum. Siu vero demergantur in aquam calidam, aut tepidam, confestim flaccescunt, & paulo post nigrore contracto computrescunt. Illiusmodi porro curatio Livonia, Islandiæ, Norvegiæ, & exterarum Septentrionalium plagarum locis usitatissima est. Neque enim vespere iug edianunt in divetorium aut ad ignem, vel vaporarium accedunt, nisi egræ periculis prius manibus, extremo naso, & auriculis plurimâ nive. Quod si cui videri trahâ, pro regionis ritu manus pedesque probè congelati fuerint, cum primùm divetorium ingressus est, non dubitant illic immergere partes gelidas in aquam frigidam, aut nivem, & sic cum televant, frigore enim, quod inest aquæ vel nivî, per antipetillium repellente, & cogente in unum, quod reliquum est calidi innari in partibus affectis, ipsum innatum calidum ita invalefcit, ut frigus seu adversarium expellas, Generosus Vir Dr. Bernhardus ab Harveth, Demum in Wildenberg, Vir pius & fide dignus narravit, se, cum eas regiones peragraret, incidisse aliquando in vjatorum secundum viam frigore rigidum, ac penè mortuum: quem planstro suo impoñitum, cum deduxisset in divetorium, herpes illud demersit in frigidam: quo facto undique erupit gelu, ut ipsius corpus glaciæ seu ferro contractum conspiceretur. Tum quoque propinatum illi, ajebat, cyathum amplorem hydromelitis, quo illi seu potu ordinarium nuntur, addito polvere cinnamomi, caryophyllorum, & macis, unde tunc in lecto provocatus est: atque ita ægrum ad se rediisse, & convalescere, amissis duntaxat manuum, & pedum extremitatibus articulis. Hinc intelligimus, hanc methodum sanandi congelatos veram & tutam esse, ac eam etiam probant summi Philoſophi, & Medici, in primis veto Avicenna & Levinus Lemnius, qui regiones illas sequeutur. Sic enim scribit Avicenna: Sunt præterea, inquit, hominum quidam, qui pœnuvi in aqua frigida & facinus militaturo, ac si nocuum ab eis removeretur, quemadmodum fructibus accidit congelari. Cum enim in aquam precipituntur frigidam, sunt quemadmodum si ab eis extraheretur congelatio, & ab eis labium, & leniantur, & æquantur, & signi applica tur, corumpuntur. Hactenus Avicenna. Levinus Lemnius vero de hac re scribit: Partes quoque si affectæ, modo ne prius frigore rigeant, ac nonnullis faecibus suffu, aquâ gelidâ immerſa, eaq; subito te irrigata, in pristinum vigorem restituntur, ac sensim incalere incipiunt. Et paulo post: Sic postea congelata in aquam frigidam demersa ad naturam suam redeunt. Hæc tamen distinctio diligenter observanda est, nimirum, ut statim ab initio adhibeantur & huiusmodi frigida, neve frigore potius rigeant partes, ac nonnullus calor subit. Nam si innatum calidum extinctum, aut extinctioni proximam sit, cum aqua frigida nunquam revocabit, imò vix erit unum medicamentum ullum: Quamvis tamen ratione illucendum est in partem affectam frigidioribus & cæteris, quæ paulo post in medium afferantur.

Conſciens autem Chirurgus ex sedato dolore pun- gente, ipsam quoque congelationem magna ex parte mitigatam, missam faciet, aquam frigidam, aut nivem, & lenes frictions adhibebit: deinde foras de lacte dulci, cui lauri bacce, roſmarini, salvia, lavendula, & similia calida incocta fuerint. Jus è capite, pedibus, & intestinis verecinis, incoctis herbis isdem, aptissimum est alliciendum sanguini, partique affectæ in pristinum vigorem restituendæ. Raparum decoctio, aut eadem rapæ coctæ & cum butyro receptæ, Ol. Rosæ, & vitellorum ovi in mortario plumbeo contrita, plurimum juvant, teste Pigne. His peractis componendas æget in lecto, probeque conte-

gnus, circumponendæque partibus congelatis ventis, plena ius illo, modo dicto aut lacte dulci. Deinde per os exhibendum, quod calidum innatum, & sanguinem vitalem partium innaturum ad extimè impellat. In eum vero usum laudatissima theriacalecta, in vino albo, coque generoso, dissoluta, cui nomenhil conf. Aliterius, lap. Prætor, & cæteris cæteri, addi poterunt. Perendie contiñuandi foras ex parte intestinorum, & herbarum super dictarum. Deq; illinenda pars affecta Ol. de lareibus, de terebinthina, de cera, semine urticæ, nallurti, &c. Quin & aliquoties theriacæ usua ex vino iterabitur. Siu frigore vehementissimo & diuturno planè suffocatum sit innatum calidum, ipsique Gangræna multum invaluerit, tum adhibenda est scarificatio, aliaque ante propolita remedia.

In Gangræna ex congelatione, defensiva ab initio morbi locum non habent: nulla enim adeſt affluxio humorum. Siu repletio five ad vasa, five vires io ægro adheſit, tandemque propter doloris vehementiam affluxio humorum, & inflammatio supervenerint, tunc non tam ad præcedentem causam, quàm ad præteritum affectum respiciendum est. Poterunt itaque tunc quoque applicati defensiva ad repellendos humores, qui affluunt. Interim tamen calidum innatum partis malè affectæ, quia ex præcedenti frigore & congelatione multum in modum labefactum, conservandum & restitendum est, adhibitis assidue vesicis, plenis sequenti decoctione.

R. Fol. Lauri
Melisse
Rosmarini
Roræ
Origanii
Scordii utriusque
Absinthii ana M. ʒi
Rad. Vincetoxicæ
Angelicæ ana ʒij.

Conquantur In vino albo ad consumptionem tertie partis.

Quoniam In Gangræna ex intemperie frigida & humida, morbi origo ut plurimum consistit in partibus inimicis, hepate, splene & cæteris, habenda est in primis ratio harum partium, & præcipienda digesta, purgationes & cætera, prout eandem disposici postulat. Hæc autem consulendus est doctus Medicus; Gravissimus enim est morbus, & ut plurimum letalis, quemadmodum ex eis, quæ antea dicta fuerint, satis colligere licet.

Quoad remedia topica, si adeſt magnus humorum pituitosorum affluxus, applicandum est decoſivum: non tamen ex simplicibus frigidis & siccis, ut in affectibus calidis, sed ex eis, quæ modice calescant, & propter vim suam adſticticioriam, partes roborant, compositum. Ab Avicenna, Pigne, & aliis varia proponuntur, ego sequenti utor.

R. Fol. Rosæ rub.
Absinthii vulgaris
Schizanthi
Stœchados ana M. ʒi
Scordii M. ʒi
Baccarum myrtillorum & jonipelli
an. ʒi.
Sampſuchi
Anthos ana ʒi.
Nucum cupressi
Aluminis an. ʒi.
Salis marini ʒij.

Incidantur & contendantur omnia græſſo modo: deinde bulliant omnia cum vini & lixivii barytonicæ

bironforis æquis partibus, addito paucio aceto, ad consumptionem tertie partis: deinde colentur. Tandem

Accipe farinæ fabarum

Lupinorum

Lentium

Hordci an. ꝑij.

Misce, fiat cum præscripto decocto cataplasma, addendo in fine pulveris cinnamomi opt. ꝑ. β. croci ꝑ. β.

Joannes de Vigo præscripto emplastro oleum rosaceum, chamomelinom & spicæ addit: Verum oleosa & pingula, quia potius obstruunt, & perspirationem impediunt, non sine maxima necessitate, quemadmodum antea quoque monui, in Gangræna usurpanda sunt.

Sin affluxus nullus, nihil defensivo opus, nisi putrefactio plurimum progressa fuerit, paræque sphaecelo sit proxima: tum enim defensivo cohibendi vapores putridi, quo minus ad partes principes pervadant. Applicato defensivo, quavis ratione desiccanda est humorum copia ingens, loco affecto inclusa, exhalandusque calor extraneus, qui putrefactionis fuit in causa. Itaque scarificatis locis omnibus suspectis, sive aliis, sive superficiei, prout maxime magis minusve altas radices egerit, fovenda est & lavanda calidè pars affecta decoctione sequente.

R. Lixivi baritonforis ꝑ. viij.

Calcis vivæ, ꝑi.

Coquantur parim.

In colatura iterum coque Lupin. M. j.

Scordii utriusque

Abinthii

Rutæ

Salis marini an. M. β.

Tandem coquantur ad consumptionem tertie partis. Colaturæ fortiter expressæ admisce

Aquæ vitæ

Aceti scillitici an. ꝑij.

Aloës

Myrrhæ an. ꝑij.

Postea ubique applicandum Ægyptiacum nostrum antea descriptum, aut etiam ruptorium, si sit necesse echinam profunditatem excitare, ac tandem induenda pars sequenti cataplasmate:

R. Farinæ lupinorum &

Lolii an. ꝑij.

Sammitum abinth.

Scordii utriusque

Rutæ an. M. j.

Radie. vincetoxici

Angelicæ an. ꝑij.

Omnia in pulverem redigantur, levitetque cum lixivio jam præscripto coquantur: deinde eum per se stricet, admisce

Aloës

Myrrhæ an. ꝑ. β.

Aquæ vitæ ꝑij.

Misce, fiat cataplasma.

Pars sic curata calida est in lecto continenda; in idque plurimum laudo fragmenta lapidis molanis calefacta, & parti circumposita. In enim lapis præterquam quod calidum linteum terocet, exsiccet quoque & resolvit plurimum. Chirurgus dum cataplasma detrahet, consuevit scalpelli acie, aut separatoriis, ad calorem hujus capitis adumbratis, echinam anguento Ægyptiaco, vel ruptoriis, aut quovis alio modo inductam, separare, deinde abluet deoib partem antè dicto fori, adhibebitque Ægyptiacum & cataplasma, ut antè: nec aliter se geret, do-

nec fuit malum animadvertere. Tandem necesse separare echinam pharmacis ante commemoratis: continuando iterum cataplasma, quod putrefactioni repugnet. Quod si Ægyptiacum, aut ruptoria non iatis valeant contra vim putredinis; adhibendus erit cauter actualis, qui mihi in hoc Gangræne genere probatur, propterea quod egregiè desiccet, resolvit & roborat partem affectam, ejusque calor agens penetrat aliis quovis remedio.

In Gangræna ex interperie sicca, nimirum ex atrophia, & penuria alimentis, quavis ratione humectandum est corpus, cum commodo victu, tum his, quæ sequuntur. Igitur est necesse dietam ægri & ætati, in quâ moratur, tendere ad calorem & humiditatem: debet ergo cibis uti, sanguinem & alimentum plurimum elementibus, concoctu facilibus, & jurebus collatis, & restaurantibus, aliisque bonis jusculis, à vervecina, gallinaceis, pullis & capris: hordæo item mundato bene cocto, dein colato, muliebri quoque lacte, vel si desit, asinino. Lac autem summo mane recens emulsum cum paucio saccharo & sale bibendum est, & quidam juno stomacho. Necesse quoque est, ut æger per horas ad minimum tres post sumptum lac, neque bibat, neque comedat quicquam. Dum utitur lacte, ab omnibus acidis veluti aceto, succo citræ, autaniorum, & similibus abstinere ægee, ne lac in stomacho coaguletur, putrescatque. Cubiculum meridiem spectet: in summa, humectandum est corpus, vitæ quæ exsiccant, quæ sunt vehementer purgantia, sudorifica, & diuretica omnia.

Externicus inungendum corpus oleo amygdalarum dulcium, filiotum alborum & violarum: ut hoc modo comprimantur pori, & innata caliditas intus conservetur. Partes, quæ sunt supra affectam partem, puta totam tibiam, ad femur usque, si pes æger sit, inungenda sunt succo lumbicorum terrestrium, ad eum modum parato, qui ad finem hujus capitis describetur. Succus ille longè optimus est, quia calefacit & humefacit, aperitque simul & semel valorem obstructions, ut eò libetius sanguis & pituitus à corde & epate ad locum laborantem perneare possint.

Quod ad partem affectam, videndum est, num interperies sicca, veluti causa futuræ Gangræne, solummodo addit: an verò Gangræna ipsa jam invaserit? Si nihil aliud præter interperiem hecane adfuerit, quavis ratione humectanda est pars affecta, & alliciendum alimentum in partem ægram. Quare fovenda quæ tepido interstino, capitis & pedum vervecis; quod si manipulum unum aut alterum lumbicorum terrestrium aquâ lotorum, & incisorum admiscueris, majorem efficaciam habebit decoctum. Postquam per quadrantem horæ pars affecta, prædicto decocto ita fota fuerit, cucurbitulæ nonnullæ applicandæ sunt, chira tamen scarificationem. Interim autem si dum adherent, rigendus est locus linteo duplicato, aut spongiâ, filio luto in jure antè dicto; his continuatis, usque dum lincus incipiat rubescere, illi cō demoræ sunt cucurbitulæ, simulque linteæ calentiæ, ne resolvatur & eracretur, quod attractum foret: dein inungenda pars sequenti unguento.

R. Ol. amygdalarum amararum

Ol. tynapi ana ꝑij.

Succi lumbicorum terrestr. ꝑij.

Misce, & applicetur tepidè. Deinde sequens emplastrum applicandum est.

R. Picis liquide ꝑvj.

Farinæ lolii,

Lupinorum quantum satis erit ad inspissandum.

Si





Fig. 7




Fig. 8



Si Gangræna jam invaluerit, & putredinem concipiat locus, duplex aut triplex sumenda erit indicatio, prout erit morborum & symptomatum complicatio. Enim verò, quia totius morbi causa est atrophica, alimentum quavis ratione attrahendum est, fistulionibus mediocribus (asperæ enim proxius desiccant, & evacuant, quod attractum est) vel lintheis calidis, vel manu innuncta oleis suprâ memorata, cucurbitulis, &c. Quia etiam jam adest putredo, hæc evacuanda est; sive testificationibus, sive hircudinibus, & Egyptiaco applicato: deinde applicandum cataplasma lequens, putredini obstitens simul & nonnulli attrahens.

R. Farinæ lupinorum,
Lolii ana ℥iij.
Summit. absinth.
Scordii utrinque
Folior. rutz au. M. j.
Rad. vincetoxicæ
Angelicæ ana 3ß.

Misce, fiatque omnium pulvis, cui admisce plcis liquidæ, quantum sufficit ad figendum emplastrum.

Cauterem actualum hic ex *Albicastro* doctrina improbamus. Cùm enim maxima adsit extenuatio & siccitas, ac cauter mitum in modum desiccet, non video, quomodo prodesse possit, nisi quando ad amputationem membrum deveniendum est: tunc enim cautello carere non possumus, ut postea dicemus. Cùm autem subito inducenda est cicatrix, applicanda erunt ruptoria vel novacula resicandam est, quicquid corruptum est: deindeque appendendum Egyptiacum, & procurandus cicatrix cæus, velut ante monuimus.

Hæc Gangræna species planè abhorret à defensivis, liquidem defensiva additioe sua prohibent spiritus & alimentum à parte affecta: in disperata tamen Gangræna, que in Sphacelum degeneravit, ubi nulla amplius spes est, ut membrum conservari possit, etiam locum habent defensiva, in eum finem, ut vapores putredinis atceantur à partibus principibus. Amputato verò membro, non amplius conveniunt, nisi de novo symptoma aliquod, quod ea requirit, substatut.

Anrequam autem pars amputetur, necesse habet Chirurgus ventura pericula prævidere, &que parâ commemoretur apud ægri amicos, & adstantes omnes. Nam etsi amputetur aliud pars affecta, in ipsa quoque carne viva, tamen malum, ut plurimum truncum letum invadit æque occupat. Cujus rei lector exemplum habet Observation. 89. Centuriæ 3. Item Observ. 92. Centuriæ 4. de fene quodam *Jacobo Alvarado* nomine. Atque ut paucis dicam, Gangræna omnis ex siccitate, ut plurimum lethalis est, ut ante dictum undecimo capite. Idque revera mitum nemini videri debet. morbi enim ex siccitate & humili primigeni abscondione, insanabiles sunt, quod & ipsum *Hippocrates* testatur, cùm dicit, convulsionem ex helieboto lethalem esse. Indicat enim, humidum radicale à pharmaco absorbptum esse: At longum tempus exigunt, ut *Galenus* docet, ad siccitatem nervorum removendam, morbi autem acerbissimus tempus non expectat: quin citò vires dissolvit, & subito exitum addert: Quæ omnia ad hanc speciem Gangræne optimè adaptari possunt.

Sedatâ Gangrænâ, mundificandum & incarnandum est ulcus, mundificativo nostro, de succo apii iussu cap. 18. describendo, aut melle rosato, addito pauxillo aquæ viæ, & theriacæ, idque citra pinguedinem ullam. Tandem incarnandum & cicatrice obducendum sequenti pulvere.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

R. Radicum tridid flor.
Aristoloch. rotund.
Angelicæ ana 3j.
Foliorum scordii 3ß.
Olibani
Malthicæ ana 3j.
Lapidis Bezoardici.
Croci ana 3j.
Cornei cervi ussi & præp. 3j.

Misce, fiat pulvis tenuissimus, qui ulcers inspicit gerat. Si ad cicatricem inducendam majore exsiccatione opus fuerit, addatur parum tutiæ, cerussæ, lithargyri auri, aluminis ussi, lapidis calaminaris, & cornei cervi ussi, & præparati.

Succus lumbricorum terrestrum, suprâ memoratus, variè componitur. Johannes Wierus in trallat. de Scorbute, lumbricos usurpat comestitionum pinguisimos, quos aquâ primùm, deinde vino appellatè loros, minurim incidit, & phialæ indit, pastâ obvolvunt, hanc furno inficit cum alio pane, hocque cocto phialam simul extrahit pastâ obvolvunt, ac ubi refrigit, mergit in aqua, hincque mollescente pastâ, ac phialam desiccante, lumbrici resoluti in liquorem sese offundunt: percolatus liquor reservatur ad usum, sed alterno quoque die renovandus est; elid enim corruptitur, præcipuè æstatis tempore. *Nicolas de Meris* eodem modo liquorem illum præparat, nisi quod nonnulli olei olivæ vermicibus affundit. *Caspar Stenar* illustrit. Juliacensium, Clivensum, & Montensium, &c. Principis Archichirurgus, usus hoc succum ad atrophiam, & extenuationes particulares, aut ad Gangrænam ex sicca intemperie, sumebat eisdem lumbricos, coque, ut *supra* mandamus, collocabat in magno recipiente: deinde sat copiosum oleum amygdalarum dulcium & violarum affundebat demum i per cineres calentes resolvebat in liquorem, quo post succum expressionem colato, utebatur.

Hæc autem mihi longè præstantissima compositio videtur, in siccitate particulari: quoniam hoc modo integrè servatur utraq; facultas, & olei & lumbricorum. Succus lumbricorum propriè & peculiaritè vi penetrat illud, permeatque ad nervos; & nervosa omnia, ipsaque adeo venas & arterias, quatum tunica nervosa constant substantiâ, & eas quidem partes succus ille roborat, alit & calcificat mediocriter, tollendo, quæ in his sunt, obstructions. Inest præterea compositiõni hujus qualitas viscosa ab oleis, cujus ratione statim atque succus penetravit, oleum poros claudat & obstruat, atque ita cohibetur innatus calidum, & intra partem affectam veluti concluditur.

Vid. Tab. vi. fig. 1. & 2. ubi reperitur

Delineatio cutellorum & humulorum ad separandas escharas.

Cap. 14. Curatio secunda speciei Gangræne, ex alteratione videlicet vehementi, per qualitatem occultam.

Capite 5. diximus, esse Gangræne speciem, quæ quidem ortum non ducit ex causis manifestis, inemperie videlicet calida, frigida, humida aut sicca; verum ex qualitate & malignitate occultâ, nostrisque mentibus impervestigabili, unde sequitur, non esse insinuandam curationem solis pharmacia operantibus per qualitates manifestas, sed illis etiam,

etiam, quæ occultis agunt qualitatibus, sive ocre foveantur, sive fossi adhibeantur. In his autem cœclant Theriaca, Mithridatica, Bezoardica lapideis, dictamini Cretensis, scordium, radices vincetoxici, angelicæ, & succus citrionum. In hac autem Gangræna summa vigilantia opus est, quia plurimum lethalis: quippe si libet appetit, lædique partes principes. Quomobrem Chirurgus aggrediens ad curandam id genus Gangrænam, nec plenè compertam habens, ut sibi à calamita præcaveat, faciatque, quæ decent, suæ eruditioni diffidens, consulari præstantissimum aliquem Medicum, aliosve doctos, in arte Chirurgica plurimum exercitatos.

Ubi autem Chirurgus ea signis lisis, cap. 8. enumeratis, cognoverit, Gangrænam ex qualitate occulta nram, si libet infundat ægro, si stipata est alvus, elyptem lenitivum, aut suppositoria subdat, sacula eorum operatione, sequentem porum propinet.

R. Radic. angelicæ
Vincetoxici ana ʒiij.
Scordii utriusque,
Rutæ,
Dictamni Cretici ana p. ʒ.

Coquantur in l. q. aquæ buglossæ, & cardui benedicti, us colatura redeat ad uncias duas, in quibus dissolve

Theriace opt. ʒ.

Succi citri ʒss.

Misce, has potiuncula, detur calidè.

Pro portis & delicatulis, qui prædictam potiorem propter saporis injucunditatem bibere non possunt, præparetur sequens:

R. Lapidis Bezoardici gr. vj.
Cornu cervi usi & præp. ʒ. ʒss.
Syrupi de succo citrionum ʒss.

Cum aqua cardui benedicti, fiat potiuncula.

Poterit & aliquid confectionis Alkermes, & aquæ cinnamomi admisceri, hunc in modum:

R. Lapid. Bezoard. gr. vj.
Cornu cervi usi & præp. ʒj.
Margaritarum præp. ʒss.
Confect. Alkermes ʒj.
Aque cinnamomi ʒss.

Cum aqua cardui benedicti, aut decocto suo, pro potu ordinario, cujus descriptio mox sequetur, fiat potio.

Æger sumpto potu tegatur aliquantisper, dum promoveatur sudor, ut hoc modo materia maligna à partibus principibus arceatur. Fortis etiam applicetur cordi episthema, quale capite 12. descripsimus: Itegentur item præscriptæ poriones auctâ imminutâ ingredientium dosi pro ægri ætate & habitudine. Quamvis autem ad singulos hauftus non procedat sudor, minimè tamen in utilis esse desinet. Quippe hujus ope materia maligna, si qua fuerit corpori ingemita, foras ad extrema detrusit procul à corde, & cæteris primariis partibus: Sin verò extrinsecus propter mordum, aut idem bestiarum venenatarum adveniat, corroborat etiam ac tuetur partes primarias, dum ab illis malignitatem arceat. Hic vehementes purgationes minimè conveniunt, ut nec phlebotomia, aut somnus diuturnior, ne forte retrahatur venenum ad partes primarias.

Quod ad victus rationem spectat, vitet æger cuncta difficilia, salina, & piperata, aut alioqui acris: sorbeat cremorem hordei titæ cocti, aut juscula vervecina; pullis gallinaceis vescatur, aut caponibus, in coctâ copiosa botragine & acetosâ. Loco vini bibat psillanum, in qua acetosa, pruna, aut tamarindi coeli sint, aut sequens decoctum,

R. Herbarum agrimonie M. ʒ.

Veronica M. ʒ.

Raluzæ cornu cervi crudi ʒiij.

Coquantur in ʒb. aq., donec quarta pars sit assumpta: aromatizetur cinnamomo & saccharo.

Utatur frequenter succo citri, tum in psillana, tum etiam in jurulentis. Hujus succi loco potest etiam usurpari syrupus ex eodem succo, item ex succo acetosæ, granatorum acetosorum, & berberotum.

Quod ad topica, Chirurgus summo studio debet extrahere & evacuare materiam malignam: Itaque scarificabit profundius, quæcumque videtur obrepere Gangræna, & quantum satis sit sanguinis effluere sinet: vel adhibebit hirudines, vel cucurbitulas: prætereaque abluit partem decoctione sequenti.

R. Radicum angelicæ

Vincetoxici,

Lupinorum ana ʒj.

Herb. Scordii utriusque,

Abinthii,

Dictamni Cretensis,

Rutæ ana M. ʒ.

Coquantur in lixivio barbitonforia ad consumptionem tertie partis, in ʒb. colaturæ dissolve

theriacæ ʒss.

Succi citri ʒj.

Hæ decoctione calidè diligenter ablotis scarificationum vestigiis, & unguento Ægyptiaco nostro, præcedenti capite descripto, applicetur cataplasma sequens calidissimum.

ʒ. farinæ lupinorum,

fermenti acris.

alliorum sub prunis coctorum ana ʒj.

Pulv. foliorum rutæ.

scordii, dictamni Cretensis,

Rad. angelicæ,

vincetoxici ana ʒss.

theriacæ optimæ

mithridatici ana ʒj.

Cum decocto scordii, fiat emplastrum in mortario.

Exinde pergens Chirurgus in ægri curatione, auferat cicharam, si adhuc, deinde scarificet denud partem affectam, ad eundem sanguinem & applicet cucurbitas, ac hirudines: locum abluat, & applicet Ægyptiacum cum cataplasmate, & in illis perseveret, donec malum superatum fuerit.

Tandem nitatis cicharam removere succo, pororum, vel (quod magis placet) novæculâ, aut culicellis delineatis. Exin ulcus aëri apertum teneat, quod materia maligna continud effluere possit. Ex intervallis quoque ægro præbeatur theriaca, Mithridatica, terra sigillata, cornu cervi nst. & præp. cornu monocerotis, Bezoas, confect. Alkermes, aqua cinnamomi, aliæque, quæ partes nobiles corroborant, & à venenatis vaporibus defendunt.

Cum verò Gangræna oriunda est ex materia extra corpus genita, velut à morbo venenato, aut septicis adhibitis, unde periculum, ne malignitas comminuetur partibus principibus, necesse est cæteris actualis ope utere & absumere subitò, quicquid ejus malignitatis est participes: aut etiam, (quod magis præbatur) abscidi potest novæculâ aut culicellis separatis, quicquid suspectum est: Ex eum sanguis pro vitium tolerantia effluxerit, adhibendum est Causticum actuali. Demum ablucendum erit olcus decocto supra scripto: tandemque unguentum Ægyptiacum nostrum, & cataplasma

& cataplasma præscriptum applicandum. Forti quoque defensivo atendi sunt vapores maligni à partibus principibus. Sin verò Gangræna orta fuerit ex materia maligna, corpori ingentia, quæ ad partes externas fecerit, defensivo, aut quibusvis adstringentibus nullus est locus.

Sedatâ Gangrænâ, superest ut mundificetur, & incarnetur ulcus mundificatio nostro de hieco apti, aut melle rosato, mixto cum pauxillo aque vitæ & thetiacæ. Deinde incarnetur pulvere iacoso, ad finem præcedentis capitis descripto, & cicatrice obducatur.

Cap. 15. *Cursus tertia & ultima speciei Gangrænae, ex spirituum interceptione.*

IN hujus Gangrænae curatione, præscripta universalius, nempe dieta, sive nro lex rerum non naturalium, ut & phlebotomia, purgationibus, & cæteris, pro morbi ratione, & ægri viribus, diligenter inquirenda erit causa, ob quam spiritus retentus à parte affecta, eoque si fieri possit, statim tollenda itaque si æctior sit ligatura, laxanda est: deinde adhibenda pharmaca resolventia, escicantia, & incidentia quicquid ligaturâ illâ attractum est. Tale est cataplasma sequens:

R. Farinæ lupulorum,
Fabaſum,
Lentium ana ʒij.
Pulv. Summitat. abinth.
Scordii,
Flor. Chamomillæ ana ʒss.

Cum oymelle, aut syrupo de succo acetosæ, fiat cataplasma.

Si inalecat nihilominus ægritudo, statim scitificandus locus, & apponenda hircidines, Egyptiacum nostrum, aliæque remedia, ut dictum est, cap. 13. in curatione Gangrænae ex intemperie calidâ & humidâ.

Si in causa sit defensivum adstringens, antemplastrica adhibita, hæc pariter potius auferenda sunt: deinde frictionibus moderatis & calidis revocandum innatum calidum, aut locus fovendus forti lixivio, cui incoquantur lupini, leotidum, & solum rutæ cum pauxillo aceti, sub finem addito, ut hoc modo tutum aperiantur pori, & detergatur abemplastrico medicamento inducâ viscositas.

Si sint tumorea scitethosi, circa majores arterias, venas, & cætera vasa, quæ spiritus ipsos attecant & inhibeant, emollientur illi hoc vel simili unguento:

R. Ping. Gallinæ,
Anatis,
Uti ana ʒj
Ol. Liliorum albotum ʒß.
Succi Lumbicorum ʒij. Misce.

Deinde applicetur emplastrum ex mucilaginis, aut ex ammoniaco dissoluto in aceto. At si tumor in quapiam parte sit, in quâ tunc possit operatio perfici, præterit incidere cutem, deinde separate tumorem, & sique ad ipsius radicem, quâ ligatâ filo ieduplicato, abscidendus est tumor, ut expeditior spiritibus sit via. Hic autem diligenter cavendum, ne attingantur, aut transverſum fecerit vasa; id enim aut subitam mortem, aut Gangrænam insinabilem adferre possit. Verum ut hujusmodi operationes tutius exequi possit Chirurgus, summopere necesse est, ut in Anatomia eruditus sit. Anatomia enim, ut *Galenus* scriptum reliquit, nos docet accuratissime propriætatem essentia uniuscujusque partis. Quapropter Chir.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

tutius, qui hujus scientiæ penitus ignarus fuerit, non nisi summo cum periculo hujusmodi operationes admittitæ poterit, ut ex sequentibus historiis videbit licet. Anno 1596. unâ cum Clarissimo Viro Dn. Doct. *Jano Antonio Saraceno* puellam strumâ laborantem vidi. Strumam verò hanc cum alpeze arteriæ, nervis recurrentibus, & venis jugularibus hærentem cognovissim, manum adhibere nolui, etiam si mater summopere id à me efflagitaret. Non diu post, temerarius operator, cum advocatus esset, & strumam excipere vellet, pocula in ipsa operatione animam, mater verò, quia hanc unicam prolem tantummodò habebat, in longum tempus lachiymas, & quidem copiosè effudit.

Illoſtri cuidam Germano, cum temerarius Empiricus, & rerum anatomicarum planè ignarus, tumorem scitethosum: ex interna parte femoris excidete vellet, & novaculam nimis audacit, nimisque aliè infudit, tumoque istum venæ cavæ, quæ ad poplitem descendit, abscidit, in ipsa operatione, propter ingentem hæmorrhagiam, & penuriam cauterii igniti, ab hac lue subactus fuit, ut in 3. Cent. Observat. 82. fusiùs declarat.

Sin Gangræna ex retentione, & obstructione spirituum animalium fuerit, ut in paralyâ & spasmo accidit, spina dorsi, veluti origo nervorum, simul cum ipsa, parte affecta, sequenti linimento inungantur:

R. Succi Lumbicorum ʒijj.
Ol. Collini ʒj.
Ol. Terebinth.
Ol. Cerae &
de lactibus ana ʒss. Misce.

Ante inunctionem autem origo nervorum, simul & pars affecta decocto florum chamomillæ, salviæ & betonicæ, primulæ veris, lavendulæ, baccarum juniperi, & simillum vino coctorum calidè fovenda est.

Quod si Gangræna accidat coecygi, aut clunibus, æger decubens modò in sinistram lacus, ad levandam partem affectam. Est & in tali Gangrænâ, sive ex alia quapiam causa, pes ita locandus, & ad lacum reclinandus, ut ne talis offendatur.

Si sit paralyſis in vesica, & gutturis stiller Jo-Juven, id diligenter excipiendum est: comparatum in id vasculum, à nobis excogitatum & hic addumbratum. (vid. Tab. vi. fig. 3.) Nam si ribis simul & semel cum vesica fuerint resoluti, ita ut æger in lecto decumbere cogatur, inaleſcere lotium, tandemque exulcerabit coecygem, quæ deinde proclivis est in Gangrænam, ut capius accidisse memini.

Tab. vi. fig. 3. Demum

Vasculum ex stanno aut argento fabricatum, id urinam involuntariè effluentem excipiendam, aptissimum. Hujus autem hæc est explicatio.

A.A. Capacitas hujus vasculi est, quæ tanta esse debet, ut libram circiter continet: Posterior pars autem D. notatâ obtusa est, paulatimque in acutum desinit, quod melius inesse clunæ intradi & limbus ille C. notatus, parumque elevata peritænam immediatè attingere; & urina per foramen ipsum B. notatum in vasculum infillare possit.

D. Manubrium est, cujus beneficio vasculum intraditur in clunæ; iterumque pro necessitate extrahitur.

In vitis hæc est, si membrum vitæ in foramen B. notatum ptenderit. In feminis verò, ut limbus C. notatus peritænam attingat necesse est.

Ceterum si casus Gangræne sit luxurio, ea restituenda est, & os in suo loco fasciis & Emphyseis sive pulvillis ex stupis, aut lineis reduplicatis factis, continendum. In locum suum reposita osse adstringentia parèe adhibenda sunt, ac porius inungenda pars affecta succo lumbicorum terrestrium, cui tantillum olei rosati, aut myrrillorum pro corroboracione partis & dolore leniendo addi poterit. Si autem pars infus laxationem sit pericula, macilentia & extenuata, ea fricanda, & cætera necessaria peragenda, quæ cap. 13. dum de Gangræna ex interperie sicca curatione egimus, commemorata sunt. Conveniunt quoque scarificationes; vehementer enim attrahant, ut *Galenus* testatur. Prius verò fovenda est pars jure tepido intestinorum, capitis, & pedum vervocis, quemadmodum cap. 13. diximus. Ante scarificationem tamen perpendendum est totumne corpus siccum atque extenuatum sit, an verò pars affecta tantum. Si totum corpus extenuatum fuerit, frustra erunt scarificationes, sin succulentum utilissimæ.

Cap. 16. Sphaceli curatio.

SI quantumvis sedulam Chirurgi vigilantiam & adhibita remedia natura morbo succumbens, ita eludat, ut definit Gangræna in Sphacelum, sive mortificationem perfectam, tunc non erit amplius sumenda indicatio à causis antecedentibus, aut pro illarum ratione & varietate mutanda remedia. Sive enim Gangræna orta fuerit ex interperie calida, sive frigida, humida, aut sicca, Sphacelus semper est idem, nempe extinctio caloris nativi, destructio humidi innati, ac proinde mortificatio ejus partis, quam occupat.

Cum igitur Sphacelus (ut sæpius dictum) sit perfecta mortificatio substantiæ parvi affectæ, ut loquitur *Galenus*, quæ quidem partes vicinas sensum inhiat, & corruptæ, fieri nequit, ut ei, quod plene mortuum est, vira restitatur. Unica igitur hæc erit curandi Sphaceli ratio, nimirum ut pars singera & sana conservetur. Id autem sit primò applicandis defensivis, quæ impediunt, ne mortificatio altius ferpat, partesque sanas occupet; Secundo exstirpato eo omni, quod corruptum est: Ergò paulo supra, aut circa partem jam emortuam applicandum erit defensivum, quale super cap. 13. præcipsimus. Et quantumvis nonnunquam nulla derus spes conservandi partem sanam (sæpiissime enim Sphacelus adeò vehemens est, ut nullo remedio quantumvis ex arte præscripto, & adhibito cedat) nihilominus tamen defensiva sedulo sunt applicanda; ut hoc modo vapores ex putredine exhalantes arceantur à partibus principibus, veluti à corde, cerebro & hepate.

Ceterum, corrupti exstirpacio vasilis sit modis. Nonnulli scarificationi altius facit inter sanam partem, & mortuam, inspergunt pulverem ex arsenico, vel unguentum *Ægyptiacum* induunt, arsenico fortificatum. At nos jam antea docuimus arsenicum in medicamentis sepius censeri, atque dira & periculosa inferre symptomata, ac penidne alienum esse ab hujus morbi curatione.

Loco arsenici mirè placent ruptoria facta ex cinere sarmentorum & calce virâ: quippe illic, & ferè sine dolore profundam, gignunt, elcharam, & cum nulla qualitate maligna sint prædita, nequaquam partes principes, veluti cns, cerebrum, & hepar lædunt, ut facit arsenicum.

Ruptoria autem prope carnem sanam applicanda sunt, nec opus est, prius scarificare carnem; per se enim facta valida sunt, & altè penetrant. Elchara

verò facta, non est ejus casus expectandus naturæ, aut medicamentorum ope; sed removenda, separandaque est novacula, aliove instrumento idoneo. Tandem, si videat Chirurgus carnem mortuam nondum penitus exstirpatam, denudè applicabit, ut antè, ruptoria, etque reiterabit, quoad quicquid est putre, à sana separatam sit.

Alter modus exstirpandi, quod corpeum est, cauterio actuali perficitur, dum uritur, quicquid infectum, & corruptum est, removetur elchara novacula vel pharmanis. veluti succo porronum, alisque antè cap. 13. propositis.

Tertio modo telecamus primò una eademque vice novacula quicquid corruptum & mortuum est; idque quàm proximè accedens ad sanam & sinceram carnem; deinde cautere actuali vulnus inuimus, tum sistendi sanguinis gratiâ, tum etiam siccandarum, & absumentiarum reliquiarum sanguinis & humorum corruptorum in parte affecta: postmodum aggrediemur, ad removendam, ut antè elcharam.

Veruntamen si insit parti vas aliquod veluti arteria, aut vena, operatio tantò erit periculosa, quantò hæc grandiores fuerint. Itaque si meus est hæmorrhagiæ, præstabit cautere potentiâ & actuali operationem exicquâ, quàm novacula (præcipue si æger exsanguis & imbecillus fuerit) quamvis hæc ratio tutior, & securior est, tum quia, dum amputatur caro emortua, fit simul & semel sanguinis, & corruptorum humorum evacuatio; unde pars nonnisi plurimum levati potest, tum quia, dum primò secatur portio carnis corruptæ, cautere actualis altius penetrat, adque exsiccat potentiùs corruptionis reliquias: contra verò si telinquatur caro mortua, cautere subito gignet elcharam durissimam, sub qua proterdo manebit conclusa, cita perspirationem ullam: itaque res erit loco, quàm antè, peior.

Hæ operationes possunt iuxta, cum Sphacelus inest parti corporis, quam non sit necesse, esse possibile totam exstirpare, vel bi gratiâ seniori, & iunioribus, & cæteris id genus partibus. At si sit in manu, pede, brachio, riba, totumque membrum occupet, id unum tellat extremam nimirum remedium, hoc est, ut non solum pars carnosæ, sed ipsum os, totumque membrum exstirpetur. Verum antequam declaremus operationis modum, videamus, quo loco curiâ, & commodiùs ea possit institui.

Cap. 17. De Amputationis loco.

Distinctis de loco, in quo amputatio facienda est, consideranda occurrunt partiæ affectæ differentia. Quare si Sphacelus sit in pede, aut tibia, operatio faciendâ est quatuor quinqueque digitis infra genum, nempe sub poplite. Est enim Chirurgus tenetur, quantum potest, corpus quàm integerrimum conservare, amputatio tamen nullo alio in loco, quàm prope genum, nri diximus, fieri debet. Sic enim æger commodiùs utetur lignæ tibiâ, firmiusque incedet, alioquin reliquius tibiæ ruosus impedit, & ita quidem, ut nonnulli, quemadmodum tellatur *Paras*, iterum subire periculum, reliquamque partem trunci ad popitem sibi amputandam curate coadi fuerint. At si Sphacelus genu superaret, quàm minimam sincerè refecandum, quoad ejus fieri poterit. Primò, quia operatio tantò periculosa, quantò truncus corporis est proximior, propter valorem, venarum scilicet, & arteriarum amplitudinem. Secundò, quia lignæ tibiâ difficultatè adaptari potest, si crura supra genum abscissum fuerint. Idem de manu judicium: in qua operatio commodè fiet ad carpi articulationem, ut tantum è brachio conservetur, quantum commodè alligandæ & aptandæ manui ferreæ sufficiat.

Ceterum

Laceratum monitus velim Chirurgos rationales fideles, ne in abscisione minorem & digitorum eos (nisi maxima urgente necessitate ut postea cap. 19. fuissis dicam) sequantur, qui membrum in scannum collocant, & appollo scalpelo, aut secuti, lēu malice canem & oīs simul & semel maximā cum vehementia, maximoque cum impetu abscindunt. Est enim operatio nimis violenta & crudelis, ac proutde rationali Chirurgo indigna: acria verō planē exitiōla, propter maximā, quā ipsam sequuntur, symptomata. Non solum enim hac operatione partes nervosæ, & musculosæ supra modum contunduntur, & commoventur, verum etiam ossa ipsa ad proximam articulationem usque, ut plerumque funduntur: hinc etiam ossa nullum habent sensum, ratione tamen periossi dolores gravissimi, inquietudines, vigilie, inflammationes, convulsiones aliq̃ue pessima symptomata sequuntur, imò & nonnunquam Gangræna de novo suboritur, ægræque periculis. Sin verò huiusmodi symptomata omnia non supervenerint, ulcus tamen, & non nisi maxima cum difficultate ad cicatricem perducitur, idque propter maximam contractionem, & comminutionem ossium, quæ hinc & inde per partes musculosæ remanent, & ad tempus periossiō adhaerent, tandem verō paulatim beneficio naturæ rejiciuntur, neque expelluntur, cujus rei exemplum memorabile hic in gratiam tyronum inferere non gravabor.

Anno 1578. juveni quidam p̃p̃ Novissimā, in Episcopatu Coloniensi, cum crepitū bombardæ sinistra pericula fuisset, Magistro N. Clout, barbironi Novissensi, se curandum commisit. Is (ad imitationem Leonhardi Botalli,) in scannum collocatā manu, securim, quā rursus fūdunt ligas, parci, ubi abscindenda erat manus, apposuit. Deinde quendam cordam hominē ex adstantibus jussit, ut ponderoso quodam malleo ligneo, quo rursus ad findenda lignamenta, vortum securis fortissimo ictu petens, ut quod quidem ita ad totum successit, ut nunc primo ictu abscissa fuerit. Ab initio gravissimi quidem dolores, vigilie, aliq̃ue supra commemorata symptomata supervenerunt: post longum tempus tamen, & longos dolores evasit, corporeque convalescit. Ulcus verò difficiliter ad cicatricem perducitur, propter ossiculorum fracturam & comminutionem abundantiam, quæ mensuralis fēt molesta, novaq̃ue symptomata ægro paraverunt.

Ex his manifestum sit, quā ineptus, quimque periculosus sit modus abscidendi membra, quem Johanne Schenckius observationum medicinalium lib. 5. mihi pag. 791. ex Leonhardo Botallo lib. de vulneribus sclopetorum proponit, his verbis: Ceterum inquit, major cura est adhibenda in magnis membris amputandis, quā si digitus tantum sit: nam hic facile demittitur: collocatur aut super banco, fixo, aut exiguo pulvillo ex gossipio submisso, mox illi acies gladii, vel scalpelli plani ac laxi optime acuminati, quasi ad perpendicularem aptatur, & inicit cum ligneo malleo adigit, ut unico ictu opus petatur.

Pro magnis verō membris alius est modus erogiratus: nempe cultri duo lati, quorum unus intra duas columnas lineas clipo infusus est, alium sursum producens, alter verō intra eadem columnas superiorem loco ponitur, qui ad amissum descendat, ut aciem acie fricat. Hic autem quo minus labatur, sulco in utraque columna factō recipitur, ut quasi filuca intum deorsumque libere ferri possit, non aliter citroque: & quō suo solo descensu ac pondere totum membrum detrahet, clipo vel plumbo onctandū est, quantum satis esse videbitur, vel ipse quoque cedendus est ingenti & gravi malleo ligneo, ut unica

abscisione absolvatur opus: sed melius est si instar huiusmodi cadit. Modus autem hic, eo qui fētā efficiatur, multo tutior est, facillior & celerior, imò etiam ferre citra dolorem: adeo ut Regius Chirurgus Magister Jac. cognomine, Vir in arte suā cū doctrinā, cum experientiā exercitissimus, fatetur, siā op̃a vivere nonnullis, simili instrumentum eum: mulieros, qui putabant ex lychnio ignis scintillam super pedem incidisse, cum detraherent membrum esse quod non evenit, nisi actionis ejusdem instrumenti celeritate, quæ quantum commodum ferat, solummodo prudens artifex novit, & qui in tali calamitatem incidit. Nam præter id, quod dolor exiguus & momentaneus est, ex arbitrio etiam artificis illius arteria & vena occluduntur: quod non pauci est momenti, imò quidem ex his, qui à cæcis membris intereunt, plures ob effusum sanguinem occidunt, quā ob aliam causam. Nam interea dum fētā illa secantur (præter id quod & plerumque multas nervosas partes à novacula relictas hæc miser læcet) respuat sanguinem & spiritus fundunt scēte venæ & arteriæ, quare non possunt non vehementer hoc loco fētā viuperare, & adverso cultros laudare ac commendare. Sed qui vel animi prestantia, vel stupore, vel artis imperitiā non facili ad infusa transeunt, statim opponunt ossium contactum, vel carnosæ partis confusionem, vel operis crudelitatem. At hæc nulla profus est, si cum ea, quæ sciam consequitur, conteratur: & controbia nulla sit, si culti acies, potius licet, fuerit adductæ: nullius etiam momenti est ossium contractio, cum facili fragmenta hoc loco aure deducantur, vel à natura rejiciantur. Cū igitur negotium ipsum obsequium est, cuncta cuncta habenda sunt parib; apponenda ad axillam, vel inguen repellenda, aut obstruenda, oculi avertendi, & membrum, prout didicimus, est ligandum, postea sic inter utramque est collocandum, ut (si intra cubitum vel genu scēpi sit) ambo oīa æqualiter inferiori aciei insistant, non autem unum alteri superstitat, (non idem obstruendum est, si supra genu vel cubitum secare oporteat, quod unicum tantum os sit) deinde rependat a sano frigidum, mox ad cuncta deveniendum est, quibus arteriæ & venæ cohibentur: incepto opere ab arteriis: nam sanguinis aliquid colline utile est: deinde protinus trans-cissa inducenda, perinde atque alibi jussu est: inde vincula solvenda, & totum alius cum adjacentibus partibus obtegendum medicamentis confecto ex rosaceo, ovo, & bolo armeno, quod tepidum applicetur: ulsupetur hoc bidaum. Hæc Botallus, quæ quidem, mihi candide lectæ, non adhibito, ut modum ac methodum illam approbem, quin potius ut tyrones, quibus methodus illa facili esse videbitur, admoneam, ut diligenter sibi ab ea caveant. Cautari, ut multis verbis exponam, supervacaneum esse existimo: Unicum enim illud exemplum, superius commemoratum, & de javene, cui Magister Clout, Barbironis Novissensis, manum abscidit, tibi sufficit. Ego operationi non interfui: etiam enim tunc temporis adhuc juvenis, quæ verō recentis, ex viris fide dignis habeo, patrum quoque propriis oculis vidi; ægrumque cū in istis miferis esset, cognovi. Nunc iterum ad institutum nostrum.

Alii membrum, imprimis verō digitus tenacillā incisoris, & ad id apertā abscindere tentant. Quæ quidem operatio abique maxima confusione, & laceratione nervosorum parvum, ossimque comminutione, ac periculo ægri fieri non potest: Huiusmodi enim tenaculis ferrum, similisque materia dura, potius & facillius, quā nervus, aut nervosum quid abscindi potest: quod diligens Chirurgus etiam

eiam in brutis expectari facile poterit. In extrahione fortis mortui, aliquando ut brachii in ipso humero abscindantur, necesse est, sicut praedicti. Ab initio itaque cum operationem illam administrarem, & abscissionem novacula, non nisi summo cum periculo fieri posse penderem, ad tenaculum incisionem confugi, eaque parvo cum negotio abscissionem brachii perficere me posse sperabam: Verum fecellit me opinio, alique instrumenta ad operationem illam assequendum excogitare coactus fui. Quid plura cum contula vulnera, ut experientia docet, reliquis semper sine periculosa, suadeo, ut Chirurgus ab huiusmodi operationibus inceptis atque periculosis, ne dicam crudelibus, abstineat. Quomodo autem membra sint abscindenda, posthac declarabimus.

Potro docere nonnulli ex neotericis, & quidem magni nominis Medici, partem resecari in ipsa carne mortua, ac corrupta etiam nonnulli relinqui, ad vitandam hæmorrhagiam, dolorem, & convulsionem: ac nihilominus censent, quicquid putredinis reliquum est, absumendum cautio actuali. *Andreas Vesalius* Institutionum Chirurgicarum lib. 5. c. 14. eadem habet verba. Quam opinio nem opinionem falso *Vesalius* adscriptam fuisse, vel solus ipse stylus testis est. Non enim *Vesalius* illo in loco loquitur, sed alias, magni tamen nominis Medici, ex quo *Dn. Prosperum Bergaratum* qui Chirurgiam *Vesalii*, ipso defuncto, in lucem edidit, locum illum de verbo ad verbum transcripsisse, vix unâ voculâ immutatâ, facile animadvertet, qui verba unius atque alterius auctoritis inter se conferet velit.

Opinionem autem hanc ex *Joanne Vigone* doctissimam fuisse, verisimile mihi videtur: libro enim 4. cap. ult. jubet, ut de carne putrida atque corrupta, propter causas antea recitatas, nonnulli relinquantur. Verum locum istum incitâ amantissimi, aut forsan ipsius typographi depravatum esse neque hanc fuisse mentem *Vigonis*, scripsit ipsius luculentè ostendunt. Sic enim scribit lib. 2. cap. 17. de curâ Gangræ, a *schachelles* & *effluens*. *Ultimè*, inquit, loco, si ipse corruptio transire videtur ad effluens dispositionem qua (ut superius diximus) corruptis membris, in quo talis reperitur indifferens, in tantum, quod ossa etiam dicuntur visari; Tunc statim pro ejus curatione succurrendum est, sequens bene incidendum: Deinde os ferri secundum est, &c. Ubi dictiones totam partem corruptam notande sunt: nullam enim in se continet exceptionem. In compendio verò suo l. 2. c. de curatione Gangræ mihi pag. 851. Etiam ipsi *Vigone* aliter sentite videatur, cum membrum corruptum in carne mortua, & putrefacta amputandum esse refert: atramen quia eodem capite, uti & capite 13. l. 2. doctrinam suam authoritatè *Celsi* probat, atque stabilite nititur, cetum est, ipsum cum *Celso* consentire; Alioqui in quem, quæso, finem ipsius authoritatem protulisset; At *Celsus* potius de parte sana aliquid excindendum quàm de ægra & corrupta quicquam relinquendum esse, postea addit. Hinc ita argumentari potest. *Celsus* post *Galenum* membrum Sphacelatum inter eam sanam & corruptam abscindendum esse docet; Ita tamen, ut potius de carne sana non nihil excindatur, quàm de corrupta quicquam relinquantur.

Vigone opinionem suam, de abscissione membri Sphacelati, authoritatè *Celsi* duobus in locis confirmat.

Vigone itaque cum *Celso* consentit, ac membrum potius in parte sana, quàm in carne mortua amputandum esse, sequitur. Hæc propterea adscribo, ut aliquis celeberrimum, atque de Chirurgia opi-

me meritum vinum *Dn. D. Vigone* hujus controversæ primum fuisse auctorem agnoscet.

Quod ad *Galen*i doctrinam attinet, ea videtur pugnare cum *Celso*. & complurim antiquorum, & recentiorum usurpata præd: sic enim scribit: Etiam cum ita membrum affligitur ut moriatur, ut nec purulentum, nec scissum, nec etiam ulnium sentiat, statim ipsum rescindere oportet, quia vicinam sanam partem attingit. Verum intelligendum est, *Galenum* ipse dixisse, quod præcipuum est potius, hoc est, ad radicem mali, quàm quæ ex eo consequuntur. Quia etiam putredo semper altior est in ima parte, cum calidior & humidior, ut postea fusius dicam, noluit *Galenus* inchoari amputationem extrinsecus à maiori radice, ita ut relinqueret præcipua radix & putredo in ima parte nihilum inter musculos, & vascula; Ibi enim vera perforationis radix, non item fortis in cute, ut igitur tollatur radix illa, necesse est, fieri aliquid resecari, idque extrinsecus, quemadmodum *Celsus* & alii docent.

Est præterea modus loquendi passim à *Galeno* aliis quoque in locis usurpatus. Sic enim scribit, de arte curativa ad *Glaucum* lib. 12. c. 10. ubi de excisione canceri ait: At sepius, inquit, in hæmorrhoidibus curatione est, utrum, qui circumscissus, tumorem præter naturam, qui partibus sanis adheret, abscindere quibus verbis *Galenus* tumorem prope carnem sanam excindendum esse docet. Alii verò, nihilum Methodo *Melendi* lib. 14. hæc habet verba. *Ubi vero quod vitium est, præsertim exciderit, sic ut nulla superius radix, sines effluere sinquantur.* &c. Et libro de atra bile: Omnes, inquit, ulcerationes ab atra bile, sunt insanabiles, nisi quæ sanationem appetit, ut afflicta pars ita circumquaque ad partem sanam abscindatur. Hinc manifestum est, *Galenum* cum *Celso* consentire; Ac proinde membrum potius in parte sana, quàm demortua abscindendum esse. Atque hanc fuisse opinionem atque mentem *Galen*i, *Avicenna* discretè testatur. Cum enim causationem Gangræ & Sphaceli ex *Galeno* operi suo inferuit, hæc habet verba. *Proinde*, inquit, partem mortificatam celerrimè rescindere oportet, quatenus contingat vicinam sanam, ita, ut nihil præsertim puridæ ac corruptæ relinquantur. *Barberramus Maggius* mentem *Galen*i & *Pauli*, in excisione non totius membri, sed partis aliquæ corruptæ, intelligendam esse, testatur, & membrum Sphacelatum in parte sana amputandum esse, docet.

Sed redeamus nunc unde digressi fuimus, & videmus, an operatio illa, quæ fit in carne mortua & putrida, secundum tria illa præcepta *Galen*i, quæ lib. 4. cap. 13. meth. med. prætulit, fieri possit: ubi operationes ead, iud & iurandi, hoc est, absque dolore fieri debere præcipi.

Extirpationem membri, quæ fit in carne mortua, citò fieri non posse, ut demonstrat, illud *Galen*i, Sphacelum scilicet corruptionem esse substantiæ partis, quam ipse occupat, ita, ut etiam ossa ipsa labem sentiant, iterum in memoriam revocandum est. Inde enim apparet, quicquid putridum est, absumendum esse; At non video, quomodo extirpatio illa citò fieri possit, si toties iteranda erit operatio. Ad carnem enim putridam ad os usque incidendam: deinde eandem ad vivam carnem usque cauteriis multis ignis absumendum, & os ferri abscindendum, profectò tempus longum requiritur. Et quia huiusmodi operatio etiam in carne mortua fit, dolorosa, ut postea demonstrabo, ac insectis æget

ingend

ingeno horrore perstringatur, dejectior vites, si longa fuerit operatio. Abscissio verò quæ sit in carne viva, præcipue si Chirurgus diligens, & manu promptus fuerit, ferè, ut ita dicam, momentanea est, uno enim ictu caro ad os usque inciditur. Quid si Chirurgus ad carnem incidendam cautelo cunctatus, ut postea dicam, vel voluerit, vasa quoque summi constringit, & hæmorrhagiam impedit. Sin novacula carnem absciderit, faciliè tamen, & parvo temporis spacio, vasa ante ligabit, aut canterio actuali claudet. Hac non ex conjectura scribo, sed expectus loquor. Citò itaq; abscissionembei, quæ sit in carne costropra, fieri non potest.

Nunc an mediè fieri possit, videndum est, ubi verba proxima ex Galeno allegata, iterum sunt perpendenda. Si enim Sphacelus partem, quam occupat, ita corumpit, ut etiam ossa ipsa labem sentiant, non solum extrinsecus cutem conspiciari, sed quousque pervadit malum attendere, ut tota pars afflicta extirpetur: alioquin futura est inuisilis operatio: nempe quia corruptio ossi impressis de nobis inficit partem sanam. Advertendum præterea, quod calidiores & humidiores sunt partes, eo facilius eas putrescere. Est autem cæcum, musculos & vasa in sinu sua parsbus, multo calidiora & humidiora illis, quàm sit cutis externa, ac proinde putredini & corruptioni magis obnoxia. Hinc sequitur, corruptio nem & putredinem altiores esse seipsum in ossa parte, quàm foris in summa cute apparet. Itaq; si juxta id, quod apparet, operationem tam administraveris, frustra ægrum cruciabis, dum capitis emotus plurimum in ossa parte resingens: Quammodum ex sequentibus historis manifestum sit. Anno 1586. cum præstantissimo illo Chirurgo, Dn. Joh. Griffone Geneva in Sabaudiam ad vitam quendam juvenem roñsum Gangræna in ribia laborantem, p. oculos ful. Gangræna ad poplitem usque ascendit. Ut igitur genu conservare possimus, tibiam ad ipsam radicem mali abscidimus: deinde truncum diligenter, quoad fieri poterit, ferro candenti decurimus, ut si quid forsitan telum esset putredinis, illi canterio ablueremus. Verùm sinistra languens æger excruciatu fuit. Abscissâ enim tibiam sub genu, ubi vasa magna descendunt, & propè os Gangræna jam multo altius, quàm in cute apparebat, ascendit. Aliud & quidem recens exemplum satis memorabile addam. Juvenis quidam duodecim annorum ætate, Coppel ad Lacum Lemannum, cum ex Dynteria citatua esset, Gangræna in dextro pede exorta est, quæ in Sphacelum degenerata, rorem crus invasit. Naturæ autem beneficio per se in ipso genu subfudit, ibiq; in fortissimum ulcra degeneravit, ligamenta crotis, ipsamq; juncturam disjunctis. Ego cum ultima die Januarii Anno 1614. accessurus essem, crus supra genu, & quidem in ipsa carne viva ad duos digitos in latitudine positis abscidi. Alterâ die cum emmenat denudassem, os ante carnem protuberantem, & musculos versus coram retractos & longè altius, quàm extra in cute apparuerat, ab ipso osse sepeparata esse reperi. Sphacelus enim etiam misro beneficio naturæ in ipso genu, ut dixi, subfuderit: putredinem tamen ulceris longè altius in cæno partis affectæ, hoc est, citum circa os sepepisse, ipsumque os carne contaminasse, postea manifestè apparuit, quemadmodum in Centuria quartâ Observationum mearum finis dixi. Simile videmus in poma & pyris, in quibus nonnunquam extra in cortice macula solummodo nigra conspiciunt, cum tamen intra ad nucleum usque, aut etiam ulterius, putrida cariosaque sint:

Nunc, quid de hæmorrhagia censendum, & ubi illa tantopere in amputatione membri formidanda sit, in eligendum est. Ubi constituto ægri perperenda est. Age enim si supra modum debilis, atq; extenuatus fuerit, quemadmodum juvenis ille Coppel, cuius jamjam mentionem feci, sanguis, quoad fieri poterat, conservandus est. Conservatur autem, si caro ad os, canterio actuali, & in formam culti fabricatio, abscindatur, de vasa canterio obstrata fuerint. Hæmorrhagiam quoque impedit, si arctissime constringas lorum, quod superligatur parti, cui færa adigenda est: Sic enim venatum & arteriarum vasa ita constringuntur, ut vix itea quatuorve sanguinis uncie in amputandâ tibi perant, modò Chirurgus indolentissimè se gessit. Tamen etiam paulò plus percat, non est existimandum, suspensè omnem prodire, sed partem etiam ex ipsa parte amputata manare, quæ quidem quicquid combinebatur sanguinis effundit. Sin verò æger juvenis, robustus, & plethoricus fuerit, tantum ubet, ut hæmorrhagia sit evitanda, quin potius ex præstantissimorum hædiorum atq; Chirurgorum sententia, operatione facta, sanguinis quantitas aliqua sinenda effluere; neq; abiq; re. Enimverò sanguis putredini, siue carni innoxie contiguus, cum jam quodammodo corruptionem conceperit, nonnihil nocere potest, quàm diu in parte moratur: imò nullo sufficiens evacuator fuerit, paulo post operationem diebus, Gangræna rursus truncum invadit, aut saltem inflammatio phlegmone, aut dolor, & cætera gravia symptoma impervient; & quodpropter nonnulli sanguis ut effluat, necesse est, habita tamen ratione virum.

Potest, an operatio in carne mortua facta, jucundè, hoc est abiq; dolore, ut illi existimant, fieri possit, nunc quoque perquirendum est: Exaltatio doloris in amputatione membri Sphacelati, ratione nervorum; membranarum, & petiolii. Quid si itaque volueris operationem abiq; dolore fieri, hæ parat ut planè sit corruptæ & enotius, necesse est. At verò nervi & nervosæ partes propter suam firmitatem, multo tardius carne contumpanit: ubi ite cum apparet, aut multum relinq; eodem esse carnis putredis, aut operationem dolorosam fieri, etiam in carne mortua fiat. Septissimè enim, etiam curis, & tato sint enotius, nulloq; sensu prædix, interim tamen nervi majores, & periosissimi sensu nondum destituti sunt. Quapropter cum os færa resecandum venturum acutissimè percipiantur dolores, non quidem obis ratione, quod insensibile est, sed ipsius petiolii, quod acutissimo sensu præditum. Ut igitur operatio feret extra dolorem, necesse foret totam partem ita corruptam esse, ut illi etiam membræ corruptio communicaretur. Id, si ita se habet, annon, quæso, & ipsum os tali imbure esset corruptione, & ossi adherens idem corruptum, puris & enotius multo profundius, quàm extimam cutem spectant videtur? cum caro illa ossi vicina proclivis sit ad corruptionem, quæ quæ cute proxima, sicut ante quæq; motu moti. Si autem inuisilis foret operatio, cum telis qua corruptio nunquam possit carere corrigi.

Isti autem, dum vitæ dolorem vitant, eundem doleo videtur augere. Ubi enim ratham emortuæ carnis abscindendum est, quantum reliqui volunt, vix satisfaciunt duo, velve cauteris, imò etiam quinque, fæve cum ardentissimo igne delibebantur, usq; dum, inquam; eos percipiat æger & alioquin leticus labor. Cæterum summo canteriorum ardore liquantur adeps, ac telisq; hamotes, hnd & effluunt, atque ita urunt, & immodicè esciscunt partes sentientes, quales sunt nervi, tendines, & ipsa musculi, unde acutissimus dolor, inflammationo, vigiliæ, febris;

fibris, convulsiones, alique gravissima sympto-
mata. Hinc *Avicenna* monet *Cameracianum*, inquit,
qui cauterio debet, ut fortitudo convectionis ipsius
ad nervos perveniat, neque ad chordas, neque ad li-
gamenta, quid si propter sanguinem, qui fuit, caute-
ricaverit, spertabit, ut convectionis sit fortis, adeo
ut crusta grossius habeat, & spissitudinem, & cito
cadat, &c. Altecum præterea, ex fortissima illa
cauterizatione fit incommodum, nimirum quod ef-
ficata illa sive crusta densissima & densa maligno-
rum & putridorum vaporum exhalationem inhiibent,
unde fit verisimile, eas ad partes principes fieri. Ne-
que sic possunt omnia cauterio extirpari, quin reman-
eat aliquantum nova quasi corruptionis fetoremque,
dum efficta putrescit. Præterea carne mortua sic
absumpta, cutemque cauterium vi contrahit, magna
ossa eminentia relinquunt, ac fortè talis, quæ se-
pe opus denud efflagitet. At si perperam inciden-
da pars in carne mortua, quid fiet in pedis Spha-
celo? nunquid magna ribiæ porio tibi relinquenda
erit, aut expectandum, dum corruptum aut putre-
do altius pervaserit? Hoc autem ægro erit pericu-
losissimum, illud eidem molestum, ac laboriosum.
Sed & arcta ligatura Chirurgi usitata spiritum ani-
malem impedit, quo minus viget in parte affe-
cta, adeo, ut veluti obstupescat, proptereaque
novacula optimâ sectio prius absolvetur, quam ipsam
vix animaverit. Non potest itaque fieri operatio
in carne mortua cito, multo vero minus imò &
jaceat, hoc est, absque dolore. Præterea cum
an Medica sit nobilis, subiectum verò Medicinæ no-
bilissimum, æquum est operationes cum ornatu &
splendore quodam fieri. At verò in operatione
istâ, quæ fit in carne mortua, ubi primò caro &
os inciduntur, deinde cauteria ignita rotas iteran-
tur, ut non solum domos, verum etiam plecta,
tetro isto odore impleantur, quemadmodum *Felle-*
piscus de quodam scibit, & ægri in longum tem-
pus mirum in modum tormentis lacerantur, nullum
ornatum, nullumque splendorem video. Operatio
verò, quæ fit in carne viva, veluti momentanea,
seculissimaque est, sique sine magno dolore.

Sed videmus nunc, quid de convulsione censen-
dum sit, anque illâ factâ amputatione in parte vi-
va, potius metuenda, quam si in parte corrupta
fuerit. Convulsionem fieri aut à reptatione, aut ab
inanitate, *Hippocrates* & *Galenus* docent. Neo-
terici etiam multas statuunt causas, omnes ad præ-
dictas illas duas ab *Hippocrate* traditas, referri pos-
sunt. Verum in amputatione aliquis membrum, si
convulsio supervenerit, illa erit vel propter im-
modicam hæmorrhagiam, aut inguenem do orem, vel
denique ex materia aliqua maligna, ex parte affe-
cta ad cerebrum ascendente. Si ex nimia hæmo-
rhagia fuerit, periculosi erit, testante *Hippocrate*: Et
enim ex facilitate: quapropter Chirurgus, ut san-
guis confervetur, diligens esse debet, præci-
pue in delatollis, aut quovis modo extrinsecis
corporibus. In robustioribus & plethoricis verò,
ut aliquid sanguinis post amputationem membri ef-
fluat, necesse esse, antea demonstravimus.

Impedit autem Chiratus hæmorrhagiam, si lo-
co novacula cautè callestati, ac bene ignito utar-
tur, diligens, & manu promptus fuerit. Anno 1600.
Pueriachi brachium ad humerum, præfente reveren-
do Viro Dn. *Job. Aterna*, verbis divini ministro,
& Dn. *Petro Fræderich*, ibidem Oecologo, abscidi-
dit in qua operatione vix uncie duæ sanguinis ema-
nant. Anno 1614. Coppet similiter tibiam in
ipso femore abscidi, ubi similiter vix uncias tres
sanguinis amissimus. Erant autem hi supra modum

extenuati & debiles, alioquin non solum tanopere
esse soll'citus, etiam si aliquid sanguinis post opera-
tionem efflueret.

Ratione doloris supervenit convulsio, cum nihil
sit, ut testatur *Galenus*, quod magis profusivum ex-
citet, sanguinemque attrahat, quam ipse dolor:
hinc inflammatus, & convulsio sequuntur, quæ qui-
dem, ut *Hippocrates* docet, lethalis. Non quid-
am tanquam ex immensitate, ut addit *Galenus* in com-
ment. sed tanquam edo crebro. At operationem
illam in carne viva factam, fere abique dolore
fieri, ante demonstratum est: est enim dolor ille,
ut ita dicam, momentaneus, respectu doloris,
qui fit, si in carne mortua abscissio facta fuerit.
Adde quoque post operationem dolorem illum, me-
dicamentis medicèriter refrigerantibus, & repellenti-
bus, facile leniri posse. Nervi enim in ipso mo-
mento, quo absciduntur, sursum retrahuntur, &
à carne reguntur: facta verò abscissione in parte
mortua, etiam si nervi verus originem tetrahantur,
propter cauteriorum tamen numerum, & ignis vio-
lentiam liquantur, & effervescant humores in ipsâ
parte affecta, & circa nervos, nervosque partes, ac præ-
inde maximos dolores interant, quemadmodum antea
quoque demonstravi.

A maligna vapore fieri convulsionem, sciunt præ-
dicti. Interdum, inquit *Job. de Vega*, putrefactus ner-
vi, ex qua putrefactione materia venenosa elevatur in
furan, & per nervos rapitur ad cerebrum: qua-
molestum necessè est cerebrum, sentiens nocivum venenosi
venenosi materia, qua causat inflammationem cerebri,
compressio nervorum, ad expellendum nocivum venenosi
Hactenus *Vigo*. Ceterum in parte viva abscisso
membro, quomodo quæso superveniet convulsio ex
malignis vaporibus, ad cerebrum elevatis & cum
quicquid putridi est, abscissum sit. Contà in par-
te mortua factâ amputatione, remanet tamen pars
aliqua putredinis circa nervos, imò & in ipsi venis
& arteriis: quæ etiam si à cauterio exciderint ex
parte; non tamen omnino absumitur, sed calu-
is ignis effervescit acutiorque efficitur. Post dies ha-
que aliquot affluens humoribus, magis magis
que incalcescit pars affecta, & quæ efficta illa ipsa
est, ne cessat materia illa acris, & putrida, obest
malignitatem acquirit, ex qua postea maligna &
pestiferus vapor ad partes nobiles ascendit per ner-
vos ad cerebrum, ubi nonne convulsiones, nunc vi-
gillias, inquietudines & delirium procreat; per ar-
terias ascendendo ad cor, spiritus vitales inficit,
& liporhymias, viriumque prostrationes excitat. Per
venas verò majores ad hepati si pervenerit maligna
illa quæstas, massas sanguineas inficit, intem-
peratque caillam cordi, torique corpori inducta.
Hinc videmus, convulsionem potius supervenire pos-
se, si membrum in parte pusilla abscindatur, quàm
si in carne viva facta fuerit operatio. Ego multa
abscissi membra, eaque omnia in carne viva;
nunquam tamen (Deo opt. max. fit laus atque glori-
a) convulsionem ægri meo supervenisse, Deus
testis est.

Est itaque amputatio illa, quæ fit in parte vi-
va, seculissima, certa ac veta, nec novâ & *Gale-*
ni & *Celsi* approbata. Hujus quoque opinionis fuisse
Avicennam, hæc ipsius verba solum faciunt, *Qui*
autem, inquit, *confirmatur corruptio in carne, tunc ne-*
cessarium est, accipere tunc ipsam. Alium similiter
cum *Celsi* consentire, & mentem *Galenus* explicare,
ante demonstratum est. *Althæsi* verò de hac con-
troverfia sic scriptum reliquit. *Si ergo*, inquit, *cor-*
rumpo, aut percussio est in extremitate digiti, tunc in-
vide digitum, & non des spiritum corruptum, ut
perveniat

perueniantque ad reliquum membrum. Et similiter si acciderit in manum, tunc incide eam ex radice, nihil de corrupta parte relinquens, &c. Hujus quoque sententia fuisse Theodoricum, Bartholæum, Guilielmum de Saliceto, Guidonem de Cauliacis, & neotericos testatur omnes, ipsorum scripta luculenter fidei faciunt. Sic enim Theodoricus, de Sphacelo loquens, scribit: Unde mox, ut sanari eueniret, ferro secari debet usque ad vitium, & usque ad locum sanum, ita ut nihil de mortua carne remaneat, &c. & eodem cap. Si necesse fuerit amputari, aut secari aliquod membrum corporis, usque ad loca sana abscindas, ita ut nihil carnis putrida derelinquas, sed magis de vna, aut sana carne aliquam auferas: sic enim melius & citius curabitur. Bartholæus & Guilielmus de Saliceto eadem habent verba. Uti & Rulandus lib. 3. c. 31. de canceris & fistulis, & alii pusillis in genitalibus consurgentibus. Theodoricus lib. 3. c. 10. Bartholæus de Apoplexiis c. 7. Guilielmus de Saliceto, c. 53. Guido de Cauliacio c. 6. doct. 1. c. 8. Galienus H. Reys. in Chirurgia sua magna, parte sexta. Felix Platerus, tract. 2. c. 17. de curacione doloris superficialis corporis. Angelus Bologninus lib. de cura ulcerum c. 16. Bartholæus. Magnus lib. de vulneribus Sceloporum cap. de mortui Sphacelo effectibus & curacioni eorundem. Joannes Gouernius Andernacus de Medicina veteri & noua cognoscenda commentarij 1. dialog. 8. Paulus Offredus in quadam Epistola ad me scripta, & Cent. 4. lib. meorum inscripta qua sic incipit. Non sine voluptate tuas perlegi, &c. Antonius Bisenensis comment. in Galeni librum de iniqua interperet. Antonius Chalmetus Enchiridion Chirurgiæ lib. 1. cap. 4. S. Ambrosius Parvus lib. 12. cap. 29. Josephus Quercetanus lib. de Sceloporo. vulneribus. c. 5. Petrus Francus lib. de Herniis c. 91. & 103. Joannes Jesenius à Jossen Insulin. Chirurgiæ. c. 21. Joannes Andreas à Cruce l. 1. tract. 3. c. 18. Stephanus Gormelienus l. 2. cap. de Eccepe. Joannes Tagantius Insulin. Chirurgiæ. lib. 1. cap. 10. Laurentius Joubertus l. de Sceloporo. vulneribus. nihil pag. 113. Leonhardus Bualtus de vulneribus Scelopori. cap. 22. Petrus Piery lib. 1. cap. 9. Jacobus Guillelmus lib. 10. cap. 4. Sebastianus Franciscus Ranchbous Tract. de morbis subcutaneis c. 29. Cornilij Insulin. Chirurgiæ. lib. 1. c. 3. Joannes Embertus à Chotiehorzen Bohemus Preli. Therapeut. deoed. 3. quest. 10. Rodericus à Castro Lusitani de Medico Politico l. 3. cap. 18. Jean Fagienus Chirurgiæ des ulcères chap. 52. Claude Darius in versione Gallica Chirurgia Paracelsi lib. 1. tract. 3. c. 12. Petrus (von der Salte, im andern Theil seines Handbuchs der Mundarthen im ersten) tractat. cap. 4. (wie auch im ersten Theil) quest. 23.

Concludemus itaque ex prædictorum Medicorum, atque Chirurgo sententia, operationem administrandam esse in parte sana: cum satis sit syncretum aliquid resecare, quam emortuum quippiam relinquere. Necque quicquam interesse, ait Cellus, an sanus erit, qui remediis, quod unicum est. Et cum motus sit extremus, quis non fateatur adhibendum extremum remedium? Denique si tunc operetur, fellicorem spectabis eventum, quam si secus feceris. Nullo vero modo tuta operatio est, quæ fit in carne mortua, quoniam mali radix relinquitur. Quid plura?

Nulla prius remanet sed immediate vulnus esse residendum est, ne pars sincera trahatur.

Quod spectat ad eam questionem, quæ proponitur: Liceat ne membra Sphacelo affecta in ipsa articulatione amputare, nec ne? Scio quosdam, & quidem magni nominis Medicos esse, qui illam mi-

nime admittunt. Primum, inquit, propterea, quod vulnera articulationis periculosa, imò & mortalia esse solent, propter gravissima quæ ea sequuntur symptomata, cum sint partes nervosæ, ac prout exquisitissimo sensu præditæ. Deinde, quia ossa circa articulos lata ac magna, caro verò exigua, ac calor natus imbecillis, difficulter iterum ad cicatricem perducì possunt. Ego verò cum Guidone, & Laurentio, Jouberto, & aliis sentio, membrum in ipsa articulatione minori cum difficultate, & circa peticulum amputari posse; idque sapientissime expertus sum. Minore cum difficultate sit amputatio in ipsa articulatione: quia non icta novacula optime cadente, præcipue si promptus manu fuerit Chirurgus, fieri potest: nec opus est ferrà, aut quouis alio instrumento; quapropter dolor non uique adeo magnus: nonquam enim tam præciè amputes & seipares nervorum & membranarum porciones, quin aliquatenus ferrà in eas incidat, easque diuellat à com vehementissimo agri cruciatu. Circa peticulum verò, quia nervi & tendines penitus abscidit, scilicet contrahuntur, & colque caro operit, unde nec ipsam, nec alius symptomaticis metus est. Deinde, quia junctura carne distinet, ac venæ magis conspicuæ, facilius sanguis supprimitur. De cicatrice inducenda nulla est difficultas, satis enim circa articulos est carnis, & calor natus ad cicatricem inducendam satis vegetus est. At hic rursus pro partis affecte differentia administranda operatio. Nam si malum sit in pede, aut tibia, incilio facienda circa popliteum, ut eo commodius aperitur agro ligata tibia. Sin Sphacelus popliteum superaret, in ipsa genu articulatione incilio facienda veniet. Quod si malum totum digitum occupaverit, ad metacarpum in ipsa articulatione abscindendum est. Hunc operationem eam alia, tum præcipue Anno 1587. Disfeldorpi in Viro robusto triginta circiter annorum ætatis, Rugero Pijore, ex voto successisse observavi. Hunc enim cum bombarda dissilendo sinistræ mirum in modum lacerasset, Dr. Cosmus Stenetus Chirurgus præstantissimus, præsertim Viro Clarissimo atque Doctissimo Dr. Galeno Wiero Illustriss. Principis Julicæ, Cliv. & Mont. Doctore Medico, aliisque Viris doctis, manum in ipso carpo feliciter abscidit. Nullum supervenit symptoma molestum, & brevi sanitate restitutus fuit.

Cap. 18. Quomodo corpus ante operationem sit præparandum?

Exploratis ac satis designato loco amputationis membri corrupti, statim ad operationem pervenendum esset. Vetum unum obstat, preparatio nimirum corporis ægri. Id enim, rursi probè, & ut decet, ad operationem præparatum fuerit, non video, quomodo operatio ad votum succedere possit. Pravi enim humores, quibus corpus oneratum, ratione doloris ad locum affectum, velut ad cloriam conflunt, ac gravissima symptomata excitant. Videmus id quotidie in praxi Empiricorum, atque impetorum hominum, qui (cum lucrum proprium potius, quam salutem ægrotum querunt, & vix inter ligna lapidesq. ac corpus humanum distinctionem faciunt) tot ægros ad summam miseriam redeunt.

In præparatione autem corporis, iterum indicatio ab essentia & magnitudine morbi sumenda est. Si enim morbus peracutus fuerit, & corrupto partes sanas celeriter invaserit, non datur inducia, ut corpus ante operationem, prout necessitas postulat, expurgetur: ab eo enim, quod magis urget, semper inchoandum

inchoandum est. Clystere itaque exoneratâ alvo, jufculo & ovo forbili, nec non hauſtu vini, exhibitis, & epithemate regioni cordis & carpis applicato, proinus membrum amputandum eſt. Poſt operationem verò corpus clementer purgandum eſt: non tamen ſecundo, aut tertio die, ne propter motum & agitationem corporis, & præcipuè internorum viſcerum, hæmorrhagia de novo exciteretur. Interim tamen alvus enematis, aut ſuppoſitoria lubrica retinenda eſt. Sin morbus miſior, præſtat ante operationem illud præparare, hoc eſt victus rationem præſcribere, pravos humores educere, vires reſcitare, cor partemque nobiles corroborare, reliquique, quæ neceſſaria ſunt, ex arte adminiſtrare.

In victus ratione à viribus ſumenda eſt indicatio; Si enim æger juvenis, robuſtus, & plethoricus, morbus verò acutus fuerit, victus ratio tenuis indiſtincta eſt, juxta illud Hippocratis: *Ubi morbus præcævus eſt, ſuam extremam habet labores & extremam tenuiſſimam quædam eſt.* Corpus aliquoties à prævis humoribus manâ, caſſia, rhubarbato, electuario lenitivo, diacatholico, de ſucco roſarum, ſyrupo roſato ſolutivo, compoſito cum rhubarbo, agatico & ſenna, & ſimilibus expurgandum. Si plethora maxima adſuerit, diminuendus eſt ſanguis, ne factâ operatione intempeſtè ad locum affectum ſuar: circumſpectè tamen hæc in re agendum eſt. Niſi enim magna fuerit plethora, miſſio ſanguinis ante operationem locum non habet, ſed deperditio illa ſanguinis, quæ in ipſa operatione ſequitur, ſufficit. In Gangræna ex qualitate aliqua occulta, vel ubi putredo jam majora vaſa occupaverit, phlebotomia quoque minime convenit, putredo enim ad partes traheretur. In ſis ſanguis, ut poſt amputationem membri, ſi vires adſuerint, effluat, ſummo perè neceſſe eſt.

Si verò æger ſenex, aut ratione morbi imbecillus fuerit, cibus boni fuſci, cujuſmodi ſunt juſcula carniſum recentium, veluti caponum, gallinarum & ſimilium, antè & poſt operationem reſciendus eſt, ut ante ſuo loco diximus. In his purgationes fortes minime conveniunt, corpus nihilominus medicamento aliquo lenitivo, niſi vehementia morbi obſuerit, ante operationem expurgandum eſt: Id ſi fieri nequeat, alvus clyſtere lubrica addenda eſt. In his venæ ſectio quoque minime convenit.

Omnibus autem, quibus membrum aliquod amputandum eſt, per dies aliquot (ſi mature advocatus fuerit Chirurgus) ante operationem, ut epithemata regioni cordis & corporis quotidie ter quæſiſſe applicentur tepidè, neceſſe eſt. Quotidie bis terve nonnihil de frequenti cardiaco exhibendum eſt.

R. Lapidis Bræzardici

Oſſ. de corde cervi præp. an. gr.vj.

Corno cervi præp. ℥ij.

Margaritæ. præp. ℥ij.

Conſect. Alkermes ℥j.ſ.

Aque cinnamomi ℥j.

Bugloſæ &

Calendulæ an. ℥j.ſ.

Syr. de ſucco citrænoni ℥j.

Miſce.

Fiat potiunculæ, de qua detur bis aut ter in die ad ℥j. plus aut minus, ad libitum Medici.

Ea die, qua operatio fieri debet, paulò ante operationem jocolum, item ovum recens & forbile, nec non hauſtus vini offerendus eſt. Tandem de meſſicis & amicis convocatis, & flexis genibus, & ad cælum elevatis corvibus, Deus pro felici ſucceſſu

operationis (quod & in aliis magnis operationibus ſoleo facere) ſuppliciter invocandus eſt. Deinde iterum factâ prognoliſtatione de periculo, & an amici & parentes omnes ad operationem conſentiant, poſtquam perquiſitum ac iterato epithemate, operatio eâ, quâ fieri poteſt, dexteritate exquenda eſt.

Cæterum in exhibitione cibi & potus, diligenter proſpiciendum eſt, primò, ut cibus, qui ante operationem exhibetur, concoctus ſit facilis à deinde, ut paucus ſit, & per horam unam, aut alteram ad minimum ante operationem offeratur, idque in eum finem, ut tempore operatiſſis ventriculus ſit vacuus: Ventriculo enim cibi onerato, vomitus vehemens (qui partes omnes, cum internis tum externas concurrit) lyncopen, viriumque proſtrationem excitat, & hæmorrhagiam adauget. Vntientius enim oneratus, hepatis ſimul & venam cavam comprimit, languinemque exprimit. Cujus rei exemplum Anno 1609. 31. Maii, Paterniaci mihi obſervare contigit. Fæminæ enim cuidam *Tonææ* nomine, quadraginta circiter annorum ætatis, cum propter vicus inveteratum & incurabile, tibiam ad popliteum feliciter amputaſſem; interim dum ego in ſiſtendo ſanguine, & deligando truncum occupatus eram, in tantum animi deliquium incide, ut adſtantes mecum nihil aliud, quam ipſam mortem obliſſe putarent. Sanguis quoque, etiamſi carnem cauterio cuticellari & maxime ignito abſciſiſſem, adeò copioſè effluere cepit, ut niſi alia cauteria in promptu habuiſſem, de ipſa ædum fuiſſet. Redditi hæmorrhagiâ, faſciſculo iovoſulo trunco, ne ægrâ velati mortui in grabatum poſiti, ſequenter potiunculam, quæ in promptu erat, exhibui.

R. Conſect. Alkermes ℥ij.

Aq. cinnamomi deſtillatæ ſine vino ℥j.

Aq. calendulæ

Bugloſæ an. ℥j.ſ.

Miſce.

Potiuncula hæc quamprimum ad ventriculum perveniſſet, vomitus adeò copioſè ſecutus eſt, ut pelvim cibo indigeſto, quem me abſente atque ſolito devoraverat, adimplect. Ventriculo ſani onerato, cum iterum non nihil de præſcripta potiuncula ſumpſiſſet, vires recolligit, & ad hunc annum 1616. quo hæc ſcripſi, vivit, optimeque valet.

Præterea, quæ in & poſt operationem neceſſaria eſſe poſſent (ne aliquid deſit in operatione) ante præparanda ſunt. Primò prædicti potiuncula ex conſectione Alkermes, & aquæ deſtillatis, ut in triplo aut quadruplo in promptu ſit, neceſſe eſt; Sæpe item due, ſed ejusdem ſpiciſſitudinis, ut ſi forſan in ipſa operatione una frangeretur, alia ad manus eſſet, & commodè in tranſitu prioris ferre interromitti poſſet. Ne forſan acideſcat tibi, quod negligenti cuidam tonſori Neocomi Helvetiorum acideſciſſe memini. Illi enim, cum tibiam ad popliteum amputaret, in ipſa operatione rompitur ſectæ: ita ut ad Arcularium M. Pierre ſans ſin nomine, alioquin Roſcium in ſua arte, excurrere, & aliam reſpetere neceſſum habuerit. Accurrit Arcularius ipſe, & exprobando Barbiconſori negligendum, ipſemet ſectionem oſſis abſolvit, ægumque ex tanta hæmorrhagiâ languidum & penè exanimem feliciter liberat. Hæc non ſolùm ex ingenioſiſſimo Arculario, amico meo ſingulari, verum etiam ex ore aliorum vitorum ſide digniſſimorum habeo. Sæpe autem, quod quoque notandum, ſi membrum aliquod magnum, veluti tibi, aut brachium, amputandum eſt, magna eſſe debet; Parva, ſi parvum fuerit.

fuerit membrum, veluti digitus, aut tibia, vel brachium infantulorum. Noviculae, forcipes, cauteria ignita, pulvis ad sistendum sanguinem, tenacula ad liganda vasa, defensiva, fasciae madescentes oxytrato, polvilla, stuppe albumini ovi intinctae, & pulvere ad sistendum sanguinem adpersae, vesicae bovine, & si quae alia in opere necessaria esse videbantur, ante esse diligenter praeparanda.

Instrumenta simul & medicamenta ita sunt collocanda, & ordine disponenda, ut in ipsa operatione, unum alteri minime sit impedimento, quemadmodum cuidam Chirurgo, cuius meminit Dn. Dn. *Michael Doringius* accidit: Ille enim dum crus Sphaculo conaminatum abscinderet, & in medio esset opere, terra fasciae (quae cutem & carnem sustinere debebat) ita involuta fuit, ut ab opere aliquandiu desistere cogteretur, dum terram & fasciam iterum extiricaret.

Cap. 19. Amputandi membrum ratio.

Corpore omnibusque ad operationem necessariis (ut in praecedente capite declaravimus) praeparatis, & ordine dispositis, ad operationem perveniendum est. Quapropter si tibia amputanda occurrat, collocandus erget super scamnum, quo firmior maneat tibia. Tum Chirurgus sursum trahet musculos, & cursum, attilimodum vinculo partem firmam constringet, paulo supra locum amputandum: erit id vinculum & tenui redimiculo, cuiusmodi illud est, quo mulieres ad reliquandos, nodandosque suos crines uti consueverunt. Usus ligaturae duplex. Primum enim ita comprimit venas & arterias, ut non usque adeo metenda sit haemorrhagia. Deinde compressio sua inhibebit spiculum animale, quod minus per nervos deferatur; Unde reddetur pars quasi stupida, adeoque incisionem facilius praestet. *Guido* vult vinculum alterum adhiberi pati mortui, ut inter duo illa fiat incisio: nec male foras sit. Cum enim aditantes terant ut haemorrhagia, seu sanguinis eruptio, quae saepius Chirurgum calumniandi occasione praebet, huiusmodi ligaturae coercetur laevis intra vala partis emortuae, & tam copiose distillat. Alii supra genu vinculum adhibent, si sit amputanda tibia, circa poplitem, ac sub cubito, si sit incidenda manus ad carpum, ut sit, inquam, obscurior sentiat. At praeterea quod nervi ibi sunt profundius sit, quam ut eos ligatura valeat comprimere, contendantur saepius istiusmodi compressione partes musculosae, & nova sit spirituum interceptio.

Atque ligaturae sic factae, Chirurgus ad extremum scamnum locabit tibiam, ita ut illius extremitas petveriat infra genu, & fecit ad locum illum, in quo amputatio fieri debet: tum fasciam alligabit genu scamno, ne qua forte demoveatur. Femur autem & genu, ut scamno commodè annecti possint, necesse est, ut extremitas scami ex utraque parte aliquantulum excavata sit, quemadmodum sequens figura indicat. (Vid. Tab. vi. fig. 4.)

Genu scamno diligenter fasciis annecto, in promptu sit manica, ex alura aperta, hanc in modum. (Vid. Tab. vi. fig. 6.) Longa fit cinctus spithamam unam, lata vero, ut tibiam ea io parte, quae amputanda est, percingere possit. Ex utraque parte aperta esse debet, ita tamen ut aterior pars A. notata, ad formam crumenae duplici funiculo claudatur; quemadmodum sequens figura denotat. Funiculus autem ut lubricus sit, & in actu facilius constringi possit, rotundus, & oleo inunctus esse

debet. Superior pars huius manicae, quae A. B. C. notata est, aperta esse debet, nisi quod in utraque extremitate, uti & medio, simplici filo connexa sit, quod abscisso osse, celeriter forcice dissolvi & abijci possit.

Ufus autem huius manicae triplex est. Primum enim sanguinis impetum cohibet, ita ut Chirurgus multo melius videre possit, quo in loco apponenda sit terra. Secundum aequaliter, & parvo quidem cum negotio, musculos & cutem sursum trahit, quae facta operatione iterum descendit, extremitateque osium cooperit, atque ut tutius facilius cicatrice obdoci possit, elicit. Tertio, ne terra carnem attingat, atque dilaceret, impedit.

Figura autem huius manicae haec est: (Vid. Tab. vi. fig. 6.)

Guido & alii loco huius manicae carnem linteis cooperiant: praestat tamen manica uti; ut enim caro ad os incisa, linteis obtegatur, longum requiritur tempus: deinde facillime terra io ipsa operatione linteis ita involvitur, ut difficulter extrahi possit: quemadmodum enidam accidisse, ad finem superioris capitis ex Dn. D. *Doringio* declaravimus. Manica vero longe alia est ratio: celeriter enim medianebus funiculis, undique circa os constringitur, cutemque simul & musculos aequaliter in altum, vel dixi, erahit. (Vid. Tab. vi. fig. 6.)

Sin vero Chirurgus praescipit manica uti nocturnis vinculo praescipit superiori ex utraque parte tibiae laqueos adaptandos est, quemadmodum proximè praecedens figura indicat: Vid. Tab. vi. fig. 7. idque in eum finem, ut ministret, qui genu tener, indice & medio laqueos illos apprehendit, & facta incisione: carnis usque ad os, illam horum laqueorum beneficio in altum trahere possit. Hoc modo aliquot membra feliciter abscidi, neque manica, multo minus linteis, secundum mentem *Guidonis* adhibui. Genu scamno, uti dixi, annexo, induenda est manica, ita ut inferior pars B. notata, genu cooperiat; altera vero, quae in modum crumenae constringitur, ad superius vinculum ita colliganda est; ut facta incisione carnis usque ad os, ministret, qui genu tenet, illam protinus veloci imponere, & circa os constringere possit. Pars autem illa, quae aperta & A. B. notata est, ut ex superiori parte tibiae sit, necesse est; idque tam ob causam, ut facta amputatione, praedita fila ex utraque parte, simul & funiculi, forcipe protinus abscindi, & manica abijci possit.

Ita, ut dixi, induci atque adornari manica, aliud scabellum, quod cum priori scamno ejusdem sit altitudinis, pedi tibiaeque supponeodum, & fasciam alliganda est. Tandem adior ites cordati ministri, quorum unus ad scapulas, alter ut pedem cum scallo bello continet, tertius vero ad genu collocandus est, firmietque teneat agrum, ne in operatione in hanc vel illam partem vacillet. Qui autem ad genu tenendum constitutus est, ut indicibus, & mediis digitis funiculos manicae, aut vinculi superius adumbrati apprehendat, pollicibus vero & reliquis digitis, ut annexa figura indicat, genu amplectatur; necesse est. (Vid. Tab. vi. fig. 8.)

Quod si nervi ita retracti, & genu adeo locum varum fuerit, ut egret illud extendere non possit, in solum conelavis collocandus est ager, tibia vero ita in altum elevanda, ut scamno, eo in loco, quo excavatum est, annecti possit, quemadmodum sequens figura indicat. (Vid. Tab. vi. fig. 9.)

Processus

Processus autem ille, meo quidem iudicio, minime sperandus est. Primum enim tibia, cum jam sit mortua, aut quovis alio modo corrupta, acutissime scanno absque periculo alligari potest: At sciant Practici, quanto arctius membrum, quod abscindendum est, scanno alligatur, tanto minus cum discutere fieri amputationem. Secundò, hoc modo instituta operatione, æget in dorso decumbat, ac proinde Ipnorhymic minus obnoxius est. Tertiò, minus metuenda est hæmorrhagia, cum tibia in alrum sit elevata. Vinculum tamen sub genu cum suis laqueis non est omittendum; Et ut minister in ipsa operatione carnem & cutem in alrum trahat, prospiciendum.

Ceterum videat minister ille, qui scapulas tenet, ne brachii sulci ægrum amplectatur, aut quovis modo pectus aut ventrem comprimat: si enim pectus compresserit, respirationem impedit; Sin ventrem amplectendo, stomachum, hepar, ceterasque partes contentas, augetur hæmorrhagia propter compressionem venæ cavæ, facilius itaque etiam si scapulas & brachia teneat.

Monitos autem velim Chirurgos, ne operationem hanc, in lecto decumbente ægro, incipiant, nisi forte eo modo, à nobis in proxima præcedenti figura propòsito, collocatus fuerit: aut brachium vel manus amputanda sit. Membrum enim, quod amputandum, inpeimis femur & genu, nisi firmiter scanno annexum fuerit, operatio vix dextrè fieri poterit. Ante annos aliquos unà cum clarissimis viris D. D. *Jana Antonio Saraceno*, & *Georgio Jemichio* Medicinæ Doctoribus, ad ægrum, cui tibia amputanda erat, vocatus fui. Illum cum Chirurgus in lecto decumbentem reliquisset, & tibiam scabello solum annexisset, femur verò simul & genu omnino libera essent, multum & quidem in longum tempus insulit æger. Pre dolore enim, cùm ex una in alteram partem sese projicere coactus esset, terra hinc & inde, & quidem aliquoties ossè implicata fuit.

Si verò æget propter imbecillitatem lectum egredi minime poterit, asserculum spondæ annexendum est, deinde æget ita collocandus, ut totum corpus præter tibiam inter pulvinaria in lecto conquiescat, femur verò & genu prædicto asserculo firmiter annexa sint. Brachium similiter, aut manus, si amputanda occurrunt, æget inter culeitras manere poterit, brachium verò aut manum extendere, quæ scabello, aut asserculo aliquo spondæ annexo fascià alliganda est. Ut autem siue tibia, siue brachium, quod abscindendum, eò firmius scanno annexi possit, neque ex una in alteram partem vacillet, sequens instrumentum excavatum, scanno annexendum & infigendum est. (Vid. Tab. VII. fig. 1.)

Femur & genu scanno, ut dictum est, annexo, ministris constitutis, omnibusque, siue medicamenta fuerint, siue alia ad operationem necessaria, ordine dispositis, novacula probe exacta, aut alio quovis cultro incurvato, & ex utraque parte acuto, (Vid. Tab. VII. fig. 2.) incidat carnem nique ad os, separans simul & semel periosium, quoad fieri poterit: Si duo sint ossa parallela, veluti infra genu & supra carpum, cultro incurvo & acuminato separanda est caro intermedia, ne quod ferrè obstaculum occurrat.

Incisio autem carnis ex superiori parte ossis tibie, & ad latera incipienda, sique periosium diligenter ab ossè separandum est, semel enim absque impedimento si terra appollita fuerit, postea non facile ac levè aliquo obstaculo removersi potest. Infertur verò pars tibie, siue fura, postremò incidenda,

da, & ab ossè separanda est. Ea enim in parte cùm majora vasa venarum & articularum decendant, si primò incidatur, multum deperderetur sanguinis interius, dum cutis & os in superiori parte separaretur. Omnia tamen quàm celestissime, festinanterque & eundè petiendi sunt.

Cum primam caro ad os nique abscissa fuerit, videat minister, qui gent tenet, ut proximus limbus manica incisioni imponat, funicularumque beneficio circumscissa os confiringat, carnemque æqualiter in alrum trahat, ut Chirurgus os alijs carne amputare, cicatricemque firmiorem, & tempotius inducere possit. Tandem terra ressecabit os, quantè poterit agilitate & dextérité. (Vid. *separatorem* Tab. VII. fig. 3.) Abscisso ossè, proxime forcipe separanda, & abscidenda est manica, incisus funicularis A. B. notatis, superius in delineatione maneat.

Deinde ubi sanguinem effluere siverit, pro ratione plenitudinis, & visum ægri, cauteriis vasa inuret ad sistendum sanguinem, ipsumque etiam os, quò citius excidant ejus fragmenta. (Vid. Tab. VII. fig. 4.)

Resectio sanguine, solvet vinculum, quod est supra incisionem, & applicabit pygmaton è stupis, intestinum prius Oxycrato, dein ovorum albuminibus, & adspersum pulvere sequenti plurimo,

R. Facin. volar. ʒij.
Sanguinis draconis
Thuris an. ʒi.
Boli armen. orient.
Terra sigillat. an. ʒß.
Gypsi ʒi.ß.

Ranarum aquatiliū preparatum (mirificè enim & proprietate quadam occulta sanguinem sistunt) ʒi.

Musci cranii humani ʒj.
Pij. lepor. minutissime incisorum ʒij.
Pulv. albuminum ovorum sale caniculati cascaca-
torum.

Sponzæ maris
Sponzæ novæ torrefactæ an. ʒj.
Mille, satque pulvis subtilissimus.

Ranz autem quomodo preparanda, lector ad finem hujus capituli videre poterit.

Postea defensivum applicato, ac trunco vesicæ bovinæ involuto, revinciet omnia fasciis, intestis in oxycrato, nec mutabit hunc apparatus ante secundum diem, si æstus fuerit, aut tertium, si hyems. Defensivum tale sit, quale descriptum est capite 13. ut etiam hujusmodi.




R. Boli armeni albi
Sang. draconis
Masticis
Gypsi an. ʒi.
Ol. Rosacei &
Myrtini ana ʒi.ß.
Albumina ovorum num. ij.

Aceti q. f. Fiat unguentum in mortario.

Defensivum autem non circa ipsum truncum, sed supra genu, si tibia ad popliteum aut circa cubitum, si manus abscissa fuerit, applicandum est. Impedit enim defensivum, quo minus vesica trunco commode adaptari possit. Deinde singulis diebus iterandum est defensivum, quod fieri nequit, si circa truncum applicandum fuerit.

Inferior autem pars vesicæ bovinæ madida, superior verò ubi aperta est, sicca esse debet: sicca, inquam, ut extensa & aperta remaneat, & facilius, celestiusque trunco induli possit: madida tamen ex inferiore parte; ut æqualiter ac similiter stupas cum pulvere contineat.

Nonnulli,



Morab. Sc.



Nonnulli, quò secutiis præceperat hæmorrhagiam, ligaturæ: aut vinculi, ex superiori parte inclinationis, solutionem differunt in secundum apparatusum. At hoc non nisi cum ægri damno fieri potest, quoniam viaculum illud magnos excitat dolores, attractionemque promouet sanguinis, atque humorum, qui accendi tandem in parte suppurantur; unde nova pravorum symptomatum ocellio.

Alii unico tantummodo cauterio, eoque aded lato, ut totum truncum obtegere possit, utuntur, eoque vasa omnia venarum & arteriarum corrugare tenant. Verùm incepta, ne dicam, inepta est operatio. Venæ enim simul & arteriæ cum primùm abscissæ fuerint, sursum retrahuntur, ita ut cauterium illud latum illas, propter eminentiam ossis, attingere non possit. Interim cutis propter vehementiam ignis comburitur & contrahitur, curationemque difficiliorem, ac clearetem imbecilem reddit. Præstat itaque ad vasa constringenda cauterio Sphærico, ad os verò lato ac plano, qualia antè depinximus, uti.

Cauteria autem absque manubriis, non sine causa depluræ. Cauteria enim dum calefiunt, relaxantur manubria, ita ut in operatione hinc & inde vacillent, & difficultatem efficiant operationem: quapropter extremitates cauteriorum stupis involvo, quas interius dum ignescunt, uous ex ministris continuè aquâ frigida irrigor.

Porro ante operationem vires ægri perpendendæ sunt. Si enim æger debilis & extenuatus fuerit, & putredo locum amputationis nondum attingerit, eâ, quia fieri potest, diligentia profusio sanguinis cohibenda est, ne unâ cum sanguine spiritus dissipentur, vitæque dissolvantur, & æger periculosa syncope corripatur. Quapropter maiora vasa cauterio actuali corruganda sunt, neque pulveri ulli ad sanguinem sistendum, quantumvis probatissimo, fidendam. Impetus enim sanguinis medicamentum expellit, impeditque, quò minus ad vasa aperta pervenire possit, ut ibi vires suas exerceat. Graviter itaque erant Chelurgij, qui præstantissimum hocce remedium in abscissione membrorum, aliisque magnis operationibus, in perniciem ægri rejiciunt, illudque præter omnem rationem viuperare, & maledico dente carpere non verentur. Interim verò, dum suis pulveribus in sanguine sistendo occupati sunt, multum sanguinis deperditur, sepiusque æger in ipsa operatione extinguitur; quemadmodum ante cap. 15. & Centuria tertie Obsev. 82. de Illustri quodam Germano fusius declaravimus. Quapropter cum partes animantis non solum ex sanguine alantur, sed & calor nativus mansione ex sanguine obtineat, perinde atque ignis, qui in foco est ex lignis, ad arrendum idoneis, à quo totas ædes calidas conspicimus, summo studio, & quantum quidem fieri poterit, conservandus est. Quod si tamen corruptio atque mortificatio ad locum, ubi amputatio instituta est, perveniret, necesse est, ut nonnulli sanguinis efflueret, ne sanguine corrupto in vasis telato, de novo putredo truncum occupet: sensim tamen ut profusur, danda est opera idque optimè sic cauterio ignito, si valis leniter levitque tantisper admoveatur, usque dum nonnulli sanguinis effluerit. Tandem verò, ut sanguis omnino sistatur, cauterium fortiter admoveendum est. Ne autem iniecerim, dum vas unum cauterio claudere, ex altero sanguis nimis copiosè profusur, soleo duobus cauteriis, uno dextrâ, altero sinistrâ apprehenso, uno eodemque tempore operari; idque alias quàm sepiussum, tum non ita dudum in pueri Copeti ad Lacum Lemannum, cujus antea mentio facta fuit, feliciter mihi successit. Chelurgus itaque ut ambidexter sit, necesse est.

Abil. Chirurg. Tom. II.

Centrum ad impediendum hæmorrhagiam, aut ad minimum ipsius impetum veluti freno compescendum, Chelurgij cauterium culltellare excogitarunt, quo & ego multoties maximo cum fructu ægrotum usus sum: quandoquidem incidendo carnem usque ad os, venas quoque & arterias simul comburendo corrugar. Porro autem hujus cauterij, ut pollicis spissitudinem superet, necesse est, aliòquin non satis diu calorem suum conservare possit. Ut autem caro, quæ est inter utrumque os, eo quoque abscindi possit, acuminatum esse debet, quemadmodum sequens figura indicat. (*vid. Tab. vii. fig. 5.*)

Quòd si præter spem atque opinionem, etiam si cutis & caro cauterio actuali abscissæ fuerint, sanguis, uti sepiussum mihi accidit, profluxerit, propterea cauteriis Iphæricis sistendus, tandemque os serrâ abscidendum est, imprimis si æger extenuatus ac debilis fuerit.

Potest excellentiam hujus cauterij non satis extolere possum. Primum enim, ne sanguis impetuose profusur, ac spiritus dissipentur, impedit. Secundò, minus dolorosa est operatio, quàm si novacula cutis carnisque amputatio fieret, immò tota curatio minori cum dolore absolvitur, quemadmodum eventus in multis me edocuit. Hujus autem rei causa hæc mihi videtur, quòd nervi partisque nervosæ, imprimis periosium, eò primùm ferrum ignium sentiunt, porroque sursum retrahuntur, & ita quidem, ut serrâ illas non attingit. Novacula verò, quomodo periosium excidet, & ita quidem, ut setra liberam iuventiam viam, separari possit, nondum video. Setra itaque undique obidens periosium, maximos excitat dolores, vigilias, febres, phlegmones, aliisque gravissima symptomata: idque præcipue propter dilacerationem periosij membrana, exquisitissimo sensu prædita. Accedunt præterea & alia, quæ malum adaugent. Cum enim calor nativus in parte affecta maximè sit labefactus, eum, si caro & nervi cuncto frigido incidantur, & postea medicamenta frigida ad repellendos affluentes humores applicentur, magis magisque debilitant, & dolores insuperabiles, juxta illud Hippocratis; *Frigidum ulceribus mordax, &c.* procreant, quis, quæso, in controversiam vocare poterit? Cauterio verò culltellari periosium, uti dixi, omnino separatur. Cum primùm enim ignem persente, veluti pars nervosa sursum dolumque retrahitur, & setra transiem à partibus nervosis liberam invenit. Deinde mediante calore isto simplicissimo, & elementari ignis, recocturque calor nativus, in parte affecta labefactus, ac veluti prostratus. Et quia calidum, ut idem Hippocrates docet, ulceribus, ossibus denudatis, nervis, ac omnibus partibus nervosis amicum, doloremque lenit, sequitur mox digestio vulneris, ita ut omnia salva sint. Expertus loquor: multis enim hac methodo membra amputavi, iterumque truncum sanitati restitui, ut vix de dolore conquererentur, multò minus intermedicatio aliqua circa truncum appareret. Sed videatur obstatere locus Hippocratis, qui habetur libro de Articulis, ubi ignem nervis inimicum esse, sepiussum elligit. Sed loquitur Hippocrates eo in loco de nervis, non abscissis, aut malè affectis, sed adhuc integris & sanis, quibus revera ignis, ut ipse omnium calidissimus & tenuissimus, ac minimo negotio ad illos penetrat, adversissimus, illosque contahit, & dolores excitat. De nervis verò malè affectis alia est ratio. Cum enim multa ignis commercio reddantur meliora, ut *Galenus* docet, ignisque omnia dissolvit, ut idem *Galenus* aethor est; quis, quæso, non videt, cauterium in tanta putredine circa nervos

X

collecta,

collecta, multum professe possit? Hæc etiam ita se habeant, non sequitur tamen, methodum illam amputandi membrum in parte mortua, reliquamque putridam carnem cauterio comburendi approbandam esse. Ex maxima enim combustione illa, non solum nervi supra modum incallescunt, verum etiam (quia adhuc in parte mortua hærent, ita ut quantumvis abscissi, minime tamen sursum retrahi possint) vi ignis ita comburantur, contra huncque, ut maximi dolores, vigilie, aliaque, symptomata inde sequantur. Effervescunt præterea in parte affecta adeps, cæterique humores, & continuo otendo, de novo affluxum excitant, quemadmodum c. 17. diximus. Alioquin calidum nervis maxime convenit, doloresque sedat, ut antea ex Hippocrate demonstratum est. Cujus rei exemplum non vulgare ante annos aliquot mihi observare licuit. Matrona Paterniacensis à carne tabido in digitum medium mortua fuit: circa septimum dolor acutissimus exortus est: cum verò balsamum abietinis calide vulneri instillasset, ac ægra maximum levamen inde percipisset, petiit, ut parum calidius illud infunderet; Tandem eò usque, rogante egrâ, gradum caloris auxi, ut ferventi balsamo vulnus adimplerem, quo facto dolor iotta paucos dies remisit. Integræ historiam pete æ Cæter. 3. Obs. 58.

Si verò æger juvenis, robustus, & plethoricus fuerit, vitæque constitutæ, putredo quinque etiam ad locum ferè amputationis pervenerit, necesse est, ut factâ amputatione membri, nonnihil sanguinis effluet: hinc enim totum corpus aliquo modo refrigeratur, & veluti onere quodam gravi deposito allevatur, vitæque iterum colligit, omniaque symptomata imminuunt. In hujusmodi ægris amputato membro, pulvere meo præscripto aliquoties hæmorrhagiâ abscis, cauterio actuali cohibui. Iterum tamen ut Chæirurgus cauteria in promptu & quidem ignita habeat, suadeo: ut si forsan propter impetum hæmorrhagiæ pulvis non sufficeret, ad cauterium confugere possit.

Pulvis autem non unico pulvillo magno ex stupis preparato, ut nonnulli sacre consuevit, sed variâ applicandus est. Unico enim applicato ad vasa, quæ statim post amputationem sursum retrahuntur, cum vix pervenire possit, veluti inutilia est impetus enim sanguinis pulverem repellit & abluat. Habeat itaque Chæirurgus multos pulvillos parvos, spissos, bene compactos, albumine ovi madefactos, & pulvere nostro ad sanguinem sistendum copiose adspersos; quia ad ora venarum & arteriarum trudas, unum post alterum, donec truncus undiq; sit coopertus pulvillis. Habeat deinde pulvillum ejus magnitudinis, ut totum truncum obtegere possit, qui similiter ovi albumine imbutus, & pulvere adspersus esse debet, quo applicato, protinus omnia vesicæ bovinæ, ut dictum est, madefactæ, obtegenda sunt: deinde fasciis oxyurato madefactis diligenter deliganda, ut pulvis circa ora venarum & arteriarum remaneat.

Galenus, & post ipsum Avicenna, Celsus, & alii, aliam Methodum sistendi sanguinem, & quidem apertissimam excogitarunt, vasorum scilicet ligationem. Convenit autem præcipue in robustioribus & plethoricis corporibus, & in eis, in quibus hæmorrhagiâ non usque adeò pertimescenda est. Ad liganda enim vasa, unum post alterum (nisi Chæirurgus manu promptissimus fuerit) tempus requiritur: at quia sanguis iterum profluit, ac deperditur, non ovis in plethoricis & robustioribus tentanda est: In delicatulis verò & extenuatis, abque peticulo administrari, non potest: in his enim sanguis propter causas, quas antea recensui, protinus sistendus est. Quod si necessariò membrum citra ipsam radicem carnis putridæ abscindere cœssit fue-

ritus, methodus hæc sistendi sanguinem locum quoque non habet: Cauterio enim actuali, ut corruptelo illa castigetur, necesse est. Convenit præterea & in eis, qui animo sunt pusilli, ac ferum igitur supra modum metuant.

Comprimunt itaque os ferrâ abscissum fuerit, apprehendat Chæirurgus forcipe hic adhibitâ. (Fid. Tab. VII. fig. 6.) vas, quod reliquorum est maximum, & cum aliquantulum illud ad se attraxerit, protinus mittit vinculum, ex filo canabino factum & A. notatum, vasi injiciat, illudque arctè constringat. Interim autem, dum Chæirurgus & minister vas novum, ut dixi, amplectuntur, atque constringunt; tertius quidam digitis reliqua vasa obstruat, impetumque hæmorrhagiæ, quantum fieri potest, impediât, & si forsan nonnihil carnis una cum vena, aut arteria apprehenderit, nihil nocere potest, & facilius obstruatur vas. Vincula ita diligenter vasi injecta, ad majorem securitatem pulvilli ex pilis leporinis, aut gossipio factis, ovi albumine madefacti, & pulvere ad sistendum sanguinem adspersi, ad ora vasorum, quemadmodum superius diximus, imponendi: deinde omnia vesicæ bovinæ, fascisque diligenter vincienda atque deliganda sunt.

Explicatio fig. 6. Tab. VII.

A. Laqueus est ex filo canabino reduplicato; & interducatum, quorum Chæirurgus quinque aut sex paratos, & in promptu habere debet. Ad ipsam autem forcem ad-parti debent, quemadmodum ex delineatione videtur est, idque in eum finem; ut cum primò Chæirurgus vas aliquod apprehenderit, minister eò facilius laqueum ad ipsum vas usque detradere, nodumque conficere possit.

B. Plectrum est, quod forcipem apertam tenet.

Sin verò vena aut arteria sursum retracta fuerit, ita ut præcedenti forcipe, quia læta & in formam rostri anseris fabricata, apprehendi non possit, sequentem forcipem, in formam rostri clonici factam, in promptu habet. (Fid. Tab. VII. fig. 7.)

Nonnulli resecto membro, & resecto sanguine, acu oblongâ, & filo æquali ac levî, quale est seticum, labia vulneris decussatim, quantum fieri potest, contrahunt: Verum methodus illa mihi non probatur. Cum enim truncus post operationem intumescat, futura hæc dolores mirum in modum adauget, filum quoque hoc, intumescente carne, cutem abrumpit, quapropter futura relaxatur, ita ut planè inutilis sit. Impedit præterea futura hæc, quò minus pulvilli ad ora vasorum commodè applicari possint, si forsan de novo hæmorrhagiâ supervenierit. Præstat itaque, loco suæ glutino vel, quemadmodum postea dicam.

Restituo sanguine, fascisque deligato truncum, in tertium usque diem (nisi dolor obstruit, quemadmodum cap. 24. dicturus sum) relinquendus est primus apparatus, propter merum hæmorrhagiæ. Interim tamen torum femur, aut brachium, quoadvis bis oco rosæco, aut myrtilorum innigere, defensivum quia etiam singulis diebus iterare convenit. Postea cum proximum apparatus abijcere voluerit Chæirurgus, iterum tres, aut quatuor pulvillos parvos ex stupis, aut gossipio paratos, albumine quin etiam ovi madefactos, & pulvere nostro ad sistendum sanguinem adspersos, in promptu habeat. Omnia clemens admoveenda sunt, pulvilli tamen, qui in

primo apparatus vasis impositi fuerit, si aliquo modo, quantumvis levissimè adhæserint, propter metum hæmorrhagiæ, in sequentem usque diem relinquendi sunt. Sin verb faciliè, & veluti per se decidant, recentes vasis imponere convenit, ossi filamenta sicca, reliqua vulnere sequens digestivum applicetur.

R. Therbinth. Jus in aqua plantaginis ʒiij.

Ol. Rosacel.

amygdalarum dulcium ana ʒj.

Gummi Elemi dissoluti cum prædictis oleis, & colati ʒss.

Croci ʒj.

Misce, fiat unguentum, adlendo vitellum unius ovi.

Neque verò morabantur hæc remedia ante digestionem factam; in primis defensivum; adiper-gaturque vasis pulvis noster ad sistendum sanguinem, quoad non sit amplius ab hæmorrhagiâ periculum. Tum remoto digestivo detergebitur oleum mundificatio nostro de succo apii, capsulamodî infusæ extremo hoc capite, aut etiam sequente.

R. Therbinth. Jus in vino ʒiij.

Pulv. rad. aristolochiæ cornuæ

irisidis florent.

farinæ hordei ana ʒiij.

mellis rosæ ʒj.

aqvæ vitæ ʒss.

theriac. optimæ ʒij.

Misce, & fiat mundificativum.

Interim nitendum deorsum trahere cutem, ac musculos, qui sinum attrahi fuerant, ut paulatim deorsum contegant osium incisuram extremam, utque post cicatricem inductam cutis ea, & ipsi musculi pulvini instar extremis illis ossibus sublestantur. Quamobrem tulent nonnulli decussim ipsa vulnere labia fuerit, statim ab ipsa operatione, sicque cutem & carnem appropriant. Qui modus mihi non probatur propter incommodum, quæ inde sequuntur, quemadmodum antea ostensum est. Placet itaque loco futuræ, quæ sit in carne & cute, uti pulvis, spenis, fasciisque, aut glutino ad id apto, & sequenti modo applicato.

Digestio vulnere, & inflammationis experite, lin-trem, ejus longitudinis, ut totum truncum ambire possit, induco sequente emplastro, aut glutino, & ad labia vulnere applico; Ita tamen; ut labia mi-nimi ferè digiti sit inter labia vulnere & emplastrum. Postera die siccat emplastro, & renacissimè hæren-te, acum filo tractam inserto, sicque vulnere la-bia a haud aliter conjungo, quam si ipsam cutem & carnem pectorassem. Glutini, quo ego utor; de-scriptio hæc est.

R. Farinæ volantis ʒj.

Misticis

Thuris

Sing. draconis

Pulv. Rulæ. rub.

Gummi tragacant. ana ʒij.

Misce, siatque pulvis tenuissimus, cui adde albumen unius ovi, aq. rosarum q. l. ut crassilem mellis adipsatur glutinum. Manceant in infusione per noctem; sequenti die si nimis spissum fuerit me-dicamentum, iterum affunde aquæ rosarum, aut plan-taginis quantum satis est; deinde utere quemadmo-dum dictum est.

Loco glutini utimur emplastro de pelle arictis, aut aliquo alio ex pice navali, colophonis, & simi-libus confecto.

Relaxatur autem aliquando glutinum, aut propter abundantiam puris, aut quia Chæsurus medicamen-

tum aliquod humidum applicat. Si propter abundan-tiam puris acciderit, inspergatur vulnere sequens pul-vis, qui exsiccet absque mordicatione, & calum ex-tremorum osium procurat.

R. Rad. Aristoloch. rotundæ,

Peucedani

Irisidis florentinæ

Corticam pini

Ligni Guajac ana ʒss.

Misce, siatque pulvis tenuissimus, qui ulcere quo-tidie semel, aut bis inspergatur.

Lin-teum glutini obductum si deciderit, novum applicandum est, idque toties, quoties opus fue-rit. Est enim tutissimum remedium, minimè do-lorosum, & periculi expertum, quo in omnibus vulne-ribus, quæ futuræ indigent, uti possumus.

Tandem dum curatur vulnus, procurandus casus extremorum osium, quæ aeris & fæcie contactu lœsata fuerunt, aspersis pulveribus catagmaticis, cujus-modi est iste, paulò antè descriptus.

Ab omnibus autem humidis & oleaginis in de-nudatis ossibus, in quacumq; parte corporis fuerint, planè ut ablineat Chirurgus necesse est. Quapropter statim ab operatione filamentis sicis, nec non pulve-ribus catagmaticis ossa diligenter tegenda, ac mu-nienda sunt. Accelerat quoq; calum ossis, si post am-putationem cautellam actuale, ut suo loco diximus, ossi leniter lætetur; applicatum facit. Etiam actua-lis ignis proculdubio, quod porum talis non potest, ab-solvere, ossi robur addet, & plura alia dabit commoda, ut eruditè monet Anatomicus & Botanicus D. PETERUS PAVIUS. Leviter autem ossa cautellâ actuali, tractan-da; Primò quia nulla adest caries. Sed solummodò al-teratio quoddam à fæcie, & aëre externo contrahita. Secun-dò ne inedulla vehementi ignis nimium incalcescat, ac novam inflammationem exciter. Euphorbium quoq; (et-si, ut verisimile est, genuino & legitimo *Diaphoræ* ca-reamus) separat & deturbat osium carinorum fragmen-ta, quemadmodum Olib. 2. Centur. 3. fusiis demon-stravimus: velut & emplastrum de betonica.

Ab initio autem, ut antea quoq; monui, diligenter filamentis os denudatum obtegendum est, donec natu-ra carne aliqua spongiosa id obtegerit, quod circa de-cimum, aut decimum quartum diem post amputatio-nem fieri consuevit. Cum u. aër ossibus denudatis sit adversissimus, ea statim carne aliqua fungosa tegit na-tura, sub qua nihilominus patrem illam ossis ab aë-re, aut medicamentis, vel etiam à fæcie alienata, paulatim separet, & per carnem illam fungosam ex-pellit: os vetò carne solidâ, & laudabili tegit, itaque non satis rectè, nec prudenter faciunt nonnulli, qui in ossibus denudatis quoridie ferè (ut ego apud quosdam vidi) scalpris os abradunt; Aut carnem istam fungosam causticis abluunt. Hinc multoties ex recenti vulnere sunt ulcera maligna atque diuturna. Extrema autem fragmenta ossis minimè vl sunt extrahenda; Sed interdum con-currienda & commovenda leviter, reliquum naturæ & pharmacis permittendum. Non est interim ex-pectandus horum casus ante arigefimum vel quadra-gesimum diem ab amputatione. Est & excrescens in truncis ipsi caro coëscenda pulvere aluminis ussi, aut sequente.

R. Aluminis ussi ʒj.

Lapidis calamiarici

Ploembi ussi

Cervise ana ʒj.

Vitrioli calcinati ʒss.

Misce, fiat pulvis tenuissimus.

Deinde inducenda est cicatrix emplastro palmeo, de cerussa cocta, unguento delicatissimo rubro, diapompholygos & similibus.

Manus si sola contaminata fuerit, in ipso capto amputanda est sequenti modo. Cutis versus cubitum reducenda fortiterque liganda est; Quemadmodum de abscissione tibie diximus: Postea circumferencia juncturam lineæ atramento ducenda est. Tandem minister aliquis cordatus brachium firmiter teneat; Chirurgus verò sinistram manum, quæ amputanda, apprehendat, dextram autem cutem & carnem secundum lineam atramento inductam cultro ante delineato incidat, paravumque manum deprimat, sic enim articulus protinus disjungiatur & novacula absque ulla obstatulo, & celeriter quidem operationem absolvit. Truncus postea curandus est, quemadmodum de tibie diximus.

Sin verò brachium extra articulum amputandum est, cutis & caro usque ad os incidenda est, aut cauterio cultellari ante depicta, aut alius cultus: Deinde os non scalpris, aut securo, ut nonnulli artis imperiti homines facere consueverunt, sed firmiter præcedere convenit. Operatio autem ut dextræ perichelatur, brachium scamno annectendum est, quemadmodum de tibie diximus. Quod si Chirurgo libuerit, poterit quoque applicare & uti manica, antè in abscissione tibie descripta & depicta.

Digitus 17. solum diximus non forcipe incisionem, ut vulgus Chirurgorum facit, aut scalpris, sed novacula, vel securo amputandi sunt. Novacula quidem parvâ, & acuminatâ, si in ipso articulo facienda est operatio: securo verò si extra articulationem. Minister itaque brachium & manum teneat, Chirurgus verò forcipe apicem digiti apprehendat, firmiterque sinistram teneat, tandem lætâ minimâ os abscindat. Operatio hæc eam aliâ, tum Anno 1591. in puella quadam Hildenzæ, cui omnes digitos dextræ manus abscidi, feliciter successit, de qua vide historiam capite quarto. Præterea in petegino quodam Gallo, qui Anno 1600. Romæ rediens, & in monte S. Bernardi à via descensum, & inter nives petegians, tuncum frigus passus fuit, ut extremitates omnium digitorum dextræ manus (extinctâ in istis calore nativæ) Gangrænâ correptæ sint quemadmodum in 2. Cent. Obs. 87. fufius declaravimus. Porro in abscissione digitorum, talis observandus est ordo, videlicet, si apex pollicis, apud Vesaliûm, de corporis humani fabrica Lib. 1. cap. 25. fig. 1. C. notatur, abscindendus fuerit, fiet id in prima articulatione, & quidem non forcipe aut scalpro, sed novacula. Si verò putredo primam articulationem transgressa fuerit, proximamque, in eadem figurâ T. notatam, nondum contaminaverit in medio, ubi B. notatur, abscindendus est digitus; eazque quidem ac relique partes molliores novacula, os verò lætâ exigua. Quod si dimidia illa pars ossis B. notati, reservari quoque non posset, abscindatur in ipso articulo, T. notato. Si pars illa pollicis in prædictâ figurâ A. notata, reservari quoque non poterit, non tamen in medio, ubi os in prædictâ figurâ A. notatum est (id enim Chirurgo in operatione perquam difficile, ægro verò molestum esset, & deformitatem pateret) sed ad quintum brachialis os P. notatum, abscindendus est pollex, sequenti modo. Adhuc minister cordatus, teneatque firmiter sinistram suâ (si abscindendus est pollex, aut alius digitus dextræ manus) brachium ad Carpum, dextrâ verò digitos omnes arripat, levitet, ad se trahat. Dum Chirurgus sinistram suâ pollicem apprehendat, & nonnulli ad se trahendo, videlicet pollice, incisionem ad ipsum articulum T. notatum, novacula bene acuminatâ inchoet, & rectâ ad quintum os brachialis ducat, sic ad se

trahendo pollice, primo vel altero ictu ipsum facile abscindet. Si verò pollex sinistræ manus abscindendus est, minister dextrâ suâ brachium ad carpum, sinistram verò digitos teneat, eodemque modo, uti jam dixi, procedat. Si corruptio, aut caries indicem occupaverit, prædictâ methodo non est mutanda, facillimèque ad metacarpum, sive postbrachiale os, in 1. & 2. figurâ L. notatum, hoc est, in tertia articulatione abscindatur, quemadmodum ego in aliquibus expertus sum. In abscissione minimi digiti eodem modo procedendum est: potest tamen ad brachiale usque ubi in prædictis figuris N. notatur est digitus, parvo cum negotio quoque abscindi. In abscissione mediæ atque annularis digiti, si corruptio aut caries eo usque pervenerit, ut ad tertiam articulationem, sive postbrachiale os, abscissio instituenda necessariò fuerit, hæcenus non exigua fuit difficultas: Idque propter superum digitorum. Tertio enim iterandus fuit ictus scalpi, vel novacula, ut ex adjunctâ figurâ faciliè colligatur. Primo ictus digitum in postrema articulatione à metacarpo leparabat. Secundus, & tertius septimum digitum, ex una arg; altera parte digiti, incidit, ut sequens figurâ indicat.



Pet septimam autem digitorum, intelligo partem illam carnem, quæ sita est inter tertiam sive postremam juncturam digitorum & secundum articulum versus, uti videre licet, & figurâ 2. cap. 25. lib. 1. Vesalii, à literâ R. ad D. Porro in hac operatione ac tertio repetito ictu scalpi, in uno aut altero angulo, a & b notato, facillimè carnosum aut membranaceum quid à scalpro, intactum remanet, & operationem difficiliorem, longioremque reddere poterit. Hæc apud me pendens, & quomodo hæc in re, tum ægri, tum etiam Chirurgis succutere possem, nervos intensus, sequens instrumentum excogitavi, quoque digitus in extrema articulatione, unâ cum lepto, ex una atque altera parte, unico ictu facillimè & sine difficultate abscinditur. In abscissione digitorum pedum eodem modo procedendum est. Est autem scalprum peracuminatum, & alatum, cujus postica pars A. notata semicircularis, ejusque est magnitudinis, ut cum osse, quod amputandum, justam habeat proportionem. Alæ B. & C. notatæ, pollicem cum dimidio sint longæ, acuminatæque ut ex sequenti figurâ, ad virum depictâ videte est. (Vid. Tab. vii. fig. 8.)

Operatio autem sequenti modo instituenda est, præparato corpore, manus in scammum aut tabulam collocanda, & à Viro Cordato teneunda est: deinde articulus, in quo amputatio peragenda, diligenter atramento notandus est, & apposito scalpro, malleo id tam valide percussendum, ut unico ictu digitus abscindatur. Mox quæ sanguinis fluxum cohibent, & dolorem leniunt, applicanda sunt, de quibus suo loco fufius.

Cæterum, Candide Lector, est ante cap. 17. usum scalpi & tenacula in abscissione membrorum improbatum, in hoc tamen casu, quia aliter fieri nequit, ex duobus malis minus eligendum, & extremum remedium potius adhibendum, quam ægrotum, in periculo constitutum, detinendum esse existimo. Cæterum quomodo post curationem lignea tibia, aut ferrea manus adaptanda sit, Lector apud Ambrosium Paracum l. 23. videre poterit.

Sunt præterea, qui ægri ante operationem soporiferum aliquod præbent, ut minus sentiat dolorem. At nos ex boni *Guidonis de Castore* sententiâ abstinemus: Quippe ista narcotica perquam periculosa sunt, propter gravissimam, quæ inducunt, symptomata, imò & mortem: quemadmodum pollicar cap. 24. exemplo quodam demonstrabimus. Quare de his agere imperite debet.

Mundificatum nostrum de succo apii, ad mundificanda & incantanda Gangræne ulcera, aliæque foetida & maligna, sic præparatur:

R. Succi apii,

Scordii,

Amnoglissi majotis,

Ruræ ana ℥ij.

Mellis rosati ℔b. j.

Coquantur ad consistentiâ syrupi, tum admisce.

Farinæ lupinorum,

Pulv. rad. Asitoloeb. rotundæ,

Anglicæ,

Vincetoxicæ,

Theriacæ ana ℥ss.

Aquæ vitæ ℥j.

Misce, fiat unguentum, quod servetur in vase vitæo.

Ranæ, quarum antè in descriptione pulveris nostri ad sistendum sanguinem memini, sic præparo. Accipio ranas aquaticas, suspendo illas in eumbratâ, ira tamen, ut fundum non attingant, ne in carbonem comburantur, & aqua, quæ exsillat, odorem gravem acquirat. Accenso igne aquam in arena clementer extaho, & ad usum refero. Est enim præciosa in ulceribus malignis & cancerosis, item in polypo, ozena, aliisque pudendorum & sedis ulceribus: inflammationem extinguat & malignitatem corrigat. Ignem non castiguo, usque dum omnino exsiccatæ fuerint ranæ, nec ulla amplius castillet aqua. Illam tamen, quæ circa finem exsillat, separatim colligo, odorem enim aliquo modo graviorem habet, & in ulceribus ois & narium minus grata est. Ranæ ita exsiccatæ in castillum sniorium proficio, ac in albidissimos cineres comburo. Valent non solum ad sistendum sanguinem, verum etiam in omniulceribus malignis, & foetidis, si eis inspergantur, mundificant, abstergant, & malignitatem corrigunt.

Cap. 20. De symptomatibus, quæ post amputationem membri supervenire solent, deque eorum causis.

Ceterum, etiam si Medicus & Chirurgus summam adhibeant diligentiam, corpusque ante operationem rite præparaverint: æger tamen non semper à symptomatibus immunis esse potest. Primò, quia Medicus non obtemperat & in victus ratione peccat: aut quia adstantes officio suo minime funguntur. Est enim vestissimum, quod *Hippocrates* scriptum reliquit: nimium non sufficere, si Medicus officium suum circa ægros fecerit, omniaque summâ cum diligentia adhibuerit ad morbi oppugnationem, nisi æger ipse & qui circa ipsum constituti sunt, officio suo quoque fungantur: & tunc à Medico præcipientur, diligenter observent. Primò itaque, ut æger obediens sit, & in omnibus Medici consilium lequatur, necesse est. Secundo ministros, qui ægro intersunt, diligentes & vigilantes esse convenit. Tertio exteriora quoque, velut aer secundum morbi naturam, victus ratio, & habitatio commoda, requiruntur. Sin vero æger morosus & inobediens, habitatio ægri incommoda, & victus ratio prava fuerint: rarissimè scopum suum attinget Medicus, etiam si diligentissimus fuerit.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Secundò superveniunt symptomata post operationem, quotiescunque corpus pravis humoribus, sanguineque oneratum est. Cum impetu enim ad truncum conflant, aut symptoma aliquod molestum in corpore excitant.

Tertia causa symptomatum ad morbi magnitudinem referenda est. Si enim membrum aliquod magnum, veluti femur, aut brachium, abscindendum est, aut in vulneribus capitis membranae, læsæ fuerint, quis quæso à gravioribus symptomatibus securus esse poterit? Tandem impetitia & negligentia Chirurghi sapissimè multorum gravissimum symptomatum causa est: nonnunquam enim affectum, causas & symptomata, propter impetiam non satis agnoscunt, at quis symptomata præcavebit, nisi morbi haberet notitiam? Alii ab initio affectum negligunt, & focci faciunt, ac interim dum corpus ægri expurgare, victus rationem præscribere, aliæque ad præcavenda symptomata, adimplere debeant, ventri & voluptatibus dediti sunt. Hinc occasionem, quæ, ut rectè *Hippocrates* docet, præceptum est, negligunt, siquæ aliquando ex levissimo aliquo vulnere gravissimos affectus, qui ægrum aut exstinguit, aut ad summum periculum perducit, maximeque incommoda posse se relinquunt.

Vultus simplex facillè curatur, imò natura, quæ, teste *Hippocrate*, morbosum est medica. per se & absque medio aut Chirurgo, sapissimè vulnera consolidat: symptomata vero cum supervenerint, omnes naturales operationes invertunt maximeque molestias, ac ingentes labores aliquando Medico patiunt. Ut autem Chirurgus symptomata, quæ vulneribus aliquando accidunt solent, præcaveat, vel etiam ex arte curare possit, non satis est, ut nudam solummodo habeat experientiam: ratio (ut rectè monet *Galenus*) arq; doctrina quoque requiruntur. Sed prohi dolor, quorum nunc devenit ars Chirurgicalis: jacer profecto, & pascis ipsius splendor, apud multos veluti caligine quadam sepultus est. Multos circumfocandos, barbitoniores & castratores cognosco, quos vulgus ad cælum usque extollit; quorum tamen nonnulli matrem linguam legere & scribere ignorant, malvum, aut parietarium viæ cognoscent: Hi nullâ habetâ ratione corporis ægri, hemioliâ testiculos evelunt, calculos errantur, aliasque gravissimas operationes, non purgato corpore, in altum cum detrimento ægotum perficiunt. Facti enim operatione, humores ratione doloris, veluti ad elocam, circa locum affectum conflant, gravissimæque quandoque symptomata excitant. Illa autem, quia non raro totum negotium inverttere, majoreque molestias ac labores, quam ipse morbus procreare solent; necesse est, ut Chirurgus rationem subjecti sui habeat, morbum, ipsiusque causas, naturam ægri, simul & facultates atque vires medicamentorum rectè agnoscat, eaq; ex arte præparet, & adhibere sciat: quæ omnia ex ipsa testurigenie artis, nimium ex *Hippocrate*, & *Galen*, *Avicenna*, *Cels*, aliorumq; antiquorum, ac neotericorum Medicorum arq; Chirurgorum scriptis potissimum haurienda, & ita collocanda sunt, ut ratio & experientia simul conjungantur. Deinde, & quidem potissimum quia omnia bona dona à Deo proveniunt, quemadmodum divus Apostolus monet, item quia Medicina à Deo creata & data est, & absq; benedictione Creatoris nihil opetur, videat Chirurgus, ut in omnibus suis actionibus & operationibus Deum invoctet, & quantum fieri poterit, piè & Christianè vivat. Circa ægros vigilans sit, summamque diligentiam adhibeat. Et quia, ut antea quoque monui, symptomata sapissimè totam curationem prioris morbi invertunt, ideoque quomodo illa temovenda, hæc in gratiam tytonum annexere visum est.

X 3

Symptomata

Sympromata autem, quæ post operationem potissimum intervenire solent; hæc sunt. Syncope, & vitium prostratio, hæmorrhagia, febris, dolor, inflammatio, phlegmone, vigilie, phrenetis, convulsiones, atque Gangræna & Sphacelus de novo. De quibus omnibus ordiæ & sigillatim, breviter tamen dicturus sum, præterquam de Gangræna & Sphacelo, quæ si denuo superaverint, præcedens curatio iterum adhibenda est.

Cap. 21. De Syncope, & quomodo ea prævenienda & removenda sit?

Syncope, quæ præcipue vitium lapsus est, & in hujusmodi gravioribus operationibus non raro accidere solet, petiolo non vacat; nonnullos enim in ea extinctos fuisse, observatum est. Videat itaq; Chirurgus, ut ante operationem eis omnibus, quæ in syncope requiruntur, instructus sit.

Moleis varique de causis præcipue vitium prostratio oritur, de quibus Lector *Galenus*, aliosq; auctores videre poterit. In gravissimis vero operationibus has potissimum ob causas accidit. Primò, propter maximam dissipationem & deperditionem spirituum vitalium. Hinc enim cor aliquo modo refrigeratur, ac prostratur, donec cætera viscera iterum novum prædium ad ipsum miserint. Hujusmodi autem lipothymia supervenitæ solent, quoscunque Chirurgus in gravissimis operationibus cauterium actuale improbat, & in sistendo sanguine aut negligens, aut tardus fuerit. Cum sanguine enim spiritus simul effluunt, atque dissipantur. Cujus rei exemplum Lector *cap. 15.* de illustri Germano videre poterit.

Altæta causa est, quando sanguis & spiritus repente & nimis copiose, sive sit propter itam, timorem, vel aliam aliquam causam, circa cor confluunt, spiritusque vitales veluti suffocant.

Tertio supervenit lipothymia, quoscunque vapor putridus & malignus ex trunco per artérias ad cor ascendit, spiritusque vitales inficit. Quapropter quoscunque membrum aliquod putridum in parte mortua ascendit, & quod reliquum est carnis putridæ, caneris actualibus in escharam comburitur, lipothymia gravissime & mortales periculis tendit. Vapores enim putridi, vi ignis exalati, subtilis & acres facti, facillimè per artetias ad cor ascendunt.

Quibus onitium ventriculi exquisitissimo sensu præditum est, facillimè syncope corripuntur, si bilis flava, aut aliquis alius humor acris iustus regurgitaverit: Ut accidisse memini, cum Eripitici, & imperiti barbirones hujusmodi, aliterque operationes, non purgato corpore administrant. Civi cuidam Berneosi, *Hieronymo Zukel* nomine, cum Anno 1614. Arentici venam, non purgato corpore, in sinistro cubito incidit barbirones, cardialgia primò, mox quoque epilepsia corpeus fuit: hinc paroxysmo epileptico, imprudens barbirones prostratus venam in dextra manu incidit, multumque sanguinis extrahit. Quid sit iterum cardialgia, mox quoque epilepsia gravissima & periculosa corpeus fuit; oti lektor in 4. *Cent. Observ.* *negleram* fusula videbit. Corpus itaque antequam vena incidatur, aut membrum aliquod abscindatur, ab excessivis humoribus ut evacuetur, plus quam necesse est.

Ubi lipothymia invadunt, pulsus languidus, & ita obsecutus sit, ut quandoque difficultè percipi possit: Sudor frigidus in facie, aliquando quoque circa pectus erumpit: Nausea, non raro quoque vomitus superveniunt, frequenterque oscitat æger: Sanguis

ex toto corpore ad cor confluit: quapropter extremæ partes frigent: faciei nitor & color vividus aufertur; nalis acutus & oculi cavi apparent. Sanguinis quoque fluit ut pluximum, fluente ad interna sanguine, remittit, nonnunquam rarissime tamen, augetur, propter retentis faculteris labefactationem, atque summam prostrationem; quod & eis, quibus vena secta, & sanguis nimis copiosè extractus fuit, accidisse memini. Corpus, ut lemel dicam, prostratum, & sine motu ac sensu facit, nec quicquam videt, neque audit æger optum, quæ circa ipsum fiunt.

Cum autem remedia secundum causam morbi sunt mutanda, & adhibenda, necesse est, ut Chirurgus ex sequentibus signis edicat, an syncope propter dissipationem spirituum, vel ex eorundem oppressione proveniat: idque primò ex pulsus cognitione licet. Solax eolm vites inquit *Galenus*, patrum, languidum, ac valde frequentem pulsus efficiunt: oppresse vero pulsus moritur, cum in reliquam omnem inæqualitatem, & ordinis confusione, tum in eam, quæ in vehementi spicitur & magitudine. Nam inæqualitates hæc oppressarum vitium maxime propriæ existunt. Secundo, vitium lapsus propter dissipationem spirituum semper post se temp sitam hæmorrhagiam accidit. Ex oppressionem vero spirituum etiam ab initio operationis, & antequam sanguis prostraverit, supervenit consuevit. Si syncope circa finem operationis, aut etiam absoluta operatione pervenit, haud difficultè ex sanguinis, qui effluxit, quantitate consicit Chirurgus, syncope, an ex spirituum vitalium dissipatione fuerit, nec ne? Tertio, in syncope ex retentione spirituum, item ex magna crudorum humorum copia, præcordia infantur, & totum corpus majorem naturalem molem habet: & color alius in albiditatem, & aquosioris speciem mutatur; alius ad nigritudinem, ac lividitatem. Quarto, æger, si optimo corpore habere prædixit, cordatus & audiosus, nihilominus tamen lipothymia corpeus fuerit, veritatis est, malum propter dissipationem spirituum accidere: propterea quod æger ante operationem inrempitè per alvum, aut sudores expurgatus fuerit, aut in ipsa operatione multum sanguinis profuderit. Sin verò æger delicatulus fuerit, stomachum d. hilem habuerit, inrempitè expurgatus non fuerit, neque hæmorrhagia usque ad magnam supervenit, citum est, lipothymiam propter retentionem & suffocationem spirituum accidere: propterea quod aut ratione timoris, aut aliquam aliam ob causam, sanguis, humores, & cum ipsis spiritus inrempitè confluxerit. Ignosce candidè Lector, si in enumeratione signorum prolixus fuerim. Id enim eam ob causam feci, quò tyrones, juniorq; Chirurgi hujus affectus plenissimam notitiam habere possint. Quam grave enim & periculosum sit symptoma, Medicis in confesso est, & sequentes observationes finem faciunt. Duo ex domesticis ferentissimi Principis ac Domini, Dn. *Javani* ad *Redegaili* Litaniæ, &c. Ducis, cum in decertatione unus ex illis gladio parum supra genu vulneratus fuisset, proximus in lipothymiam incidit, vitamq; posuit, antequam Chirurgus Principis accurreret: etiam nulla supervenisset hæmorrhagia, & vulnus non usq; ad profundum esset. Hæc ex relatione ferentissimi Principis habeo.

Gersteinensis quidam barbirones, *Wilhelmus* Fix nomine, cum velitante cum Düsseldorfensi quodam in via, haud procul ab ipso oppido, circa catpam (si rectè memini) sinistram, vulnus exiguum recepit, feritissimè syncope corpeus fuisset, in ipsa extinctus fuit, etiam nulla supervenisset hæmorrhagia.

Ambo

Ambo autem illos viros propter concepam iram extinctos fuisse, verisimile mihi esse videtur. Dolor enim itaque, ut Ponsianus refert, mentem præcipitant. Sanguis enim, & spiritus cum impetu ad eor conflunt, eilemque vitalem extinguunt, quemadmodum videmus flammam in lampade extingui, si nimium olei affunditur. Adde quoque conturbationis proprium esse, ut idem Ponsianus docet, mentem labefactare; at altercatio illa abique conturbatione fieri non potest. Hæc quidam matrona Hilidenæ, cùm An. 1502. 4. Septembris per totam diem in administratione rerum domesticarum occupatissima, ac proinde defessa fuisset, & quod cenam ad focum sedaret, periculossimâ lipothymia correpta fuit; quemadmodum lector in tractatu, de combustionibus suis videre poterit.

Quamprimum itaque Cheimurgus ex supradictis signis cognoverit, lipothymiam in propinquo esse, protinus ut secundum causas adhibeat remedia, necesse est. Quapropter ne in ipsa operatione longos dolores patiatur æger: aut multum sanguinis profundatur, viresque dissolvantur; cordatum & manu promissimum conveniunt esse Cheimurgum. Habet præterea in promptu pulveres, ad sanguinem sistendum expulsiuissimos, simul & cæteris ignis; ut venas simul & arterias protinus obstruat possit. Adhuc etiam ægro Ministri divini, qui consolationibus suis ipsi animam erigere possint. Sin verò visum lapsus, propter spiritum citra cor collectorum copiam acciderit, non uique adeo opus est, consensum telingute sanguinem, imò expedit, ut sanguis & spiritus iterum ex interioribus ad exteriora, beneficio hæmorrhagiæ, & ætissimis ligaturis evocentur. Verum enim verò in his omnibus virum imprimis habenda est ratio. Cùm primum autem superventum lipothymia, ægrius protinus in dorsum collocare convenit, ita tamen, ut caput & pectus aliquo modo elevata sint, ne membra nonnisi intervenientia, veluti ventriculus & hepatis, diaphragma tepiant, pectusque coarctent. Hanc quoque ob causam vestimenta, & quæcunque circa pectus & ventrem sunt, protinus relaxare convenit; quo membra respiratio intervenientia libera esse possint.

Porro si lipothymia propter dissipationem spirituum fuerit, exerts a libenda sunt eiusmodi, quæ pro obstruere, sanguinem quietiam eilemque naturam simul & spiritus iterum ad interiora propellere valeant. Quapropter facies, tempora, & capiti, aqua rosarum, plantaginis & aceto rosaceo sunt itrotanda: Sin prædictæ aquæ minime in promptu fuerint, aqua communis, acetum item commune substituendum est. Aqua autem (quod notandum) cum impetu, & ægro nesciente, in faciem projicienda est: sic enim spiritus veluti sopiti excitantur, & ad fontem vite redeunt. Os præterea & nares digitis comprimantur, quo inspiratus aer versus interiora recedens, etalefactusque cor calefaciat, & spiritus reficiat. Protinus quoque patum vini, aut vini Malvatici, vel nonnihil aquæ cinnamomi, in qua aliquid confectiois Alkermes dissolutum sit, ægro propinandum est. Cines trahendi, & spiritus citra cor spiriti, vociferationibus excitandi sunt. Cùm primum lipothymia nonnihil remiserit, buccella panis vino aut vino Malvatico mæfacta, ovum item sordide, & jusculum ex optima carne, haustusque vini ægro ostendendus est. Sin febris ardens adfuerit, vinum pisanâ, aut decocto agrimonie dissendum est. Sequens quoque epithema regioni cordis, temporibus item & artetis brachiorum applicetur.

R. Aquarum rosarum.

Buglossæ.

Confect. Alkermes.

Acetolæ.

Aorti rosarum ana ʒj.

Cosallior. præpar.

Santalorum omnium.

Specier. diamargalit. frigidi ana ʒj.

Confect. Alkermes ʒij.

Ollis de corde cervi.

Caphurs.

Croci an. ʒß.

Misce, fiat epithema, ut dictum: Ori præterea & naribus continuè lineum aut spongia epithemate isto insuccata admovenda est. Odores enim suavissimi, ut postea dicam, vires quoque reficiunt, instaurantque.

Quod si syncope propter sanguinis copiam, aut ex putredine & malignis vaporibus, ex membro putrefacto ad cor elevari advenerit, sanguis, ut post amputationem membri nonnihil fluat (secundum tamen visum tolerantiâ) necesse est. Sic enim vapores putridi iterum ex partibus nobilibus ad truncum trahuntur. Haec quoque ob causam ut vinculum illud paulò supra locum amputationis, protinus solvatur, non uique adeo est necesse: sed poterit per quadrantem horæ relinqui, ab interioribus enim ad exteriora quoque trahit. Quapropter in maximis & periculosis lipothymias, brachia & crura ætè ligare solemus. In dorsum similiter collocandus est æger, & pectus à vestimentis liberandum. Facies vino, in quo flores spicæ macerati fuerint aut etiam aqua spicæ; labia verò & lingua theriacâ conficienda (unt; parumque th. iacæ vino malvatico dissolva, ex cochleâri exhibeat. Aut

R. Aquæ cinamomi

Buglossæ ana ʒß.

Confect. Alkermes ʒj.

Lapidis Bezoar. gr. vj.

Misce, fiat potincola.

Naribus suaviter redolentia, veluti aqua cinnamomi, in qua confectio Alkermes dissoluta, aut Rosarum, Benzoi, ambræ, Moschus, etocæ & similia macerata fuerint, admovenda sunt. Hujusmodi enim spiritus recreant, viresque, ut Galenus & alii docent, instaurant. Sin autem lipothymia propter vitium aliquod matricis acciderit, aut ægra hysterica fuerit, naribus, non suffragis ex odoratis, sed fætidis, veluti aliâ fætida, fumus item plumarum perdicum combussorum, aut coeni caprarum, aut solarum calceamentorum, coticum caprarum, & id genus aliorum; pudendis verò odorata adhibeantur. Ita etiam capiti: dolor ingens ac magnus adfuerit, suffragis aromatum naribus admodum minime convenit, nos docet Hippocrates his verbis: *Suffragis aromatum, & odoramentis, malebis dicit. Sæpius verò ad aliâ utilis esset, opote ad omnia frigida & humida corporis, uter præterea mala; illi capiti faceret gravitatem, quippe vapores suffragis, utpote remiores, ad caput feruntur, idque complerent, gravitatem ejusdem efficiunt. Quod si syncope adeo gravis & vehementer fuerit, ut de vita periclitetur æger, extremis artibus, veluti brachiis & cruribus vincula dolorosa protinus injicienda sunt. Naribus pennâ pipere confectâ, inditâ, aut nonnihil pulveris pipenis albi caland inspiratâ, sternamenta cienda sunt, quo spiritus sopiti excitari possint. Hanc quoque ob causam pennâ oleo communi inunctâ, & ætophago intrusâ, vomitus provocare convenit. Nonnunquam enim ob crudum humorum, vel etiam cibi copiam, in hujusmodi operationibus*

operationibus lipochymia gravissima accidere solet, quemadmodum cap. 18. exemplo de pulosa quadam ostendimus. Interim autem, dum Cibururgus sternutamenta cyocare, aut vomitum excitat, diligentissime ut prospicias, plusquam ocesse est. Quapropter huiusmodi prædicta nō nisi maximā urgente necessitate, adhibenda sunt. Cordi sequens epichema applicetor.

R. Aquarum Borrageia.
Buglossæ ana ℥j.
Melissæ ℥j.
Vini Malvatici ℥ij.
Electuarii de gemmis ℥j.
Crocī ℥j.

Misce, fiat epichema.

Sequens elixir vitæ quoque mistum in modum in lipothymia, & victum lapio convenit: quandoquidem cerebrum, cor, ventriculum, omnesque partes ioremus roborat, spiritus recreat, ac humidum radicale instaurat, noxiosque vapores à partibus nobilioribus ad ignobiliora expellit. Detur à drachmis duobus ad uociam semis, per se, aut paucō saccharo, vel confectioe Alkermes dulcorata.

R. Aquarum rosarum odoriferarum.

Melissæ,
Buglossæ ana ℔j.
Aq. Cionamomi ℔ij.
Garyophyllorum confractionum,
Nucis Muschar.
Maceæ,
Benzoiçi,
Storacis calamitæ,
Cortic. Citronum,
Acoraniorum ana ℥j.
Florum anthos,
Salvæ,
Betonice,
Primulæ veris,
Buglossæ,
Borraginis,
Violarum,

Summiatur majoræ ana M. ℔.

Incidentur & coarundantur, quæ contundenda, ideine cum aq. commiscantur, & digerantur 10 Sole per dies 24. vase diligenter cerâ obturato. Tandem per alembicum vitrum in balneo Mariæ leno igne distillentur. Aqua excipiat ampullâ vitreâ. Ex remanentia s. a. extrahatur Sal, & admisceatur aqua, item Mosci ℥j.

Ambre gr. vj.
Crocī ℥j. 6.

Misceantur omnia, & reserventur in ampullâ diligenter clausâ ad usum. Præstans est, ut divi, si ex cochleari exhibeatur, naribus quoque etiam, fronti, & arteriis brachiorum admoveatur.

Sequens quoque pulvis summopere convenit in lipothymia, oaribus & ori calamo ioditus.

R. Rosarum-odoriferarum ℥j.
Storacis calamitæ
Benzoiçi ana ℥j.
Mosci &
Ambre ana gr. vj.

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus: reser- vetur in vase vitreo, cerâ diligenter obturato.

Cap. 22. Qualium visus ratio agro post operationem præscribenda sit.

Peractâ operatione, & remota lipothymia, si for- san supervenit, victus ratio talis, quæ reliqua

symptomata patim removere, patim quoque præca- vere possit, præscribenda est: ubi iterum essentia & magnitudo morbi, simul & vires ægri perpenden- dæ.

Potest Gangræna cum sit ex numero gravissimu- rum morborum, extrema & exquisita remedia, juxta Hippocratem, convenire, omnibus in consilio est: Victus itaque tenuissimus præscribendus esset ægro, cū vires ut plurimum contrarium fuaderent. Humi- dum enim radicale cum propter morbi violentiam, dolorem gravissimum, & lagninis depredationem, sit absumptum, & spiritus vitales dissipati, omnes- que actiones corporis prostrate, pleniori victus ratio- nem iterum ut instauraretur, resisterentque, perquam necesse est. Major enim error, ut testatur Hippocra- tes, in tenui victu intempestivè adhibito sit, & gra- vius vires læduntur, quam in paulo pleniori victu, præsertim ubi vires prostrate fuerint. Quæ vitæ ve- rò ratione id fieri debeat, alibi nos docet Hippocra- tes, his verbis: Victus humidus aut frigidus acta, aut potentia talis, feblicitatebus confert: ut in hu- jusmodi gravissimis periculosisque operationibus, lemper adeat febris: quapropter cibi boni succi, qui humectando simul refrigerant, æger nutriendus est. Huiusmodi cibus autem est, pulcillum carniū recocti- alium, caponum imprimit, gallinarum, & castratonum, bustei mundati, & avenæ decorticatæ, & similium: coveniunt & pasatellæ, ut vocant, emulsiones seminum frigidorum, amygdalata, & ova recentia. Cum carne coqueat vitæ herbarum refrigerantes, vel- uti borrago, buglossa, acetosa, lactuca, eichorium, spinacia, ceterosolum, & flores calendulæ. Spiritus enim vitales recreant. Conveniunt quoque pruna dama- scena, & uvæ passulæ, aquæ & sacchæo coctæ. Aromata, præcipue piper, zingiber, garyophylli, item aliæ, capz, raphanus, sinapi, & huiusmodi omnia, quæ igniter excalefaciunt, summopere nocent, Ab iocito vinum, omniaque potulentia calida, omni- nō intendenda sunt, nisi vires planè prostrate, li- pothymia frequenter adfuerint, tunc enim per inter- valla vinum aquâ dilutum exhibere convenit, allo- quin bibat prilianam, in quâ pruna, aut tamarindi incoctæ sunt: vel detur decoctum agrimonie & veronice saccharo dulcoratum, & cinamomo ato- mizaturn, vel lac amygdalarum. Priscæ quoque & decocta agrimonie admisceri poterunt, syrupus ci- tronum, de limonibus, de succo acetosæ, de agrestæ, de succo berberorum & similia. Loco Syroporum suc- ci quoque conveniunt. Si verò tussis adfuerit, aut æ- ger vicio aliquo prætoris laboraverit, ab omnibus a- cidis ut abstinere æger, ocesse est: præcipue ab ip- sio morbi, ne autâ rursi propter concussioem corporis, sanguis circa truncum iterum erumpat.

Alvus ut lubrica sit, prospicere oportet, ubi enemata leniciora, suppositoria, & pruna aquâ & saccharo cocta conveniunt. Ita præterea, tristitia, om- nesque affectiones animi vitandæ sunt. Gaudium me- diocriter, uti spiritui recreando convenit: Sic risus in- primis immoderatus supra modum nocet: Ridendo enim cor torumque oervosum geous maximo cum impetu moveri, atque ex una in alteram partem feri, Centuria prima Observat. 23. annotavimus. Hinc perspicuum fit, duabus de causis risum nocere eis, quibus membrum aliquod amputatum est. Primò, quia ridendo nervi contrahuntur, unde dolor, & convulsiones: secundò, quia ex maxima illa concussionē, & agitatione corporis & musculorum, veoz quo- que & arteriæ agitantur & commoveantur, ac proin- de sanguis iterum erumpit, quemadmodum loco jam jam allegato fusiùs monstravimus & exemplo con- vulgari

vulgar in Nobilissimo & Senenno viro Dn. *Iohanne à Dierbach*, Domino ad S. Chriltophorum oblativo, confirmavimus. Prædicta victus ratio non solum amiffas vires instaurat: Verùm etiam quàmplurima symptomata, quæ ægri insidias parare solebant, avertit.

Cap. 21. *Quomodo hæmorrhagia, si post primum apparatus iterum supervenerit, prohibenda & compescenda.*

Omnium symptomatum, quæ vuleribus superveniunt, hæmorrhagia metù periculosissimum est censeodum, præcipuè autem, si arteria aliqua aperta fuerit. Ex arteriis enim sanguis longè impetuosius, quàm ex venis profluit; Et propter continuum motum eorum, deusam duplicemque rancidam, difficultè obturari possunt. Hinc æger in vitæ discrimine versatur. Cum sanguine enim spiritus dissipantur, vires dissolvuntur, humidamque radicalem exhaustur: hinc partes nobilissimæ ad hæbescuntur, ut sapissimè obstructions gravissimæ vitæcorum, ictericia, & hydrops sequantur. Quod si singulus supervenerit, de ægro actum est. Ubi enim sanguis pluvius effluerit, à quovis loco, sive à nobis, sive ab ore, thorace, venterico, utero, hæmorrhoidibus, singulis, qui ventriculi depravatus motus est, aut convulsio superveniens, malum. Fit enim huiusmodi singulus ex inanitione & absorptione humidi radicalis, quapropter ut plurimum letalis est, ut *Hippocrates* & experientia docent. Hanc ob causam prospiciat Chirurgus, ut diligentes & fidelis ministros ægro adjungat, qui omnia, quæcumque necessaria videbuntur, adhibeant: Ioprimis autem manu madefacta oxytrato, stupas cum pulvere continuo per vices continuo dibene, ne sanguis erumpat. Prospiciant præterea, ne mulem fe commoveat æger, iternaret, vociferetur, tussiat, rideat, aut corpus calcitrans multum oneret. Quid plura? quæcumque corpus commoveat, aut quovis modo calefaciant, vitanda sunt.

Monitos autem hic velim iuniores Chirurgos, ut interim dum æger dormit, vigilans & diligens ipsi adit minister: ne æger propter falsas imaginationes, quæ aliquando supervenire solent, truncum commoveat, iterumque sanguis erumpat, quemadmodum cuidam ægrotorum meorum in agro Paterniensi accidit. Hic cum brachium ad cubitum amputatum, ille vero tertio die, me absente, brachium, (quod minime sibi amputatum esse persuaserat) extendere, & manu, nescio quid, apprehendere velleret, deinde aperit venâ, hæmorrhagia magna & visum proflata secuta est, ita ut paucos post dies à vitâ discesserit. De huiusmodi falsis imaginationibus videat *Le Boer Observ. 14. & 15. Cent. 3. item Laurentii Jouberti tractatum de vulneribus Sceloporum.*

Quod si hæmorrhagia supervenerit, non illico tamen amovendus est primus apparatus, sed prius tentandum, an alius remediis recludi possit. Proinus itaque unus ea ministris manu stupas cum pulveribus continet, fortiterque contra oscula venarum reprimat. Ne autem incalcescat manus, sapissimè oxytrato immergenda est. Alius præterea adit minister, qui superiorem partem trunci, lineis oxytrato madefactis involvat.

Si amputatum fuerit crur, brachia ad cubitum arctissimo vinculo constringenda sunt, et id vinculum è tenui redimiculo, cuiusmodi illud est, quo mulieres ad ligandos nodandosque suos crines uti consueverunt. Sin amputatum fuerit brachium, crura ad popliteum constringere convenit: Ligatura enim hæc sanguinem

protinus attrahit, & hæmorrhagiam sapissimè impedit. Ad eandem intentionem summo potè quoque convenit venæ sectio, in opposita parte facta: hoc est, si crur dextrum amputatum fuerit, in cubito dextro liganda est vena: si verò brachium abscissum, venam in poplite secare convenit. Quod si vena in poplite non apparuerit, in pede secanda est, dummodo ibi abique inunctione pedis in aquam calidam fieri poterit. Quandoquidem in his frigido, frigidaque aqua utendum, unde sunt sanguis, aut fluxus est. Immerfus enim pedibus manibusque in aquam calidam, rotas sanguis incalcescit, adeoque effervescit, ut difficiliter retinenda possit. Quapropter etiam frictions eis, quibus sanguis fluit, aut fluxus est, minime convenire, rationi consentaneum est. Evacuatio autem hæc non solum in hæmorrhagiâ convenit verum etiam reliqua symptomata, veluti febrem, dolorem, inflammationem, & similia avertit atque impedit.

Ante venæ sectionem autem diligentissimè perpendere debet Chirurgus, an æger sit plethoricus, juvenis & robustus. Si enim eucrochymicus, senex, aut mulier imbecillius fuerit, minime aut in paucissima saltem quantitate detrahendus est sanguis.

Si interperies maxima hepatis adjecta, sequenti episthema tepide applicate convenit regioni hepatis.

R. Aquæ. endiviæ,
Cichorii,
Lactuce,
Abundantius an, ʒij.
Aceti rosæ ʒ. ʒ.
Specier. diarrhod. abbas
Distinction fantalor, an, ʒij.
Caphuræ ʒ. ʒ.

Misce, & applicetur, ut dictum, cum filtro aut spongea, vel etiam linceo reduplicato.

Act, in quo æger versatur, frigidus ut sit, necesse est: quapropter, si tempus calidissimum fuerit, cubiculum aqua frigida alpergendum & foliis plantaginis, salicis, quercinis, rolarum, gramine, & similibus hinc inde spiritis, calor attemperandus est.

His adhibitis remediis, si sanguinis fluxus non sit, sit, falcia, velicam, reliquaque omnia clementer solvere & amovere, iterumque renovare necesse est. Quod si vena, ex qua sanguis profluit, in conspectum venerit, forcipe apprehendenda, & hilo reduplicato liganda est, quemadmodum superius disti. Si vero impetuosè profluerit sanguis, ita ut de vitâ periclitetur æger, ligandi cautius candente compendendus & retinendus est. (*Vid. Tab. vi. fig. 9.*)

Tandem stupæ cum pulvere ad sanguinis fluxum sistendum, velica item, ac reliqua, quemadmodum *exp. 16.* declaravius applicanda sunt. Adit quoque minister, qui manu oxytrato madefacta, stupas cum pulveribus ad oscula venarum reprimat.

Cap. 24. *De dolore, inflammatione, & intermissione, & quomodo huiusmodi symptomatibus occurrendum.*

Post hæmorrhagiam, omnium symptomatum periculosissimum dolor metù continendus est, cum sit mater, ex qua quàm plurima mala generantur. Quapropter non sine gravissima causa monet *Galenus*, vulnera blandè esse tractanda, ne dolor suboriantur. Eriam si enim corpus ante operationem eâ, qua fieri potest, diligentia expurgatum sit, attrahit nihilominus dolor, maximo cum impetu, sanguinem & humores ex toto corpore ad truncum, iterumque inflammationem, tumefactionem, phlegmonem, convulsiones, aliaque symptomata suboriantur. Ratione item doloris vigilans, inquietudines

ingrediantur, phlegmæ, lipothymiz, proflatio appetitus viriumque consequuntur. Digestio quoque non tantum ventriculi, verum etiam vulneris impeditur, ita quidem, ut sapientissime Gangræna iterum circa truncum laboraret. Monitos itaque velim iuniores Chirurgos, ut in omnibus operationibus illam adhibeant diligentiam, quo omnia, quantum quidem fieri potest, abique dolore perficiant: Id n. verò *Galenus*, cum operationes iocundè fieri debere præcipit. Quapropter omnes metudi viuperandi sunt, qui ægros nulla urgente necessitate, doloribus ac tormentis lacerant.

Dolor autem præcavetur internis externisque remediis. Internis quæ affluentes humores, & sanguinem, siue si qualitate siue quantitate peccaverit, evacuant: Externis, quæ eosdem humores sanguinemque à parte affecta repellunt, alterant. Quod si circa truncum aliquid dolorificum à Chirurgo commissum fuerit, hoc est, si medicamentum aliquod acce applicuerit, aut vinculum: vel nonnulli faciunt) ad truncum reliquerit, id protinus quoque corrigendum & removendum est.

Ceterum sedatur dolor tribus modis, t. auferendo causam, a. corrigendo intemperiem, quæ partem læsam afficit, 3. stupefaciendo & sensum partis hebetando. Quapropter si dolores ex affluu humorum acciderint, corpus iterum secundum humoris prædominantis naturam expurgandum est. Id tamen, nisi violentia morbi obsuerit, ante operationem fieri debet: quo facta operatione corpus purum sit, ne forsitan ex motu isto sanguis iterum eruptat. Sin verb corpus ante operationem expurgatum non fuerit, & dolor ac inflammatio supervenerint, post operationem (si vires permiserint) clementer expurgandum est. Ne autem, dum æger è lecto ad exorcandam alvum egredi cogitur, hæmorrhagia iterum superveniat, sequens vasculum ad excipienda excrementa aptissimum ipsi supponatur.

Vasculum autem illud ex cupreæ, aut stanno fabricatum, & rotundum esse convenit, latum pollices 13, altitudo pollices quatuor non excedat. In superiori parte foramen habeat rotundum, & pollices septem longum, cujus limbus aliquo modo depressus sit; quemadmodum sequens figura indicat. (Vid. Tab. VII. fig. 10.)

Explicatio fig. 10. Tab. VII.

- A.A. Vacuum siue ventrem vasculi denotant.
- B. Foramen rotundum, in superiori parte pollices septem longum, adambat.
- C. Limbus est vasculi, nonnihil impressus, idque in illum finem, ne æger ab ipso ledatur, sed commodè ei insidere possit.
- D. Operculum fistulæ E. notatur, per quoniam pelvis mundatur, denotat. Est quoque loco manubrii, quo vasculum sub ægrem intrudetur iterumque extrahitur.

Quò lector figuram vasculi, & imprimis, limbi depressionem, ed meliùs intelligere queat, apposita est figura altera: quæ vasculum per medium distichum representat.

Interim autem, dum æger alvum exonerare nititur, misist, ut manu potius madefacta pulvillos, fasciam & pulveres ad sanguinem sistendum, versus vasa reprimat, necesse est. Clementer tamen omnia facienda sunt, ne dolor exciteretur. Viciùs ratio talis præscribenda est, qualem c. 22. & alibi fusiùs indicavimus. Si plethora maxima adsuerit, & sanguis in partem læsam confluerit, doloremque excitaverit, incidenda est vena, dummodò vires consentiant, & æger sit juvenis, neque in ipsa operatione multum sanguinis profusum fuerit: Quandoquidem ve-

næ sectio in omnibus doloribus, præcipue qui ex plenitudine sanguinis proficiuntur, singulare præsidium est.

Solent nonnulli Chirurgorum vinculum ex superiori parte amputationis, in secundum apparatus relinquere: idque in eum finem, ut oscula venarum, simul & arteriarum constringantur: Sed perperam profectò faciunt. Vinculum enim hoc maximos atque continuos dolores, ingentesque cruciatu excitat, hinc inflammationes, febres, vigilie, aliæque Symptomata subducunt. Attrahit enim cum imperi sanguinem, atque humores ex toto corpore ad partem læsam. Hinc quoque ob causam primus apparatus, si ullo modo fieri possit, aut ad summum secundo, aut tertio die removendus est. Fascia enim & veica bovina, cum circumcirca truncum exteantur, doloresque non spernendus excitare solent. Nonnulli ab initio lineamentibus, ac culcitris calidis ita solent obvolvete truncum, ut inde (maximo ægrotum damno) præter modum incalcat, atque ratione suæ caliditatis, sanguinem humoresque ex corpore attrahat. Hæc, si causa doloris fuerint, corrigenda quoque erant.

Unica superest causa doloris, quæ removeri non potest, nimirum, quæ propter puris preparationem accidit, ac præcipue tertio, quarto, ac quinto die ægrem infestare solet. Puer enim, *Hippocrate* teste, dum conficiunt, dolores sunt, ratione quæ materia circumstantes partes intendit, ob ipsius fusionem, & spirituum dissolutionem. Febres item accidunt magis corde jam consensato, quàm jam confecto pure: quippe materia tum attenuata est, & multum spirituum exhalavit, putrida denique concocta sunt, atque effluunt. Hoc itaque tempore æger blandè & circumspiciè tractandus est, omniaque, quæ dolorem excitare solebant, evitanda, atque removenda sunt.

Secundò sedatur dolor, corrigendo intemperiem partis affectæ. Ratione enim solutionis continui, promeritudine & cacochymia corporis, humores in partem affectam plus minusque confluant, & exaltati, ac partes nervosæ extendendo & alterando, dolorem atque intumescensionem excitant. Itaque statim ab initio, quemadmodum antea quoque monui, repellentia applicare convenit. Quapropter totum membrum bis aut ter in die oleo rosaceo & myrtillorum ut inungatur, & defensivum applicetur, necesse est. Pulvilli item & fasciæ oxycrato imbuedæ sunt. Hæc omnia enim non solum affluentes humores repellunt, verum etiam calorem partis affectæ ad temperiem reducant.

Esti autem huiusmodi frigida parti affectæ applicare necesse sit; Ipsum tamen vulnus, ut temperatè sit calidum, prospicere debet Chirurgus. Quamobrem digestivum utcumque copiosè alimentis & pulvillis applicandum, & ne oxycrato aliante frigida ad ipsum vulnus perveniant, danda est opera. Frigidum enim, inquit *Hippocrate*, ulceribus mordax, non quidem erodendo, quod continuum est; Sed potius divellendo cutem obdurat, substantiam ejus densam & costringens, dolorem importabilem facit, ed quod nativum calorem, qui supputationis causa est, exstinguit, livorem obducit, & denigat, rigores febiles; convulsiones, distentiones erant, non quidem per se, ut rectè docet *Lyseus*, sed ex accidente: Nam conclusa corporis meribus putredinem, & subinde febrem excitant, necesse est. Summa, ut verbo dicam, pars affecta ad temperiem, quantum quidem fieri potest, reducenda est: hoc est, ut neque nimis sit calida, frigida, humida, aut sicca: Quandoquidem, nisi pars affecta quàm optime fuerit temperata, minime curari posse, *Hippocrate*, & experientia fidem faciant. Sin verb materia effluens

effluens pituitosa fuerit, vitæ ratio necunque calida & sicca instauranda est, uti cap. 12 in victus ratione, in causa frigida & humida, fufius declaravimus. Truncus non rigida, sed temperatè calida, veluti unguentum basiliconis, autem, cataplasma item ex farina faburarum, lupinorum, baccharum lauri, floribus chamomille, sambuci, meliloti, rosarum, & summitatum absinthii, omnibus vino rubro coctis, applicanda sunt. Truncus quin etiam linteis & stupis calidis involvatur, & digestio vulneris celeriter promovenda est. Venæ sectio hic vix locum habebit, quin potius corpus à pravis humoribus expurgare expediat.

Hic, uti dixi, adhibitis, si præter ipsum atque expectationem dolor, inflammatio, affluxus humorum & febris iterum supervenerint, demum corpus secundum humoris prædominantis modum expurgare, venam secare, & defensivè applicare, & truncum totumque membrum sequenti linimento calidè iuvare necesse est.

R. Ol. rosarum.

Myrrillorum.

Anethi.

Lumbicorum an. ʒj.

Misce.

Interim tamen etsi inflammatio aliqua adsit, vulnus tamen, ut omnia tepidè applicentur necesse est. Calidum enim, ut *Hippocrates* testatur, pus movet, cutem emollit, dolorem sedat, rigores, convulsiones, & distensiones mitigat. In hunc itaque finem sequens digestivum vulneri filamentis copiose imponendum est.

R. Terbinth. claræ & aqua beronicæ, aut Veronica lotæ ʒj & ʒss.

Ol. Rosaceæ &

de vitellis ovorum ana ʒj.

Gummi Elemi &

Cera novæ ana ʒvj.

Dissolvantur lentissimo igne, & percoleantur: postea admisce

Croci ʒss.

Vitell. s. ovorum nom. ij.

Misce, fiat unguentum, quod filamentis tepidè applicetur, & emplastro basilicone cooperatur. Aut applica sequens cataplasma, quod dolorem mitans in modum mitigat:

R. Medullæ panis ʒb. j.

Coquatur cum lacte vaccino, ad formam cataplasmatum: Deinde admisce

Ol. Amygdalarum dulcium;

de vitellis ovorum ana ʒj.

Buryri recentis ʒij.

Croci ʒj.

Virell. s. ovorum nom. ij.

Misce, & applica calidè.

Oleum autem de vitellis ovorum, & amygdalarum dulcium, quod diligenter norandum & observandum, non ex vitellis aut amygdalis coactis (quemadmodum nonnulli sepiassurum, quo oleum copiosius & minus cum labore extrahere possint, facere consueverunt) sed leviter calefactis, cæ, quæ par est diligentia, extrahendum est. Coactis enim vitellis amygdalivæ oleum quidem facillè, sed fœdum, fœtidum, & ad sedandos dolores ineptissimum elicitur.

Sequens item fomentum dolorem lenit:

R. Flor. Chamomillæ,

Meliloti,

Rosarum rubearum,

Absinthii ana M. ʒ.

Rad. Althææ ʒj.

Sem. Anisi.

Fennigræcæ ana ʒss.

Incidentur omnia in minutissimas partes, & coquantur in lacte vaccino, in quo spongia aut filitro

madefacto calidè applicetur loco dolenti; & cum primum refrigeratum fuerit, iterum prædicto lacti calido inungatur.

Hic si non sedatur dolor, ad narcotica transeundum est: à levioribus tamen incipere convale, hunc in modum:

R. Syr. de papavere ʒj.

Aq. Lactucæ

Papaveris albi, &

Bellogossæ

Aq. Cinnamomi ana ʒss.

Confect. Alkermes ʒj.

Misce, fiat porriuncula, denar duabus horis post cenam.

Si ad fortiora transire necesse fuerit, detur Philonium Romanum, Triphera magna cum opio aut Laudanum Paracelsi. Volneri emplastrum ex hyoscyamo, Boribus nupharis, sem. papav. albi, opio, & similibus applicetur. Cautus tamen hac in re ut sit Chirurgus, necesse est, præsertim in exhibitione *Laudani*: quamvis enim sic medicamentum præstantissimum, quendam tamen, cum eo abuteretur, mortem sibi imminuisse observavi. Fuit is Nobilis, hæc procul à Colonia habitans, & quinquaginta circiter annorum ætatis: Is cum dolore Nephritico, simul & Arthritico mihi in modum excrucietetur, Coloniam ad Medicum mittere, auxiliumque ejus exposcit. Præparat Medicus doses aliquot *Laudani*, & ad regum transferendas tradit tabulario, cum instructione, quomodo medicamento isto uti deberet. Servus ad Nobilem suum revertens, medicamentum quidem tradidit, libedam verò in via amiserat: Ager præ maximo dolore cum veluti prostratus esset, neque ut famulus Coloniam rediret: iterumque instructionem Medici exposceret, expectare posset, medicamentum, quod pro aliquot diebus misisset Medicus, una vice deglutit. Dolores ita sedati fuere, somnoque tam profundo corpore fuit æger, ut dormiendo inter homines esse desierit. Balneæ in domibus agris idem accidisse, ex relatione *Dom. D. Caspari Bambini* habeo. Hæc adscribere volui historias, non in eum finem, ut medicamenta hæc præstantissima utilissimæque improbare vellem, quin potius ut notiores Chirurgos admonerem, ut circumspiceret & prudenter ea exhibeant. Ante exhibitionem tamen *Laudani*, aut cujusvis medicamenti arte chymica præparati, prospiciendum est, ut fideliter & ab exercitiis artificis sint preparata. Et quia in præparatione maxima difficultas sita (ut alibi fufius demonstravimus) caveat sibi Chirurgus, ne facillè præscribat medicamenta chymica, nisi ipsemet, aut exercitatus & peritus pharmacopæus illa præparavit: cautiones prætexet; quæ apud *Dn. D. Offervaldum Cretlinum*, & alios leguntur, in eorum exhibitione diligentissimè observandæ sunt. Atque hæc sunt præfida, quibus dolores sedentur, inflammatio extinguitur, & intumescens pars male affecta consumatur. Quod si inflammatio in abscessum abierit, sequenti cataplasmate procuranda & acceleranda est suppuratio.

R. Medullæ panis albi ʒvj.

Radicum althææ ʒj.

Pulv. seminis lini, &

fennigræci ana ʒj.

Ficuum num. vj.

Cum decocto radic. althææ, fiat s. cataplasma; addendo in fœc butyri recentis,

Axung. porcine, recent. ana ʒj. ʒss.

Vitell. s. ovorum n. ij.

Croci ʒss.

Misce, fiat cataplasma, quod calidè applicetur: lenit dolores, & suppurationem accelerat.

Rupto

Rupto abscessu, mundificandum & incarnandum est ulcus, ut aeris est. Sin verò inflammatio de novo in Gangrenam terminaverit, remedia, quæ in curatione Gangrenæ tradita sunt, iterum admoveere convenit.

Cap. 25. De immoderatis vigiliis, inquietudinibus, & mentis alienatione.

Vigiliæ inquietudinesque, ex numero quoque sunt gravissimorum symptomatum, quæ post operationem ægros torquere solent. Ratione enim vigiliarum, & inquietudinum, digestio stomachi simul & suppuratio vulneris, impediuntur retardanturque, vires quoque prosteruntur, & humidum radicale absumitur: cuius loco viscera pravis humoribus gravantur. Moxque febris oritur, tandemque mentis alienatio, & quandoque phrenitis, symptoma longè periculosissimum sequitur. Maturè itaque ægris prædictis symptomatibus correptis succurrendum est. In primis autem, quàm diligentissimè perquirere convenit, quæ vigiliarum sit causa, & quæ aufertenda est. Ea si foret dolor, sedandus est, quemadmodum in præcedenti capite fassus declaravimus. Si febris adfuerit, purgandus est æger; vena item (dummodò vires adfuerint) secanda, & victus ratio præstibenda, de quibus omnibus antè satis prolixè dictum fuit.

Animi perturbaciones, imprimis mæcores, apud huiusmodi ægros, quibus membrum aliquod amputatum est, vigiliarum & inquietudinum non rarò in causa esse solent. Quapropter, ut gravissimi animi ægrum adæant, ipsi quoque blandè alloquantur, animi ipsius à sollicitudine abducant, perquam necesse est.

Ita similiter summopere vitanda: impedit enim non solum somnum, & quietem, verum etiam, sanguinem & humores ita incendit, ut febris inde alienatio mentis, & nonnunquam mors sequantur. Quid si splendor Solis quietem retardaverit, lineis amicis fenestras obstruere, lumenque tecludere convenit. Quandoque fluxus alvi ægro admodè est molestus, ut somnum capere non possit: quapropter restringendus est; Cibus quin etiam talis exhibendus, qui non solum facile concoquantur, multumque nutriat, verum etiam humectet, lenuumque conciliet. Cum carne itaque lactuca, folia violarum, borrago, begonia, portulaca, item hordeum decorticatorum, & huiusmodi coquenda sunt. Aut exhibeantur emulsiones sem. frigidorum, & sem. papaveris albi. Minissimum & optimum remedium, quod potest dari cum debilitate vigiliæ, est tale hordeum mundatum refrigerans.

R. Hordei mundati, dentissimè cocti ʒiij.
Amygdalatum dulciorem insul. in aq. frig. & tolarum tantundem.

quatuor sem. frig. majorum mund. ana ʒij.
Sem. papav. albi ʒj.

Sacehari rosati q. l.

Fiat hordeum mundum, contundendo omnia simul, & coquendo parum post impositionem sacchari rosati. Detur post cenam in introitu lecti, nec sit spissa sorbitio. Conciliat somnum humectando & refrigerando, & vires imbecilles reparat.

Sequens quoque posio intertemperat calidam inter-narum partium mitigat, somnumque provocat.

R. Fol. Lactucæ.

Portulacæ ana M. j.

Flor. Nenuphar. &

Violarum ana M. ʒ.

quatuor sem. frig. major. ana ʒij.

Papaveris albi ʒj.

Liquiritiæ &

Pulsillarum ana ʒj.

Fiat decoctio in aqua ad consumptionem tertie partis. In ʒij. colaturæ dissolve Syrupi de papavere, & nenupharis an. ʒj. f. Misce, fiat posio, de qua bibat æger bis, aut ter in die, jejuno scilicet stomacho, & dabis horis post sompnam cenam, ad ʒiij. pro dosi. Si recentes hebre in promptu minime fuerint, fumeatque sunt aquæ distillatæ cum Syrupis.

Laudum quoque opiatum, triphera item cum opio, philonium Roman. & requies Nicolai, somnum provocant, intertemperat calidam inter-narum partium mitigant, sed cum iudicio hæc omnia exhibenda sunt, quemadmodum præcedente capite juniores Chirurges monui.

Sequens enema somnum quoque provocat, incendiumque rerum mitigat.

R. Hordei mundati ʒij.

herbat. plantaginis,

Violarum

Portulacæ ana ʒij.

Quatuor sem. frig. maj. ana ʒij.

Sem. papav. albi ʒj.

Fiat decoctio in aqua ad consumptionem tertie partis in ʒij. colaturæ dissolve

Ol. Violarum &

Nenupharis ana ʒij.

Capitur ʒss.

Misce, si t. clyster.

Si maximas tamen capitis & ventriculi fuerit dolor, caput autè intendendum esse, monet Dn. D. Raymondus *Mindererus*, quapropter medicamentis live per os exhibitis, live per alvum insusis, aut exterius admotis, camphoram, si dolor capitis adfuerit, minime admiscere solet.

Frans & tempora bis aut ter in die sequenti Linimento inungere quoque convenit.

R. Ol. rosacei &

Nenupharis ana ʒj.

Opil dissoluti in aqua rosacea

Capitur ana ʒj.

Aceti rosacei ʒss.

Misce,

Tempore æstatis nodulus ex sequentibus herbis fecti, & natibus admoveeri poterit.

R. Florum, aut folior. papaveris.

Folior. hyoscyami.

Mandragoræ ana M. ʒ.

Capitur.

Opil ana ʒj.

Aceti parum. Incidantur & contundantur simul in mortario ad usum.

Uno vel altero prædictorum medicamentorum exhibitio, fronte item & temporibus inunctis, & nodulo natibus admoto, fenestris obstruendis sunt, & ut omnia placide, & suspensio gradu citra ægros agantur, adstantibus injungendum est.

Si phrenitis causa vigiliarum fuerit, injectio prius enemare, & secta venâ in cubito, si vicia confluerint, iterum corpus Chologago aliquo medicamento, veluti ex thabarbaro, electuario de succo rolarum, Syrupio rosato solutivo, cum aqua cichorii & lactucæ dissoluta expurgare, cucurbitulæ ac scapulis & nuchæ applicare convenit. Victus frigidus ac humidus præstibendus est. A vino omnino abstinere æger, cuius loco prisanam, aut decoctum agrimonie, cum succo berberorum, citrionum, granatorum, & Syrupio violaceo, & de succo acetosæ bibat. Porio somnifera, reliquæ omnia superius commemorata, hic quoque conveniunt. Topici ab initio sint frigidi; & repetitientis. Abstrahis itaque crinibus inungatur caput unguento populeonis recenti, antiquum enim calefacit: Deinde,

R. Aquæ

R. Aquæ rosarum,
Nymphaeæ,
Solani,
Betonice ana ʒij.

Aceti rosacei ʒj.

Misce, & applica tepidè cum panno. Tempore æstatis, concretis herbis expellatur succus, & cum panco aceto applicetur. Ad somnum conciliandum adde capita papaveris albi, aut eorundem stillarum liquorem. In augmento morbi multis repellentibus pauca resolventia addenda sunt, ut:

R. Ol. violarum &
Rosarum ana ʒij.
Ol. chamom. ʒi.
fucci aut aquæ betonice ʒj.
Misce, pro linimento.

Vigiliæ quàmprimum remiserint, & phrenitis in declinatione fuerit, ab omnibus medicamentis, quæ opium, mandragoram, papaver, & hujusmodi recipiunt, abstinendum est, ne temperamentum cerebri, quod frigidum & humidum est, destruat. In declinatione itaque cum resolvendum est, catulus aut columba per medium dissecta, & calida applicata, summo opere conveniunt: ut quoque pulmo arteriis calidè applicatus hæc vix quàmprimum refrigerata fuerint, auferenda sunt. Pulmonem tamen aqua, in qua betonica, rosmarinus, rose, & flores chamomillæ incoxerint, sacrum exaltescere soleo. Sequens quoque pulvis capiti inspergatur.

R. Flor. Betonicæ,
Anthis,
Salviæ,
Rosarum odorisferarum ana p.ij.

Rad. Iridis Florentinæ,
Caryophyllatæ ana ʒiij.
Syracis calamitæ ʒj.
Macer, fiat pulvis.

Cap. 26. De Spasmo.

Spasmus quoque nonnunquam ægrum post operationem non tantum excruciare, verum etiam non raro cruciatare solet: quapropter ipsius curatio minime hic omittenda.

Spasmus autem sive Convulsio, ut docet Galenus est, qui nervos & musculos in eum cogit affectum, in quem ab animali facultate, cum naturalem habitum fervarent, dicebantur. Io hoc enim malo nervi & musculi in eas partes attrahuntur, quibus innascuntur, verum id motu quodam violento, ac præter voluntatem ægri fit.

Convulsio est aut universalis, aut particularis, Universalis triplex est: aut enim caput, totumque corpus in pedes contrahitur, aut caput cervixque ac reliquum corpus ad posteriora, & dorsum convellitur: Aut corpus immobile manet neutramque in partem inflectitur: sed recta in utramque partem intenditur. Convulsio particularis est, quæ partem aliquam corporis solum occupat. Fit autem hic morbus vel ex repletione vel exanasthione, aut propter putridos & malignos vapores, ad cerebrum & originem nervorum elevatos, de quibus vide supra cap. 17.

Omnis convulsio periculosa est. præsertim ea, quæ fit ab inanitione. Nervi enim post immoderas purgationes, vomitum, hæmorrhagiam intempestivam, & febrem ardentem escicari, non facile humectari possunt, ita quidem, ut morbi acerbissimas vires exolvat, exitumque afferat, priusquam nervi iterum humectentur, & ad temperiem reducantur.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Quapropter convulsionem ex hebetate lethalem, rectè pronunciant Hippocrates, sit enim, propter immodicam evacuationem, quam sequitur siccitas incurabili. Convulsionem ex vulnere lethalem esse; docet Hippocrates, accidit enim propter nervorum partium læsionem, & inflammationem, quibus de causis dolor ingens oritur, qui propter consensum cerebri gravissimè afficit. Convulsio ex malignis vaporibus non minus periculosa est. Vapor enim malignus non solum cerebrum afficit, verum etiam per arterias ad cor ascendit, spiritibusque vitales inficit.

In curatione causa morbi diligentissimè perscrutanda est. Si ex repletione tuerit convulsio, evacuationem requirit, docente Hippocrate. Quapropter vitæ rennis insitendus, corpus expurgandum, & vena secunda, parique affecta, totaque spina doctè sequenti linimento innungenda est.

R. Ol. Lumbicorum,
Vulpini ana ʒij.
Terebinth.
Cerae,
de castoreo ana ʒi.

Axungie humanæ ʒiij.
Succi lumbicorum ʒj.

Misce, applicetur calidè.

Si verò convulsio ex inanitione & siccitate fuerit, nequaquam purgantis, aut sedtio venæ adhibenda, quin potius corpus, quorundem fieri potest, cibis eucharis nutriendum, & humectandum est; de quibus abundè cap. 17. ubi de curatione Gangrænæ ex intemperie siccæ, & penuria alimenti egimus. Si virga magna fuerit, sequens porio exhibenda est.

R. Aquar. buglossæ,
Rosarum &
Violarum ana ʒiij.
Syrup. violacei ʒiij.

Misce, hæque juplurim, de quo sumat æger quotiescunque sibi libuerit.

Emulsionem sem. frigidorum, & lac amygdalarum quoque conveniunt; uti quoque conserva violarum, florum nenupharis & borraginis.

Alvus si non responderit, clyster injiciendus est. Sic autem emolliens simul & nutritius, veluti ex decocto carnis vervecionis, caponis, & gallinæ cum vitellis ovorum parumque pulveris croci, macti, & aquæ cinnamomi.

Pars affecta, totaque spina doctè sequenti linimento innungenda est.

R. Pinguedinis humanæ,
Ol. violarum &
Amygdalarum dulcium ana ʒij.
Succi lumbicorum Wietii ʒiij.
Misce, & applica calidè.

Si convulsio propter consensum, hoc est, exaltescentis doloris, inflammationis & intumescensionis cruci fuerit; dolor sedandus, inflammatio extinguenta, & intumescitio membri resolvenda, ac dissipanda est. Quo in casu sequens linimentum mitrum in modum convenit.

R. Ol. Salviæ,
Anethini;
Chamomil,
Vulpini,
Succi lumbicorum terrestr. Wietii;
Pinguedinis humanæ ana ʒij.
Ol. terebinth.
Aquæ vitæ ana ʒj.
Croci ʒj.

Misce, fiat linimentum.

f

Ambrasi

Ambrosius Pareus Cheirargus æternâ laude longè dignissimus, sequens linimentum in affectibus nervorum præcipuè ex causa frigida oris summopere laudat.

- R. Sulvis,
Chamæpithyos,
Mijoanæ,
Rosmarini,
Rutæ,
Lavendulæ ana M. j.
Flor. Chamomil.
Meliloth,
Anethi,
Hyperici ana pug. ij.
Baccar. lauri &
Juniperi ana ʒij.
Radic. pyretici ʒij.
Masticæ.
Alliæ odoratæ ana ʒj. 6.
Terebinth. Venetæ lb. j.
Ol. Lumbicorum.
Anethi.
Cærellorum ana ʒvj.
Ol. Terebinth. ʒij.
Aungiz humanæ ʒij.
Croci ʒj.
Vin. albi odoriferi lbj. 6.
Cetæ q. l.

Contundenda contundantur, pulverisanda pulveriscentur, postea coquantur cum oleis & aungia prædictâ in vase duplici, fiat linimentum secundum artem. Adde in fine aquæ vitæ ʒij.

Quod si convulsio ex prævis & malignis vaporibus, ad cerebrum aliasque partes nobiles ex trunco elevata fuerit, acceleranda est digestio & suppuratio vulneris. Defensiva aliæque frigida circa truncum applicata, etiam si elevationem vaporem impediunt, quia tamen suppurationem vulneris retardant, nervique nocent, non sine maximo iudicio in spatio uti his licet. Acceleranda itaque est digestio, ut jam jam dixi, ut cum parte unâ quoque vapores maligni exhalare possint. Id autem hic calidæ & humidæ temperatæ, de quibus suo loco abundè dictum est. Saltem hoc addo; Linimentis, quæ vulneri imponuntur, tempest nonnullis theriacæ, Mithridatî & lapidis Bezoar addendum esse. Mithridatium quoque, theriacæ, Bezoar, cornu cervi, aliæque alexipharmaca, de quibus in præcedentibus diximus, per os exhibita, summopere conveniunt. Regionali cordis, uti quoque carpis, epithema applicandum est.

Cap. 27. Agri à præcedente curatione vietus ratio.

Næque verò in curatione tantum causa esse debet Agri dictæ; verum etiam, si favente Deo liberatus fuerit à tam dira & funesta lue, aliquantisper sibi temperabit, laudabili victu contentur, omnem intemperantiam, seu in potu, seu etiam in cibo vitabit, maled magis, quam abstineat, subietari studebit, quandoquidem immixto corpore non tantum alimentis desideratur. Si fuerit juvenis quispian robustus, & sanguine copioso præditus, purgabitur interdu & venam ad minimum bis in anno, præcipuè autem in Vere tundenda corabit. Venas autem maleoli præ cæteris incidere convenit. Plurimum enim, quibus amputatum est brachium vel crus, accidit, ut dum natura de more transmittit sanguinem alimentarium, ut antè solebat, in obstructâ viâ, cogatur sursum regurgitare, & inflammare partes intimas, hepar nimirum, pulmones, diaphragma, & cæteras id genus partes.

Cuidam ex millicibus Germanis, quorum cap. 4. mentionem fecimus, cum utramque ubiam ad poplitæ amputavimus, trunci quinetiam cicatrice ob-

ducti essent, ac æger nihil aliud quàm tempus vernum, quo ad suos se conferre posset, expectaret, circa principium mensis Aprilis dolore torminibusque maximis ventris, febre continuâ, ac tandem Dysenteria quocumque correptus, à qua quinto die morbi exiretibus suis. Causam hujus morbi, regurgitationem sanguinis ad partes Nobiles, hepar imprimis, fuisse, Medici mecum suspicabantur: Cum enim propter laetam victus rationem, & constitutionem temporis, sanguis in hepate audivisset, eumque natura deorsum ad cæca agenda mitteret, sursum regurgitasse, & in ipso hepate, & venâ cavâ propter sui copiam inflammatum fuisse, & acrimoniam contraxisse, rationi consentaneum esse mihi videbatur. Humorem potè illum cum vesicula fellea ex officio copiosè attraxisset, & ad intestina effudisset, secutus est dolor maximus, tandemque dysenteria. Quapropter omnes, quibus membrum aliquod magnum amputatum est, admonitos velim, ut in victus ratione omnem excessum, viramque desideriam, & quæ viscera interna sanguinemque excelsascent, evitent: Econtrâ verò illis, quæ viscera sanguinemque aliquomodo refrigerant; velut sunt sympus gastrorum, de succo limonum, acetosæ, violarum, rosarum, de succo berberorum, & de agrestis, utantur. Corpus per intervalla syrupo rosato solativo, thubarbaro, electuario de succo rosarum, lenitivo & similibus expurgandum est, venæ item poplitæ, aut maleolotum incidenda. Si verò utrumque crus amputatum fuerit, venæ brachiorum pertundenda sunt.

Venus maxime nocua, in ipsa quidem curatione lethalis, & multos etiam post dies plane periculosa. Episcopi rei fidem faciet historia memorabilis Nobilissimæ cupandæ, cui *Cassius Slevanus* experientissimus Cheirargus, Valentis lævam amputavit, ex iâtu Scloperii consultum. Egrotanti juveni voluptatibus dedito, diserte interdictus erat cum uxore congressus: at is valente prope modum persuasus, & sedatis symptomatibus omnibus, eam interpellavit, quæ remente propter scierat *Slevani* monita, ipse emisit spermata cæca colorem, atque hinc recidit prius in febrem, delirio, spasmos, aliæque gravia symptomata, tandemque obiit quarta post die. Ex his intelligimus, quàm infesta sit Venus nervis & nervorum vulneribus, æquæ ac capitis & articolorum affectibus. In aliis quoque morbis acutis nocentissimam esse Veneream, cum aliis, tum in Colonienis quodam observavi. Is enim ex pleuritide ferè liberatus, cum decimæ die morbi uxorem amplexus fuisset, iterum in febrem incidit, & decimo tertio naturæ satisfecit.

Super Amputatione partis Gangranosæ hic rursus, subiungamus quod paucis admodum lineis tradidit Clariss. Antonius Nuck in suis Experimentis. Chirurgicali.

Quotiescunque corporis nostri pars vel sphæclata, vel gangranata, aut alio modò male affecta, ne vicinis locum inferat, ut inutile pondus tollenda occurrat; toties, aut supra, aut infra articulum, si fieri potest, in parte sanâ Ampuatio instituetur.

Cibò itaque potique, vel spiritibus quòdam, aut aromatico medicamentò roboratus patient in sedili, ut decet, locetur; hinc sana cutis cum carne subij. cæ sursum trahatur; mox ad duorum digitorum transversum latitudinem (supra locum incidendum vincens) fortiori, quod lignò bacillo, *Tercidur* propterea dictò, contorqueatur, pars amputanda arte constructatur; quibus peractis, cuncto saltatò celestis in orbem dissecetur, periosiumque (& si duplices os necesse erit & ligamentum intermedium simul separandum) illico ab offi abradoendo separatur. Non tantum diu huic operationi incumbendum, quoniam magnè utilitatis tempus non est, & Patienti maximam molestiam affert solet.

Mox *Serrâ squiers* ossa præcidamur, & hæmorrhagia, si major fuerit, Caustero *Actuali* sistatur, dummodo elictura ejus beneficio iuducta, postea decidens, novæ hæmorrhagiæ causa non existat.

Nonnulli hæmorrhagiam inhibere laborantes, abscessu vasa *Tenacula* appendunt, eaque nō deligant, verum cū hic modus admodum sit inobtus, & Patienti dolorificus, illum omnino improbamus.

Præstabilis itaque *Pulverem sypicium Albumini* Ovorum permixtum, cum *Plumacellis*, Perilisque applicare: vel Fungum illum *Boviss*, qui in sanguine istendo non ignavam semper navat operam, patribus sanguinem eructantibus admoveere.

Stypticum interim multoties felici cum successu adhibere sequens est:

℞. Bol. Armen. ʒiij.

Calc. Vir.

Pistiol. ʒss.

Alum. ʒss. aa. ʒi.

Lap. Hamarit.

Aloes Lucid.

Sarg. Dracon.

Terr. Lemn.

Croc. Mart.

Manna aa. ʒiij.

Maffich.

Tinur.

Oliban. aa. ʒi.

Al. F. Pulv.

Si verò Hæmorrhagia minor fuerit, font, qui statim, factâ *Exsiccatione*, e, filo cetâ obducto, quatuor in locis cutem cum carne perforant, hinc priore vinculo soluto, eandem deorsum ducunt, atque ita cutis extremitates propius ad se invicem accedentes externum ætrem excludendo, subjectum os à corruptione præservant, vulnusque citius curatur. Verum hæc methodus jam apud plerosque inolevit, & modò præscripta familiarior est.

Styptica igitur admota, beneficio *Emplastri defussæ* & *plumacis* in suo convenienti detinentur: quod Emplastrum in crucis formam præparari debet, ut extremitates ejus eo melius parti affectæ adaptari possint, quibus omnibus Vesica bubula superinducitur, & ad immotâ compressâ unâ aut alterâ, *Fasciâ Cruciatâ* inspicitur.

Nonnulli Manum *Sphacelo* correptam aut oculo *Cancro* afflictam (factâ prius ligaturâ) *Scalpro* majore, cum successu amputare solent. Corrupti verò digiti aut pollices, facili negotio vel forcipe vel forcipe robustiori abscinduntur.

Fusus hallensis de membrorum, vulgari methodo de curandis ratione ex Clariss. Viris Guilielmô Fabriciô Hilidanis, atque Antonis Nuckio, æquum, in illisque meritis subsisteremus, si aliam, eoque & curiosam, & forsitan etiam nulliusmodi in hac operatione perficiendam methodum nobis exhiberet Celeberrimus ac Perissimus Petrus Hadrianus F. Verduin apud Amsteladamses Chirurgus sebesionis: Cuius propterea Dissertationem Epistolicam cum adiectis figuris, recensuimus, anno 1696. vulgatam, additâ etiam in eadem argumentis, observatione, & animadvertionibus quas in Epistulâ suâ Anatomica problematâ decimâ quariâ, Præclarissimus adfert Fridericus Rhujfchius, Sui itaque primò,

Illustrissimo, Nobilissimo, & Amplissimo

VIRO

NICOLAÛ VVITSEN;

Urbis Amstelædamensis Consuli ac
Senatori,

In Concilium Delegatum Hollandiæ sapiens.

In Consessum Ordinum Generalium
quondam Delegato,

*Federati Belgii ad Magna Britannia
Regem*

GUILIELMUM

Exlegato Extraordinario.

Societatis Indiæ Orientalis Assessori &c.
&c.

S. P. D.

PETRE HADRIANI F. VERDUIN.

Diu multumque dubius hæsi, Vir Amplissime, an Te, maximis Reipublicæ, ac quidem hoc tempore calamitosi, negotiis occupatum, & oō nū soli-diora studiâ meditantem, levioribus hisce meis interpellate essem aulus: Verum Tuâ stetit facilitate, quâ omnes, etiam minimos, qui tuum impiorant auxilium, audire non dedignaris, haud ægrè Te laurum spero, si à Te modestè petam, ut novum hoc meum, quod vidisti & probasti, de crurum amputatione inventum, Illustrissimo Tuo Nomini inscribi permittas, Promulgandum equidem, cum aliis viris doctis, iudicasti & cū nihil mihi sit antiquius nihilque religiosius, quàm Tuis obtemperare mandatis, è te ita esse credidi, hoc qualecunque inveniam, Tuis sub auspiciis, publicum facere. Tu enim, qui apud omnes nationes multis nominibus notus es, fortiter illud tueri, magnamque ipsi pondus adferre potes. Mortam minus hæc in te trahendam putavi, hoc opportunè id experiundi tempore, quò, ex infestissimo inter omnes terâ Christianos bello, multi artubus truncati, multi cruribus orbi redduntur, qui hæcè novâ meâ methodò, brevius non tantùm & felicius restitui possunt, sed ut etiam genâ stectere, & ipsâ truncatâ parte iuncta, imò ei insisteret, maximò commodò queant.

A multis jam annis observavi, plura citra æquum asper deliderati, plura minis rectè perficî cum respectu ipsius operationis, tum etiam ratione apparatus ad eam, & maxime quidem, fasciarum, quæ magno molimine, & multò majori quàm natura te requirit, adhibentur: Unde factum est, ut potentem novum omnino & succinctum apparatus invenirem, quem facillè & procul ab omni periculo quisq;, etiam minus in arte exercitatus, imitari posset, cū e contra, vel versatioribus Chirurgis, quandoq; infeliciter contigit, ut ex vulgâ fasciâ involvendi normâ, Gangrenam parti induxerint. Decurrationem ipsam quò spectat, mirum in modum me semper affecit, promptum illud & stupendum nature opus, in partibus sibi invicem agglorinandis, licet longissime distictis, si abscessu cure, labra earum vulnerata & sanguine madentia, proximè duxerant ad invicem jungantur, ac probe conjuncta fervent, cujus rei frequentissima in præxi m. 2 habui exēpla, imptimis in

rescindendis labiis leporinis, etiam maxime distantibus, unde mihi aliquoties in mentem venit, an non in decurtandis artubus simile quid præstari possit? insignis obstat difficultas; quod scilicet animadvertet, partem, in qua opusculo est instituenda, maxime esse osseam, parum carneam; videram equidem aliquoties in vinctibus capitis aliique, denudatam etiam os, si aeris inquinamentum subito ob ipso accretet, aggregationem superinductæ carnis tulisse; verum id in truncato osse, & medullam continente, nunquam factam expectavi: nec etiam sufficiebant, ad illud os tegendum, laxata cutis & caro, solito more, ante mutilandæ partis constitutionem, tutum, quamvis fortiter, attrahere. Hæc meum torquebant ingenium, & tentamen morabantur; præcipue cum operatio hæc per se esset ambagibus plena & crudelis; in qua & æger & adstantes, multo terrore percussu, non facile dubium & difficile experimentum in se primis admittunt. Porro dum varios, & primam familiam ducentes Chirurgo consulto; fuit antiquos semper Hippocratem, Cornelium Celsum, Paulum Aginectam; inter recentiores Ambrosium Paræum, Gasparum Tallacotum, Guilielmum Fabricium Hildanum, Hieronymum Fabricium ab Aquapendente, alioque præclaros Viros, video sanè illos, etiam de truncandis artubus, & eorum Chirurgiæ ex professu agentes, tamen ne verbum quidem, de artuum per institutionem curandorum methodo protulisse. Atque etiam, quamquam in magnis aliquid quoque tentasse, laudabile est, facili quæ columnis meriti nova experiri veretur, ut, *veritas enim comes inviolata*: & sapienti profecto illis meriti, me, quæ & artis erant & rationis facere, deteritum æque tentatum confiteor. Hic eulm doleto possem, quoties, supra vulgus in meâ professione sapere annisui fui, & majora in arte mo lei (tamen id masculè fecissem ac feliciter, ut, si Deus siverit, observata mea, ubi in publicum prodierint, aliquando probabunt) nihilominus tales, qui quæstui docent male loqui de melioribus, illa vel vituperare vel minoris fecisse.

Dum sic protraho hujus operationis instituendæ desiderium, in mihi literas cujusdam Londinensibus amici, olim mei Discipuli, & qui apud me vixerat: ille, qui noverat perit ego illustrandæ artis arderem cupiditate, scribit Profocorem suum, inter Londinenses Chirurgum dexterrimum, hanc, quam meditabar, methodum ex parte instituisse; scilicet in cruris decurtatione versasse suam, eamque truncatis ossibus applicuisse, idque eo successu, ut sibi invicem adhererint ac coalescerint; parum vel nihil de cæteris circumstantiis. Vereor Imperfectiorem fuisse ejus instituendi rationem eam, quantum rescire potui, nullius alius ibi ipsum fuisse imitatus; hodieque in ipsi Angliæ aequè parum ac in cæteris orbis regionibus hæc Methodus invaluerit. Imò & inter illos nuper Vir Nobilissimus in tebus medicis multum versatus, hanc à me peractam operationem per litteras cujusdam familiaris edoctus, per eundem petiit, ut integram hujus instituendi historiam, ad se transmitteret, quam, tanquam rem novam, raram & scitu apprime necessariam Societatis Regiæ actis inseri volebat.

Verum, Vir Nobilissimus, ne in publica commoda peccet, si longiore sermone tua tempora moerent, rem ipsam aggrediar, & primò Instrumenta, quibus uti soleamus, & plurimà à nobis ut excoquinata aut emendata, describam: deinde ipsum operandi modum, & in illò observanda, verbis quam perspicuis, adjungam; postremo utilitates & commodas, quæ ex eo proveniunt, subjiciam: imò, quod facilius & clariùs hæc intelligantur, multa, juxta eorum adhibendi methodum artis incisa, artis Chirurgicæ cultoribus ob oculos ponam.

Instrumeta autem, tam ratione materiæ, quam temporis, quò applicanda, sunt varia: Alia enim ex

curo, alia ex terro, alia ex chalybe vel quælibet aliâ materiâ idonea sunt fabricata: Respectu temporis; alia in operatione, alia post illam, alia denique Sanatione peractâ adhibentur.

In Operatione.

1. Requisitus Cingulum quoddam laxum constructum, ex curio viniliod, quod vulgò pingue audit, fabricatum, & ad crassitatem femoris decurtandi cruris accommodatum, cum tribus corrigiis & duobus lincis appendentibus; juxta internam extremam faciem, Tabulæ A. figurâ primâ & secundâ delineationem.

2. Lamina concava, ex ære, aut aliâ quâvis materiâ ductili, ad mutilandæ partis periferiam complectendam, parata: secundum Tabulæ A. figuram quartam.

3. Zona gracilis ex prædicto curio confecta; alterò extremo fibulâ aneâ munita, alterò moitis foraminibus ex ordine, & exiguis interjectis spariis, pertusa; quam figurâ undecimâ Tabulæ A. denotat.

4. Sex linguæ, quibus corrigiæ, lura & Zona clauduntur; quas ubique à fibulis liberis reliqui, ne ullas corrigiarum, Lororum, aut Zone, inter claudendum, sit retrocessus; qui evitari nequit, si linguæ, ut solent, fibulis sint affixæ. Harum quinque Tabulæ A. figurâ tertiâ, & una Tabulæ ejusdem figurâ undecimâ literâ A. notata, sunt delineatæ.

5. Duo Spatula tertia & crassi, duos tresve digitos transversos lara, & Spithamam circiter longa; ut figurâ quintâ, & sextâ Tabulæ A. exprimitur.

6. Lineum quadruplicatum, cingulò constructori majus; figurâ septimâ Tabulæ A. demonstratur.

7. Tarsia vel vitra lata ac validâ; Tabulæ A. figurâ nonâ denotata.

8. Bacillus, ad vitam prædictam constringendam, ejusdem Tabulæ figurâ decimâ depictus, & eorum usus Tabulæ A. figurâ decimâ octavâ.

9. Sint in proximâ duæ resve vesicæ bubulæ; quarum una parata & aquâ emollita, figurâ decimâ sextâ ejusdem Tabulæ est delineata.

10. Toridem fasciæ emplastrò glutinoso (exempli gratiæ Emplastrò Dischalcitico tantillo Theriacali commixto) illitæ; duos tresve transversos digitos lara, tres, plus minus, spithamas longæ, alterâ extremitatè paululum lucidæ; ut eadem Tabulâ figurâ decimâ septimâ denotatur.

11. Sit quoque in promâ funis orbicularis veteracitè Borsii, Linamentum, & stupa; quorum quardam frusta, plomaceoli & pulvis, figuræ decima tertiâ, decima quarta, & decima quinta ejusdem Tabulæ, demonstrant.

12. Ne sit inter fenestra Lutci detriti & mundati; ex quo Spentia, piagula & fæces requiritur ac in Leonibus designatæ, parantur.

13. Castilleo cum aquâ tepidâ & molli spongia; quem Tabulæ ejusdem figurâ duodecimâ indicat.

14. Culter falcatus & anceps, quorum duo diversæ magnitudinis, Tabulâ A. figurâ 23. & 26. sunt delineati.

15. Separatorium potest esse paratum, si cui eò uti lubet, cujus effigiem, ejusdem Tabulæ figurâ 24. habet.

16. Bina sectæ, tenuissimarum laminarum, acutissimique dentibus præditarum, quarum Schemata eadem Tabulâ, figurâ 22. & 25. videbis; alteram majorem, in femore, aut crure obedi adhibendam; cujus arcus extremum manubrîo, literâ A. signatò, munitum est; quò, dum adhibetur, manû atreptâ, Secta majori vi reciprocet & adigi potest, ut eò clitor ossum fiat distinctio: Alteram minorem, in minoris crassitie extremitatibus idoneam.

Post Operationem, & quidem primò apparatus remouend.

Instrumentum Retentivum, cujus prima pars, femoris postico lateri, latus parvum, aut finem complicitis prius vestigio admoveatur; altera pars carnem trunco adjuuctam, & plagula rectam sustineat. Cujus integri Schema, nec non in partes divisâ, Tabula B. figuris 1. 2. 3. 4. invenietur.

Paniculum, plagula & fasciâ, quæ ad ejus applicandi modum requiruntur, eadem habes Tabula, figuris 5. 6. 7. & 8.

Ipsæ verò modus applicandi & usus, ac etiam quæ ad vulnus tractandum requiruntur, Tabula B. figuris nonâ, decimâ, undecimâ, duodecimâ, & decimâ tertîâ describuntur.

Vulneris Sanatione consummatâ.

Crus artificiale, ex ligno aut alia qualibet materia levi fabricandum. Pulvillus ex fœtis equinis contortis aut coctis & alutâ rectâ compositus, munitur parti subspiciendus, quorum formas, & usum Tabula B. figuris 16. 17. & 18. describitur.

Deniq; colligæ ex alutâ, ad trunci, genu, & femoris castitatem & formam accommodata, quæ figurâ 16. Tabula B. est depicta.

Hactenus quæ ad hunc actum ex arte perficiendum à nobis necessaria judicantur, enumeravimus arma: Quibus si supersit quid aut desit quod potest, quippiam addere aut demere, per me integrum erit, quippe quæ facili quondam admittunt mutationem: Sæpe etiam pro te natâ, & loci ætatis opportunitate res sunt disponendæ. Nunc eorum, apertissimis, quantum poterimus, verbis usum trademus.

Si igitur Chirurgus crus offeratur decurrendum, ante omnia ægri examinanda sunt vitæ, ante operationi ferendæ sine periculo: Præterea pars afflicta, quæ quò magis lægra & carnea, eò aprior: cautè eorum prospiciendum, ne Sphacelò isortum afflicto crui, aut aliis morbis nimium corrupto, culter adhibeatur; vana enim & inutilis foret operatio. In homine itaq; haud male habito, atq; crute totosq; operatio sequenti modò est instituida.

Ægri luci clariori opposito, femorè denudato, primò Splenia tertetia, unum in poplite, inter tendines crus flexionem, alterum ad internum femoris latus, ubi magna sita sunt vasâ, applicantur. Tegantur hæc, nec non infima pars femoris & genu quadruplicato linteo, quæ fasciolâ, ut suo loco maneat, obvolvî possint. His cingulum latum constrictionum superimponatur, quod upe brevium corrigatur, fibulæ & lingularum, similiter in poplite claudatur, ut valorum sanguiferorum fiat coarctatio: Majoris tamen constrictionis gratiâ, Tenuis lata ac valida omnibus superinjiciatur, quæ bacillò, inter operandum, à famulo contorqueatur: quod instrumentum hic apud Gallos audit *Tennigum*, & ab illis subinde hinc loci, subinde circa inguen, femorè admoveatur.

His ita præparatis, illa pars cinguli, quæ genu tegit; cum locis dependens, retractum, ne operantibus obstat, flexatur.

Deinde crus, gracili Zooi, paulò super locum, ad amputationem destinatum, arctè constituitur, à duobus vitiis interceptâ, alterò crus circa Zoonam, alterò pedis articulum amplectente, immobilitate teneatur.

Mox iura, levâ manu arrepta, culterò falcato & accipit, ab ipsâ Zonâ crus constantè inchoando, juxta cruris longitudinem, pone ossâ, deorsum abscindatur. Reliquæ verò cruris carnisque partes, ut moris est, transversim incidit, separatò nunc, eodem culterò, periossiò, unâ cum ossibus Sæpi decurrentem, retroruscâ innotum, ubi læturæ Sæpi decurre, prædictâ avulsâ carnis portione. Extemplo jam vulnus recusat, molli Spongâ, aquâ

Bibl. Chirurg. Tqm: 1k

tepidâ unguâ, abstergendum, ne quid scobis vulnere remaneat, quod sanationem temerari possit. Quò factò, ac Zonâ constrictionis solutâ, remota carnis parva discò citius, antroforum est restitenda, & molliatæ parti coaptanda. Vulneris ora sang, linameno, stupi aut aliò quovis stipicidione (pauillum enim requiritur) totiusq; truncus vesicâ bovina, aquâ tepidâ emoluit, tegantur, quæ fasciolâ, emplastro viscoso oblitâ, circumvolvuntur: Necessitate autem urgente, alutæ vesicâ, more prædicti, superinjici potest.

Deligantur hîc modò vulnere, plagula seu linteum complicatum trunco imponi debet, illi verò lamina concava, quæ prolisioribus cinguli constrictioni (cujus pars anterior jam genu est adspandâ) locis discussis atq; tepia, sursum; quadantenus tracha, mediocriter, quamvis acutè etiam latis, in genu duabus fibulis suisq; lingulis claudatur; atque sic, vel copiosior commode & totò inhiberi consuevit hæmorrhagia.

Modus hîc deligandi Tabula A. figurâ 20. liquidò designatur. Et, ne quicquam sibi loco recedat, unde nova hæmorrhagia, aut aliud quid incommodi possit oriri, fasciolam muniendi causâ addere solemus.

Illâ supra genu injectâ & contortâ Tenuis jam est laxanda, quæ quidem, si nova hæmorrhagiâ non esset metus, (quam nunquam, adhibita hîc vulnere deligatione, etiam in vulgari amputandi methodò, me vidisse affirmo) mox posset auferri.

Si etiam cingulum constrictionum plus æquò constringere videatur, faciliè tantillam, tenuissimâ pauillulum corrigat, laxari possit, quod in fasciarum usû non item; id inibiolumis quibuscumque horis post operationem fieri, laus est.

Habes hîc, Vir Illustrissime, insolitam hanc, & à nobis excogitatam corruptos, nec ullâ arte redintegranda, ætate demendi rationem ac methodum: In bacchis enim, imò in femoribus æquæ ac in cruribus eam adhibendam censeo, si sagax modò Chirurgus, ea quæ ad rem requiruntur, pro partibus decurrandæ sanæ ac conditione scire mutare atque disponere noscatur. Quæ aut distinctè latis hîc me verbis, quantum potui, elucidis (brevis enim, attamen perspicuus esse labori) proposuim, perspicaci Tuo judicio subspiciuntur: Si verò descriptioni quid desit, id ex adjunctis iconibus probe Te intellecturum nullus dubito.

Hactenus instrumentorum adhibendorum, vulnereq; optimè certissimèq; deligandi modum exhibui; quem dexterrimis Chirurgis laus exponere supervacuum foret, unde, ut in diverbio est, *manum de calidâ*. Verùm cum & hanc, in tyronum & minus exercitatorum manus oculorum prævidem dissectionemq; operæ pretium me lacrum putavi, à in eorum gratiam, qui lætari hoc vulnus debeat, adjungam. Sciant ergo tyrones, ejusmodi vulnere, & quidem maxime in principiò, admodum cautè esse tractanda, ne qua proxima pars ulli modo lædatur, nedum abscedat, verùm potius molliatæ parti conjuncta servetur, quæ facilius unitæ jam partes in unum coalescant; quem in signum aliud quoddam, haud contemnendum, excogitavi instrumentum, Tabula B. figurâ 1. 2. 3. & 4. delineatum, necnon ejus usus ejusdem Tabulæ Figurâ nonâ, quod, primò apparatus remouend, in usum est revocandum; qui est partes sibi invicem unitas conservare; ne, vel inter curandum, ullò modò discedat, relicta ad id vulnere oris in totum libera.

Instrumentum hoc, cui nomen Retinaculi imponere lubet, duas habet partes, altera est lamina ferrea vel cuprea tenuis, ad dimidiat femoris truncum cunctis peripheriam & formam incurvata; hujus extremitatibus alutæ vagina ex eadem substantiâ oblique sic affixa, quæ eminentiam alterius partis capere, & cochleâ, quæ in vaginæ posticâ est parte, clausâ, retinere possit; al-

T 3 terâ

tera pars rotunda est lamella, cochlearis instat utcumque cava; cui eminentia prædicta sit affixa, ut in Tabula B. figuris primâ, secundâ, tertiâ & quartâ videre licet.

Modus applicandi hic est. Primum panniculus aut linteum complicitum posteriori femoris lateri, & huic prima pars instrumenti accommodetur, tali modo ut truncus vaginæ incumbat: hæc fasciâ femori alligetur, & truncus vaginæ aliâ fasciâ.

Deinde eminentia alterius partis in vaginam est immittenda, usque dum lamella cava, carnem mutilatæ parti adjunctam linteoque tectam, suffulciat; postremâ cochlea in posticâ vaginæ parte, est torquenda, ne, cû clausâ, lamella discedat; sed ita carnem mutilatæ partis carnî probe cointam confervet, etiam interna dum vulnus, fasciâ & plagulâ solvitur, quotidie curatur; ut in Tabula B. figurâ nonâ, ubi ejus usus demonstratur, dilucidè patet.

De Medicamentis ad vulnus sanandum necessariis, non est quod multum dicam, nec non qui vulnus ipsum sit tractandum, quoniam qui artem modò a limine salutarint, facile sciunt, quid ad recens vulnus, consolidandum, atque cicatrice obducendum, desideretur; nec eos latebit splenio esse tegendum, & fasciâ obvolvendum.

Ipsas jam varias utilitates atque commoda, quæ ex nostrâ hac profuunt agendi methodo, cognoscere si desideres, Vir Illustrissime, hæc sunt præcipua: Copiosissima, frequens aliâ, sanguinis profusio, debilitatis plerumque causa, è vestigio supprimitur; ut si leam ingruentem nonnullam Gangrænam metam exulare. Atque hæc, ut vera dicam, sola in causâ fuisse, quare jam dudum, imò in triviali decurrandi modò, antiquum illum fasciarum usum rejicere, ac ceterorem morem circumspicere fuerim coactus: Quid enim molestius, quid periculosius, quam ætissima illa longissimorum involucrorum compressio? unde perfacile Gangræna; quæ constititio si minor fiat, novum sanguinis obstruere profuvium: Quam Scyllam & Charybdim hæc pyxide navigantis tui evitabunt Chirurgi: Et cò magis hæc Operandi methodo, quod carne carni junctâ, hiamia Vasorum oscula ipsâ carne obducitur.

Aliud sanè commodum non minimum videtur, cûm aliâ crebrè soleant separari ab osse aëre tactò quadam fragmina, sæpè numero omnimodum sanationem impediencia, aut ad minimum protrahentia; quæ nulla hanc nostram methodum sequentem Chirurgum temeratur. Nec est quod quis timeat superficiei ossis, crudò aëre, aut ferrâ tactè separationem; cûm jam olim multoties observâim, hanc non adeò, ut quidam volunt, esse necessariam. Insuper, quod mirari dignum, & scrupulum injicere posset, ne ipsa quidem supereminens caro, quâ vulnus tegitur, ut ait magna, quipiam adferet incommodum, tantum abest ut demat; quandoquidem labia illa ita contrahuntur, ut parva admodum cicatrix, in anteriore, aut, si major, superiore tibie parte relinquantur; ut in Tabula B. figurâ 14. manifestè liquet: Ex quibus etiam multò citior vulneris est Sanatio.

Ex prædictò commodò tertiâ, quæ si qua alia, ipsi ægro quidem maxima, oritur utilis: ut scilicet parti, hòc modò mutilatæ petecomodè adaptari queat, ex quavis levi quaterâ, arte factam, caligâ calcèque ordinandam, atque ita naturale membris, crus: cuius ope haud secus ac altero posset incedere: Quapropter hic monendum est, ut quàm longissimus, in decurrandò, servetur truncus, ut cò similis crus scitum illi adjungatur. Nec est quoque quiddam quis metuat, ne agglutinata illa decurrato artui caro incommodum aderat, cûm cû è contrario relictum crus tanquam pulvinari, sine ullo dolore, innitatur & Incessum admittat, remanente quoque in genâ morò voluntariò, qui, si subinde

inter sanandum genus non moveatur, omnino aboleri videtur.

Deniq; silentiò præterire non possum al'ud quoddam emolumentum, nequaquam ponendum; nimirum, quòd hòc modò relictis non conquerantur, ut quidem alii, de dolore Sympathethicò in pede curis ablati, qui dolor magnus, ut alios multos, idque per diuturnum molestissimè infestat tempus, ita ab his ne minimus sentitur; quod & deud me docuit usus in vitò pauiò post memorandò, qui antea, solitò more, pede truncatus, hòc dolore admodum infestabatur: jam vetò genu propius crure decurratò, ac per incisionem, juxta methodum nostram curatò, dolor ille planè cessavit. Cuius rei causam, licet Philosophis terumque naturalium ablatum indagantibus foveat maxime proprium sit, tamen si meam (salvò aliorum iudiciò) liceat proponere sententiam, hinc deduci posse arbitror; quòd nervorum extremitates, in vulgari modò truncatis, levi duntaxat cicatrice obductæ, & aëris aliiq; injuriis expolitæ, facili negotiò tangantur atque offendantur; unde illic è spirituum ad cerebrum recursus, in mente, præcedens in pede incommodi recedant, ameli qui doloris sit perceptio: Quod in his, ubi nervorum extremitates tantâ carnis mole sunt coopertæ, locum habere minimè potest. Quæ res sanè non exiguum adfert commodum, & quidem ex præcipuis est causis, quòd æger mutilatâ parte innitè & incedere queat; quæ aliâ minimam non seie percussam.

Plura enumerare non est animus, sufficient vel hoc unum, quo prædicta confirmare queam, subijcere; quod meus hic agendi modus tam prospicere fuerit institutus avibus, ut hujus Urbis No. comiti Chirurgi, mea vestigia pressè secuti, virum triginta præter proprios annorum, secundâ vice, altero pede truncarint, & per incisionem sanarint: & quidem adeo feliciter, ut nullus dubitem, quin iisdem emolumentis brevissimè sit gavissurus æger, quibus nosser fuit adolescentis; Truncato enim non tantum infisit ac incedit cruri, vetum tam libetè gressu flectit, ut intermiscere sit difficile, quo crure magis laboret truncato-ne an integro; ut in Tabula B. fig. 18. videre est.

Vale, Vir Illustrissime. meosq; conatus, quò sola aliorum, favore prosequere. Ita fiet, ut Spartam hanc, quam nasci sum, Chirurgicam, ulterius, Inò sub præsidio, sicut ceterarumq; sanarum, impetum plura non indigna hæc, cui præes, Republ. elaborandi, & magnò miserorum hominum bonò evulgandi.

Amstelædami Sexto Idau Junii, Clò MDCXCVI.

Tabula A. figurarum Explicatio.

Fig. 1. & 2. Cinguli larii constitutionis facies interna externæque demonstratur.

Fig. 1. A. Facies ejus interna, & quidem partis femori applicandæ.

B. Pars genu adjungenda.

Fig. 2. A. Facies externa partis femori applicandæ.

B. Eiusdem faciei pars genu adjungenda.

Fig. 1. & 2. C. Tres corrigiæ, quibus cingulum in poplite clauditur.

Fig. 2. D. Fibula tribus foraminibus oblongis, ad prædictas corrigiæ transmittenda, pervia.

Fig. 1. & 2. E. E. Duo loca, quibus lamina concava clauditur.



Fig. 2. F. F. Fibulæ duæ, quarum foraminibus extremitates locorum sunt trajiciæ.

Fig. 3. Quinq; lingule, foraminibus tam corrigiarum quàm locorum, transmittendæ.

Fig. 4. Lamina concava, truncò post decurratum crure, adjungenda.

NB. Methodus horum instrumentorum applicandorum hujus Tab. Fig. 18. & 20. ostenditur.

Fig. 2.



John Martin Hoff









Fig. 5. Splenium crallum, popliri imponendum.

Fig. 6. Splenium paulo latius, interno femoris lateri adjungendum.

Fig. 7. Linteum quadruplicatum, quo totum femur, genu & splenia teguntur.

Fig. 8. Fascia, quâ prædicta quadratenus posuit obvolvitur, ut suo loco maneat.

Fig. 9. Vittâ vel Tarsia.

Fig. 10. Bacillus Ligneus, ad Vittam centurquendam.

Fig. 11. Zona Gracilis, cum sua lingula A.

Fig. 12. Carillus cum aquâ & spongiâ.

Fig. 13. Frusta Fungi urticularis.

Fig. 14. Plumaceoli ex linamentis.

Fig. 15. Pulvilli ex Stupâ.

Fig. 16. Vesica parva & aquâ emulsa.

Fig. 17. Fasciola Emplastri Glininum oblita.

Fig. 18. Femur & pattem Cruris, cui altera pars est dissecta, demonstrat; reliquâ carnis portione mutilatæ parti adaptandâ.

A. Pars femoris

B. Linteum complicatam femur regens.

A. Cingulum constrictorium.

B. Ejus pars Genu regens, cum loris E, E. retroflexum fixa.

C.C.C. Tres Corrigiæ, quibus Cingulum clausum est.

D. Fibula ænea, cui corrigiæ per tria foramina sunt traductæ.

E.E. Duo Lora.

F.F.F. Lingulæ tres, quibus corrigiæ sunt clausæ.

C. Tarsia vel Vittâ.

H. Mannus quæ Vittam, ope bacilli L. contorqueat.

I. Bacillus manu arreptus.

K. Genu.

L. Pars Cruris.

M. Zona, crus arcu constringens.

N. Portio Caruli ex Surâ exacta.

Fig. 19. Pars cruris amputata.

A. Locis ubi portio carnis exacta est.

Fig. 20. Totum apparatus, crure jam deligato, ostendit.

A. Femur.

B. Linteum complicatum.

A. Cingulum constrictorium.

B. Ejus pars anteriorum in genu jam reflexa.

C.C.C. Tres corrigiæ.

D. Fibula ænea.

F.F.F. Lingulæ tres.

G. Vittâ jam laxata.

E.E. Duo Lora, quibus Lamina concava H. deussatim amplexa, & trunco adjuncta est.

H. Lamina concava.

I.I. Dux fibulæ, per quarum foramina lora traducta, & lingulis suis K. K. clausa sunt.

K.K. Dux lingulæ prædictæ.

L. Vesica trunco applicata.

M. Fasciola emplastru glutinoso illita.

N. Plagula, trunco ante laminæ applicationem, admuta.

Fig. 21. Fascia, quâ lora & totus trunco, ne quid sub loco decedat, obvolvuntur.

Fig. 22. Scira Major, in femoribus aut cruribus obiecta utenda; cujus arcus extremum manubrio, literâ A. signato, est munus, quod, dum utimur, manâ arreptâ, Scira majori vi reciprocari & adigi potest, ut eo eliciat ossium fiat dissecio.

Fig. 23. Culter falcatus major, qui etiam est anceps, quo solo omne quod scindendum & separandum est, exceptâ ossium dissecione, absolute consuevit.

Fig. 24. Separatorium: Si cul en uti libeat.

Fig. 25. Scira Minor, in tenuioribus amputandis artibus idonea.

Fig. 26. Culter falcatus & anceps minor.

Figurarum Tabula B. interpretatio.

Figuræ 1, 2, 3, & 4. Instrumentum retentivum live Retinaculum, cum annexis, designant.

Fig. 1. Pars prima ex tenui laminâ ferrea, A. ad dimidiam cruris peripheriam incurvata.

B. Vagina ferrea, priori affixa.

Fig. 2. Altera ejus pars, cochlearis instat, utcumq; a vagina C. cui eminentia E. vaginæ immittenda, est affixa.

E. Prædicta eminentia.

Fig. 3. Cochlea, cujus upe eminentia, in vaginâ premittitur, clauditur & retinetur.

Fig. 4. Partes prædictæ conjunctæ.

A. Pars prima.

B. Vagina ejus.

C. Altera pars, cujus eminentia in vaginam est immittenda, & cochlea D. clausa.

D. Cochlea, quâ eminentia premittitur & ita retinetur.

Fig. 5. Panniculus femoris, priusquam prima lamina adjungatur applicandum; cujus loco linteum complicatum adhiberi potest.

Fig. 6. Fascia, quâ femori alligatur.

Fig. 7. Fascia, quâ truncus vaginæ annectitur.

Fig. 8. Plagula seu linteum complicatum, carni adjunctæ prius imponendum; postea lamellâ cavâ fulciendum. Quæ omnia hujus Tabulæ figurâ nonâ demonstrantur.

Fig. 9. Usus Retinaculi, prius designati indicat.

A. Femur nudum.

B. Panniculus posticum femoris regens latus.

A. Lamina primæ partis, femori applicata.

B. Vagina ferrea, priori laminæ affixa.

C. Lamella concava, carnem foræ trunco conjunctam amplectens & sustentans.

D. Cochlea, mediante quâ eminentia E. in Fig. 2, in vaginâ B. premittitur & detinetur.

E. Fascia, quâ lamina prima femori annectitur.

F. Fascia, quâ truncus vaginæ alligatur.

G. Plagula, vaginæ impolita.

H. Linteum complicatum, quod cito adjunctâ cooperta est.

K. Genu.

L. Pars cruris mutilatâ.

M. Caro excisa prædictæ parti adaptata.

N. Vultus crudum.

Fig. 10. Plumaceoli unguento illiti, vulneri applicandi.

Fig. 11. Emplastri huius imponendum.

Fig. 12. Plagula seu splenium ad partem regendam.

Fig. 13. Fascia, quâ tota pars obvolvitur.

Fig. 14. Tota Pars jam sanata, omnibusq; emplastris ac vinculis soluta & libera:

A. Femur.

B. Genu.

C. Truncus, seu pars mutilata.

D. Caro Suræ, parti mutilatæ adnata.

E. Vulnere cicatrix, in Tibiâ vel cruris antico latet.

Fig. 15. Caliga ex alutâ, trunco & femori induenda.

Fig. 16. Crus artificiale designat.

A. Pes ligneus caligæ & calceæ ornatus.

B. Vaglos ex laminâ arenâ, duobus locis, ad truncum immittendum, incisâ.

C. Fibula, quâ vagina post immisissam truncum, quadantenus clauditur.

D. Locus ubi vagina pedi ligneo est affixa.

E. E. Dux laminæ ferreæ, quarum ope crus ad Genu latera flexitur.

F. Instrumentum femorale, constans ex laminâ ferreâ anticum femor ambiente, & cælo vestitâ : quod testat femoris corio circum, & in postico femore ligamine G. notato ordine connectitur.

G. Ligamen predictum.

H. Flexuræ locus cuius crus incurvatur.

I. Caliga ex alutâ, quâ truncus & femur sunt vestita.

Fig. 17. Pulvillus, ex setis equinis conortis & alutâ vestitus; cui truncus subicitur antequam in vaginam immittitur, ut eò commodius incubat.

Fig. 18. Aget jam sanatus & restitutus, cretoreq; arte factô innitens & incedens.

ADMONITIO.

Sicut Lector benevolus, hocce eritis Schema, non, ut in omnibus calibus sit exemplar, hic esse delineatum; talia autem pro ægrotum statu, conditione ac ætate sunt paranda: In adulto enim, qui cautè de modo gradu scit incedere, ex ferro, ære aut aliâ quolibet materiâ idoneâ, crus multo apertius fabricari possit; in quo pedis articulus concinnè esset imitandus, qui, vi elasticâ, ex instrumentis chalybeis, admodum mobilis foret, ut, à naturali motu parum differens, rigidus ille infusus, qui, ex pede ligneo & circa malleolos immobilis, semper reperitur, admodum corrigeretur. Istiusmodi verò crus velle parare adolescenti (cui, propter enormem motum & continuum corporis incrementum, id sæpius est renovandum) multum requireret laboris, nec minus sumptus.

Hærens Celeberrimus Petrus Verduyn, cui commenda jam succedit Præclarissimus Ruyschius, Cuius superius indicata Epistola Anonym. Problem. hæc habet.

Clarissimo Doctissimoque Viro

FREDERICO RUYSCHIO, &c. &c. &c.

S. P. D.

MAURITIUS à REVERHORST.

Litteræ tuæ nuper ad me datæ gratissimæ fuere præcipuè quum ex adjectis relationibus circa Methodum secandi Fratris Jacobi de Draubienæ, vulgò Eremitæ, intelligere liceret, qualem successum in suis patientibus, vestra in civitate, habuerit, quum de illo tam variè apud varios differatur; hi enim Manum ipsius in secando tanquam optimam, dexteram & quasi cælestem datam deprecantur; alij contra ipsam pariter cum famâ ipsius rejiciant, fœdissime proficiant convulsis, quum nos ta-

men æque ac illi, quibus Lugduni Batavorum circa illorum patientum mandata fuerat, satis felici in curatione fuerimus; quippe à tredecim diversis sexus & ætatis, tam à Calculo, quam diversâ Herniarum specie sectis, non nisi duo satis cessarent, ambo quinquagenariis majores; quorum prior à diuturno Vesicæ ulcere, macie confectus, quin & Calculo ipso satis magno, aspectu & inæquali, non nisi cum insigni Hæmorrhagiâ extracto, intra novem hebdomadarum spatium, usque eò prorsus valetudini suæ restitutus, ut ille, qui antea nimis dotoribus, continuisque vigilis & Vesicæ ulcere attritus, & penè consumptus erat, jam multò oberior appareret, quin etiam jam urinam ad aliquod tempus retineret, & per cubiculum suum obambulat, & munia sua in ipsâ officinâ (faber enim ferrarius erat) utique obiret; adeoque, si in ultimo patiente saluti spes affligeret, hic in nostro fuit, qui tamen ex Incendii alicujus terrore à lecto suo proflens, variisque in dicta eroribus commissis, incidit primò in Febrem condannam cum tussi, à qua corporis vehementi agitatione, vulneris labia, jam fere coacta, lacerum disrupsa fuere, & variæ Calculosæ incrustationes, ab urinâ persistente sese continuo lateribus apponentes, nostræ curationi remoram injecit, dum inierim in urethrà ipsâ, variis in locis Carunculae obortæ, liberum urinæ exitum prohiberent; sic ut reliquis Symptomaticis cum Febri cæcis, hic nosse paucis vitam cum morte commutaverit; quid autem in corpore ipso lauerit, Cultro Anatomico indagare nobis non licuit. Quid verò novaverimus in altero nostro patiente, idem ab illo à Calculo secto, cuiusque cadaver à nobis inspectum est, à Petro Adriaan Verduyn, ejusve Filio absque dubio intellexisti, tam de statu ipsius corporis morbo, upote anteà Apoplectico, Miçtæ cruento, & nonnuncum Urinæ suppressione laborante, nec non Hæmiâ ejus intestinali, operationis tempore prolapsæ, ut & altero tunc ab ulcere consumpto, exterius præter naturam in corpore reperit, & observavit, unde hoc infelix omen satis prævisum fuit: hæc & pleraque alia, hunc casum spectantia, & notatu dignissima, non dubito quin intellexeris, quocirca longiori narratione illi de re hic supersedebam, cum adhuc ex dictis illis tredecim patientibus, D.T.O.M. sit gloria! undecim qui vivunt valentque, satis de illi secandi Methodo restari possint. Interim nullus etiam dubito, quin suo tempore aliquis Galenus, aut alius, qui ipsius secandi Methodum pernovit, quique polioris styli est ac dictus Eremita, hanc ejus methodum contra sinistros ejus famæ obsecratos sit defensurus, uti ex nuperis litteris ex Atce Vetsaliâ ab ipso ad nos missis non obscurè colligere potuimus, ubi simul, sed obscurius, loquitur de novâ Herniâ (absque Testis Jacobi secandi Methodo, quam se jam aliquoties instituisse perhibet, quæ multis ob causâ antiquæ præstenda foret, nisi dies docebit: Sed hæc de Eremitâ ejusque libris, quas uti meas non facio, ita quoque illas componere nolo; progredior ad aliam, & novam quoque, seu super propositam in illâ arte (videlicet amputandi) Methodum, quam P. A. Verduyn nuper proposuit, variisque experimentis ab illo tempore, ipsi oblatis, confirmavit, quâ de Methodo rancè labentis tecum agam, quoniam illam nuper Amstelodami Te præsentem à P. A. Verduyn, ejusque Genero & Filio, præclaris illis Rei Chirurgicæ luminibus, ipsam institutam vidi, eademque Amputatio apud nos quoque paulo post, non in Mann, non in Juvene, non novâ illâ Methodo, sed

fed in Pede, in Virgine, idque antiquò morò inflicta fuit à Serphano de Rouv, & Adolpho Strukey, juvenibus Abrahamo van Kervel, & Everardo van Oudek, Chirorgis apud nostros in sua arte non parum versatis, spectantibus verò, seu potius patientis curam habentibus, Jacobo de Bye aique me M.D.S.

Casum nostrum prius ego hic exponam, dein de quid à Te, vestro in Casu, desiderem, addam.

Virgo triginta duorum annorum ante hos decem undecimve annos ab unctione dextri pedis circa talem diu malè tractata, & ut in adultis nunc h'is, nunc illis remediis adhibitis, alcit ab illo tempore, hac in parte, ulcus cum Carie tam Apophysis ipsius ossis Tibiæ, Fibulæque, quam reliquorum adjacentium ossium totius Tarsi, Interim jam hæc, jam illa in parte, aliqua curationis spes affulgebat, sed quod ad cæteras corporis functiones rectè sese habebat, & quamvis usû hujus pedis malè affecti (utpote plerique Ligamenti, quæ hæc ossa alias continent, jam ab ulcere consumptis digitorumque versùs terram omnino & præter naturam protracta) destituta esset, tamen benefici scijonit'is suis benè sese movebat, adeò ut Scalis quoque promptè conscenderet, cæterisque suis muneribus alacriter fungeretur; interim nescio quo malo lapsum pariter, ex quò ossa illa, præcipuè Calcis, non tantum fracta, sed & tota corporis mole desuper incidente, omnino comminuta fuerunt, cum tarò Sanguinis profluvio, ut vix evasita videretur, quò tamen sublato, & volente pro temporis ratione tractatò, nec ulli restitutionis spe, nec pedis usul assurgente, unanimi consensu in illud omnes convenire, ut ille pes paulò infra Genu rescinderetur, quæ Operatio quamvis dextrâ pariet atque celeri manû instituta fuerit, quinientiam ipsa Curatio satis feliciter pro tempore succederet, optatumque eventum polliceretur, contrarium tamen videre coacti fuimus; nam præter continuos & ferè intolerandos dolores, tam in parte affectâ, quam jam ablata, de quibus continuò conquirebatur, incidebat primò ante iustum tempus in Menstrui fluxum, cum magnis intestinorum Cruciatibus, & assiduâ rejectionibus, qui simul ac componbantur ac sistebantur, statim conquirebatur de Facium anxietate, & Respirandi difficultate, quod in principio pro Passione Hystericâ, utpote malo ipsi familiari, habebatur; sed Colli dolore, ejusque mori molestiore, & Masticatione æque ac Deglutatione aliquò modò impeditâ, cum aliquò oris Clansurâ, & Musculorum Faciei distorsione, aliud cogitare cœpere, præcipuè illi, qui unâ nobiscum ex patientibus, ab Hærnâ intestinali ab Eremiâ Sectis, quique jam sursu proximi videbantur, nihilominus lethale ut plurimum extitisse, fuerant comperi; illi, inquam, qui hoc antea nobiscum notarent, non sine ratione utent' laudabilia omnia in vulnere apparent, nihilominus aliqual' fœliti ominabantur, præcipuè cùm enarrata Symptomata neque externis, neque internis remediis minuerentur, sed contrâ febribus magis intenseretur, quinientiam jam quoque de difficultate tam in reddendâ urînâ, quàm in excludendis alvi fecibus conquiretetur, quod malum tamen applicatis Clysteribus aliquò modò levati videbatur; hoc non obstante, doloribus tam in abdomine, quam in parte jam ablata (præcipuè ubi Ulcus fuerat, hæc enim pars continuò ipsi in animò versabatur, utpote nervi, nervosæque partes terminum suum jam in vulnere ipsò obtinentes, & aëris incommodis aliisque injuriis externis obnoxie,

jamque malè affectæ, hanc menti idem obulere) his, inquam, cum febre & delirio magis auctis, hinc nostræ patienti Mors supel'is optata finem dolorum imposuit.

Quid jam dicemus de dextrâ in operandò manu? Curatione ad tempus satis felici? Si tam tristem eventum obtineant; quare non tantum cum Hippocrate in suis Aphorismis notare debemus *Experientium periculosum esse*, atque idcirco alia excogitanda media, quibus tam infelici successui, cæterisque Symptomatibus enatais obviam eamus; hæc enim omnia quis dicit non provenire ex Nervorum Nervosarumque partium contenti'que coactione? Quæ in hac extirpatione, vel continui Solutionem patiuntur, vel alio modo malè affectæ, disrumpuntur, dilacerantur, vel ab aëris injuriis minùs sunt vindictæ; an non illa Methodus, quam P. A. Verdoy nuper proposuim, quamque in Tuâ præsentia ab ipso suis feliciter institutam, vidi, an non illa, & quibus modis, antiquè præferenda foret, impositi Cursus non tam diuturni, neque dolor post operationem tantus, nec tum quoque talis Hæmorrhagiæ metus, nec ossis separatio expeditanda venit, & Nervi Nervosæque partes, Tendines earumque Fibre & Vasa ipsa jam testâ, & à tringente cæterisque molestiis & incommodis externis ab applicatâ Musculorum partium mole suis conservata videntur: non quod ego hic novam illam Methodum, solum quia nova est, introducere velim, sed quòd in curatione sit minùs dolosifica, paucioribusque Symptomatibus stipata, an non idem amplectenda, veterique præferenda videatur?

Jam nihil est quod avidius expectemus, quàm ut tua illa Observatio in lucem prodiret, & quid in Curatione ipsâ acciderit, & quor' quibusve modis antiquæ Methodo aut præferenda aut postponenda veniat hæc nova, tam respectu doloris, & moræ in Operatione ipsâ, quàm reliquorum Symptomatum post ipsam institutionem, nec non intumescencie illorum Musculorum, quibus Ossium, & reliquarum partium extremitates tegende veniunt; quod ad reliqua non dubito, quin Manum ipsam amputatam dexteritâ tua Methodo cœteris omoi'us incertum defensus, atque, uti afoles, incidendam daturus sis, idque si fieri possit, formâ naturalem, cùm aliis iusticiam non tam accuratè fieri possit, uti in Severino Lib. de nov. observ. abic. similem ferè Casum proponente liquidd' appareret: certiores sine dubio nos quoque facies de qualitate illorum tumorem, qui sese in manu offerebant, & an Cartilagineæ, an Ossæ, an verò (ut Cl. Pechlin. Obs. lib. III. Obs. XLVI. habet) Glandulosæ indolis fuerint, nec non quibus cum parvis cohærent, seu potius, unde primùm originem sumperint, cuius, natales debuerint, an propolis vasis ab ipsis primordialis, unâ cum forti Imaginatione temporis Gestationis, his tumoribus à naturâ datis, an ex communibus, an ex tendinibus eorumque; involucris, an ex periosio, an verò ex ipso, tanquam ex fonte, & primâ Scaturigine principium suum duxerint; non verò, quid solita tua soletia in etuendis corporum abstrusissimis mysteriis ulteriores detexerit, avidi à Te expectamus; interim ut diu vivas, valeasque, & Antem Anatomicam novis & hæcenus inauditis tuis inventis ulteriores omnes, ex animo precor.

Hagæ-Com. xij. Kalendas
Martii, cio 15 cccj.

FREDERICI

FREDERICI RVYSCHII RESPONSIO.

Ad Clarissimum Virum

MAURITIUM REVERHORST,

Med. Doct. & Anatomia Professorum.

SUPER

Nova artium decurtandorum Methodo.

Litteræ Tuæ, Vir Clarissime, & longè charissime, ad meas quidem pervenerunt manus; arduum autem mihi erit, nodum, in iis propositum, dissolvere: Si enim ulla in te judicium difficile sit, ut alius magnus ille senex, ceterè illa, à Te exhibita, haud exiguum hæcenus creaverunt Medicorum filius molestim.

Quod ad relationem attinet, de operationibus Lithomicis, Hagæ-Comitis, à Fratre Jacobo Beausieur institutis, jamdiu est quod veram hujus rei relationem desideravi. Gratulor quod inter 13, quos à calculo Vesicæ, Herniaque liberavit, 2. tantum satis concessit; quos hæc Amstelodami, post calculi sectionem evasere, ex relatione, typis mandata, cernere quoque liceat.

Novam methodum amputandi membra quod spectat, in ea varia consideranda veniunt, quæ, si conferantur cum antiquo exstirpandi modo, longè inter se differre, palam erit; Uter bonum sit præferendus, Tibi, aliisque in Anatomicis & Chirurgicis versatissimis, judicandum relinquam; ego interea, quid sentiam revelare non detestabor, postquam succinctè regulæ operationem non solum, in juvenis brachio iustitavero, in Tuâ, mea, & aliorum præsentia, verum etiam quicquid in curatione sese obtulerit, in quâ Te præsentem sistere haud potuisti.

Juvenis quidam, cui omen Christianus Veldner, 26. annos præter propter natus, nuper ad nostras venit adest, corpeus non solum tumoribus magnis in dextrâ, vetus etiam sinistra manu, uti & in utroque pede, eorumque digitis, qui tumores admodum duri, extinctis accuratè Radices Cyclaminis, aut potius Chrysanthemi Americani, radice ruberosâ, emulabantur, sicut in annexis figuris representantur.

Hujus mali causam nobis explicantibus, temerè argutus, ut & anus quidam, quæ dicebatur ejus matertera, quid mater impregnata impensè apperiverat dictas Radices Chrysanthemi Americani, quas tamen impetrare haud poterat; factum jam in lucem edisse, reperiunt, uti aibat anus, exigui tumores in manibus atque pedibus, qui temporis successu in tantam exceverunt molem, præterea in sinistra manu, ut brachium diutius sustinere vix posset, imò coactus fuit dextra sinistra suffulcire. Tandem, cum unus ex istis tumoribus necrosus factus, emulisset aliquoties multum sanguinis, & patiens manus ponderositatem, doloreque immanes diutius perperit haud posset, totius manus extirpationem nobis proposuit. Nos autem, consideratis considerandis, annuebamus quidem ejus petitioni, aut verò absque Magistratus con-

senso, variorumque Expertissimorum Medicorum & Chirurgorum adhibitatione, operationem non aggressus est Magister Petrus Verduyn, auxiliantibus ejus Filio, ut & genero Gomaro à Borrel.

Die igitur constituta ad dictæ manus amputationem, præsens fuit Clariss. Vir, præsentem quoque sese sistere Medici expertissimi Ulackveld, Smedingb, Schyn, Valentyn, La Græ, Smir, ope non exercitissimæ Chirurgi, Aurick, Deutelsin, Pothuyse, &c. Patiens brodi confortatus, admodum erat animosus, operationemque perperus est sese absque ejulari, ut omnes, qui operationi interestuere, admirari suerint.

1. Humeri pars superior circumducebatur splenio quadruplicato, superimposito splenio longitudinali, lateri interiori brachii & quidem secundum longitudinem, ut hujus & funiculi seu cinguli contrictionis ope, vasa totius & minori cum novâ inter operationem compelli possent.

2. Hæc factâ Dn. Smith. Hafnienis injungebatur cingulum contrictionis bacilli ope leniret, & in operatione ipsâ, fortius contorquebat, partim ad sanguinis profusionem inhibendam, partim ut pro tempore, brachii stupor excitaretur, & dolor arceretur.

3. Anâ gracili archè circumducebatur cubitus infra juncturam. Hic peractis, Magister van Borrel; gener Magistri Petri Verduyn, partem musculolam sinistra arripit, dextrâ cutellâ accipere & mucronatâ cum perfodit, quàm proximè fecti potuit, ad ossa cubiti & radii. Hæc initio facta latere interiore brachii, quem locum quoque occupabat Operator dictus. Perfodit parte musculosa, cultum ulteriores adgit, incisionem continuando donec sufficere videbatur pro vulnere tegmine, & sic ulterius transversim carnem abscondebat. Porro Magister P. Verduyn cæteram partem carnolam circulariter & celeriter incidit cultro falcato ad ossa usque, & periosâ abrado, utrumque os fectâ dividebat; Interim ne caro propendens à cultro sur terrâ offenderetur Mag. Adrianus Verduyn prospiciebat.

Manu amputatâ & spongâ madidâ rasurâ ossium ablata, vulnus, & per consequens ut iussu ossa extremis tegebatur quidam à dicto Magistro carne propendens & reservatâ, aut verò propter carnis contractionem, quæ illico se post incisionem, totum vulnus ex voto contegi haud potuit: itaque, quod restabat vulneris; ut & totius membri amputati truncus frustro planò fungi Orbicularis, obducta & contracta fuerunt, superimpositâ Vesicâ madidâ, & super eam alterâ madefactâ, quæ priori aliquantò major erat: hæc bina Vesicæ, ut firmius curi adhererent, comprimebantur & stabiliebantur circulariter frustro Emplastri coagulantis, cujus latitudo erat unum uncia, longitudo autem Spithamarum duarum.

Hæc factâ tertio quoque Vesica madefactâ superimposita fuit, hæmorrhagiæ metu. Illæ præcedentibus longior & eodem modò stabilita altius brachium coopereunt.

Hic ita munitis, lamina concava, splenio quadruplicato intus obductâ, membri extremo applicata fuit, ea intentione ut deligatione petactâ, lamini manû laminâ comprimeretur truncus, hæmorrhagiâ inhiberetur, & ligaturæ laxius applicatæ liceat: ut autem dicta lamina cava truncus cohereret, duo frusta ampl. coagulantis cuculicam adhibita sunt, ejusdem naturæ ac supra citatum. Hic peractis & cingulo contrictionis (Gallicè *Tourniquet*) dissoluto, membri extremo applicamus

fuit

fuit alterum splenium ex linteis confectum, præcedenti majus & crassius, illudque firmatum fuit fasciâ simpliciter capite præfixâ.

Deligatione ita præfecta composuit se pateriens in lecto ad quietem; quam ut facilius acquireret, Emulsiō ex hordeo ad Crep. coctio, Sem. Cucum. & Amygdal. præscripta fuit, additâ Syr. Diacodii dimidiâ uncia; sub noctem sese mediocriter habens & alimentum petens parum dicti brodi exhibuitur fuit, & sic sese ad quietem composuit, noctemque transiit sibi tranquillam, nullo sanguinis profluvio suborto.

Die infequente brachium bene videbatur constitutum, nullo tumore insigni obstrum, pateriens quoque immensus ab omni febre.

Hic visum consulemus duximus, patientem ex ædibus Magistri Verduyn transfere in locum quietiorem, ubi illum inviserunt Magister vao Bortel & Verduyn, qui deligationis exteriora abstulerunt, vulnusque mittis deligarunt, id quod levamen patienti adferebat. Tertiâ die sub meridiem integra deligatio simul cum Veficis ablata fuit, invenimusque separationem Epidermidis, seu Hydaridem omnium humore loturæ carnis æmulo, idque parte anteriore junctura cubiti, eaque apertâ, repetimus subtilitatem cutim nonnihil quoque infectam, & gangrenam ulteriorem mentientem; eodem quoque tempore pateriens non immunis erat ab omni febre, & membri extremitas, præter magis tumefacta: Vulnus tamen magnâ ex parte carne, quæ in amputatione conservata fuerat, coopertum invenimus, sine sanguinis profluvio. Quia autem omnis hæmorrhagie novæ metus nobis nondum erat ademptus, in deligationis renovatione haud omisimus fuit Fungus Orbicularis, munitis Empl. Diapalma dissolut. spleni quadruplicatâ & ligaturâ convenienti.

4. Die pulsam invenimus concitatiorem, & vulnus non minus exumefactum, itaque ablato fungo leniter tantum adducebatur caro in amputatione conservata, idque fascioli Empl. Glarinosi oblatione, vulgâ furta secca dicta, postea totum vulnus tegebatur Empl. Diapalma dissol. plumaceolis, ex linteis carpo confectis, haud neglectâ. Die infequente quæ erat quinta ab amputatione, res eodem fere modò sese habuit, nec febri quoque melior facta: itaque eodem ritu remissius deligatum fuit vulnus, atque verò eo loco, ubi Gangrenæ metus fuerat, sc. circa juncturam cubiti, Gangrenâ jam prodiit levis, quapropter consilium videbatur cautiùs prospicere huic symptomati, quàm trunci integumento carneo: itaque lenissimè tantum adductâ carne reservatâ, Cataplasma ad Gangrenam sistendum applicatum fuit. Die infequente vulnere prospexitur digestivâ Cataplasmate superimpositâ: die autem 7. truncus non nihil detumuit & vulnus quoque humidius apparebat; interitum locus, Gangrenâ obfessus, magis magisque intumuit, doluitque, nec patienti à febre immanis, ita ut magis metueremus abscissum quàm Gangrenam profundiorum, qui tamen haud supervenit. Altera die, eodem modò res sese habuit, exceptò, quod nonnihil mollior pars tumefacta nobis obvenit, die autem 9. hand pejus res sese habuit quoad truncum, Gangrenâ verò in pejorem statum erat redacta: Itaque post ablationem cum Sp. Vini calescenti factam, applicati sunt plumaceolis, retharmaco cum digestivâ permixtâ, illi, nec non in Spitz. Vini humectat, superimpositâ Cataplasmate, Spirit. Viol aspersâ.

10. Autem die febris remissior facta, trunci vulnus parte coctâ obstrum, Gangrenæ tumor quoque minus datus: hoc tempore nihil immutatum fuit circa deligationem, pateriens verò eodem die primâ vice questus fuit de dolore pollicis membri detruncati, & præterea quidem, cum inspiratâ pollicem extendere conaretur aut mentiretur, non autem cum in animò haberet eum flexere, de ceteris digitis nullæ erant quiete, illud enim distinctè interrogavimus.

Die undecimâ major spes affulgebat, quandoquidem omnia in melius vergebant, pus enim laudabile promanabat de vulnere trunci, tumor diminutus, elevari periphæria humida cum aliquâ separatione: in hac renovatione omisâ fuit Cataplasmati applicatio supra truncum, non autem supra partem Gangrenâ infectam: Caro autem reservata, quæ ob symptomata supra citata, haud satis erat adductâ, & propterea retracta, jam de novo fascioli Emplastro Glarinoso oblationis reductâ & vulnus maximâ ex parte coopertum fuit.

Die 12. patientis status non erat quidem deterior, sed verò Gangrenam, profundius ex egresse radices, videbamus, utpote separatione partem facta; imò tendens multicolorum non fuisset immunes à dictâ Gangrenâ, ita ut vasculi quoque separarentur. Jam à Cataplasmati usu destitimus, dicto loco prospectus digestivâ, & carnem reservatam digestis fasciis, or antea, adduximus.

Die 13. patientis immensus erat ab omni febre, placidè dormiverat, cibum apperebat, truncus carnis adhesionem maximâ ex parte coopertus erat, & quod restabat vulnere, applicimus Unguentum Unguentum, fac nimis dictum, ut cicatrice ulterius obduceretur vulnus: quicquid autem emortuum & Gangrenâ infectum fuerat sub cubiti juncturam, partim forcipè excisum, partim à naturâ separatum erat, adhuc bis plumaceolis Ung. Digestivâ, basilico permixtâ, oblectis. Diebus infequentibus melius atque melius sese habere coepit pateriens; imò paucis post diebus profors fuerunt eorum dictæ isolationes continui, quin etiam quò magis appropinquarent eorum curationes, eo majores erant quærelæ de dolore amputati membri, & nunc quicquid circa volam manus, non verò de dolore rotas manûs; & quoties quis leviter tantum comprimeret cicatricem infra juncturam, ubi Gangrenâ fuerat, summis cruciatur dolotibus; interrogatus, quâ in parte i regebatur in digitis amputatus manus, comprehensâ autem in parte dictæ cicatricis confinis, nullum sentiebat dolorem.

2. Consideratione dignum esse censo, nos nullam sensibilem separationem extremitatum osium cubiti, & radii in curatione offendifse, quia minus oculis injudis expositæ fuerunt dictæ extremitates osium.

3. Comprimensdo trunci extremitatem, cicatrice obductam, dolor sursum vergebat verò brachium.

4. Truncum flexendo, sibi imaginabatur, quod simul quoque digitus flexeretur, idque hoc ullo dolore: pollex verò videbatur illi rigidus & sine motu.

5. Quam dextrâ fricaret, supra juncturam trunci, idque parte exteriori, dicebat nobis, sese non solum sensum mucum, hujus fricationis in digitis membri detruncati percipere, verum etiam cum fricaret sese in latere Thoracis sinistro: id quod (quamvis non obscure nobis arguere videatur consensum membrorum, nervorumque in corpore n. strâ,) magis mirandum, quàm explicandum.

6. Contraactionem

6. Contrahionem singularem præstare poterat in trunci cicatrice; quam quasi corugabar, dicens, jam mihi video digitos flectere, et jam denudò extendere.

Hæc à nobis observari, impossetur expiscandum, otrùm dicti dolores, quos videbatur passus in manù extirpatâ patiens, & à quibus haud immunes sunt homines, quocumq; attus vulgari modò extirpati sunt semper superveniant patientibus; quibus eò, quò retruli modò, extirpata fuit manus, an verò hæc ansim deditur Gangræna, circa cubiti flexuram prognata, an ex aliâ causâ artum duxerint, occasione data inquirendum esset, quandoquidem Magister Petrus Verdun testatur in Epistolâ suâ Dissertatione, sese quidem bis hanc operationem in pede instituisse, quâ eadem methodo, & quòd tales dolores Sympatheticos non-dum offenderit. Verba ejus hæc sunt, denique *fidelitè prætere non possum aliud quoddam emolumentum, nequaquam penitendum; neminè quid his modè restitui non concurantur; ut quidem ali, de dolore sympathetico in pede eruit aliâ, &c.*

Hæc sunt Cl. Vit., quæ nobis in, & post extirpationem, observare licuit. Quid autem de hæc extirpationis methodò sentiam, à me scite cupis, in quâ, ut rectè cenles, *curatio non tam diuturna, neque dolor post extirpationem tantus, nec tam quæque talis hæmorrhagia metus, nec effusio separatim expellenda venit, & nervi nervosque pariet, tendentes, eorumque fibra, & vasa ipsa jam tecta, & à frigore caritque melioris & incommodis externis ob applicatâ Musculorum partium mole satis conservata possunt, &c.*

Hæc concessis, ut revera concedenda esse putem, amplectenda videntur hæc nova extirpandi methodus.

Fateor quidem in manû aut brachii amputatione, nos semper sollicitos esse, ut tantum membri conservetur, quantum fieri potest, quia ad nonnulla munera obunda illud inservire potest, & si velimus truocum membri amputari mole carneâ tegere, quæ in cubiti extremò nimis exigua, quàm ut eâ contegi possit, necesse foret in alio loco membrum decurtare, sicuti, uti fateor, in hoc patiente, factum. Verùm enim verò in postremum minùs sollicitus ero, de cooperatione trunci carneâ mole; existimo enim sufficere, si truncus tegatur cute manû, quæ totò dorso vel volâ manû separari & conservari possit; Contrâ en pedis extirpatione necesse est partem detruncatam carne lurali integere, uti olim factum à Magistro Exercitatoris Petro Verdun, & Vilhelmo à Virent, & Adriano Coenething; dico necesse esse, sc: si per infisionem curari, & parti detruncatæ, non verò genu insidere atque incedere velint homines: caro enim reservata mutilatæ parti pulvinaris locò est.

Circa hæc hæc inusitatum amputandi methodum, non nulla adhuc consideranda veniunt, &c.

1°. Quidem, si in crure facta operatio, & patienti in animò sit per infisionem ultèrius curari, an non obstaculo erunt excrecentiæ seu exostoses, quæ in homine vegetò observantur aliquando è truncò emergere.

2°. Si in cubiti extremò instituenda sit operatio, an curis, quæ in manù est, sufficiens est pro vulneris integumentò?

3°. An in novâ hæc methodò major aut minor gangræne supervenientis ansa detur?

Quoad 1^{am}, nempe ossium excrecentiam: Rsp: in cubiti aut manû amputatione non est cur de eâ solliciti sumus, membro enim detruncato non incedit homo: verùm enim verò in amputatâ crure ejusmodi excrecentiæ admodum nocivæ forent, hæ enim casum conservatam compungerent incedendo continuè, si nempe per infisionem ultèrius incedere vellet patiens. Hoc incommodum, si Magister Petrus Verdun inter curandum inhibere valeat, (sicuti affirmat) idque suo apparatu novo, soluta est isthæc difficultas.

Demonstravit quoque nobis puerum, qui crure amputatò, crure artificiali incedit, currit, gressu flectit, extenditque pro lubitu. Vide ejus dissertationem Epistolarem de novâ Artum detruncandi ratione, Anno 1696. in lucem editam; in quâ exhibetur Instrumentum retentivum, ut & lamina excavata, quibus factâ amputatione in pede aliquot post diebus, cùm dicta excrecentia merceda sit, trunci extremum ita comprimitur, ut illud incommodum inhibeatur.

Quod ad 2^{am}, attinet, sc: an cutis manû sufficiens sit pro vulneris integumentò, propter retentionem cutis? Rsp. si non sufficit omnino, saltem magnâ ex parte truncum coöperiet, id quod de vulgari amputatione dici non potest, & quò magis nervi, tendineque abscessi propriò regimine conteguntur, eò remissiora expellenda symptomata; præterea curatio citius quoque absolvetur; imò Auditor esset, ut in eò casu carnosum & caruocum volæ manû arripetemus, & in auxilium vocemus, pro trunci nervorum ac tendinum tegmine. Præterea amputatò membro Chirurgi applicatæ assolent pulv: adstringentes, quos inter variis Pulv: Escarotica recipiunt ad sanguinis hæmorrhagiam inhibendam, id quod planè rejiciendum cenleo, propterea quòd illi suâ acredine nervosis partibus nocere valeant; in hæc autem operatione tale quid non adhibetur, sed vulnus regitur propriò involucri.

Quod ad 3^{am}, attinet, sc: an in hac novâ methodò, major aut minor Gangræne metus adsit? Rsp. si non minùs Gangrænam minatur operatio isthæc nova, saltem haud major est hujus symptomatis metus, modò deligatio tunc petagatur. Fateor quidem illam in suprâdictâ curatione nobis obvenisse, verùm circa cubiti flexuram sedem fixit, forsan à ligaturâ, iustò archiùs circumligatâ, id quod multum negotii nobis facillimit, & hoc præcaveri poterit in postremum, præstabitque laxiorem adhibere ligaturam, & per 12. imò 24. horas truncum manû continere & comprimere, & hoc ut æqualius fieri possit, in auxilium, ut dixi, revocanda lamina excavata, quæ ante compressionem applicanda.

Pergam ultèrius ad ea, quæ Cl. Vit. me admonet, sc: brachii amputati conservationem, ut & naturalis magnitudinis delineationem, *cum aliâ judicium tam accuratè ferri nequeat, uti in Marcò Aureliò Severinò, de Nerv. observ. obfess: similem ferè casum proponens, liquido apparet.*

Rectè adstruit, objecta naturalis magnitudinis semper esse delineanda, si quis proposita accuratè demonstrare staret, & hoc quoque in omnibus meis Epistolis Anatomico-Problematicis observavi. Est mihi in animò hanc manum amputatam ita fepelire, ut quicquid in figuris expressum fuerit, semper demonstrari possit. Porro novum ex istis tumoribus in manù existentibus, ut me monuisti, examini subiecti, repetique, illum nequequam esse: Glandulosæ Indolis, at Cartilaginolæ, imò & Ossis, eratque quasi et lanumeris minoribus tumoribus partim Cartilaginosis, partim



Fig. 1



Fig. 2



Moff. sc.

3339-607
11/11/11
11/11/11



Fig. 1




Fig. 3



Fig. 2



Moff f

TABULÆ D. Explanatio.

FIGURA I.

Demonstrat partem Brachii supra citati cum annexâ manû, parte supinâ.

- A. Pollex.
- B. Digiti medius.
- C. Index.
- D. Tumor maximus.
- E. Ulcus.
- * Arteriolæ cutaneæ.

FIGURA II.

Representat Tumorem maximè portione abscissâ, ad constitutus intra quæ tempora, quæ partem carilagineâ, parvum cartilagineâ substantia annula, cellulosa, & mucosa.

Isque jam ex Celebratissimis Viris Petro Vinduino, ac Friderico Rhoischio attolimus, licet superaddere, quod artuum decurtatio, novâ hâc methodo à perficissimâ ac verè industriâ apud nostros Chirurgos, D. Sabourin felicissimè peractâ, interfectus; quodq; non ita pridem viderimus virum utroq; crure eadem methodo truncatum per vicus urbis nostræ maximè declives, bacillis quos in utrâque manû gestabat junctum, satis commodè incedentem.

Consultationes.

Gangrena Pollicis sinistra manus lethalis.

Filiâ Josue Hessi, Ecclesiæ Megastinenfis Pastoris, ex inflammatione pollicis manus sinistra gangrenam contraxerat, quam quam oegligentius haberet in sphacelum degeneravit; accertius Chirurgus quidam Castrensis Paulus Polt, digitum unum vehementique ita paulo infra articulum amputavit, eoq; sanguinis profluvium sisteret, febre candenti adussit: hinc dolores acutissimi, vigilie perpetuæ, animi deliquia, convulsiones, aliæque subortæ symptomata, quæ etsi adhibitis idoneis remediis quoadque mitigarentur, subinde tamen recrudescunt, donec nec tandem è vita decederet ægra.

Inflammationes partium insidentes, quandoque in gangrenam abeunt sphacelum, vulgo noxum est, quatenus à copia sanguinis humorum calet narius partis affectu suffocatur: qua via autem quibuscumque remediis præcaveri possit, ne in gangrenam degeneret inflammatio, apud auctores passim obvium est.

Curacionem verò quandam atinet & in specie quidem sphaceli, nullâ aliâ ratione perfici ea potest quam amputatione, siquidem quod planè jam corruptum est vitam amplius recuperare non potest ac propterea, Erse rescindendum est ne pars sincera trahatur.

Quibus autem modis & instrumentis hoc fieri debeat, aliâ aliter sentiant: quidam carnem mortuum prope sanam multis sectionibus rectis & obliquis scarificant, idque satis profunde usque ad os, postea vulneribus pulvete ex arsenico & sublimato inspergunt, ut pars mortua à sana separaretur. Alii cauterio quod corruptum est, adurunt, usque dum dolus percipitur in parte: alii sectione amputant corruptam: idque vel novacula, vel seta, aut modio, vel securi.

partium Officiis, composuit; singuli autem eorum denot ex innumeris minutis humore succoso, gelatioso repletis Vid. Tab. D. figur. 2. Impossibile autem mihi fuit indigere, an ex ossibus manus, tendinibus, aut periostris, tanquam ex fonte, & prima scutidine originem duxerint: Omnia enim ita sunt confusa & connata, ut ulteriores indagines baud fuerit locus; cum illud perscrutatur, sub cute coalescenda sese exhibebant vasa sanguinea, quæ eam cetracæ materiam replevissem, distinctè videre licuit eorum cursum, & capacitatem: Venæ per dorsum manus disseminate, calami scriptorii capacitatem adæquant: horum ramuli minutissimi à naturali cursu quoque recedunt; quin etiam circa cutem observato dignum esse cenleo, sc: quoddam cutis in hac ingenti tumorum excrecentiâ, tenuior facta aliquid visui offert, quod in cute sanâ non tam accuratè occurrit: Imò cutis de sua integritate & compositione aliquid in viâ amittit, quod cutis incrementum insequi non potest. Id quod jam sese videndum luculentè exhibet, sunt papillæ cutaneæ, extra cutem nonnihil protuberantes: Vid. Tab. C. Fig. 4. ut & Fig. 5. Lit. C. ubi ordine naturali dispositæ: illud autem quod in excrecentiâ amittit cutis, sunt eadem papillæ cutaneæ, quæ circa basin tumorum, non in apice videri possunt. Plura ob cæli serenitatem non addam, illa enim me invitât, ut hisce diebus xii iussu cutem, quæ in stomachi structura, ab aliis nondum sunt detecta. Præterea multum molestiæ mihi creaverit hisce diebus, quæ in oculis adhuc sunt ostendenda, puti vasa sanguinea per tunicam humoris crystallini disseminata, &c. hæc enim Theodoro secundo insectare mihi in animo est. Hisce Vale, Vir Celebratissime, & ut artem Anatomicam magis magisque nobilem promoveas, ex animo optat, Celebratissimi Nominis tui.

Cultor

FREDERICUS RUYSCHIUS.

Amstelod.
19 Junij. 1701.

TABULÆ C. Expositio.

FIGURA I.

- A. Pars Brachii amputatæ cum manû, in quâ pars supinâ videri potest.
- B. Pollex.
- C. Index.
- D. Digiti Medius.
- E. Annularis.
- F. Minimus.
- * Arteriolæ cutaneæ.

FIGURA II.

Digiti exhibet parte supinâ, cum suis papillis cutaneis, ordine debet fieri.

FIGURA III.

Demonstrat digitum parte pronâ.

- A. Papillæ cutaneæ epidermide destitute, & confuso ordine composite.
- B. Poti cutanei, sed, nullum ordinem servantes.
- C. Papillæ cutaneæ naturali ordine sitæ.

Circâ hæc Papillas considerandum, se. per epidermidem artificiosè desinunt, extra cutem nonnihil prominentes.

Verùm quàm poxia sit æscenſi ſublimatiq̃e vulncribus ſcarificatis imperſio: docet Paræus; quàm perniciôſa cauteriſatio demonſtrat Fallopius; quàm periculôſa per modiolum aut ſecurim amputatio, exemplis evincit Fabricius, quibus meritiò æſcenſior hoc noſtrum, in quo triplex error commiſſus videtur.

Primus quidem in eo quòd pollicem infra articulum reſecuit Chirurgus, cùm rectius & cum minori periculo & dolore in ipſo articulo fiat amputatio: nervi enim & tendines inciliſi ſuſum contrahuntur, carne conſequentur, neque ulla ſequitur convulſio.

Alier verò, quòd iſtu adeo vehementi & per modiolum pollicem amputavit, id quòd novacula melius expediſſi poterat. Fieri enim non poteſt quin percutionis violentia nervi & tendines contundantur, compungantur, oſſiq̃ue conterantur & immenſiſſimi cruciatus, inflammationes, tumores, convulſiones, aliq̃ue prava ſymptomata excitentur, ut in tractatu ſuo de gangræna & ſphacelo cap. 17. annotavit Gnilelmus Fabricius.

Tertius denique in ſiſtendo per ſernum candens ſanguine, ſiquidem ut Paræus monet, uſiones non tantum ſumumum dolorem inferunt, ſed & partibus nervoſis prava accidentia inducunt, multumque ſaræ carnis abſumunt, unde oſſa denudantur, & caro ac cicatrix ſumma cum difficultate vel planè non vobducitur.

Quæ cùm obſervare ex uſu ſit, tu gratiam Tyronum hoc loco inferenda duxi, ut cautius de corio humano ludere diſcant, & ſic ubi ferro aut igni agendum eſt, diligenti cum præmeditatione, & circumſpectè hoc faciant. Arduum enim & difficile ſunt hæ operationes, & quandoque etiam periculum eludunt conatus, adeoque temere non temenda, niſi ubi nullam aliud eſt præſidium, tunc ſatis tutum eſt, ut Cælius loquitur, quod unicum eſt. modò equiſitè ſit comparatum. *Balthaſſar Timæus in caſibus Medicinalibus.*

Gangræna brachii & ſphacelus ex ulcere pedis intempeſtivè occluſo.

Vix quidam Conſularia ulcere Rheumatico pedis ſiniſtri per multos annos affectus, tandem conſolidato ulcere, in vehementiſſimos capitis dolores incidit, quibus cùm per integram hyemem conſiſtentes, circa æquinoctium vernum anni 1652, ſubito vehementique dolore brachii epuldem lateris prehendiſſus eſt, cum inſigni dolore & inflammatione, quæ cùm à Chirurgo ejuſ loci initio negligentiùs haberetur, in gangrænam & paulo poſt in ſphacelum deſiit, amputato brachio, æger quoadſcenni poſt apoplexia forti extinctus eſt.

Quàm periculôſa ſit ulcerum ſtenuum maxime inveteratorum occluſio, ſuprà lib. 2. caſu 26. & lib. 6. caſu 24. dictum eſt, ubi eolm narva longo tempore aſſuevit humores noxios ad patetæ ignobiliores demittere & per ulcra apertum ſubinde evacuat, ſieri non poteſt, quin præcluſa via in partes principales regurgient, ægroque certiffimam perniciem, aliquando interitum adferant, niſi tempeſtively ſufficienterque evacuentur & exſiccantur, quod cùm in præſenti caſu neglectum ſit, mitum non eſt quòd à multis annis per ulcus pedis effluens humor exiru denegato, ad cerebrum delatus, capitis dolores, poſtmodum cum impetu in brachium de-

cumbens, gangrænam & ſphacelum excitavit. Humores enim pravos à natura in membrum aliquod detentis ſubito id motivificare poſſe multiplici experientia conſtat & ſuprà lib. 5. caſu. 8. demonſtratum eſt. Accellit & culpa Chirurgi, qui initio malam hoc plane neglexit, niſiſque applicandum ſed panni calidiſi ſolummodo fricandum, regendumque fuſiſt, unde proculdubio attractis per frictiones & calorem humoribus exalſpratum eſt, quanquam & in eo peccatum, quòd poſtmodum ſuſu Balneatoris vehementer tepellentiæ, refrigerantiæ & adſtringentiæ, ut ſuccus ſempervivi, acetum vini & id genus alla impoſita, quibus poſt conſtipati calore nartivus ſuffocatus eſt, ut in reſponſis noſtris prolixius docuimus. *Idem iſidem.*

Gangræna ſeroti,

Nobiliff. D. Petrus Van Swenhausen cognatus meus ex dyſenteria in hydropem aſcitem incidit, cui cùm icterum ſuprà modum intumefceret, apertionem urſit. Ego dubiè eventus auxilium, quòd paucis, bene, multis malè ceſſetæ animo volvens, tandem ex arbitrio Cælii, meliùs eſſe anceps quàm nullum remedium, cætos, miniſtrante libtorum, ſerotum uno vulnere, & eoq̃e ſatis amplo aperui & primo quidem die ſeroti humoris libras circiter duas per cannam argenteam vulnere impoſitum, partibus vicibus, eduxi; ſecundo tera, tercio quatuor, quarto ſupervenit gangræna, ſuaſi ſerotum illico ſectiônibus multis undique ſcarificaretur & poſtmodum decocto ſequenti probè ablueretur.

℞. Rad. vincetoxi. iteos, aſtiſoloch. rotund. an. ʒʒ. ſcorodil. abſinth. ſlot. ſambuc. lupinor. ana m. ſ. acet. vini & lixivii fortiff. an. ℞ij. coq. ad tertius; in colatur. diſſolv. theriac. andromach. ʒʒ. aloes, myrrh. an. ʒ iij. mell. roſar. colar. ʒj. ſpl. vin. opt. ʒ iij. m.

Facta ablutione negnentum Egyptianum & ſuprà id caraplaſma ex ſcorodio, abſinthio, lotio, junipeto, myrrha, aloë, fatina lupinor. aliſiſque putredini reſiſtentibus, applicuimus, ſimulque convenientem victus rationem præſcripſimus, corpus præ intervalla hydragogis convenientibus blandè purgavimus, niſiſque eorum quæ ad vicerum roborationem facerent, intermiſimus. Serotum ſphacelatum partim natæ beneficio ſponte decidit, partim oavaculâ reſectum eſt, ut telticuli nudi conſpicerentur, qui tamen medicamentis reſiſcentibus & incarnantibus, carne ex inguinibus ſuccreticente quaſi novo involucro obduci ſunt.

Interea natura multum humoris ſeroti per hanc viam depoſuit, ut brevi tempore totum abdomen detumefceret, nec exigua reconvalſcentiæ ſpes aſſulgeret, ægro jam ad conſorta munia redeunte.

Verùm major erat vicerum labes, ut in cadaveria apertione deprehendiſſimus, quæ à ſuperari poſſet, unde cumuloſo iterum ſero & ſuperveniente alvi proſtutuo, æger ſatis conceſſit, cùm paulo ante, multa cimenta cum ʒ. cum rejeciſſet. *Idem iſidem.*

Gangræna faciei, palpebrarum & utriuſque oculi.

Vix quidam Nobiliſſ. & de Patria optimè meritus, eripſelate faciei affectus, poſtquam ad reſtinguendum ardorem, aquâ ſilgi iſſimâ totam faciem repetitum perfuſeretur, gangrænam pauidè in genia

in genus, postmodum etiam in palpebris, ipsique oculis contrahit, adhibita varia & exquisita comparata remedia. Medicis & Chirurgis dies noctesque excubantibus, sed frustra, malo in dies angelicente, donec sphacelatis faciei & palpebrarum musculis, totaque oculorum substantia, misere, pie tamen & constanti in Deum fiducia, interiret eger.

Discant ex hoc Tyrones, quàm periculosum sit humores, quos natura à paribus interioribus ad exteriores protulit, rursus ad interiora repellere, naturamque rectè agentem in munere suo impedire, imprimis verò in erysipellate, ubi materia quam natura expellit, per refrigerantia & reperiocutientia plerumque in ipsa parte asclia conclusitur, unde putredo & suppuratio, non raro gangrena & membri rursus oritur, ut docet Hipp. 7. Aph. 2. In rustico quodam observavit Guilielmus Fabricius Cent. 1. obs. 82. *Belasfor Timens in casibus medicis.*

Gangrena pedis.

Vir 40. annorum robustus, post exnam, bene potus, media hieme, in stabulo, cujus fenestree erant apertæ, se ad dormiendum composuit. A somno surgens, pedes vix poterat movere, in hisque exiguis erat sensus, ac color in his apparuit lividus.

Partes affectæ in hoc ægro sunt pedes; quod eorum supor, movendi difficultas & livor probant.

Morbis quo laborat, est intemperies frigida & putrida atque contagiosa primum, quæ scilicet stuporem, & movendi difficultatem ac livorem, ex caloris nativi extinctione lachryata, inducens, & ad vicina facillè propere, gangrenam appellari solet.

Causa hujus morbi externa est æris frigus, in quo æger noctu, corpore non satis adversus ærem frigidiorum munito, dormivit. Frigoris enim vehementia calor nativus in pedibus valde fuit extinctus; quo fibrille nervorum pedibus insensotum, ita fuerunt viciatæ, ut motum pedibus impressum, ad cerebrum, sensationis eademque causâ, satis valde transmittere nequeant; partesque insensibiles cutis & vicinarum partium, propter ingentem putredinem & corruptionem, ex frigore illo indurctam, ita fuerunt corruptæ, ut pedes jam liveant & supseant.

Morbis hic est periculosissimus, cum sit magnus à naturali statu recessus, & magna adsint symptomata: malumque hoc valde propere, & brevi in sphacelum convecti solet.

Celeritima itaque & prædentissima curatio moris erit aggrediendus cæque in corruptione partium ablatione, & intemperie correctione, & denique in partium, quæ asperientur, consolidatione consistet.

Sciam itaque pedibus applicetur tale emplastrum, calcificans & corruptionem sistens.

℞. Rad. raph. hort. rap. ana n.ij. contrand. in mort. addendo sem. sinap. ʒj. pulver. caryophyll. ʒij. olei sem. lini, jugland. veter. ana q. l. M. & fiat emplastr. eisdem applicandum pedibus per unum diem, ægerque in calido loco deambulat.

Si conglat malum ad interiores partes extendi, illico scarificationes satis profundæ, usque ad vivam carnem sunt adhibende ita ut sanguis egrediatur.

Deinde partes laventur aquâ salâ, vel spiritui vini in quo unguentum ægyptiacum est dissolutum, & lotio sit valde calida. Postea adhibeatur tale unguentum, quod præstantissimum est ad omnem putredinem, & ulceris malignitatem sistendam & tolerantiam.

℞. Flor. ʒris, alum. rochæ, mell. comm. ana ʒij. aceti acerrimi ʒv. gal. comm. ʒj. vitriol. rom. ʒss. sublim. pulver. ʒij. Bulliant & fiat unguentum.

Si ita putredo superetur, eschata separanda est apposito emplastro ex quinque-farinis, fabaz. scilicet. lini, fenugreci, hordei, lupinorum, vel alio simili.

Quod si neque per hæc sistatur corruptela, igni utendum.

Eoque nihil etiam proficiente pedes excindendi: ex Paræi sententia, in carne viva: ex Fallopij, in parte mortua, in consilio vivæ; quæ deinde post sectionem cauterijs actualibus adurenda, donec æger dolorem cauteriorum sentiat. *Hæmo. Regius apud Theod. Cræven. Medicinæ lib. 4.*

Observationes

De Gangrena ex contusione, qua totum crus, scrotum & inguen, spatia 29. horarum mirâ cum celeritate sanavit, atque agrum à mediâ sustulit.

Die 21. superioris mensis Julij, Stephanus Stropz pinus, civis Falsiciensis, Oppidi hic in vicinia ad lacum Neocomensem sit, quinquagenarius, robustus, & optimo corporis habitu præditus, cum in maximis messis occupationibus, apud plaustrum vacuum ducere remasset, se currendo in tertiam procidisset, tota internam partem sui sinistri cruris dilaceravit, cum tibie ossis, à prioris illo suo ad longitudinem spirituum, denudatione; neutrum tamen os fractum aut fissum fuit, ita ut pedes domum, à qua fere dimidiæ horæ abfuerat, se conferret.

Ego eodem die vocatus, illico totum crus coxamque olei rosar. ʒij. inunxi. Vulneri prius vino rubello & aqua tepida, à sordibus & arenâ abluto, digestivum sequens imposui.

℞. Terebinth. loræ ʒj. cere ʒij. gummi elemi ʒij. ol. de vitell. ovor. ʒi. dissolve lentissimo igne, postea admiſce croci ʒss. vitell. ovor. n.ij.

Ut autem affluxum humorum impedirem, fasciâ inunctâ poscâ, totum crus involvi, vitiumque optimum ac tenuem præscripsi, & pro potu ordinatio decoctum agrimoniz & veronicæ ordinavi. Hinc dolor plurimum remissi, noctem tamen cam; utcumque inquieram transegit. Circa scapulam quoque & humerum sinistram (sicet nullum manifestum contritionis indicium apparuerit) quia tamen eo loco ei de dolore conquereretur, eodem oleo rosar. inhi bis illum in die inunxi, adeo ut dolor scapulæ intra biduum cessaverit. Die 22. Julij sequens medicamentum ei exhibui.

℞. Syr. ros. solut. compos. cum thabarbaro, Agatico, & semina ʒij. pulver. sennæ præpar. ʒij.

Cum decocto agrimoniz & veronicæ fiat potuscula, qua corpus leniter purgatum fuit, Paulo post digestionem soluta, optima futuræ digestionis signa apparuerunt. Denno itaque præscripta digestivum imposui.

impolui, totumque crus oleo rosar. innixi, & lacia posca imbuta, omnia colligavi. Circa vesperum eadem relictavi, qua nocte optime quievi.

Die 13 Julii summo mane basilicam dextram (suscipula enim propter cicatrices ad cubitum nullo modo in conspectum sese dabat) incidi, sanguinique ad 3vi. extraxi, soluta deligatione vulneris partem illam suræ dilacerata & a subiecta carne disjuncta, quæ livelebat, ac ad gangrænam tendebat, abscindere vilum fuit. Quæ parte in præsentia reverendi D. Joban. du Moulin ejus loci præbiteri, abscissa, & eaque aceto & sale abluta, Ægyptiacum nostrum ad radicem putredinis, reliquæ vero parti vulneris digestivum impolui. Postea sequens cataplasma, quod putredini resistit, applicui.

℞. Farinæ fabar. ʒijj. salis marini ʒj. pulv. summitat. abynth. vulg. (scottidi versifloræ, rutz ana ʒj.

Coquantur in oxymelite simplici, fiatque cataplasma, addeodo sub finem myrrinæ, aloes, an. ʒss. fiat cataplasma.

Circa vespertam rursus eadem methodo processit, sed quia nox subleqens ei non admodum quietata futura videbatur, grana aliquot laudani ei exhibui. Quia nocte nullos dolores perferens, sed quietè & securè dormivit.

Die 24. Julii mane soluta deligatione, putredinem iohibitam, neque gangrænam amplius prosperere, certis signis conspiciere licuit. Ad majorem tamen securitatem, unguentum Ægyptiacum, ut antea filamentis complicatis, & ad radicem putredinis, totamque partem læsam, supradictis cataplasmate cooperui. Intemperies ulla neque inflatio aut dolor adebat. Domum itaque me confecto; circa tertiam pomeridianam illico, & quidem me absente, in alterius tibia, nihilum externa parte suræ dolore acutissimo corripitur.

Ego circa nonam noctis horam ad ipsum veniens, maximis quidem doloribus ipsum vexari facile conspexi potui, abique ulla tamen intemperie manifestâ, aut inflammatione conspicuâ. Unde Hippocratis sententiam, libro de vulneribus capitis animo volvens, videlicet, carnem contusam necesse esse potuerit, & in pus converti, ab incæptis desistere nolui, sed deo digestivum impolui, tibiam oleo rosar. innixi, ac rursus tempore somni nonnullis laudani ei exhibui. Verum tamen abfuit, ut somnum capessere potuerit, quin potius circa tertiam horam noctis me accersivisset, si forte aliquo modo dolorum lenire possem. Deligatione ita rursus soluta, externam partem suræ, & quidem ipsum locum dolentem ex parte lividum deprehendi. At quia dolor magnus, nihilque aliud in promptu erat, illico cataplasma ex meli panis in lacte coctâ, additis vitellis ovorum, parumque butyri recentis, calidè applicui. Hinc dolor aliquo modo sedatus fuit, parumque æger quævit.

Die 25, circa septimam horam matutinam solutis fasciis, partem externam suræ palmæ latitudine nigram & sphacelatam offendi. Subito ergo Paternicum me recepi, ut ea, quæ pro morbi magnitudine necessaria, videbantur, præpararem. Circa meridiem instructus omnibus necessariis ad ægrum rediens, statim sic exclamavi: ut urinam attulisses feram, tibia enim hæc est amputanda, quò dolore & cruciatu possim allevari.

Solutis ergo denuo fasciis, totam externam partem suræ, & ipsum pedem sphacelatum, vesicis etiam nigris & maximis, nec non aquâ loturæ car-

nis similis, repletis, animadverit. Interea tamen nonnullis in locis, dolores & maximi & continui aderant. Effugitantibus itaque tum amicis, tum imprimeis ægroti ipsò, ut tibiam amputarem, deinde me domum contuli, & instrumenta cum omnibus ad hanc rem necessariis mecum attuli, atque circa horam secundam pomeridianam ad ægrotum redivi, & suræ totam tibiam, præter illam partem vulneris cui præcedentibus diebus Ægyptiacum applicueram, lyderatam & in loco sano non amplius abscindi posse competi. Super genti item ad externam partem in quodam locò, crines novacula abradens, sonum quasi vacuum aliquod subfuisse, percipere potui. Inde malum illud subesse conjiciens, adstantibus atque amicis, significare cepi, amputationem plane infructuosam & inutilem fore, & ut alios Medicos atque Chirurgos in consilium advocarem, fuisti. Post duas horas iterum soluta deligatione, locus ille, in quo antea sonum audiveramus, pronus sphacellatus deprehensus est. Circa decimam horam noctis in inguine ad scrotum, vesica ovali magnitudine nigra, & aquâ loturæ carnis simili plicata, & sphacellata conspicebatur. Inter horas duas scrotum in magnitudinem capitis intumuit & lyderatum est. Tum æger sudoribus primò calidis, postea frigidis correptus, circa tertiam post mediam noctem horam, quæ quarta dies sui morbi cum undecim horis erat, ab incæptâ vero gangrænâ, hora vigesima quarta, placidè, & inter loquendum ferè expiravit.

Post mortem totum latus & caput paulatim ita intumuerunt, ut sequenti die, cum cadaver inhumare vellent, capulam ampliari necesse esset. Sub hypocondrio sinistro vesica, quæ magnitudinem capitis aequabat, nigra & aquâ sanguinolentâ plena, exorta est. Ex ore quoque & naribus aqua ista sanguinolenta tam copiose emanavit, ut per cubitalium instar rivuli delibueret. Ex cadavere item talis fetor expiravit, ut adstantes in fugam converterent. Ad initium morbi usque ad finem viræ, vix ulla febris in illò cernuisti potuit, nullumque symptomata febrile, veluti dolor capitis & renum, siens, siccitas & ariditas linguæ, aut pulsus à naturali statu recessus, apparuerunt. Urinæ tamen statim ab initio morbi ad finem usque viræ sanguinolentæ erant.

Io istâ autem relectâ historîâ, nonnullæ occurrunt difficultates quarum aliquæ, quamvis ex Doctissimo tuo Tractatû facile discuti possunt, cupio tamen hac de re Excell. T. iudicium atque sententiam, si quando sibi per oculos licuit ulterius intelligere.

Primò quidem, an gangræna hæc tam furiosa, tamque dira & immanis, ut vix unquam similis conspexita, ex contusione sola, vel ex causa aliqua interna & occultâ, orta sit necne?

Ego ex sola illa contusione tibie, tam horrendum malum orti non potuisse, planè sentio.

Primò enim contusio in tibia etsi magis pro magnitudine tamen gangrænæ non respondebat: erat enim curis tantummodo cum carne membranâ à subiecto musculo separata: ita quidem, ut ne ramus ille insignis qui per musculum, suræ partem internam constituentem (qui cruris movementum in ordine primus) superficie tenus descendit, dilaceratus, aut discruptus fuerit; denudatus tamen, & integer conspiceretur. Hanc quoque ob causam pars illa curis dilacerata & à subiectis partibus separata, nutrimentum suò destituta, necessariò gangrænâ & sphacellâ

& spachelō correpta fuerat. Hæc verò parte abscissâ, gangræna platiūs inhiibēra fuit, quemadmodum antea dixi, neque postea ullum indicium gangræne apparuit, neque dum totum crus invalerat. Secundo, si gangræna ex internâ parte suræ ad externam serpendo penetrasset, vulnus prius labē ista infectum fuisse, quàm vicinæ partes invaderet potuisset, luce meridiana clariùs existit: ac penetratio illa, quomodo sine dolore, inflammatione & inflatione maxima fieri poterat, nondum video. Post primam autem noctem usque ad 24. mensis diem, quæ fuit tertiâ morbi dies, nullum (pro magnitudine vulneris) dolorem, nullamque præterea inflammationem adfuisse, sed optima signa digestionis apparuisse, testabuntur & fidem facient adstantes, quorum ex numero erant Rever. Joh. D. du Moulin, ejus loci Præbiter; uti & D. Emanuel Vissilius Philosoph. h. mag. & Medicinæ Candidatus, confidit meæ suavitatis. Adde quòd extremâ suræ parte nullum unquam indicium contusionis apparuisse. Tertio non potuit gangræna hæc ab externâ parte ad coxam nisi serpendo, ac in transito partes, vnam post alteram incipiendo, pervenire. Ac in hæc eorū gangrænam cūm ribiam, tūm etiam fœtur, inque & icterum, quasi unò eodem momento (interim tamen hinc inde partes nonnullas illasas relictas) invasisse, ex præcedenti historia elicere licet. Potuit itaque contusio hæc in crure, quæ quidem iudicō, esse causâ adiuvantem, præcipuum autem materiam aliquam vitænam ex corpore eò propulsum fuisse plantæ sentio. Quamvis enim antea in ovis non adn obnoxius homo iste, quia tamen rota, totum laus transgressa fuerat (id quòd dolor circa scapulum indicat) potuit facillimè sanguis, aliq̃ d. in locò concenteri ac putrefactus, in perfisterum hocce venenum converteri, postea verò à natura expulsum hocce crudele malum generare. Gravissima enim quandoque ex sanguine coagulato, Ferneliò de abditis acrum causis lib. 2. cap. 15. testis, symptomata oriuntur. Idem testatur Fernelius aliquando se patrem spachelari vidisse sine causâ externâ, sine tumore aut rubore conspicuò, oboriri primū dolore immensissimū, tandemque ægrum extinctū fuisse, sine febre, sine symptomatibus admodum gravibus, idque in hæc ægriò bellè observare licuit.

Ex modò dictis autem oritur secundum dubium, nempe, quomodo natura hænce pestiferam materiam absque symptomatibus conspicuis, puta febre, syncope, delirio & similibus, tam diu retinere, multò magis ad extremas partes corporis propellere potuerit? Tertio quomodo factum fuerit, quòd caput & totum cadaver, exceptâ tibiâ dextrâ, post obtinuit in monstruosam hænce magnitudinem intumuerit: Cūm animæ facultates, animale extinctū, omnes abolitæ sint ac cessant.

Prolis & ordine hænce: historiam recentere placuit, propter varias & inæptas, quæ hæc de apud vulgus habentur opinioniones. *Gustavus Fabricius Hildanus in Observ. Chirurg.*

De gangræna gravissima ex morfu equi progenita.

Casum de gangræna, ex morfu equi cuius in via Mildenum versus, mentionem fecimus nunc. Excell. penitus adumbrare statui, dum tamen de venenositate vulnèrum à fetis insinuat. *Bibl. Chirurg. Tom. II.*

tum prius verbum unum aut alterum præfatus fuero. Percebit apud vulgus Chirurgorum opinio mortis eorum, canum, velorum, leonum, ac similibus belluarum, maximum ac exitiosum ut se continere venenum. Huius opinionis iâ causa sunt symptomata gravissima, quæ huiusmodi vulnera sequuntur, & præcipue quod sepiissime iâ gangrænam terminantur. Chirurgum non medicorum in eptibus artis chirurgicæ veratū, s. nullatit novī, qui hæc imbutus opinione, omnes mortis animalium, etiam non venenatorum, aut ferro candenti, aut oleo ferventi, protinus imperebat, atque hac occasione plerumque sibi nomen crudelis parabat. Ego etiā huiusmodi vulnera non, nihil malignitatis in se continere profitear, quemadmodum postea dicam, attamen quomodo eorum opinio quæ ipsa absolute venenosa esse sentiant, fulciti possit, nondum video. Si enim mortis horum animalium, per se & absolute venenosa essent, tunc præfecto parvum quodque vulnus, ab ipsis insitum, non nimis ac magnam, malignæ qualitatē participes esset, quemadmodum videmus in mortu canis rabidi, ubi minimum quiddam vulnus, si neglẽdum fuerit, mortem intertere, potens est. Contrarium in prædictorum animalium, (nisi tabie infecta fuerint) moribus observant. Ingens enim ac magna ab ipsis infecta vulnera imprimis ubi ossa simul sunt fracta, periculosa exitiosa esse, necnon aliquando in gangrænam terminant experientia fidem tacit: præcipue si fractus arte nimis ligat aut eior aliquis in curatione committus fuerit. Unde igitur, inquit, pessima illa symptomata? Præfecto ego plane sentio, ipsa magis ac corrosione quàm ex venenosa aliqua qualitate bonum animalium accedente. Cūm enī in huiusmodi fractis, vi sua contundunt, & conerunt musculos, vnas, arterias, imo & ossa ipsa. Hinc dolor, hinc inflammatio, humorum affluxus, tandemque spirituum suffocatio & gangræna. Cuius rei exemplum memorabile mihi videre contigit, quod tibi viro doctissimo & chirurgicarum operationum avidissimo, prout promiseram, communicare non gravabor.

Anno 1579. quum Novissis Chirurgicæ operum datem, civis quidam in oppido Zoons ad Rhenum, ab equo in brachio graviter mortu vulneratus fuisset, cum carnis dilaceratione & ossis fractione, Ad vocatus Barbitorior, ossa fracta in sedem naturalem sepulit: vulneri digestivum, fracturæ verò medicamentum ex bolo armeno, facinæ & albuminibus ovorum confectum, applicuit. Fasciæ item ferulaceæ apposuit, & fenestellam, quæ vulnus quotidie absque fasciarum solutione curari posset, reliquit. Sed quia fasciæ ferulaceæ nimis arte constrinxerat, auctus est dolor, auctus est & affluxus humorum. Et quia corpus neque à pravis humoribus, neque ab abundantia sanguinis exoneratum fuerat, sequuta est inflammatio, tandemque gangræna. Misit Joh. Durngens, apud Novisses Chirurgus exercitatus, præcepto meo plurimum honorandus, in consilium adhibitus, brachium scarificavit, unguentum ægyptiacum, reliquisque medicamenta, quæ ad curationem gangræne requiruntur, applicuit ita ut gangræna remitteret, tandemque brachium sanitati testaturum fuisset: sed curatio fuit & longa & laboriosa, non quòd qualitas aliqua admodum maligna animadvertenter, sed quia ut factum fuerat, & gangræna supervenerat.

Anne paucos annos multir quædam Bernæ cum utris, qui continuè ibi in propriis foliis asservantur, elcam obtulisset, ac usus ipsius manum, nil fallos dextram, per cancellos artipulisset, adeo manum & brachium momordit, ut illud abscedere necesse esset. Non quòd medicè venosam aliquam qualiter in motu isto agnoscerent: sed quia caro simul & ossa penitus confusa, contritaque fuerant.

Cæterum etsi in motu animalium prædictorum & per se non venentorum, illam quam vulgus Chirurgorum ipsis adscribit venositatem, ut antea quoque dixi non invenimus: non negatem tamen, ab ipsis inflicta vulnera ab aliis, ense & cultro incisus, non nihil differre, imò etiam nonnihil in se continere posse malignitatis, atque proinde peculiarem curandi methodum requirere. Itaque ut omnia rectè, & ut artis est administrantur, motus beluarum sive eorum, sive uriorum, canum, leonum, apromm (ut & de hominis motu obicit, 84. cent. 1. scriptum) sic distinguo. Aut enim animal rabiosum est, aut solummodo commotum, & simpliciter itatum, cum morbo violat: (donec enim mansuetum, & minime ita periclitum, neminem mordet, ut quidam motum carnis distinguit.) Unde affectus quilibet, peculiarem requirit curandi methodum. Si enim animal rabiosum fuerit, vulnus sive lousere expedit, reliquaque media, quæ observatione 87. cent. 1. & observ. 98. hujus centuriæ recensentur, applicanda erunt. In motu verò ab animali non rabioso factò, inustione opus non est, ea tamen remedia quæ ab alto ad superficiem trahunt, uterpanda sunt idque in eum finem, ut si quid maligni subesset, paulatim educeretur. Primò itaque vulnus aceto, in quo thuriaca dissoluta est, abluit: postea si vulnus parvum fuerit, spiritum vini cum thuriaca, filamentis impono, & emplastrum Basiliconis applico.

Aut *℞.* Pulveris radic. Angelicæ aristoloch. rotundæ, vincetoxicæ, caryophyllatæ an. 3*℥.* folior. scor. dii, rutæ an. 3*℥.* rhætiacæ, extract. card. benedicti an. 3*℥.*

Cum i. q. mellis rosacel fiat mixtura in forma, unguentum hoc in omnibus vulneribus ac ulceribus malignis & venenosis, aethære & similibus præstantissimum est. Sin vulnus magnum & contusio ingens fuerit, ut quamprimum digeratur, affluxus humorum evitetur, necesse est, alioquin inflammatio, dolor ingens, aliæque pessima symptomata ferenda erunt. Sciatim itaque victus tenuis instituendus, corpus à pravis humoribus evacuandum, & vena, si nihil est quod obstat, tundenda erit. Membrum verò malè affectum oleo myrtino & rosaceo lousgere convenit. Defensivum quoque ut affluxus humorum impediatur, applicandum. Vulneri verò sequens digestivum imponendum.

℞. Cera novæ, colophoniz, gummi elemi an. 3*℥.* rescebinth. lot. in aqua cardus ben. 3*℥.* olei rosacel, Amygdalar. dulcium, de vitellis ovorum an. 3*℥.* liqueant leno igne & percoleatur, deinde admisce croci 3*℥.* thuriacæ, extract. card. benedicti, an. 3*℥.* vitellos ovorum 2. milces fiat unguentum.

Vulnere hoc modo satis digesto, imponatur antea descriptum unguentum ex pulvere radicem Angelicæ, Aristolochiz rotundæ, tandemque emplastro diapalmeo, aut de cerusa, vel simili aliquo medicamento inducatur cicatrix. Si dolor supervenerit nimis; applicetur cataplasma aliquod anody-

num, ex testibus nostris de gangræna, vii de combustionibus, excerptum. Si fractura adfuerit elementer & absque violentia reponantur ossa, diligenterque in sede naturali retineantur, absque ferularum tamén nimis arcta ligatione, ne fiat humorum attractio, calorique & spirituum suffocatio, quemadmodum in viro illo, cuius antea meminimus, accidit. Para astringencia, uti etiam emplastica hic, propter insignem contusionem non conveniunt: sed quæ simul digerant. Inunctio itaque toto membro oleo rosaceo & myrtino, sequens applicetur cataplasma.

℞. Farinæ hordei 3*℥.* pulv. cosar. rubear. myrtillor. sanigræci an. 3*℥.* pulv. scor. dii folior. rutæ an. 3*℥.* coquantur cum vino rubro, ad formam cataplasmatris: tum admisce. Croci pulverisati 3*℥.* ol. rosacel, myrtillor. an. 3*℥.* de vitellis ovorum 3*℥.* vitellos ovor. n. 2. applicetur tepidè singulis diebus semel, præcipuè si confusio magna fuerit, idque usque ad decimum quartum diem, donec vulnus optimè digestum sit, & graviora symptomata non amplius sint timenda. Tum in fasciis & tinctamentis quæ fracturæ circumponantur, fenestella, ut vocant, per quam vulnus singulis diebus mundenr, relinquantur, fractura verò quarto aut etiam sexto quovis die tantummodo deliganda erit. *Idem ibidem.*

De gangræna ex frigore, ac congelatione.

Anno 1600. peregrinus Britannus Romæ rediens, & in monte S. Bernardi à via recta destitutus, ac inter nives pernoctans, tantum frigus passus fuit, ut extremitates omnium digitorum dextræ manus, extincto in ipsis calore nativo, gangrænâ correptæ sint. Exorto statim dolore vehem. missimo viri sumque prostratione, maxima nonnisi cum difficulratè Sedunum Vallisiorum pervenit, epusque loci Chirurgum quendam diligenter satis in consiliu adhibuit. Is videns gangrænâ jam in spæculum degeneratam, apicè quoque digitorum plane emortuos esse, carnem digitorum circum circa ossa, prope caput incidit, necnon ad proximum articulum usque reparavit: digitos quin etiam in ipsis articulis novaculâ abscidit. Idque tali artificio & destitute perfecit, ut postea gangræna ulterius & partes sanas invadere non posuerit. Sed quia ferrâ ad hujusmodi operationes apè, bonus ille vir minime instructus, forcipe verò aut scalpro (ut plerique Chirurgorum facere consueverunt) ossa abrupere, rem nefariam, ac artificè indignam esse censuit, miserum huncce peregrinum Lausannam ad me misit: ubi præterito vito clariss. ac doctiss. Dn. Alberto Roscio, ejus Reipubl. Doctore, Medico ordinatio ar. ue celebrat. Reverendo item vito Dn. Johan. Recherio ibidem lingux sanctæ professore dignissimo, multisque aliis, ossa omnium digitorum dextræ manus ad metacarpum ferrâ abscidi, quo facto brevi convalescit, & in patriam rediit *Idem ibidem.*

Gangræna ex intemperie frigida & sicca, cum defectu alimenti curata.

Cùm senectus (Gal. Teste) intemperies quædam sit, ad frigiditatem & ad siccitatem declinans, multum nemini videri debet, morbos ex hac intemperie ortos, in senibus vix curari posse: Deficit enim in his calor nativus, qui omnia vivificare, concoquit & restituit, desit & humidum radicale, quod

quod omnes partes corporis humectat, atque calori nativo pabulum subministrat: Et contra abundat hæc ætas humoribus excrementis, quorum illius sæpe numero calidum innatum paulatim suffocatur, aut ad minimum debilitatur; inde diminuantur vires, ita ut morbi minime resistere possint. Hinc fit ut gangræna ex intemperie frigida & sicca omnium sit periculosissima, præcipue autem in senibus, & quibus partes principes male afficiuntur: Incipitque hæc species gangræne circa extremitates, quæ partes illæ peius nutrimento destituantur. Non immerito itaque Beniventus scripserit reliquit, gangrænam à digito pedis (id quod de hac specie gangrænarum intelligendum) incipientem mortalem esse. Ego (ut ingenuè fatear) inter omnes quotquot hæc genus gangrænam ex intemperie frigida & sicca, vel alimenti penuria laborantes vidi, unus tantummodo evasit. Quam historiam hic in gratiam juniorum Chirurgorum subjungere placuit, ut semper in morbis, quantumvis desperatis, de sanitate bene sperent, atque ad eam recuperandam summam diligentiam adhibeant.

Anno 1582, die 20. Augusti, cum essemus apud Illustrissimum principem Civitanensem, & Iuliacensem, Montensium &c. In ætate Breuburgensi, Presbiter quidam homo septuagenarius & decrepitus, Gangrænam ex intemperie frigida & sicca, vel (ut rectius dicam) defectu caloris nativi & alimenti, in dextra tibia corruptus fuit sine causa aliqua externa. Nullus in principio morbi dolor erat, nullumque inflammationis indicium, sed potius frigus in crure persentiebatur, unde statim ad e accessit Clariss. D. D. Galenus Wierus Archiatrum Principis, ac Colmum Slotanum, ejusdem principis Chirurgum primarium. Præceptorem meum summe honorandum. Invenimus autem paulo supra talem postulam nigram natis avellanæ magnitudinem vix excedentem, & (ut dictum) sine dolore, inflammatione, & tumore. Quæ pustula incisa, non nihil ichoris, coloris flavi effluxit, subiecta vero caro livida, & sensus experta erat. Pustula in fœtidissimum ulcus degeneravit, quod intra paucos dies tantâ fœditâ crure invaserat, ut una ex parte semimortuum conspiceretur. Unde ex consilio Clariss. ac Doctiss. Wieri erus, ubiqueque (supra aliqua gangræne aderat, scæticis vicibus, cataplasmata item, unguenta, aliaque plurima, quæ putredini adveniant, & partium calorem simul & nutrimentum attrahant, applicuimus. Ceterum Clariss. D. Doctor Wierus particularibus quibusdam internis medicamentis calorem nativum refocillavit & continuo bonis ac euehymis alimentis instantavit. Sic Dei beneficio & Medici hujus ac Chirurgi diligentia summi, atque industria, revocato tandem colore nativo, & humido radicali, putredo remissa, reliqua quæ etiam symptomata paulatim cessarunt. Manducato dein ulcere & penè sanato, Clyvium reversus est æger, ubi domi suæ adhuc ad tempus aliquod supervixerat. Idem ibidem.

Quidam cum supra modum incaluisse, & ipsius corpus aquâ frigidâ perfusum fuisset, gangrænam & sphacelo in tibia corripuit.

Ceterum antequam ad problemata sua respondeam, affectum gravissimum tibi communicare visum est. Superiori ætate, cum Basileæ apud serenissimum Principem ac Dn. D. Jannetum Radzivilium Lituaniæ &c. Ducenti, per menses aliquot (ut ex præcedentibus meis ad te literis intellexisti) moram traherem, accidit noctu ut in platea quæ portui proxima est, domus quædam incenderetur.

Cum verò cives accurrerent, ac quidam juvenis, viginti circiter annos, robustus, plethoricus, & optimo corporis habitu præditus, rectum proximum concendisset, ibique cum propter caloris ab incendio vehementiam, tum etiam propter labores, supra modum incaluisse, rogavit focios ut aquâ frigidâ sibi corpus perfunderet: hoc enim nisi facerent, ætatem maximum non amplius se sustinere posse, sed de vitâ periclitari, aiebat. Assundunt aquam eamque copiose, ita ut vestimenta omnia ipsamque corpus undique madefactum esset. Quid sit? corripuit horrore, ita ut vix eo recto descendere & ad ædem suam pervenire posset. Postero die, ac deinceps etiam graviter laboraret & maximum incendium interorum viscerum persentiret, morbum tamen neglexit. Citea quareum narata cum per criticam expulsiorem flet exoneraret, crura dextram quoque intumuit, & inflammatione correptum fuit. Ad Xenodochium itaque deducitur, ubi Clariss. ac ætatem laude digniss. Vito Dn. D. Jacobo Zwingero, pie memorie, & Chirurgi commissus fuit. Post dies aliquot, cum inflammationem in tibia ad gangrænam tendere videret Dn. Zwingerus, rogavit me, ut miserum quoque inviscerem, ad ægrem itaque me confert, tibiamque ad popliteum fere usque, gangrænam corruptam animadverto.

Porro etiam vires prostratas, febrem maximam, tibiam quæ etiam ad coxam fere usque supra modum tumefactam, ac proinde rem istam in angustis posuimus esse, satis superque videtemus, attamen quia lassissimè, etiam in desperatis, divina clementia atque Potentia, præter spem atque opinionem Medicorum se se patifacere solent, & semper (ut divinus Hippocri lib. 2. Aphor. 25. nos monet) omnia secundum rationem sint facienda, ejus undique scitissimus, rationem ægyptiacam, aliaque medicamenta quæ præcedenti adveniant, applicuimus, sed frustra, sequenti enim die, ad coxam regionemque hæratis usque livida reperta fuit, Lithomyia, frigus extremitatum & sudor frigidus aderat, & eadem die vitam cum morte commutavit. Idem ibidem.

De gangræna & retentione urina; historia singularis, in qua rara nonnulla recensentur.

Ceterum quia statum generosi nostri ægri scite cupis, ipsius iussu paucis, sed ordine ipsum tibi aperiam: Reversus hic ex magna Britannia lapsissime de ardore urinae, nonnumquam quoque de ipsius retentione conquisitus est, sed humilis emulsionibus & te præscriptis Enematisque, adhibitis quoque candellulis facillè restituebatur. Ex sinistra tamen parte peritonæi à duabus aut tribus mensibus ante morbum, usque dum ruptus fuit abscessus in perineo, ut postea intellige dolorum punctivum, non usque adeo acutus tamen continûs periculis. Citea principium verò menses Aprilis hujus anni, cum præscriptam videtur rationem non satis exacte observasset, in exercitiis quietiorem corporis, modum excessisset, furorem quandam in urina percipere cepit. Ferox ille paulatim adeo ausus fuit, ut mirum sit, quomodo talis portento absque febre, nausea, aliisque gravissimis symptomatibus in corpore tam diu delitescere potuisset. Eodem quoque tempore in suodo urinae, mæretica quædam villosa, spermatica ranzarum ooo abissimilis conspiciebatur. Præterito mense Majo, cum à Alpes prædia sua invensendi gratiâ, profectus esset & scopulos pedes ascenderet descendereque, & proinde præter modum ac consuetudinem suam incaluisse, longè vehementius quàm antea ipsum invaderent symptomata. Reversus Bernam cum esset, Emulsionem exhibui, Enema ex

lacte quod præscripsi, inieci aliquoties: Renes unguentis & oleis refrigerantibus innixi, post dies quoque aliquot corpus medicamentis ebulligato leniter expurgari, venamque in brachio incidere. Et quia materiam illam feridam & viscidam cum urinâ copiose ipsam excernere videbam; fusi, ut per dies aliquot sero lactis cum saccharo uteretur. His per dies quatuordecim adhibitis medicamentis, & exquisitissimâ observatâ victus ratione, cum omnia salva esse videbantur, factor quâ etiam urinâ omninî remittere videretur, Solodurum cum Illustrem Dn. Micronium Chistilantiss. Regis legatum vocor. Non diu post mensum abitum, malum & longè acerbius & crudelius quàm unquam antea, ipsum invasit, non solum coim febris ardentissima & continua, cum urinâ retentione, verum etiam phlegmone in ipso perinæ exorta est. Quapropter me absente, Dominum Davidem Regem, hujus Reipubl. Doctor. medicum ordinat. & doctiss. appellare coactus fuit. Insistit & ille Emulsionibus Escamabouique & locum affectum oleis conveolentibus inungit; semicupio quoque propter doloris vehementiam, vel coactus fuit. Interim ego acerbius adeo anxium agrumque veluti in agone reperio. Febris enim vehemens, syncopæ frequentes, nausea, cibi fastidium, urinæ ardor & retentio, omniæque, fere signa, quæ mortem præseutem precedere solent, adeant. Phlegmone in perinæ magnitudine ovum anicinum adæquabat cum maximo dolore pungitivo, tumore & duritie scroti & virgæ. Dn. D. Rex ante meum adventum anodynis, & quæ discutunt ac resolvunt simul usus fuerat, sed frustra quapropter ad pus morientia oobis transfundendum fuit: Sequens itaque cataplasma applicimus.

26. Radicum & folior. altheæ, malvæ, an. m. i. coquantur & pistentur, ut atris est, quibus admisce fatinæ tritici, ʒ. ii. fatin. sem. fuminæ, & lini. an. botryl recentis, Olei liliorum albis & unguent. de althæa an. ʒ. i. f. croci. ʒ. ʒ. vitell. ovor. num. fl. melle, fiat cataplasma, quod calidè applicimus bis terve in die. Vigesima nocti maii cum in medio perinæ & quidem in ipso tauro ruptus fuisset abscessus, pus ad eundem putridum & sœtens in copia effluit, ut totum conelave, incredibili & plurimum cadaveroso suo fetore adimpleret. Factor ille per dies aliquot continnavit, talis enim erat sphaerosola putredo, ut totum perinæum emortuum excideret, & ulcus ingens post se relinqueret. Interim ego quæ putredini resistant, applico, ulcers unguentum Ægyptiacum meum in tractatu mox de gangrænâ descriptum, cum filamentis & duabus turundis, quarum una versus scrotum ascendebat, altera deorsum versus podicem descendebat, impoſui; postea sequens cataplasma applicui.

27. Farin. lupinor. fabarum an. ʒ. i. ʒ. Pulver. fuminæ, abynthi, scordii, turæ, an. ʒ. ii. coquantur in oxymelle simplicis, siæque cataplasma: adhuc calenti admisce. Aloes, myrrhæ, an. ʒ. i. ʒ. carnem suam emortuam quociescumque ulcus deligavi, forfice & scapellis ad id aptis, quantum fieri potuit, excidi, pus cum penicillis ex spongias in decocto scordii, turæ, abynthi, & lopinorum, addito sale, madefactis absterxi. Sic per singularem Dei misericordiam putredo paulatim, & quidem intra triduum cessavit, nec ulceris sepsis: quapropter usum unguenti Ægyptiaci intermisit, & linimentum ex pulveribus radicum Aristolochiæ rotundæ, Iridis florentinæ, Angelicæ, Aloes item & myrrhæ, cum Extracto scordii, parumque vitelli ovi mixtus, ulcers impoſui. Cataplasmate rariore præscripto ultra hebdomadas tres usus fuit. In perinæ autem non solum cutis & caro à putredine erosa fuit, Verum etiam membranae multæ putridæ, ductus urinarii, procul dubio tunicæ, excidende at-

que extendendæ nobis fuerunt: quapropter, & omnis fere strinæ per ulcus effluxit, idque lo longuio, ut posset dicam.

Citæ inhiuim junii in medio virgæ, & quidem in ipso latere dextro tuberculum, quod ab initio fere morbi durissimum fuerat, in abscessum abiit, qui paulo post ruptus quoque est, non tamen ad ipsam ductam urinam penetravit: quapropter adhibitis emollientibus, digerentibus, & mundificantibus haud difficilè coaruit. Triduo à rupto in virga tuberculo, humor qui antea per totum scrotum expansus erat, in imam ipsius partem, versus ulcus in perinæ decubuit, ibique exuberantiam quandam duram effecit.

Postquam verò applicissemus lacculos emollientes, unguentum item de althæa, & Emplastrum ex melileo; materia ibidem collecta, per ulcus in perinæ paulatim evacuari fuit.

A catæ putridæ & membranis sphaerælati facis mundificato ulcere, decocto Traumatico ex pyrolâ, alchamilla, fanicula, consolidâ saracenicâ, artemisiâ, & betæ tubra, cum vino tubæ hypico vi sumas, hoc modo: bibi æger haustum tribus horis ante prandium & totidem post cenam: cum siphonæ quoque ulceri illud bis in die calidè iniecerim: duabus quinque etiam cum turundis eodem decocto madefactis ulceri immisimus, unâ videlicet sursum, alterâ deorsum versus perinæ. Tandem hunc reduplicaturâ io eodem imbuitum calidè applicimus. Nunc tantum autem ulceri cum siphonæ decoctum, verum & ipsi ductui urinario, tam sursum quàm deorsum infundimus. Id verò ut commodè fieret, totum siphonis incurvatum fieri curavimus.

Non autem admiratione caret, in hac gravissima maximeque putredine sphincterem semper saluum & locolum extitisse. Apparet id inde, quod æger etiam in morbi ipsius vigore urinam temper retinere posset, nec unquam illa involuntarie effluxit. Ulcus nihilominus quod deorsum versus vesicam teodebat profundum erat, & ad ipsas Prostatas, quas ego à longo tempore male affectas fuisse existimo tendebat. Quociescumque autem urinam exercebat, parum quoque post ulcus effluere, abique ulla tamen difficultate & dolore. Prædicto decocto Traumatico, eo modo ut dixi, in tertium mensem usus est, ita ex paulatim ulcus plenissime consolidatum fuerit, nec fistula ulla remanserat. Faxit Deus Opt. Max. ut recuperata valetudine diu ad Dei gloriam sui possit. Porro præter Topica enumerata etiam in universalibus nihil prætermissum fuit. Ab initio vix præter modum labefactas cibis optimi succi, cordialibus item medicamentis, quantum fieri potuit, instauravimus. Deinde paulatim recuperatis viribus, de triduo in triduum, aut etiam alteris diebus, nonnihil Terebinthinæ optime exhibuimus, cujus beneficio alvum lubricum fecimus, & vias urinarias simul expurgavimus. Renes unguento rosaceo cum camphora inungimus, & laminam plumbeam ejus magnitudinis ut lumbos & os sacrum cooperiret, applicimus. Nunc optimâ valetudine, laus sit Deo, fructus generosus ille, nec ullum incommodum hujus mali gravissimi præseutit. Urinam absque ulla difficultate & impedimento excrent, præterquam quod cum post cenam ipsam reddit, prout quendam dolorosum, eo in loco, ubi antea fuit alvus, percutiat. In urinâ præterea nonnunquam infusus conspicitur. Præterea quociescumque vult ipsam excrent, guttula una materie viscidæ, albæ & glutinosæ in extremitate ductus urinarii ante excretionem urinæ apparet. Quis illa sit materia, & unde

proveniat, ex Te scire, cupit generosus? Ego materiam illam ex labefactis & nondum satis corroboratis prostratis pervenire existimo, effluque veluti excrementum feminis, beneficio naturæ ad extremitatem virgæ projectum. Deinde etiam quærit, cur prout ille dolorosus in urinz excretionē, post cenam, cum cubitum iturus est, solimanodo, non autem mane aut interdiu sententius? Arbitror ego, naturam locum illum membranam suā delicturum, noctu, cum naturales operationes præcipue sunt, viscosa quadam & glutinosa materia in eum suum, ne ab acrimonia orinz lædatur, mittere: Interdiu verò urinam, quia aliquoties excrenitur, materiam illam abluere, præterque adhuc debilem vellicare. Hæc si non probabilia, verisimilia tamen mihi esse videntur. Sed amplius declaracionem, & quomodo hinc symptomatibus impoſitum occurrentium sit ex Te nobilissime vir, avidè expectamus.

Generosum ægrum porro quod atinet, etiam nunc opinamur exquisitissimamque observat viçus rationem. Per intervalla quin etiam uritur Terribintha. Præterito quoque autumno Apraxmate laxativo corpus expurgavimus & venam in brachio sinistro secucimus. *Idem ibidem.*

De admirandâ curatione scrovi post gangranam delapsi.

Anno Domini 1616. mense Junio, vir quidam bonifolius, annorum circiter quadraginta, vino obutus, cum repente in scrovi tumorem cum febre acuta, & vitium subita dejectione incidisset, à Chirurgo vocato remedium petiit, qui cum livorem istius partis cum exulceratione penis totius, imo periculum, quod manifestum gangranam deprehenderet, noraret, de cura sollicitus, petiit consilium Medici. Ego vocatus injecto prius clystere, quoniam alvus à biçio non responderat, præscripti cataplasma ex scotillo, ruta, farina lupinorum, orobul cum oxymelle, vino & similibus. Per os exhibui diſensam Hæton. Fractosii. Unde aquam Theriacalem, quod malignitatem cordi communicatam obviarem, sine hac enim vix respirare potuit. Die sequenti deposito caraplasmate super cuticulam, quam Epidermidem vocant, separatam vidimus: tercio die scrovi sponte apertum, circa vesperam vel libras aquæ decem effluxisse. Quarto die testes ex toto nudatos confestim, deciderat enim scrovi præter usque ad perineum. Hic quod factum opus deliberavimus, resiccarebis & incantamentis remediis, quatuordecim dierum spacio tantum profecimus, ut non tantum teris scrovi muniverimus; sed & natura scrovi novis pillis vestivisset, glans peni tederit integra, omnia ulcera penis consolidata fuerint, & officium viti deinceps paries præstare poterit. Ego nec quicquam Medicorum nostrorum similem nec vidi, nec audivi: laus venetæ oſſa suspicio: nunc inculcata fruiſor valetudine.

Ego naturam potius in conservacione speciei quam individuali sollicitam esse dixi: studet enim perpetuari, ut eum individuum servare non possit servet speciem, quod præstat paribus, quibus sobolescimus. Si molestum non fuerit, & negotia fecant, judicium Cl. T. officioſe pro, *Idem ibidem.*

De Gangrana Parina & scrovi admirandâ curatione.

Monstra in morbis fieri, Vir nobilis, Amplissime, Avetæm, summum illum Philosophum rectè scriptum reliquiss, indices experimur. Testis est admirandus & fortè laudatus ille casus, quem Clarissimus vir mecum communicavit. Ego infinitos propemodum vidi ægros, gangrenâ scrovi laborantes, sed, ut ingenuè fatear, ne unus quidem testitutus fuit. Pudentia enim cum partes corporis sint humidissimæ, tæx & spongiosæ. facile excrementitios humores ex corpore descendentes recipiunt, sequiturque gangrana, uti facilissimè in hydropicis observamus, in quibus gangranam pendorem, propter cachexiam corporis, & labefactionem viscerum, nec non caloris nativi partis affectu imbecillitatem, plane inlanabilem esse existimo.

Ægrum autem de quo Clariss vir scribit, non fuisse distantum aliquo multo affectum, ex licetis clarissimi viri colligo: scribit enim, ipsum vino obutum repente tumore scrovi cum febre acutâ correptum fuisse. Vires itaque non fuerunt à diuturno aliquo morbo, quemadmodum sit in hydropicis, consumptæ, sed adhuc intæ: quapropter morbum facilius debellare poterunt. Sutile quid videte mihi licuit.

Generosus quidam Benensis, quadraginta circiter annorum ætatis, à multis annis carunculâ laboraverat, quæ ipsi multum negotii faciebat. Ante annum, circa principium Aprilis, cum præscriptam à Medicis viçus rationem non satis exactè observasset & in corporis exercitiis modum excessisset, primò scrovi tumorem cadaverosum iu urinâ (quæ sedimentum viscidum, spermatis ranarum non assimile habebat) percipere cepit. Ego quæ tenes, vialque urinam abstergeant & mundificent, præscripti, interim tamen facior ad septimanam aliquot continuavi. Tandem penitus supressâ urinâ, & exorta inflammatione, in ipsi perineo gangrana sequuta est, ita quidem ut totum illud interitum, quod est inter podicem & scrovi, ductus item urinatus partim exciderit, partim quoque excidendum fuerit. Longa esset ratio, si omnia quæ annotatione digna in hoc ægro occurrerent, recensere vellem. Clariss. Vir omnia ordine videbit in v. Centuriâ Observationum meorum, observ. 64. in quâ paulatim progreditur. Tandem omnibus administrantibus, veluti ex cymbâ Charontia evasit, & nunc integrè fruiſor valetudine, necque ullam molestiam in reddendâ urinâ sentit. Caruncula enim omnes, quæ antea ductum urinarum coarctabant, etoræ & ablata fuerunt. Exigua præterea fistula in perinæo remansit, & maximò quidem cum ipsius commodò; Viscidi enim atque excrementitios humores, qui ex superioriſſis & labefactis partibus veluti renibus, vesicâ & vasî spermaticis, descendunt, liberè per ipsam effluunt, non tamen involuntarie sed cum ipsâ urinâ, quam pellicula, ad id ex industria fabricata, excipit. Observatione autem dignum est, ante menses aliquot, cum ulcus illud in perinæo, ita volente & jubente ægro, me verò dissuadente, maximâ adhibita diligentiâ, electricè obductum fuisset, ægrum retentione urine aliſſique incommodis, quæ carunculas comitari solent, de novò tantisper afflictum fuisse, donec fistulâ iterum rupta fuerit. Potto ut eodem, unde digressus fui, nisi juvenis adhuc esset generosus hic æget robustus, optimò quin etiam corporis habitu præditus, vix evasisset.

essisset. Natura enim ut Clariss. Vir recte quoque tenet, semper sollicita est in conseruatione Individui sui, moribique sese opponit: sed prout valida aut imbecilla fuerit, aut victrix evadit, aut victa succumbit. Memini aliquoties ex Dn. Colm. Slosano, p. m. Chirurgo praestantiss. intellexisse curationem admittendam, nec absumilem illi, cujus Claritas tua mentionem facit, corpus etiam memini centur. observ. 48. Est autem talis.

Quadragesimus quidam Colonienſis, robustus, optimo corporis habitu praeditus, cum aestatis tempore supra modum, incaluisse, & maximum haustum frigidae bibisset, post dies aliquot febre continua correptus fuit. Ex qua potius naturae beneficio & industria, quam arte & medicamentis Medicorum curatus fuit: interim tamen intemperies & visum in hepate remansit, quapropter paulo post in cachexiam incidit. Et ita quidem, ut primò lèstis, postea quoque Aëste prehenderetur. Advocatus Dominus Doctor Bernardus Cronenburgius, si recte recordor Medicus Colmienſis longe celebrissimus, omnia quae ad morbum debellandum necessaria esse videbatur, adhibuit. Tandem veluti per crisiam, expulsionem in scrotum delapso humore Dm. Slosanum quoque vocatum in consiliu. Ambo omnem adhibent diligentiam atque industriam. Interim tumor scroti non credit, sed paulatim eo in locò, extincto calore nativò, in gangranam desinit. Scrotum itaque undique phlegmonò scarificans, sale marino & theriaci aceto diffusit abluunt: Unguentum Aegyptiacum & cataplasma ex farina Juniperorum, lolii, aloë, myrrha, cooridò, aliisque putredini resistentibus applicant, nec quidquam eorum quae ad universalia spectant, praetermittunt. Optimam victus rationem praestant, corpus per intervalla leniter, leviterque expurgant: Corroborantia & obstructions aperientia, cum foras exhibent, tum capis, hypochondria, & ventri applicant. Interim dum aqua copiose per scrotum effluit, & per meliuscule habere, viresque recolligere capis. Demum scrotum sphacelatum, partim naturae & medicamentorum beneficio decidit, partim quoque quod sphacelatum erat, à Dn. Slosano novacula resectum fuit, ita quidem ut testiculi nudi conspicerentur. Ulcus per menses aliquot apertum mansit. Interim narrat quiddam humoris excrementis visceribus inhaerebat, per hanc viam ita evacuare, ut partes mobiles in integrum restituerentur, & à morbo plane liberaretur & per. Circumflecta autem testiculos, quod notandum, natura cicatricem duram, adeoque callosam procreavit, ut ipsos vice scroti, ab externis injuriis vindicare sufficiens esset. Sic Dei beneficium omnino tributus fuit & per, & ad multos annos in matrimonio vidit, liberisque aliquot progeniuit.

Ante annos aliquot cum Lausannae Medicinam facerem, venit ad me Sabaudus quidam 41. circiter annor. aetatis, cujus nominis de industria parum, huic ulcus ex me venerat orium plasmam diutius parrem scroti & testiculorum erofetas. Adhibitis à me medicamentis, Deo benedicente restitutus fuit, & liberus ex uxore sua suscepit. Hanc coronidiam loco adlo historiam, etiam à praecedentibus diversis sit. *Gustavus Fabricius Hildanus in observationibus Chirurgicis.*

Gangrana Universalis.

Seni fatuo, neque heri, atque hoste, sed diutissime debili faciebant tandem ulque eo, cum lan-

guidum cor, non effectus partium calor: ut à nimia corporis ossilia, sequeretur potius perniciosissima gangrana. Dispersens se per incens hocce corpus, tam libere, ac lae ut id intra paucos dies, consumperit universum.

Non licebat illi, vel natibus insidere, vel cubito incumbere: nedum calcem pavimento imponere, vel scapulam in parietem inclinare, quin proutinus exingueretur calor: & à gangrana obdeteretur non minus pars pretens, quam pressa. Quae labes, tam praeperae penna, corpus universum, ubi per-volatet: vidimus brevi, vix ullam partem intactam: quia omnia jam emortua, antequam verè emortueretur, miserrimum hocce, lacerantis moris luditurum. *Niccol. Taupius Observationum Medico-Chirurgic. lib. 3.*

Gangrana pedis.

Lucas Sicus, geometra Apollitredamentis, contraxit ex penuria caloris innati, gangranam pedis sinistri. Cujus digitis à parte sana jam avulsus, obulit nonnumquam, humo natum jocundus, Chirurgo sub: ubi jam mellisculi ipsi foret, pedem dextrum: quasi eteandis causis.

Sed eo, eadem labe paulo post, fridem infecta, delensit illum illico intemptiva haecce hilaritas, & quasi desperata, jam tum omni salute, credidit finit, penam hanc calidus ipsi immisit: quod tum intemptive jocularis fuisset. Quae certe tristitia non delensit ipsum, antequam deleret ipsa vita. Adeo periculosum in scitis nugari.

Infestum autem, quod ipsum oppreſſit, circumvenit pletumque, quosunque à simili gangrana detentos. Neque fuit fortassis, ipsi conditio, eo deploratio, quod peccatum hoc, peccasset: sed quia cordis tobis fuit imbecillius, quam ut conveniret ab interitu vindicaret pedes: cui longissime, à se remotos. Quorum parium exitum, propterea iudicium facit circumspicis medicis, brevi ulque pessum iterum, & totum hominem. *Idem ibidem.*

Gangrana partium naturalium.

Innumera in feminas cadere incommoda, mentis post partum minus prospere succedentibus, vel Tyroni notum, ac cui cognitum, explurimumve. Omnem expurgationis uterinae impetum consertim propelli, in partes naturales, idque inde, non tantum extrinsecus protrudere, Veram gangrana etiam obideri, quorum felicissimum eventum dum nobis oblata sunt Exempla, & utramque puerperis aequae exitiale.

Magna locuples difficillime enixa, cui nihil post partum, ex naturae lege, à vulvâ fecederet, doluit impense citra naturalia, praesigni illorum tumore, quem tamen inviolissima quom ostenderet, Geregimus quidem cum per clysteres ac potiones: tum per someira ac olea opem adferre, sed tunc ac opera deperditis, malogi. In dies invalescente evicit tandem pudorem, facti copii illius tumoris, quem necessitas non sinebat ulterius celare.

At fluxus uterinus tam libere, tantoque impetu jam tum, se effuderat, in declivis haec partes, ut etiam ac dissentit ad sub ac fervido hoc uteri excremento, jam indurienti naturam gangranæ: cum cure nigra, febre ardente, crebren animi deliquio imi ventris dolore, ac summis praecedentium angustis,

angulis, quorum gravissima symptomatum vehementia. Adactis Chirurgis, aperti non solum scapulo locum, et ceterique inde plurimum concreti ac glutinosi sanguinis, sed vetas infusorem menstruum reliquias. Verum fategit quoque loca sineca de fecedere, & quod induruerat, in pus convertere, cujus voti propemodum compos, conceperat certe non exiguum sanitatis spes.

Sed heu vanas hominum spes & incerta conceptæ valetudinis argumeta. Vix animos fecerat sperata victoria, quin proinde in pus rueret, atque ante duodeviginti interveniente puerperæ inexpectatum vitæ exitum, secundum illud Celsi: Adeo in medicina, ubi etiam perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id quod sequi convenit. *Idem ibidem.*

Vulva Reliquæ Intestini gangrana & perforatio feliciter curata.

In gravioribus affectibus haud decet Medicum facile desperare; sapientius enim sunt, quæ fieri posse pernegare. Reperiuntur adtiones quæ non veniunt mox exclamare: *Non curabitur, non elabitur.* *Asteriscum est ægra &c.* Attamen si nomini & famæ cupereat consilium, cautius certe prognosticari deberent. Uxor cupuldam Pistoris Amstelodamensis, ob partum difficilem, incidit ante aliquot annos in vulvæ intestinique recti gangranam adeo enormem, ut multi existimarent assistentem brevi à vivis excessuram. Post gangrenæ separationem foramen vulvæ à nobis reperiit fuit tantum esse, ut facillimè nux juglans viridi cortice obducta per illud ad intestini recti cavitatem inferi posuisset; unde foribus vivinis dabatur locus, ut ex intestino recto ad vulvam nullo negotio transirent, id quod in tali casu admodum familiare. Vulva enim tum statim coheret intestino recto, ut quasi continuum sit corpus. Itaque si alterutra pars afflicta, altera nequit remanere innoxia. Chirurgus qui mecum curationem suscipiebat, excogitabat instrumentum à bractea confectum, in forma peltatis excavati, cujus superficiem exteriorem obduerat sacroto medicamento: quale juxta Theoriam Chirurgicam equidem non erat improbandum, sed tamen in praxi præfenti inutile fuit reperiit, neque enim illud perficere potuit ægra. Itaque dictis medicamentis, phlmacolis exceptis, aperturæ dictarum pituitum prosequimus, quibus brevi in totum convalescit hæc puerpera. Ubina jam sunt scoli, qui effusione epulmodi malum esse incurabile, & sine ulla remanente nunquam curam posse absolvi? Eiant non solum hanc puerperam in totum fuisse restitutam, sed et nulla superesset labe, verum etiam diversas ex eodem affectu à nobis esse curatas. Hoc verò diffamem in gangranis partium animum. Scilicet, si partes posteriores, nempe, quæ os factum respiciunt, tali affligantur morbo, facilius curantur, propter intestini recti carnositatem, velveque dispositionem, quæ versus intestinum rectum non quod rei ruga transmissa, nervis & duris, curationi obstatulum inferentibus, sed quod omni ibidem molliora, curationique magis prona. Præterea in parte anteriore, nempe, quæ meatum urinæ respiciunt, propter continuum urinae stillicidium sanatio præcipitur, unde tum sapientissimè sibi relinquatur incurabilis. *Fræder. Royssch. obfero. Anatomia. Chirurgia. Centuria.*

Sphacelus strictiorem ligaturam sequatur.

Patitur puer quidam rusticus ix. annorum in agro Gorlicensi fracturam sinistræ manus in medio cubiti & radii: Ligatur ab imperito ciliat illius loci omnis arctè, unde subsequente aurora, rubore nigricante in manu subortò, cum sanguinis eruptione circa apices digitorum manus cepit gangrænescere cum infelici ejusdem sphacelo, factaque hinc amputatione. *D. Ehrenfrid. Hagendorn.*

Gangrana brachii ab incantâ venesectione

Nobiliss. & magni nominis Jure-Consultus D. Oc. à s. Patricius Norimbergensis, cum juvenis, ex Hispania rediret, Moosspelli in galliis ex præcipitante, Chirurgi aliis peccolebris, sanguinis missionem procurantis, in extremum fere vitæ discrimen inciderat. Nam iste, conspecta quadam in medio brachii fiera cicatrice, profundiorē venæ si tamen conjecturans, cultelli (*Lancetæ galli vocant*) eupside jussu longius atreptâ, non venam tantum infelici ictu percuterat sed simul nervum quoque sub vena latenti gravissime læsit. Ast Oc. infelici hujus sectionis ignarus, cum subsequente die horrorem febrem sentiret, in emittendo sanguine ex altero brachio, ejusdem Chirurgi operâ, sed feliciore ausu, usus est. Sequentibus diebus, in pelvis septimo, brachium dextrum supra modum extumescere, inflammabatur, ac tandem in sphacelum converti videbatur, tanto cum patientis exqu岸issimo cruciatu & dolore, ut plurima sanguinis & saniei copia excreta, ad interitum fere decumberet; variis quidem medicinis intus & extrinsecus, frustra tamen applicatis. Et quavis singulari tormentationis beneficio ex catellis & felibus trecentissime editis, atque summo studio ad id requiritis dolores aliquantulum mitigarentur, atque calor brachii naturalis omnimodè redintegraretur; ipsum tamen malum à gangrenâ conceptum non nisi cum brachii abscissione, vel funesta totius corporis perniciē, curari, aut deponi posse credebatur. Quia propter totum Medicorum Collegium inclytis inibi Academicis in consilium convocatum, præmissa inspectione oculati, unum ex istis tribus ægro eligendum pronuntiabat, vel brachium ob incidens gangrænæ malum incutabile, amputandum; vel nervum cum amortizatione totius brachii discicandum; vel vitæ subsidium quodcumque. Is reputans rem sub roga, seu sub fago, se brachio indigere, ultimum eligens, maluit vitam cum brachio amittere, quam sine brachio eandem misere & orisole producere. Ob id in tam desperato casu Medici & Chirurgi rebus ægri miserè reliquerunt. Postero verò die ordinis Medicorum illius loci supremus, D. Joh. Hucherus de Bellorac, ad ægri jam quasi conclusum accessit, narrans in simili plane casu, olim Carolum ix. Galliarum Regem provida ejusdem Medici ope & arte curatum fuisse, si æger debbo atis eventui se committere, & tam ad gravissimos dolores obduratum, quam ad sumptuum plurimum ergationem lubenter paratum præstare vellet, luum quoque scientiæ & operæ studium adhibiturum se indenter promissit. Annente ægro Hucherus novacula atreptâ, in affecto brachii loco novam vulnus crudeliter incidit, & ægro ipso vulneris incisionis foras remanente & dilatante, frustula quadam inietta, vulneraque rursus colligito, paulatim diebus

dictus id efficit, ut vena perforata & nervus latus conspicerentur. Cum verò somentationibus premis, fervido & bulliente oleo locum affectum Medicus crebro perfunderet, eo ipso patienti tantum cruciatum cavavit, ut viribus plane consumptis denique in mortis vicinia versaretur. Tandem immensus doloribus paulatim remissis, ligatura aperta, notabiliter apparuit, quomodo nervus præcisus infusus bullientis olei beneficio coalescit, ac quasi conglutinator fuerit, quo & petacho, vulnereque perfusato, ipsum brachium piliis vires indices recipere, & pariens præter omnem expectationem in integrum restitui cepit. *D. Thom. Bartholini.*

*An gangræna pedis ex Sp. C. C. rectificata
inunctione proficiat.*

Amplissimi Viri amicæ petitioni satisfaciendi, perlegimus jussu diligentia transmissum Casum Medicum, & ad questionem propositam brevissimè respondimus. De facto tamen iudicium nostrum suspendere debemus, quia deficiente Medici Sempronii relatione, circumstantiæ variæ desiderantur de ægræ Viduæ statu, malo præcedente, remediis adhibitis &c.

Interes ad Questionem Primam officiosè responderet, videri pustulam in pede excitatam, fuisse mali moris ante farinarum Medicatum applicationem, alioquin enim cessisset, ad minium ex parte, post admotas farinas, quin & pravitatis ejus iudicium esse, quod totus ille prior dolor, & cordis, & aliarum partium superfluum, desierit velut in punctum ac centrum pustulæ, adeoque ibidem tanto vehementiorem in angusto spatio excitari dolorem. Putamus autem minus convenienter illi tum postea Spiritum Coræ Cervi rectificatum, præsertim si purus ille fuit, & non temperatus mixturis aliis, qualem scilicet mitionem nostri pharmacopœi dividendum. Opporuerit adhibuisse Sempronius diaphoretica interna, quàm externum illum vehementem liquorem, qui non potest non, præcipue in affectu non frigido, causari tandem dolores & alia incommoda. Neque spiritus ille in hoc casu salutari potest *Schmerz. Stillende* spiritus, si accensat loqui placeat. Solent tamen Medici in Inscrptionibus medicamentorum propter diversas intentiones ludere quandoque vocabulis, atque id lenoxie.

Deinde, postquam ex superioribus constat, pustulam fuisse pravi & mali moris, non credimus inflammationem illam, & supervenientem gangrænam, in totum Spis. illi Cœni Cervioi adscribendam esse, cum etiam sine illo medicamento potuerit sensim ex pustula illa seu fonte infecto malle, præsertim si corpus fuerit Cacoehymicum, & græ in feoium declinans. Potuisse tamen dolores accelerare, & aggravare non negamus. In fina autem carne gangrænam ab liquor gustatum illitu, etique quaterve repetito, excitatam fuisse, hætenus non observavimus.

Tandem, quamquam Theriaca diatesaron fœco Sambuci permixta cum fructu applicari possit erysipelati incipienti, adulez tamen inflammationi sistenda quomodo servare poterit, non videmus. Solum rob Sambuci applicatum fuisse innoxium.

Cocclusum in Collegio nostro Medico, Hafnise 26. Martii 1710. 10c. lxxix. Th. Bartholin. Er. Bartholin. W. Worm. Ol. Botrichius. Gasp. Bartholin. Th. F. E. Clav. Thom. Bartholin. Alii. Hæst.

Remedium in Wierow ad Gangrænam

Acceptis Miscellaneis Academicæ vestræ Curiosas gratias ago, quod me inter Principes Archivos primum in Scenam producere voluerit. Instituto præclaro Deus annuat, ut tantum opusquod molissimum in Reipubl. Medice emolumentum cedat. Alias Observationes superaddiderim, sed Vulcanus omnes turbavit meos calculos. Quia aliis subdilis jam destitutor, prona voluntas interveniendi equi bonique consulenda, donec ad me ipsum rediero, interea tantum unam alteram mitto historiam, quæ scribenti occurrat. Græssabant nuper apud nos Morbilli maligni: facies exinde puella gangræna adeo defædada, ut labia pene fuerint consumpta. Sedavi statim serpenteum gangrænam aqua marina, cui abinthium incoctum, quod experimentum in aliis quoque gangræis opposui felici cum successu. Dn. Th. Bartholini in *Lat. Hæstia Danorum ad D. Særlum datus.*

Scholion. J Remedium simplicium maximam esse varietatem, nemo est qui dubiet, habuerunt Græci sua remedia, suppeditarunt Mauritanii maximam eorum sylvam, sed ut Rombus ait Ep. 28. p. 98. Videmus adhuc alia in usum cecisse, quæ illi ne attrigerant aut viderint unquam. Quanta non Remedium comitocopia inaudita pœtis feculis emergit inde ex utraque Jodia, & ejus adjacentibus Insulis, adeo recte dixit Comicus.

*Ufus, atas, tempus aliquod apparet morbi,
Ut qua te modo fœre credas, nefas.*

In Gangræa tali messe plurimi non sine certa ratione Remedia apud nos nata Exoticis præstantiora iudicant, ut pote cum ob familiaritatem cum nostræ naturæ constitutione, tum quod iustis fors petantur auxilia, quibus domi abundamus, ut censeat Andr. Libav. Ep. ad Schniz. 44. p. 135. in cista Horung. Agoovit hoc infirmis Exc. fuh. Bo-verovicus Med. Dordrecht, qui Lugd. Bat. Anno 1614. edidit elegantem tractatum *außen Baravia* l. introductionem ad Medicinam indigenam, in qua demonstrat culibet Populo satis apud se esse ad necessitatem, cuique proinde morbo sua ubivis remedia, & cum Natura *mitte melle, want jui tuis melle* *Wierowen* *Wierowen* nec frustra quicquam faciat, nec deficiat in necessariis cui Orientis illa solum sit mater facunda in superfluis largiendis; reliquum verò terrarum Injusta noverca, quæ cogit ex alieno orbe advehere remedia. Indigena remedia sane quoad certitudinem, vigorem, puritatem, impensas, convenientiam cum natura incolarum (Beverovic. l. 1. cap. 2. pag. 65.) majorem habent, quamvis longe petita perarum æstimentur. Eandem simplicium defensionem suscepit Primotof. de Enor. in Medic. lib. 4. cap. 7. jam suo tempore Pilo. (quamquam fere nimis acerbe) l. 24. cap. 1. exoticis indigena prætulit, quando loquit. Ex terra nascentibus Medicinis: hæc sola Naturæ plauerit esse remedia, patata vulgo, inventu facilis, & sine impendio, ex quibus virum: postea grandes hominum & ingeniorum captæ Officinas invenire, in quibus sua cuique homini venalis proponitur vira. Statim compositiones & misturæ inapplicabiles decantantur. Arabia atque India in medio æstimentur, ulcerique parvo Medicina à mure m. n. imponitur, cum remedia veta pauperitum quicquæ cener. Id l. 22. cap. 24. non placent remedia tam longè oascentia, non oobis gignuntur, imò ne illis

illis quidem, aliis non vendebant. Hæc Plinius. Eundem in finem Excell. Thom. Stanhulin. conscripserat libellum, cui titulus: *Medicina Danica iniquillius remediis proptius morbos sanans, sed in miserando illo elapsi anni incendio cum reliquorum librorum incomparabili iactura perit*. De eodem hæc ipsemet scribit in de Incend. Biblioth. pag. 69. vulgo inservire placui, non doctis, quamquam malam gratiam inire videat à Pharmacopœia: Dedit Deus iniquilla remedia pro curatione morborum domesticorum, quibus nci potest quisquis ab officinis Pharmaceuticis remodior, nec Medicos habet, quos consulat, nec masipium, quod peregrinis remediis impendat. Sic Parallin lateris finistri curavi Spelitu frumenti cui herba paralytis incocta, Pleuritides populariter grassantes solo decocto hordei sanavi; Scurbuticos folio aquarico in Cerevisia veteri decocto: hydropicos purgavi foliis teneriocibus Sambuci. Hæc Bartholinus.

De male Gangranoso totius corporis.

Describit tale ferè malum à scorbuto Eugalenus de Scorbuto pag. 191. quale non ita pridem in Xenodochio S. Crucis Goslarienti observavimus, in quodam cœlibe XL. annorum. Hic ab aliquot mensibus rigidior incessit, & quasi immobilis, ut pedes & cœta, immo ipsum dosum uno facis ex animi sententia flectere valuerit. Ante aliquot hebdomadas vi clinicus, & in lambis oritur primo intus quasi excoctus, quæ à diuturno decubitu aliis otri consuevit. Hæc primis diebus ab ipso zero negligitur, post paucos tamen dies advocatur, qui manum Chirurgicam admovent. Ille pro viribus eam tentat; sed perperam, quippe malum ipsos lumbos & dorsum adeo infecerat, ut ad interiora suspendo ipsas vettedas lumborum & os sacrum denudasset, cum insigni & intolerabili putredine: & ipsa caro lumborum plane indolens apparebat, & quasi carnes dilacerasset, ipsam hanc musculosam carnem. Accedebat *invidia* inferiorum partium & abdominis, quippe infusa & excrementa & urinæ, modò corpus moveretur, effluant. In pedibus & brachiis utcumque appareret macula nigricans, aleta die tumor, tertio die subsidebat tumor, & apparebat ulcus gangrenosum foetidum, ubi & sterque calcaneus brevi spatio sensum & vitam exiit. Tunc, rogatus, miserumque die ante finem obitum desperato morbo, videbar, ubi vix intolerabilem fortitatem cum aliis perfere poteram. D. Joh. Georg. Traupn.

Sphacelus fracti cruris.

Ratisbonæ observari in Viro quodam, ac juvene alio, quod, cùm in cura & deligatura fracti cruris calcaneus non ita & subus concave ponebatur, hunc brevi sphacelo infectum. D. C. B. Winsler.

Scholion Schroekii.

Calcaneus cùm in parte posteriori magis præ cruce exister ac promineat, adeoque in supino decubitu concavaretur aliquam efficit, si illa suppositis pulvillis non explicatur, cruris ossa, ob fracturam tono suo & robore urbara, pondere quasi concidunt, adeoque partes circumjacentes molliores comprimendo, vel etiam distendendo, inflammationem faciliè atque sphacelum inducere va-

Bibl. Chirur. Tom. II.

lent. Siquidem ut Hippocrates in lib. de Orthocina Medic. scribit, iacere eu habitus convenit, qui secundum naturam sit; & dolorem minime faciat; quod paulo post calcaneo in specie adplicans, in prominentibus, inquit, corporis potius molliis, æquabilis esse debet, & qui sursum tendat, velut in calcaneo & curandico, ita ut neque reflectantur, neque evertantur. Et lib. de fract. hæc habet: Ubi devineris, supra molle aliquod & æquabile deponere, ut ne in hanc vel in illam partem pervertatur, aut in anteriorem aut posteriorem partem inflectatur. Ad id verò plurimum confert pulvium lineum, mollem non durum, medium in longitudinem, aut aliud quid tale cruri supponeat.

Gangrena sanata.

Nobilis à *Grußkreiter* laborabat Gangrenâ, Chirurgus impoluit jus sive mortium de Brassica acidâ feliciter.

Brassicam acidam egregiam vim refrigerandi habere, nemo est qui negat. Memini Dominum Capitanum à Weitzl mihi enarrasse, quod aliquando pulvere pyrio adustus felicissime seipsum sanaverit, imponendo Brassicam acidam. Sic D. D. Sim. Pauli 4. part. Bot. p. 16. refert: Gangrenam in femore sola applicatione pomorum putridorum confutorum, sine assusione ullius liquoris codiorum sanavit. De Brastica Gal. 1. 2. simpl. med. dicit; Brastica esculenta desiccandi vim habet, tam eâ quàm foris impoita. Quantum Brastice acidæ ad alium usque tribuat Hippel. *Gangrenas in Grauel der Berynkung. Menschlichen Gefäßes*. p. 370. videri potest. D. C. Winsler.

De Ratibus sphacelatis.

Glugos sphacelatos videte frequentissimum mihi fuit in febribus malignis & chronicis multis à diuturniori decubitu supino. Licet autem ex illis amplè habere atque lamellæ defectæ sint, atque optima quæque anaphagedenica ram intus, quam extra fuerint adhibita, mortis tamen præda fuerant, uno duatax excepto, vegetiore viro, belli duce, purpurata febre correpto, de quo mihi toties à Chirurgis inclinatam, *tuere videri præsidia, nos externis prospicere sumus*. Et tætera quisque nostrum suas partes feliciter peregit, insistentem salutem Numisio afflata. E. Clar. viri Carol. Drelicewski Collegii, communicante Excell. D. Geyer Med. D.

Gangrena ex Elleboro leibalis.

Rustica mulier juvenis, doloribus ventriculi molestata, infulum, è coriæ radicum ellebori albæ cum vino paratarum assumpsit. Hausto pharmino incidit in Dyspœam cum strangulationis sensu, cardialgiâ, pulsû debili & frequente, sudatione, extremorum frigore, tussi, spurque cruentato. Tæc aut quærat alvum deposuit, postmodum cum tribus aut quatuor scibus, lumbricos deiecit, cum immenso frigore univerfum corpus obdiente, dolor in dextro crure oboriebatur. Non fomenta ex vino rubro cum herbis nervallibus parata, non spiritus vini applicatio, membri mox emoritur si frigus sustinetur. Sensim evanescere dolore, qui per biduum missam cruciaverat, narius cruris color in purpureum lividumque mutatus fuit, membrumque sensu

senſu & viâ carere comperit eſſe. Nulli ſuere auxilio ſanctificatioes, permultaque alia Medicinæ præſidia. Amputata infra genu tibia, nullus manavit ſanguis. Interim ſerpens & interiora pervadens gangræna ægrotaſcentem à vivis abſtulit. *Ex communicatione Clar. D. Rivalier Medic. Doct. Celeberrimi.*

Gangræna pedum podagram mentiens.

Clariff. Marci Gerbeſi, Myſicell. Curioſ. Decur. vij. Ann. 1.

Egreſſè poſt Galenum de gangrænâ & ſphacelo Hieronymus Fabricius ab Aquapendente Penſat. Chirurgi l. 1. c. 19. dicendo: Gangrænâ eſſe mortificationem panis, quæ inflammatione tentata eſt; Sphacelum verò affectionem, in qua pars omnino emortua eſt. Cauſam verò eorum inter cætera quandoque etiam eſſe influxum pravotum, & quæſi venenatorum humorum, lo corpore à pravis cibariis geſcitonem in partem aliquam. Communiterque incipere ſolere in digito magno pedis, & mox inde progredi ulterius, ita ut brevi tibiam, & totam coxam apprehendant. Omnem etiam gangrænâ quidem eſſe aded curatu diſſicilem, ut niſi quæ præſentiſſimis remediis occurrat, ſatis continuat quoddam motu ſenſim emortuat, ac brevi temporis ſpatio hominem jugulet: eam tamen, quæ ex humorum affluxu contingit, eſſe omnium deterrimam, & planè raro ſelicitè terminari, imò homines ſenes ſubiedo intra diem decere. Curationem verò tentari poſſe, (1.) Sanguinis emiſſione. (2.) Peccantium humorum correptione. (3.) Eorumdem humorum expurgatione. (4.) Doloris lenitione (5.) Caloris ovarivi in parte affecta reſuſcitatione, aut, ſi is jam planè emortuus eſt, quod quidem ſaltem in malo jam ulterius progreſſo, & in ſphacelum commutato ſit, partis affectæ à non affectis omnimoda ſeparatione (6.) Vitium conſervatione. Quemadmodum hæc omnia unâ cum Remediis ad id idoneis, pluribus videre licet loco citato.

Reverendiſſimus & Illuſtriſſimus Comes Octavius Buccellenſis Præpoſitus Labaceniſ, hujuſ inditæ Provincie Camiliolæ Deputatorum Præſes, vir omni virtutum genere ornatiffimus, & patetis olim mens gratiſſimus, ætate ſexageſimo anno propiusque, temperamenti cum prædigniſſimo melancholici, habitûs gracilis, & diæte aliâ obſervantiſſimus, podagricis tamen doloribus, jam à pluribus annis valde obnoxius, citra finem Decembris anni 1691. poſtquam cum familiarioribus ſuis præter ſuam motem in novo vico nobis Preſecther dicto, vino, ſi ejus claritate excipias circa illud tempus guſtuſſimo, nonnihil exceſſiſſet, & ſonè quoque in aliis detrioris ſucci cibariis, in alvi quendam fluxum incidit, aded quidem tolerabilem ut Ordinarius ſuus Medicus Excellentiffimus Dn. D. Andæas de Coppinis, in ſcientiâ Medicâ aliis nulli facile palmam concedens, eum excepit probe diæte obſervantiâ nullo alio remedio indigere judicaverit, quemadmodum malo in dies decreſcente, res tandem etiam eò devoluta eſt, ut diarrhæia in totum cum ægri ſeamine ceſſaverit, ſed cum quæ tamen evento, audiamus.

Dum Illuſtriſſimus Pætiens ſe ita planè in ſalvo eſſe exiſtimat, nulluſque ultioris remedii cogi-

te, in pedis dextri extremis digitis dolorum quemdam adentem percipit; podagricum tamen, cui, oti præius innuſ, valde obnoxius erat, deſtitutionem tatus, nihil minùs, quam inſanſi quid inde ſibi meruit. Aſt invadit idem ardor & alterum pedem oon minori cum furore & pauli poſt utriuſque pedis digitor, immobilitati quendam in aliis podagricis paroxyſmus inſeſta, unde ad ſcrupulum ſibi hæc in parte admeodum, mox ordinarium ſuum Medicum advocari curat, qui, re & ſibi ſuſpectâ viâ, author fuit, ut pro re exactiſſa dignoſcenda, adhuc alii in arte verſari viri advocarentur. Et advenimus noſtrum tres, qui viſo in pedum digitis livore quodam iſtero, & immobilitate, mox de gangrænâ præſente & à materia quodam atrabili, valde calida, acri, & quaſi malignâ, ex alvi fluxu fortè reſeſta, illoc tanquam ad partes ob toties perſeſſos podagricos doctiores debiliores à naturâ præcipitate progenitâ, ſuſpicari coepimus, & proinde, quod allegatis ſuperiùs ex Hieron. Fabricio ab Aquapendente in ſimili caſu indicacionibus cum apertis remediis tempeſtively ſatiſfaciendo, ulteriorem mali progreſſum ſatis maturè præcaverimus, omnem quidem lapidem movimus; ſed priuſquam ſerè aliquid, excepto acri clyſtere, qui mox ab habito conſilio injicitur, in uſum tractum erat, jam actualis ſphacelus aduſt: Dolor ſcilicet ceſſavit, pedum digit aded arefacti, quod quidem ſidem ſuperare videret, conſpicebantur, ut in ſumo magis exſecari nequiverit, reliqui verò pedes pallore quodam inſeſto, frigidiſſime, flaccidiſſime molliſſime ita affecti ſunt, ut contracta caro ædematis ad inſtat facilè ad ſurro cederet, & cuius, quaſi à ſubſtratis catenibus avuſa eſſet, digitis elevari potuerit, cum ſuccedente pæ interiorum tibiam livore quodam, inſenſibilitate & immobilitate, ut propterea de actuali ſphacelo jam præſente, nemo noſtrum ampliùs dubitare potuerit. Hinc de quinto ſuperiùs memorato ſcopo cum emortuorum partium ab aduſſis ſuis actuali cum ſerè abſciſſione exſequendo mox quidem ſolliciti fuimus, quod vires tamen valde proſtrate, ætas utcumque proſpecta, & ſerè inevitabilis ſub ipſa operatione ingens hæmorrhagia ſimile remedium nobis diſſuadere videretur, evidensque peticulum minati, ne ægri ſub ipſa operatione ſuccumberet, judicatum eſt, conſultiuſ eſſe minoribus, & quaſi proponit citato loco ruſus Aquapendens emortuorum partium iſtam à ſanis ſeparationem tentare. Uode mox applicata fore re ſanis adhuc partibus deſenſiva, emortuiſ verò præmiſſâ profundiffimâ ſanctificatione, potredinem corrigentia & carnem emortuam à ſana ſeparantia, aſt quibuſcumque non obſtantibus, malum inſenſibilitèr catenas proſequebat ſolâ partium immobilitate, & cuius aliqui valitudine paulò poſt verò etiam inſenſibilitate ſe prodens, æt illuſt. Dn. Patientem planè interfecerit. Sed quàm inſueto mortis genere! quaſi mors meruiſſet tantum ſubjectum palam, & modo aliis mortalibus uſitato aggredi, ſed potiùs coactu fuiſſet ſimile ſtratagemâ ſtudio excogitare, & mutuat à podagra larvâ, ab extremis pedibus quaſi clam ſuſum ſerpendo nobiliſſimo illam lætiſſimique virtutibus ornata animæ ſedem, eot invadere. Uſque aded moriendum eſſe cunctis certum eſt, mortis verò genus & tempus incertum.

Gangraena in pede curata.

Clariff. Christiani Heibichii, Miscell. Curios. Decur. III. Ann. 4. p. 92.

Cum animi relaxandi gratiâ brumali tempore iter in pagum suscepissem, Rusticola quidam me accessit, retetens in filix 10. cichet aenis nare pede alterutro primò quidem vitam esse inflammationem cum rubore, tensione, deinde verò eam de dolore jam pulsatorio, jam scindente, æstu quoque & siti graviter conquestam esse, mox vitas aliquas yesh.ulas cum maximo sensu doloris, modò pedem esse lividum & in parte quadam nigrum, fortore putridum ac cadaverosum circumstantibus perquam gravem, ac jam stupidum fieri, morumque perire: ego hâc intellexi periculosissimum affectum esse agricolæ significari, me ex ore ejus modo audivisse signa gangraenæ, imò sphacelli sive perfectæ cessionis vitæ, jubeo denud explorare diligenter, an super sit adhuc sensus in organo, si aut pungatur, aut putrescens caro præcindatur, quòd si nihil sentiat, unicum servandæ vitæ modum esse præcisionem scilicet & amputationem, si vitæ adhuc æger consent, ne pars sana trahatur, & quo modo in vicino oppidò Chirurgus sese gerere debebat, scripsit Epist. 14. doceo, quòd si sensus indicium aliquod se se prodatur, jubeo aquâ calidâ partem affectam lavare, & lotæ, Emplastrum Diaphthusa applicare; recordabatur enim Martium Rolandum cum felici successu hâc epositoria triste malum strisise, ipse externam causabatur paupertatem, & cum meo sumptu vel Spiritum salis Atmoniaci aut oleum Terebinthinæ, vel ex acidis ex fide multorum bene se gerentibus, oleum victorali emere vellem, licet etiam desectabar, instaret orans, ut nominatim vegetabilia Germanici nominibus: Laudo Scordium, Card. bened. Centaureum minus, Radicem Galangæ, Rutam & alia aëtica ac balsamica non essent, quia verò Tinct. Bezoardica more Michaeli parata ad manus erat, imò etiam constituenta eam & spiritum vini maneris loco allata amico, offere homini, usumque Tinct. intercum, spectrum verò cum Spiritu vini externum mando, & hac ratione ex loco discedo. Post quinque menses cum redirem, diligenter percontabar, quid post abitum meum contigisset; Rusticus narrabat, sese domum revertebantem pullum planè sensus indicium in pede isto amplius offendisse, nec tamen paupertatis suæ ubi concium advocasse Chirurgum, postea in festo memorie S. Jacobi sacro tibi & fibulâ extra admitticulum quasi ferra, ut loquebatur non procul & genu abscidisse, decidisse pedem, nec servasse malum longius aut genu transcendisse, & cum antea TRam Bezoardicam ad guttas aliquot poterasisset, alteri pedi idem malum minavit Specie Spiritu vini imprægnatos imposuisse, & sic evanuisse periculum & filiam de nullo amplius morbo conqueti, ac amissò altero pede domestica pro villi negotia tractare. Ex his igitur evidenter patet, Gangraenam non tantum arteriorum, venosum ac nervosum genus insectis, sed etiam ossa corrodere. Quantum verò conjicere ex relatione hominis licebat, ex frigore nimio nuda enim pedibus obambulare: lavaret seviens (beatus) in hoc malum incidit, frigus verò circulationem sanguinis sine dubio impedivit, fibre

Bibl. Chirurg. Tom. II.

enim & propagines nervæ in corraçõeses & spiritus adactæ, Spiritibus in fugam conjectis, ausdistractis, vasa sanguifera ab ipsis circumligata strinxere, hinc orta stagnatio & inflammatio; per hanc autem notabili temporis morâ sanguis acredinem Spiritibus & humoribus inimicissimum & corrodentem videtur acquisivisse; unde necesse est prædicta mala consequi. Hæc verò neceps, quâ malum nullo ab arte impedimento factum in altero pede sese non diffuderit latius, an unus Bezoardica T. R.Æ usus fortassis obicem posuit?

Pollex pedis gangranosus feliciter separatus in septuagenario.

Clariff. Joh. Pauli Wurfhaini, Miscell. Curios. Decur. III. Ann. 9. & 10. p. 436.

Hieronymus Schedel, ob formæ pulchritudinem in juventute, Hieronymus forniculus dictus, ex eo Textorum genere qui ex stamine lineo, trama verò vel sericea vel bombycina telam conficiunt & quod circa annum. 1438. & Savia famillias suas transulerint Norimbergam, hodieum Textores S. 14. vi vocantur. Anno 1700. in pedis pollice dextro; insignem percipit dolorem, nullo tamen sive dolore sive robore complesuo, quem Arthritidem credidit, cò facilius, quo frater Podagricus constanter hoc affirmavit, remediâ tamen nihil applicavit, nisi quod propriâ salivâ jejunis adhuc, pollicem non sine levamine, ut prævit, quotidie saunxerit.

Elapso quadriennio rediit dolor, priorem tamen atrociam longè superans, & clavam fortiter adactam; simulana, cum tumore & inflammatione insigni, cui vicinorum fusu linteamina Lacte capillo calido madefacta, non sine tumoris decremento, mox pessimo consilio, Terebinthinam ovi albumine mixtam, applicuit, exsudante dinceps materia purulenta, quæ mox copiosius abbreviata à Balneatore lingue, affluebat, guttula aliquot sanguinea mixta, sequebatur, elapsa aliquot diebus sanguis grumosus, putridus, nec sine foetore, augebatur dolor insidies, ita ut infirmes planè æger consumeret noctes, non sine vitium notabili lætione, & quod maximum, livefcebat pollex, & sphacellum minabatur præcristissimum; contentus hac rerum facie, Balneatoria ad insigne Rois beatè defuncti, Minister Gotofred. Pua Lissa prope Göttingium oriundus, Medici consilium summe necessarium, & absque ulla mora implorandum esse aiebat. Vocatus ab Eggi filio, d. 12. Maij. Anno 1704. accuratè omnia inspicio, & tam ex pollicis nigredine, quam stris rubria à pollice ad suram usque jam ascendentibus, gangraenam cum tumore vitæ periculo adesse, Conjugi & distantibus denuncio; & interin Constantibus sic dictis fructus resuscitate vites, Gangraenæ verò putredini resistentibus, admixta simul antiseptica obvia licet intendò, externè verò Spiritum Vini Cinphoratum myrthatum cum plumacolla alicui imponere, quam linteaminibus totum pedem cum Tibia, quousque nempe se extendebat striz, involvere jubeo, non sine effectu laudabili, brevi enim striz modò dictæ imminens sphacelli prodromi, disparebant; pollex magis quidem nigrescebat & corrumpebatur, gangranosus tamen partibus à sania rubicundo apparente circulo, optimo sane præfugio se separantibus

ranibus ac difcedentibus; crexi ergo ægrum nobilium senem foliato, decurandum tamen esse pollicem si prolongate velit vitam suam, di. I, annuit senex, animo fortissimo, & die 26. Maii Anno 1704. exarati verò fux septuagesimo quiesco (natus est Anno 1630. d. 6. Maij) sustinet interepidus; sed delitebant adhuc bina appendicis Mearædii fragmenta, quæ post aliquot septimanarum effluxum à benignissima Marte natura, non sine admiratione separabantur, & foras protrudebantur (quæ unâ cum pollice inter varia curiosa fetu) lymphâ hædenu emanante, sensim emanante, carne sana cavitate replente, cutemque oculi debito rursus modo investiente, ut ades pro lubitu perambulare, templa frequentare & pro senili facie aliâ vegeti ratione, vivere queat panteatæ.

SCHOLIUM) Naturam in senibus, tantam esse vitium, ut ossium fracturas consolidare, fissuram lamellas & squamulas separare, ulcera mundificare, carnem sanam regenerare, contumacem supetinducere queat, dubitare omnino licet, cum hæc omnia succum requirant nutritio copiosum & gelatinosum, in senibus verò cutis tificat, musculi languescant, membra incurvantur, non alia certe ratione, quam quod plerumque viscera fucij hujus nutritii elaborationi decata languescant, ut sensum deficiat, vel non satis sit glutinosus, unde non potest non fieri, quin fibræ efficeantur, vasa contrahantur, pori ductumque meatus immutentur, corpusque nostrum stipium instar exarcat; Merito hinc vegetum adhuc Textoris hujus senium, succique nutritii & copiam & bonitatem, quem ex effectu hoc satis raro, probamus, miramur, simulque concludimus, Gangrenas affectas à causa externa, extirpatione Membri via curati melius, ab interna verò ortos, nec igne curari, nec ferro, sed morte, ut plurimum, & bile lineam esse rectum ultimum.

GASTRORAPHIA vid. de eâ in *Falsetibus Abdominis*.

GENU immobile quomodo curatur ab Aquapendente. Vid. sub titulo *Artrici*.

GIBBOSITAS.

De Gibbis quædam videri poterunt ex Marco Aureliô Severinô sub titulo *Luxatio, in fine, ubi de Luxationibus internis, seu ab interna causâ. Hic autem primò trademus quod de ejusmodi infirmitate habet in Dissertationibus Medicis Selectis Clariss. Wolfgangus Wedellius. Sic autem ille.*

NE in frontispicio statim propositi nostri mæandris implicemur, sed succincto & solido tramite procedamus, more recepto à vocis significatu initium facturi sumus. Nomina enim sunt *æone* sive imagines rerum, quibus intellectus propositis ipse ter, uti sunt, capiuntur, & concipiuntur prout par est. Hinc eleganter Plaro in Gorgiâ; & a. r. d. *hæpæta* idem, dicitur & r. d. *hæpæta*, nominum gnarot, gnarot rerum. Consistit autem illa nominum cognitio in tribus: *Æymologia, Hæmonymia, & Synonymia*.

Gibbus itaque, & *æymologia* spectamus, nomen græcum est & latinitate donatum, descendit enim à *gibbus* inflectere incurvare, à cuius præterito medio *gibbus*, abjecto augmento *m*, & mutato *a*, in *g*, dicitur *gibbus* incurvus. Alii hoc nomen derivare allaborant ab *gibbus* curvus, inflexus. Hinc *gibbus*, *gibbus*, curvamen, tanquam ab *gibbus* curvo, quod illi, qui hoc affectu afficiuntur, non excedo sed magis depresso & inflexo incedant retro; quæ tamen derivatio cum priori eadem est Videri de hac Philologia suprà meretur Pergamenus l. 6. aphor. comm. 45. Ex quo ipso loco & rei ipsius fundamentis potissimum arguere licet, quidnam sentiendum sit quoad.

Hæmonymia, magni momenti quæ est, ut citate procedamus hinc in dicendis. Notandum enim est, sumi gibbi vocem 2. latissime pro omni convexo & extuberante, etiam naturali, unde notum est, non solam montes ab Helmontio & aliis dici gibbos terre; verum speciatim hepares dividi in partem gibbam & simam, convexam & cavam, Refertur huc meretur, quod ipse Coss spinam scribit à facto osse usque ad magnum verticolum *æone* gibbosam esse, lib. de ossium natura c. 1. r. 6. Quod reperit lib. de artic. c. 41. r. 8.

2. Late & improprie paulo gibbus notat omne vitium ossium circa ipsam cratem sive spinam, à statu recto in curvum abeuntem, & eminentiam inde consequentem, qualis tum in aliis ex consuetudine observatur, tum frequenter in senibus jam decrepitis, potissimum procerum corpus habentibus, quibus corpus præ siccitate aut imbecillitate nimia in anteriora incurvatur ac inflectitur, quæ tamen potius curvitas, quam gibbositas nominanda, ut quæ nullo pectoris aut spinæ vicio accidat.

3. Strictè magis gibbi dicuntur in universum, quibus luxare sive loco dimptæ prominent spinæ vertebrae. Hæc autem luxatio varia est, & deprehendimus illius quatuor vel quinque potissimum annotationes differentias, quas communè & recepto ordine recensébimus. Una sit *cratorum*, quum foras sive in posteriorem spinæ partem, vertebrae convertuntur, Græcis *ἀνίσταται*, sive *ἀνίσταται* Latinis gibber gibbositas dicitur. Altera sit *interiorum*, quum in partem anteriorem vertebrae luxantur, ita ut in dorso sit cavitas, in pectore circa sternum præcipue tumor Græcis *ἀνίσταται*, Latinis repanditas, recutivitas. Tertia ad spinæ latera, quando nempe vertebrae neque ante, neque retro recutuntur, sed in obliquum sive ad latera declinant, Græcis *ἐκκλινόμεναι*. Latinis obliquitas, divaricatio: est autem sic dicta, quod tortuosum vel lumbicum terq. reptantem refectat spiritum similitudine. Refert etiam Hieronymus Cardanus in Comm. de causis, Signis & Locis morborum part. 3. §. 56. id quod etiam obtigit citanti id. M. A. Severino, l. de gibb. c. r. p. 324. & D. D. Prædidi, visum sibi puellam, flexa ita spina, ut litteram S. reficeret. Quarta est, quum vertebrae in loco quidem suo manent, eandem tamen compages laxant, cum equali magis in sedendo incurvatione, quod in teollis infantum corporibus speciatim visitur, non item in senibus, exceptis, quibus id vitium incurvatum remansit, qualem sortem novit D. D. Præses, qui continuò incurvato & prono fere corpore incedit, non aliter ac si aliquid amissum studio curioso semper quæreter. Græcis dicitur *ἐκκλινόμεναι*, Latinis commoio sive concussio, quasi facio vertebrae. De singulis his speciebus videtur potest Galenus l. 4. de loc. aff. c. 7. & comment. 3. de artic. 1. 2. Quinta est, quando tum vertebrae dors,

sed moveri potius eadem per *apophyses*: Sufficit enim, concedendum omnino esse ut motum quemdam & articulationem, ac eundem in finem & vertebrae sibi invicem incumbere, flecti aptas, & articulas sibi eandem apophyses ascendentes & descendentes inter se.

6. Speciem etiam vertebrae dorsi, five thoracicas, costas excipere, firmare, & hinc inde ad vicinas partes nervos emittere, ubi vis annexas inflectentibus musculis.

Qua viscera spectant, vertebrae rotundas esse cum substantia tenera magis & rara, extensorum verò proceribus eminere, per *vincula* connexis, & aequali positi rectitudinem proportionatam servantibus. De quibus evolvi præter alios possunt, *Archangel. Piccolthum. prælect. Anat. l. 8. p. 367. segg. Rulphus. l. 7. & 37.*

Es hinc, ut alias mitemus, clarum esse potest, illi principaliter morbum esse assignandum, ubi læsio contingit, & consequens vidiosa conformatio. Firque id ipsum modò per essentiam, proprio & domestico vitio, quod frequentius est, modò per consensum aliunde morbo indotto, ita tamen, ut successu temporis essentialis labes fiat.

Ut ne verò sint, qui subiectum hoc latius extendere velint, & præter spinam dorsalem gibbum pati etiam alias partes extra hoc clima medium, ut Severinus l. de recond. abscess. nat. manus & pedes quoque huc refert, cum hæc partes æque distorqueant, adducitque exemplum in adolescente, quod videti potest l. c. p. m. 343. Propriè tamen loquendo reliquæ dictæ partes corporis sublinee quidem possunt luxationem perfectam, vel imperfectam, curvitatem, eminentiam, at gibbum non item, illa ergo solum comperit spinæ & præcipue quidem, quoad dorsum frequentissime, cum annis thoraci partibus, hinc & lumbos.

Cum itaque plurimum referat causam nosse, & in morbis his conformationis ad oculum patet, non cognitam eandem nec auferri possi, merito ad hujus investigationem provehimur.

Causa immediata est vertebrae spinæ dorsalis luxatio, laxatio, subluxatio vel *dissepis* distortio, seu contorsio nominata Hippocrati l. de art. c. 45. c. 5. ut *parvitas non emulsa* Galeno l. 4. de loc. aff. c. 3. quibus innuitur articulationem earundem esse laziam, *excessivam, tardam, viciatam* non pristino naturali deprehendi in statu, vel laza vincula, quod in *ævi* potissimum vitium, vel luxatos penitus verticulos. Hinc enim luxatis & non emare repositis, statim aliqua eminentia, aliqua protuberantia conspicitur.

Notari verò meretur, laxationem hic accipi paulo latius non pro dislocatione omnino perfectâ, violenta, & simul ac semel contingente, quæ majorem vim causarum extenuarum sequitur, & si vera sit ob spinæ medullæ compressionem, præviâ communiter paralyti nervos inde accipientium partium, & aliis symptomatibus, ut plurimum lethalis esse consuevit, vel alia facie saltem vitanda; quæ de re videti potest Celsus l. 8. c. 14. p. 580. sed imperfecta, minus respectiva violenta, & successiva, unde à sede sua sensim sensumque dimoni verticulis nutritiva & succris vix à limite suo abstrahit.

Causarum Mediarum Proasimilam vicem sustinet quæcumque *diversa vel rursus eadem* trahere vel distendere nervosa corpora vertebrae possunt, quas commodè in externas & internas dividere licet. Internæ, quoad essentiam, sunt vel vaporosæ, vel humorosæ. Vapores quidem concutunt, quod vi-

deantur debilitates ex ordine suo dimovendis vertebis; si tamen impetum horum respiciamus, etiam suo loco aliquid confecti poterunt, exemplo illorum, qui juxta 6. aphor. 46. ex tussi & asthma gibbi evadunt, quatenus cuicunque expansione thoracis in anxia illa respiratione etiam vertebrae in disposita extorsionem coguntur cedere, successivè impellita debilitatis nota, licet magis videatur loqui apothosimus de asthma & tussi, tubercula latitante consistente.

Hinc si retento anhelitu comprimat abdomen, sepe manifestus hujus rei sensus in dorso se exercit.

Humores verò potissimum absolvunt paginam si peccent, quoad essentiam, ferosi comprimis, luæte & laxate præ reliquis apti nati. Quoad essendi modum verò considerati, si delinquant quantitate, qualitate, & motu.

Quantitate, partim in excessu, tum primario interdum, tum secundario & dispositive, facilitantes dimotionem illam, si male sint dispositi, si humores in articulis & juncturis accerventur, qui articulationis ipsius ligamenta primùm madefaciunt, dein laxiora reddunt & tandem ob copiam os ipsum à sede sua penetrant; partim in defectu, si sufficiens humiditas desit, ipsaque ligamenta velut magis nuda, minusque investita partibus carnosus & adiposus contractioni facilius alevantur.

Qualitate peccant, si vel slementem blandam, rosicidam oleosam deponant naturam, & acida vel alcalinis particulis fœcant, unde aridius corpus confurgit, & tenerius, vel inhectentia, concepta facili labbe ab extravasatione vel *crasi*.

Marime ergo accusandum venit eorundem motus, tum generationis, tum localis. Generantur sepe in parte affecta ipsa per *emaciationem* seu congestiorem paulatim, induram ob debilitatem naturam vel acquisitam, ob intemperiem humiditatem, vel errores æternos, unde non legitime nutriendæ partes tenent, molles, cartilagineæ, nec debicam acquirere possunt consistentiam.

Idque ut paulatim magis sit, ita majori cum *impetu* & impetu, si extra locum affectum generati vitiosi humores, seu latea viciatis ad spinalem medullam ejusque vertebrae per *invasum* appellat, unde considerabimus, partem mandantem, recipientem, vias & modum.

Partis mandantis vicem obtinet totum aliquando corpus, ob cacochymiam ferosam, acetosam, nervisque & ossibus minis benignam, unde ut ex hoc fonte seti vitiosi *exercent*, sepe confurgit, ita speciatim quoque hæc gibbum conjunctum frequenter habet. Plerumque verò minus videt gibbositas, quod in his torosiores musculi minis læsionibus sunt obnoxii. Interdum vicerum *Arqueas* concutunt particulares, ventriculi, hepatis, lienis, cerebri, depuratione & cohabitatione sanguinis minis rite peracta, unde promptus laticis decubitus, & spiritus animales minis vegeti in nervis decurrunt.

Partis recipiens est spina dorsalis, sustinendo corpori dicata. Cum ergo pars hæc sit spectantia, à ferro incrementum sibi capiens, mollis natura sua & si-gidior, adeoque sibi jam cum glutinosis humor exi-ita, si hæc ipsi alius & quidem in excessu peccans superveniat, haud difficultet vitium & tuberculum aliquod calcitrari potest.

Vig sunt arteriæ advehendo, venæ & vasa lymphatica non recipiendo superfluum.

Modus fit *per* *id*. Pellit continuo spiritum sanguinis & succedentium sibi undarum impetus, obice ergo posito, five concepto calore pori magis *areantur*,

rarefione, seu dolore velut spina insignitur & dicitur prompta est; verbo, circulatione sanguinis vel lymphæ impedita hoc vel illi speciali loco, promptus affluxus & sanguinis confluxus, hujusque hinc affectus, tubercula seu abscessus. Sane summi Medicorum Hippocrates & Galenus, bisas has præcipuas & unas fere causas gibberis laudant, quas verba Galeni profertemus ex 6. aph. comm. 46. *ὅτι τὰ γίββη, ἢ ὅτι πρὸς τὴν ἀσπίδα καὶ τὴν στήθεα, ὅτι τὸν στήθεα καὶ τὸν στήθεα καὶ τὸν στήθεα*

Gibbositas spinæ fit aliquando propter ictum aut casum, sit etiam propter quæ in parte anteriore constituitur. Et paulo post asserit, omnes qui sponte seu citra externam aliquam causam, sine ictu vel casu gibbosi fiunt, propius dura & concoqui difficultia tubercula tales fieri, *ὅτι τὰ γίββη καὶ τὰ στήθεα καὶ τὸν στήθεα καὶ τὸν στήθεα*. Quæ ipsa mens quoque est, imo verba eadem, divisi sensu lib. de artic. c. 37. t. 11. ubi quod *ἀσπίδα* loco dicitur meminimus, additque plerique propter tales *εὐσπῆρας*, collectiones, morbum fieri.

Quomodo verò à tuberculis hicce tascio, tescio & consequenter contorsio vertebraum fiat, insequens modò introsum, si una tantum parte reclinatur, modò extrosum, si utrinque, modò laterorum vertebraum exambitio contingat, pluribus h. cit. L. 4. c. 3. de loc. aff. & comm. 3. l. de artic. l. 2. Galenus explanat elegantissimè, ibidem videndus. Suffecerit nobis, exemplo tumorum extrinsecus oculis occurrentium idem concipi & illustrari posse. Constat enim v. g. in colli tumaribus inflammationis, ea, quæ relidet malam partem, tensione fibrarum Inæquali & laterali magis inflecti caput & curvari velut ad laevam, & si in oppositum reclinatur, dolorem mirum quantum augeri, quòd hoc pacto major sit tensio & consequenter dolor; ab æquali verò & majori in oppositum magis verti. Eadem ratio est, si tamot in inguine considerit, alii quoque locis, ubi flexura imprimis opus est. Tacemus exemplum mechanicum corporum flexibilibus, bacillo recentium, & calamarum scriptorium, itidem Galeno & ex eo Severino laudatum. Ut in aliis quoque luxationum generibus, quando tendines & ligamenta extendantur, nimis laxantur, flaccidiora evadunt & hinc dimittunt ex ætæculo suo ossa; ita & in affectu hoc nostro plurimum ipsi ligamentorum & nervorum vitii adhibendum est. Facta horum tensione, necessum est vertebrae etiam una nonæ dextrorsum nunc sinistrorsum, aliis introsum rapi, sique sua sede dimoveri & luxari. Ex hac ratione tubercula quicquid præstant, quod non exiguum sed plurimum est, præstant viriorm affricando illis corporibus, quibus vertebrae alligantur.

Hinc cum molem superpositam ferre non susterant vertebrae, non firmata nec ferruminata, uti prius, sensim fatiscunt, cedunt, & anatomias in figura patiuntur, dimora magisque è loco suo. Pro varietate ergo loci, ex quo dicto modo ligamentis & vertebrae dislocationis intentatur vitium, etiam modò hic, modò illic, idq; iterum variè, conspicuum conlat malum confectum. Constat Mayetov. lib. de rachit. pag. 121.

Præter internas has proximiores, etiam causa externa consideranda venit, cujus vicem obire potest omne illud, quod corpus grave duramque qualitas, assidue, petcutit, qualia sunt ictus, calus violentus in scapulis vel costis, nimis compressiones, inflexio nimis & similes causæ violentæ. *ἢ τὸν στήθεα καὶ τὸν στήθεα καὶ τὸν στήθεα* *ἢ τὸν στήθεα καὶ τὸν στήθεα καὶ τὸν στήθεα*. Gibbositate ex causis contingen-

tes plerique sunt, si aut in costas innitatur, ac impingat, aut in homotes cadat, inquit Coss l. c. 45. t. 1. Quo pertinet etiam nutritum improdenta, quando infantes fasciis nimis arcte aut inæqualiter constringunt, quod Hildanus in malis observavit, ob strictionem icell. involuptionem gibbum infantibus frequentè accidere: siquidem ossa adhuc tenera, mollia, cetera quasi & cartilaginosa facillè retorqueantur, extraque sedem naturalem reprimuntur, quæ dein paulatim exerceantur indureantur aut in brachiis gestant prius, quam ipsa ram firmata est, ut erecti sedere possint; ut si dum infantes è cunis elevant, dorsum manu altera non sustinent. Hoc referenda est & vestimentorum nimia constructio & angustia, dum puellæ stultæ matres junceo corpore esse student, tenella enim ista ætate mollia nimium & mucosa spinæ dorsū ligamenta ita eam recto & constanti casu continere nequeant, sed sequacia nimium ejus vertebrae in interiori, exteriori aut laterali partem protrusæ & projicere se facillè permittunt.

Est & ex causis externis memoranda consuetudo, corpus quoqueverum inflectendi, arque infraum continendi. Quemadmodum enim virgulis & viridibus ligna pondere pressa, assidueque contortis, ita & dorsū nostri corporis curvatur accidit sub officiis diversarum artium & sub insistenti vitiæ dicitur. Ad hanc consuetudinem referendus videtur & indecora juveniliū & mollium adhuc corporum situs & positus in stando, ambulando, saltando, gesticulando, aut simile quid agendo, de quibus omnibus plura legi meretur apud Severin. l. c. c. 3. p. 327.

Prædictis causarum generibus obstruuntur tum *opportunity* seu antecedentes, tum *opportunity* seu occasiones, quas sub naturalium, nonnaturalium & præternaturalium nomine complectemur.

Ex Naturalium causarum causa est dispositio corporum, si non hereditaria, tamen individualis, quæ alii præ aliis procliviores sunt ad hujus mali fomitem recipiendum, nam omne agens requirit patientis dispositum ad agentis energiam recipiendam.

Quoad Dispositionem hereditariam, licet gibbus non sit morbus aque seminalis propriè dictus, nihilominus tamen multum ad illum producendum conferre valet vitiosa in utero conformatio. Hæc autem facillè contingere potest ibidem vel ioterno humorum vitio à matre traductorum, tum quoque, ut colligere non ineptum aliquando est, ex situ fœtus murato, & exanclatis gravioribus in partu angustis, præcipuè in primiparis. Hinc tradit Helmo, libro Rerum inscripto p. 497. Ad continentis morbos; alii, spectant quoque spontaneæ excresecitæ, gibbositates, luxationes & exarthroses, Quæ quia innatam roboris inæqualitatem sequuntur, semini parentum plerumque vel nutritum deficiibus accipiuntur ferunt.

Temperamentum frigidum & humidum, ut & frigidum & sicum maximopere ad hanc proclives reddit ladem. Nec solum totius temperamentum corporis, sed etiam & quidem præcipuè reliquorum corporis nostri viscerum attendendum venit. Venterculus si non rectè dispositus, non rectè concoquit cibum sed corruptit, ex quo haud laudabilis fit sanguis, sed cruditatibus cumulat corpus, quod vitium concoctionis primæ non corrigitur in secunda, molè minus in tertia. Cor si non bene sese habet, non bonus elaboratur sanguis, & mala fit nutritio, cor enim est primatia sanguinis officina.

Ætas unice huc facit & pæc aliis quadrat infanti-
lis & puerilis 3. n. 26. Illa quidem, quando confide-
re incipiunt, etiam frequentius patitur, hinc & *νιωσις*
quale exemplo in xvi. m. mensium infantis recenset Theo-
dof. ep. 42. p. 250. & similia in pæxi sæpe occur-
runt, hæc quando jam ambulare cœperunt, anno cum-
punctis quarto, quinto & sequentibus, donec ex e-
phelis excefferint. Rarior paulo ultra septimum annum
procecti gibbosi, ab interna maxime causa, redditi
observantur, vel saltem quod serius malum hinc im-
petit corpus, eò minus incrementum vitiat.

In primis verò id fit, si accedat habitus corporis
gracilior & tæxura tenerior ac serotior, unde spina
debilior, ex cartilaginibus magis quam ossibus adhuc
constans, pro sustentanda capitis mole fulcrum mi-
nus firmum præbet, prompceque si præsertim idius vel
casus superveniat graviori oneri cedat, & rectitudi-
nem suam non line insigni costarum hæmque con-
torfione amittit. Hinc Hippoc. lib. de articul. c. 6.
carnosis minus contingere luxationes, scilicet, & si
fiant, difficilior restitui, contrarium verò *νιωσις*
& *σπασμους* tenuioribus & magis ex carnibus accide-
re.

Juvenilis verò, cœscendi terminum supergressa, ut
& media consistens ætas libera ab hoc malo setè est,
nec hujus insulsum fatum expectari cogitur, si quidem
de gibbositate proprie dicta sermo sit. Talis enim in-
curvatio aequalis magis etiam in ætate senili & de-
crepita visitur, seu quod vires fine debiliores, unde
imbecillitas corporis in genere multum huc consert,
seu nimis exsiccata vincula & contracta, unde minus
onus corporis sustinere norunt, quin spina nocet &
incurvetur; hæc autem imbecillitas fit parim ex co-
pia pavorum humorum, parim ex penuria sacci
alimentitii. Si illud accidat, id magis extraordinariè
& à causa graviore fieri putandum est, uti exemplum
de coquo recenset lib 5. epidem. c. 22. & 4. Hippocra-
te, de quo infectis agemus mox.

Quoad seum, apprehendit hoc malum frequentius
fœminas, & quidem magis urbanas præ rusticis,
quam viros, fœminæ enim majorem præ viris hæ-
bent mollitiem, tenebiturque & fetosiorum sive fœ-
minæ serosiores sunt viris, unde ipsarum corpora de-
prehenduntur laxiora, & citius adolescunt quam viri.

Nec cause non naturales suis detrahunt viribus
penitus ad gibbositatem juvandam & producenda-
dam.

Atq. qui inevitabile & perpetuum corporis velut
integumentum est, crebris suis mutationibus, cum pati-
um anni, tum ventorum vaporumque putridorum
admixtorum respectu, in alterando ultimæ setæ ma-
ximam est vitium, idque raris magis, quam cor-
pora sunt teneriora. Sic frigidus & humidus huc facit,
quatenus calorem narivum obeandit, humoresque
in corpore auget. Calidior verò æstivus, ob ca-
scationem majorem.

Cibus & potus si peccare substantiâ, quantitate
& qualitate multum ad hujus affectus *νιωσις* consert
queant. Sic commune puerorum vitium *αδυναμία* corpus
viciosus replere succis apta nata est imbecillitas si as-
sumantur, quæ minus laudabile præbent nutrimentum,
sed rariùm generant pravos humores, ut sunt
lacticius, piscium largior elus, fructus quoque ni-
mis frigidi & humiditatis *νιωσις* ut cerusa, pruna, cerea, me-
lones, cucumeres, fungi & similia terrea ulcera alia-
que pœritum cumulantia. Tacemus, aquas crudiore,
nivofas, usu suo continuato multum conferentes. Cer-
visiæ minus defecatae ex aquis palustribus & putridis
coctæ nec lupulo bene condita usus huc facit, vi-
ni item intempestivus usus tenellis corporibus infan-
tum fumane nocet, eferendo humores & exsiccando
nimis.

Motus summa vis est ad distorquenda ossa tenella,
quocunque derum modo excedat, sive tendatur ni-
mis corpus, seu conerahant, seu tenfum & contra-
ctum teneatur, unde ligamenta articulorum facile
faciunt, & ex ordine dimoventur.

Nec quies omnino culpa vacat, cum videamus etiam
adultos sedendo & incurvando dorsum hinc positum
corporis obliquum reportare. Multò magis in infan-
tibus id valet, quando erecto corpore superiori im-
mature desidere coguntur, plinque ipsi, ut solet,
vitiis tribuitur, quam subdigne corpus queat.

Pat ratio est somni & vigiliarum in accumulandis
vel dissipandis humoribus. Excreta & tæxura magni
etiam sunt momenti, non solum quando crassiora ex-
crementa per alvum & urinam reddenda restant, unde
vitioli humores cumulantur, & exinde semina pro
morbo hoc excludendo sparguntur in reliquum cor-
pus; verum etiam & possimum tenia per habitum
corporis exhalati solita. Hinc retentis humoribus &
transpiratione prohibita facillime febres & tubercula
interna enasci solent. Sin nimis sudoribus saeignetur
succosa corpora & depauperetur serum alimentarium
ultra sphaeram ætatis, cum nutrimenti tum augmenti
defectus oboritur necessarius.

Tandem Animi Pathemata ad hunc affectum pro-
ducendum sua etiam non carent virtute, quo loco
saltem memorabimus iram, si, contra Apostoli mo-
nitionem, irritetur ad exandescendum infantes & pue-
ri, atque inde in incoñdites ploratus, cum pœctis
singultuosa quasi concussione, adigantur, faciliè no-
xa ad ossium & ligamentorum stimulum redundant.

Nec cause præter naturales silencio fuit præ-
terendo. Intemperies & humida & sicca hæc occur-
rit accumulanda; illa quatenus ligamenta vertebrarum
laxat, distendit & tandem è suo loco dimovet; hæc
quatenus ariditate vincula vertebrarum spinæ in an-
teriore protrahuntur, sicut in ardeute possimum
febte visitur.

Pertinet hoc exemplum ab Hippocrate visum l. c.
νιωσις, inquit, *το αδυνον το σπιναν* & *σπασμους*
hinc. Coquo in spina gibbositas facta est ex phre-
nitide.

Quòd angina ad gibbum facere possit, legi mei-
retur Cels. l. 2. epid. l. 2. c. 66. lego, quòd dolo-
ret, idem l. de artic. c. 45. t. 1. Gibbositatem ex
longo ventris dolore observavit Epiph. Ferdinand.
hist. 84. p. 279. seu ob conjunctam frequentem,
longam & diurnam ventris compressionem, &
consequentem vertebrarum dimotionem, sive decub-
itum humorum ad spinam, un notum est *νιωσις*
aliàs ex colica non raro oboriri, & tantò quàm-
dem magis, quia tumore hoc apparente dolore eva-
luit.

A palpitatio cordis *νιωσις* è suo loco motas ef-
fecit Ferriellum l. 5. pathol. c. 12. observavit Hostium
l. 3. obs. 17. p. 139.

Ex dysenteria prægressa gibbum factum in puello
quinque annorum novavit D. D. Præter, ubi gravissi-
mo malo succis vitalibus depauperatis curi via obstitit
hæsit, & hinc vertebæ ex sede sua sensim excreverunt.
De aliis externis injuriis jam satis diximus superius,
hæc verò frequentissimæ sunt cause.

Si Res Supernaturales addere lobet, certum est,
per veneficia quoque & incantationes ut contracta-
ras & convulsiones horrendas, ita quoque gibbos-
oboriri posse. Neque opus fuerit immediato dam-
no, satis est per diabolicas artes casus, idcirco in
partes osses hæc & consequenter gibbum concita-
ri posse. Aliàs verò ope Diaboli in *νιωσις* talia
contingere luxationum stupenda exempla notum est,
& tale refert Hildanus Cantu. 5. Observat. 68.
pag. 158.

Cogniti. nunc caulis, differentias ne proportionis, ordo postulat: Præter differentias itaque gibberis essentialis, quas repetere deo non opus est, alias quoque considerate operæ pretium fuit, quandoquidem hæc & diagnosi & prognosi, adeoque ipsam quoque curationem lineant & modificant.

Ratione Generis, alius gibbus est major, alius minor, unde & minor vel major deformitas: alius in acutum magis, alius in orbem magis versus vertebra.

Refertur huc, & nominatim ad *enim*, etiam à Sennetto l. 2. p. 2. præf. c. 21. p. 294. affectus, quem Germani *der Gebuck* appellant, à tensione membrorum & ligamentorum circa vertebrae indeem ortus.

Ratione subiecti, gibbus alius est in cervicæ, alius in thoracis, alius in spina, alius infra septum, alius in lumbis. Quomodo enim vertebrae sunt inter se distinctæ pro vario situ, quem in spina obtinent; ita gibbositas, quæ vertebrae ipsarum vicinæ est, quoque variat, pro eandem inducta lesione, modo & diversitas symptomatum, quæ singulis locis invadunt.

Ratione Causarum tot sunt differentie, quot causas, ex recentiora petenda. Alius fit à causa interna, alius ab externa; alius à repletione, alius ab inanitione; alius ex intemperie frigida & humida, alius ex intemperie calida & siccâ. Alius ab humore infusum chylorum, & inflammatione; alius à congestione, alius cum fractura, cum ulcere, alius sine his.

His omnibus modis, advenimus vertebrae interiori rarissime, exteriori frequentissime, ad latum vero frequentius obliquari.

Si ullus in morbis diagnosi opus est, sane in gibbositate quæ maxime id valet; adeoque & hæc quæ Cui verba sunt, solus is, qui signorum horum cognitionem habuerit, rite curationem aggredietur.

Dupliciter verò signa Diagnostica sunt ratione Gibberis, alia imminenti, alia præsentis. Indicia incipientis gibbositatis, verba sunt Rollini, epit. affect. pætr. l. 4. c. 2. p. 350. adeo interdum latente musculosis in spaciis occultata, ut etiam peritos fugiant. Angustia omolus exposita est oculis. Illa verò manere oportet, quando ea jam dicendis minoribus gradu se præcipue exhibebunt.

Speculabimur ergo ordine fontes consuetos, ut demonstrative hinc concludere liceat, gibbum adesse, vel non.

Ex Essentialiter inhaerentibus, quæ quidem hoc in casu ipsos in sensus incurruunt, vitium adest in situ, in figura, & rectitudine, cum magnitudine aucta, quoad locum affectum, ita ut non instat carinæ in navi decurrit *exterioris* ac *internæ* præbeat spina dorsalis, sed modo extuberet ante & retro vertebrae, ut in gibbere proprie dicto, modo vel excavato dorso intro spectent, ut in *kyphosis*, modo sumentur in latum, modo viximus in modum incurventur univertæ, ut in reliquis speciebus. Junctim verò reliquæ quoque partes figurat vitiatas exhibent, sternum magis acuminatur, scapulae, costae magis prouertuntur, prout varia præcessit læsio, caput thoracis ætibus infidet, brevior collo.

Ex Essentialiter consequentibus symptomata gibbum præficient variis generis, in actionibus læsis animalibus sumptis motus imminutio evidens fit. Neque enim *kyphosis* strictu sensu possunt stare diu nequeunt, neque sedere, nisi corpus vel mentum

fulciant manu, donec confirmato vitio aliud confortato & adalior ætas induerint. Insecti dorsum tenuit versus inferiora, ut si terram contingere manu velint demissis poplilibus id facere cogantur. In strepitando molitiam sentiunt, magis ob angustiam concussis partibus. In vitalibus pulvis celerior, respiratio difficilis, deflationes frequentes, asthma & tussis succedunt, idque tamò magis angustatur spatium thoracis, & vice versa. Cum enim in thorace eor & pulmo resident, horum actiones positionum lædi necesse est. Variæ ergo hæc ratione loci, seu partis affectus specialis, si enim infra septum transversum malum contingat, minus hæc obtrahantur. In naturalibus actionibus nutritio & actio mirum quantum faciunt corporis succedit macies & incrementi penuria, ut ad solium proceritatem non extendatur corpus aequaliter, neque incrementum sumant, nisi carnes. Haurit hæc ex fontibus Hippocratica operæ pretium est, ex quibus quippe alii tunc hæc sua fecere. Quibus inquit divitiæ lineæ, gibba fit spina, dum pueri sunt, prius, quàm corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus juxta spinam *kyphosis* coarctari non amat, sed crura quidem ac manus perficiuntur, illæ verò partes defectuosiores sunt. Et quibus supra septum transversum gibbositas est, his & collæ in amplitudine augeri non solent, sed in angustiam patitur, & pectus acutum fit, sed non latum ipsi pæ & difficultat spirant & thoracem sapient affertatem habent l. de artic. cap. 37. t. 4. seq. Cautæ maciei potissimum debentur cum trahuntur vitiatæ, unde in latum magis quam in longum fit extensio, tum sero non bili magis ratelatio. Aliæ videri possunt apud Helmont. l. vna lervit p. 328. *kyphosis*, de lail. thorac. c. 14. p. 107.

Notari dignum verò est & hoc phenomenon peculiariter in gibbositate, quoad thoracem occurrent, quod nempe abdomen supertiori parte circa epigastrium contrahatur, & eluctatur quæ panitur, durancie expirationis actus, quod sine dubio conciliat ubi diaphragmatis vitium, autem situm & tractionem. Consilium enim per Anatomem, testante Galeno l. 4. de loc. aff. c. 3, septi transversum nervos sub quatuor vertebra eme græ. His igitur patientibus necessariò motus hujus, uti decet, expediti non potest, sed magis versus supertiora trahitur, unde non sola angustationis culpa libera spiratio impeditur, verum etiam plurimum, ut ad inspirationem alias, consensu diaphragmatis & mensuris hic, ut & musculorum pectoralium & intercostalium iptomum.

Quandoque & paralyticus succedit, sed rariò, quale exemplum notavit. D. D. Præf. Ann. 2. Epimer, Germ. observ. 20. p. 333. & Hildan. cent. 5. obs. 7. cā tamen differentia, quod posteriori casu, potest & assensus præcesserint, à cupo decubuit & *kyphosis* succedit curam resolutio, in priori non item. Licet enim non febriatæ quæ vertebraeum dislocatio in gibbere fiat, ipsa tamen paulum hæc & pedetentim facta nonnunquam obstructions potiorum nervorum causari potest.

In excelsis sæpe tentantur hæmorrhagia nasim; quod & angustiori spatio decurrere cogatur sanguis, & ubi respiratio difficilliorum moveantur velucius, unde quocunque errore externo, vel alio modo ratiōne majori indulta, promptè stillant nares, illis exitum æstuant sanguine.

Causæ Præteritæ quoque præficient affectum, sive externæ, præcesserit ictus, lapsus, contusio violenta, vel alia injuria evidens; sive internæ, quando nil tale deprehendi potest, dolores, pectoris angustia, febris & similia.

Hæc ipsa etiam ad signa causarum iustanda faciunt. Si læta fuerint æqualiter magis vertebrae, quoad æquidistant, per quam sibi connectuntur secundum corpora, mediante cartilagine non plaça, sit *curva*, seu incurvatio æqualis; si versus interiora fiat extensio sit *aliqua*: si versus exteriora, quæ processus, ubi per *apophyses* sic connectio, sit gibbus, et *depressio* sit *exterior* dicta. Par ratio est costarum, scapularum, versus exteriora protensa; sin ad alterutrum latera *curvatur*.

Nec Similitudo abluat, sed hæc omnia confirmat magis, sive eggi ipsa cum alterius tani hominis comparatur, sive ad priorem sanum statum ipsiusmet cogitatione reaturatur.

Signa subiecti specialia, ex visu & sensu patente. Si superiori parte malum hæreat, caput humeris contiguum, cervix & collum brevius deprehenduntur, humeri non depecti, sed velut alati; in inferiori non item.

In morbis etiam externis hæc multum interest, ut munimentum famæ Medici prognostis observetur, ne vel temerario promisso desperato malo promittatur salus, vel prognostico relinquitur, cui adhuc medici licuerit.

Eventus prædictionem quod concernit, illa in salutis & mortis, curationis item possibilis vel impossibilis signa concinne dividi possent. Quoad priorem quidem distinguendum merito & hoc loco est inter luxationem perfectam ac repentinam, quæ à solo caso externo graviore accidere potest; & imperfectam, successivam, propulsoriam. Illa ut vel lethalis est, vel satis gravis; quando scilicet angulosa sit spinalis medullæ luxatio, cum non paulatim sed affatim, perinde ac si frangeretur, pars aliqua curvatur, subiectas partes omnes lædi necesse est, paulatim verò facta luxatione atque in orbem magis, nihil notari dignum patiuntur partes teste Galeno l. 4. de loc. affect. c. 3, ita secundario magis hæc spectat. In gibbere verò videnda in se lethalis minus est, licet satis molesta, nam juxta Hippocratem l. c. de artic. c. 45. t. 5. spinalis medullæ ejusmodi distorsiones facili fieri, eo quod circularis ipsi distortio condirgit, non angularis, si ve in acutum.

Id ipsum tamen quoque intelligendum est de violenta magis in angularem seu acutum figuram propulsione. Dasi enim casus possint, ubi, circa illam prægressam, id minus periculum inferri, ita seculis resistentibus, lignetis, cavis istud spinam lumborum in acutum gibbum una aut altera veteribus prominentem in infantibus quinque, sex, septem mensium, quod sepe contingit, aliquoties contexit B. Ruffinus l. 4. epist. affect. part. c. 2. p. 381.

Quoad posteriorem, ratione Essentialiter intentionem *propulsionis* omnium difficillime curatur, si non fere intractabilis est, ob inaccessam operi medicam, ut evadendi possint & exportari vertebrae. Post hanc *expulsi* à casu non facili etiam cedere consuevit, nisi læsio fuerit levior & recens. *curatio* verò & *curæ* compendialis facilis fere auscultant medicæ arti. Omnibus verò commune est, quod non nisi recenti malo & imminente nondum facto & confirmato, eoque minori & in corpore adhuc molliori, cetero & succulento, ubi flexilis adhuc spina commodius tractari & pro lubitu decedenti flecti potest, atque curabile sit malum; sed satis grave, tantoque gravius, quo magis à statu naturali, & *dispositio* naturæ facta est mutatio.

Quo magis itaque æqualis fuerit & pluribus vertebra communis distensio, eo levius & facilis curatur est malum iudicandum, & contra. In lumbis si essentient prominentia, facilius curari est, imo quo magis versus inferiora declinat, eo etiam promptius cedit; quo magis versus superiora pectoris, eo diffi-

cilius, tum ob alias causas, tum quod ibidem commodior & constantior fieri potest deligatio & compellus, hic verò minus.

In essentialiter consequentibus, quo facilis feratur malum in respiracione, motu, incremento aliiisque; eo etiam minus est, & contra. Incurta caularum, si malum fuerit hæreticum, diu duraverit, & collum jam contraxerit, desperatum est. Ab exteriora eorum gibbus curaginem magis admittit, tanquam magis evidenter & obvia; non item ab internis, nisi manite obviam eatur per diligentia & roborantia.

Quoad tempus eventus, seu longitudinem & brevitatem, variat id ipsum pro lætione, pectoris angustia majori vel minori, adeoque tolerantia & respiracione facili vel difficili. Hinc assertum Hippocraticum 6. aphorism. 46: Qui gibbi æt æstimate aut rulli ante pubertatem sunt, moriuntur; non alio quam hoc incurta videtur intelligendum, quatenus producta sunt hæc duo à tuberculis latrantibus, ut supprentur, & in bronchia pulmonum effundantur, unde vel suffocationem, vel phthisin post se trahunt, utramvis vitæ infidiamt mature, idque ut plurimum. Confer Galenum in comment. Neque opus est, quod Severinus contendit, ut in græco textu loco hæ legatur *ita*, cum, quid sciamus, unanimis sit illa lectio.

Ex sane anni pubertatis de salute & morte in possumus definitum fere prognostis in gibbosis quandoquidem vel incrementum tunc aliquod capite mutatione illa solemus ætatis, quod eo usque dilatum fuerat, ut hinc ætatem reliquam facilius assequatur; vel sensim ad mortem fit transiens, exacerbata symptomatibus. Hinc diuturnum est malum gibbus, ad plures annos dictus & *curatio* *difficilis*, ita tamen, ut præter dicta, etiam *expulsi* *difficilis* facile ac fixorum more degant maxime illi, quibus ad carnositatem ac pinguedinem promotam fuerit corpus. Præci verò talium sexaginta annos superantem, peruenisse brevioris vitæ, teste Coo l. de artic. cap. 38. t. 5.

Quin & omnis qui sperari potest curatio, si *curatio* exceptis in parvulis, lento & paulatino fere gressu fit, non citi manu.

Modus eventus ad saluam sit repositione vel perfecta, vel quasi tali, ut talem tolerantibus sit malum & ad naturalem modum magis perit g. m. cavendo hoc ipso, ne nimis exacerbat, majore nam deformis tactum acquirit. Inferiorem finitiam in nonnullis dyfmetria & varicosis memorat Hippocrates l. cap. 17. t. 4. Ad mortem suffocatione, asthma, phthisi omnibus fere pulmonum morbis expositis his & egitis, nonnunquam & apoplexia, quod D. D. Præfidi visum est in juvene, terminari consuevit.

Cum Gibbus ex illorum morborum censu sit ubi natura cedit arti, ejusque operi & auxilium manus amice exposcit, ad curationem devolvitur. Absolvitur hæc ipsa, ex Medendi Methodi regulis, indicationibus, morbis gibbi & sitis aliis communibus, & indicatis seu materiis præsidiorum huic fini aptatis.

Curatoria morbum ipsum respicit per repositionem, adæquationem & complanationem partis affectæ emittentis, ut figura naturalis conformis, quantum omnino possibile est, consurgat, quotum solite illæ luxatorum indicationes subordinatæ, extensio, repositio, deligatio & collocatio spectatur. Ut enim videmus in vegetabilium genere, quæ curvatae crescendo adestant, facta ad rectos comites deligatione, inflectione blanda vitium corrigi, ita etiam in corpore le tes habet. Torum enim & præcipuum artificium curandi gibbi in hoc consistit, ut exarbutantia vertebrae reprimatur retrorsum, seu in locum præbentem, alioquin omnia frustra tentantur.

Præservatoria causas vel internas ailluxu suo malum foventes, vel externas, morbum detentorem indies reddentes, removere, & reposita firmare jubet.

Vitalis denique vitibus subvenire, & symptomatibus urgensibus, atrophis, respirationi difficili & aliis occurrere.

Materiæ Præsidiorum ex Chirurgico, Pharmacutico, & Dietetico fontibus desumuntur.

Maxima spes in Chirurgia sita est, quæ sola suppetias & genuinum juvenem fectæ apta est, vel primario saltem, reliquis ministrantibus, tum severa, tum palliative, prout conditio obvenientis mali variat. Cum ergo *apophyseos*, seu reductione vertebrarum lictam & contentam in suum locum, opus sit, triplex etiam hic modus utilitatis locum obtinet: palæstricus, methodicus, & organicus, pro apparatu scilicet minori vel majori ita dictus, pro ratione subjectionum, malique majoris vel minoris accommodando.

Primus Palæstricus dictus, præ aliis est *simplicissimus*, sola manus Compressio, vel Extensio proprie dicta instituendus. Illa in rubere ipso & in plerisque gibbi speciebus, hæc in vicinis quoque locum habet, ut *apophyseos*, item & luxatione recenti levior & graviori. Extensio hæc, quorundam & consuetudine consensu pertinet, mature facienda, quod viuce prolat, in locum reducendis quoque modo vertebra. Solent id & vulgo frequenter cum successu instituere in quassatione aliqui veteratarii, de quo consili potest Scatteredus l. c. qui modum vulgi describit, licet ad suspensionem sepe & aculeis illa & ceteris, præsertim in infantibus. Cum vero tardè statim in ipso principio factæ lationis extirpescere advocat Medicus ubi extensio primario instituenda fuerit, facta jam extuberantia, compressio in ejus locum cedit. Talis *pro* *apophyseos*, *veritas* *pro* *apophyseos* & *in* *apophyseos*, nam est, quæ extant, ad locum suum recte cogit depreffio.

Modus nempe hic est: fota prius parte affecta vel solo vino calefacto, vel cum nervinis mixto, ut cedere facilius & emolliat partes ligamentose queant, sinistra manu firmo apponia dextra, intersecto interamine, vel in pugnum conformata sit introitus, consensu vel femiculo per motum ejus facta, vel, quod Hippocrates l. c. 45. vult, imposita manus vola supra gibbum, & altera manu insuper alteri superimposita deorsum cogitur, habita ratione loci affecti & status p. n. directi.

Et hæc coagulatio maxime innoxia & tuta est, cui altius & altera, cujus memineret etiam laudari medicinarum proceres, quando insidere vel pede innamulare gibbo jubent, quod tamen minus fere usuratum est. Inde vero emplastris, unguentis, fortibus subjunctis, & ex fonte pharmaceutico repetendis, diligatè instituatur, quo magis magisque & intro adgaur. tumor, ut decet, & sumentur repositæ partes. Tali usus est *Epiphanius*. *Ferdinandus*. *hist.* 84. p. 280. *fig.*

Ministrant hinc deligationi fasciæ, splenis & alia, in situ suo detinentia vertebra affectas, adminicula. Et convenit maxime hæc operatio in tenellis & aliis personis, solaque fere sufficit in *riem*, hinc & in reliquis, si cetera consentiant. Præcipue verò in lumbis, ubi fortius comprimere licet. Utiliter adhibetur eadem in *remissionem* scapulæ & aliis lateralibus eminentibus, in sterni acuminazione ipsâ, redigens in ordinem thoracem.

In cervicis verò gibbere & *apophyseos* extensio magis administanda, quæ ipsâ & consuetudine consensu etiam in reliquis in principio statim, recentè adhuc malo, spem restitutionis in integram facit.

Alter Methodicus modus eidem finis dictus, sed mediis diversis, locum habet magis pro successiva impulsionem. Referemus huc primò *Ferulus*, quas tectas, cava seu imbricatas adhibere consuevit, seu ligneas quales l. c. B. *Rollius* quilibet adhibuit, seu zincas, quæ in *remissionem* sub axillis commodè gestantur, erigentes corpus & rectum tenentes. Subiungunt illæ sola cum deligatione in climate lumbari, cui paria faciunt etiam alibi, æque ac ferule pro re nata applicandæ, laminæ fectæ plumbæ eidem imbricaturæ, magnitudinè gibbi conformatur, aliæque spleniorum in modum compressioni velificantiæ. Sic M. Antoninus Imperator, cum esset longus & senex, adeoque exacta ætate nimiam ob proceritatem incurvaretur, tiliacis tabulis infasciatur, ut rectus incederet, quod refert *Julius Capitolinus* in ejus vita. Vid. etiam *Scaliger*. lib. 2. de plantis p. 286. quæ thoracem, aut, tiliacis assultu illum corrigere solemus, potius quàm aliis, propter quod calore suo foverent senem. Ipse tamen non tam ob calorem expetiam ad Imperatoris fomentum tiliam addit, quàm quod medicos est inest rigiditatem ac lentitudinem. Valeat id quoque in *apophyseos* cum primis ipsâ.

Deinde in dorsali & thoracis regione extensio est thorax, seu coriaceus uti ex cute humana, præcipue ejus parte crassissima in dorso gestatur costas à gibbo distinctas intra limites subtilissime coarctate altissime *Rollius*. l. c. p. 38 r. Seu lineæ, firmus tamè & ossibus seu seris balenarum intertinctus, ut firmetur rectitudo & erectum teneatur corpus, seu fectus quoque, sive postica parte firmanda, si antica compressio, magis requiratur, seu antica, si contra. Singuli hi item vel minoris vel majoris sunt apparatus, qui postiores ad tertium magis modum referendi.

Notabile tamen est: 1. thoracem talissimè magis convenire emolliis pectus cartilaginibus & ligamentis.

2. Obducì posse commodè cosio, & leviores cum sint laminæ, per se gestari, vel quoque, quo leviores sunt & respirabiles magis multis & crebris foraminibus perforari, corpori apte.

3. Continuumdum esse usum thoracis hujus per bene multum tempus, donec imbecillitas membrorum & mollieties plenarie cessaverit.

4. Pro corporis intertinctis & mali remittentis modulo novum fabricari & aptari posse, exactis aliquor mensibus.

5. Constrictione interim probe facta, ad *apophyseos* tamen, & junctio, si opus fuerit pro extensione cervicis, in thorace postice firmato, capitis elevatorio, gradibus additis, pro majori vel minori intensione, & remissione variandis.

6. Thoracis hi in iis magis usum habent, qui incrementi adhuc magis sunt compotes, qui enim incrementi sui modum maximam partem acquisiverint, minus ab iis ipsis quoque juvantur, nisi forsitan, ut firmetur magis debilius ossium crates, fuscandis illi & tunc vidantur. Cosset *Hildan*. cens. 5. observ. 63. pag. 458. Parizm l. 22. c. 8. qui thoracem tales depingit, & alios.

Pertinet quoque *apophyseos* Fabricii ab Aquapendente, cujus icon antica & postica parte videntur in operibus ejusdem depicta visum. Consulendus etiam scortum idem pag. 127. operat. Chirurg.

Porro hoc etiam pertinet suspensio artificialis, quando firmatum sub axillis corpus, capite per mento scotum fasciâ excepto, antusque geminis apertis manibus, liberò in aere libatur agnoscatur corpus pendulum una alteraque hora de die, ut hoc pacto pendere suomet extendat & exportetur curvaturam, id quod non minus, ac reliqua plura, comprimitur, nec cessat ex vero quando infectus paulo declinat gibbus, non

non æque quando superiori loco tendit. Memnie hujus etiam Mayovv. l. c. p. 142. Cujus succedaneum est, si capite manibus utrinque prehensio sustollatur corpus per vices.

Tertius denique mechanicus compressionem extensionemque; expectant quodvis incidendi potius, scalatum, scammorum, torcularium compimentum & laqueorum beneficium, de quibus Hippocrates, Galenus, Oribasius alique legi possunt. Memorandum hic quoque est instrumentum mechanicum, quo auge utroque ad attollendas rotas & ponderosiora, cujus mediante impulsu gibbositatem curatam refert River. obs. commun. p. 668.

Genuinum tamen & probe attendendum monumentum est Hippocraticum aureo libro de articulis. c. 39. r. 1. parum sæpe his efficit extensionibus, adde & compressionibus, quin sæpe optimum remedium est, graviore malo & frustra tentatis reliquis, remedium non est, nisi nempe in principio scilicet adhibeatur, prius quam callo obducto, vel ossibus etiam coalitis, malum desperatum sit. Ita luxionem ipsam vertebrae dorsii introsum factam hoc modo curatam legere licet Ann. 4. Ephemer. Germ. obs. 77. p. 64.

Petrinet hac extremam illam spinæ reponendæ, in *apertis* puta, remedium quod prævis incisionibus man in ventrem injecta perficitur, ex interna parte ad externam manu facta retrusione, quod mirum est Hildanum, tam insignem Chirurgum, centur. 5. observ. 69. p. 460 admittere & commendare, imo tenacula manus loco adhibere velle, quod latius ibidem videri potest, cum tamen divinus Senex l. c. c. 43. t. 6. id in motuo quidem fieri posse, in vivo autem non item, expressis verbis edixerit, Quin visus fuit aliquando abscessus in dorso ortus, spontaneo nativæ conatu, citra tamen mali ablationem.

Hæc verò proposita hæcenus ut propria quasi sunt parti hic affectæ; ita communia præsidia chirurgica huc accessi quoque possunt, si eadem indicata ex usu esse videantur, quod tamen rarius paulo fit. Ita narsesio non habet locum, nisi forsan lapu vel icu graviore facto statim in principio ad revulsionem.

Sin affluens feri major & copiosior ad spinam dorsalem fiat, consentientibus reliquis, cautelum potentiale vel fonticulus admovei potest, quale exemplum recenset Poterius cent. observ. c. 38. p. 136.

Cum chirurgia ipsa ex fonte pharmaceutico sibi mutatur remedia, etiam ad gibberis curationem, non ipsa pharmacia non minimam de suo addit momentum, potissimum si ab interna causa ortum suum trahat, si euechymia conjuncta eundem foveat. si laticis vitium sit extraneum, quæ prædicta ordine breviter videbimus.

Ex universalium peno lenientia ferocitatem & latorem habitum corporis, eductis à primis visis quilibet, & omnino respiciunt, ipsaque pro te nata proprie dicta purgantia. Notum quippe est, non solum optime ferre purgantia infantes, contra ac nonnullis visum est, verum etiam non minus ac alias ætates admittere, imo opus habere eisdem, & indicare, siquidem ob *adiposum* facile cumulant recrementa, & corpus infarciendo vicia in nutritione & nutritione accerunt. Tacemus mature sefe exere salum scorbuticorum vel hereditarium habem, unde expurgati postulant corpora nonnongum & ut præserventur à morbis, & ut facilius curentur gibberis fieris vicia.

Notabile quin etiam est, in abscessibus internis lactantibus sæpenuero purgantium insignem fuisse virtutem observatam. Cavendum solum, ne hyper-

catbarin patiantur tenella corpora, & hinc exhausto & depauperato nutritio succo nutare occipiant corporis subintracula, partes ossæ, robur omne finem à spina dorsii veluti basi quadam derivantes.

Hanc in finem dari possunt eligenda & individualia aptanda purgantia ex gualapa, mechoacanna alba, mauna, rhubarbaro. aloë, iena Alex. & exin pæparatis, sit. sol. folat. de cich. c. rhab. elect. ienit. resin. scammon. aliisque abunde notis.

Præter hæc, ut potiora saltem liberos, plurimum opis situm est in usu Diaphoreticorum. Cum enim hæc ipsa omnem *græm* feri & sanguinis, ubi fierent & factam, dissoluant, affluxum arceant, & circulum humorum vitalium in ordinem redigant, merito suo à Serapino l. c. c. 4. p. 35. habentur præcipuum & primum ad morbi hujus causas aut eximendas & minuendas. Laudat hunc in finem metuen animi, diaph. C. C. phil. bez. martiale cachect. ens. venetia Boylei, seu flor. sal. armon. vitrioli, seu ex terra vitrioli dulci sublimati, M. S. sp. tart. tinct. bez. Extremis verò ætatis, balnea laconica, tepidaria, therae, ad tolerantiam habitus corporis, ætatis, naturæ inflicienda.

Par ratio Diureticorum, quæ aperiendi & resolventi virtute seram superfluum partem immittunt, partim in ordinem erigunt, ex succin. alb. ppt. magist. oc. cancelli arcan. duplic. cujus insignis vis in atrophis ab obstructione glandularum metasteticarum, si à martialibus abierimus, accuratioribus prædictis dudum vocata est; arcano tataris & similibus.

Alterantia specifica interna, licet non adeo possint, vel ad gibberis curationem vendantur; summo tamen juve hac referri possunt & pro bis haberi (2.) Resolventia ex lap. caner. animi, diaph. spermat. cet. mat. perlar. ppt. pulv. absorbente Wedel. pulv. contr. casum; cerefolio, scabiola, cinnabari nativa, quod divinam ad omnia feri stagnantis viria remedium laudes omnes superat, & alia. Non sine causa etiam horum censum subeunt laudata jam diaphoretica & anodina ipsa, singula vni eidemque intentioni debita.

(2.) Aperiencia, quorum nomine complexius, quæ glandulas intestinales obstruere reserant, amucam venarum extergunt, humores acetosos saturant, edulcant, absorbent quin & diluendo temperant, scilicet deficit humor debitas. Talia cumprimis martialia esse queunt, quæ iustis omnium sunt, modò humectantia & roborantia in sciciori statu magis eligantur, ut tinct. mart. pomata, tydonata mart. solat. cum arcano tataris tincta, tartari balsamica, Zuvelferi; essentia mart. animi. tartar. anima rhubarbati, elixir antiscorbuticum, ut alia antiscorbutica taceamus.

(3.) Nervina & Cephalica, illa præcipue quæ & vincula roborant balsamica virtute, & feri leborescentiam & fluxilitatem peregrinam salinam corrigunt, ex chamædæ, chamæpic rosmar. salv. major. rhecad. arab. callos. rad. chin. fasteparill. essent. succin. liqor. specif. cephal. cinnabario, pulv. epil. March. & similibus.

(4.) Traumatica, quæ characterem suum alcalinum vel balsamicum linguntur massæ, & latici præcipue impertiunt, ut impedimentis *purpuræ* convenientis ablati, solidescere magis in cartilaginosa & ossæm duritiem possit, ut decocta, aquæ & infusa ex plantis vulnerariis, facillè cum resolventibus & nervinis miscendis, essent. traum. Roif. Wedel. quæ omne absolvit punctum, seu per se, seu cum tinct. bez. elix. pector. effus. succin. anod. prout indicantia variant, miscenda; ne lapides caner. illorumque infusum vel decoctum cum vino non deuo laudemus.

Intra robora hanc (5.) reponi merentur & Pe-
dalis, tussi, respiracioni difficili, phlegm, seu milti-
gandis, seu preservandis, appropriata, non omittis,
que calorem hecticum, si quis obcepat, ardeant.
Hinc polv. pector. D. D. Præf. uterque, elix. pe-
ctor. spec. diamarg. sc. pulv. Haly contra phlegm.
rec. disp. hic nominari merentur. Quin imo ipsa
quoque pinguedo canina recensculis non inu-
lter inferri potest, ad oleosorem reddendum lach-
rim.

Tandem & alterantia externa seu topica recen-
senda veniunt. que vi traumatica, heretica, ana-
leptica, emolliente, vel roborente sunt conspicua.
Sic fieri possunt Foras ex cephalicis & roborantibus
cum vino vel sp. vin. infusus & digestus; ea 29.
anhalina, essent. rosmar. castor. ejusque spiritus
sp. lumbrie. junip. &c. Unguenta ex oleo comord.
lauro, lumbrie. ill. alb. ophiogloss. euphorb. n. m.
petrol. medull. ebur. vitul. fœv. hiteen. pingv. hu-
man. taxi, unguent. dialth. agripp. mariaz. net-
vin. popul. resimpriv. additis quoque oleis desiliari-
tis pro lubitu. Sane qui pinguedinem arteris, mu-
ribus juvenibus pluribus impleri & assari, pro se-
creto remedio habent. Quid tamen præstat, sine
dubio, ascendendum est ab emollienti vitare, cum
illis communi. Compositum tale unguentum ad
gibbositatem Infantum descripte Ströberg. tr. de aff.
puer. p. 61. Emplastr. ex certato cinirino, sandal.
empl. ad fracturas & ruptur. ut oxyroc. emplastr.
ad gibber. Hildan. descripto cent. 5. observat. 67. pag.
458. de rad. alcham. opoteldoch. Rolf. & additis
adtingentibus, roborantibus & discutientibus, pulv.
lumbrie. terr. g. racamah. carana. &c. Tale quo-
que est à Forcello commendatum L. 29. obs. 23. in
schol. p. 824. simplicius quidem ex gummi ammon.
& iadano, pro pueris, & compositum magis si desi-
deretur.

Ex his verò non difficilis fuit medico rationa-
li & experto seligere pro causam & subjectorum
diversitate, quod magis ex usu pater. Alia enim
ratio est sciorum, alia laziorem vinculorum ha-
benda, unde & emollientia ad adtingentia, sed
diverso tempore & respectu profant, ejus rei
exemplum videri potest apud *Amat. Lasi. ebur. 5.*
eur. 47. p. 143.

Fertiliorem tandem cautionem præstat videtur ra-
tio, seu vivendi regimen. Dieta, que in genere ita
comparata esse debet, ut ætatis & corporis temperiei
sit conveniens.

In naturali cibo præbeatur *Lycopodium & Muscipula*.
Imprimis si facies conjuncta sit major & aridura.
Vitatur verò nimis viscosa, salita, infumata, fixa,
aromatizata, obstructionibus generandis vel rarefacien-
do sanguini magis apta.

Potus sit cerevisia defecata; recens & vetusta ni-
mis noxia. Vinum parca præbeatur manu, imprimis
generosum.

In vitali aër eligendus temperatus. Frigidus cum
nervosis partibus inimicus sit, & tussis ac catarrhis ge-
nerandis aptior, à corpore arcetur. Noct. verò & ca-
lidus nimis, sanguinem ad motum magis elens ac su-
dorem.

In animalis quiete cordi habeatur pax motus. In-
firma illa corpora omnia lassantur & laxantur motu,
qui jamdum difficilis succedit, & respiracionem adju-
get magis.

Somnus cum humedet, & humidum, quo mu-
tescit, magis ad lentorem debitum disponat, con-
venit pax Vigiliis. Opus sæpe est & de die & no-
ctis simul gestare thoraces & ligamenta, ut constan-
tibus & tepriantur & respirata firmetur ex ordine

Bibl. Chirurg. Tom. II.

dimota. Supinus decubitus, capite tan-
to paulo inclivi, hic reliquis modis fere præferendus. Vitanda
& in lecto, quas vocant, jectigationes.

Alvus & vesica trementosa, spissa & tenues ali-
mentorum partes justo reddant tempore, ne deficiat
vel exactione nimia indurata scybalis conatum in
egrediendo majorem infertant, unaque offites laborem
facient.

Animi Pathemata ad rationis justæ normam mo-
derari fas est. Gaudium moderatum infantum &
crefcentium ætatum reliquarum temperiei est ap-
sumum. Ita terrores, metus & tristitia, que exerceant ossa
ablinet. Lachrymandi & plorandi occasiones, quantum
licet, vitentur. *Excell. Fridericus Kafsberg, in Disser-
tatione. fœliti. Clar. Wedelii.*

*Gibbositas ab humorum affluxu incipientis cura
propria, quam maximo cum successu sepius adhi-
bimus, hæc est.*

℞ Turbith. gummosi, fol. lenn. mandat. radie.
mechoacan. hermodactyl. cremor. tart. diagrid. cran-
nii hom. caract. liquirit. ana 3℔. M. F. pulvis
dividendus in doses 12. totidem septimanis adhi-
mendas.

℞. Baccar. juniperi 3℔. castor. camphor. ana 3vj.
rad. imperator. 3℔. flor. chamom. lavendul. ana 3℔.
confundantur & conquantur. umida atq; immittantur
lagenæ vitæ, sospetassus sp. vini lb. v. insolentur, ana
igne areæ digerantur per dies 14. post desillentur os-
ganis vitæ.

Spiritu hocce, singulis diebus, bis aut semel gibbus
incipiens prope ignem per horæ quadrantis spatium
perfricetur.

3. ℞. Fol. sal. recent. major. menth. crisp. rotad
lavendul. paralys. hyperic. chamomill. summit. anethi
ana Mj. baccar. lant. & junip. ana 3℔. rad. pyret.
3℔. Confundantur & conquantur. post infund. per
septimanas tres loco calido, in olei lumbrie. hyper.
rotar. æsticis ana 3℔. additis aaugia human. cate-
locum, cari sylvestr. ana 3℔. Infusione, aut infusione
in loco calido peracta, coquantur omnia vase clau-
sio ad humidæ absumptionem; post colatis, & for-
titer expressis, adde olei terebinth. 3℔. mastic. pul-
ver. 3℔. terebinth. Cypr. 3℔. tinctur. benzoini 3℔. ce-
re alba 3℔. Coquantur rursus horæ spacio,
materias continud agitando, ut fiat baltamum, seu
unguentum.

Ex inungatur Gibbus post perfractionem factam
ex spiritu mox descripto.

4. ℞. Emplast. de gratia Dei, de pelle arietis.
& consol. maj. ana 3℔. balsam. sulphur. tantum-
dem, M in emplastrum, quod toti gibbo post inun-
ctionem applicetur. Removendo & reapplacando
bis de die, scilicet, in singulis perfractionibus & inun-
ctionibus.

Potus sit decantum radie, chinæ paned cinnamo-
mò aromatizatum, & saccharo ad gratiam con-
ditum, illudque vel totum, vel paucio vino ad-
mistum.

Consultatio.

Gibbositas cum corpore partium infernarum.

Nob. Adolescens vigesimum primum annum
agens, temperamenti & habitus melancholici, à
nativitate

nativitate capite Morpha in live lactumio affectum habuit, quæ affectio progressu in Tineam migravit, quæ decimo sexto suæ ætatis anno Topicis remediis abique diuient totius expurgatione omnino cessit, sed quinque abhinc annis succellis destillatio quædam à capite per dorsum, quæ circa mediam spinalem medullæ partem firmata dolorem quandam gravatum & obtusum excitabat, ad pectus & costas mendolas sese extendentem, & exiguo temporis spatio curvaturam eidem spinæ induxit, figuram ad infusæ S. representantem, sicque non exiguum gibbositatem; neque ita jam dicto præterito tempore usum internam fuit administratum medicum prædictum. Astate autem proxime præterita semitti cepit in illa spinæ parte atque costis jam dicta molestia, sed supervenit difficultas quædam deambulandi, cum pedum & crurum imbecillitate, & dolor gravativus atque obtusus qui antea mediam spinæ partem occupabat, lumbos molestare cepit cum quadam musculorum atque tendonum sub gelibus contractione. Tunc convocati fuerunt Excellentissimi Viri Urbis primaces, & consultum fuit Nob. Adolescentem generosis remediis fore curandum, cuius curatio mense Septembri proxime præterito incepta fuit, ad reduciendum excrementorum melancholicorum atque pituitosorum deponendum. In quem finem primis viis capiat, educus fuit sanguis, primò ex brachio, deinde ex hæmorrhoidibus; præterea seferatæ fuerunt obstructions quædam in visceribus existentibus, inde totum venosum genus fuit diligenter expurgatum, mox caput ipsam, tandem institutum fuit Decoctum ex China, cassia, visco querc. lanalis, necnon cichoracea & capitulibus herbis paratum, & sudor moderatus in lecto fuit excitatus. Prætereaunctiones panibus lactis administratæ. Conferre capitales cum cratio humano & ungula Aleis atque succino in usum ductæ fuerunt. Progressu jam dicti decocti melius habere videbatur, verum ambienteis invalescente frigore, in detescentem statum quam antea lapsus est; liquidum impotentia ad ambulandum adeo adausa est, ut fere ex toto motus progressivus ablatu sit cum torpore & stupore in eroribus & pedibus ipsis, quinimo quandoque motus aliquis convulsivus qui contrahit crura ipsa, observatur. Interim de capite nulla adeit querela, licet prægressi fuerint timores, animi agitationes ob varia contingencia accidentia. Modo de agendis & quando pro salute consulti.

Mirandum quidem, quod Nob. Viri parentes statum ejusdem morbosum tardius neglexerint, siquidem licet lactum seu Morpha in infantia, progressu in Alopeciam live Tineam conversâ, bona fuerit, ut causa, mala tamen, ut signum, procul dubio semper fuit. Etenim aut totius venosi generis impuritatem, aut capitis insignem intemperiam, aut utrumque nobis significabat, & ideo radicibus extirpanda; quod cum fuerit ommissum, ætatis progressu capitis eute cum membrana carnosa crassiori atque densiori redidit, & ideo extenuationem egredium impediens; factum est ut ipsa Tinea evanuerit, live potius non amplius apparuerit, superflue tamen humore excrementorio, ejusque reproductione vigente, quem à prædominio pituitum fuisse in capite genitum, subdominio vero melancholicum atque seruosum, à toto ad caput transmissum credendum, qui vias ad egressum sibi impediens inveniens, quinque abhinc annis per spinam ad vertebrae dorsales decumbere incipit, & sua acrimonia, seu potius acritate partes nervosas vellicans atque pungens, dolorem quandam excitavit, sicut

mo eo magis vertebatam ligamenta madefaciendo atque laxando, ejusdem spinæ illa parte constrictior, sicque gibbositatem induxit, postremo verò, ut magis compressis nervis ab adausa gibbositate, aut quibus humor redundans inferius ad vertebrae quoque lumbares pervenit, compressione possit, quam obstructione infernatum partium motum dimittit, in eo tandem fere ex toto ademit, præter torporem stuporem etiam inducto, diminuo nimirum etiam sensu cum ipso motu. Nec mirum motum convulsivum etiam quandoque observari, qui tamen vera convulsio non est, quoniam non ex nervosa substantiæ repletione, sed ex irritamento, vel ab acritate melancholicæ humoralis, vel ab aliqua molestia, à vertebra male suo situ disposita, eidem illata provenire speramus, nisi fortan portio aliqua melancholicæ ferofitatis à nervorum principio per medullam quoque spinalem sese inoluerit, ut non femel in præsi à nobis observatum fuit, quod Deus avertat, Deus, inquam, hoc avertat, quoniam non solum infernæ parvis, verum & superne, futuræ Paralysis ratio curabilis pecticulum imminet: sicut si extra nervosam substantiam repetitur jam dictus humor mistus, non adeo difficilis evadet curatio: & si causa moribifica immediata adaugeat, compressio nimirum vel à vertebra ipsa, vel ab humore multiplicato, motum quoque naturalem infernatum partium abolere, & præter naturam, convulsivum scilicet, frequentiosam ac molestiorem reddere val. bit.

Quoniam verò ex adducta relatione comprehensum malum hoc quotidie magis fuerit in detentum, idcirco quamvis anni tempus vetum exigat ipsa causatio, ad eandem tamen festinandum esse credimus: duorum enim mensium spatio raneam possit vim assumere morbus ipse, ut disciunt curationem non sine vitæ discrimine admittet. Quare statim sepe-tenda curatio, primas vias mundando. Secundo totum venosum genus depurando. Tercio caput expurgando. Quarto materiam ad vertebrae jam fixam resolvendo. Quinto intemperies partium manducalium corrigendo. Sexto caput nervosum, genus roborando; & tandem vias totius conservando.

Tribus autem prædictis intentionibus iidem jam administratis remediis erit satisfaciendum, omnia tantum ex hæmorrhoidibus sanguinis educatione. Quæ quoque intentioni adimplenda, decoctum sudorificum erit institutum, præscriptio non dissimile: quod parati poterit in aq. stillar. cich. atque betoni. addendo pulv. vipetini gr. xv. aut xx. Sed quod omnino uectricibus censimus, est sudoris provocatio in hypocausto, ultra horæ dimidium nunquam moritur Nob. Pætiens; & in hoc remedii genere supra trigulum perveniat, ideoque non adeo tenui vitæ utendum, licet à vino eo tempore sit semper abstinendum.

Teminato sudore, in vipetini pulveris usu erit perseverandum, ne diaphoretica adparta ferretur de quo dicebat Gal. quod extenuantis est facultatis, valde enim excitat ac digerit, & ad curam properat, & interim non interpositâ morâ ad Therias sulphureas Aponianæ sese conferre debet, ut lura prius emollientia, si opus fuerit, deinde centis resolutiva spinali medullâ administrari possint: & fortan etiam Balnea sulphurea, ut facilius sulphurea vis emollientis atque resolvens penetrare valeat; quo tempore & capitis scilicet motum non parum profuturum credimus; tuncque & de aliquo ferico instrumento adaptando cogitari poterit, hinc fortan & in præsens: quod excellentiss. præsentibus atque videntibus committere debemus. Interim ut humor magis inactetur

locustator atque exsiccetur, quotidie exteriò sadoxæ tota spina iouenda usque ad os sacrum, inunctione parata ex oleo lil. alb. de lumbicis, vulpino & viperino: non autem crura ubi deficit motus, exemplo Pansanix: sub genibus tantum ratione motus cooivolsivi, oleum lil. alb. cum amygdalino conueniens rit.

Quibus iam dictis omnibus congrua videtur ratio esse addenda; à vaporosis omnibus, tum calidis, tum humidis abstinendo, vinumque medicarum pro mensa parando, ligno totis mar. visco quere. lentisco & fantalis alteratum; cæteraque observando quæ Viri Excellentiss. prescribenda, sicut reliqua omnia disiudicanda atque corrigenda relinquimus. *Raym. Joh. Ferris Caspali. & Respons. Medic. T. 1. Cent. 1.*

Observationes.

Gibboso cuidam Piæto nobili, cui spina dorsæ extorsorum admodum exuberabat, thoracem ferreum qualem armati ferre solent, ex tenuissimis laminis fabricatum, atque intra forisque omni minimis illam premeret, pannis fustulatum, indurum ut gesseret docui, quo facto, cum cum integri anni spatio, dies noct. ij. g. stultis, erig. sic assuevisset ut non magnam inde sentiret mollestiam, sanum pectus illa curvatura, spina rectitudinem iterum suam naturalem esse adpta, postea; semper recto corpore incedens, procerus admodum est factus. Felix Platerus observat. lib. 1. pag. 164.

Puellula quedam octodecim mensium exercebat vertebrae dorsæ laborat caput. Ad eam vocatus, tertiam & quartam vertebrae lumborum exuberantes inveni ad ovi Anatis magnitudinem, quas secunda & quinta nonnihil sequebantur, ita ut in maximam gibbum extremitat spina, præcipue versus finitum latus: quapropter limitum crux dextro longe imbecillius fuit. In curatio sequenti modo procedi.

Primo dorsum totumque; crux sequenti aqua ad nervos corroborandos inunxi.

℞. Aquæ gran. juniperi sine vino destillat. aq. salvia, betonica, lavenderæ, an. ℥ ij. pulveris radicis bistortæ, tormentillæ, rosarum an. ℥ ij. M. fiatq. infusio in ampulla magna per dies octo vel decem. Desin. per inclinationem à pulveribus separata aqua ad usum traheretur. Post inunctionem, sequens Emplastr. quo etiam in fracturis ossium utor, applicul.

℞. Emplastr. Slorani ℥v. cereæ novæ ℥ij. Lapidis ost. ocell. ℥j. pulveris radicis consolida, majoris, teræ sigillatæ an. ℥ij. pulveris balsam. nucis cupressi rosarum odoriferarum an. ℥j. miscantur lentissimo igne, fiatque emplastrum, addendo ol. rosar. aut mastich. quantum satis, totum autem præcipuumque artificium in curatione gibbi, in hoc consistit, ut exuberantia vertebrae reprimatur retrorsum, alioquin omnia frustra reneantur. In hanc itaque finem laminam ferream, aliquantum incurvata, & ejus quidem longitudinis & latitudinis, ut totum gibbum cooperiret, in thoracem ex reductis tela ita adaptavi ut exuberantes vertebrae seprimere posset. Laminam tamen carbalo obtexi, ut pusille minus esset molestia; thorax nudo corpori induatur & ita quidem adaptandus est, ut totum ventrem ad muliebria osque comprehendat: Per medium ventrem ligula oblonga costringatur; circa pectus quidem mediocriter, ne metaphreum & costæ constingantur: post costas verò mepodas usque ad anum ventris arctissime, quo lamina

ferrea exuberantes vertebrae seprimere possit. Ne autem thorax à scapulis sursum trahatur, fasciæ duæ transversum digitum laxæ, in utroque inguine ascendenda erunt thoraci, quæ descendentes subter nates, in utroque latere thoraci ligulis annexenda. Emplastrum autem & inunctiones de quanto in quantum, aut etiam de sexto in sextum diem reovavi, coxam verò totumque cras singulis diebus, prescripta aqua inungere iussi, sic divino favore, intra menses sex, gibbus depectus fuit, thoracem verò, laminamque propter imbecillitatem & molliorem membrorum in secundum nique annum gestavit. Nunc cum annum ætatis tertium attingit, qualem belle se habet. *Guilielmus Fabricius Hild. obs. 67. cent. 5.*

Anatomica Inspektiones.

Gibbositas ob sinistram Pulmonem & Pericardium firma cicatrice costis adnata

Quidam purulenta tussiens, circa diaphragma sinistram veb. mentissimè doluit, tandem acitide obiit. Aperto cadavere, paterothyma sinistri pulmonis fere totum consumptum; Leionchia verò tellecta cum paucis parenchymate, & ipso pericardio firmissima cicatrice, cum callo, costis adnata coalescente, ita ut propter diuturnum dolorem, hoc latere compresso depressoque, gibbosus altero latere factus fuerit milit. *Sal. Resalius in miscell. cur. anni 1673. Observ. 191.*

Gibbositatis causa in capite reperta, ob visiosam ossis Ethmoidis conformationem.

Adolescens à pueritia Gibbo & asthmate vexatus, tandem ex phthisi obiit, circa annum ætatis 16. Hujus cranium aperui, & inveni procerum sive interstitium, aut septum illud quod eminet in medio ossis ethmoidis, seu cribrosi (qui procerius crassitiam papilli excedere viz solet) in latitudinem & altitudinem ita auctam, ut fere totum os cribrosum obtegeret, adeo ut foramina hujus ossis, præ quo pituita ex cerebro ad nates solebat effluere, plane oppleta viderentur, & quamvis percocto cratio, viz eorum alium patret. Denique ossicula superioris maxillæ, quæ in magno oculi cantio conspiciuntur, adeo excreverant, ut septum nasi hinc inde propemodum attingerent: Hanc præcipuam fuisse gibbositatis causam verisimile est: nam cum pituita per nates minime posset expurgari, versus spinalem medullam trudebat, sicque vertebrae, ratumque cartilagines, assidue ittorate pituita viscida & relaxata, tandem excreverunt in gibbum maximum. Nec solum pars illa Dorsæ ex hac deductione & ittoratione pituitæ relaxata fuit, verum etiam omnia ossa à collo usque ad pedes præcipue vertebrae, os sacrum, os pubis, ossa pedis, denique omnes epiphyses sive appendices, præter consuetudinem molles ac tenellæ erant, ita ut fere instat cereæ tractari possent. Illud præterea in hoc cadavere notandum visibatur, quod 6. 7. 8. 9. & 10. vertebrae metaphreni, quæ Gibbum efficiebant, cretæ erant carie, præcipue autem 7. 8. & 9. quorum nihil præter exteriores femicirculos, & eorum procerius conspiciebantur. Interiores autem partes harum vertebrae, in quatuor aut quolove fractas patra, non sine admiratione, in ipsa pulmonis substantia invenimus; Pulmo enim in parte, quæ dorsum respiciebat, ulcere magno & calloso laborabat, per quod ea fragmota, ex continuo pulmonis motu

attracha fuisse, dubium non est: Tanta enim est pulmonis ad se attrahendi facultas, ut nonnunquam runcas et vulneribus pectoris penetrantibus ad se traxerit. Fabricius Hildanus cent. 1. Observ. clv. Diximus in Gibbo illo 7. 8. & 9. vertebrae metapneuri ita excelsas fuisse, ut nihil preter exteriorese semicirculos & eorum processus tepetum sit: ubi admittatione non caret quomodo spinalis medulla conservata fuerit. Erat enim plane denudata, & nonnisi membrana sua cooperta: interim tamen insigni illa putredine ossium cariosorum, & ulceris pulmonis sordidi circumdata, neque tamen sequutum ullum symptoma ex his quae spinali medullae laesae accidunt. Idem cent. 3. Observ. 66.

Gibbositas Pectoris & Dorsi à magnitudine Hepatis extraordinaria, Rachitis Anglis dicta, Tabes Pectoris.

Pectoream Tabem appellamus, non quae intra Pectus sedem habeat, quo facto Phthisis Pulmonia eo nomine comprehenderetur, sed in qua ipsa Pectoris crates vitietur, id quod fit in morbo quem describendum scilicet. Est autem hic Pectus duntaxat sen infantilia, & vulgarissimum in Anglia, uti & in Hibernia ab aliquot annis, ubi antea solebat rarissimum esse ac vix cognitum. Invasit autem non grandisculos tantum infantes, sed & valde tenetos ac recens natos: Sicuti contra rarissime rimis majores adolevit, & ut plurimum intra himatum se continet. Multae corporis partes in hoc morbo afficiuntur, pectus, caput, artus, aliae, sed praeter omnia ac ante omnia pectus, cuius pars anterior, quae lata esse debet ac plana, angustior fit, & utriusque accivis in medio, seu sterni regione, alacis assurgit, eandem partem carinat. Colla inflectitur, ad latum fornice ventriculi, introsum tetrahentur, ac quodam utrinque velut scrobem faciunt, totoque sui ductu, quibusdam velut nodis asperantur ac inaequales sunt: viciat pectoris figura respirationem facit impeditionem ac crebriorem, quam etiam tussicula plerumque sicca, comitatur: Caput grandescit ultra debitum modum, ac inferiores corporis partes, coxae, femora, crura, extenuantur & debilescant, unde infantes incessui inepti redduntur; non modò illi qui nunquam adhuc eo usi fuerant, sed & qui firmiet admodum agilitateque incedere ac discurrere coeperant, diu antequam hoc morbo prehenderentur: Dorsi spina in multis curvatur, acque arcus instat in exteriora flexitur: Ossia articulorum in brachiis & cruribus, non omnium, sed caporum ac talorum augmentur, autaneopere proruberant ac si duplicata esset fere eorum moles; unde etiam *Doubling of the joints*, i. e. juncturarum duplicationem id vitium narrant Angli, qui morbum ipsum, hoc symptoma te stiparum *Tens* indignant: quum aliquot eum generaliori vocabulo, omnemque ejus speciem includente *The Rickets* appellent; Praeter haec omnia dextrum hypochondrium intumescit totum, tumore aequali, magno ac tenente, sic ut digitus sub costas nothas adigete non possit: Et sane omnis mali vel origo vel fomes laet hoc in loco: Tumor iste cum pectoris aliqua angustia, statim initio morbi apparet, sic ut interdum quidem ambo ista simul, eodemque tempore se prodant, alia vero vel hoc vel illud altero nonnihil antecedit: Nodi in costis, ac scrobis istae in imis otis pectoris postea accedunt: quando etiam pectus fit magis magisque angustum: Capitis incre-

mentum illis posterius est, nisi quod pectus toto mochi decursu actius regeditur, donec ad summam angustiam deveniunt sit, sic ne carinae instar acutum fiat, ac prominat, quod fere non fit nisi paucis ante mortem diebus: Est enim lethalis hic morbus, si vel negligant penitus, vel serò aut prave curetur, plurimisque quotidie absumit, neque ullus est annus quo non aliquot millia infantium pereant: Articulorum granditas fere nonnisi ultimo loco supervenit solet: quoniam multi sunt qui eam nunquam patiuntur, ac moriuntur prius quam ad eam devehantur: sicuti rursus ex illis, quibus illa accidit, permulti evadunt, etiam incruentius habentur, quippe haud ita periculosa est illa Tabis Pectoris species quae huc symptoma trahit, quam quae eo caret.

Origo hujus labis à Jecore est, pectate non vitio ullamve noxam passo, sed supra modum aducto, ita ut plerumque duplo, imo fere triplo majus sit quam par erat, totamque anteriorem epigastri partem occupet, & ipsum quoque sinistram hypochondrium attigat, interdum quoque impleat Jecur sic aduatum, cum in ipso ventre non inveniat spatii satis, ubi se commode explicet, à thorace mutatur quod ipsi deest, ac versus superiora assurgit, diaphragma longe impellit, adeo ut interdum pectoris cavo vix dimidium partem spatii ipsi debitis relinquat: Pulmones sic in arctum rediti, contrahunt sese ac in sese colligunt, unde fit ut pectoris quoque crates, ipsorum causi facta, eis se accomodet ac angustior evadat: Quandoque ab ipso pectate & pulmonibus incipit tumor, hedita quidam siccitate, cum nonnullo etiam caloris excessu, obestis, quae sensum marcescentes illarum partes, ac sese contrahentes, quam vix ullum nutrimentum tunc capiant, sanguinem quem in statu naturali valde copiosum ad se trahere ac absumere solent, Jecori refundunt: quod eo circumfluent, plus justo incrementi, atque in omnem partem sese adauget, cujusmodi nimium Jecoris incrementum principalis hujus morbi causa est, ita in hoc quoque non parum ad eundem fovendum confert, atque in progressu eadem omnia mala importat, quae modò memoravimus, atque sic morbum, quoniam non ab ipso caput, fovet tamen & magnopere adauget: Neque in hac Pectore Tabis specie alium magnopere periculum est, donec ista à Jecore noxa superveniat: quae & supervenit semper si diutius trahatur malum, neque statim initio curetur, aut ab alia causa premotum in fons fuerit. Ego sane, quum plurima corpora, utraque hujus morbi specie extincta secuerim; anopsia deprehendi rem ita se habere; neque unquam mihi adhuc infans, isto morbo defuncti, corpus aperite contigit, in quo non praetande ejusmodi Hepar reperitur.

Mali hujus originem infantes saepe in utero matris contrahunt, idque vel mox in ipso conceptu, vel gestationis tempore: Prius evenit soler ubi vel pater, vel uterque parens calida & sicca ortuque visceris, Jecoris & Pulmonum, vel alterutrum intemperie laborat: Alterum à sola matre proficiscitur, quando ea in vitu multum peccat, interea dum uterum gerit, atque vinum, cerevisiam forte, aquam vitae ceterisque ac largius ingurgiat: Eodemque vel matris, vel additae nutriciae, vitio, haec labes accersitur etiam infanti, qui aliquot ei ab ortu obnoxios nequaquam fuerit, si liberalius cujusque Siccitatis potui crebrius ac largius indulgeant, istoque pacto lac suum incitant, ac naturalem ejus bonitatem contumpan: Quandoque coxae huic malo causae subiant, infantesque in

incipia tecum ex matris utero deferunt, vel postmodum id contrahunt, abique eo ut ullus ejusmodi defectus vel in partibus vel nutritio compitatur. Sane ut in aliis personis humani corporis affectibus, ita in hoc quoque alia plurimum possunt, certumque fidetur istius tibi vel procreando vel fovendo magnopere intervenire. Morbus iste agrius tollitur si à jecore capiti, quam si à pectore, magisque etiam si à primo utero infans ei obnoxius fuerit. Quando in pectore ipsi originem habet, curatio ejus satis facilis est; quum scitatis, etiam hæcica, quæ in corporibus adultis fere immutabilia, in corpore infanti cum minori difficultate emolletur: Curatur autem balneis unguentisque emollientibus atque chalcidicis, aliisque ad humectanda pectoris ossa pulmonemque accommodatis: inter quæ pectus ovi aut agni recens detracta, & adhuc valens admodum, atque aliquot horis relicta, misceis multis profuit. Quod si jam in progressu est morbus, atque jecur superaugeri cœpit, aut si ab ipso jecore processit malum, isti quoque medicatio adhibenda est, omnique modis coarctandum ut incrementum ejus obstituat, atque intra naturalem modum coercentur: quum in rem, non linimenta modo & unguenta, aliisque topica, sed interna quoque in usum trahenda: sic tamen ut non salubritatis tantum ratio habetur, sed & teneræ istius ætatis effectus ac sapientia medicamentorum attemperetur: Pari quoque prudentia cavendum ne dum refrigerare ac coarctare fecerit ultimus, obstructions aliæque mala in eo generemus, nimio adstringendum, aut interceptivo emplatricum uls, atque sic geminam pro simplicia labem acceleramus; motuumque p-nitium incurabilem reddimus: Super autem omnia sciendum præ internis & externis medicamentis, ea hic deligenda, quæ & jecori privam amica sint, & præter communes curam aliis multis refrigerandi & adstringendi facultates, peculiarem aptitudinem huic operi necessitatem, sortita sint: Purgantia hic nullum locum habent, nec sanguinis quidem missio, nisi morbo longius progresso, ac capite jam nimium aucto: quando sanguisugæ venis post aures, atque in fronte & temporibus utiliter admoventur, multumque ad universam curationem conducunt; ideoque si res ita secat secundo ac recto usurpandæ sunt: Videtur ratio longe alia in hoc morbo insitenda est quam in prudenioribus, ac naturam ejus non satis perspectam habentibus, videri posset: Non enim Atrophie, qua infantes conebescunt, per se attendendum est, neque coarctandum ei occurrere pleniter cibatu ac validius nutriende, quod esset oleum addere camine, sed contra omnis opera in id adhibenda est, ut exuperans sanguinis copia compescatur, ac nimius ejus fervor, nimiaque tenuitas & acrimonia coerceatur; quod quibus paulatim rebus effici debeat neminem doctum Medicum latere debet: Quod si ita teneri fuerit infans, ut nihil dom præter hoc nutrimentum affumant, matri vel nutrici ea danda sunt quæ prædictis copis valerant; ac hoc eorum debito modo attemperare valeant: In illis vero infantibus qui grandisculi jam, nondum tamen ablati, & ubeta sugunt, & alios præterea cibos ac potus assument, utroque modo agendum est, & etiam ipsorum, cum nutricum videtur ita ut diximus ordinandis. Hæc curationis via sollicite admodum observata, & diu admodum continuata (nihil enim hic parvo temporis spatio effici potest, præsertim ubi altius hæsit malum) feliciter curatur iste morbus.

Morbum istum non in Anglia duntaxat & H. Bist. Chirurg. Tom. II.

bernia, sed & in aliis quoque regionibus graffati verisimile est, & de Gallia quidem mihi certissime constat: diverfus enim Passius infantes vidi eo laborantes. *Arnoldus Boerhaave de affectibus univ. cap. 12.*

GINGIVARVM MORBI

Gingivarum raro spongiosa ac glandulosa pluribus morbidis affectionibus sedem præbet, quarum præcipue sunt earundem eructatio, corrosio, ulceratio, (etiam in fistulam abiens, imo & gangrænam) flacciditas, tumefactio, ac excretescentia, abcessio à dentibus, pruritus, ac parulis. De gingivis eructans, corrosis, ulceratis, flaccidis, tumefactis, vide quæ capite de scorbutico; de fistula & gangræna, vide quæ propriis capitibus de abcessione à dentibus, vide in dentium morbis; de pruritu, vide de morbis infantum; de parulide, vide in epulide. Hic itaque tantum pauca.

Consultatio.

Pro egregio quodam viro scirrho cancroso cum abesse circa gingivam in inferiori mandibula ad dexteram existente detento.

Tametsi præter naturam, qui gingivam in inferiori mandibula ad dexteram occupat, scirrhus existit, nam ibidem cum duritie, atque tenui aucta magnitudine reperitur, & quantum nullus dolor, nullusque scirrus, saltem secundum dextram partem adest, ideo scirrhus secundum hanc legimus esse habendus, verumque scirrhus, ut habetur à Galen. 14. Morb. & 2. ad Glauconem, præterea est immobilis ad Strumam, & glandulæ differentiam, quæ est scirri dicantur, mobiles tamen existunt: Cæterum hunc non esse simplicem scirrhum, sed complicatum cum radimento quodam cancro, ita ut scirrhus cancerosus dici possit, facile est ex integritate, & livore in ore ad partem illam petere offendere, atque adest & ulceras, quia continuo ichor fœtidus graveque odens emanat ab emiculis quibusdam etolis dolentibus ad totum aliquem modum secundum partes internas; rursus quoniam ex Paulo, Cancr. ulceratus vel est furidus, vel purus, hic, de quo agitur, purus profecto est, quoniam cum livore erat quidam, & materia tenuis excremitur.

Causam scirri immediatam, humorum conditio prætoralem crassam, & lentam per congestiorem, non autem per defluxionem à capite (de quo nulla querela à patiente nostro habita fuit) ibidem collectam, item humorem melancholicum naturalem simul mixtum, de humore melancholico fidem faciunt prægressa quartana, nec non subdominium melancholicum in proprio patientis temperamento, Concedo equidem antea tantum à simplici pituita ortum duxisse, nam velut melicæria fuit, uti à suppuratione substantiam similem mellis reddente colligere parum involsquisque; sed nunc ob colorem fuscum partis internæ humorem melancholicum admisceri pro certo habeo, ab his autem duobus humoribus & scirrum diversum, & conjunctum unum scirrhos fieri posse scilicet lib. de Atra bile, & 14. Meth. Cæterum duritiem acquiescentem scirrhos prædictum non à teptatione partis ob copiam humoris, tum à concretione à frigidiore ossis mandibulae facta, imo &

rotundus; durus & hvidus, non adeo tamen magnus apparebat; gingivæ verdè & sinistra pars oris gangrenâ correpta fuit. Multa sed frustra ipsi adhibuimus remedia. Itaque tandem ex his gingivis, labisque ad nasum usque, è vira dissecti.

Genève cum Clai. Jano Altoni, Sarceno M. D. & Joh. Griffonio Chirurgo præstantissimò in duobus pueris similes penè casum observavi. In curatione; nihil quod necessarium videbatur prætermisissim fuit: nihilominus ex laborantes febres, delirij, syncope, vomitus & spirandi difficultate tandem è vira decelerant.

Filius aviculi mei erosionè gingivarum propter febrium vehementer laborabat; tandem in gangrenam degeneravit erosio illi, & ut piores è vira decellit cum doloribus maximis atque pessimis symptomatibus Summa igitur adhibenda est diligentia in hujusmodi morbis oris: præsertim si junioribus qui putredini obnoxij sunt: cum quia pars viti per se calida est & homicida, tum etiam quod constitutio puerorum talis sit. Ideoque prospiciant parentes chiregi ne temerè possintur argis, quæ præstare nequeant: & quæ quantum scilicet præstent. *Gustavus Fabric. Hildanus observat. Chirurgicæ. Cent. 2.*

De Epulide insignis magnitudinis scilicet ablatâ.

Ut molestum, inquit Nobiliss. Tulpus Observ. 29. lib. 2. sic quoque periculosum sanguinem profuerit ex oculis, auribus ac dentibus, sive quoad veras arteriales, ex quibus facile plus effluit, quam partes quibus designantur, sint fetentis, sive quod remedia hujusmodi profluvio necessaria, ægetimè perducantur ad loca diversorum vasorum, sanguinis ex hac illius parte affluxus præternaturali graviter læpius commoveat homines, sic ut deliquit non raro superveniat.

Nectri cuidam, *Emmanie Gerris*, viginti sex annis ætatis, dens extructus maxillaris caninus, sequens maxilla, densisque adnatis carpi gingivalis ex exultatione consumptis, illius in primis, quæ oculari maxillatissimo, primò adhaeret.

Ex loco læso fungosa quedam caro, caqi satis magna, propullulabat, hanc, quod sanguinem copiosè fundere, loquendique difficultatem induceret, præterquam quòd in cancerum commutari posse libi persuaderet ægra, instrumento apio callipati conveniens videbatur.

Primum hoc in casu à nobis usurpam, mediū illud erat, cuius meminit Aeglij scemon. 8. cap. 25. At sine successu adhibuit. Consultum adeoque visum, atrum bilem præparans expurgantique decoquum, per vices assumentum præscribere.

2. Rad. elchor, cum roto m. j. petroselin, aniculi an. ʒj. polypod. quercin. ʒs. berbas. scolopendr. betonice, scabiose an. m. j. becabangæ, buglossæ an. m. ʒ. flor. portagin. bugloss. beton. an. p. ʒj. fol. fenic. el. mund. ʒvj. semin. anil. scapic. an. ʒij. p. sular. corinth. ʒs. decoq. in f. q. aquæ comm. in colae, ʒj. dissolve syrup. scolopendr. sume an. ʒj. diacnicu ʒij. f. apocima.

Pœr quantumdum Apozemate hoc ula fuit, singulisque diebus moderate per alvum direxit. Eo consumpto instituta à nobis Venæ brachij sinistra, hinc etiam pedis sinistra, ad malleolum, scilicet, extraxæ, quæ quavis vice sanguinis uncia octo.

Hicse sic usurpatis, peractisve, quòd sanguinis fluxu ex ore contineretur, molestia valde ægotant, ad operationem Chirurgicam devocire necessarium duximus; quàm ubi aggredi constitutum, Cauteria quorundam, igni impolissima, ne, si fossa vasa quædam abscessu sanguinis nimiam effunderent, pulvereq; nostro styptico usulit adstrictio debita pericel non posset, oculi medio sanguinis fluxum sistere, et disteretentur.

Hoc permisso ægotantem sedili comodo impasitam loci, quo ex debito sanguine tractare nobis liceret, oppositam, bono animo esse pulsimus; brevi-molestiam hanc carnem nos ablauit. Instrumentum ad ejus extirpationem convenientissimum nobis videbatur, quod parte 3. obs. 27. delineatur.

Instrumentum hujus ope & celeri manu, ablato fungo, sanguine, et vasa admodum; eo impolissimo loco, qui dens oculi hanc maxillari interpectis, effluentis imperum sistere coacti, hic multum effluentis pulvere nostro styptico; beneficio linthei combusti vulnere parti applicato, descriptis ejus hæc est.

2. Nuc. Gall. immatur. ʒij. Boli Armen. ʒij. Terræ Lemniz ʒij. Vitrioli, Cypri ʒj. Alumini. Coad. ʒj. M.F. Pulv. subtiliss.

Pulveris hujus usus in eo consistebat, ut prius conficiatur mixtura quedam ex albo ovi, coagulato & sp. vitrioli gutt. aliquot, hujus impomatæ linteum combustum, hinc linthei, huc ex ipsius pulvis loco vulnere applicandis debite & perficiam extensam, & per manum ægotantis in loco suo detinenda.

Cautelis in hujus fangi ablatione haud indiguimus. Sequenti die adtingentis hæc vulnere applicata auferri curavimus coque in locum substituvimus decoquum, hordel. cui aliud unguentum Egyptianum mixtum, pro colligatione usurpandum.

Tandem ad omnimodam consolidationem meli restat. præscriptum, cui gutt. v. ut v. sp. vitrioli mixturæ, pro finimento. *Joh. à Mecklenburg Observation. Adit-Chirurgicæ.*

Gingivarum erosio incurabilis à vermium abundantia in intestinis.

Puer quidam Dusseldorpiensis erosionè gingivarum à longo tempore gravissimè divexabatur; multa remedia frustra adhibita; tandem vitam cum morte commutavit. Appetit corpore tanta inventa est abundantia vermium, ut à quibus in locis intestina erodent, multique in vacuo ventris reperi fuerint. *Gustavus Fabric. Hildanus observat. Chirurgicæ. Cent. 2.*

GLAUCOMA Vid. Hamorum oculi vicia.

Tuila Oculorum Morbi.

GLANS PENIS per Circumcisionem detraha, quæ operatione ex Celso id fiat. Vid. sub titulo Penis morbi.

GLOBULI Plumbet, quemodo extrahendi Vid. sub titulo Vulnura Sceloporum.

GLOSSOCOMIUM Hippocratis Vid. Instrumenta Chirurgica.

CONOR.

GONORRHOEA.

Gonorrhœam melioris doctrinæ ergo duplicem facimus, veram scilicet & nonnam. Vera est, quando vera materia seminalis, aut ipsi solum proxime similes in testibus tamen elaborata, crebris nimis excrentur. *Verba gonorrhœa* verò est, quando alia materia vitiosa locum seminis excrentur.

Gonorrhœa vera, est triplex. Fit nempe 1. à nimia copia & abundantia seminis; unde non tantum uberior venereis stimulus: Sed etiam ubi særum pascatum turgescere incipit, impetu facto ex vesiculis seminalibus prorumpit; id quod contingit præprimis nocturno tempore, dum supini jacent, ubi scilicet propter sanguinis citra partes dorsi inferiores & posteriores, & illarum partium inferiorum incalcementum, semen abundans calcifacit turgere & erumpere solet; id quod fit non tantum in juvenibus, sed etiam in viduis, qui à venere solita abstinere coguntur. Dico fieri in primis nocturno tempore; si verò cum hac seminis abundantia coniuncta sit laxatio quædam vesiculatum seminalium, aut certe quod harum ipsarum meatus in urethram sine paulo patentes facti: in talibus etiam interdiu seminis fit effluxus, accedente membri tensione, & aliquali venereis pruritu: quod excrentur semen est copiosum, crassum, spissum & naturaliter coctum. 2. Fit gonorrhœa vera à seminis acrimonia præternaturali. Unde & irritantur partes continuo pruritu venereis, & præterea ista irritatione vesiculæ stimulantur vicinæ musculose partes se contrahere & ita semen stimulantur exprimeere incipiunt. Præcesserunt imprimis causæ quæ semen actius generare valent, ut sunt atonia copiosis assumpta, in specie piperata: Sic enim Schenck. Observationum lib. 4. t. fert de quodam qui fere quodoties voluit, sinistrio seu uasturio gonorrhœam provocare valuit, ex acrimonia scilicet, sal. volatili, ast-mpit uasturio, quæ stimulo semen copiosum genitum talem producit gonorrhœam. Ieno & purgantia actia assumpta venereis stimulare & interdum gonorrhœam provocare solent. Exempla vid. in Placet. & Timæo, quin & cantharidum abusus hoc ipsum malum, aciendo semen, inducit. Facit & hæc constitutio massæ sanguinæ, paulo actior, aut sedo lassiore temperata: quod ipsum særum actius immixtum chylosam materiam, semen reddit actius & stimulant: & tales continuo stimulo venereis, ac tennigine, sæpius urgente fortiori exillatione, excrentur solent, idque non absque volapate venereis 1. die ac nocte. 3. Fit gonorrhœa ex nimia tenuitate & fluctuatione seminis, concurrenre tunc simul laxitate nimia vesiculatum seminalium, non secus ac prostratum glandulosarum: Unde & aquosum semen effluit; & hinc laxatis ac atonia, seu nimia relaxatione affectis vesiculis istud continere, aut retinere nequeunt: unde sine volapate insigniori & tennigine acutioris sensu interdum non advertentibus effluit tale semen, aut statim ad levem imaginationem veneream, vel ad levem formine contactum hoc ipsum sponte quasi prolabitur, & est tenue admodum & fluidum quasi solito. Vicium in primis hæret in testibus in hoc casu eorumque fermento debilitato, quod ineptum est elaborando semini, & hinc viduum est in vesiculis seminalibus nimium laxatis; si nempe illud citò elaboratum, & hinc non convenienter naturam seminis induxit. Hæc posterior

gonorrhœæ species sæpius à damnata oritur maculatione, qua sæpius reiterata, & testes laxantur, & fermeotum eorum debilitatur. Exemplum huius rei habet Timæus cap. 49. lib. 3. de studio juris, qui tali damnato modo gonorrhœam sibi contraxit.

Species gonorrhœæ veræ sunt varis, sed ex modò dictis facile possunt dignosci. Hoc tantum addo, quod dum loco seminis chilivensis continui novum supplementum ex massa sanguinea suppeditatur, oriatur denique ut defraudata massa sanguinea succo suo chilofo corpus tabescat, & in primis tales ægri debiles & pallidi sunt, oculorum orbitæ excavatæ apparent, & falgor oculorum deficit, quin potius oculi comæ, & minus lucidi videri videntur, cum semper cum semine aliquid spiritus animalis simul effluere solet.

Tales gonorrhœæ ex se quidem non adeo insignis sunt momenti: verum si diutius continuentur hominem contabescere & succumbere lethaliter cogunt. Supervenit imprimis febris hæctica similis cum tali atrophis specie, qualis est tabes dorsalis noviter auctorum. Qualis hæctica tunc difficillime est curationis. Ulteriori: Gonorrhœa diuturna subito nimis non est supprimenda, imprimis ubi nonnihil inclinat ad virulentiam veneream: metus enim est, ne suppleta subito materia antea copiosius affluente, hæc ipsa stagnando in testibus occasione remoti suppediet; unde postmodum peticulosius malum superveniat.

In hoc in primis sunt causæ removendæ, & in semen immittendum, aut ejus fervor temperanda, unde denique testium fermento tobato partium zonæ legitimis restituendis, laxisque nimis adstringentibus firmandis.

His copis quæ satisfaciunt remedia, in primis quæ semen, aut copiosum turgescens, aut actius stimulantur compescunt, sunt, præ cæteris radix nymphi. albæ & flor. nymphi. item sem. agni casti, seu vincis, ubi etiam semen malorum, papaver. alb. laque. plantag. in specie semen cannabis ad inveteratas etiam, & tantum non desperatas gonorrhœas contrahant; si ex eodem, non secus ac ex reliquis feminibus hiant emulsionem; quæ tamen emulsionem cum cautela utipande propter admixtam vim narcoticam. Convenit præterea urtica mortua, seu gallicus flore albo, quæ ex signatura commendatur Carriethero, egregio in hoc puncto botanico, si decoctum propinatur in vino. Præterea res nova est de mentha, sem. de ruta, de portulaca & similibus. Millefolium item laudatur, si nempe succus millefolii ad ʒij. exhibeatur cum lacte dulci gonorrhœam totaliter sistere refertur, imprimis ubi simul succus lactuce cum camphora exterhè testibus applicetur. Præterea succus limonium & succus citri præ cæteris sunt remedia, licet simplicia, ad gonorrhœas sistendas, siue sint ex acti semine, siue ex abundante, quæ ab omnibus auctoribus mirè laudantur. Unde experimentum Syllati cent. 4. conf. t. est hæc non inefficax compositio; nempe.

℞. Aq. rosar. ʒij. succ. limonium ʒj. album. ovi crud. n. r. Er hæc misturam quarta quolibet die propinat non sine sperato successu. Petrus Joh. Faber ad curandum gonorrhœam propinat succum limonium cui instillavit spirit. terebinth. unā cum tantillo camphoræ.

Potèd de essent. castis. de essent. abstin. de ejus vino & essent. menthae &c. nihil dico, quia sunt satis clara & cognita. Terebinthina imprimis conducit, ac in specie spirit. terebinthina ipsi addatur facchar. sacrum: hinc enim evadit mistura elegantissime rubicunda,

rubicunda, quæ crebrius usurpata mitè compescit gonorrhœas.

Deinde etiam succinata sunt commendata ad gonorrhœam, scilicet pulvis succin. alb. quotidie propinatus in jusculo calido jejuno stomacho mitè ad gonorrhœam valet, quin & oleum succin. in tali casu usurpari potest, quod tamen est paulò fortius ita ut rarius solus polvis usurpetur. Trochisci etiam de carabe possunt olinari; ulterius, ossa sepia picis admodum conducunt; preparata specifice sunt Hæthmanni, ut & etiam D. Michaeli, qui sæpius ad gonorrhœas compescendas adhibuit pulverem ossis sepia preparat. unà cum anisimon. diaphoretico, quæ milita à 38. ad 31. propinavit; nam & anisimon. diaphoretic. in aq. plantagin. haustum gonorrhœas sistit, scilicet etiam bezoaricum martiale, item bezoaricum venereum usurpari solent.

Pertinet hæc electuarium sequens quod à quibusdam laudatur.

℞. Conserv. rosar. & menth. cisp. an. ʒj. vel ʒiij. ossis sepia prepar. ʒij. borac. calcin. ʒj. nucis moschat. ʒss. syr. de ros. fccc. q. l. M.F. electuarium, quod quotidie bis vel ter usurpetur. Obit nota de boracæ calcinacæ, quod instat alumina adstringit, præcipit, sistit gonorrhœas, coëctat venetem, dum citius insigniter venetem, instimulat. Ulterius chrysal. mont. præp. etiam compescunt gonorrhœas nimias. Quiddam præscribunt pilulas contra gonorrhœam hæc modo.

℞. Extract. rad. torment. ʒij. spemiol. croll. ʒj. (hoc etiam admodum laudatur ad gonorrhœam) pulver. sem. agni casti, plantag. an. ʒij. terebinth. coctæ, camphor. an. gr. i. M.F. p. lnt.

Vel ℞. Extract. tormentill. ʒj. succ. satum. camph. an. ʒss. M.F. pil. quæ subinde usurpentur.

Corallia, in primis corundem tinctura, cum spem. lignor. aut etiam tinctur. corallor. suffragata egregie est usus in gonorrhœis. Sic etiam martialia, ac in primis tincturam matris adstringentem laudate solent.

Modernorum experimentum est balsamum de Capiva ex India allatum, cujus 4. aur 5. guttae haustæ mitum sunt experimentum ad gonorrhœas sistendas, propinquant cum vino Hispanico vel alio liquore appropriato, & pro mirabili habetur remedium. Ex modo dictis, milturæ, emulsiones, & aliæ formulæ pro usu prædestinato fieri possunt.

Elisensarum quas vocant castitatis compositio est varia; præ cæteris efficax est, idque propter terebinthinam admixtam, aqua ad gonorrh. Riverii, cujus descriptio extat in ejusdem cent. 1. obs. 25. item in cent. 1. obs. 30. Prostat etiam aqua castitatis Mynsicht. sed admodum inepta, multa enim continet quæ nihil per alembicum transmittunt; potius loco ejusdem à feminibus ingredientibus fiat emulio, cui postmodum adduntur pulveres reliqui appropriati. Dabo exemplum talis emulsionis contra gonorrhœam, in specie si simul fervor quidam adjuvans sit in inguine circa perinæum, & hinc usque ad lumborum principium.

℞. Sem. melon. agn. casti an. ʒij. papav. alb. canab. an. ʒiij. cum s.c. aq. nymph. & portulac. f. l. a. emuls. cui adde ossis sepia præp. ʒj. anisim. diaphor. succin. alb. præp. an. ʒss. spemiol. croll. ʒj. edulcoret. cum s.c. torulat. man. Christi perlatæ.

Præterea sunt etiam qui insinuant ad has gonorrhœas commendare sequent. pulv. scilicet.

℞. Folior. rut. fccc. femin. agn. casti, menth. gallar. pulveris an. q. v. cujus pulver. ʒij. hauriantur in vino chalybeato, repetendo quotidie: *Adversus* hoc

est Hæthici Paduani, qui non tantummodo ad gonorrh. sed præterea ad fluxorem album mulierum commendat; ubi simul tanquam expertum specificum extollit succam cetherach, seu scolopendit, si ad cochleare j. repetitis vicibus addimatur; idque habet obs. 170. & 171. Quod si verò præter dictas causas semen aqueosum, ac vesicularum laxitas inducat gonorrh. in tali casu interne, ex mentha, abinthio, succino, thure, & similibus confectum, in specie corall. alb. & thus, essentia item lignor. & essent. lign. falsari. tinct. corall. cum sp. lignor. item tinct. mart. adstringens admodum laudatur in specie succus menth. cum melle coctus & ad consistentiam syr. inspissatus, si ad ʒij. usurpetur, commendatur à Foresto. Item thus pulverisat. in aq. plantag. propinquant feliciter has gonorrhœas sistit sed non est tam sepe hoc ipsum repetendum, quoniam aliàs etiam urinae fluxum cohibet.

In genere conveniunt omnia, quæ inspissant, & fluxilia coagulant, ut sunt martialia adstringentia, corall. & similia. Externè sunt fomenta adstringentia cum vino austriore in quo decoquantur corric. granar. balsam. & rosæ; item radix consolid. major. plantago & similia; aut fiat instantio perinæ aq. radie. penis cum oleo myrtillor. scilicet.

℞. Olei myrtill. ʒij. malthic. destill. ʒj. caryophyll. destill. nucis mosch. an. ʒss. cum pauca cera fiat linimentum quod vesiculas feminales nimis laxas oonitil roborabit atq. adstringet.

Quod si necessum fuerit ne etiam interdum purgationes instaurantur, præ cæteris in quo erant terebinthinæ, v. g. pilul. de terebinth. Mynsicht. vel etiam pilul. factæ ex sola terebinth. cum tharbar. pulver. item pilul. factæ ex mass. pilular. de fumar. & terebinth. cum mercur. dulc. ubi suspicio subit luia vener. Sic namque D. Michaeli curavie aliquando militem quendam diuturnâ gonorrh. afflictum per solas pilulas de terebinth. Cypr. cum croco mart. adstring. nullis aliis adhibitis remediis. In genere terebinthinæ, cum laxent blandè, & simul vias urinarias ac spermaticas detergant, hic sunt convenientissima.

Hæc fuerunt species Gonorrhœæ veræ. Quod attingit gonorrhœa nothas, in quibus loco feminis aliud quoddam liquamen vitiosum excernatur; hæc ipsa denud est duplex, vel benigna, vel maligna, seu, ut aliàs vocatur, virulenta. Benigna est quando circa causam manifestam, v. g. cetera prægressum actum venereum suspectum, effluit continuus liquor men, seu materia tenuis aquosa & copiosa, idque circa peuricum venetem, aut circa membra rentiginem: fluxus talis die nocteque diu satis continuatur, adeo ut observatum fuerit etiam ad aliquot annos durasse circa ullam intermissionem; & absque insigni, & tali fluxui (si semen verum esset) proportionata virium prostratione.

Fluxus talis gonorrhœæ nothæ virorum respondet fluxui albo mulierum: alià quibusdam, aut pauci fuerint Aurores qui ejusdem fecerunt mentionem, gonorrhœa catarrhalis appellari solet. Auctores pauci, ut dico, qui de tali gonorrhœa agnoscunt. Langius in suis epist. lib. 2. epist. 5. item Laurentius in suis consil. p. 60. ac denique Matcellus Donatus, Histor. Medic. mitab. lib. 4. c. 18.

Si pressius examinemus hanc gonorrhœam notham inveniemus quod subiectum seu pars affecta in eadem sint prostrata glandulose, seu spongiose in radice urethæ circa cervicem vesicæ sitæ, quas ipsas esse subiectum talis gonorrhœæ sufficienter declarat & confirmat.

firmat Graëvius in novissimo suo tract. de organ. vident. generat. Intervient. Sicuti hæc ipsæ prostatæ glandulosæ mirabilium morborum proinde sunt subiectum. Scio enim ex illis infarctis & insignitè tumefactis; Ichthuriam seu suppreffionem urinæ lethalem Romæ in quodam Principe fuisse indurctam: sicuti è contra hæc ipsæ prostatæ glandulosæ nimis laxæ, aut alio modo vitiatæ sunt subiectum hujus gonorrhœæ notari dicendum. Naturaliter enim præparant & secretione quandam lympham tenuem & lubricantem, quæ Intervit pro vehiculo seminis ex vesiculis in urethram expressæ; quod semen, cum fuerit glutinosum, hujus lymphæ indiget vehiculo ad fortorem ejaculationem. Quod si ergo fiat ut laxatis his ipsi substantiis glandulosæ, nimium copiosæ, ac frequentius talis lymphæ in urethram excrementur, quæ tunc simul à naturali statu ad quandam viscositatem inclinatur, eandem oriatur hæc gonorrhœa. Fit hoc quando ipsa mass. sanguin. tali humore aquoso superfluo saturata, quæ data porta sese exonerat. Ubi ergo hæc ipsa corpuscula, aut ex equitatione nimia, aut ex lapsu, aut ex alia quacunque ratione, erant lacerata, aut distenta, aut alio modo vitiatæ, tunc talis læta mass. sanguin. superflua per has ipsas prostatas glandulosas, tanquam caloriolum excrevit, & ita gonorrhœam talem notam constituit.

Remotior causa hæret in primis in stomacho, qui non ritè digerens alimenta, sed hæc ipsa in cremorem aquosum pervertens, exinde vitiosum sanguinem etiam generare facit, unde & talia subiecta ad cachectiam sunt disposita. Aut si non mox in principio resolvatur talis gonorrhœa, postmodum cachexia supervenit.

Ex modo dictis signa tam diagnostica quam prognostica per se patent. Quod attinet curam, in hoc affectu, scilicet ad hanc gonorrhœam, seu superveniens quoddam symptoma minus est dirigenda cura, sed potius prima ratio habenda est stomachi, rescindenda ejusdem digestio, & mass. sanguineæ cruditates emendandæ ac corrigendæ, id quæ quod superest laticis aquosi per vias urinarias est expurgandum: tunc tandem externis adstringentibus prostatæ glandulosæ firmandæ & in tonum naturalem lunt restituendæ. Remedia quæ his satisfactionem scopis ex illis quæ superius de cachexia diximus petenda: præ cæteris conducunt ex ligno salustriæ parata remedia ejusque essentia cum spiritu serpilli parata crebrius & in majori dosi assumpta. Hoc & ex quæ ex mentha & absinthio parantur, quæ & stomacho & gonorrhœæ satisfaciunt. Item fricciones, in specie Sal. volat. quod cachectiam imminuentem tubide prævenit, ciendo potenter urinam.

Immo observatum fuit acidularum potum, uti in aliis morbis chronicis, ita & in hac gonorrhœa diuturna contulisse; in primis si post habitas acidulas thermatarum externus usus circa partes genitales exhibeatur, pro restituyendo tono prostaticarum læsarum; aut etiam balnea aluminosa artificialia, aut similia adstringentia externe erant commode in usum vocanda.

Non eisd nimis suppressenda est hæc gonorrhœa, quoniam natura abueitur his viis ad evacuandam mass. sanguineam; emendetur saltem prius imminuens cachexia & vitium stomachi, & ferè semper sponte cessabit gonorrhœa.

Quod attinet gonorrhœam notam malignam: hæc est ex quæ ex coitu cum semina impura, ac Lue venerea infecta contrahitur. Effluie in hac ipsa liquorem aquosum liquidum absque, dolere; hinc

successive flavescit, tandem viridescit, liguu & aciescit, adeo ut tandem cum acerbissimo dolore effluat, imo non raro pus ac purulenta sanies simul excrevit, & ipsum semen odore fetido & singulari foret; nonnunquam talis gonorrhœa accidit illis qui visitant Galliam & Italiam, interdum fit ut nimia aciditate seminis, seu materiei profluentis, corrodat ac exulceretur meatus urinarius, ex quibus ulcusculis tandem excrevit carnes sylvestres, ut sic dicam, seu verrucæ, quæ hinc canalem urinarii obstruunt, & vulgè caruncule meatus urinarii appellantur. Affligit hæc gonorrhœa continud, imprimis, secundum indolem luis venereæ, vesperino aut nocturno tempore cruciat, adeo ut eodem tempore acerbissimi dolores crucient penem, siquæ eo acerbioribus, si forsitan se erigat ac extendat membrum: fin malum ulterius procedat, superveniunt crudeliter ardentes nocturni lumborum.

Causa hujus gonorrhœæ est contagium Gallicum fermentativum, per coitum ex muliere infectatæ attractum, ex tali scil. quæ ulcuscula gallica in vagina urinaria habet. Malum enim profluvium est hæc ipsa gonorrhœa gallica; adeo ut referat Balonius Consilior. lib. 1. cons. 9a. de quodam viro qui ex coitu impuro gonorrhœam violentam contraxit. Unde postmodum non tantum propriam uxorem inquinavit, sed cum eadem filium quoque generavit mox à primo oculo eodem malo affectum.

Subiectum hujus gonorrhœæ sunt eadem prostatæ glandulosæ quæ modo nominavimus: id quod per experimenta anatomica confirmatum dedit Bartholinus Cent. 12. Hist. anat. 36. ubi, aliquot memorantur hæc gonorrhœa affectu, & eandem mortuæ, in quibus prostatæ glandulosæ fuerunt reperiæ ulceratæ. Nam dum hæc ipsæ jam excalescunt in coitu intensius incalcescunt, tunc ulcera gallica vaginæ uteri exhalant & exspirant miasmata fermentativa, quæ post excretionem seminis virilis se insinuant in urethram penis ibique se affigunt, & per meatus à modo excreto semine patentes se insinuant in prostatas glandulosas & sua fermentativa vi corumpunt successivè lympham in illis prostatæ elaborandam, ut degeneret in aciditatem caustivam & virulentam lue malignam; sicuti notum est, quod in lue venerea abundet acidum virulentum corrodivum. Unde postmodum talis succus aeris & acidus fluens, non tantum corrodit proprias prostatas, easque exulcerat, sed etiam meatum urinarium excoriat, & eandem tam dira, & atrocia & dolentissima symptoma post se trahit.

Promotum alterius & alcius sepiens contagium, ita ut per vasa differentia testes ingreditur horum tumorem & doloris inflammationem infert.

Diagnosis hujus gonorrhœæ ex primis dictis. Symptomatis patet. Quoad prognosin, quod citius ei occurrat, èd facilius curatur. In sensibus ut plurimum ad mortem terminatur. Nisi hrevi ipsi occurrat in perfectam lue Gallicam, inquinata massa sanguinea degeneret: & hic est modus communissimus quo lue venerea contrahitur.

Quod curam attinet; in hac virus Gallicum acedum appropriatis partem mercurialibus, partem acedum destruentibus contrigendum, & quæ data porta evacuandum. Quod si cui libeat præferre se ab hac gonorrhœa, quem nempe vexat appetitus venereus, nec tamen Interim certus esse potest, an enim infecta coëat. In præservationis loco, mox ante, aut post coitum, assumat spir. de olei terribinth. volatilis gut. 6. 7. vel 8. in haustu vini generosi,

generosa. Hujus enim alba, foeta vis meatum urinarium obstruit, ac corrigit contagium virulentum fortiter haustum. Quod si vero quis parum infectus sit hoc malo & laboret gonorrhœa, ante omnia præmittendo universalia purgantia mercurialibus mista, succurrendum v. g. hiant pilulæ ex extracto elebori, nigeli, aut ex extracto catholico Andeiaci cum ana mercurii dulcis, his pro stimulo addatur aliquot grana extracti trochilicæ, alaudal, Colocynthidis enim efficacia melle commendata est ab Helmontio in cura luis venereæ, prælati usibus lignorum; etiam loco mercurii dulcis, mercurius præcipitatus viridis venereus cujus descriptio videatur apud Schenkerum cap. de mercurio, commodè usurpatur. Aut pilullæ de terebinthina misceatur mercurius; vel fiat bolus ex terebinthina Cyprica cum rhubarbo, ac mercuriali remedio dulci, vel alio. Nam licet mercurialia ista in principio videantur augere malum, illud tamen adducit insidendum; cum non dicitur magis appropriatum remedium contra virulentiam Gallicam. His ipsis commodè subiungatur aqua Quercetana contra gonorrhœam virulentam, quam se corioris expectum esse gloriatur. Vid. etiam Scultetus in Armatum. Chirurg. obs. 79. qui ipse etiam indicat hujus aquæ experientiam. Loco hujus aquæ etiam spir. terebinth. mistus cum saccharo latum egregie conducit in hac gonorrhœa, non absumentum tamen, ut vulgò putatur, sed absorbendo acidum visiosum in hac gonorrhœa peccans; qui ratione etiam camphora conducit, non quod castræ per nates, ut putant, sed tanquam sal volatile oleosum detegit & corrigit acidum venereum. Ex hoc ipso fonte infusum caustharidum in viro expectum est remedium cuiusdam medici Belgæ: quatenus caustharides acerrimo sale volatili abundant, vid. Bartholinus Cent. 4. Epist. p. 343.

Decocta lignorum, efficacia lignorum seu per se notis, & ad lumen veneream, & ejus prodromum gonorrhœam commendatissimas sicco pede prætereo. Infusa costallor. cum spir. lignorum parata est egregia, fed crebrius usurpanda; gummi guaiacum appropriatissimum est remedium ad hanc gonorrhœam. Commendantur tal ammoniacum, effertur, aut extract. gummi. guaiac. parat. cum sp. vini tartaroso & in aqua plantag. propinat. Nam in gummi guaiac. hoc perfecta consistit, cura gonorrhœæ malignæ. Aliæ etiam balsamina de Coibaya ex fida Belgarum experientia ad gut. 5. vel 6. propinatam singulariter laudant. Animon. diaphoretic. bezoaric. mînez. ac similia etiam laudantur; item succum limonium cum spir. terebinth. & camphora ex Fabio jam proposui; ut succo experientiam addere est in Sculteto obs. 79. Armatum. Chirurg. Bartholinus loco citato testatur; curam gonorrhœæ virulentæ per pulvrem sympatheticum, id quod exenus verum est quatenus eo processit exulceratio proflarum, ut corrosis variis sanguis quoque efflueret.

Quod si fiat, ut sæpius etiam fit, exulceratio meatus urinalis, tunc etiam conducunt injektionen in penem, quæ fiunt ex succo plantagininis cum melle rosato, quæ diluantur aquâ appropriatâ, ipsique pro se nata adduntur mercurius dulcis & aloë rosati; aut si alius processit malum, lectiones aloëicæ cum trochico mercurii præcipitati, sicut etiam ubi ferocissimum fuerit malum, cum mercurio sublimato etiam instituenda. Singulare experientum cuiusdam Medici est aqua meteorialis hermetica: scilicet accipit meteorum vivum, coquit in aqua communi per sex horas, decantat aquam & tenet meten-

sim in eodem planè pondere quo fuerat ante ebullitionem, & aquæ hujus singulo mane propinat bonum haustum; Unde successisse sedatur gonorrhœa virulenta. Michael Eumullerus in Collegio Præliis.

In gonorrhœa 2. Refin. jalapp. scam. angr. vt. mercat. dulc. gr. xii. succ. liquit. 3j. olei lign. guaiac. testis. gutt. x. M. F. pilulæ num. vii.

Vel 2. Extract. dilacathol. 36. mercat. dulc. gr. xv. olei lign. 3j. testis. gutt. 3j. & F. pilulæ num. vii.

Seu 2. Confect. Hamech 3j. pulv. rhubarb. 36. oculor. cancr. 3j. M. F. bolus.

Vel 2. Pulp. cassia 3j. resin. turbich. gran. viii. terebinth. Venetæ 3j. M. F. bolus.

In India 2. Conserv. flor. cassia, tamarindor. aa. 3j. resin. turbich. gr. xii. mercat. dulc. gr. x. olei ligni ebeni testificati gutt. 3. M. F. bolus.

Vel 2. Pulp. cassia, conserv. flor. cassia an 36. resin. scammon. rosbich. an. gr. v. gummi elem. liq. 3j. mercat. dulc. gr. xii. M. F. bolus. Quiboli qualibet leprimanâ semel exhibentur. Interim sequentibus unum ex his per diem 4. emulsiō & quadam, vel appropriato vehiculo, usurpant.

2. Bals. sulph. simpl. 3j. dof. à gut. x. ad xii.

2. Bals. sulphur. succin. 36. dof. à gutt. v. ad viii.

2. Brist. sulphur. juniperini 36. dof. à gutt. vi. ad gutt. xii.

2. Spir. vini terebinthiastri 3j. dof. à gutt. x. ad xii.

2. Spir. vini succinati 3j. Dof. à gutt. xv. ad xx.

2. Tinctur. succini & tinctur. tartar. antimoniastri an. 36. M. dof. à gutt. x. ad xx. Ad ardorem urinæ ab ejus accinomia, spiritus salis per diem bis usurpatus, ægrotum felicissimè adjuvat. In India.

2. Olei still. gummi. elemi 5j. {dof. à gutt. x. ad xii.

2. Olei baccar. cionam. 3j. 4j. à gutt. vi. ad x.

2. Bals. elemiastri 3j. dof. à gutt. 8. ad 12.

2. Spir. vini elemiastri 3j. effert. juniper 36. M. dof. à gutt. x. ad xv. cui boli magis placent potest usurpare frequentes.

2. Conserv. rosar. 3j. flor. hyperic. 36. pulp. cassia 3j. terebinth. Venetæ 3j. tart. vitriol. 36. oculor. cancr. 3j. tindur. succin. 36. M. F. bolus dof. 3j. mane & vespri. In India.

2. Conserv. flor. cassia 3j. pulp. cassia 36. lapid. percar. præp. matris perlar. præp. an. 3j. pulv. liquirit. 36. olei. gummi. elemi 36. M. F. bolus dof. 3j. emulsiōes fiunt tales.

2. Sem. 4. filig. maj. an. 3j. amygdalinor. dulciom 3j. aq. hord. rosar. an. 3j. v. f. emulsiō; huic adde aquæ petroselin. porcel. an. 3j. M. F. bolus. cancr. 36. lye. liquirit. q. i. m. Aggroto juxta præscriptum modum tractato, orationi tandem in suis per sequentes pilulas, pro valetudine plenariè restituida, imponendus est.

2. Terebinth. Venetæ in aq. rosar. lozæ & in eadem ad justam consistentiam coctæ 3j. balsa. Peruvian 36. pulv. rad. tormentil. consolid. an. 3j. oculor. cancr. præp. mercat. dulc. an. 36. M. F. massa pilularis. Dof. mane & vespri 36.

2. Terebinth. Cyprica in aq. plantag. lozæ & ad justam consistentiam coctæ 3j. bals. copalvæ 36. resin. guaiac 36. pulv. liquit. torment. rhubarb. an. 3j. cortic. guaiac. pulv. sangu. dracon. lapid. hæmat. an. 36. M. F. massa pilularis dof. 3j. in ole.

℞. Specier. diamantis ʒij. conservæ rosar. ʒj. m. dof. ʒj. ad ʒij. manē & vespert.

Vel ℞. Conserv. rosar. flor. cassiæ an. ʒj. pulv. ad gonorrhœam ʒij. m. dof. ʒij. mane & vespert. Si autem defluens materia coagulatione indurata dolores creat in vis, & ulcerum atque caruncularum causa est; illa frequenti decoctionum, quæ ex abstergentibus & emollientibus, siue adstringentibus consistunt, iniectione abluitur. *Herman. Nidol. Græm. compendii Med. Chym. lib. 3.*

In principio Gonorrhœæ laborandum ut fermentum illud peregrinum, acere corrosivum, per contagium contractum, expellatur vel suffocetur, antequam sanguinis materiam aggredi, eamque malignitatem suam infundere queat. Quod potissimum fit per purgantia, sudorifica, diuretica, & acere fermentum enervantia.

℞. Extract. cathol. ʒj. mercur. dulcis gr. vii. Trochisc. albandal. gr. iv. olei juniperi, gut. v. m. f. pillule nom. vii.

Vel, ℞. Pulp. cassiæ recent. extraet. ʒj. terebint. venet. loræ, ʒij. mercurii dulcis, salis prunellæ, ocul. cancr. præparat. an. ʒi. salis vol. succin. ʒ. rv. fyr. de althea Fernel. q. f. ad form. conditi. m. f. conditum, antist. curantur hoc condito in principio, & hujus capiat æger ad magnitudinem oculis molchatæ, bis terve de die.

Corpore purgato, ad diuretica festinandum, ut venenum per easdem expellatur, per quas admissum est vias, ut.

℞. Tinct. verumum majalium cum alkali tartari præparatæ, à gut. x. ad xv. in aq. petrolelini, vel vino propinquent. m. f. haustus diurectus. Quod si vero post exhibitionem hujus tincturæ, æger conquiescat de intolerabili stranguria, hanc faciliè superaverit, exhibendo patienti, lac tepidum saccharatum: vel emulsionem ex seminibus frigidis, addito sem. paveris, temperatoque cum fyr. de althea Fernel.

Ad venenum expellendum, malum conducit aqua Quercetani in gonorrhœa.

Vel; ℞. Olei succini, gut. 3. terebint. locid. gut. v. balsami prœviani, gut. 3. dentur ex vino calido saccharato. m. f. haustus diurectus.

Balsamum cobaiba non tantum educit venenum, sed postmodum consolidat, & adstringit, hujus balsami dosis à gut. x. ad xv. exhibeantur cum potu calido.

Præ cæteris balsamum sulphuris antimonii terebintinatum, quod frequenti modo sulphure antimonii impregnatur.

℞. Scotiarum antimonii in confusione reguli simplicis provensurum q. p. his affunde olei terebintinæ lucidi ad emin. trium digit. transvetor. Sicut in digestionem, donec oleum terebintinæ sanguineam extraxerit tincturam, cujus dosis est à gut. v. ad x. in vehiculo convenienti.

Ad evitandum, ne contagium aliquam materiem nostri sanguinis imprimat labem, & ulterius serpendo glandulas inguinales inficiat, præscribatur sequens sudorificum.

℞. Resin. ligal. guaiaci, aut ejus loco gummi ʒj. dissolvatur in l. q. p. vini. m. f. haustus præservans una dosi exhibendus.

Vel, ℞. Theriac. venet. ʒj. ocul. cancr. præparat. ʒj. salis volatilis succin. gr. xv. camphoræ, gr. 3. olei juniperi gut. v. m. f. bolus præservans.

Si vero malum vel diuturni mori, vel adivitate sui veneni testes, vel glandulas inguinales prederit, vel urethram eroderit, vel ulcera maligna circum glandem exciderit, pro ratione loci & veneni, medicamenta sequentia applicentur.

In inflammatione testium.

Si testes inflammantur & tumescant, præparatur sequens lotus ad inflammationem auterendam.

℞. Lithargii auri, ʒ. rv. flor. sambuci, rosar. pallidæ. m. ij. coq. ex l. q. aq. & vini & aceti, an. m. f. Forus, calideque applicetur. Majoris discussionis gratiâ, si opus fuerit, nobilitari hic lotus poterit cum spiritu vini & camphorato.

Inflammatione sedata, postmodum tumori & duritiei obviam eatur, partem affectam balsamo sulphuris succinato calide insungendo, applicando postmodum emplastrum diaphoræ Rolandi, cujus præparationem vide in empirica Rolandi.

Vel, ℞. Scotiarum reguli antimonii simpl. q. p. terantur in pulvere aneoquum humido aeris insinuantur, siquæ affunde olei succini, terebint. an. q. f. ad eminentiam duorum digitorum transvetor. rum, digerantur ut artia est. Fiarque balsamum magnarum virtum in tumoribus doris emollientis.

In Bubonibus.

Bubones si in inguine appareant, explorandum primo, utrum discuti queant absque suppuratione, illis applicando.

Emplastrum de ronis cum triplicato vel quadruplicato mercurio.

Quod si æger conquiescat de pustulis cutis, hoc cum emplastro misceatur pauxillum sacchari saturati, quo mediante prædictum hoc incommodum evitabitur.

Vel, ℞. Mercurii vivi cum aq. fort. ʒ. vii. soluti, ʒ. iv. axung. porcine, ʒ. vii. coq. simul in fictili vase, continuo spatula lignea movendo, donec inspissari incipiant, massamque obtinens mollem, adde cer. flavæ, ʒij. malth. olibani. an. ʒvi. m. f. emplastrum discutiens.

Vel, ℞. Lithargii auri sub. pulv. q. p. hinc affunde aceti stillatit. q. f. coq. simul, donec acetum de acrimonia sua remiserit, & dulcedinem saccharinam acquisiverit, filtra.

℞. Hujus solutionis, ʒ. vi. mercurii præcipitatis albi vulg. ʒij. lento igne evaporentur ad siccitatem pulveris.

℞. Hujus pulv. ʒj. m. f. unguentum discutiens tophi, glandulisque induratis applicandum.

Quod si bubonium discusso ex voto non succedat, ad maturacionem festinandum caraplastathi ordinatiis, vel emplastro diachilo simplici, ulcus forto aperiendo, mundificando & emplastro opodeldœ consolidando.

In ulcere urethrae.

Urethra si ab aceti & corrosivo sale corrodatæ, intolerabilis oritur dolor, ubi urine retinendæ sunt; acere enim sal. urinæ transiens, locum erosum, hunc infectissimè modicatur, & pungit; per sistingam itaque sit iniection talis.

℞. Lactis tepidi, vel aquæ rosarum ʒij. sacchar. saturati, ʒi b. m. f. iniection anodina.

Vel, ℞. Balsami satomi tubicond. gut. xx. aquæ ros. vel lactis tepidæ, ʒij. m. f. iniection anodina, quæ continuatur, donec pars erosa consolidata fuerit.

sed cum à præterfluente-urina curatio valde tetatur, patienti, dum ipsi suargendum erit, fistulam argenteam, oleo olivarum illiam, in urethram introdeat, ut hujus beneficio præcaveat, quo minus urina locum affectum attingeat.

Ulcus, si se manifestaverit, mundificetur sequenti.
℞. Vitelli ovi, ad ducitum cocti, m. r. mell. optimi, ℥j. misceantur exacte, terend. cum pistillo, donec obtineat colorem spadicium, adde mercurij sublim. ʒij. vel ʒj. m. f. mundificativum.

Sæpius ulcus tangatur oleo ligni guajaci median-
te candelâ cæca.

Quod si summe pertinax fuerit, neque ordinariis cedat remediis, tangatur oleo originis, de quo vide Hartmannum in praxi sua chymica, capite de gonorrhœa, vel aqua forti, & postmodum aqua replenda clausur, & cicatrifetur, cum prædicto oleo guajaco.

Virus ubi expurgatum est, fluxus seminis sponte sedari solet. quod si verò ex debilitate vasorum vel erosione nimia, ex vuto medici hoc non succedat, adstringentia, & confortantia sunt utenda, ut.

℞. Trochisc. de terra sigill. ʒj. corall. rubt. præparat. ʒʒ. Terebint. cum aq. plant. lotæ, ʒv. M. F. pilulæ instar pilorum, quatum pro dosi v. vel vi. dentur mane & vespere.

Vel, ℞. Vini rubelli, aq. simplicis, vel consolide major. ana ʒv. In quibus infunde per noctem s. l. Schordei, m. f. corr. granatorum, Bacc. juniperi, an. ʒʒ. Boli amen. ʒʒ. Mane leviter ebulliant, & colentur, & post urinam redditam, fiat injectio per seringam.

Vel. ℞. Sem. alkekengi, ʒij. quarunt frig. major. papav. alb. lactuæ, plantaginis, ana ʒj. agni casti, ʒj. Rhubarb. electi, ʒʒ. malliches, ʒij. boli armenz, Gummi Arabici, Soccini albi, Gummi tragacant. Amyll. ana ʒij. ros. rub ʒj. Terebint. q. l. pro matetia pilularum. M. F. pilulæ, dosi à ʒj. ad ʒij.

In ulceribus malignis glandis.

Ulcuscula maligna si glandem infestent, ordinariamque medendi methodum respuant, medeant aqua sequenti.

℞. aq. vulgar. q. p. ebulliat in lebeate ætio, in ea dissolve, calcis vivæ parum, adde vitriol. hungar. tantum, ut coarulescat solutio, filtretur. M. F. foras, & repide applicandus. ad hoc suum confect aqua divina Fernelii, vel

℞. Lactis virgin. q. p. in eoque solvatur. Mercurij sublimati paulillum M. F. liquor, quocum tangantur ulcera maligna sæpius.

Vel Arzeng. porcin. q. p. quocum misce olei tartari per deliq. tantum, donec obtineat unguentum acre, cui si tandem non aulcerent, Loco olei tartari per deliq. misceatur oleum vitrioli. M. F. linimentum mundificativum.

Mercurius dulcis, ut & rubieb minerale, mixta cum unguento convenienti non inferiores hic obvi-
Anonymous: Præcox chymiatrica rationabilis cap. 25.

Consultationes.

Pro Juvene Perilustri, & Nobilissimo Gonorrhœam patiente.

Quodd perilustri, & Nobilissimus Juvena deti-
Bibl. Chirurg. Tom. II.

neatur gonorrhœa, jam omnibus est perspectum, quæ nil aliud est quàm Involuntarius seminis exitus. Verùm quoniam quandoque semen purum, quandoque mixtum cum bile semen exite, color flavus excurrit indicat, sed an huic flori conjuncta sit aliqua malitiae venereæ merito dubitari potest & pro utraque parte rationes non desunt. Primum quidem pro parte affirmativa est ratio decompia ex commercio, quod habuit cum pluribus feminis suspectis, pro parte verò negativa est ratio desumpta ex conqueuntibus hunc fluorem, solent enim alia symptomata, ubi est adjuncta malitiae venereæ, fluorem subsequi, quorum nullum observatur in Juvene Nobilissimo. Ex quibus utraque pars iustitieri posse videtur.

Verùm quamquam symptomata alia non appareant, dicerem hoc evenire posse, quia malum est in principio, & urinam non inspectam, nam ut verum fatear ego quasi certus som de infectione, & eo magis quia novi patientem ultimum rem habuisse cum muliere lue illa venerea obruta & infecta.

Jam igitur causæ hujus floris sunt adveniendæ, qui fluor quoniam est symptomata secundarium necessario in aliquam actionem læsam refertur, hæc actionem nulla alia esse potest, nisi retentio vasorum seminalium, quæ cum possint laxi, vel per se, vel ex accidenti per se quidem vitialis vasis seminalis, ex accidenti verò irritata facultate expultrice ob leminis accedentem, quam accedere puto ex dicta bilis cum semine admixtione, atque forsas à lue illa venerea sanguinem, & semen inficiuntibus.

Sed utrum seminalium vasorum dilatatio aliqua conjungatur, jure quaeretur aliquis, cui ego respon-
dendum, in hujusmodi viro fere semper aliquam vasorum dilatationem conjungi, vix enim fieri potest, ut fluor prædictus aliquot diebus perduret, nisi aliqua vasorum relaxatio, ac appetito suboriantur.

Quare ex dictis patet ad medicum attingere seminis acedinem removere per evacuantia, & attemperantia, atque etiam materiam prædictam retrahere, si aliqua adsit qualitas venerea, eandem propriis alexipharmacis domare; Amplius oportebit vasa nimis dilatata restringere, maximeque vitibus prospicere.

Quare omnia ardua erunt, ac difficilia, quoniam affectus est satis progressus, & suspicio non levis occurrat venereæ infectionis, ut ex hac immineat etiam deluvium capillorum. Danda tamen erit opera, ut quamprimum affectus præsent, & huic imminenti, & alius quamplurimum hanc subsequi solitis occurratur.

Idco lenita alvo venam cubiti fecare, & si opus fuerit cucurbitulas naribus cum leasificatione adhibere oportebit.

De pharmacis ita decerno, ut quàm citò leniatur alvus cum Diacubesthen lenitivo, vel Diacacia cum manna, deinde præparentur humores decocto endiviz, sonchi, acetosæ, plantaginis, & coriandrorum præparatorum cum syrupis accommodatis, postea deturbentur, cum diapruno lenitivo, & ab hac purgatione uteretur ego sero chalybeato cum succo acetosæ, vel thermis frigidis, post quatum usum saccharum rotarum antiquum cum pulvere coralli rostri, seminum cannabis, coriandrorum præparatorum, plantaginis, & simillium propinatam. Sed præter hæc si suspicio luis venereæ præsens erit, nil præstantius decocto falsæ, & chinæ esse poterit.

Externis autem convenit unguentum Comitissæ, infundigans Galeni, Remibus adhibiturum.

Quibus tandem addendus est victus accommodatus, qui erit, ut patiens degat in aëre temperato, vescatur præsana, lacte seminum melonis, & cannabæ, caribus optimis in aqua chalybeata decoctis, ovis, piscibus petrosi, oleis refrigerantibus, & utatur vino paucifero, vel aqua diluta, quod magia expediet, si sandalis, salis, itemque china medicabuntur, somnus sit longior vigilia, alvus proprium officium exerceat adjuva, si opus fuerit, clysteribus emollientibus, ac refrigerantibus, demumque animi, & corporis quieti impetetur in quibus omnibus ad majorem efficaciam à D. O. M. auxilium implorandum est. *Julius Cæsar Claudianus in Consultationibus Medicinalibus.*

Gonorrhœa ex frequenti masturbatione.

Juvenis quidam forium studiosus, constitutionis sanguineæ, & per naturam in venetum proclivis, ætate libidinis & coëundi appetentia sæpius tenebatur, quam ut compelleret, trullante virgilia manu semen elicibat, idque frequenter, ut ipse fateretur bis, ter & amplius de die: tandem in gonorrhœam incidit cum insigni virium & totius corporis debilitate.

Causam istius gonorrhœæ laxitatem vasorum seminalium esse iudico, quarens ex frequenti masturbatione viscule semen continentes turles inanitate iterumque repletae laxitatem contraxerunt, id quod etiam ab humorem affluxu fieri quandoque solet.

Corporis totius debilitas ab intemperata & nimia seminis profusione proficiscitur. Quomodo enim semen intemperativè æquant corpus totius gravitate inducit, & si eorumptior gravissima symptomata excitat: Ita nimium exercitum calorem nativum dissipat, cruditates emulatur, nervos lædit, mentem hebetat, & universum corpus debilitat.

Ut itaque facultas retentrix labefacta roboraretur & vasorum seminalium laxitas emendaretur, adstringentia quædam interna & externa præferimus.

℞. Rad. torment. fragar. bistort. an. ʒss. flor. rosar. rubrar. m. j. balsam. cortic. granat. an. ʒiij. succi acaciæ ʒss. sem. berber. ʒij. cassiæ lign. ʒiij. mixta infunde in vini rubr. styptic. lb. iv. adde sp. viriol. got. xxi. extrahe tinctur. lenio calore M℞. Colatur. adde syr. corallin. Quæretani ʒvi. M. De hac tinctur. bibat singulis matutinis ʒvi. cum jejunio trium horarum. Vesperi decumbens confectiorem stypticam Mynsichti, vel subsequens electuarium delibet.

℞. Conserv. rosar. veter. ʒiv. cam. cydon. condit. ʒvi. nuclei Indic. condit. ʒij. pulv. tormentillæ, balsamior. an. ʒij. tetr. sigill. corall. rubr. præparat. an. ʒj. C. C. præparat. ʒss. cum syr. granat. acido f. electuarium. Extra usurpetur tale unguentum.

℞. Olei rosar. myrrh. mastich. an. ʒvi. bol. armen. tetr. sigill. balsamior. an. ʒss. cere albæ parum, M.F. unguentum molle.

His per integrum mensem adhibitis à turpi hoc malo liberatus est æger; monui in posterum à tam nefanda libidine abstinere, memor Divinæ comminationis, quæ ab hereditate regni Dei excluduntur molles, Epist. Paul. ad Corinth. 1. cap. 6.

Abominandum sanè & homine Christiano indignum scelus, quod etiam Etbnei famiores detestati sunt, ut videtur est apud Martialem, qui hoc nomine acriter reprehendit Horatium.

Pennis quod nunquam fuit sed pulice levè

Uteris & veneri servis amica manus.

Hoc nihil esse putas, sensus est, mihi crede, sed ingens.

Quantum vix animo concepit ipse suo.

Nampe semel fuit generatus Horatius, ut iter,

Mars semel ut gemens lilia casta daret.

Omnia perdidit si masturbatus ieritque.

Mandasset manibus gaudia fada suis.

Ipsum, crede, tibi naturam dicere verum:

Illud quod dignus, Penitus perdis, homo est.

Balratt Timæus in Calibus Medicinæ.

De gonorrhœa simplici.

Vir triginta quinque annorum, temperamento pituitosus, diu alimentis humectantibus usus, jura à longo tempore ex urethra incisio & sine sensu frequenter emitit liquorem aquosum, crudum, viscidum. Toto corpore gracilescit: oculi sunt concavi. Vires ejus in dies magis magisque imminuuntur. Cum impura femina non consuevit.

Afficitur in hoc ægro totum corpus, quod ex gracilitate & ejus debilitate innotevit. Sed præcipue afficiuntur prostatae & aliz partes, quæ feminis generationi interserviant; quod testatur involuntarium illud ac imperceptum liquorem istius aquosi crudi & viscidum effluviū.

Morbus, qui hunc ægrum affligit, est intemperies frigida, ac humida & nimis laxa & rara testium, eorumque prostaticarum & parastaticarum, quæ frequentem liquoris aquosi crudi & viscidum, ac sine sensu ex urethra effluentis excretionem, magnamque totius corporis extenuationem inducens Gonorrhœa simplex appellari solet.

Causa procatartica hujus morbi est continuus alimentorum humectantium usus. Inde verò, adjuvante temperamento ægri pituitoso, aquel in corpore copiose geniti humores, antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Pars verò ad parastatus, parenchyma testium, & prostata delata, hisque partibus intemperiem frigidam ac nimis laxam earumque impatiens, continens hujus morbi, & aquosi crudi & viscidum humoris, per urethram sine sensu copiose effluentis, symptomatumque hinc sequentium, est causa.

Dum enim sanguis à corde in illas partes, intemperie ista laborantes, impellitur, propter ipsarum intemperiem frigidam & humidam refluuntur crudus, ac convertitur in materiam aqueam & viscida, quæ cum molles aut paucos habeat spiritus, & partibus istis, ob laxitatem & raritatem earum nimiam, sine ulla volupatis sensu copiose emittitur. Ex quoniam ille fluxus est perpetuus, quo soccus alimentarius subducitur toti corpori, hinc totius corporis est extenuatio, oculorum excavatio, viriumque quotidie sese augens debilitatio.

Affectus hic, quia diu duravit, & est in partibus genitalibus interioribus & à ventriculo remotis, ad quas via medicamentorum difficilis deferri potest, satis difficilis est cetero Curatio.

Quæ in causæ procatartice, antecedentis, & continentiis ablatione, & intemperiei correctione, consistit.

Primo itaque ad causæ antecedentis, nempe pituitosorum humorum evacuationem, præscribitur hoc purgans.

℞. El. diacarthol. ʒss. turbit. pulv. ʒi. Rhabarb. ʒss. cinamom. gr. iv. Dissolve in aq. card. benedict. ʒiij. ʒ. aq. fœnicul. ʒi. Misce F. Haustus aliquoties repetendus.

Interim oratur hoc decocto ad intemperie alterationem.

℞. Fol. menth. absinthii rom. an. m. j. Sem. agni casti, rutæ, myrthi, Cupular. gland. sem. rosar. rubr. an. ʒi. F. decoctio in vino rubro gallico ad lib. j. cum sacchar. q. l. Et fiat Apozema, de quo sumat haustus ʒvi. omni mane & vesperti.

Et innungat regio lumborum & pectinæ, inter scrotum & anam, hoc unguento.

℞. Ol. mastichini ʒi. ratacci, menthacel an. ʒij. Sem. agui casti, oricæ, rutæ an. ʒj. Mentha, cario-phyll. an. ʒss. ceræ q. l. Pulverisatis pulverisandis F. Unguentum.

Postea utatur dragma una sequentis pulveris, cum haustu vini tubi, vel cum lacte, cubito in iutus.

℞. Gland. quercû in fueno exsiccatarum ʒvi. Sacch. ros. tabellæ ʒr. mastiches, thuris an. ʒj. Sem. coriand. ʒss. fuccini ʒj. Viticis, fol. menth. an. ʒj. Oculor. cancri ʒj. F. Pulvis subtilissimus.

Si hæc & similia parum juvent, poterit per cauterium potentiale fonticulus excitari in utraque tibia, paulo infra popliteum, in paribus internis, ad humores piruiculos, cum materia feminis ad genita. lia partes fluentes, easque nimis laxantes, aliò deducendum.

In dieta alimenta sint exsiccantia & calefacientia, & frequent oriaæ usus. *Henric. Regius apud Theodor. Craanen Medicationum lib. I.*

De Gonorrhœa virulenta, & Vlcere præputii meatuque urinarii.

Juvenis 30. annorum, jam à quatuordecim diebus paritur fluxum materiz cuspidam purulentæ & fœtidæ, ex meatu ejus urinario perpetuo fete effluens, & indurium ipsius commaculantis. Adur in fine mictionis adeit immensus, præputiumque ipsius extensus est exulceratum. Hæc omnia parcescit coitus, cum femina non satis pudica aliquoties petactus.

Morbus, quo æger hic laborat est intemperies prostratarum, & forsitan etiam vicinarum parium, maligna, contagiosa, actis, & nimis laxa & tara; cum urethæ ulcere & præputii externa, exulceratione conjuncta; quæ perpetuum fete materiz purulentæ & fœtidæ ex urethra effluxum, urinæque, ab ejus excretionem, ardorem producat, vulgo Gonorrhæa virulenta appellari solet.

Morbus hic originem duxit à coitu, cum femina impudica & impura aliquoties insinuat. Inde enim, per contactum partium genitalium, maligna intemperie liboantium, partes genitales hujus ægri, & in his præcipue prostratæ, similem intemperiem pravam contraxerunt, &que humores, ad alituram & feminis generationem ed propensos, in materiam purulentam & fœtidam convertit. Hæc verò prostratas laxantes & acrimoniam suâ villicantes, uterumque cum præputio erodentes & exulcerantes, partemque illas ad excretionem perpetuam stimulant, perpetuum materiz purulentæ & fœtidæ ex urethra profluvium, utrinque magnum, ab ejus excretionem, ardoris, vel potius acrimoniz, sensum producat.

Morbus hic periculosus est: cum lumen venetæ & canaliculæ in meatu urinarii, prodere possit.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Curatio itaque prudenter instituenda: quæ intemperiem percontaria correctione, & ulceram mundatione, consolidatione, consistet.

Primo itaque talibus purgent bolis.

℞. Rhabarbari pulv. ʒj. Terebinthinæ venetæ ʒiij. Cassiæ recens extractæ ʒss. Misce F. Bolus mane à jejunio sumendi cum nebulis, qui subinde reiterari poterunt.

Postea mane, & vesperti circa horam 4. sumat cum lacte trochilorum alkækengi pulv. ʒj. continuando per aliquot dies.

Si malum perseveret, utatur bis in die, de hoc decocto, haustu ʒiij.

℞. Rad. petroselinæ ʒj. albæ ʒj. s. Lignisæ, consolidæ an. ʒij. Bistortæ ʒss. Herb. plantag. alchimillæ an. m. i. Flor. malv. arborescentis p. l. Sem. lini, cydonior. an. ʒij. glandium ʒj. Nucleor. persicot. ʒss. Decoq. in aq. hort. q. l. ad lib. ij. & Coquentur ad usum.

Dum his utitur, in penem primo talis fiat injectio deturgens, syringâ injicienda.

℞. Lulargyr. argent. cerussæ, turiz præpar. an. ʒj. Sacchari candi ʒss. camphoræ ʒss. aluminis ʒj. Aq. rosar. plantag. an. ʒiv. Misce.

Postea ad cicatricem inducendam, tali injectione utendum.

℞. Trochilcor. alb. Rhafis ʒss. Bol. armen. ʒss. Aq. rosar. plantag. an. ʒiv.

Ulteri in glande adhibeantur hoc Unguentum

℞. Cadmiz foliis, sive lapid. calamaris. ʒss. Sulphuris, argenti vivi an. ʒj. Cum terebinthina misceantur in furmam Unguenti, addendo parum æturgiz potli.

Si malum petrinaciûs perseveret, ʒi. vel ʒss. sumat quotidie de hoc pulvere cum lacte.

℞. Rhabarbari opt. myrobalanor. cirr. Mercutii dulcis an. ʒj. F. Pulvis.

℞. Cortall. tubi præp. succini an. ʒss. camphoræ gr. v. Terræ lemniz veræ ʒij. nucis muscatæ ʒj. F. l. att. Palvis subillis.

Vicibus raro, hic instituenda humorum acrimoniam obdurant. Propetia utilis est pistibordeacea cum amygdalis dulcibus & 4. sem. fig. majoribus. Utatur frequenter oryza & lacte. Videntur acris, salsa, acida, & diuretica, idem idem.

Gonorrhæa cum Hyperfarcos.

Juvenis 27. annorum, postquam per aliquot meatus gonorrhæa virulenta, admodum acris & mordaci, ex coitu cum impuro scorto petactio nata, laborasset; ab ea liberatus caput laboratæ magis urine difficultate, ita ut ea aliquando penitus supprimatur, nonnunquam paulatim & gurgitans magno cum urethæ ardore & dolore emittatur, immissa in eam candela ceres liberè non transit, sed in medio meatu urinarii impedimentum invenit, quod tamen paulo fortiore ejus percussione cedit.

Afficitur in hoc ægro media pars meatus urinarii in penem; quod ex urine & candele ceræ impedimento, & magno urine excretionis ardore ac dolore, in eo ibi percepto, patet.

Morbus, quo hic æger laborat, est obstructio meatus urinarii, orta à canalicula in media urethra nata; urisq. justam excretionem impediens; magnamque dysuriam inferens.

Hæc cum à gonorrhæa virulenta, ex impura Venere contracta, & canaliculæ in urethra pravis producente, sit profecta, græc. Hyperfarcosis Urethæ Venetæ, & latine Canalicula in meatu urinarii, à causâ proxima & parte affecta, appellari solet.

Ce 2

Causâ

Causa procatartica huius morbi est coitus, cum impuro scorto ab hoc Juvene aliquando peractis; quo ejus partes genitales per contrahum pravam intemperiem contraxerunt, indeque (incus seminalis & alimentarius in his corruptus antea) huic morbo præbuit causam. Pars verb ejus ad proflatas delata, ibique in liquorem virulentum acrem & mordacem conversa, antehac suo profluvio gonorrhœam virulentam aliquot menses durantem, & postea actimoniâ suâ urethram erodens, primò ibi ulcus, & deinde poros ibidem vicinas, & nimis laxas, carnem nimis laxam & copiosam live hyperfascosin, meatum urinam obstruentem, in urethra genuit; eaque ibi ita genita proxima & continens hujus obstructions Urethra, symptomatumque, inde sequentium, nempe urinae modo suppressæ, modo guttatim cum magno dolore & ardore effluens, est causa.

Morbis hic periculosissimus est, difficillimæque curationis; propterea quod sit in loco valde angusto, acutissimoque sensu prædito; ad quem remedia difficillime applicari, & applicata ægerime ferri possunt; atque ideo sæpe per totam vitam durare solet. Sæpe etiam, urinam penitus sufflaminando, mortem inducit. Non tamen de sanatione desperandum cenſeo; quia hoc malum est recens, caruncula est mollis, non callosa, sed pressio fortiori candela immissa cedens.

Curatio itaque diligentissima hic est adhibenda. Eaque primò in caruncula excipione & consumptione, & deinde in ulcers, post carunculam ablutam reliqui, exiccatione & cicatrizatione consistit.

Quæ ut recte peragantur primò æger noster blando hoc medicamento purgetur.

℞. Electuarii lenitivi, Cassiæ recent. extractæ an. ʒss. Dissolve in f. q. aq. hordei, & f. Haustus brevis.

Postidè venæsectio instituat ad uncias sex.

His peractis, adhibetur caruncula in meatu urinario cannula lineæ, intus cetera albâ & foris sequenti erodente linimento oblita, transversum digitorum longa, & iusta cavitatis latitudinem prædicta, longoque hinc appendente transfixa Medicamentum illud tale erit ex.gr.

℞. Mellis in cineres nlli, Tuthiæ præp. Butyri recent. in aq. plantag. loti, Terriblinth. similiter lotæ. Cereæ flavæ. an. ʒß. Aluminis ulsi ʒß. Misce f. Linimentum.

Hoc crebriâ experientiâ teste, carunculas meatus urinarii, abique dolore, & sanatum parvum exoriatione, consumit.

Quidam hoc experimentum summis laudibus extollunt.

℞. Pulv. argenti viv. Merc. præcipit. Viridii ætis, Anisimoli crudi an. ʒij. Cereæ albæ ʒj Misce f. a. In mortario plumbeo ad formam unguentii.

Cannula igitur, cujus jam meminî, nbi uno ex his medicamentis foris fuerit oblita, stylo, extra fistulam argenteam ad digitum transversum longitudinem prominenti, adaperius, atque unâ cum argentea fistula & stylo inserto, in urinariam canalem immittatur, donec occurrat caruncula; & cum iam est in loco canniculæ, primò n stylos & deinde argentea fistula retrahatur, quo fiet ut cannula, ex linco cetera indurata parata & immissa, relinquatur in meatu urinario, ut per eam urina exeat, eaque simul præhibeat, ne medicamentum, carunculae admodum, ab utraque elui possit.

Cum volumus renovare medicamentum post u. vel alterum diem, rum ope affixi & propenduntis huius cannula extrahenda est, aliaque modo jam explicata adhibenda.

Vel castoreo carunculae infusui potest sequente unguento, quo castoreus candela cetera innungitur, eaque ad partem affectam per urethram immittitur, ibique noctu diuque relinquatur; & cum mendi est prorsus, extrahatur, & postea rursus adhibetur.

℞. Præcipitati ʒij. unguenti de cerussa ʒi. Misce. quibus pro magnitudine affectus aliquid olei virioli addi potest.

Consummâ catunculâ, quod ea facili & libera urinae excretionem deprehendit, ulcus citè exiccandum, & cicatrice obducendum tali medicamentum.

℞. Butyri recentis ʒij. cerussæ lotæ in aq. ros. ʒij. Camphoræ ʒj. cereæ parum f. Unguentum, quod candela cetera immissa loco affecto adhibetur.

Vel ℞. Aq. sabulæ lib. ʒ. Nucum cupressi. Gal. l. Coit. mali granati an. ʒi. Alumin. rothæ ʒß. Bulliant omnia.

Ex hoc decocto tepido fiant injektionen in meum urinarium syringâ, donec ulcera sanentur.

Victus ratio hic cascet, & humorum secretionem etiam obstruat, propterea convenit præfana hardesca cum amygdalis dulcibus & q. sem. sup. major. Uratur quoque frequenter etiam & lacte. Vinum acra, Liliâ, & acida, atque etiam diuretica. *idem ibidem.*

Observationes.

Gonorrhœa Virulenta.

Nobilis mulier à marito inita, qui cum proflubulo impuro concubuerat, inquitur: hinc gonorrhœa virulenta male fluxum multibrem repensata. Quæ excremuntur, cum virore pallent. Jam fluxus ille per annos perseveraverat, illam à variis morbis vindicans Tamen propter contagium malfæque sanguinis labem valetudinaria est; quoniam credo, non satis largiter virulentum ille humor decurrit. Mensis plane subfistunt. Atque hinc illinc metus ingruit quidam. Num si supprimitur illud fluxus & virulentum, perniciem consequetur? sin fluxus, tamen suo casu commoditatem aff. ut, si tamen in maiorem iam laborantem concideret? Quod plerisque usui venit; siquidem non potest non afficere partes per quas traducitur. Invenire vite quo præsentem tempore omnia reputantur, Lamentum in renibus gravitatem sensit. D. dicitur appetentia languet: monia non obit sua: Dolores in ventre excitantur toto. Quo medicamento exhordeo & syropo laxativo sæpe aduta fuerat, eodem occurrunt: malum recedebat. Tandem diu nocteque ita vexatur, ut ferendo non sit. Pulvis largidus & sepultus: facultatum omnium fere concessio, ac maxime vitalis. Surfum deorsum fertur materia. Quæritur quid sit opus. Sensim atque sensim crescent dolores purgentes & ferientes, divellentque membranas. Dolor turgens est, & qualem Galeus describit lib. 3. de locis aff. l. c. in partibus quibusdam tenditur dolor veluti à remora alia parte velut radice derivatus; quod notandum est, falsè credunt colicum esse dolorem; proptereaque ut fere sit, liberales

liberales nos esse debere in usu rerum calidarum : imo tali usu egrescitur magis ; in eam sententiam veniunt est , ut crediderimus in provocando illo fluore incumbendum esse, alioquin frustra operam daretur. Atque ita provisum est. Primum in clistere injectis.

℞. Malva bifidal. artemisæ, an. m. j. sem. poroniz cubensis rubenis ʒj. agripalmæ p. i. rad. perfol. asparagi, an. ʒj. sem. lini, fenogr. an. ʒ. ʒ. si fiat decoct. in colat. dissol. terebinth. ʒij. sacchar. rub. ʒj. olei liliorum. Eodem die excitatus vomitus materiei vituleatæ & ejus quæ olim per inferiora ferebantur : Non à ventriculo erat, sed ab jejunio & regione Renum, ut conjunctis deprehendebatur. Quæstio an clister sitendus an jervandus. Non placuit jervare, ne materiam quæ per inferiora moveri debet, aliorum tolleremus. Vigentibus doloribus coacti sumus adhibere balneum, uti succo amygdalar. dulc. cum vino Hippocrati. Cellabant statim dolores : & balneo egrescitur redditus. Secta vena in malleolo; adhuc pessi ex hiera diacolocynth. Pulvere hieræ & galyops, addita styrac. liquida : & innoxii sunt intestino. Deinde pilulæ de hiera cum agrico & theo confusum est. Tandem repetiti clysteres pilulâ similes. Et præscriptus bolus sequens post balnea.

℞. Terebinth. venetzæ ʒij. thei ʒi. cum syrup. capill. ven. capiat. Secta vena in brachio oburgentem in lumbis dolorem. Applicata cutibus cucurbitula. Tandem ad decoctum fæsepæpillæ ventum est ad proliciendos sudores. Provocati sunt atque ita admodum fuerunt, utcumque convalescit. *Balnearia Consilii, medicæ lib. 1.*

Mercator quidam una muliere non contentus, quantum licuit libidinosè vixit : & cum prostitulis vetustis, inquinatus est, unde & gonorrhœa & isentula caeothica in pudendo manaverunt : Tamen sibi peccavens advocato Medicorum consilio, in suum non incidit. Sed cum rem levicillam putaret, semine illius vituleatæ gonorrhœæ interperissivus lupprete rediit, sensu dolore æcerdum in spina, & lumborum regione ino in pene ulciscula repullulante, statimque evanescunt difficultatem spirandi nonnullam habet æquer est, maceratis in dies, dolet totam spinam, & lumbos. Intro consilio dictum est id totum esse à reliquis istius vituleatæ quæ sensum vires acquirit : immo & rudimentum erit illius affectionis quam Hippocrates in libris de morbis habet ex dorso vocavit. Itaque tamen ad oppugnandam vim morbi valet usus guaiaci, tamen de macie erat verendum neque credidit fatidius corpus reficere, & interea non esse alienum ut interponeretur usus hydropicorum temperatiorum ut non proliciantur sudores, sed ut postius sensum humores descenderent, & maligna qualitas emenderetur. Consilii hæc sunt capita.

Hic hebdomade injiciunt clyster emollientes & detergentes. Primo quoque tempore uratur bolo cum rheubarbaro. Aperiantur basilica dextri brachii ad tria vascula.

Uratur semel paucâ terebinth. cum syrupo de althæa. Paucæ autem fit quantitas, ne hinc alvus solvatur, sed eandem ut vala. monda fiant.

Linatur frequenter spina oleo mastichæ, cyonio, rosæo cum aceto. Deinde uratur lacte asino per dies viginti continuos.

In partibus decocto fæsepæpillæ diluto satis, idque cum pilulis. Tandem cum emulsiis fuerit, ad decoctum chinæ, & fæsepæpillæ minime dilutum adducetur, si semen reall longius disseminetur. Et cum

Bist. Chirurg. Tom. II.

perseveraret dolor, & calor summus in testibus, huc quod sequitur fuit institutum.

℞. Sap. lib. ʒ. mucaginis decoctionis malvæ bifidal. violarum, seminis pyllii, melonum : adde opii ʒij. & applicetur instar cataplasmatidis regioni renum. *Item ibidem.*

Mulier quædam cùm Gonorrhœâ laboraret, hoc uno decocto, à profluviis feminis, & urine ardore post universalia remedia adhibito, ex incontinenti per me curata fuit.

℞. Lignit. ʒvj. sem. myrsillor. coriandr. præpar. plaoag. agn. cast. an. ʒj. sem. papav. alb. ʒij. sem. hiofeyam. ʒij. hood. mund. M. j. acaciæ, juncac. an. ʒi. semina contrand. crasso modo & bulliant omnia in aq. chalybeata pro ʒij. colat. adde troch. aliskeng. ʒj. M. Sumbat cyathum vel in ele, neque aliis medicamentis opus habuit.

Benedictus Faventinus, Præceptor meus hoc in simili casu magno cum succellu & experientia uratur. Si & Gonorrhœa adesset dolor & ardor, dabat tepide septem diebus lactis ovilli ʒij. aq. plantag. vel succi cju ʒj. boli. armen. ʒj. *M. Petrus Forghar. observ. 15. lib. 26. De Penis Punctis.*

D. Bontius in Gonorrhœa, ut J. Heurnius inier secerocia remedia sua, annotavit, usus fuit his Pilulis.

℞. Sem. lactuc. papav. an. ʒij. rad. nymphaeæ ʒij. ros. rub. ʒj. corall. rub. ʒj. camphoræ ʒb. sem. agn. cast. ʒj. cum mucaginis tragacanth. F. massa ex ʒj. fiant Pilulæ vii. In Notis ad cap. 13. lib. 6. *Pathologia Joann. Ferneti.*

Vit quidam Gonorrhœâ antiquâ laborans, à me consilium petiit : cui primùm præscripti purgationem ex Mercenii dulcis ʒj. cum pil. coch. min. eadem quantitate, & sequenti die vent. sectionem. Deinde Bolum ex rhab. pulv. ʒi. cum terebinth. ʒij. quem continuavit per quinque dies, eoque purgabat : ter aut quater in die : iterum simplicem Pilul. Mercuriales, & prædictum bolum per alios quinque dies : ac tandem aquam sequentem per octo dies.

℞. Menth. fac. ʒij. sem. lactuc. rosæ agn. cast. an. ʒij. ʒij. iteos ʒ. ʒij. dictam. ceticæ ʒc. sacch. albid. ʒij. omnia pulverenter addendo terebinth. venet. ʒv. vini albi generosi ʒxxx. F. destillatio in balneo M. capiat cochlearia duo mane duabus horis ante cibum. His remediis à constricta illo affecta liberatus est. *Lazarus Riverius obs. 25. cent. 1.*

Juris quidam utriusque Doctor Gonorrhœâ laborans à me consilium petiit : illi bolum præscripti ex rheo & terebinth. per quinque dies sumendum : & cùm nondum fluxus cessaret, postea usus est aquâ ad Gonorrhœam Queteeran. in illius Pharmacopœia descripta : prima exhibitione omnino sublatus est fluxus, & ideo per tres aut quatuor dies tantum illius usum continuavit : neq. amplius rediit affectus. *Lazarus Riverius obs. 36. cent. 1.*

Vit quadraginta annorum ex impuro concubitu Gonorrhœam contraxit, cui ab initio præscripti bolus ex cassiæ ʒj. thei pulv. & crystall. ratar. an. ʒj. Sequenti die volcham sanguinem mittere ex pede, quod ipse æger tenuit. Emulsionem præscriptæ tum ad tres aut quatuor dies, quibus urinx acrimoniam temperata est : fluxu eodem modo perseverante. Postmodum pîsina laxante usus est. per septem dies continuos, in hunc modum præscripta.

℞. Tamarind. ʒij. aq. fontis ʒlv. coq. ad ʒij. in colat. infund. frigide per noctem sem. mund. sem. coriandr. liquirit. & ros. rub. an. ʒj. capiat cyathum unum mane horâ unâ ante passum. Hoc remedio fluxus valde imminutus est, ad quem omnino delendum bolus sequentis præscripti.

Et 3

℞. Terebinthi

℞ Terebinth. venet. ʒiij. thei pulv. ʒi. F. bolus quem capiat mane per quinque dies deinde aquâ fortius descriptâ usus est per septem dies. Hoc modo Gonorrhœa curata est: quia tamen caigua quædam humiditas in earumque glandis frequenter apparebat, ut io sine huius morbi plerumque fieri consuevit, ad eam potius cohibendam & exsiccandam sequentes pilulæ præscriptæ sunt.

Gommi arabic. tragacanth. carab. mommij, bol. armen. an. ʒi. pulverizatur, & cum fyr. de rosâ sic. F. pilul. massa, de qua capiat ʒj. singulis diebus mane, duobus horis ante pastum per octo vel novem dies, & ita fluas omnino cohibitus est. *Lazarus Rivinus. observ. 74. cent. 4.*

Conservâ fructus brusci à ʒij. ad ʒß. per aliquot dies exhibetâ Gonorrhœas multas curavi. Idem præstat aqua ejusdem fructus distillat. *Samuel Formis observ. 47.*

In Gonorrhœa commendatur pulvis sequens. ℞. Fol. menth. mommiz, corall. rub. agn. casti, carabæ, an. ʒi. M. F. Pulvis: de quo accipiat æger aliquod mane jejuno ventriculo cum ovo tremulo. Vehementius sistit profluvium seminis, pulveris ossia Sept. ʒj. cum conservâ ros. ʒij. bis vel ter sumptis. Excellentissimam est Magisterium ejusdem cum conserv. ros. antiqua à gr. vi. ad ʒß. sumptum. Tinctura etiam corall. mirabiliter prodest.

Io Gonorrhœa virulenta interdum inflammantur testes cum maximo tumore: in eo casu præsentissimum remedium est Cataplasma ea foliis rutæ & ebulli aceto coctum & applicatum *J. Hermannus. Practic. chymicæ. pag. 165.*

Juvenis viginti quatuor annorum, mirus formæ spectator ac verus Venetia alumnus, post coitum cum imputa meretrici peractum pariebatu conrinuum ferme materiz albicantis ac viscidæ ea urethra profluvium, non tantum abique voluptate, sed præterea etiam cum dolore scindente, qui quoque aderat, cum æger reddebat urinam.

Fermentum nempe acido-corrosivum in partibus genitalibus hujus scorti delinens per penem hujus juvenis in poros proflatum ac vehicularum seminalium à coitu plus solito apertis, sicque accedine sua & semen & humores nutritios alluentes infecit ac ulcercula excitavit in illis partibus: hinc itaque vellicari & continua fere contractio proflatarum ac vehicularum seminalium semine ac humores nutritios corruptos modo prædicto assidue prope modum cum dolore fundentium.

Malum hoc gonorrhœa plerumque nuncupatur, etque facis periculosum, quandoquidem sæpius degenerat in lucem veneream, si dilatarur ejusdem medela, tunc etiam fermentum acido-corrosivum absorbitur & cum massa permiscetur sanguinea.

Nulla itaque mora interjecta ad curam propere vi, ac ad acidum corrosivum temperandum & evacuandum, ut & ad ulcusculorum sanationem sequentia præscripsi.

℞. Extr. cathol. Gr. xarv. Mercur. doli. Gr. vi. Sal. pruo. antimoniæ. Gr. v. M. F. pil. N°. vii. Has pilulas tempore marutuo assumat ptiens, ac sequentibus quinque diebus semel quotidie jejunos devoravit bolum hunc.

℞. Tereb. ven. ʒij. Rhab. ʒj. M. S. Post iterum mox præscripta purgatione & bolis usus est ut ante, atque hoc pacto pulissimam sanitatem adeptus est æger.

Terebinthina à quibusdam tam diu coquitur, donec pilulæ inde formari queant, sed male, quoniam coctio oleum spirituosum in aëre propellit, cum ramen in eodem præcipua theretiothine virtus consistere repetitur.

In hoc malo iterum acidum criminor, sed mela fortasse alicui videbatur mea opinio, acidum scilicet in animali vivente adeo noialum existere ac inimicum sanitati, cum interim acetum carnem maciatam conservet integram per longum temporis intervallum, sed ut & huoc amoveam scrupulum, respondeo rem longe aliter se habere in vivo animali ac in mortuo.

In vivo animali ad vitæ ac sanitatis conservationem appime necessaria est sanguinis ac humorum libera per vasa tubulofque varia patulos circulario, quæ tamen haud parum impeditur ab aceto aliisque acidis sanguinem ac humores coagulantibus. Io mortuo autem animali ad massæ carnis conservationem prædicta non requiritur circulario, sed tantummodo opus est, ut præcaveatur, ne valde prævæ carnis particule ab aëre nimium agitentur, fermententur, ac è statione propellantur; acetum autem particulis suis crassæ ac gravibus ad hunc effectum producendum idoneum est.

Quod autem cito maneant incorrupta, si moris particularum valde parvarum, aliis futuris, hac aut illa de causa sistatur vel hinc manifestum evadit, quod caro maciata beumali tempore per multos dies integra servetur, cum tamen eadem vivo tempore chissime corruptur ab aëre tum temporis, in motu valde celeri confuturo.

Quod verò acetum confert particulis, crassæ ac gravibus, liquer ex destillatione, quæ docet, spiritum vini citius ac prius in alembicum elevati quam acetum.

Præterea dici posset, quod carnis massæ sal volatile cum aceto coaguletur, ac ita immotum conservetur & impediatur, ne fermentetur cum aëre, figuram suam muret, ac avolet in aëre, sicut cetminus sal volatile cornu cervi aut aliud quodvis cum spiritu acido coagularum non avolet, ut aliis facere consuevit.

Dum ago hic loci de gonorrhœa, in memoriam mihi redit haud illepidum alicujus medici responsum; interrogabatur hic aliquando inter pocula, quid foret in causa, quod homines tam facile suppellicium præterentur in pene, ubi cum hac aut illa meretrici concubuerant, dum interim canes masculi cum canibus alterius sexus sonueris coeunt impune, ad quod medicus subridens reposuit, hoc contingere, quia canes, hac in re hominibus longe prudentiores, statim post coitum peractum cuttellos suos lingendo bene purgare solent à sordibus, quæ fortè adhærescunt; ea quo responso interrogator illud adhuc didicit, ut postea mox à coitu peracto membris vitile propria tempore abluat urinâ. *Isham. May in Fraxi Chirurg. rationali.*

Gonorrhœa periodica.

In sexum sequiorem num cadat seminis profluvium jam non disputabimus: Patare utrinque ratione: Silentio autem præterite minime deest laborasse apud nos juvenem Gonorrhœa periodica: Reditum hujus hopitris nunquam noo nuntiabant dolorica labiorum disruptio, nec non præterea, universi corporis

corporis riggr: Prostratis inde notabiliter viribus ad nos accessit petitiu Medicinam, qua faciliè impetrata, brevi convaluit: Præstanteum auxilium præstiterit (al corallorem ac Magisterium Sarani cum aceto nitato paratum. *Joh. Peri Prucklii.*

In Gonorrhœa affecto balano, insectulum limaciforme fuit inventum. *Petrus Berellus observ. 53.*

Gonorrhœa virulenta cum excrescentiis.

Juvenis quidam temperie beliosus, opulentus & falax, ab impuro & impudico prosthulo numisma venerem pro aureo permutaverat, ut de feminis prosluio doloifico eoque flavo querelas haberet, monstrando infimal excrescentias verrucosas ad fibulam, unicam principio quidem, postquam verò eandem acro aperuisset, prolifetam, nam quousq; sanguis infectus fluxerat, eousq; novatum notaverat exitum, ut etiam numerum tandem sexagenarium transcendere. Huic in antecessum nodulum ex lignis, rhabarbaro &c. cum vino ordinavi, deinde Pilul. de Terebinthina cum pauco mercurio dulci præscriptis, tandemque decoct. nigrum Myrsichet composui, exterius applicandum, qui nunc aliquot liberorum patet vivit sanus *D. Christophorus Seligri.*

Anatomica Inspectiones.

Gonorrhœa disturnâ laborantis Glandosum corpus Semine repletum inventum est, cum Testibus eodem referis.

In involuntariæ feminis fluxu laborante, quem Patavii disciculus, corpus Glandosum cum divideretur, non minus quam testes ipsos semine opplerum conspeximus: Et si verum fatendum est, inter disciscandum nulla penis corporis, parte tanta feminis vis ulquam atque in hoc glandoso corpore juvenis, quantumvis id à istum substantia, mollitie, æquabilitate differat. *Vesalius de Hum. corp. Fabrica lib. 5. cap. 13.*

Gonorrhœa affecti cadaver vasa semen deferentia in penem maxime dilatata exhibuit.

Vasis semen in penem deferentis infectio conspexit quodammodo fugi, Et coitus, aut aliâ excretionis feminis tantum tempore aperitur; Quod Patavii quidam disciscus facile edocuit, qui ante suspensum involuntariæ feminis fluxu laborans, hos meatus omnes appetos laxosque habuit: eos postillam qui ex testibus in Deferens semen vasis revolutionis gyroso persequunt, & quibus dextrum & sinistram deferentia semen vasa in vesicæ cervicem terminantur. *Vesalius de humani Corp. fabrica lib. 5. organ. cap. 13.*

Gonorrhœa excitata ab ulcèribus orificii vesicæ vicinarumque partium.

Mercatore febre exigua laborante, ut febrè decumbendi necessitas non esset, & fluere Gonorrhœa, ut propterea scilio vena differretur; tertio post die exacerbatu est dolor, & continua febris tenuis, &c. Nonò mortu.

Qui sectioni cadaveris interfuit Chirurgus, retulit reperta esse ulcera in orificio vesicæ & vicinis partibus, Et tamen de his non querebatur. *Ballerius Epid. lib. 2. pag. 160.*

Glandosum corpus [Prostrate,] Gonorrhœa virulenta sedes est.

Gonorrhœa virulenta proterahuntur interdum ad decem annos, quale exemplum Patavii vidimus in viro Bergomense, cetera sano, sed vix ossibus hærente; unde in Gonorrhœa hujusmodi non excernis semen, sed pus ulceti, ex prostratis verò videtur proximum: Certe in omnibus Gonorrhœa laborantibus in Nosodochio disciscis, ulcera reperimus, seu callum, ulceris præteriti: Impossibile alioque foret tanto tempore effluvis feminis vita superstare pestificis: Severinus Neapoli in disciscis invenit inflammationem & abscessum in patavitis: *Ballerius cent. 2. Observ. 36.*

Gonorrhœa muliebris Glandoso corpore affecto excitatur.

Fluor muliebris, si continuus, & Gonorrhœa, ita inter se conveniunt, ut nisi mentem adhibeat Medicus præ similitudine faciliè in errorem abeat, quinquam à diversis partibus procedant & per destinata loca excreantur, quidam Fluor fidem quibus venustas fluunt, ductibus efficiunt, quod vel ideo judicamus, quia menstruum cruorem in sublimi de immutari cerimus, ut qui primò veluti à vitulina, referente Hippocrate, prodibat, nunc minus floridus, postea pallidus ac sensim albus appareat, Fluoremque muliebrem, Album dictum efficit: Gonorrhœam verò ex Glandoso corpore provenire, & per lacunas circum, & in meatus urinarii exitu collocatas erumpere, Cadaveris ejusdam mulieris hoc vitio infecti palam fecit. Nam utero ejusque vagina innoxii corpus glandosum sive Prostatis, urethra circumpositas solum male affectas offendimus.

Dicit aliqui, Quomodo illa Medicus internoscere valebit, si mulier affecta se callum & ab omni vielli consortio alienam profiteatur; utcumque judicare poterit si ad prolabantem materiam, ægræque querelas diligenter attendat; materia namque Fluoris alteram in Gonorrhœa manantem longe quantitate superat: Querelas si consideret, Fluore scindas lombati dolore cruciari, aliâ verò Gonorrhœa laborantis de oborta circa pudendas partes acerbitate lamentari audiet: Sin minus his contentus certior esse velit, genitalia inspicat, liquidum moratus urinarii exitum circumstantes partes (in quibus lacunarum exitus terminantur) mucosâ quadam materia obfictis, ac interdum ulceratis reperiet, reliqua vaginæ partibus decenter sese habentibus, cujus contrarium in Fluxu alio fieri solet: Sed hæc vulvæ inspectio non semper necessaria est, eum Medicus hand sit culpandus si medicamenta secundum ægotantis quærimonia præscribat: Si verò illum clindat, nec operam præscripto medicamine successum contomax mulier consequatur, id sibi imputet: *Regn. Graaf. de mulierum organ. cap. 9.*

GRANDO Vid. *Hædolum.*

GRAVIDARUM MORBI, Vid. *Pregnantium morbi.*

Et 4 GURGU.

GVRGVLIIONIS MORBI.

Gurgulio seu Uvula est regio foraminum interiorum narium inter tonsillas situm, stricte iuxta fontem palati limbo posteriore dependens. Conspicitur involacris oris quidem & faucibus communibus, sed paulo crassioribus. Quidam asserunt binis suspensi musculis, interno scilicet & externo pariti, ut antiorum & retrorum moveatur in deglutitione, sive ut humores contenti sic continuè exprimerentur. Alii verò volunt hanc musculorum apparatus rarissimè ornari, & interdum ab involucri procellosis ossis sphenoidis ad ejus latera musculosis dimissi fibris, unde etiam quandoque totum ipsius integumentum carneum appareat. Apertè involucri glandulosa partis reteritur contractio, fibris membranosis ac vasculis variis coherens, quorum vasculorum extremitates inter papillas ex interiori membrana ipsam investiente alligantes, hiant, ac segregando cibi liquidiori cuidam salivali, sicut & alie omnes glandosæ palati & oris partes, inserviunt. Non tamen in hoc totus uvule testiviguitus usus, liquidum etiam inservit impediendo cibi & potus in nates ascensui; præterea, secundum aliquos, modulando aëri à pulmonibus propulso pro voce articulanda non parum facit, ut & respirandum aëris ad pulmones in inspiratione tendentis impetu, ne scilicet in illos liberius intrare suffocationem inducat.

Variis pars hæc tenetur morbis, qui partim ex congestione in ipsa facti, partim ab acrimonia aliunde adveniente enascuntur: Si enim humor salivialis in illa secretus, ac per vasa in faucibus hiantia evacuandus, per ostium suorum obstructionem in propria scaruigine diutius continetur, illicque moras longiores trahit, non tantum partem tumefacit & prolongabit, sed etiam in aëris quid ac corrosivum evehens inflammationes & ulcerationes non parum molestas, procreabit, imò in cancerum abit. Rursus si virus in sanguine nidans, vel ex scorbutica constitutione vel ex venerea lue illic copiosius deplur, sine mora inflammationes & ulcerationes aliis non abimiles, progignit; sed quæ curatæ morbi radice, per se, aut saltem paucis adhibitis, aut particulis acropiciis, evanescunt. Ast quid hæc diutius insistentis quom de Curationibus, Consultationibus, observationibus, varia è variis hac adducenda sele offerant.

Curationes

In uvula exulcerata commode usurpatur hoc remedium, quod in aliis etiam affectibus oris & angini est præstans.

℞. Herb. malv. hort. m. i. lilor. tofar. rubr. princell. veronic. salv. an. m. s. radic. polypod. querc. ʒj. coq. in aq. porulac. ℞. tv. acceti vin. ʒvj. usque ad calum transversii pollicis, postea colentur & colatura leniter exprimitur. Pro uvulæ relaxatæ ac nimis tumentis abscessione singulari deficiet instrumentum Barthol. Hist. 88. Cent. 2. Alias recentiora uvulæ prolapsum, ac relaxationem curat fermentum cum ipis vini humectatum & vertici

impositum, una cum gargarism. & decocto florum ligultri cum sale prunellæ, aut nitro. Item sal deceptatum cum piceo pipere applicari potest uvulæ ita prolapsæ. Loco salis communis optimum est sal. armoniacum subinde uvulæ applicatum, spiritum aluminis commendat alii. Quod si simul uvulæ inflammatio adsit, optimum est decoctum herbæ aut radicis taraxaci, succini suffusus ore exceptus specificum est Rulandi: Vel semen cannabis in posci parum coctum & colatum, pro gargarismate adhibitur, est unum ex optimis remediis. Vel radix tormentill. & uvulariz an. coquantur in cerevitha secunda, & cum modico mellis edulcorata exhibeantur pro gargarismate. Michael Eismullerus Collegii Prædici l. t.

Laxatur sapissime gurgulio, & linguæ superincumbens vocis modulationi incommodat, ut in catarrhis; atque adstringentibus siccauribusque remediis in priusium suum restituitur, præsertim gargarismo ex decocto rosimarini, rosarum ponicærum, plantaginis, uvulariz baccarum myrtæarum cum diantho, vel diamoto; itemque pulvere ex pipere longo, costicibus myrtæalorum, tormentilla, alamine usit. bolo Armena, & similibus. Fermentum capiti adhibetur cum succino, & spir. vini putus, optime conficit ex Frieder. Hoffmann. Suffusus etiam ex masticæ, gummi, anise, balsamo Peruvianò & Toluxano, pulvere nicotianæ, rosimarini, betonicæ. Pipetis contractis quoque prudet ex Botello. De inflammatione uvulæ, vide ubi de Tonsillarum affectibus. Lucas Tozzi Med. & Practica parte 1.

De Uvula Descensu & Reflexione, sic scribit Clariss. Anton. à Nuck, in Experiment. Chirurgia.

Circa Uvulæ Descensum, ab humore crasso & piceo in ejus tubulis stagnante otio trahentem, facilis & frequens occurrit Chirurgia. Restituenda illa adstringentibus, incidentibus, obstructivisve relictibus pulveribus, v. g. Alamine usit. Piperis, Zingiberis, Sale communis & sin quæ Cochlearis beneficio ipsi admovendi, vel Cochleari, Manubris Fibulæ & exiguæ Fuli donato eidem aspergendi; cujus delineationem vide apud Hildanum Cent. 2. Obs. cxi. Fol. 96.

Solus quoque Spiritus Vini per modum gargarizationis adhibitus, ut etiam Spiritus Salis Ammoniaci lineatis carptis relaxatæ Uvulæ aliquoties admotus, presentaneum nonnunquam tolere opem.

Verbo, quicquid piceosum incidere, viscidum attenuare, obstructiones solvere, humoribusque per hanc partem ciculantibus calcar addere aptum nam est, illud hoc in affectu utramque paginam absolvit.

Verum aliquando tam pertinaces sicut obstructiones, ut Aquæ Sublimatæ Uvula sic tangenda.

Queritur, An capillarum verticalium retractio in Uvula relaxata conducatur? Resp. Aliquando juvenem afficit, dum major eo tempore quo retractio peragitur spirituum copia Uvulam irradiat, unde expeditis obstructivis Uvula relaxata restituitur.

Ubi verò prædictis non restituitur, sed relaxata manens loquelam & deglutitionem impedit, aut Scittho malive motis vlcere, vel Gangrenâ afficitur, sunt qui impositio supradictæ Cochleari Anser Nanno, sed ignitio (quarvisimines convenienter) eandem adstant,

Præstabit

Præstat in ejusmodi casibus eam exsistere, quod *volvisse* & *Furber*, beneficio hanc difficile peragitur. Quod si patiens Operationem hanc, ob sanguinis omninoquam subsequens profluvium, ut cruciatum nimis abhorreat, extripatio Annulo cum Manubrio Cannularo & Filo adaptato facile paratur. Instrumenti delineationem vide apud *Hildanum*, nec non *Scutellum* in *Armentario*, cuius ope nuper Operationem hanc cum successu institutum vidimus.

Si cui volupe fuerit Encheiresin hanc minui cum apparatu absolvere, *Infermento pro Uvula abscondenda* à Rustico quodam Norwægo invento, à *Th. Bartholins* Cent. 1. observ. *Anatom. Hist.* 33. delineato & descripto, uti possit.

Quo instrumentis aliorum quoque in corpore Tumorem, Tuberculum, Verrucam &c. extripatio, singulari celebritate, infans pariente, nihilque mali cogitante, peragitur.

Si vero testatam Uvulâ immoedica sanguinis fluxus eidem superveniat, hand inconsultum erit depressâ linguâ, admodum *Pariali Cyprino* (in linguae vinculo propolito) parietem sanguinem suadentem tangere.

Possit tamen aliquando contingere, ut sanguinis impetuosior fluxus eo non sisteretur, quo in casu ad *Cavum allata* confugendum parvius.

Chirurgus itaque *sistulam Annulo* multum ori intransmittat, manu sinistra tenens, Uvulamque situale foramine excipiat: dein Stylo ferreo igitur fistulam immisso Uvulam tangat & cauterizet, probè cavendo, ne vicinæ partes ledantur.

Gargasilis denique convenientibus, vel melle rosaceo admotis, curatio absolvitur.

Consultationes.

Inflammatio Tonsillarum & gurgulionis Laxatio.

Serenissimæ Reginæ Suediæ Consultatus, Sedini Pometanotum in solenni quodam convivio præter intentionem, vitæ alioquin temperatissimi meracioris vini potu inebriatus, postero die molestiam quandam & dolorem circa radicem lingue sentiebat cum ardore, sui, & quadam deglutionis & respirationis difficultate.

Tonsillas, aut columellam, vel utrumque aliquid præternaturale pari suspicabat, ac proinde depressâ linguâ fauces inspexit, ubi primo intuitu in ygdala, uti vocant, sive tonsillas ex utroque latere tumidas, rubentes & inflammatas, mox & gurgulionem relaxatam & propendentem deprehendit.

Occasione malo, potcul dubio deest largior vini generosioris portio, quatenus sanguis ab ea incallescens & tenuior redditus, ad partes has sua natura molles & laxas desiciens, tumorem ac inflammationem excitavit.

Confessio hanc apertâ basilicâ dextrâ brachii sanguinem detraxit, mox ad fervorem lingulis restringendum Julapium refrigerans præscripsit.

℞. Aq. fragor. acetosill. endiv. an. ʒvj. sob. ribum syr. berb. rubi idæi an. ʒij. Inc. cirri ʒij. M. Ex topiciis gargasilum, vel potius colluvionem oris ex repellentibus & astrigentibus exhibui.

℞. Fol. plantag. prunell. an. m. l. flor. ros. mbr. m. R. cortic. granator. ʒij. coque ex ℥ q. aq. simplic. pro R. Colatur. adde sob. ribum ʒij. diamoroni ʒj. syr. de agris ʒij. m. Matura hæc resupinato

capite in ore concutatur tepide; inflammata enim nec frigida ferunt nec calorem, & valida gargulatione plus materię ad locum affectum attrahitur.

Columellam elongatam sequenti pulvisculo undique conspersi, beneficio instrumenti à *Guillmo Fabricio* Cent. 2. obs. 21. depicti.

℞. Flur. icablos. balsamior. ros. rub. cortic. granat. an. ʒß. rad. bistort. roment. gallat. immatur. an. ʒij. alomii. usli ʒij. M. F. pulvis.

Sedâ passim inflammatione, repellentibus moderate discutientia admiscui, extra etiam guttat oleo amygdalarum dulcium & liliorum alborum inunxi.

Tandem corpus biliosis humoribus repletum extracto cassiæ & pulvere inco chologogo purgavi, sicque vitum integritum, meique amicitium Dei grâtiâ, bonæ valetudini restitui. *Baldasar Timæi in Cassio Medicinæ.*

Uvula Relaxatio.

Juvenis virginis sex annorum, plethoricus, postquam aliquot dies liberaliori vini & cerviciæ potu indulgisset, incidit in magnum dolorem faucium, quo non nisi cum dolore & difficultate quicquam deglutire possit. In faucibus etiam aliquid, instat boli deglutienti tumens ab ipso perpetuo percipitur in ore ejus cum lingue depressione apertâ, apparet uvula valde tumida & laxata, vicinæque partes valde tumentes tubentes.

Afficiunt in hoc ægro uvula, ac præterea fauces, quod ex dolore, deglutienti difficultate, & tumore, instat boli fauces prementis, in illis partibus percreto item, ex ipsi fauces ejus infipientium autupia, est manifestum.

Morbus, qui ipsum affligit, est faucium, tumor & præcipue uvulæ, à sanguine calidior & puerilis ortus; qui partes illas vicinæque sua copâ distendens, uvulamque nimium relaxans, atque hic dolorem & deglutienti perpetuum difficultatem, suffocationisque lubidine invalere metum, inducens, uvulæ relaxatio, à præcipuo hujus tumoris symptomate, reliqua alia symptomata potissimum producente, vulgo appellati solet.

Procatartica hujus morbi causa est potus illi generosior & liberalior, cui hic juvenis per dies aliquot plus justo indulgit; inde enim multum humores sanguinei & pituitosi, in ejus corpore geniti, antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Pars verò eorum in corpore inalecens, & poros vasorum circa fauces, uvulæ, vicinæque partes plus insto, ex præcedenti portione illas partes præceteris magis laxante, apertis inveniens, & per eos se in partes illas copiose effundens, continentem hujus morbi, ejusque symptomatum, continuit causam.

Cum enim per illum humorum sanguineorum & pituitosorum, in partes illas copiose illabentium, ibique vehementius incallescendum, instum, tumor in faucibus vicinæque partibus & uvulâ nascitur, gula & gurru ira accenditur, ut ea, non nisi magna vi, magnum dolorem necessariâ inferre, in deglutendo apertiri queant. Uvula verò hinc justo longior & laxior evadens, & fauces sua nimia mole replens facit in illis perpetuum, namque boli ibi hærentis, sensum. Interdum verò illa plus solito intumescens, & humores quosdam in asperam

arteriam per rimas epiglottidis copiosius immittens, tandem subinde inducit respirandi difficultatem, ut æger suffocationem mereat. Hæc autem omnia in ore tam sunt evidentiæ, ut insipientium oculis certum possint.

Morbus hic, cum deglutitionem & respirationem tollere, & uvulæ corruptelam inducere possit, satis est periculosus.

Diligent itaque Curatione erit impugnandus. Eaque in causæ antecedentes, & continentes, item in tumoris & intemperiei, per contraria ablatione consistit.

E vena igitur in brachio dextro aperta mox educatur sanguis ad uncias decem, idque etiam postea repeti potest.

Paulo post talis injiciatur clyster.

℞. Decoct. emollientis lib. 1. Elect. diapruni 3vj. Ol. violar. lilior. an. 3j. salis 3j. Misce, F. Clyster.

Cucurbitulæ etiam scapulis & humeris sunt adhibendæ. Et uratur tali gargasismo;

℞. Hordei mundati p. 1. Fol. violariæ, portulacæ, plantag. an. m. j. myrti m. 8. Cort. malor. granat. ʒiʒ. Flor. ros. rubr. malvæ arbor. an. m. 6. Sem. cydon. malvæ an. 3j. Anticurar. judæ 3j. Decoq. in aq. com. ad lib. ʒss. in colatura distolve diamori, dianoci, mell. ros. an. ʒss. Misce pro gargasismo, quo sæpius in die gargasiet.

Et sæpe lambat de hoc linctu.

℞. Diamori, dianoci, Sit. violacei an. ʒss. Misce.

In ingenti dolore, interdum gargasificandum cum lacte recenti.

Postridie purgetur tali haustu, si tum deglutire possit; nam alioqui repetendus esset præcedens clyster.

℞. Sennæ ʒss. Sem. anisi 3j. Decoq. in aq. hordei q. s. ad ʒiv. In quibus dissolve el. diapruni ʒij. Misce F. potio, mane exhibenda; & subinde, malo perseverante, iteranda.

Corpore bene purgato, uvula cum pulvere sequenti, coaleatis, ab Hildano centur. 2. obs. 21. descriptæ, vel alterius convenientis ope, sæpius in die erit sublevanda.

℞. Rosæ, rubr. balsamior. corr. granat. an. ʒss. Rad. bitortæ, tormentill. galbar. immatur. ʒiʒ. Rorant. an. 5j. aluminis usti ʒij. M.F. pulvis.

In dilata aër sit temperatus; cibis ex pulcillis & ovib. forribilibus; videntur omnia aromata: potus sit tenuis cerevisia; corpus quiescat; somnus sit moderatus: fugiantur animi affectus. *Hemorius Regius apud Theodorum Craanen. Medicationum lib. 1.*

Ulcus in gargarone cum exsione tonsillarum & uvulæ.

Vit Illustrissimus, quadragesimum tertium annum agens, temperamentis totius calidi & humidissimi, jecoris calidioris, boni & carnosissimi habitus jam quintus decimus currit mensis, ex quo præcipiti de copiosa destillatione in fauces correptus fuit cum febre & insigni deglutendi difficultate. Medicus autem domesticus acerrimis sanguinis missionem iussit, gargasimos præscripsit, clysteribus venetem exoneravit, & victus rationem congruam instituit, quibus equidem melius habere visus est Nob. Patiens, verum duobus transactis diebus, rursus invaluit affectus & præsertim in tonsilla sinistra cum ejusdem

exaceratione: idcirco sanguis rursus extractus fuit & gargasimi detergenti instituit; quibus licet febris, inflammatio, deglutendi difficultas fuerint omnia remissa, exulceratio tamen progrediebatur uvulam verius, & non obstantibus medicamentis quocunque refrigerantibus, & humoris actionem atque aciditatem demulcentibus assumpsit, ulcus tamen quotidie ferpens, non solum uvulam, sed & dexteram quoque tonsillam occupavit, tuncque hoc celerica humoris infectos fuisse Medici assantes suspicari ceperunt: cum ante inceptam destillationem Gonorrhæas, & caries pallus fuerit; propterea ad alexipharmaca ea gallica devenire decreverunt, & Decoctum ex salia, guajaco, ligno cydoniorum & santalo in aqua fumarizæ atque eichorii præscriptum, quod solutivum reddiderunt sennâ, polyod. & tartaro superadditis; pro potu verò coactum aquæ ex salia parata utebatur: interim melle ros. & syr. de rosâ sicci cum spiritu sulphuris partes affectæ tangebatur. His per mensem adhibitis, non solum levatus, sed ex toto sanatus, videbatur; verum transactis mense, recruduit affectus & ulcus in eisdem partibus apparuit. Causam autem tulerunt isti novum commercium cum ioneâ muliere. Quamobrem repetita fuit quadragesima continuis diebus jam administrata remedia, omnia tamen in cassum reorata, siquidem ulcus ferpens semper magis undequaque sese dilatavit; ob idque Medici decoctum sudorificum instituerunt per plures dies, capite tamcū extra sudatorium servato, vestiri ne nimium illud incalcesceret, sed sensita omnia & lirica fuerunt; etenim & uvulam, & ambas tonsillas de-sillibito corripuit vocemque & deglutitionem adeo lesit, ut loquendo vocem etiam per nates emitteret, atque potus præsertim, nonnumquam etiam porulenta assentientia ad nares regurgitaret atque prodiret, corpore toto interim valde emaciato. Hoc insuavis evenit perterriti medici æris mutationem consuluerunt, & ad locum quandam inurbanum tanquam ad Tabas Virum Illustrissimum quæram, à qua loci mutatione juvenem majus, quam à medicamentorum administratione Nob. Pat. cognovit. Attramem ad nos petveniens, accuratissime locum affectum exploravimus, & tonsillas, necnon Uvulam ex toto ablatam atque corrosam invenimus; præterea ulcus tum superius ad os sphenoidæ, & inferius per ætiophagum tepere cum callositate atque non exigua fordie observavimus. Et quoniam à nobis auxilium peti, ideo de agenda, ut infra consulimus.

Ad quadragesimum usque annum, vitam incolentem duxit Vit Illustrissimus iste totius temperamentum calido & humido præditus, boni & carnosissimi habitus, cum capitis caliditate non valde excedente, & ideo sine sensibili molestia capitis destillatione, quæ ex tempore præcepta ad glum intrare cepit, postquam Gallicam Gonorrhæam cum Castæ contraxit, sicut eodem tempore totius corporis macies incepit; cujus variæ ratio facile adduci potest, namque si à calore temperamentis proper ætatem acutiori reddito, sanguis calidior & actor factus fuisset, qui ut ineptus ad nutritionem, maciem introduxisset, & postea per venam cavarâ ad cor, indeque per arterias carotidas ad cerebrum circuloque pervenient per jugulares vinas interinas ad fauces atque tonsillas, ut iussit à natura transfusus affectum anginosum produxisset id contigisset eo tempore quo magis calor ipse temperamenti viget, nimirum circa trigessimum aut trigessimum quintum annum; quod non evenit nisi post quadragesimum; postquam scilicet à Luc Gallica, non solum vasa

speculata.

permatia, sed & hepar unâ cum massa sanguinea inquinatum fuit, cujus Celtica qualitas impellit & charactertibus cum sit exulatio, idcirco viceribus & ipsi lingui gradus caloris p. n. superaddidit, ipsumque sanguinem ad nutriendum incipit reddidit, unde macies naturæ autem molestus extra venas detulit inflammationem in faucibus excitavit, ubi diutius temeraria sua prava & exurente qualitate tonsillas primò corrodit, & iterum excedendo Uvulam quoque consumpsit. Non igitur mirum, si prioribus medicamentis minime cesset affectus, & parum quoque alexipharmacis Gallicis: etenim cum calida & humida capitis naturalis intemperies non valde excedens, à Luc Gallica magnopere adacta fuerit, caputque ipsum valde extremosum redditum, hæc corrigi non posuerat sine dolore, nec sine ipso Gallica qualitas in humiditatis excrementis & partibus siliis fundata extirpari, & propterea nonnihil quidem remissa, ac nunquam ablata fuit tanta fluxionis & exulcerationis; imò fusi tandem humores in toto à Decocto linderio in hypocausto sicco ad caput impetum fecerunt, quod extra hypocaustum exiens, nec ideo satis exadans, eosdem infectos humores in scilicet retinuit, siquæ fluxio necessarii ad tonsillas & gargarcon adacta fuit, simulque adactum ulcus. Ut autem Uvula impediret quominus alimenta, & potulenta præterit ad superiora ascendere possint, & eorumdem descensum atque deglutitionem adjuvat, ita eadem dempta atque consumpta in causa est, ut ad superiora regurgitare & ad nates ferantur, præsertim quia ab ulcere dolorum inferente impediebatur illud alimenti descensus quod impedimentum tandem cessavit, quoniam ab callositate ulceri obductam non amplius percipitur dolor, & vox tamen ob columellæ defectum fertur ad nates, & eorum tota per os emittitur. Urinam vero in præsens ulcus non amplius depalesceret; in parte namque inferiori vix terminus conspici poterit, sicut nullo modo in superiori, adeo ut ad os sphenoidæ facile pervenire possit, & præterea cum palatum quoque colorem mutare inceperit, ideo & proximas partes brevis iussu posse dubitandum: vixit enim & abundat, copiosa Gallica destillatio, cujus aliqua portio in pulmones nocturne delabens tussiculam excitat, copia vero major per œsophagum in ventriculum descendens subversionem excitat, ciborum amplexum & concoctionem impedit, ac chylosæ, & forsan etiam saniole materiz catarrho immittit regurgitationem inducit.

His autem ita se habentibus, facile videre est statum Illustrissimi Viri adhuc esse periculum plenum, primò quoniam ulceris dilationem & propagationem prohibere difficile erit, cum ejusdem termini non satis oculis pateant, & præterea quoniam macies invaluit, & à perseverante in pulmones destillatione, & simul ab aeris frigida ob Uvulæ defectum pulmones immediate feriente, Phthisis facile introduci possit.

Quare sedulo agendum etiam hoc incongruo anno tempore, ne ulcus ulceris progrediatur, Topica adhibendo primò, & postissimum Cachectica, mox Sarcotica, atque tandem Epulotica, dum interim expiatio ventriculo, acrimoniæ humorum demulcentia, & Gallicam qualitatem respicientia, (non tamen fundenda) sunt in usum duenda. Proximo autem intrinsece Vere inuenda quoque erit regulæ Purgatio, causarum extirpatio, & ulceris perfecta Cutatio, sine tamen dependitæ partis fe-

stitione; tunc enim primis mundatis suis, massa lingulosa erit depuranda. Capet purgandum. Celtica lues penitus debellanda, simulque humida capitis intemperies, jecoris calida remittenda, Sanguis temperandus & totum corpus remittendum; Topica veto ulceri incumbendum.

In præfatis igitur ulceri coris viribus prospiciendum, primò detergentibus & cachectici, quoque, non solum saniem, sed etiam callositatem auferentibus, deinde ericcantibus, ideo gargarismi frequentes instituantur ex aqua Terebinthina, cum melle rosato simpli, cui aqua hordei poterit etiam commisceri; verum quoniam jam dictis callositas non adeo facili tolli poterit, ideo etiam ad Echarotica & aducentia, ad ignem scilicet erit deveniendum, idoneo instrumento applicandum; vel saltem valde ericcantæ gargarismi erit utendum (quod tamen tolerabile ut) ut cinis, colatum, spiritus vitrioli extracta & aqua plantaginis, vel aqua Villeni parata.

Interim ventriculus à præsentis infarctu est vindicandus, præbendo primò mel ros. sol. cum manna, cui superbebat mulle dilux lib. ij. Mox die sequenti assumat.

℞. Oxytel. simpli. ℞. iij. aquæ Ros. citri ℞. iij. pro syrupo. Tercio veto die assumat crem. tart. ad ℞. ss. in jure pellæ, aut vituli, coct. citri alterata. Die postea sequenti rursus assumat oxytel. deinde creosotum tartari, & ita alternatim p. reverteret x. aut xii. diebus, ut ventriculus cum œsophago mundificetur & p. limæ vix eliminantur; & penitus suspensus præterito Leniente. Quæ putrida p. vitæ viciat expiatione, in usu, ducat lac hujusmodi artificiale.

℞. Sem. melon. mundat. ℞. j. sem. cucurbit. mundat. ℞. ss. amygd. dulc. mundat. n. xv. nucleorum pineorum n. xv m. contundantur omnia, & cum juce carnis pro cibo confusio extrahatur Emulsi ad ℞. vii. aut viii. cui addæ sacch. albi cochlear. & liquorat hujusmodi emulsi ad snavia: emutulis aquæ ros. aut è Ros. citri, & humo mane præbeatur quatuor aut quinque horis ante cibum. Jus autem carniæ, tum pro hac emulsiōe conficienda, tum pro fructibus omnibus parandis, sit semper optima china alteratim in utriusque jam dictæ emulsiōis perseveret tota Quadragesima, usque ad tempus futuræ eradicationis Purgationis; poterit enim inservire, tum ad demulcendam humorum mordacitatem, tum ad totum corpus nonnihil emolliendum. Interim decimo quoque die assumat crem. tart. ad ℞. ss. cum sacch. in jure, ut super dict. solutum. Et congrua utatur victus ratione, evitando aeris inclementiam & nimis frigidam, & in cubiculo nimis calidam. Vixit quoque alimenta excrementosa, coctû difficilia, calida, vaporosa, siquæ cæna parca. Vinum fit album, tenue, aquosum china & tanulo albo medicatum, ita ut pro singula situla ingrediantur ℞. ss. dictorum liquorum. Somnus nocturnus, diuturnus quoque proderit. Exercitium fiat aere praxidum. Venus omnino ableganda, & alvos lubrica servanda passulis aut primis coctis in prima meosa cum sacch. assuendis. Tandem ab applicationibus & studiis abstinendum, animique alterationes & perturbationes atcendæ. Et hæc pro nunc.

Purgatio autem eradicatoria sub fine mensis Martii inuenda, tunc erit à oobis præstibenda, si de statu Illustrissimi Viri tunc temporis certiores facti fuimus: consilium enim erit in arena capientium, & supra propositis indicationibus pro viribus erit

erit satisfaciendum, sanguinis missione, primarium viarum expiatione, humorum preparatione succis depur. cich. borag. betonicæ pinitibus diebus assumendis; & non semel electivè purgantibus Cacoehymia erit tollenda. Caput pilulis capital. Paracelsi expurgandum. Lnes Gallica Alexipharmacis expianda, nimum Decodo sudorifico, medulla guajaci, tassa, visco quercino & sanialis albis in aqua cich. & beron. parato, quo humida quoque capitis Intemperies corrigitur. Quibus peractis, ad jecoris aque sanguinis caloris moderatorem & totius corporis renutationem, intrinsecus facili convenire poterit lactis asin. usus, & extrinsecus balneum aque dulcis herbis refrigerantibus alteratæ, non omittis Conlervæ capitalibus, & habita semper ulceris providentia, si opus fuerit. Quæ omnia Illustrissimo Viro à summo Deo salutaria precamur. *Reym. Joh. Foris Consult. & Respons. Medicin. Cens. 1.*

Observationes.

De vicia relaxata curatione.

Nunc quomodo ego tardè maximas quidem & ingentes relaxatas columellas sanaverim, paucis addam. Relaxatur autem ut Hippocr. docet libr. 2. de morbis, quoriscunque piruita à capite ad fauces defluerit, à columella excipitur. Id quod facile fieri potest, cum sit pars admodum tæra, mollis & spongiosa. Estque affectus hic periculosus: Aliquando enim columella cum tonsillis adeo inflammatur, ut æger neque cibum, neque potum deglutire, imo vix spirare possit. Horum ego nonnullos vidi, ac etiam feliciter curavi. Transit & interdum in gangranam, ut ex præallegato loco. Hippocratis elicete licet. Quod & Forstius lib. 15. Observeat, s. annotavit, mihi tamen videre nondum contigit. Poreit & in anginam terminari, ut tu ipsemet mecum hic in Dno. Joanne Metella, lenè omnimodo reverendo vidiſti, & procul dubio annotasti. Is enim cum inflammatione columellæ la boraret, me absente, Empirico & homini plane ignoto se curandum commisit. Hic per dies aliquot pulverem calidissimum atque adurentem faucibus insufflavim, unde mox inflammatione & angina sequuta, de vita periclitabarur. Curationem non addo, cum tu ipsemet interfueris, itaque ut Chirurgus in hoc affectu caute & præmeditare procedat, est necesse. Inprimis autem explorandum, an affectus sanabilis sit, nec ne, ne ægro temere quicquam polliceatur. Deinde etiam, an sit enim, vel cetera inflammationem; si enim scieritis fuerit columella, & cancro proxima, quemadmodum ille quantum in præcedentibus observationibus meminimus, prudens erit Chirurgi, manum non admoveat, aut si ægri, amicum aut adstantium precibus obtemperare cogatur, nihil quicquam tamen, nisi de eventu morbi prius facta prognosticatione teneat, ne nomen impritri Chirurgi sibi acquirat, suadeo. Porro ex quacunque oculis duxerit causâ, statim ab initio vicius ratio tenuis instituenda est, corpus clysteribus, sæpius quoque iteratis, Arcteo præcipiente, evacuandum, & materia, quæ ad fauces defluit, deorulum trahenda, ligamini item extremitatum, sectione venæ in brachio cucubitali, quæ scapulis adhibitis, defluxus aliorum revellendus est. Gargarisma ab initio tri repellens, quale hoc ego uni soleo.

℞. Folior. plantag. Mespitor. Caudæ equinæ. Rosar. rubr. an. m. folior. scabiosæ m. s. gallar. ʒ. ʒ. Coquantur in aqua ad consumptionem tertie partis. In lib. ij. colatura dissolve mellis rosati, an diamor. ʒ. ij. aceti rosac. parum. misce, & fiat gargarisma. Loco decocti possunt sumi aque distillatæ cum melle ros. & diamoran. Aliquando & solâ poscâ feliciter usus sum, Nonnulli statim ab initio pulvere pipereis longi gula instilo. Uvule relaxatæ auxiliari conantur, quod quidem periculo non vacare, tu ipsemet in reverendo Dn. Metella observare potuisti. Collum quoque oleo rosac. inungere solitus sum, Et si affluxus vehemens, sequens applico cataplasma.

℞. Fainæ bordei. ʒij. Pulv. rosac. Myrtillor. nucum cupressi. an. ʒij. Coquantur poscâ, fiatq. cataplasma, addendo sub fine olei rosac. parum & vitellum cum albumine ovi.

Os singulis ferme momentis, superiorem gargasimæ abluendum. Si dolor ingens adsit, gargasimæ addo parum seminis feniculi, cydoniorum & florum chamomillæ. Nonnunquam quoque ut loco gargasimæ lac recens fumar æget, jubeo, videndum tamen, ut quum semel os lacte deinceps quinquies, aut sexies gargasimæ abluit: lac enim magis lenis dolores, quam verè affluxum repellat, quod tamen in hoc affectu citæ insula præcipuum. Ceterum quoriscunque æger aliquæ de causâ per se fauces non satis recte abluit & gargasimæ poscâ, soleo gargasimæ ut hoc ægro, lypheone clemente in gulam injecte. Corpus præterea à piavis humoribus expurgandum: Si bilis abundat, conveniunt electuarium diacatholic. de succo rosar. lentivum, tyrop. rosac. isolat. compos. cum Rhabarbaro, Agarico, & fenn. Diaphenicum. Si verò pituita, Pilulæ cochlear, aureæ, & de Hiera cum Agarico, ex usu esse possunt. Si æger pilulas deglutire non possit, posio ex electuario Indo maiori aut minori, vel ex diacathamo cum decocto betonicæ, scabiosæ, semine anisi & feniculi dissoluto, est; Phlebotomiam (si nihil adsit quod impediat) in brachio, tum revulsione gratiâ, tum quod humor omnes simul evacuet, tam in defluxione frigida, (si vehemens & suffocationis periculum fuerit) quàm calida administrare soleo. Cucubritulas item scapulis, & musculis bicipitibus, cum fructu applico, Hippocrati. lib. de affectionibus, vult ut capiti rulo in postica parte applicentur; indeque plurimum detrahatur sanguinis.

Id tamen extra laconium, ut fiat, suadeo. Fabianus Scheurerus lib. de catarrhis, capite de catarrho oculorum, cucubritulas in Podagricis improbat, ne materia ad spinam, indeque ad articulos trahatur. Recte quidem, sed quia Podagrici sæpiissime hoc affectu corripiantur, morbus cum sit gravissimus, suffocationis quin etiam periculum nonnunquam adsit, ad id quod magis orget, Chirurgi præcipue respiciendum est. Interim etsi aliquid ad articulos defluerit, minus tamè periculosum erit, quàm si ad gulam, & faciliè potest corrigi poterit. Affluxus autem inperu sedato, ad ea quæ magis discutiunt, transeundum. Unde sequenti gargasimæ magno cum succellu utor.

℞. Folior. & flor. betonicæ, silvæ, scabiosæ an. m. Rosar. m. j. sumuntur, rosamini & florum chamomel. an. p. i. Coquantur in lb. ij. aquæ ad consumptionem tertie partis. Colaturæ adde mellis rosac. ʒ. ij. etiam aluminis ʒij. misce fiat gargasimæ nonnunquam etiam prædicta simplicia vino rubro

in coque. Exterius collum oleo chamomillæ aut oleo ex floribus solani inungo, & sanam succidam applico.

Aliquando columella propter continuum affluxum materie, incurvatur adeo, atque relaxatur, ut non minimum negotii, tam ægro quam Chirurgo, facessit, sicuti mihi, tum in multis aliis, tum præcipue, in viro quodam honesto, ac civæ Paternacensis videre contigit.

Hic uvula ad magnitudinem fere nuclei juglandis excreverat. Quare imperii affluxus sedato, corporeque semel atque iterum purgato, applicatis iterum cucurbitulis, sequentem pulverem, bis aut ter in die insilavi.

22. Pulv. ros. mbr. balaustris. cortic. granator. an. ʒi. l. sul. & flor. Scabiozæ & ligustici ana ʒii. aluminis ʒii. l. mizæ, & fiat pulvis. aut.

23. Radicum bistortæ, Irisidis florent. tormentillæ, gallæ. immaturæ. an. ʒii. ros. tubæ. & flor. scabiozæ an. ʒi. lapidis calam. preparati ʒi. l. aluminis ʒii. mizæ & fiat pulvis subtilissimus. Modus autem ejusmodi pulverem insilandi, talis est. Lingua speculo oris depressa, mox spatula aut cochleari parvo & ad id apto, pulvis uvulæ admoveatur. Ut autem pulvis undique uvulæ aspergi atque insilari possit, sequens excogitavi instrumentum, quo multoties usus sum.

Est autem cochleare ex capso cujus manubrium fistulosum, octo pollices longum, & inferiori cochlearis parti annexum, Ex altera parte folli culum (ex coelo, eo modo, quo anceps fistulis suis ad salientias conuoluit, alligare solet, factum) annexum habet cochleari itaque impleto pulvere, uvulæque admofo folliis conturgendus est, quo aer pulvrem in altum pellat, sicque uvula ac palatum eo undique atpergantur. Sed quia necesse est, ut minister speculo linguam deprimat, interim dum Chirurgus hoc instrumentum pulvrem admoveat, ac proinde sic unus alterum impedit, hanc ob causam, aliud instrumentum longè ad hanc rem commodius effinxi, quo Chirurgus interim dum sinistra speculo oris linguam deprimit, dextra pulvrem admoveat.

Folliis hic similiter alligatum habet cochleare cupreum cum sua fistula, longitudine pollices octo continens. Folliis verò longiusdo quinque, uti latiusdo trium pollicum existit. Ut autem folliis depressus per se in altum relevaretur, atque unica manu insilatio fieri posset, in interiori parte sua instrumentum veluti plectrum sive elevatorium ex chalybe fabricatum, consistet, beneficio cujus, superior pars folliis in altum relevatur. Nonnunquam adeo contumacem uvulæ inflammationem, aut relaxationem vidi, ut ulla mensiem ejusmodi pulvrem quotidie insilare, necessum fuerit. Hæc ideo moneo ut de salute ægri semper benefices, etiam si ab initio res per se difficilis appareat. Quod si levioribus hisce remediis morbus non cedit, ad fortiora progrediendum est. Nonnulli aquam fortem per se aut aquæ Plantaginis vel rosarum dilutam, aliquæ medicamentis caustica admovent: prædenter tamen & cautè hac in re agendum est, ne malum ingravescat. Quotiescunque enim malignitas aliqua adest, facillimè malum ab ejusmodi medicamentis acrisioribus irritatur: si quis tamen illis uti voluerit, ea quæ à Paulo Æginetha lib. 6. cap. 3. t. hac de re traduntur, observet.

Sæpienatè quoque uvulam forficibus abscindere aut filo ligare, vel cauterio insinere coacti sumus. Videat tamen Chirurgus ante omnia, ne aliqua subit malignitas, vel dispositio ad cancerum, quod facile cum ex duobus proxime præcedentibus

Bibl. Chirurg. Tom. II.

observationibus; tum ex Paulo Æginetha loco præallegato, elicere licet, ubi monet conerctas, rotundas, sanguinolentas & sobnigras, Chirurgiæ aggrediendas inimicè esse. Quæ vero contrariò modo se habent, nimirum quæ, ut idem Paulus docet, tenues sunt, oblongæ, & in supremâ parte imminutæ, neque nigre aut sanguinolentæ, sed subalbicantes, Chirurgiam admittente. Tantum autem de uvulæ quantum naturalem excedit modum, auferendum convenit; est enim veluti plectrum rotis, qui ea catent, raso distinctè ac clarè vocem loquelamque profertè possunt, Raro inquam, quandoquidem mihi uvum aut alterum videre contigit, quibus licet uvula erosâ fuerit, adeo tamen distinctè & articulatè proferebant sermonem, ac si instrumenta omnia integra ac illæsa adfuissent. Alter eorum Ozænicus fuerat noster, cui per annum integrum ozæni laboraret, uvula plane erosâ conspiciebatur, ut suo loco dicemus: sed hæc rara sunt atque infrequentia.

Porro abscissio hoc modo perficitur. Cuspide uvulæ rostro ciconiz Chirurgus apprehendat, deinde quod superfluum, forficibus abscindat, parumque sanguinem effluere petenat. Si autem plus æquo effluerit pulvis noster ad sanguinem sistendum cochleari parvo, applicandas est. Postea gargatilis ejusmodi, quales antea præscripsimus, utendum. Quod si æger incisionem abhorreat, aut sanguinis profusum vereatur, tum sequenti instrumento, à nobis primo invento uvulam absque omni difficultate atque periculo ligare, & abscondere soleo.

Est autem styliis fistularis, longus pollices octo, mihi ex ære fabricatus, cui ex una parte annulus adaptatur, est. Is verò ex inferiori sui parte tantum excavatur, quantum ad recipiendum filum opus. Postea laminodis, faciendus.

Fili deinde una pars per foramen, quod in superiori parte annuli est, similiter traducenda. Tum deorsum angustissimum foramen quod in externa parte annuli existit reducto filo, parti inferiori alligare oportet. Si autem externa pars annuli, similiter non nihil excavatur, quo filum, ne hinc inde vacillet, continere possit. Quò factò minister speculo oris linguam deprimat, Chirurgus veto partem uvulæ abscondendam, annulo apprehendat, dexteraque filum, vehementer attrahat, ac uvulam stringat. Sic enim nodus efficietur. Facto nodo ad uvulam, filum, abscondatur: & extrahito instrumento, ut extra dentes propendeat, relinquatur; si enim in ipsa constrictione uvulam non abscedit, eadem tamen, aut sequenti nocte, id præstabit.

Sin verò immodicus sanguinis fluxus supervenerit, cauterium actuale admoventum est, hanc in modum. Habeat Chirurgus duos ministros, quorum unus caput firmiter teneat, & ægroto oculos veler: alter linguam oris speculo deprimat.

Chirurgus viro fistulam æneam, octo pollices longam, lineoque madidâ, undique excepto foramine excipiat. Postea stylo ferreo ignito fistula intromissâ, uvulam cauterizet, vicinis tamen partibus illæsis. Tandem gargatilis idoneis, melleque rosaceo curatio absolvenda est.

Præcautio aliqua si adfuerit, efficacissimum erit cauterium. Sed quia ægri vehementer ab eo abhorrent, & totam, si res ad votum non succedat, Chirurgo adferunt, ideo prius medicamenta hæc, quæ sequuntur experiri soleo, quibus magno cum successu utor. Intimura igitur optimâ viâ ratione, purgato corpore

D d

corpore reliquisque adhibitis universalibus, ut antea morui, sequenti gargasillmate os continuo ablueret jubeo.

℞. Hordei integri m. i. Radicum plantag. \mathfrak{z} i. Folio. Scabiozæ, geranii, icordii an. m. f. Rosarum & folioz. plantag. an. m. l. Coquantur in \mathfrak{t} l. liii. aquæ ad hordei creperatam, tom admixte mellis rosaceæ, & diamorri, an. \mathfrak{z} ij. misce, fiat gargasilla. Ter quoque aut quater in die unguento nostro Egyptiaco, cujus descriptionem pete ex tractatu de gangrenâ, affectam partem penicillo luango, idque eo ungue continuo donec putredo, ac morbi sævia remiserit. rum ea quæ superius in relaxatione uvulæ tradidi adhibeo, itique curationem absolvo. *Gustelmus Fabricius Hildanus observat. (iurgicæ. Cent. iiii.*

De ulceribus oris, ex lue venerea contractis:

Item de uvula relaxata periculosa curatione.

Nobilis ac strenuus viri, Dn. Joh. Held. Inclitæ Reipublice Freyburgensis Helvetiorum consulis prudentiss. uxor, cum quadam die sub ardentissimo sole equitasset, caputque plus, quam pro conservanda valetudine licebat, excalescens fuisset, cartharto ad uvulam & fauces corrupta fuit. Advocatus Barbitonsor, cum uvulam intumescens esse deprehenderet, pulvete summe calidum & acrem quoque idie ter quater inflavit. Hinc exorta inflammatio & abscessu periculosissimo, non tantum uvulæ, verum etiam cartilagine nasum erose fuerunt, ulceraque hinc inde in facie eruperunt. Tandem miseram calamitosamque hancce viam, misera illa ægra (quæ nulla arte sanari potuit) misere, sed constantè & pie finivit, melioremque vitam sibi elegit. Hæc ex ore genete, & virtute nobilissimæ marionæ Dn. prænominate, ægræ filie, Anno 1561. 6. Martii patiens clarissimo V. Do. Sebastiano Mejero, Reip. Solodurensis, Do. medico ordinario excepi.

Anno 1618. ex Belgio rediens, una cum viro clariss. atque doctiss. Dn. Georgio Fabro, Castri Imperialis Fridbergensis doctore Medico ordinario atque celeberr. matronam ipsam & singularem virtutis præditam, nec non Dn. Fabro sanguine fundam vidi: æni cum propter cartharum uvula relaxata inflammataque fuisset, & Barbitonsor aquam quam Regia vocant, nimis indifferetè applicuisset, talis sequuta est inflammatio, & hamorum affluxus, ut per dies aliquot de vita periclitaretur ægra. Tandem, cum Dn. D. Faber (qui peregrè profectus fuerat) advenisset summa suæ & indefectæ diligentia restituta quidem fuit: sed uvula & portio aliquis palati & cartilagineum narium extenderunt, maximo cum ipsius incommodo & loquelæ depravatione.

Ex pulvere pipæris longi & croci, gulæ faucibusque inspergo atque insufflato anginam periculosissimam lequatam fuisse, in reverendo viro, Dn. Johanne Altruda p. m. Ecclesiæ Paterniacensis pastore fidelissimo, observavi anno 1607. uti in 3. centuria observationum mearum fusius videre poterit.

Quapropter contandum est, ne corpore existente impuro, aut inflammatione & affluxu hamorum tenetæ parte affecti hujusmodi. Medicamentis calidioribus & erodentibus facile namur, nisi etiam maligna aliqua qualitas, ex humore atrabiliario progenita, quæque cancerum sapit, adjuvet. Cancerosis enim aplea à medicamentis erodentibus exasperantur irritantque. In his porcio medicamentum ex cinetibus gummatosis & rarisum, cum

eorum menstruo confectum applicarem. Iam quantum cum successu in egrégio isto sene Dn. Claudio Alantellæ ante annum fecerim te non laet. *Idem Cent. vi.*

Pro Columella inflammatione.

Præmissis Clystere & venæ sectione, hoc gargasilla (cum essent in principio, ad fluxionem reprimendam præscripsi.

℞. Aqua plantag. \mathfrak{t} l. ss. aqua equiseti. \mathfrak{t} l. ss. fl. ros. cubr. p. j. B. fl. gallium contritum numero liij. ebulliant unica forti ebullitione colat. adde diamorri \mathfrak{z} ij. Postea vena sub lingua secari, & uvulam etiam inflammatam, & propendens pulvere aluminis ulsi & boli armeni simul mixtis sublevavi. Hoc deinde gargasillo orems convalescit.

℞. Plant. g. bellidi. m. n. fl. ros. rubr. an. an. p. j. balsust. \mathfrak{z} ij. coq. in aqua ad \mathfrak{t} l. adde aqua plantag. \mathfrak{t} l. sem. Cydon. \mathfrak{z} ij. sem. malv. \mathfrak{z} ss. rutus bulliant, addendo diamorri \mathfrak{z} ij. B. M. l. ros. colat. \mathfrak{z} M. pro gargasillo habebam quoque ut ex dianuco lambere, quo utebatur Galenus in Hortulano. Petrus Forestus obs. 2. lib. 1. de facium, guttur, gulæ, & asperæ arteriæ affectibus.

Mulieri cuidam tonsillæ vehementer tumebant, columella inflammata & valde laxata erat, ut deglutire & respirare vix posset, illam curavi in hunc modum.

℞. Aqua font. \mathfrak{z} ij. olei vitrioli tot guttas quo acidam mulum reddant. In hac aqua interdum pennam ad fauces tumentes immittit aliquoties in horas singulas: cujus ulu ore petmulla phlegmata continuo emitteret & expuebat. Post aquæ immisionem ex præcepto meo Succinum alium carbonibus imposuit, & per infundibulum ore fumum excepit, & sic cum multoties stupore intra dici spatium sanitatem obtinuit. Nam mox sine molestia deglutivit, facile respiravit, bene dormivit, tumor & inflammatio protinus sublata fuit. *Martius Kalandus. Cent. i. cur. 97.*

Pro Uvula elongatione.

Fiat raso capitis super commissurâ sagittali, & applicetur ibidem ventosa habens ostium facis amplum & oblongum, & teneatur saltem per unam horam, vel mediâ, ter vel quater in die reiterando ipsam: violentere etiam suffum attrahantur capilli ejus ita ut cuius capitis exfolietur à cranio suo: per tale enim ingenium statim uvula mirabiliter sublevarit. Vidi ipsum fieri, & instantè profuit: sed non debet fieri nisi in casu arduo magnæ suffocationis. *Barthol. Montagna conf. 88.*

℞. Gummi gott. gr. vi. tartar. vitriol. gr. vi. ol. succin. gr. iij. cum lyrol. solut. F. pil. v. ante vesperam institutione cum cucurbitulis utebatur: & paulo post isto gargasillmate usus est.

℞. Aqua verben. plantag. equiset. an. \mathfrak{z} ij. fl. ros. rub. cortic. granat. an. p. j. sem. cydon. \mathfrak{z} ss. ebulliant omni simul, in colat. dissolv. diamor. dianuc. an. \mathfrak{z} vi. syr. papav. mell. ros. colat. an. \mathfrak{z} ss. vini granat. \mathfrak{z} ij. de granar. acid. \mathfrak{z} ss. ful. prunell \mathfrak{z} ij. spirit. vit. ol. q. l. ad grat. aciditatem coletur denovo ut F. gargasillus pellucidus.

Tale circa collum inducatur cataplasma.

℞. Rad. alib. \mathfrak{z} ss. scabios. san. bucc. ros. rub. mell. chamæm. an. M. p. sem. alib. \mathfrak{z} ss. coq. in vini albi q. l. ad mollitudinem & pistentur: adde satm. sem. lini & fenogrec. an. \mathfrak{z} ss. Pulv. nidi hirundin. \mathfrak{z} ij. mell. ros. \mathfrak{z} ss. theriac. et \mathfrak{z} ij. ol. sals. \mathfrak{z} ss. ol. chamæm. amygd.

amigd. v. rec. an. q. l. M. pro cataplasmate.

Contra Uvulæ elongationem hoc etiam pro-

polui.
℞. Rad. bistort. iid. tormentillar. immaturar.
an. 3ij. fl. ros. sub. scabios. an. 3j lap. calamin.
prep. 3ijß: alumin. scab. 3ij. M. F. pulvis subtiliss.
lingua speculo oris depressa, cochleari parvulo ad
id factu, pu'vis uvule admovetur, imo si fieri
posset undique infunderetur, Petrus Locichius obs. 1. &
2. cap. 3. lib. 2.

Ad faucium glandulas tumentes. ℞. *Hæmurius* hoc
in secretis habuit.

℞. Argentinam coq. ex cerevisia, & fiat gaza
garlissima, vocis ad cap. 9. lib. 3. *parabolog. L.*
Fennellii.

Columella duplex, vel divisa.

Columellam duplicem, imo potius divisam, vidi
in puellu, qui Labio Leparino ita deformatus erat
ut simul palatum ad imas usque fauces filium conspi-

cietur. *Hæm. Vullgadii.*

De Uvula Gemina.

Uvulam ad bene loquendum esse necessariam, ideo-
que non adeo ineptæ vocis plectrum audire, à pluri-
mia Anatomicorum creditur; id quod à bicusia etiam
ejusdem, & præva, etque vel connata, vel à morbo
inducta, constitutio vincit; cen inprimis ab
Excell. D. Carolo Raygero in discursu, aglossostoma-
graphia, Jacobi Rolandi, Anno tertio Epheme-
ridum curiosatum German. adjuncto, præclarè illud
ostenditur, ubi adpositum exemplum gurgulionis
duplicis, in memoriam evocatur, quæ simili in mate-
ria observare mihi b's licuit.

Prima vice, dum aënis duobus abhinc juvenis 24.
annorum, eorum meæ subiectus, singularem in Co-
lumbella narum lulum exhibendo, duplicem eam con-
cessisse ostenderet, non quidem immediate palato
juncta, tanquam è basi quodam propendentem, cæ-
terum naturali planè situ locatam, ac figura & ma-
gnitudine juxta præditam.

Alterum exemplum hoc demum anno ancilla an-
norum 22. præbuit, cujus palatum duæ patite uvule
unicæ occupavit, quod figuram insoliti ostendentes
magnitudine saltem naturalem illam haud æquantes,
ita ut ambatium quantitas junctæ, si cum hac confecta-
tur, nonnulli parum cum sit superatura.

Revera autem binas in utroque subiecto uvulas
adesse, non solum divisas, quales tunc præfatus D.
Raygerus l. c. pag. 563. tum D. Henric. Vullgadii in
Schol. ad obs. 239. Anni 11. Ephem. Landsearum
sibi occurrerit, testantur, ipsa earum conformatio
docet, cum ex lateri basi in obtuse acutum mu-
tationem singula terminentur. Cæterum tunc hæc ab-
erratio in istis personis nullum aliud incommodum af-
fert, quam quod vocem non ca gerat, qua fieri alias so-
let, edere possint, sed causam nonnulli, & obscuram, è
naribus quasi descendente, tandem emittant.

Similem planè affectum in pluribus ætatisque sexus
hominibus, quas linea venerata particula hæc molestavit,
vel saltem ex parte molestavit, in nostro nosocomio
Gallico, cujus curam jam per undè viginti annos ago
medicam, observavi, ita ut omnia circa quadagen-
arias voce deturpat fuerint; hinc me illorum in
patres abire permoverunt, qui experientis edocti,
Gabr. Fallopio, nullum vocis detrimentum ex hac
uvulæ supervenire, in Observ. Annom. affirmant,
contradictor, siquæ ampla Riolano fides sit habenda,

Bibl. Chirurg. Tom. II.

dum lib. 4. Enchirid. Anat. cap. 11. de gurgulione
agens, quibus deest, inquit, vox ræca evadit, Cu-
jus veritatem etiam nuper à Nobil. D. Nicol. Guil.
Beckers, observatorum Anno 4. Ephem. Germ.
Observ. 66. inserta fuisse confirmatam vide. *Lucæ*
Schortkii.

Columella abscens à nativitate sine noxa.

Beatiss. Dn. D. Johan. Hagendorp parvulus meus,
in præxi amplissima observavit absentiam Columel-
læ in puella quadam à nativitate, quæ nihil inde in-
commodi passæ est, cæterum sana, Eusebii Hag-
endorp.

De Uvula Ablatione.

Perillustri equæ Romanæ, temperamenti san-
guineo melancholici, pluribus annis deluxionibus
statis temporibus super fauces ruentibus in Italia
laborare solitis, Principum dum negotia Cæsarea
in Aula pertractantibus. Viennæ moraretur, ac-
ci serena cieca solstitium hyemale anno præterito
super fauces & circumscissas lateres distillat'one corrip-
tur, quæ tantæ erat acrimoniæ, ut quamquam medica-
mentis tam totum, quam partes affectas respicienti-
bus, ex Pharmacia & Chirurgia delumpei abunde
agro prospectum fuisse, Uvulam cum Tonilla dex-
tra corrodere, ac ex integro sustulenti. Quo facto
Perillustri equæ, non loquelæ, neque respirationis
difficultatem, ut varii opinabantur, Verum cum
uvula sit asperatum ac levium arteriarum tanquam
operculum, aliam, præter levem vocis raucedinem,
nullam sensim molestim.

(Simillimum exemplum apud nos. h. l. videre est
in femina primaria, quæ ob deluxiones salinas
corrosivas ante aliquot annos plectro hoc vocis or-
bata efflari quodam omnes literas, & loqui, sed
tantum ræca & submissa voce non clara potest;
G. W. Wadellii.

De hiatu Palati & Uvula.

Anno 1674. die 4. Aprilis evocatus sum rux ad
quendam Nobilem, cujus Generosa uxor rux ante
21. septimanas særum masculum pulchre formatum
perperit, qui in oris palato quendam insolita ostendit,
(1.) magnum hiatum ab anteriori oris parte ad lo-
cum uvule vergentem, ibi qua (2.) Uvula duplex
& in medio divisa videbatur, ita ut quæ uvulam gemi-
nam diceret. (3.) Labia hujus hiatum in palato ab in-
vicem digitorum lara distant, ibique (4.) palatum pu-
rium maxime rubefecit in locum naturalis prodeunt
centitur. (5.) liquida bene deglurit, nisi quando im-
portune ingeruntur, tunc per nates effluunt, si au-
tem placide comedit minimè, quomodo autem io-
lidiora deglurit, tempus docuit. (6.) in ploratu per
nates nihil revolvitur, & si quis juxta ploratum judi-
cetur, nihil vitii oī inesse diceret.

Causam hujus affectus ipsa Generosa Matrōna re-
jicit in hunc calum: contigit aliquando ne quidam
Nobilis ephræbus cum ancillis nugaretur, strôphioim-
que ad eas mitteret, quod cum forte adveniret ge-
nerosa Matrōna, in ejus os invasit; hæc lidecō ter-
rore affecta, linguam in ore retrahens, hinc missit
strophilolo hæc insolita accepta refert. An ergo ima-
ginatio hic locum habeat, dicant Næmæ Amasii.
Paulus Zacchias hanc vim admittit imaginationi, &
cum eo alii. Verum meo judicio difficile & arduum
erit contra tam receptam, rorquæ seculari affirmam,
Dd 3 tamque

ramque innumerabilibus observationibus confirmatam sententiam, &c. *Joh. Ludov. Hannemanni.*

Exsecta prope uvulam carnea excrescentia.

Parsens eacrescentia carnea nuper ex collo Conjuga civis nostri Argentinenſis prope uvulam antroriam à Chirurgo fuit exciſa, & felicitet, Deo nobis favente, petacta ita operato, ut nunc ſcimina iſta oſi detrimenti exiſde ſentiat. *Fab. Schegſeri.*

De ablatione Uvula forſice petacta.

Uvula laxitatem ex decubitu mocoſi homotis à capite oriſi Hippocrates docet l. a. de morbis.

Affectus hic, per ſe ſatis gravis, deterioris ſæpius noſe efficitur ab iſis, quibus vel morbi, cauſæque ejus conditio ignota eſt, vel adhibitorum medicamentorum virtus, qua de materiâ legi poſſunt que Fabricius Hildanus de Anglia cap. 5. parte 6. obſ. 15. parte 2. obſ. 21. proponit. Hoc faciente illi qui in uvula laxitate & elongatione, accedente illius cum partibus violatis, amygdalis, palato, aliſque, inflammatione ex ſanguinis aſſuſu, medicamentis utuntur ſummè calidis, qualia tolerant eſſe, eo in caſu uſuſia, piper, ainſibet, ſal uſum ſimiliaque. Quæ improbas magnus Galenus 6. de ſenſu, cuncta & 6. de comp. med.

Placet variis in uvula prolongatione pilos quosdam verticis ſurſum attrahere, adeo ut ſonitum quendam (quem ſe audire referunt) edant, ſic enim eorum opera elevati cenſent perſecutionem, cujus ea elevatione locum concedi uvulae libi perſuadent.

Uvula hæc noo raro ex ſanguine & pſuſa eam ad magnitudinem increſcit, imprimis ubi pſuſa malum producit, ut Nuci juglandi æquiparari queat. Hæc de ſe videri poſſunt quæ adſerunt Hipp. lib. de affect. Actius ſerm. 8. cap. 41. Hildaſus part. 2. obſ. 21. Quod ſi longè majorem corpulentiam ipſam quandoque aſſumpſiſſe dicamus, vera nos proſter ſcias.

Paulus ab Uchelen, Mercator celeberr, vir temperamenti pſuſi, cui tamen cacoſymia billoſa aliquomodo acceſſerat, Uvulae ramore ex aſſuſu humorum copioſiore ſæpius aſſenſus. Accidit ut ejus magnitudinis evaderet, ut coactus fuerit medicum domeſticum, nobiliſim, advocare. Primo omnium ad evacuationem humorum bilioſorum, pſuſoſorumque cabibimus. Purgans conveniens, imo etiam ad ſubſtationem materiæ p. a. in uvula collectæ gargarifmum hunc.

℞. Fol. Roſar. rubr. Plantag. caudæ equin. an. Mj. agrimon. vinæ Perſince an. P. ij. Coſtic. Granator. ʒj. ʒ. nuc. gallar. ʒj. ſtor. baluſt. ʒſ. coquantur in aq. puræ & chalyb. an. part. æqual. ad conſumptionem tertie partis. colaturæ ʒſij. adde ſtypt. Diamorco. granator. an. ʒij. ol. Vitrioli gutt. v. M. F. gargarifmus.

Collo applicabatur linom præparatum [vla.] quod ex thure acenſo fumum exceperat; Cervici imponebantur cucurbitule præmiſſa ſanificatione debita.

Uvulae admovebatur pulvis ſequens cochlearia comodi ope.

℞. Gallar. immat. ʒj. ʒ. cort. granator. ʒj. ſtor. Roſar. rubr. Fol. caudæ equin. an. ʒj. alum. ulſi ʒſ. Tetre Lemois ʒj. M. C. pulvis ſubtiliſſimus.

Inſtrumenta alia quorum opera pulvis hic aut ſimilia uvulae applicari queat, qui deſiderat, incipiat quæ

delioſati curat. Fab. Hildaſus, & Joannes Scholterus part. 2. cap. 21. Tab. 9. fig. 3. commodius licet nobis nullum occurrat cochleari nobis uſuali. Medicamentorum dictorum uſu, & affectus ipſe & iſtiſta ægrotantis pluriſimum remitterunt.

Tempore aliquo elapſo, convivio cuidam quod aduſiſſet æger, ex immoderato vicio rheumati generoſi uſu, lubro uvula in tumefactia ipſum de novo invaſit, pſuſa plus juſto aſſa, humiditatibusque ſuperfluis denegato loco ſatis capaci, conſternatos hæc fecit conſanguineos, maxime ubi ſiſe ullo levamine incrementum ſumebat enorme, adeo ut gangranam mioari videretur, colorem ſub nigricentem aſſumens, qualem uvulam deſcribit Forſeus lib. 15. obſ. 14. 5.

At iſu deſtro medicamentorum, prægreſſis magis calidorum, id effecimus, ut, colore purpureo remittente, ſtans inductus fuerit, at ex aſſuſa ſtaveſcentis hujus humoris in eam longitudinem increvit uvula, ut ſupra linguam ad labia ipſa ſe extendit, unde & linguæ motus, ipſaque adeo loquela, deglutitio etiam, & reſpiratio ipſa, ſetè fuerint abolita.

Symptomata hæc tollere (noſtro judicio) impoſſibile, niſi per caſipationem; & hanc quoque convenienter inſtitueremus, luci appoſiti ægrotantis linguam ſiniſtra manu ope gloſſocrochi depreſſimus, dextra forſicem admoveimus acutiſſimum manubrio longiore præditi; videti poſſunt quæ hæc de operatione habet Ægineta lib. 6. cap. 31.

Thomas Bartholins cent. 2. hiſt. 88. delineationem exhibet inſtrumenti alicujus pro uvula abſcindenda; iſtius quodam Norvegico Canuto Thorberno, ingenio minime pſebeco excogitati; ut omnibus aliis etiam acutiſſimis, merito forſicem præſtero, ſecurus hæc in re magnam flet. Fab. ab Aquapodente, qual. part. 1. operat. chirurg. cap. 37. voluſſum Celſi rejicit, & forſice uvulam male conſtitum corruptamve autert.

Ut redeamus ad ægrotantem noſtrum, ovula abſciſſa exſpuebat, quo factio cochlearis ope applicabatur cataplalma ex linteis totio (Tondel) ſarira roſæli, & ſpic. Vitrioli ranſello, uſile ad id ut ſanguinis fluxus, qui tamco parvus admodum, inhiberetur. Hinc melle Roſaceo aboluebat. catario.

Modum hunc uvulam auſtendi nil periculi habere certum eſt, nec eſt quod cum Chirurgia rerum Chirurgiarum minus periculis ſanguinis fluxum metuemus; faciliſimum enim, cochlearis dicti ope, rei neceſſitate id exigente, ubi caſuſadum, minime ignotum, parti affectæ applicatur, cum ſiſtere, quale quid fieri poſſe Hildaſus loco citato docet.

Materie huic antequam ſinem imponamus, in gratiam Chirurgicæ artis cultorum, quibus hæc grave ſuit obſervationem hanc perlegere, iſedhoſiſcenti loco medicamentum aliquod communicare placet, cujus vires inſignes experiri ſumus in non uno, quoties cauſterio aduſu uvulae, imo ubi cauſterioſoni conjuncto ulceratio Amygdalarum, pharyngiſque ſiquidem penicelli ope parti affectæ applicetur, præmiſſo ulu gargarifmaris ex Decodo Ligni guajacini, Rad. ſalsipatiſt. ſimilibusque parati.

℞. Mell. Roſar. ʒj. ebeldon. ʒſ. aqua Mercuriall. ʒſ. mercur. præcipit. ʒj. L liquor. Ægypt. ʒj. M. F. ſirus.

Aqua Mercurialis cujus hic datur mentio, deſcripta eſt à Carolo Barto Traët. 2. cap. 13. etſque Aqua Fallopii, Joh. à Macken, in obſervat. Medico-Chirurgicæ.

GUTTA SERENA.

De ea vid. Bibliothecam nostram Medicam. Item sub titulo *Oculorum Morbi*.

GUTTA ROSACEA.

DE ea fuscè admodum scripsit nunquam satis laudandus, accuratissimus Marcus Aurelius Severinus, sibi de recondita Abcessuum naturâ verè autè tractand. Nos hic nihil ipsi iis addimus quæ jam supra ex eo sub titulo *Erysipeli*, ut & etiam aliis quæ in cutis affectibus attulimus; sed tantum observationem unam atque alteram; dabimus quas collegit *Clariss. Burnetius in suis Medicinæ Theoribus*.

Gutta Rosacea, rubedo est Faciei maculosa, seu porus rubor cum tuberculis, quibus tota Facies defordatur, ac si guttis roseis confusa esset, cognoscitur visâ. Orum dat sanguis crassus & fevidus, ad faciem delatus. Hoc malum sæpe contrahunt, qui poculis & ebrietati omnino dediti sunt; quibuscumque virio naturæ obtingit.

Pro Gutta Rosacea.

℞. Lithargyr. auri ʒi. ceruss. ʒij. axung. anser. & gall. n. an. ʒss. argenti vivi cum saliva extindti ʒij. F. unguentum, cum quo sero inungatur facies, & mane lavetur cum aq. fuscis. Item pinæ nucleæ recentis pistæ cum creta lactis in modum unguentarii coarctæ, quo inungatur Gutta rosacea. Mirabile habetur.

Vel. ℞. Lithargyr. bene tritæ & pulveris. ʒij. aceti fortis ʒij. M. Stent. per duos dies. Postea eoque ad consumptionem tertii partis: deinde adde aq. s. fabarum ʒij. & simul ponantur in alembico & destillentur. Postea isti aq. destillatæ adde gomme tragacanthæ, & arabicæ q. l. ut F. unguentum quo facies unguatur. *Petrus Forestus: schol. observo. g. lib. 2. obs. Chirurg.*

Pro Gutta Rosacea.

Puellæ nobili facies admodum defordata erat jam multis annos pustulis siccis flavescentibus serpentibus, accedente rubore, ita ut de lepra suspecta esset. Vocatus ego vixis tempore primo venam apertæ brachii, Scarificat'one postea sublabris cucurbitulis in scapulis, iussu uti ungulis mensibus. Vescicatorium quoque nocturnè applicui, quod magnam illi vesicam excitavit, & quod admittendum, or aliquandiu sanguinem miorerit, fecit: Bibis aliquoties hoc decoctum.

℞. Summitat. lupul. rec. fumar. rec. an. Mj. fol. sen. ʒij. coque in sero caprino, colaturam bibat uno haustu, & aliquoties repetat.

Unguentum pro facie sequens præscripsi.

℞. Lithargyr. auræ, ceruss. an. ʒij. unguent' citrini ʒij. thuris alb. massicæ. an. ʒss. rad. serpentar. offisi sepiæ, an. ʒj. ol. castor. ʒss. succi limonum ʒj. M. Inungat faciem. Mane ablui aqua flor. fabarum: recesserunt hæcratione pustulæ, sed iterum de novo oborexerunt. Denique itaque tam phlebotomia uti iussi, altero quoque mox die scarificationibus. Purgavi quoque de ovo sic.

℞. Fol. lupul. fumar. an. Mj. st. cordial. p. j. sem. anis. ʒij. fol. sen. anis. ʒij. fol. sen. ʒij. epithymi ʒss. decoq. in sero lactis bibat duabus vicibus: sed in postero die solvat conf. Hanc. ʒij.

Electuario deinde hoc utatur.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

℞. Conserv. s. cichor. viol. an. ʒj. conserv. s. fl. nymphæ, an. ʒss. pulv. trifoliat. duplicato rheo ʒij. diarrhod. abbat. diamarg. frigid. an. ʒn. medull. lem. melon. ʒij. Syr. conserv. cortic. citri q. f. F. Electuar. capiat alteris diebus bolus.

Postea illius faciem singulis noctibus hoc unguento.

℞. Spec. unguent' citrini. ʒss. camphor. ʒss. boracis ulsi ʒj. ossis sepiæ ʒss. rad. serpentar. ʒj. lactis virginal. parati ex lithargyr. cum aceto & aq. fabarum ʒij. succi limon. vel arantior. ol. de tauraro, de frumento an. ʒss. fugitivi ʒij. (plus addidisse, sed valde denigrabat) misceantur bene, siccabatur sæpe, sed tursum luccis molle reddebatur: mane abluit hac aq.

℞. Cuspid. rosar. p. j. s. viol. Mj. fufur. ʒij. cicut. sub. conquisit. p. s. rad. iteos. ʒi. rad. lilior. ʒij. rad. serpentar. cyclamin. an. ʒss. add. aquæ mensur. s. eliciat aqua, quam cum faciem ea lavat, aqua fabarum diluat: absumpto semel unguento & denovo parando addidi lithargyr. & borac. an. ʒi. & hac ratione curata fuit. *Felix Platerus obs. lib. 3. pag. 619.*

In gutta rosacea faciei sananda curandam Doctissimus viro, qui jam fuerat purgatus & sanguinem detraxerat, Sequentia jam usurpando, & autumni tempore repetenda præscripsi.

Hoc mense Maio frequenter lac caprinum bene bibat, in quo decoq. rad. laparb. fol. Mercurial. fumar. tenetiatas sambuci & Lupulorum. Ungar faciem unguento sequenti.

℞. Lithargyr. quart. l. infund. in aceto fortiss. sæpe moveatur, & acetum effundatur: residua sumatur, cui adde camphor. dissolut. in aceto ʒss. pomatæ q. f. s. linimentum. Mane hoc decocto abluit.

℞. Fabar. conquisit. parum, & otiaz an. p. i. decoct. in sero lactis, & eo abluit faciem: quod si non sit satis efficax inungatur: succum granatorum illi permisceat. Reverius ex Italia, cum inspicere, via amplius apparebat rubedo, dicebatque impetigines protulisse unguentum ex Lithargyro. Felix Platerus observ. lib. 3. pag. 617.

Observationibus ex Burnetio jam allatis, aliam rursus adiciemus.

Gutta Rosacea Errhini usque curata.

Clariss. Codofredi Davidis Mayeri, Ephemerid. Natur. Curios. Centur. 1. & 11.

Vir Pello J. H. victu crudiori, imprimis e-ū brassicæ muraticæ & lardi addictus, rubore primo circa nasi radicem, pustulisque passim per faciem conspicuis diversabat. Cum examentum horum multitudine reterat (scarificatione tollere laboraret, malum in brachia, dorsum & pectus deducebat, unde Osthopora se inserturum credidit. Tandem cum frequentiore cucurbitularum applicationem intermisisset, consuevit in facie variis, nancisceretur Gutta Rosaceam, quam abusu salitorum & acidorum, quorum cruditas ex stomacho ad massam sanguineam defetebatur, in dies adangebatur. Dixit convenientioris commonefactus abstineat a salis, pinguis, acris, & quodlibet spiritibus vini ingurgitatione; victu potius tenui & refrigerante unâ cum remediis convenientibus utatur. Curasdam tamen suas herbam Nicotianam Hanoviensem, communem, siccatam, & in pulverem redactam, nasibusque sæpius attritam, instat errhini adhibebat, ex cuius assiduo per diutius annum usu, diæta legibus non adeo accuratè observatis, cum ob alias rationes inc postmodum consuevit, omnibus aliis

remediis fufque deque habitis, fe ab hoc malo feliciter teftitutum fuisse Pello gloriabatur.

Haec medendi methodum citra rationes non effe fufceptam ex Erthrinorum agendi modis colligendum. Etenim eorumdem energiam ratio in follicitatione, irritatione, ac vellicatione membranae narium fenfibilis, quis eft qui neget? Hanc autem tunicam numerofiffimis valis fanguiferis, intertextam teftatur celeberrimus Anatomicus Vieuffens, Neurographia c. 1. p. 188. Unde occasione erthrinorum, valis hæc cum tunica pignitatis, utpote fungofa, fpongiofa & glandulofa parte, ejufque productiones vellicantur, folidumque & fluidum in motum rursus concitantur, ficque malla fanguinea ingenti vilcidiorum humorum copia liberatur, & nova ferofitatis materia hic ratione cetero utiliffimè fubtrahitur: Quicquid in coneratum de utroque externocoli publice fpeculatus fuerit Contad. Vièl. Schnerdenus, in diffufa Eruditionis Scriptis de Catarrhis, aliisque &c. Propterea non inconvenienter Clariff. D. Joh. Chr. Wolfium, in Scholiis ad Obfervat. Chirurgico-Medicas, Obferv. 13. ftatuiffe iudico, eam partes quafdam erthrinorum arteriarum tunicas penetrare, & fanguini committas ad cerebrum devehiri ibidem edocuit: Siquidem à activitatis, humoris circa cerebri promontoria collectis, & fimul quicquid ibi hæret, attenuare, feruque reftitans ad fortiori motum inclinare quam optime poffunt. Difcuffio enim ftagnantium humorum, inque ordinariis circulum actio, ut in allegato casu, ita non minus in aliis fimilibus, primarius exiftit Medicamentorum fons.

GUTTURIS AFFECTUS.

Gutturis affectus varii funt; vetum de illis jam abunde diximus; capibusque Anginae, de Deglutitionis vitio, de gurgulionis morbis, ac in fequentibus ubi de Tonsillarum affectibus. Hic unicuique nobis incumbit explicandum, fidei. quomodo variae res extraneae gutturi innoxie, commode extrahi queant; quod per obfervationes aliquot jam perficiemus.

Pro gula dolore ab officulo illic hærente.

Seciba quidam, cum in atrocitate pullos columbinos, contractis ut folent pius officolis, coctos comedens, officulum fimul ex parte deglutiviffet, illic ubi abruptum fuit, acutum, efophago infixum hære, unde tantus dolor suboritur, ut miferè excrucietur, mox fequuta inflammatione & tumore qui etiam foris in collo apparebat. Cum variis instrumentis illud eximere Chirurgus fideret, apprehendere tamen cum non efflet confpicuum, minime potuit, deorfum poffeffe longè minus, cum tunc dolor admodum exacerbaretur. Vocatus, juffi eum iucolis & lacte nutrire, craffiora enim deglutire minime poterat, tumori extrinsecus, cum mollis efflet, cataplasma maturans applicui, quo, exactis diebus aliquot, maturati, & in abfcessum converti cepit, quo aperto, una cum pote officulum quoque prodit & exemptum efflet. Postea fanato ulcere, nihil mali amplius paffus efflet. *Felix Platerus obfervation. lib. 2. pag. 413.*

Quidam per imprudentiam deoverans frustum cervi, propemodum fuffocatus, tandem convaleuit.

Anno 1524. Mense Maio, civis & futor quidam

Coloniensis è regione divi Laurentii, lotet confabulandum ore continebat acri frustum, quod illo præ rifu hianti gutturi fe infinuavit & infixit. Provocavit statim vomitum fed neque regetere, urque deglutire potuit: quapropter homo ille propemodum fuffocatus efflet. Vocatus una cum clariff. Viro Domino Johanne Kuenio Bridembachio Med. D. proximus injece gutturi decoctum emolliens ex radicibus Altheæ, feminis lini, fœnigræci, cum oleo amygdalatum dulcium: deinde stylo auro in curvo corium ad capacitatem ftomachi depuli: quod post femefte spatium per alvum egressit, Operationis præter alios quamplurimos interfuit Rev. D. Dn. Sebastianus, Seydelvis, verbi Dei miniftrè fideliffimos, qui & fanationis teftis efflet. *Gualt. Fabriceus Hildanus obferv. Chirurg. c. 11.*

Mulier officulum deoveratum, quo pene fuffocabatur, feptimo tandem die egressit.

An. 1592. *Mezgen auffen Waller* Hildanus officulum undique peracutum deglutivit. Primo, secundo & tertio diebus provocato vomitu, neque egeret, neque transgredire potuit. Vocatus tandem quarto die, inveni collum incus & extra inflammationem, ita ut vix infpirare aut expirare, vel etiam iucula forbere poffet. Urgebant dolor vehemens, febris, delirium & convulfiones. Quum officulum neque vomitu, neque instrumentis talis depelli, nedum extrahi poffet, fed jam in ipfo guttute abfcessum procreaffet, anodyni quantum potui dolores sedavi: & ligationem procreavi. Intus decoctum ex radicibus Altheæ, femine lini, fœnigræci, & cydoniorum, cum oleo amygdalatum dulcium per syphonem injece. Exterius autem collum inunxi oleo anethino, liliorum alborum, & amygdalatum dulcium: & cataplasma ex farina fabarum, floribus Camomeli, melliori, femine lini, fœnigræci, coctum in hydzaleo adhibui. Interim etiam aliquoties enematia injece, & vites iuculis conservavi ufque ad diem feptimum. Tum per os rejecit plurtimum puris, fimulque officulum ficque liberata, & brevi curata fuit, & per multos annos à curatione feliciter vivit. *Idem ibid.*

Modus eximendi offacula, & alias res gutturi infixas.

Nihil præstantius, aut aptius ad eximenda offacula, & ipinas piscium è guttute, quam instrumentum, quo ego feliciter usus foom, tum aliis, tum præcipue anno 1607. 16. Aug. in Lodovico Tiffor Lutrinaenfi, qui inter curandum officulum crallum deglutivit. *(Vid. hoc instrumentum in Tab. nostrâ 8.)* Oleum amygdalatum copiose infufe posteaque instrumentum innotissimè ufque ad officulum, eoque modeste circumducto ac retrahito, officulum fimul extrahi, atque brevi convulfit nolter fuffocatus. Post extractionem offici, guttur fepe abluendum decocto hordæacæ, aut aqua plantagininis cum melle rosarum & diamorone, oleumque amygdalatum ter aut quater de die ad cochlear fumendum &c.

Viro clariffimo ac Doctiff. Dn. D. Petro Offenbachio, Illustriffimo Landgraffi Hæffia &c. ac non Incolæ Reip. Francfurtenfis medico ordinariæ ac celeberr. Amico meo fingulari studio obfervando.

Fabricando morfabros fieri, vis clariffime, juxta ac Doctiff. ante mentis aliquot, in juvene isto viro cuius mentionem feci circa finem obfervationis 36. cent. 1. reipfa expertus foom. Tam vehemens etenim in ipfo erat

erant convulsiones, & corporis concussiones jam antiorum jam retrosum ac sinistriorum, ne res vixi, quantumvis robusti, ipsum, ac membra disrumpere vel continere possent, donec tandem ossiculum, Oesophagi infixum ad ventriculū detruderem, per os enim educi non potuit. Quid sit? In maxillis istis convulsionibus, & dentium contritionibus, instrumentum meum lat forte, & ex autichalco fabricatum, sub dentibus adeo confregit ut plane inutile factum sit. Sed in quem finem, inquit, provexit? Dicam sinectē in hac operatione me eductum esse, instrumentum ut à Domino Ryfio inventum, & mihi aliquoties usui fuit, non semper tutum esse. Si enim in ipsa operatione inter dentes acri frangeretur, & fragmentum ad ventriculū deliceretur, quoniam, bone Deus mala? Quoniam symptomata periculosa atque mortalia sequerentur? In prædicta itaque operatione eductus fui, prædictum instrumentum (quod omnium quicumque in hoc affectu excogitari poterunt, aptissimum est) quia propter multitudinem foraminum per se nimis imbecille est, corroborativo aliquo indigere. Idque facillè fieri potest si stylus ex capro vel autichalco, prædicto instrumento ab artifice infixus & ex utraque parte, videlicet manubrium & spongiam vetus firmiter anexus plumbatulig fuerit? Cassius ut sit stylus ille, necesse quidem est, ita tamen adaptari debet, ut in medio fistulæ collocatus foramina ne obturerent, & usus instrumenti imminuatur, non attingat.

Potest quia gravissimus & periculosus, imò mortalis est affectus, ut ex observatione 33. cent. 1. apparet, suadet; ut fidelis ac diligens Chirurgus, prædicto instrumento semper instructus sit, moram enim nequam admittit affectus iste, ut in prædicto juvene & aliis observavi. Nisi enim ego instrumentum, quod nullibi in hac urbe, nisi apud me reperire, in promptu habuisset, de ipso actum fuisset, propter doloris enim vehementiam, statim assunderet humores, intumescit collum, sequiturque suffocatio: plerumque etiam inflammatio & gangæna, ut ex observatione 33. cent. 5. videre poteris. De his, clarissime mihi Dn. Doctor, quia lectorem admonitum esse cupio, tuam excellentiam etiam atque etiam rogo, ut epistolam hanc observat. 36. cent. 1. atque apud vos excudatur, ad calcem annexæ velis. *Gulielm. Fabric. Hildan. Observ. Centur. 1.*

De modo frusta carnis, casei, panis, aliaque corpora faucibus inhaerentia auferendi.

Quam difficilis eorum sit respiciendo, quibus ex Charithio oesophagus angustatur, experientia quotidiana abunde docet. At difficillior longè sit obvenit, qui ex corpore aliquo duriore, pane, carne similibusque angustiam ejus incurant. Quandoquidem enim oesophagus asperæ arteriæ firmiter cohaeret, incumbæque, impossibile est, quoties fustum aliquod ei inhaeret, autem pulmones respirationi dicatos accedere posse, aut contra pulmonibus coacta exire.

Quæ de nominis, aculeis, similibusque auctoribus, referant, non est quod à proposito nos divertant, frusta carnis, casei, panis, aliaque his similia, ex gula auferendi hic est modus.

Ad manus Chirurgo sit stylus ferreus flexilis, cujus extremitas una manubrio gaudet debito, altera instructa sit spongiæ particula, stricteissime alligata, spongiam hanc oleo olivarum madidam, ad faucium posteriores atque inferiores, ubi oesophagi ingressus, dimittat, hinc sensim, ne respiratio magis laedatur, in oesophagum ipsum, in hoc ubi ad frustum aut corpus aliud ei inhaerens instrumento dicto devenit, spongiam ad posticā premendo, studeat supponere corpori contento, quo simul cum ea tutum retracta id extrahere liceat. Sæpius hæc operatio non raro iterari debet. Quod si corpus gula inhaerens hac arte extrahi nequeat, & quidem magis si à ventriculo digeri queat, detrusione blanda ei offeratur.

Ne hic errorem committat Chirurgus, stylum suum in asperam arteriam, non vero gulam dimittendo, quod Chirurgus cuidam contigisse novi, sciat lectores gulam à parte posticā vertebri dorsi atque cervicis incumbere, asperam vero arteriam ab antica incumbere gulæ.

Hildanus obs. 36. part. 1. instrumentum delineat circa extremitatem foraminibus plurimis prædictum, cujus ope spina, ossicula, ejusque generis alia gula inhaerentia extrahi posse scribit; Est hæc ex descriptione auctoris fistula argentea aut aenea incurvata, crassitie pennæ obiecti, longitudine vero uariis pedibus cum dimidio aut cliecit; est & undique perforata, in sua extremitate vero habet spongiam ovam, avellanæ magnitudine, firmiter alligatam. Hæc fistula in oesophagum immittitur & fecum modiceque circa eundem, postea extracta, ossiculum aut quicquid simile fuerit extrahitur. Si enim accidit; ut foramen aliquod fistulæ spinam aut ossiculum excipiat, tunc simul cum fistula extrahitur: si minus asperitas ossis spongiæ adhaerebit, & suo loco amovebitur.

Qualiter gula tractanda materia inhaerente vel extracta, vel in ventriculū detrusa, notum satis Chirurgis. Vel hic ostendi potest gangænosam ex aqua hordei cum Syr. Viola. parant, cujus etiam portio deglutiri potest, vel litus deglutendus Oleo Amygd. dulc. cum Syr. viol.

Non est quod hoc loco prætereamus ea quæ in tali casu solius naturæ ope petacta observavimus.

Filius 5. aut 6. annorum Huberti Petri, casu particulam bractæ ore receptam deglutit. Media nutella, quæcumque etiam adhibeatur, hic profuere, tandem particula dicta ex deglutitione fortiore in ventriculū ipsam delata. Hic non nisi continuam usum decocti hoidi cui commixtus syrup. viol. & Alth. commendabam; interim excrementorum alvinorum haud oglesta inspectio, nec tamen deglutitum corpus unquam in eis observatum; nulla puerulo ullo tempore gravis cardiagia, nulla illuca passio. *Idem à Alsteren in observat. Medicæ Chirurgicæ.*

Finis Libri Septimi.



JOH. JAC. MANGETI.
BIBLIOTHECÆ
CHIRURGICÆ

LIBER OCTAVUS

*De Affectibus & Operationibus Chirurgicis à Litera
H incipientibus.*

HÆMATOCELE.

Vid.

HERNIA.

HÆMODIA.



SUNT qui hoc nomine omnem
perforat dentium dolorem intel-
ligunt: verum propriè sic de-
notatur stupor ille qui in den-
tibus gingivisque cum dolore per-
cipitur, vel propter manduca-
tos fructus, aliisque edulia au-
stiora ac acida, vel propter
foecotum salivalem per vasa glandulis eorundem se-
cretionis destinatis, appensa in os derivatorum qua-
litate etiam austriorem. De hijs vide in Dentium
morbis.

HÆMORRHAGIA.

*Super eâ hic afferemus Consultationes & Observationes
non aliquot, easque præcipuè quatenus Chirurgiam spe-
ctant.*

Consultatio.

*Pro perillustri, ac Excellentissimo Inv. Pek-
tinenſe fluorem sanguinis ab ore patiente.*

Perillustrem & excellentissimum virum solitari à
fluore sanguinis ex ore, refertur excellentissimi cu-
rantis; Cæterum quoniam sanguis ab ore prodians
potest vel à capite, vel thorace, vel à partibus oris
profluit, ea propter locum affectum distinguere io-
tetum oportet; quoniam igitur rursi non excernitur,
à thorace non potest exire, vetum quod à capite,
aliqua potest esse suspicio propter hæmorrhagiam,
quam alias passus fuit vir perillustis, ac ut quod
gingivæ sentio libere tæteat, puto ego per palatum
sanguinem hunc à capite emanare, quando sanguis ul-
que adeo copiosus exitus ab ore, à thorace minime
proveniens, nulla ratione possit à glugivis tantum,
vel alia qualibet oris parte prodire, atque hoc eo

magis, quoniam arbitror nobilem patientem absque
sporations occasione, sponte inquam, sanguinem
excernere, quem ideo à capite non est dubitandum
provenire, sed quod à gingivis idem p. odeat, iudicio
est, præter sentis testimonium, simplex expulſio san-
guinis olenta.

Quam ob rem ad causas descendens dico, quod
eum symptoma hoc sit secundarium in genere excre-
torum præter naturam, necessario dependet ab adio-
ne aliqua læta, quæ nulla alia interea esse potest,
nisi quæ facultatis est retentricis, cumque actio
qualibet ex Galeno tertio de sympt. causis, primo
lædatur vel facultate læta, vel propter errorem ex-
ternum, utrumque in caso nostro locum habet, pri-
mum enim læditur facultas retentrix valorum capi-
tis ob anastomum illorum, ut pater ex copioso af-
facim, atque periosice sanguine ex toto, læditur
pariter & facultas retentrix & negativum propter dis-
pedetum, quoniam cum nulla har in illi corrolis,
arque sentu iudice exiguis admodum, calidos, &
motus sanguis excernatur, necessario hunc ipsum
per translocationem exire, est necessarium, quam-
quam & apertis exiguis venarum ad illas per-
tingentium oculis, non sit impossibile sanguinem
prædicto modo dicto. Error autem externus est visum
sanguinis tum in quanto, unde nascitur Anasto-
mosis, tum in quali, unde diapedes, nasci etenim
illam à copioso sanguine fateatur omni-que, secuti
& hanc ex calidiori, atque remuisti, defluit sanguis
hic propter jecur à toto corpore in partes prædictas
per transmigrationem, ori ad locum imbecillum, quem
admodum hæmorrhagia prægesta videtur, attestari
propter jecur quidem; quoniam ut talidum & humi-
dum plurimum sanguinem gignit, ut vero caliditas
factum ab erroribus externis, & in viâ propie-
tatis sanguinem secundum qualitatem culpatum gi-
gnere potest. Quibus ita constitutis, quoniam à
qualibet sanguinis evacuatione immodica, spiritus
dissipantur, calorque nativus maximam jacturam
patitur, non est mirum, si ciborum inconcoctio,
flatulencia, cæteraque huiusmodi ventriculi sympto-
mata, & animalis facultatis imbecillitas fiant; Ad
hæc quoniam in qualibet sanguinis evacuatione
agitatio maxima in ejusdem massæ succedit, non
mirum si in propulso casu bilis commota sit os
ventriculi

ventriculi decussatus Cardialgiam, & per inde lipotimiam inducat.

Quare universa medendi ratio tum in præservationem, tum in veram curationem distingat oportet, merito itaque illius copia sanguinis est minuenda, bilis ipsi commixta præparanda, ac inde detur banda, tandemque jecur temperandum, caputque, ac gingivæ roborandæ merito vero hujus sanguinis impetus in caput est coercedus, per revellentia, & per adstringentia, sanguinemque incassantia.

Quos scopos assequi, etiam haud impossibile præter, rem tamen operisam valde, atque difficilem arbitror, necnon sine periculo, nam malum est quæsi, in hæbitu, causæ morbificæ sunt adeo intensæ, plura symptomata, eaque non contemnenda complicantur, plures partes, eaque principes adiciuntur, & denique vitæ propter morbi acutitatem, ætatemque declinantem non resistunt, ut jure graviora longè mala superimminere, sicuti toties refrigeratio, ac phlebotomia ipsa, sed non ob id ad mæretia Medica non est ut descendam.

Ex quantum ad Chirurgicam spectat, ad præservationem laudo, ut bis in anno secetur basilica dextra per quatuor dies ante tempus illud, quo symptoma hujusmodi prætempore consuevit, præterea si studendum sit curationi, probo venæ sectionem in talo, apertionem venarum scdis per hyarodines, siccas cucurbitulas infernis partibus appositas, ac deum lotiones, frictions, & vincula dolorifica crurum.

Inter medicamenta præservatoria, pro lenienda alvo laudo cassiam cum diacathoco, vel stygium ros. fol. pro bilis præparatione attidet mihi decoctum in aqua calybeata fenchio, cicutii, acetosæ, hepaticæ cum syrupis de succo cicutii, & acetosæ; purgana verò ex Rhabar. diacatholico, & cassia potius infusis, quibus ad usum deductis cogitandum de secunda præparatione, quæ commodè fiet medicamentis proposito, additis phlegmagis, portulacæ, atque syrupis eisdem simplicibus, & rosmarino paratis, pro catartico non displicebit Rhab. cum eodem diacatholico cum decocto myrob. cistria, tamarindorum, sem. plantaginis, portulacæ, & acetosæ in aqua calybeata parato dilutum.

Atque ad alterationem jecoris intus probo serum caprinum, vel vaccinum depuratum & calybeatum cum siccis acetisæ, & cicutii exhibitum, quo persistenti thermæ frigidæ tempore debito epore, possimur autem Villenses, Potestianæ veteres Bæte Virginis Patavii, ac tandem Blandulenses, quæ etiam nullum habeant fulgoris excessum, summam tamen vim abscondit asstringendi, Exterius commendo jecoris perfusionem cum succo cicutii, hepaticæ, additis speciebus confectiois ex tribus sandalis.

Verum ad capitis robur theiaca recens, saccharum ros. antiquum cum bolo Armena, corallis, & pulvere ophioglossi hora somni decorato plurimi facio sicuti & embocam simpliciter a limonem ex thermis prædictis vel aliquo decocto ex arte parato, quod eandem cum thermis facultatem obtineat.

Deinde ad gingivæ roborandas convenit frequens oris ablutio cum istdem thermis, vel cum decocto equiseti ophioglossi, nucum cypessii, gallarum, & malicori in aqua calybeata facto, huc pertinet & succus plantaginis, in quo liquetur alumen, vinum etiam cydoniorum, extrinsecusque laminæ aureæ citè applicandæ.

Pro curatione laudo diatrageantem cum bolo in ore detentum, sic & siccum plantagininis non solum in ore detentum, verum etiam & epocum, in quem

usum pauciter facti theiaca recens cum seminibus hostiam albi.

Quibus omnibus compar victus ratio est addenda, quare excellentissimus parientia vitæ omnem acris calidioris, atque ventrosi inclementiam, abstineat à gestatione granum supra caput, atque demum omnia causæ externas caput ipsum calefactentes effugias, cibum sibi parari curet ad frigidum inclinantem, qui adhuc sit invidicus, unde carnes in aqua calybeata cum pedibus vitali decoctæ maximè probantur, sicuti & oriza, milium, ac fructus aulteris; Condiunt autem cibaria cum succo Anacardium, corallisque ruptis, & aliterent feminibus plantaginis, portulacæ, acetosæ, radice consolidæ majoris, & hujusmodi. Potus sit vini nigri sobausteris, pascifici, quod poterit etiam alterari cum fensilis, corpus exercetantur, modeste tamen ac sine fudofo evacuatione, non statim à cibo, sed ventriculo jejunio, somnus devictur meridianus, fiatque capite humili super palmarum, non plumeum, sed læneum cum floribus rotatum, & nenusatis, Alvos fervetur mollis clysteribus emollientibus, ac postremo studium post cibum, curas, negotia, sollicitudinesque, quantum fieri poterit, sicuti etiam, ac ex candescencia vitæ procreum erit, quibus omnibus ut felicem successum D. O. M. beoigne largiri velit, exopto. Julius Cesar Claudius in consultationibus Medicis.

Observationes.

Hæmorrhagia Gingivarum in pregnante, lethali, cum supervenientibus maculis rubris & sudore sanguineis.

Honesta fœmina juvenula, Pastoris in vicinis conjuj, in septimum mensem prægnans, mense Maio ann. 1624. incidit in hæmorrhagiam subleantem gingivarum, sanguine confertim effluente, die noctuque per septimanas trea continuas, tantæ copiæ, ut aliquot mensulas implere potuisset, unde non tantum maritus, sed etiam quocumque præteritissimum immorbat. Tandem à capite ad calcem usque maculæ succedunt sanguineæ, quas cum sudorifero balneo discutere conaretur, sudor supervenit sanguineus, potissimum circa superiorem corporis partem, ita in locis, ubi ante maculæ sanguineæ se manifestaverant, quem sudorem postea tanta visum omnium dejectione fuit subleata, ut paucis diebus post vitam cum morte commutaret.

Cum 17. Junii 1624. casus hic singularis, à marito prædictæ fœminæ per literas determinaretur, protinus recitabatur lethalis hæmorrhagiæ consuetam honestæ matronæ, conjugis Professoris Gieseni, quæ anno 1621. sub initium Martii febriem continuam patiebatur, ex qua convenientibus remediis adhibitis liberata, circa tempus mensem infans, sub initium Aprilis, incidebat in gravissimam hæmorrhagiam per nates, quam excipiebat sanguinis continuus secretio per gingivas, idque tanta copia per quatuordecim continuabatur, ut tandem præterit alij quoque fluxu sanguinem viribus exhaustis, 8. Aprilis natæ debilitatum solveret. Aderat autem hic constitutio corporis macilenta, sua natura ad actiorem sanguinis collectionem disposita, quam præcedens febris adulescentis plurimum auxerat, unde propter imbecillitatem ex præcedenti morbo relicta, loco menstrualis evacuationis per uterum, fontè viis ibidem relicto præcanti

peccantis meretricis infactis, sursum vergebat sanguis acris, sero plurimo dilutus & symptomaticè per narces ac gingivas profluebat. Quamquam verò Dodonæus observ. cap. 15. Virgini cuidam 18. anno menses non succedentibus, superfluum sanguinem per oculorum angulos sanguinea lachryma continuis, aliisque per gingivas expulsionem sanguinis moliente natura, legerecum foliis scribit, eventum salutari quemadmodum superius etiam sub finem observ. 3. varios alios modos annotavimus: distinguendum tamen ubi tale quid accidit naturæ concurrente, quod in hoc subjecto laborante deerat, ob morbum præcedentem naturæ viribus labefactis. Similis verò casus nobis videbatur prægnantis illius in qua rectè quidem, propter quod utero gestaret, mensum defectus aderat, sed symptomaticè tanta sanguinis hæmorrhagia per gingivas superveniebat, idque propter sanguinis acrioris, terrosi & aquosi constitutionem præter naturam, cujus ratione non tantum ob denegatam adequatam nutritionem & refectionem, debilitas omnium virium introducebatur, sed insuper etiam referatur ab acri humiditate serosa sanguinis venarum osculis, præternaturalia, excretionem fiebat in gingivis, rancum paribus mollioribus, aliis ad sanguinolentiam disposita, cujus rei exemplum refert Marcellus Donatus lib. 4. hist. Mirab. c. 9. ex Matib. de Grado, qui in Montali quadam, non ex abundantia humorum, oec propter causam aliquam violentam undequaque per spiritum, per nares, per uelam sanguinis excretionem ad 18. libras, vidit, licet natura exilis, macilentia & phlegmatica fuerit, quam tamen ab interitu per nativum liberatam fuisse dicit. Imò lenofo euidam Faben Ferrario per venulam gingivæ spacio diei naturalis ultra octo libras sanguinis evacuatam fuisse Marcellus ipse testatur, ut post in quibus etiam sanguis acris sero dilutus abundat. Hinc ego in periculo prædicto, frustra multum illa quæ sanguinis effervescentis hæmorrhagiam lenirent, acrimoniam ipsam temperarent, & naturam corroborarent, præsertim cum symptoma rarissimum, nimirum sudor sanguineus, cum maxima virium debilitate superveniret. Ut autem Rondeletius lib. de diagnosi. morb. c. 1. sudoris sanguinei observat causam in studioso quodam, ad venarum raritatem, illarumque osculorum laxitatem & sanguinis tenuitatem refert, Aristoteles verò lib. 3. de part. anim. cap. 5. & lib. 3. hist. animal. cap. 19. nonnullis ætæ ætate ætate scelerate dicit, propter vitium corporis habitum, scilicet ubi corpus laxum, fluxumque nec non quod sanguis propter cruditatem imbecillitate calotia humefcit, & ut posterior locus habet, *zuvor hyemalibus*, crescit: ita hic etiam accidit istud periculosum primum à sanguinis tenuitate & aquositate, caloris imbecillitate productum, nec non à cuis ejusque pororum laxitate; tandemque tereotricia facultatis languore deducimus, unde neglectis ab initio convenientibus mediis, imò adhibitis illa, quæ morbi vehementiam augebant, inquit quæ balneum erat sudoriferum, eventus letalis subsequabatur. *Gregorius Herpilius libro de morbis mulierum.*

Pro Hæmorrhagia ex dente avulsa.

Domina quedam cum sibi dentem avulsisset, tam copiosa hæmorrhagia successit, ut ferè motetur, irrita omnibus remediis. Vocatus jussi ut emplastrum contrapurpuram sua magna temporis denti avulso responderet admoveatur, item ut aleo & quo dens extraxus erat, parum coicostaria pulverisati adhiberetur cum cotone & digito contineretur.

Hic factis intra horulam substitit sanguis. *Petrus Pachelquus, observat. 28.*

Pro Hæmorrhagia ex Ulcere.

Cum miles quidam vulnus accepisset in brachio, quo radius & cubitus transversum secabantur, tanta secuta est hæmorrhagia, ut post varia astringentia admodum, tum etiam caustica & escharotica, fluxus tamen sanguinis per intervalla recoreret, ita ut Medici de Chirurgiæ de brachio penitus amputando cogitarent. Ego verò cui æger commissus fuerat, linteum complicavi in formam cylindri, longitudinis trium digitorum transverforum, & castillei pollicis, quod perpendiculariter in vulnus demisi; deinde plumaceolis reliquum vulnus spatium implevi, & quia cylindri extremum extra brachii superficiem pollicis castillei eminebat, splenia quatuor admovi, quæ cylindrum æquabant firmabantque: ipsi verò cylindrum quiorum splenium, idque quadratum apposui, ac denique fascia arctè ligavi: & ab eo tempore sanguis amplius non effluxit, vulnus autem non detergi per quatuor aut quinque dies, donec caro intus enata vix orificium impleverit. *Samuel Fermius observat. 1.*

Cum equus comedatori cuidam mordicus digitum abstulisset, sanguineque fluxu, multis frustra tentatis, non succedente, jussi cum in pulli gallinæ vulnus, recenitet Jutes podicem sectum, luteudere, & sic quoad cakeret retinere, fluxoque statim subsistit. *Felix Platerus, obs. lib. 3. pag. 774.*

Hæmorrhagia à vena scia quam nemo sistere valens, solo aluminis tactu curata est. *Petrus Borsellus, obs. 4.*

Rusticus quidam vulneratus in mano, arteriæ lesæ solutionem patiebatur, ubi hæmorrhagia sanguinis arterialis cum saltu frequentè invadebat, nullique remediis communibus corrigi potuit, hic tandem ad collegam meum D. Stromajerum accedens, auxillum in hac periculosa hæmorrhagia desiderat, cui parvillum magisterii opii ad arteriam vulneratam opposuisti, quo ad miraculum usque consummat hæmorrhagia mox restringitur: vulnere post emplastro Rustico Crolliano facillimè consolidato. *Gregorius Horpilius, obs. 12. lib. 9.*

Mirabilis Umbilici Hæmorrhagia.

Sanguinem ex umbilico infantulorum recenitet naturam aliquando nimis copiosè profluere, multoties observavi, ut ex observat. 52. cent. 1. videre poteris. Vasa enim umbilicalia si post partum obstricere nimis negligenter ligata fuerint, sanguinem maxime cum infantulorum damno & vitæ periculo profundunt, ut loco præallegato ostendimus. In adultis vero, quia vena umbilicalis consuehit & in ligamentum transit, sanguinem non amplius per eam naturaliter profluere possit, rationi consentaneum est. Verum naturam materiam aliqua morbosica onerata, aliquando iterum venam illam reterat, per eamque serolos humores copiosè projicere, nonnumquam in hydropicis observavimus, quæ de te vide observ. 47. cent. 1. Sanguinem vero in adultis ex hepate per umbilicum ad h. copiosè, ut in sequenti historia acciderit, profusus fuit, hæc tamen observari non sicut, nunquam me legere memini: ideoque casum ordine recenitet non gravabor.

Dn. Daniel Schenlier, Apothecarius Solodurensis Helvetiorum, experientissimus, homo puerus, obesus & trigessimum ætatis anni in ætate ætatis, amicus meus lingularum, cum superius anno 1612. citæ festum

festum a Dni Joannis Baptiste ad Nundinas Argentinenſis, negotiorum suorum causa profectus, ibique occupatissimus esset, ac quodam die supra modum incaluisse, apertus sibi fuit umbilicus, ita ut ad libram unam & semis sanguinis efflueret, per se tamē de nullo adhibito medicamento subsistit Miraculis famul & petulantibus hac de re tum esset, Medicos eruditos, simul & Chirurgos advocari jussit, qui hujusmodi medicamenta, quæ sanguinis fervorem refrænare solent, exhibuerunt, & exteriis applicaverunt, sed ærgo cum fructu. Altero enim die & subsecutibus, usque ad undecimum, ea nimis leco quotidie bis sanguis, non quidem guttatim neque in parva quantitate, sed cum impetu & copiosè erupit. Toramen adeo erat angustum, ut viz lenient capere posset. Cæcis autem horis (quod præ se vocandum) nintum præchē inter septimam & octavam matutinus, & inter secundam & tertiam pomeridianam, hæmorrhagia illa accidebat. Ut plurimum quoque hoc tempore singulis diebus semel hæmorrhagiam natum patiebatur. Medici simul & Chirurgi, etiam si omnem adhiberent diligentiam, sanguinem tamen medicamentorum beneficio sistere nunquam potuissent, æger ipsemet mihi affirmavit, sed sponte & per se subsistisse. Hoc modo, nintum quotidie bis, totos undecim dies sanguinem profusisse, & interim ad libras usque viginti septem emanasse, à Medicis & ipso ægro observatum fuit. Elapsa undecima die, ulcus umbilicæ accrevit, ex quo loco sanguinis materia putrelenta per menses aliquot exillavit, paulatim tamen iterum coarbit.

Cæterum quia quantitas illa sanguinis, qui undecim dierum spatio, tam ex umbilico quam ex natis efflavit, modum excedere videretur, & via hominem tanta sanguinis copia perditum esse, credibile sit; adeoque rem subulotam esse aliquis æstimare possit, quæstio laboraret: nintum sanguis an putrescere, nec ne. Ego ipsum non putavi, sed aliis humoribus, ipsius levis ichoribus permixtam fuisse, existimo.

Constitutio corporis phlegmatica & obstructions viscærum, quibus antea per annos aliquot laboraverat, fidem faciunt. Seroſi enim humores isti, beneficio naturæ exitum petendos, verum umbilicalem paulatim dilatare: tandemque una cum portione aliqua sanguinis per umbilicum eruperunt.

Ea maxima pondi evacuatione ista vires adeo prostratæ fuerunt, ut nominis summa cum difficultate Solodurum reduci portuisset. Ego 14. Novembris in anno 1622, ea paria rediens, cum ipsum inviterem, dñm illa quæ recensui, ea ipsius relatione annotavi. Umbilicæ catenulam, rotundam & aliquantulum elevatam, & inter vesicæ aqua implere, molem invenit, nec non fluctuationem quandam in ipso percepit. Dolorem præterea per intervalla, in primis verò tussidem & noctu decumbendo, ambulando verò nullum aut exiguum solum adesse, referebat. Venter extensus, durus, appetitus prostratus, & sitis maxima aderant: paupumque dormiebat. Postea verò quid cum ipso acciderit, ad meos redeo, & Solodurum transiundo, si intellexeris, tibi volente Deo, per occasionem committibo. Nunc propter festinationem plura adscribere non possum. *Gulielm. Fabricii, Hildanus Oiserv. Chirurg. Cent. iij.*

De admiranda Hæmorrhagia per Penem.

Aliquantis mihi, vir clarissime, Amice Colendissime, cum Lithotomis, verum Anatomicarum im-

peritis, negotium fuit: Vesicam enim ipsiusque cololum, venis, quæ aliquibus momentis ceteri possint, præditam esse, in dubium vocare ausi fuerunt. Atque hanc acceptam esse opinionem Lithotomorum Empiricorum in Germania existimo. Ex isto porro errore multa incommoda, & quidem gravissima sequuntur: In eadem enim calculi, dum hæmorrhagiæ & sanguinis, qui in vesicam confluit, ibidemque in grumos concreti, rationem non habent, & ut effluat, subsidia non adhibent, putrescit, & gravissima eadem symptomata; videlicet dolores gravissimi, inquietudines, febres, inflammationes, Gangrænas, tandemque mortem ipsam. Verum enim verò rem aliter se habere, tibi, Vir clarissime, omnibusque, qui fabricam humani corporis intellunt, notum est. Ut autem ignorantiam horum hominum exemplo quoque rectellerem, rationesque Chirurgos cautosiores redderem, statui historiam illam observatione dignissimam, de Affectu Dni. Anthonii Marionis, Censuisse mea iussere. Nequaquam tamen illam publici Juris facere volui, nisi prius ad Virum (latissimumque viri ante me ad ægum accessus fuit, referrem ea, quæ Ego hac de te consignavi, quod & nunc facio, submisisse rogans, ut omnia perlegere, castigare, & si quid a me prætermisum fuerit, id abscribere non gravetur: in primis autem obnoxiæ rogo, ut excellentia T. quantitate sanguinis, ab ipso rejecti, à Dn. Capiteano *Meißner* communi nostro Amico, qui etiam curationi inter fuit, aliisque astantibus explicari, mihi quæ significare velis. His Vale, Vir, Clarissime, Consuletissime, & cum tuis æternum felicitate vive. Dabam Bæmæ 18. Septemb. 1626.

Anno 1623, cum vici nonnulli juvenes Feiburgenses saltando ac currendo sese exercerent, accidit, ut quidam ex eis, Antonius Marion nomine, homo vixinti circiter annorum, robustus, & plethoricus, inter saltandum Perinæum contra eartemque scamm angulum allideret, sine ulla tamen cutis vulneracione: quapropter etſi dolor proflus superveniret maximus, nulla tamen secuta est Hæmorrhagia, inde factum est, ut de affectu non usque adeo sollicitus fuerit: sed aliquo modo sedato dolore, cum reliquis suis Sodalibus hilaris esset. Sequente verò nocte adandō dolore, cum sanguinem copiosè emingeret capisset, & intra paucos dies ad libras aliquas sanguinis per penem eminauit, ac ita quidem, ut vires mirum in modum imminuerent, hæud parum perturbatus fuit. Quapropter nobilem & clarissimum virum Dn. Franciscum Prosperum Gottorvium Reipubl. Feiburgensis Medicum ordinarium atque celeberrimum, in consilium vocare jussit. In considerato periculo, in quo versabatur æger, auro fuit, ut ego quoque accerteret. Quarta itaque Martii, 1623, cum ad S. Albium, in agro Avenico sum, ad ægum pervenirem, vires, propter copiam sanguinis, per penem rejecti, mirum in modum prostratas invenis ea quoque die, & subsequente nocte, ad libras circiter duas creverit. De urina, quæ jam separatim cum sanguine permixta erat, non loquor. Sed quod admiratione non vacat, vidi his meis oculis, etiam præſente Dom. Doct. Gottorvio, ægum grumos sanguinis, qui magnitudinem ovi gallinæ eadebant, sine insigni molestia & conatu per ductum utinarum excrevisse, tam valida erat in ipso facultas expultrix. Interfluentium autem veluti gelatina erat, & momento tamen in grumos ipsos concretit. Via credibile est quantum sanguinis per penem eminauit. Interim tamen, divino aspirante numine, feliciter à nobis Sanctat restitutus fuit, & pessimas vires ita recuperavit, ut sequente anno in Galliam profectus sit.

ubi in hunc usque annum 1626. hæc ictibo, castra regis sequitur.

Curatioem autem ut sequitur, instituiamus: Primo victus rationem, quæ refrigerat, humectat, nutrit, & corroborat præscripimus. 2. Sequentem porriculum his 10 die, videlicet mane & vespertinis.

℞. Aquæ Fragariæ, Pteroell. Placœæ, ana ℥. j. β. Syrup. de papavere, Althea Fernell, ana ℥. j. Iriphæzæ magnæ cum Opio, ʒ. ij. Mille fist portio, pro sex dubios, mastucinis, & vespertinis.

Fæquenter quoque interdiu nonnihil de sequente portioe ex cochleate sumebat.

℞. Aqua plantag. Bursæ Pastor. Centomoon. ana ℥. j. Boli orientalis veri ʒ. j. confect. Alkerm. Diij. Syrup. de papavere, ʒ. j. melle. Perineo sequens cataplasma applicuimus.

℞. Farin. hordei ℥. j. β. pulv. Balaostri. Nocum cupress. Rad. Bistortæ, cornetill. an. ʒ. Rosar. ʒ. β. Cum decocto rad. & Foliorum plantag. patumque acet. rosar. fiat cataplasma, applicetur tepide. Imo ventri, quia de dolore extensio, propter copiam sanguinis in vesica collectæ, conquerebatur, hoc applicuimus cataplasma.

℞. Paricost. malvæ, altheæ, an. m. j. flor. chamomill. melilot. sambuc. an. m. β. sem. melilot. fœnigrec. anisi, ana ʒ. β. melle, fiat omentum pulvis tenuissimus. Hujus pulvetis.

℞. Ans ʒ. j. β. fœtin. fabar. ʒ. ij. coquuntur cum lacte vaccino, fiatque cataplasma, addendo vitellos ovorum oom. ij. Buryt. recent. ʒ. applicetur tepide. Regioem Renum sequente unguento inunximus.

℞. Unguenti refrigerant. Galeni ʒ. ij. ol. nymphaez, ʒ. j. Camphoræ dissol. in acet. rosar. ʒ. j. Misceatur in mortario, fiatque linimentum.

Cæterum, quoniam propter maximam, & ferè incredibilem sanguinis depreditionem, & proinde hepatis refrigerationem atque labefactionem, secuti fuissent viscerum obstruictio, & cæchesis, visum nobis fuit, ut sequente uteretur Syrupo Magistrali, qui non tantum viscera referat, sed & internum ulcus cistic collum vesicæ, propter casum, factum, consolidat;

℞. R. ʒ. fœniculi, petroselin. asparag. ana ʒ. β. herb. betonicæ, scabiol. agrimon. veronicæ. Alchymill. Pyrol. fœnicul. ana m. j. sem. anis. fœniculi, Urtic. an. ʒ. ij. flor. trion cordial. Geoiit. Hispanicæ, an. p. j. liquirit. muodst. uvrsrum excinat. ana ʒ. j. Fiat f. an. decoctio in aqua fontan. ad consumptionem tertie partis: Colatura adde Mellis despumat. & sacchari misceliani an. ℔. j. fiat syrupus f. an. stomatizetur speciebus stomatici rostr. & Diarrhodon. Abbatis, an. q. s. de hoc syrupo sumebat æger singulis diebus per tres horas ante prandium cochleate unum aut alterum. Sumebat quoque per intervalla ad ʒ. j. aor ʒ. β. cerebieth. elazæ, cum pulvere liquiritiæ. His non sine admiratione multorum feliciter & perfecte sanitati restitutus fuit. Quid non potest Juventus in corpore integris visceribus prædico? Idem Cæmariæ vj. Observationum.

De periculosa Hæmorrhagia per pudenda, in Puella.

Casum illum gravissimum, quem vidimus una in Do. Antonio Marione, Vir nobilissime, Amicæ plurimum honorande, oco ita pridem confisgavi, & ad T. excellen. missi. Ab eo pro tempore, cum quadam die adversaria mœa revolverem, en incido

in casum non longe absumilem quem tibi communice volui.

Anno 1522. 5. Decembris, puella quædam ex nobilissima familia Betneoti orta, quique citciter annorum, cochleate oblongo manubrio, qualibus in Colica utuntur, in manu gerens, cum ex scanno in pavimentum hypocausti decidisset, & mucrone manubrii iofimam partem colli matricis, vestus intestinorum rectum vulnerasset, tanta secuta est sanguinis profusio, ut patres ipsa, & adstantes, non semel ad me dixerint, se nequom credidisse, corpus tam exile ac juvenile, tantæ copie sanguinis perditum. Ad libris enim aliquot effusisse, ausus sum affirmare. Restricto tamen sanguine pulvere nostro ad sistendum sanguinem, & retocillaris æque inflaturis visibus, vulnus, quod ad intestinum rectum fere usque penetrabat, brevi feliciter curavimus, & in hunc usque diem visit.

Ex hac porro historia, nobilissime & clarissime vir, apparet imprudentia Liboromorum quorundam, qui Hæmorrhagiam istis in locis esse perimefendam, negare conantur. Videmus quoque, pueris urgente necessitate, & præsertim in morbis acutis, vrosfectionem, quam vulgus tameo Gemomorum tantopere respicit, sine ullo periculo administrari posse. Si enim in hac puella ad libras aliquot sanguinis, sine viæ discrimior, effluxerint, quid, quæso, obstat, cæc Medici rationalis ad paucas uncias non extrahat Idem ibidem.

De sanguinis Narium fluxu per oculum sinistrum.

Teste Aristotele solus homo inter omnia animalia hæmorrhagiæ oarum subiectus.

Sollicitos hæc non raro facit non solum ea laborantes, sed & adstantes, imo medicos ipsos, media quibus fluxum hunc inhibere studemus gattarem sanguinis ex stillante numero sæpius respondet, ferè sine ullo successu adhibita.

Heraclides Tarent Galeno auctore ablato prius eruoate naribus inhærente, ad fluxum hunc cohibendum, turundam lyeio confuso immixtam naribus intrudere solitus fuit.

Chirurgi Germani, qui castra sequuntur, fœmilla adhibitis captionem lapidibus, vel moicho cravis defundorum ionaro, vel etiam bufone preparato, ad verba quædam quibus virtutem occultam inefficerto sibi persuadent, plurimumque tribuunt, ipso Borelio Cent. 1. obf. 94. afferente, quæ tacite (quod si enim aliquis audiret, vana omnia habent) mullant: sunt hæc idiomate germanico.

Gelijck Christus stil bleef staan in Iordaan, Also myn ook diene bloede staan.

Pro secreto habent alii ex puris sanguinis ex stillantibus quatuor aut quinque vitiolo cyprio pulverisato mixtis conficere unguentum asillæ illi quæ est ejus lateris, cuius nates flunt, illinendum.

Missa his similibusque aliis, nullas consideratiois & efficaciz merito habendis, hæc inutile quantum omni tempore negotii veteribus æque ac recentioribus, medicis, chirurgivæ sanguinis hic per nates fluxus creaverit, exponere, cngnoicereque.

Hæmorrhagia narium quavis, docente Hildano, parte 2. obf. 14. si moderata fuerit, cum florētis, subito suppressi non debet, à dolore etenim capitis, varisque aliis morbis gravioribus hominem liberat; confirmat hæc exemplo *Simonis Clerici arrisadii parte 3. obf. 11.*

Critica

Critica solutio morborum, salutis sæpius, variis periculis causæ morbificæ evacuationibus, per alvum, sudorem, urinam, sanguinis fluxum variis, etiam illum qui per nares fit, quæ de ætate legi possunt quæ lib. 22. cap. 18. de *Fontan. refert Ambros. l. 1. c. 1.*

Animus haud est, ea, quæ medicæ considerationis sunt, ut chirurgicæ proponere, facinus tamen hæc eo, ut chirurgi tyrones attendere discant, quam arduum malum narium hæmorrhagia gravis, quamque necessarium, remediis cæcis huc conferentibus instructum esse.

Haud ita pridem ex inordinato sanguinis morbo non solum largior ejus fluxus per nares, in Wilhelmo ab Especom, mercatore hujus loci, à nobis observatus, sed & (quod nunquam antehac notare mihi in praxi chirurgica licuit, ab aliis, ut Barthol. cap. 1. Hist. 2. Schenk lib. 1. fol. 197. &c. propositum) per oculos ipsos, fissuram imprimit, sic ut lineæ quoties tolleretur oculo collectus, toties novæ eodem illico repletur.

Hildano minus notam sanguinis fuisse per oculos excretionem, vel ex eo colligere licet quod part. 2. obs. 26. de *Rever. D. Joanne de l'Osse agens hæc proponat verba: Et quod mirandum, lacryma sanguinolenta ex oculis prorampent.*

Hujus conditionis inordinata de ebullitione sanguinis Hild. part. 6. obs. 77. exemplum addit, in *Rever. Doctissimoq. Viro, D. Jacobo Blaunero*, pueri robusto, observat, hæc verba præponens.

Hinc viro sanguis non tantum ex naribus cum impetu promanabat, vetum etiam ex gingivis & quidem sanis & inconcinnis exsudabat: ita ut sanguinem non solum respiceret, sed & hinc inde circa gingivam, sub lingua & intra dentes in giunos concretum coegeret digitis extrahere.

Mercator noster consilio Medici domesticæ venæsectionis admisit, imo potiones varias refrigerandi, sanguinisque motum inhibendi vi polleentes, quin & styptica quædam naribus recepit, est frustra adhibita omnia, fusato hinc Amici cupidum lapides sanguinis effluens cohibere valentes manus detinuit, etiam si aliqui jam coagulatio in oculo observaretur, & horum alia levaminis aliquid percepit.

Media hæc similive alia cum successu licet sæpius usurpata, in gratiam nihilominus juniorum placet nobis, antequam huic discamus siorem imponamus, quædam eorum, quæ usui nobis facere, nec unquam fere nisi cum opato successu adhibita, quoties gravis ejusmodi narium hæmorrhagia ex sanguinis excedente ebullitione causata, homini fore molesta, hoc loco proponere, quod exemplo novo alterove illustrabimus.

Ante aliquot annos Rusticus quidam, juvenis, v. l. idus atque canosus hæmorrhagiæ tentabatur gravi admodum, venæsectione brachii dextri insilitura sanguinis libram integram eduximus, mox succum plantaginis commixtum succo limonium naribus recipi curavimus. Vincula iridem brachiis, pedibusque insecimus, lineæ frigida madefacta fronti, testibusque apposuimus, adstringentia nostris in locis usalia applicavimus, ac nihil his omnibus effectum fumentis pro cerevisia, aut Sp. vini cocti reliquis, quibus faginatur potui, quibus multum in hoc casu tribuere vult, cum succo plantaginis mixta assumeret suavis, ac frustaneus omnis labor, continuabat fluxus, nec ullo modo imminebat. Incidebat obs. 17. part. 2. Hildani haberi, sponsum quendam periculosa imo ut videbatur, lethali hæmorrhagiæ narium laborantem fusato Hild. refrigeratione uiventi corporis, in aqua frigida facta fuisse curatum; hujus ad exemplum etiam author sui nostro agrotanti ut fluvio vicino se committeret nudum, quod etiam fecit, natationique satis diuturna cor-

pus suum adeo refrigeraverat, ut tremulus prodiret, ac nec hoc medio fluxus sedatus.

Hicæ sic frustra usurpatis Limonis recentia particulas teretes, lineo combusto, pulvereque gallarum, incrustatis naribus imponi possimus, & quidem ad eam altitudinem, ut valorem sanguiferorum extremitates, si quæ essent læsæ, attingerent.

Intus affumebat quantum cochlearibus tribus contineri poterat, sanguis tubus horis, mixta hæc hujus, & quidem frigida.

26. Aq. plantag. 3vj. sal. prunell. 3j. laud. opiat. gr. iij. camphor. gr. iij. fyr. papav. citrat. 5. 6. spir. vitiiol. gutt. x. misce & detur usui.

Assumpta prima dosi, illico fluxus imminutus, imo sine ulteriore hæmorrhagiâ non fuit quiesca.

Joannes ab Heermstede, juvenis 18. circiter annorum, macilentus valde, & ex di. turno morbo debilis admodum, ex casu incidit in narium hæmorrhagiâ largam; vocatus ergo, quo laboranti succutere, venam tectare haud audebam, quod vires impedirent.

Remedia hinc alia in usum ducere necessarium, styptica nempe naribus imponere ordinaria, vincula pedibus manibusque imponere, lineæ frigida in defacta fronti, pendensque applicare, ac ita ut omnis labor, conchi adeoque etiam in hoc agrotante ad usum mixturæ modo præscriptæ, & limonium modo dicto naribus imponendi loti devent, applicito insuper fronti emplastro nobis in tali casu usuali, cuius descriptio hæc est.

26. Succ. caudæ equin. portulac. Solani, plantag. an. 5j. ol. rosar. myrtill. cydonior. an. 3ij. coquantur olea succi ad consuspensionem succorum, dein adde cæx flavæ q. l. lipid. hænarior. bulli veri, nucis gallar. cortic. granator. an. 3ij. Ecce emplastrum.

Et hoc modis usu brevi sanguinis fluxus dicta sedata, licet in deliquium animi grave satis jam bis incidere ager. *Jes. à Meken in Observat. Medico-Chirurgicæ.*

Vermis ex Nare sinistra cum longa Hæmorrhagiâ adductus.

Sua oculus quidam ætatis circiter annorum viginti, constitutionis phlegmaticæ sanguineæ à tenerris unguliculis caratris admodum obnoxius, per biconium & quod excurrit hæmorrhagiæ narium haud infrequenter exercebatur, sine ullo vi. m. lapin, quam tubide Cephaligla excipiebat. Morbo temporis tractu admodum septies de die à nare sinistra copiosissime profunder cupit sanguinem: hinc variorum pronata symptomatium congeries, dolor & imbecillitas capitis, vitium prostratio, stercostrationes frequentes, & tristis ac convulsiva quasi nasi circa appendicem sentatio. Non ita pridem iterum in largam narium incidit hæmorrhagiâ, quæ per quatrimum sèvire non desinebat accedente d. nique quinto, cum sanguis affarim effluxisset, in sinistro naris pitamine aliquid exitum impediens hæc tere sentiebat quod dum fortiter emugge, vermis hirsutissimus ad instar sanguine turgens, in terram decidit, viæque per triduum.

Solutioni plura vetum, post vigilas perpassas, cephalalgias, & mentis aberrationes & naribus excretum exempla habentur in Anno II. Eph. N. C. obs. 147. apud D. Conto. Viâ. Schneiderum de offic. p. 44 &c. D. Joh. Michael Febr. N. Cur. in sua Hiera P. cta p. 79. D. Th. Barth. cent. 2. ep. 74. D. Nicol. de Blegny Ann. I. 2. od Med. Gall. m. Febr. April. obs. 3. Theod. Kerkringium obs. anat. 43. Nic. Tulpium L. 4. c. 1. Petr. Borellum cent. 3. hist. 4. Jac. Hollerius I. 7. de morb. int. c. 54. in Schol. Guil. Fabr. Hild. cent. 1. obs. 8. & cent. 5. obs. 1. Nic. Nardem hist. med. simpl. cap. 14. Joh. Georg. Schenkium

k. um l. t. obf. mod. Marc. Donarum l. 4. de hift. med. mir. e. 26. nec non Vinc. Alliarum Crucium de quæf. per Epift. cent. 3. Nec inditum abire debet, quod excell. DD. Jo. Jac. Harderus non ita pridem per literas mihi retulit, de mæfieriata quadam, nupet felicitæ vermes quatuor præcedente atrociffima cephalalgia, per nares cam excreviffe, albicantes, oblongos, minimèq; hafufos. Ipfe etiam Ebfina lib. 3. fen. t. tr. 2. c. 3. ex medicorum quorundam idotum fide, cephalalgiam quandoque generari jam edocuit à vermibus in capite generari, motu fuo, remione & tofione laderibus, addens: nam vermes multos nales natus in anteriore capite & inpet locum, qui est in ftrictura narium, & poffibile est, ut nalcantur apud velamina, etfi à raru contingit. Locum generationis non femper eundem effe, veriffimè videtur: interdu enim, licet rarius, à patribus inferioribus, utpote ventriculo, &c. accendit, perq; palati toamina fic in nares petrepliffi, hæretum vero in ipfa nares invellente membrana, aut anfractuofa eorum cavitate, quandoque in caverna offis frontis ad radicem nafæ fic, quandoque etiam in ipfa offis ethmoidis fpongiosis cavernis ftabulari poffe, autumo, quin & fi ceterum ipfum per nares exeretum aliquando fuiffe perpendamus, quod celeb. D. Georg. Wolff, Wedelius Phyfiolog. med. fct. 4. c. 24. f. vidit tellatur, eam non ex ipfo cerebro, in quo vermes quandoque inventos fuiffa D. Th. Baphtent. t. hift. anar. 64. aliq; nemorant, eodem aliquando prodiffi, dicte licet, hand video. Utrum vero ex oculis infectorum cum cibis, &c. afumtis atque ad partes idas delatis: aut vero ex fingulari humorum putredine oriantur, eruditioribus difpiciendum relinquo, uni enim ovula infectorum ejusmodi, præcipue minifma eum fint, in remotam illam corporis partem cum maffa fanguinea deferri poffe, nemo dubitabit: ita tamen arguenda, quæ generationem abique femino ifto arguor, & à Frafe Redi in libello de infect. pofuerunt, qua ratione omnimode enervari queant, non petipicio. L. Schrock. L. F.

Vena Scellio fponanea & naturalis.

Hæmontis fanguinis evacuationes acerbiffime infectur propemodum omnes. Rati nem intet ali. adduct hanc: ejusmodi remedi genus à natura non quata ferendi, nec approbari divinitus, fed potius improbari per legem Moiaicam Gen. 9. v. 6.

Ut hoc ridiculum, ita illud expientie contrarium, Opponunt hæmorrhagie eretice natiam, fiftus hæmorrhoidales, ut multis Hypochondriaci confticti, ita maxime profici, nec non & aliarum venarum diarefis fponanea, quæ fatis probant naturam non-nunguam intendere fanguinis immutationem.

Venam Malleoli in femina crubibus varicosis onerata vidi fponie apertam cum tanto fanguinis profluvio, ut adhibenda effet nana chiturgica.

Marionem novi affinitate, mihi jundam, quæ Cephalalgia urgente aliquoties venarum fublingualium fedione quævit limimen. Hæc aliquando fub fute Siftio faciens iter, dolore capitis ob affum correpta est recidivo. Domum reverfa fub cibi mactatione fublingualium fenfe apertam, quæ pro more fluens, felicitet mitigavit dolorem. L. Sigismundi Græff.

De Aquâ Stryptâ pro Hæmorrhagiis fiftendis fructuofa.

Hamburgi à Cl. Vito D. Michæle Kiffenlo noftel amaniffimo accepi, miffa effe Florentia à Fr. Redi ad Fogdium variis experimenta ab Aquâ ftyptica facta;

præterea obfervatum interdu aqua communi vincta arteriarum fanata, de quibus per literas idem Kiffenlo poffhæc effe amice confulendus. Alloquin nuper Hamburgi egiege, ut accepi, probata eff aqua ftyptica in Nobiliffimo quodam viro, cui fub brachio finiftra arteria gladio tranfixa interitum profluvio fanguinis minitabatur. Mihi etiam ibi delatum eff cochieat unum ejus liquoris ipfi Medico Hamburgeni propinatum.

A laudato Kiffenlo exinde rem ubenius expofitam 7. Augufti, accepi filius Calpar Bartholius, & exercitationi feptimæ Miffellan. Leiden 1675. edicæ intervæ huc tranferam quæ compendio adducunt, inibi enim eff vafculum, plenum aqua clara limpidâ, quæ fiftit omnem fanguinem ex quocunque loco proluentem, modo tam lubito & certo ut nulla opus fit falcia, fufficiat tantum madefacere, aut imponere goffypium aut pulvillum ex panno lineo, aqua madefactum.

Et telatum eff etiam ita canem fanarum, cui vena jugularis cum arteria fuit præcifâ, & duos vitulos, quorum uni crus abiffum, atque mulierem, cui mamma telecta, denique viros duos, quibus crura amputata.

Francifcus Redi, juffu D. Docis experimenta fecit; quæ tamen expectationi non respondebant. Anno 1673. d. 10. m. Julii & feqq.

Ovi detecta eff vena, cum arteria, jugularis, five læfione mufculorum aut nervorum, deinde arteria cum vena plane diffecta per tranfverfium, & flatim adplicitum goffypium, madefactum liquore, & fuperimpoftis pulvillis manibus firmiter teneretur & apprimetur loco fanctiori, nullo modo fifti potuerat, ovifque fit mortua intra quadrantem horæ.

Idem evenit cani, cui præcifâ erat arteria jugularis, fine læfione vne.

d. XI. Julii. Rufus arteria jugularis detecta & feparata eff in ove, atque phlebotomo fecta per longum, eo modo quo apertuntur à quibdam venæ. Non permiffum eff exire fanguini, quoniam arteria digtus compreffa tenebatur. Statimque applicatum goffypium, & pulvillus liquore madidus, per quadrantem horæ. Nilul exiit fanguinis. Hinc l'grum eff vulnus fiftit, ovique demiffa. Verum poft alterum horæ quadrantem, cum violente curfus ovis fatigata effet, & inieptu indeliffet, falcia à collo deciffa, & fanguinis copia proflavit, ut mortua fit.

d. eod. Iterum ovi jugularis arteria, & alii vena eo modo aperta eff obligataque ne ante. Nil fanguinis exiit, dimiffa oves ad pascendum ita duravit fpatio hor. 41. Poft id tempus vulnus arterie incife detectum eff, & fubito erumpente fanguine animal mortuum eff. Idem evenit, cui vena fecta, evenit. Confpectumque eff, venam nullo modo consolidaram.

d. XV. Julii. Tres oves capæ quibus arterie jugulares detecta. Unius arteria diffecta per tranfverfium, digitis comprehenfa, ut nihil fanguinis emanaret. Aqua vulnus rigatum & digitis confiftum, per 10. minuta temporis. Retradis digitis flatim fanguis exiit. Rediit enim ad madefactionem & compreffionem eam per 10. minuta alia, retradique digitis fimiliter lecta hæmorrhagia. Ergo rufus itigato vulnere & fuperimpofto pulvillo, manu compreffum eff fpatio 20. minutorum. Quo tempore cum exiffent fanguinis uncie quinque vel fex, tandem ille confiftit. Obligataque plaga, ovis dimiffa flatim cepit comedere. Eodem plane modo tradata eff altera, eventu quoque eodem, nifi quod loco aquæ ftyptice accepta' fit aqua fontana pura, & octo vel decem uncie fanguinis calerint antequam fiftiretur. Tene ovi

ovi arteria diffusa est non per transversum, sed per longum, impositio pulvillo madente aqua stiptica, & detentio firmior per min. 20. Nihil fere sanguinis exit. Obligatoria plaga in partem missa est, in quod etiam priores dant. Omnes hæc recte se habuerunt d. 15. Julii, quo in illis periculum factum, & seq. 16. sed circa huius vespasum primæ caput intumescere coepit, cicerique et mor usque ad d. 19. mane, quando mortui est. Alteri caput similiter tumere coepit d. 17. & d. 20. mane, illa quoque mortua est. Tertia ovis se semper bene habuit octo diebus, & tunc facia deinceps est. Arteria consolida inveniebatur, multa carne generata. Valvæ impositus pulvillus in linteo sicco & rursus facia costructam. Post d. 10. deprehendebatur vulnus placidè consolidatum cicatrice indurata.

d. XVII. Julii. Secta est in ove arteria cruralis, & eadem aqua stiptica adhibita: sed post triduum mortui est reperta.

Eodem die in alia ove arteria jugularis per longum est aperta, & aqua stiptica adhibita sine ulla sanguinis emissionem Plaga fasciis costructa per continuos d. 3. detenta est, ut ne tangere quidem. Quibus elapsis inspecta vulnus est: optimeque habere se deprehensum, ut in aliis d. 10. ut priores consolidatum.

d. XVIII. Julii. Secta est arteria cruralis in ove & eodem modopoli medicina facta. Reperta est mortua post triduum.

Eodem die in alia ove aperta est secundum longitudinem arteria jugularis & aqua adhibita eodem modo, ut nihil sanguinis effunderetur. Vulnus obligatum servatum est per octiduum, ut ne attingeretur quidem. Elapsio eo se habuit, & intra X. dies profusus convalluit.

d. XIX. Julii. Arteria jugularis per longum aperta in duobus hædis. Adhibita est pro medicina aqua fontana, & nihil fere sanguinis exit. Unus mortuus est intra quatuor dies. Alter perfecte curatus d. XV. absque fasciis, quibus vulnus obstruatur.

d. XX. Julii. In ove arteria jugularis secundum longitudinem incisa & vulnere suis longum: in alia eadem aperta angusto foramine. Priori adhibebatur pulvillus madens albumine ovi, & nihil sanguinis emisit; alteri pulvillus madens aqua fontana. Utraque penitus convalluit sine fasciarum solutione aut mundificatione vulnitis.

d. XXI. Julii. Arteria jugularis in duobus agnis secundum longitudinem secta. Scarum pulvillus superimpositus ex gossypio imbutus aqua fontana, & ap-pressus manibus per 20. min. hor. Nihil fere exit sanguinis. Intra d. 18. deprehensum est vulnere perfecte consolidata sine ulla alia providentia. Non vero hi agni curantur, sed omnes oves prædictæ, sub dio relictae sunt dies noctisque sine ulla custodia.

d. XXII. Aug. Truncata ala dextra in duobus caponibus, in medio ossis superioris, obligaturamque vulnus gossypio imbuta aqua picea, & evaserunt.

Similiter ei evaserunt pulli gullinacæ in quibus omnibus truncata alarum una: quorum sex Medicina facta, adplicito gossypio aqua communi madente: sed alii apudmodum gossypium siccum, sex reliquis nihil adhibuerunt. Naturæ providentia tellectis. *Casspar. Bartholinus Thomas Filius.*

Aqua Stiptica ex quibus conficitur.

Cum de aqua stiptica super incidisset sermo in phar-macopolo Johannis Godfridi Becker, ipse, quia est rerum Chymicarum sagacior, non dubitavit similem aliam aquam sanguini fistendo appropriatam posse componi, quod alios quoque attentè accipimus.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

An vero paria cum aqua illa, quam Philippus Ha-quart Hafniae jam componit, & istius mortalium destinat, facere possit, non audim dicere. Quanquam enim sapor eandem indicet, potest tamen latere alia simplicia alioquin vires, quam ignorant qui vera descriptione carent, quæ jam clementia Augustissimi Regis nostri Chirurgi dextertimo Haquartio innoteat, cuius etiam aquæ efficaciam experti sumus non semel, & omnibus quatenus possimus commendamus: suspicatur vero Beckerus nosse ad huius imitationem posse componi aquam & piceam aliam, de qua, ut & de Vatriolo ipse ad Acta nostra hanc dissertationem misit, quam ex more illius hic subiungam.

Aliquam partem aquæ stipticæ Gallicanæ nactus sum, eamque diligenti examine deprehendi constare ex vitriolo & alumine, quamquam hoc commune vitriolum; non intelligam, sed ex Metallico vitriolo. Licet commune vitriolum, quod vel nativum vel ex terra extrahitur, etiam ex metallis accidentaliter exsurgat, non si nullo metallo in tectis visceribus reperitur, nunquam vitriolum exinde produceretur. Sine cogitavi hic locum habere Juris Consultorum axioma: quo quidque modo ligatum est, eo dissolvitur. Quod axioma ad Chymiam Hermeticam applicari potest, & ab alio hoc modum transilum est, sed alio sensu, quippe illa de vera solutione aut illo loco cum illius homogeneo primo eunte sive vero solvendi explicandum iudicat, scilicet, aurum debet radicaliter testari, ut nova regeneratio & plus quam perfectio produceretur, ita ut imperfecta metalla etiam tingat, & in istam formam commutet. Ego vero hoc modo applicabo, quo commodissime potest explicari: quodcumque quis se læsit, sive vulneraverit, quod solo hente ferro sive ferreis instrumentis ordinariis, / quamquam etiam viro absque rebus vulnerari possimus, sed ratione vulneris in illi res eadem est / tum optime curabimus eadem materia. Aquæ stipticæ ei concedo, plus tum valere, quando in forma liquida adhibetur, quia facilius datur illi ingressus quam formæ emplastris aut unguentis in vulneribus, sympatheticum tale emplastrum ante placentios annos confecti. At unguenta & emplastra, quæ plerumque ex oleo & cera conficiuntur, prohibent accessum, ut omnes vulneris partes attingi nequeant, & quamquam unguenta mollia omnes puncturas attingunt, non potest tamen materia ex matre & alumine ita composita, quia aquosâ, propter pinguedinem aggredi illas. Hinc, ut dixi, aquæ formam præfero, ita tamen ut vulnera bene clauduntur, ne accedant impuritates. Ego meam aquam ita confeci. Recepi partem Limaturæ Martis, additis spiritus vitrioli rectificatus tribus partibus. Blando calore quia per se calefit, impositi donec corpus dissolutum & spiritus coagulatus esset. Deinde tantum phlegmatis vitrioli (quod nihil aliud est, quam aqua communis, nisi spiritus aliquis in prima distillatione una ascenderit) additum ut bene solvi perneret, & phlegmati. Mos alumen crudum in sufficienti, pro lubro, aquæ destillatæ pluvialis quantitate solvi, ne aquam Gallicanæ acrimonia superaret, utramque aquas simul miscui, & per duos dies ita reliqui misit, ut resideret. Quanquam antea fuerit filtrata, tamen aliquæ feces remanserunt, per subdientiam separandas, quæ nihil aliud sunt quam Sulphur vitrioli. Cætera, cum sanguinem sistat & sanare sine escharea, mira non est, quia simile metallum dissolutum majori longe est efficacia, quam si alio modo destruitur, quando solum aceto, quo bene omnia dissolvantur, vel etiam sulphure destruitur, qui spiritus in labore evaporat, & ita Mars sicut caput

Est

mor.

momentum seu scoriz remanet, quod ulteriorem nullum vel certe exiguum ingreditur habet, quia petiti ipsi spiritus, qui ipsum dissolvere debebat.

Existimo etiam aquam libramodi vitriolatam solum fuisse sanguinem sustinendo & curando, sed quia alumen priori aquæ admixtum in examine deprehendi, etiam illud addidi, a quo aqua vitriolata dulci foret sapore, & à priori differret. Quia memoriz meæ jam occurrit, narrabo quid nuper mihi evenisset D.D. Simon Pauli senior nollet medicare, præteritis diebus ad me veniens, allatque secum v. tro aquæ flavæ, quod à Martona quadam præmæ notæ acceperat, quaesivit, an non illud possit qualis sit aqua & ex qua metia composita? Ego quamprimum gustu explorasse, statim divinare potui in his diu exercitatur quid illi subesset, inde duplici processu instituto, inveni primam aquam purpureo rubram eodem pene sapore, quam credo eandem habere virtutem, sed quia facies per destillationem separata non fuit, colorem flavum accipere non potuit aqua, verum purpureo rubentem. Hinc mecum ratiocinari cepi: si eo modo aquam fuisse non credent illi, qui ea ulius sunt, eandem esse. Igitur secundam operationem tentavi, & ita destillatam aquam observavi eodem sapore præ tam & colore, adeoque eadem virtute. His finit ex condidit reverfus D.D. Simon Pauli visum quomodo successisset operatio mea, qui gustata utraque aqua, meam præter eandem esse iudicavit, idemque eandem quoque virtutem: Idcirco utrumque vitrum secum tulit exploratum eventum veritatem, de quo nullus dubito. Est vero aqua crismatica ad faciei rubedinem tollendam omnemque levigandam, composita ex fixo & volatili sale unius subje. Et. Igitur nisi similem hanc aquam eam altera mihi allata eisset, non habita fuisset pro eadem vel ejusdem virtutis, quanquam nescius non sim, ipsum auctorem hujus aquæ ignorare similem flavam & volatilem ex uno corpore esse. Quia verò hominum non novi; nec Chemicæ peritum credo, hæc relinquo: Sum enim qui quidem componunt aliquid, idque recte, sed quia tandem tota resum ignorant, sint licet petiti, ultimus non inquirunt: Non facio cum illis, nec ita ego a. quiesco.

De Liquore Syptico Experimenta.

Percebitur hujus aquæ fama inter Gallos Anglosque naturæ curiosos, auctore & inventore Gallo Dr. Vivient Colonello, & variis experimentis in Anglia confirmata fuit eo successu ut seculum hoc 5000. Imperialibus in usum classis fuit comparaverit Seren. Magnæ Britannia Rex, Hasniam nuper idem secretum advexit Dr. Boudet, de quo hoc Programmata in vulgus disseminavit.

La véritable & infaillible Essence Syptique, pour arrêter le sang, dans toutes les Playes en un moment.

On doit convenir de bonne foy, que tous les siècles passés, ont ignoré la nature & les qualités merveilleuses de cette Essence Syptique: & que jamais on n'a trouvé un remède infaillible, prompt & sans crainte de retour, qui arrêtas le sang sortant de toutes sortes de vaisseaux, grands & petits, Arteries & Veines ouvertes, piquées, déchirées ou emportément coupées; comme le fait cette liqueur, le bonheur & le prodige de cette fiente, le trésor abrégi de la vie & de la santé publique: Elle a une qualité très particulière pour le saignement du nez, pour le flux des hémorroides immodéré, & pour le dérèglement des ordinaires des filles en femmes. Dans les playes on ne sauroit trouver un plus excellent remède; son effet se fait sent sur l'heure, & perdure en un moment. Elle ne se corrompt jamais, &

ceux qui la savent à fonds & d'original, la savent comme de l'eau commune, en sens l'effet sur leurs personnes; & ce que les Copistes en Contrefaiteurs de cette eau n'oseroient jamais entreprendre.

La manière de se servir de cette Essence, est de tremper un tampon de linge dedans, & l'appliquer sur la playe avec une compresse par dessus, trempée dans ladite liqueur tenant les doigts par dessus.

Ladite Essence se fait par Le Sr. Boudet, & en la vend avec permission des Supérieurs.

Ut ab omnibus legatur; etiam totum lingua faciet. Hic igitur verbum Gallicorum scias est.

Vera & infallibile Essentia Syptica ad sistendum sanguinem momento temporis in omnibus vulneribus. Bona fide fatendum est, omnibus seculis præteritis ignoraram esse aurum & miraculosas qualitates Essentia nostræ Syptice, nec unquam inventum esse remedium infallibile, promptum & sine recidivæ metu, quod sistat sanguinem excurrentem ex variis vasibus magnis parvisque, Arteriis & Venis aperte, incisus, ruptis aut prius dilatis, sicut liquor hic facit, felicitas & prodigium nostri sæculi, thesaurus compendiosus vitæ & sanitatis publicæ. Habet si. gularem qualitatem ad natum hæmorrhagiam, ad fluxum hæmorrhoidum immoderatam, & ad inordinatos menses puellarum & mulierum. Ad vulnera excellentissimum invenit non potest remedium. Ipso quasi momento effectum suum producit. Nunquam contumitur, & qui principia ejus & originem norunt, bibunt aquæ instar communis, in se ipso p. thulium facientes, id quod nunquam solent temere qui ad imitationem hujus similem aquam præparare præsumunt.

Modus utendi hic est, ut linea petia eo liquore imbuta applicetur vulnere, super imposito comprimente eadem liquore disto, digitisque impolita.

Laudatam Essentiam conficit Dr. Boudet, venditque cum superiorum licentia.

Quoniam efficaciam Essentia suæ passim probatum & se tuist. affirmavit Boudet, veritatem tamen ejus experimentis ad oculum nobis quoque insinuat probare voluit. Igitur ab Illustrissimo Legato Gallico Dr. Terlon Equite invitati complures Medici convenimus cum aliis Magnis parvisque Spectatoribus curiosis, certissimè experimenti testes. Cui majori semet amputant fessè, mox petiam suam liquore syptico imbutam applicat Boudetis, & mox imposita vulnus velut velamine comprimente stringit. Nullus amplius cruor manare visus, nec ulla convulsio indicia apparuerunt. Post medium horam temora manu comprimente & petia, sine eschara vitum vulnus nullo sanguine profluente, consolidatum, arteriis quanquam sub membrana tenerrima pulsantibus. Ut porro vulnus crudum curaretur, repetitis petia vinculicque, & ligaturis injectis, canit in lecto stramineo quieti repositus, sed pede uno mitilur; laudantibus Spectatoribus medicamentis attingentis intolitam virtutem. Ex vitriolo confectam esse aquam, gustu divinare posuimus, sed singulari modo præparatam, quia sine vomitu bibitur. Narrat ipse Boudet ex sensu ingredituribus compositam, & ex illis unum esse venenum, ita tamen attemperatum ut nocere non possit. Credendum illi sine rebus loquenti, quanquam rectius conscientia consulere & publice utillat, si sine questu arcantum hoc propagaret, quod aliquando facturum non dubitamus, si Magnatum indulgentiam fuisse expertus. Jam enim in Angliæ Sotissimo Britannia Magnæ Monarchiæ revelatione esse seculum, & ab aliis quoque. Medici in Regia Societate Londinensi experimentum factum nobis narravit Illustris Legatus Anglicus, Hæmorrhoidis.

Dr. Tho

Du. Thomas Henshaw. Vir civilis prudentie & ream Naturalium peritissimus, in cæteris animi dotis, quibus fulget, præteream.

De liquore isti astingente dubia non pauca occurrunt, quoniam solutio facillior foret si æreanis non esset. An Cblurgorum nostrorum pharmaca sanguinem suppletientia ex aceto, ovi albumine, vitello, pulveribonisque adstringentibus, quibus magnas hæmorrhagias in amputatione artuum, mammarum &c. repressis vidimus non semel, paria facere possiet, expendendum illis qui ignora in usum trahere dubitant. In eo tamen nota remedia liquor hie post se relinquit, quod citius vim suam exierat. Vix enim ante retionem diem vulgare alie aquæ remouetur à vulnere, cum liquor iste secernat non quidem momento, sed post semihoralem moram vasa stringit & membranula obducit sine cichara. Deinde magicam artem habesse, affirmare non audemus. Cardano si credimus, si ter super vulnus rectetur hæc verba, statim omnis sanguinis eruptio compescitur.

*Sanguis meus in te, sicut Christus ferit in te.
Sanguis meus in tua vena, sicut Christus in sua panna.
Sanguis meus fixus, sicut Christus cum suis crucifixus.*

Nomen Christi morborum esse tecticulumamentum non ignoramus, sed ab bona Dei venia fiat, quod nomine sancto ad hæc abutamur, necito ambigimus. Novi amicum, qui ter repetito nomine Iesu, hæmorrhagiam narium quasi miraculo supprescit, sine ulla alia, ut sciebat, superflitione. Opposui oraculum: Non sumus nomen Dei in vanum. Reposuit, vanum non esse sanitatem. Reipondi cum Theologis, solos illos recte usurpare nomen Dei, qui illud eo sine usurpant, quo ipse Deus illud usurpari mandauit. Ille vero quotidianas preces orgebat, quibus nos ab omni malo, etiam corporali, munimus, nomine Dei. Sed quo tuco illi factum suum regent qui ignotis verbis hæmorrhagiam sistunt? Ex Schedis Rhodii, olim Prætorii secretum accepi ab illo quidem, non me, probatur Si re quacunque inventa inscribas parti viciniori unde fluxu manat, in Viris Ophilon, in mulieribus Ophila, hæmorrhagiam consequente partu sedati. Quicquid de his sit, pro magica curatione non pauci traduxerunt unguentum aromaticum, & pulvrem Symplicium, quo & vulnera curantur feliciter, & sanguis supprimitur, cum per naturam, quamvis nobis occidat, succedat quotidie operatio sparata. Hujus pulveris Sympliciacæ vitas jam tot experimentis confirmata à vitriolo dependet, quod primas tenere partes in liquore hoc styptico, nulli dubitamus, quamquam de veneno aliquo, aliisque ingredientibus, nebulæ quædam oculis nostris obijciantur. Illud sapore quasi forex suo indicio re prodit. Mera solutio vel coctio vitrioli videtur. Difficultas angustia antea, quod innoxie affumit dicitur. Ex hic totum artificium later, ut vitriolo emetica vis admittatur. Quod ubi successerit, in sanguinis vomitu cohibendo peccatam remedium invenimus.

Aliud experimentum ejusdem aquæ stypticæ Bondeii postea factum est in Arce Regia, me in prædio meo absente, de quo ita ad me periclitipis conjunctissimus Affinis & Collega. D. Henricus ad Meinen.

Præsentè Serenissima Regia Majestate feliciter heri successit experimentum aquæ stypticæ in cane molosso, cui post acce cum Urso certamen postquam à moru de ira facta esset effecit sanguinem confiteri, circa horam decimam arteria carotis sinistra transversum dissecta est. Sanguinem ut in arteriam vulneribus fieri solet, affatim & saltatim profluentem ex voce suppressit Aqua Styptica. In ea namque tincta linamenta præ-

stite attente imposuit Philippus Hæcquard, & in ira super compescit, ita ut nihil sanguinis amplius ex vulnere clabi visum sit. Quopærem de Experimenti veritate certius constat, placuit post horulium vulnus detegere, quia vero amotis linamentis novum sanguinem præfecta arteria evomit, alijs eadem aqua styptica imbutis vulnus denovo impletum est, ac fascia super injecta apice deligatum est, ac canem ad tertiam cum dimidia à meridie reliquimus. At cum vulnere detecto omnibusque linamentis amotis, nodam line tegmine conspeximus dictam carotidem attricim, ne guttulam quidem sanguinis amplius fundentem, unde & simplex tantum linea fascia vulnei injecta, & Canis, ne quiescerent jam sanguinem aliorum incuria iterum commoveret, ligatus ad Dominum suum Leonum custodem deferretur, ubi & hodie ipsum vili solatum & comedentem, & quod magis, ne guttula quidem sanguinis hac nocte vulnere stillaret nec adhuc stillat. Expediit posthac erit magis vulnus vulnerum curatio, quia post apam stypticæ hujus aquæ admotiorem sanguis statim conquiescit, nec amplius è laci vena vel Arteria fluit, & quod palmarium, nulla ab hoc medicamento cecidit induitur, sed sole tuncis sanguinis impetu inhibito, vulnere statim propici potest digelivis ac consolidantibus. Et si ultior fides adhibenda Boudetto (à quo Serenissimus Rex videret compositionem stypticæ hujus aquæ obtinuit) post ejus admotiorem nullas inflammationes, gangrenæ vel convolutionis metus erit: unde cordatior in posterum habebimus Cblurgos in arteriorum in magnorum vulnenum ac affectum curationibus, in artuum & cancerosorum partium amputationibus, quas ob certissima ingentis hæmorrhagie pericula (alia in fileam) permulti hæcenus subterfugere Chirurgi. Iussu Regio propria manu aquam hæc confectè Philippus Hæcquard, ejusque copiam promissit de statum urbis nostre Chirurgis, ut ejus vires data occasione ipsimet experiantur, ita in non opus sit ad alia peregrina & conquiescit & composita medicamenta confugere. Th. Berolinus.

Aqua styptica vii quo usque se porrigit.

Novissimus hodie liquoris illius stypticæ usus, quem Gallos ante triennium per Europam circumtulit, ubi te, ob divenditum hinc inde secretum, mataspil provenit. Est sane cur inventum laudem in vulnibus casum infectis, sed in punctum non perinde experientem utilem. Quia & in hæmorrhagia narium compescenda sepe inutilem deprehendi. Scilicet quoties ora vulnere ubique attingere licet, est sans ipi honos, carquoquin hebescere vel, quod sequitur exemplum, clare docuerit: Joachimus Nichel civis nosset, in dusselo facinus idem gladii excepit interea brachii dextri parte, paulo supra cubitum; penetraverat autem ferrum largo & profundo vulnere ad ipsam usque alam, fissi quoque quamadmodum postea constitit, arteria. Vocatus chirurgus familiaris G. Ushelius, arte vulnus tractavit ad undecimum usque diem, ambigus tamen futuri ob ichorem tenuem & sanguinolentum quotidie profluentem, nullo puris laudabilis indicio. Sed ecce undecimo die improvise tanta vis arterioi sanguinis subito prorupit, ut æger in deliquia ageretur, & in metum chirurgus, scilicet gramus sanguinis, qui jam ante hactenot arterie malefido obice clauferat, nunc demum in pus conversus laxaverat januam exituro cruci. Accersitus ego, tentatis jam frustra alijs, quæ ratio & consuetudo in simili casu suggererant; propono aperturam vulnere ad usque locum male affectæ arterie; sed relutante ægro, ventum ad aquam stypticam; qua per aliquot dies subinde injecta, licet bis reverterentur ini-

enræ illæ sanguinis profusiones, novissime tamen stetit rivus in articulo omnes artis exsuperat, qui una adfuit Ph. Macquardo, cui articulum conscribende aquæ illius stypticæ iussu Regio crediderat Galvus. Vixit sibi tum defunctus periculo ager, me omnia alia suspensioe tum ob superventum ardentissimæ febris, tunc ob respirandi iter angustia. Quid plura? Succedunt spasmi, tumores brachii & in manu summi dolor: decimo octavo die obiit ager, laudatur nihilominus aqua styptica, quod egregie fecisset officium. Aperitur iussu Magistratus cadaver, ut de causa mortis consiliet: mirum dictu, deprehenditur arteria adhuc quidem aperta, sed via quam gladius fecerat, circa arteriam gravis ab aqua styptica generatis obstruitur quo minus crasorem profundat. Interea postquam arteria per valvulæ obstruendum nihil posset effundere, memor tamen sui officii alio derivat sanguinem, scilicet vicinorum musculorum interfuturis oppletur omnia, nec eo contentus liquor perspicitur ad usque medium pectoris; namque inter costas, sternum & pectoralem musculum dextrum invenit nubes vel tæta libæ corrupei & scæneis jam sanguinis, unde alihna, febris; & denique mors ipsa pependit. *D. Olaus Bartheol.*

Circa Hafniensem Stypticum liquorem observationes particulares.

Accepimus Hafnia sub præcedenti anni 1678. principium, data sic occasione per Serenissimi nostri Legatum Dn. Priëschekch a Lindenholen, famigeratum illum P. Hocquanti nunc liquorem stypticum. Et cum de effectu, externo scilicet, satis constaret, quodque promissis, licet experientes nonnumquam delinuerat, aut aqua saltem simplicis, albumineve (referentibus in Actis Hafnienfibus mille censique Exercitationibus Magnis illis Bartholinis), suppletis aliquando fuerit, de cætero tamen ut plenius, sub competente adhibitione satisfecit; proinde potius ultioris ingredientium, minus adhuc tunc secundum numerum proportionemque determinantum perquisitioni dicam voluimus: in commune postmodum collaturæ, quæ mihi forte specialius obvenissent: de interna, vero exhibitione tantisper securi; non tam ob intermitte venenositatis cuiusdam traditionem, quam opiorum securiorumque adstringentium in ventris pectorisque, (quo modo laudati Dn. G. Bartholini observatio de Hæmoptica pertinet,) affectibus præstantiorem (præ huiusmodi strangulatois,) sufficientiam. Nam quod quilibet, sine cochlear ejus, aliquando citra notabiliores interaneorum turbas datum foret, præterquam quod oppido sic minuere venenositatis suspicionem, id propter Inhærentis vitrioli (magis forte martialis remissiorisque) pacitatem, aluminisque restrictionem, in robustioris fortan simul ventriculo, contingere potuisse conspiciamus. Senarius autem numerus in liquore adeo limpidus, æque stypticorum diaphanorum, nunc perspicuitatem mixturarum saltem postliminio non perventurum paucitate, hanc parum hinc sibi datus, Pæchium in memoriam revocantibus, qui oculcularionis gratia longe plura, quam Hiera ejus requireret olim contrulisse dicitur. Unde perreimus in inspecta perquisitione, donec aliis quanto potius D. D. Wehenum, Med. Cæsar. librum de liquore styptico, sub Anchoræ hæmorrhagiarum inscriptione edidisse, in Germanicarum Epbemeridum Anno octavo legemus. Et cum eodem tempore habita passim super ingredientia conjecturæ indies magis simul confirmarentur; insuper etiam per semetipsum, Serenissimos secuti, domo abesse teneretur, sepelivimus collectas tunc observa-

tiones; usque dum ægre tandem tam obsecratum libellum nuper nancisceremur, per sanguinis naturam ac generationem, ad ejus chirurgicum quoque conservationem, (medium cum applicatione sua perspicue tradendo) ducentem. Quod si compendio factum hic retulerimus, cum libet hodieque hinc in locis sit rarior, opere pretium videtur hæcui.

Constat itaque Viri Excellens. liquor vitrioli Ung. aluminisque cupisquibæ dimidia: solvuntur per ebullitionem in phlegmatis vitæ. libris quatuor, remoriscit in fundo concentribus crystallis, reliquæque filtrato, singulis ejus libris drachma una olet vitrioli permiscetur. Applicatur autem quintuplicatis plenius, probe eo madefactis, & sub competente deligatione per dies aliquot, ne sanguinis (statim quidem coagulati) crusta perperam detrahatur, sic relinquatur, valere perfecte labus curato. Iam autem una, si placuerit, pro facilitando effectu, exhiberi posse putat prælaudatus Autor, solutionem Terræ sigill. cum vitrioli, vel etiam aluminis atque vitrioli conjunctum destillatum spiritu paratum; oportet tinctura terræ catechu, similibus longe præstantiorem. Hæc ibi Viri experientissimus. Quibus & forsitan aliis nobis nonnullum visus, an nostras quoque super Hafniensem sortum habitas observationes nunc demum superaddere queamus, equidem diu hæsitavimus: tandem tamen nihilominus particulariorem potiorum hic circumstantiarum considerationem his saltem, ad quos, remorioribus præcipue in districibus, his in specie vix vel nondum pervenit, futurum putavimus hanc plane inacceptam.

Color proin erat diaphanus, sed aqua simplici aliquanto obscurior; præcipue si vitrum simile viliusque foret: non aperte viridis aut cærulescentis vitrioli cupisdam præfatum nativi, in saturata hinc aqua solitarii vel supereminens index.

Odor nec ut recentiorum vel per asservationem minus alteratarum solutionum vitriolicarum; nec tamen etiam phlegmatis vitrioli vel aluminis (vehementiori denso calori hunc expulsi,) insit: sed ut doctum ritumve diuturni pluvialis. An ulterius rosæcis quid missionis initio attritu fuerit, (ut occultanda odoriferorum tingentium passillo quoque obnubere solemus,) ex enormi jam, & è longinquo quasi perceptione conjecturali saltem, nunc quidem determinare nolimus.

Sapor deprehendebatur nec pure vitriolicus, (martialis aut advenit venereus;) nihilominus nec pure solum aluminosus, stypticus interea, & sub quascunque vitriolicæ illius dulcoris nota, mox in austeritatem acoremque saltem metallicum delinens.

Pondus, ut lagenula (de meliori luto adeo fere non sista) aliquid disproportionalius, (quod tamen vel extenuæ efflorescentie defectu tantisper non existimavimus,) absorbuert, erat collata aqua simplici in tantum graviore, ut vitrum quinque ejus uncias capiens, dimidium insuper liquoris admitteret.

Quod, quibus & quantis è contentis fieret, amplius investigaturi, evaporationem primitus tentavimus, tex (pro facilliori computatione) ejus uncia in parvella vitrea successively, vegetiore tamen sub finem (cum ægrius nec sine acidi cupisdam perceptione ultima expiraret humiditas,) colore exhalantes; ad eam, quæ in eisdemmodi concentris haberi potest, siccitatem. Provennerunt inde adstringentes & (innet quasi curule nonnulli aliquid) viridescentis coaguli drachmæ quatuor, fere cum scrupulo dimidio.

Exticcarum è guttis, laceratis vitæ fortuito adherentibus, sacchari coloris; aliud præterea albicans, in repletioris adhuc vitæ officio interius concentrens.

crefcens, (utrobique primo quidem lubbale, hinc tamen flatim ftypticum, demumque quali ferrugineum,) hic tanquam inter accelforia funt: quæpudmodum etiam infillitæ culæ tantillæ liquoris concretum; fuper mediocrem ignem, pult brevem & fere aluminiformem ebullitionem remanens; guftanti ab initio crocum mart. faccharinum; inde latius quid adstringens martialianfque referens.

Quo proin circa pondas confultationem effemus certiores, præcipitationem infuper adficiamus: atque hinc fex dicti liquoris uncias, infillabamus unam Alkali (ex ana nitræ atque tartari invicem detontatis,) in aqua fimplici diffoluit, & filtratione à terreftri fua materia feparatam; quo fcilicet per alcalium prædominium eo certius fecuruliqæ pullulantentur omnia. Exoriebatur fic, fi conferent id fieret, ebullitio fat valida cum fanicentis quali aquæ regiz enjodam odore: fundum verò petebat maſſa, pingue quidpiam, aut aluminis per dictum oleum tartari præcipitæ, liquoſiſſimæ filicum CL conglomeratam craſſiorem expriimus; albicans primitus, hinc affuſa copioſiori aqua, conculſiſque inter ſe omnibus, fatuturæ, (in er tenues quoldam tunc coarctæ gyro) virens; ſeparatæ demum (per edulcorationem quoque accedente) humiditate, poſt exſiccationem pulverem relinquit: croceum, ipſo tamen vitrioli Martis ſubtili croco longe vividiore, mole diffuſiorem quam pondere, ad drachmarum duarum & ſcrupulorum duorum circæ dimidio erat.

Collectam vero prædictam (ſalinas tum ipſius liquoris, quam præcipitationis quoque alcali particulæ continentem) aquam poſtmodo lenie exhalantibus, proveniebant ſiccæ, & tartaro vitr. longe magis lividiſſi coagulî deſuper ſpicæ, de cætero ex albo vitæſcentis drachmæ novem cum dimidia; adque detractis alcali drachmæ ſeptem, duobuſque ſcrupulis, (quia terreſtri ejus ſubſtantia filtro ſeparatæ, cum ibidem abſorpti ſalis tantillo, facile ſcrupulum unum excedit;) particulatam ſalinarum liquori ſtyptico propriarium drachmæ duæ, ſcrupuli duo.

Quod autem v. g. guttis octo vel decem aquæ ſimpliciſſimi uncias infillatilis, invicemque (cum illæ prius in fundo conglomerentur,) conculſi, totum laſcentem colorem induerit, parum huc forſitè conferet: ſingularius erat; quod poſt ſemeftre demum domum redeuntes, in reliſſis adhuc quinq; præter propter uncias invenientes ad vitæ fundum expaſum aliquod, libere natans, craſſionibus aranearum telis in molendinis ſimile, colore grifeum: atque poſt idem pene tempus, (quieto in angulo vitem aquoſiſſeqæ magæ conſumpta, ſimile denuo, in ſuperficie prius collectam, hinc ſedens, ſcrupulorum duorum (cum conjunctam filtro ſeparatæ & edulcoratæ eſſent, pondere, odore in prunis ſatis ſulphureo; pondus reliſſi liquoris de cætero putius, quam ſaporem, noſtra quidem opinio, mutantia.

Atque hæc quidem tum temporis ſucceſſive notavimus. Quo vero enndem, quoad ejus fieri poſſet, aut æquivalentem ſaltem liquorem hinc erueremus, poſt varias ponderam ac poſitorum ingredientium, præcipue vitriolorum permutaciones, ſapote tandem atque pondere (tam ſeparationum quam conjunctarum) eo ducente, in analyticum inſidebamus proportionem aluminis atque vitrioli; non præſide martialis ſacchari, lubroſiſi ac præter rem carloſi, (ſicut eadem inde eadem ratione oriuntur producta;) vel è venaliſſis ſpeciebusve titulo, ſerorum ſeleſi; ſed Goſlarienſis earum alteriſve boni ſat vitæſci. Solvebamus poſin utriuſque unciam dimidiâ conſuſam moderato calore, & (cum oporeroſum, neceſſitatiſque tempore vix

requiſita quantitate ſupp:ens vitrioli phlegma, in ſulphureſtate ſua, alias facile diſſipabili, forte nil, in exigua vero vulgariſſa deſtillationis acroſitate parum conſeſſe videretur,) ſaltem in aqua ſimpliciſſi (cui tamen ſerratæ quoque ſeu fabrorum ſua ſubſtitui poſſet) uncias quinq;: ut ſex enim color pene fiebat olivæ, ſapor remiſſior, pondus duobus ſcrupulis minus; in minore autem quantitate, præter proportionis in ſapore, pondere atque colore intenſionem, tractu temporis ſalini quidpiam,) quod etiam in proportionem quadrupla ſupra laudatam D. D. Wetherſi notavit,) quali concreſcere, (& quidem magis aluminis ſomitet,) incipiebat. Filtrabamus hinc totum, quæ ob vitriolum obſcurit prius, limpidus nunc prodiret liquor; ſecedeſſe ſimul ochreæ impuritatiumque vitriolicarum, (cum alumen raro quidpiam deponat, grano uno ad alterum interdum: varianſſimè illa ibi exotetica. Hæc erat noſtra tum imitation.

Ut autem effectus in oblatiſſis tanſper tunc fortuito vulneribus, &c. (nam ulterius progreſſi nec daretur nec vacabat, ſimiliter quoque flatim erat evidens; in hæmorrhagiæ naſium Screniſſimi cuſuſdam, prius incoſpeſcibili, per ſiphunculæ aliiſ aquæ ſ dilutæ,) inſiſcendo præſentans, addito, ſecundum D. D. Wetherſi animadverſionem, vitrioli ſpiritu, adſtringentior: ita color quoque atque ſapor, (de odore enim etiam aſtriſco dicit, ſupervacuum ſintet, cum Huſienſi,) noſtra quidem opinio, apparebat idem, aut ſaltem vix diſtinguendus. Pondus coditæ recidebat; & liquor in vero quinq; aquæ ſimpliciſſis unciarum capaci, ut intermixtas æquoritari minerales particulæ,) uncia dimidia ad lanæm pariter mellebat graviter altera dimidia nuſca, (quod poſtſine ſex provenirent,) t. ſtillante, pro drachmis quidem tribus, in vitro miſcram illam amea continente, pro reliſſa drachma in filtro, utat exiguo & ſatis expreſſo.

Dum autem ſimplex unciarum ſix ænagulum, eadem methodo collectum, ſimiliter ſuperſtiti in colore pondere reſponderet; nec ſeparatim per alcalinum præcipitationem crocus, aut productum poſtmodum ſilinum coagulium ab illis diſſerre videtur; colore croci ob candicantia aluminis tæte accellam atque dilutæ, odore vero ſub præcipitatione talium pariter inſtat aquæ cuſuſdam Regiz, ob niſtoſa adhuc in alcali iſto latentes particulæ, utroſque in aluminis tantillum, de quo alibi,) exurgente: majorem proin potius imitamenti noſtri illuſtrationem experimententorum, circa vitriolum atque alumen eorumque conſtitutiva, ſerſſim ac diverſimode (per præcipitationes aliſque ſeparationes, coagulationes, proportionales ponderationes, lentas evaporationes, &c.) habitum collatione, indeque inſtituta ſupp:atione tum quæſivimus; ſed tamen (quod ſerſſim) ſub unius alteriſve grani forte lateſcit, & ſal. o quod ajunt, (inea conſtitutivorum) varianſſione, extranearum diſperſionum, facilitatè, &c.) errore calculi.

Inſit itaque vitrioli, (pro modulo ſuo ſicci, nec impuritatibus externis affluſionis,) uncia dimidia, (ſecundum prædictorum experimententorum modum atque proportionem,) tæte ſua edulcoratæ & ſiccæ drachma una, ſcrupuli duo cum dimidio; utpote nondum per ignem quid, (ut in colcoate) paſſæ eoque minutæ. Salinarum, hic quaſi concentratarum, aquoſiſſeqæ minus (ac in vitrioliſſis ſalſificationibus artiſticiſque conſedionibus,) complicatam particularem ad minimum ſcrupuli duo. Aluminis porro uncia pariter dimidia tæte ſaturatæ albiſſimæ & molis, antequam in tragacanthinum ſete

quidpiam colat, diffusissima, communiter scrupuli duo, grana quatuor; salinæ subtile drachma una preter propter: (utroque enim: quod uni parti, pro parietalis fucitacitate ratione, ac metallicum ab acido abstractum particulicatum variante quantitate decessit, accedit alteri.) Si terræ jam, ut dicuntur utriusque, (aluminosæ scilicet ac vitriolicæ) lucem emittentur, prodeunt denso, eodemque colore, supra notatæ binæ drachmæ, scrupulique duo cum dimidio. Sin salinæ, habentur pariter idem, ejusdem fortis ac coloris quinque scrupuli. Si denique utæque coniungantur, & exurgentes hinc, præter grana quatuor, scrupuli tredecim istis aquæ simplicis quinque uocis, aquasorum (natura sibi ad hærentium, & ut simplex ibi phlegma constituitur, ita aquæ simplicis locum ponderetque ventendum) particularum medio (seu in eandem istorum duorum ingredientium dissolutione sit,) copulentur, & dimidia eorum uncia (seu scrupuli duodecim) protinus id vitri quinquenialis superponendum, quod semuncie secundum proportionem erat, provenit, residuis granis viginti quatuor in testante liquoris stypticis semuncie hærentibus sive saturantibus: uti ex adverso absolute illæ sex ejus uncie facile habentur, si, (simplici solum additione,) aquæ simplicis uncie quinque, mineralium (inibi gravitantium, & ex alumine vitriolique profectorum) scrupuli, cum grana quatuor, tredecim, ac utriusque phlegmatis spontanei quasi nec violento igne, etiam à salina substantia proposita expelli) scrupuli septem, grana sexdecim, (punamus id vitrioli semuncie drachmam, unam levis, ex aluminis eadem quantitate drachmam, præter propter cum sex granis,) invicem cumpotentur, sed tantum de liquore hoc. Si interea longitica conjecturæ nullæ circa ingredientia eorumque præcipue proportionem non fecerint: verum tale simile quidpiam in vitro negligentius obtentum, sique per menses aliquot teposito concreverit occipit:) negotium saltem curiolitum, (quod speramus & rogamus,) ignoscet benevolus feliciorque circa talia Lector. Sane licet interea, cum dum faciunt idem, non protinus sit idem: si tamen alius, saltem aliquotum variato ingredientium, v. g. pulveris laxativi pondere, eandem nihilominus effectum in catharsi addecent fuerit, peccasse propterea non creditur. De cætero de renitentissimo, inest salina coagula, alumine, alibi forte agemus: ut & de vitrioli vitriolanæque (etiam in chirurgi) singulari, (seu inter recentiores quidam, præcipue quoque mutavi in Physica sua subteritanea Experientissimus D. Kitchetus) vulgo interea minus in usum tracta, efficacia. *Dan. Ludovici.*

Magna dentis hæmorrhagia.

Anno Christi 1655. Civis quidam Ratipontensis notatum tempore io subitam hæmorrhagiam à dente quodam sinistro, ac casulo superiori maxillæ in latere dextro incidit, ubi sanguis subinger, feridus, per horas septem continuas, tanquam ex siphone pressili, post multa alia medicinalia, adhibitis ventosis ficit sine scarificatione, cepitque deorsum in dorso ad lumbos usque deductis, & assumpta uris collatione ex decoctu astrigentium, sanguis quidem destitit, sed ad horam & ultra serum plane clarum, subalbidum ac falsum adhuc sequebatur. Inde conjecturari licet, quæ sanguinis acrimonia cum abundante sero falso hæmorrhagiæ rationem ansam dederit. *Hetrugii.*

Scholion Schroockii. Magna ex dentibus, vel

gingivis potius hæmorrhagias alii etiam ænotantur; potius quales in Scorbuto cum non raro inhiæntur; vix aliam ubi causam, quam quæ ab Auctore nostro in Casu præfenti à feri acris in sanguine abundantia defumitur. Unde Clar. Gualt. Chasteion lib. de scorb. cap. 1. §. 5. dii huius in scorbuto symptomata causam in sanguinem, luxuriantem supra modum sordilurum, vel sale volatili acris, à quo debita ejus consistentia petat, abundantem, sique organo exagitarum, per articulum ocella encephalo, testandam arbitrabatur. Quo etiam refertur licet fabi illius feratili leonisi historiam, cui à venula (ut quidem Donatus vocat, cui tamen rectius fuisse arteria substituenda erit, quæ in superiori maxilla à ca. oide interiore, in inferiori autem ab exteriori ad dentes propagai solet.) gingivæ, ichorosi sanguinis libras amplius octo effluxisse, Martell. Donatus lib. 4. hist. med. mirab. c. 9. refert. Et Alex. Benedictus lib. 5. de curand. morb. c. 3. ex gingivis profluvia sanguinis incredibilia, supra modum alta, vidisse se testatur. Tanta nonnumquam illa exoritur, ut ipsam etiam mortem comitem inveniat. Talem Hollerus Comm. 2. ad Aphor. 18. lib. 2. sect. 2. Coac. Hippo. memoravit, scribens. Nos vidimus à loco dantis longo tempore sanguinem profluxisse, qui nullis remediis cessit ægramque tandem subfuit. Idem accidit juveni in septimum mensem gravide, apud Georg. Hartium per. 2. lib. 1. observ. 25. qui in hæmorrhagiâ subitanæ gingivæ, sanguine confertum & magna copia per tres septimanas continuas effluente, incidit, maculis sanguineis, ac sudore sanguineo, tandemque morte ipsa subsequita. In casu observationis resolutione aliud purto exemplum magnæ sanguinis per gingivæ excretionis levisse præfuit. Feliciter vidit successum Illust. D. D. Paulus de Sorbati in Morano, cui sanguis post diurnam tertianam ad 24. libras ex gingiva fluxerat, pulvere tamen chalcantidis & castoreo actuali persorato, ut ipse obs. 48. Ann. 11. Ephem. Germ. Cor. recenit. Et femina illa apud Nic. Tulpium lib. 1. obs. med. cap. 49. plus æquo poculis dedit, plurimum sanguinis quotidie ex gingivis effundens, difficulter quamvis, sanata petibatur. Nonnumquam carnea gingivæ excreta defecans, magnum ibi sanguinis fluxum efficit, ut exelione illius feliciter curatur; quo ejus specimina apud Joh. Meckerum c. 16. & 25. observ. chirurg. occurrunt. A dentibus etiam evulsi immodicus sanguinis evacuationes coogisse scimus; qualem Valleriula lib. 5. obs. 3. à dente putrido sine ulla vi ac sine festo, sola digitorum lenissima apprehensione educto, ex arteria subdita, rivuli instar è fonte per triduum manantem, brevi tamen curatam, descripsit. Hæmorrhagia quoque ingens à dente evulsa curata habetur in obs. Laz. Riverio comunione à D. Petto Pacheco obs. 8. nec non obs. 122. Achill. Gall. c. 1. apud Georg. Flitum. Wellchium in Syllag. curat. & obs. ut & obs. 72. Joh. Udall. Rumlens apud Eundem. Egregius ille Olmocius Chirurgus Joan. Scultetus tria remedia part. 1. Armatum. Chirurg. tab. 29. §. 11. adnotat, quæ variis hæmorrhagiis & deporatum quoque illam gingivam, extractions denique violentas excipiente, infallibiliter compescant, illudque, multa inter alia exemplo Brætearii ejusdem confirmat, qui ob violentam à Circumforaneo dente molatis evulsionem, incompeficibilem fere in gingivæ hæmorrhagiam lapsus fuerat. Sed æque in illius sanguinolentis Nationibus semper existenda est salus, dum vel ob sinistram remedium non, vel aliam ubi causam, sanguinis impetus isti requirit, & mors atra una cum humore

humore illo vivo, & ipſum effudit animam: Sic duos exuto dente, ob multitudinem ſanguinis obſiſſe Cardanus de cauſ. ſign. & mo b. ac Felix Platerus lib. 3. obſ. fabrum ſenariom, & extractu denſe canino, quem ſanguinis ſalvi quodam exiſtentiſ, ſubillis, rubri, & ſervidi per triduum erupit, nullis remediis compoſcenda, intercuta fuerat, & ſpiritali nocebat. Quæ occasione magnam Agyrratum impetitiâ, fraudem & audaciam ob ter perſtringere licebit, & utium extraſtichium læpe non neceſſariâ, inconſideratus, æque ſcilicet una extrahendi cauſa urgenti, quorum inuſite officium ut Magiſtratus auctoritate inhibere, multoties neceſſariâ foret, ad Turcas potius ablegandum, Famofa enim illa humanitatis monſtra, teſtante Menavio, ſcripſit Italo lib. 3. c. 22. Chirurgia ſuis olim interdicebant, ne ſine impetrata Regiſ licentiâ dentes extraherent, diſſo pſocul non negligendum ſanctiſſi damnum deſcendiſ, uti Exc. Goth. Mœbius c. 6. Medic. phyſiol. loquitur.

Notabilis Gingivarum hæmorrhagia.

Menarius Italus Viennæ, ad aortem Cervum ex gingiva ad 24. libras ſanguinis poſt diuturnam Tertianam emiſi, & tandem linguam pulvere chalcantini & cantherio actuali ſecit, ex toto convaleſcit, nec miſium hydropis terminante veſtigio. Pauli de Senant.

De hæmorrhagia univerſali, ex ictero nigro lethali.

Sanguis, viſcēum ſumme, aliquando coaſte, nonnunquam velut petreus caſum aſſectat & corpore, & tanquam petriſſus ad intertinectionem ſedere ſopito conſpirat. Viſum ſus ſimplici vice in febribus ardentiſ lethalis hæmorrhagias narium, nulla arte compoſcendâ, (quamvis in quibundam ceſſent ordinatiſ prædiis,) donec extremum tinguat, ſaniſſima mente vitam exolveret. Aſt non una viſa exidere eodem, & conſimilem tamen hæmorrhagiam, vel ex liam ſpontaneam, ſequenti obſervavimus hiſtoria. Vir primarius, 12118. annorum, per plures annos cardiaca, hanc calculo laboraverat, per vices repetitis inſultibus, temetipſe tamen dolore illo, poſtquam in calculum ſuccedere coierat tritaia mulſago, ob hypochoſticiacum valde conſummatum præ ſe ferebat corpus cachecticum. Non raro timere pedes, inprimis ſiniſter, conſenſu laterali ſoleni, commodâ tamen diſta cavere ſibi, non minus ac medicamentis. Prædiſcatis Aſtrophologis, ex inſultu Sacuti. aſpectu moris genus ex ictero nigro totorum, quod ſeu conſectam præhabilem cauſa firmavit, ſeu ætēus ex conceptis lēis morboſis ſibi exitum hinc præſentit, eveniebat tandem.

Oculi, icteri præcones, flavedinem concipere, orina cum ſedimento tartareo, rubro, copioſo, croceo olore ſine ſtina ſingere, corpus totum concolor reddi, alii ſcybala non tingi. Viſus alias morbus facile cedere vel unico purgatiſ cholagogo, experimento Galeni & aliorum, imo noſtro quoque, viſus æpēiēnibus generoſis marſialibus, inſuſis, nitroſis, hic rebellis ceſſit. Per dant prope menſes durante ſtabula, color & ſtato in ſuſum tendens miniatum mortendum quaſi præſentit, terrore tantio majori inſuſo, quod certè & credebatur eventus jam jam reſpondens prædictioni. Tandem, cum obſtorta intumida vaſa, & ſine dubio cemento tartareo bilis con-

cietâ negatæ eſſendi coſuetis localis, licet vomitu amaricante uſ inſiceretur nonnunquam leviter, ſanguis ſcraſu menſ per os excretus mix excipiebatur hæmorrhagia narium, per alvum quoque concretos multas exibat, & urina errore tincta ubivis parula potas ſeu pertuſas porius oſtendebat. Ita per omnes vias eſſuſus, neq̄ nequam præſtante arte omni, corpus mori ſtadebat. Denegata anatome nihilominus certum eſt, hepatis glandoſos acinos æq̄; ac papillas bilioſas, induratas, obſtructas & tantum non ſcindo occupas fuſſe, lympham ſanguini incoctam omnem ſuccellere, bilem gaſcolatam in folliculo ſuo, ſanguinem vero inſpiſſatam, tateſ. Quam tamen bilioſa amica citatum in motum, & præclato debito ſpatio pro abſolvendo ciculo, illapſum laxioribus poris viſum ordinatam erupit, nulla humana arte corrigendum. Eodem propemodum tempore niſiones publicæ natiabant, ſtenuum quendam ritum militarem ſanguine per os, aures, oculos, nares ſeditioſe arumpente virâ ſunctam, D. Georg. Wolffgang Wiedeli.

Hæmorrhagia penis ſpontanea.

Longius foret diſſerte de multiplici uſu quem cori poro noſtro ſemetat neſtat illud vitale, ſanguis, qui motu indiſſo machinæ noſtre circulat morandus. Nec levius nobis faceſſet negotium, ſi eundem eſſet per omnes vias, quibus diſſerre poſſet tam petroſus latex. Non tamen æque teleſ ſunt hæ ſenſicæ, cum hæ erant frequentius illas taterent, Triſius, hercle, omne habent, ſi proſtiterent, videtimus, nbi ne tēam expeſtaſſemus. Quamvis interdum, qui ſponte teſtiantur fontes, obſcurent graſuito, ipſi ſe corrigente narata, ne videant caſſe. Cum non ita pridem, per me, poſt Deum, in gratiam cum ſanitate rediſſet aliquis euenta miſtione quæm graviffime laborans, accideſ, ut alius & viciſſia ineam contra Ophthalmiâ eſſigilaret operam medi am. Dum autem varios invicem ſerbatos credimos, narrat ſibi, ante aliquot annos, ex inſecato largum proſuſiſſe ſanguinem & imbecem, per membrum illud, quo viri ſumus. Neſciebat planiſſimè quid de Thyrio fieret, alia omnia exſpectas potius, quam angularem, qui obſervatus maximam ineuſit terrorem. Ubi vero per ſequiborâ dualis hic ætus ſanguineus, interrens commodum, eadem, qua prorupere, ſiſtebat indolentia, nullo, ne quo dem leviffimo, triſſiori, cujuldâ tel dō ſymptomatis veſtigio. Ego varia quæſivi hæc ſpectanti a; interrogans, namne cauſas quaſdam ſiſte poſuiſſet huius hæmorrhagiæ: an non, vel calculus ipſe, vel equitatio ſineuſſus, vel geſtatio gravitatis oneris, aut aliquis in diſta error præceſſiſſet, vel uſus Aloeticorum quotozdam med. ſecreſtorum, quæ oſcula teſtatiſſent venarum, hanc cupiſſet caſtataſſem? Vatum omnia hæc negavit conſtante. Hinc patet ipſam naturam, quaſi provido conſilio, imminens amoliri geſtientiſ petiſionem, per hanc ſentiam, luperculum tantummodum eſſeſſe ſanguinem. Atque ita hæc fidem celeberrimo conciliant Kozakio, dicenti. Traſt. de Hæmorrhagiâ, lib. 2. cap. 11. pag. m. 302. Simplex ſanguinalis miſt o non omnis eſt æque vel moleſta, vel noxia, ſed interdum & quædam utiliſ patientes à maleſis gravitioribus tum liberans, tum præſervans ætibus. D. Georg. Hannel.

Ex ulcere penis hæmorrhagia enormis orta arte facilis quidem, at ſingulari cobibita.

Chirurgus quidam in æſſibus venericis curandiſ ſuſiſ

taria bene veritas me noctu ad ægium accitit, qui ex aperta arteriola in ulcere inter glandem & præputium penis tantum sanguinis illa nocte profuderat, ut ipse ex sanguine propemodum videretur. Imò audiri dicere, me dimidium cupam linteaminibus cruentis oppletam in cubiculo, nobis ille decumbebat, invenisse, non aliter se si femina quendam in procinctu percipit fuisse. Diversæ generis styptica applicuerat Chirurgus ante meum adventum, hoc illo tamen levavit, compressio vix ullus quoque ibi locus erat, propter membri configurationem: itaque in summis angustis erant & Chirurgus & æger, quem tamen momenti temporis spatio ab hoc periculo, Dei auxilio, liberavi, idque remedium simplicissimum: scilicet glandem penis præputio strinxi, & sic præputium arcte digitis compressi, unde ne gutta quidem amplius effluere potuit, sicque mihi fuit testatus *Frideric Ruyssius in Observationum Anatomico-Medicarum centuria*.

Alia in eodem argumentò Observatio.

Non ita pridem cum Hentico Annema periculisimo in hoc civitate Chirurgo vocati sumus ad ægium, ex cuius membro villi per orituram &c. eliceret sanguinis librix fluxuere, idque interduo tanta vi, ut majorem urinam excrevere non posset. Quod cum sit hæc parti vicium digne ut posteritati ejus historiam hic annexamus.

Jam Huybreckz annos 52. natus, vir robustus atque vegetus, habitans in vicò dictò Vocaverunt, ultimo Januarii 1688 onustus sacro testici, domi per asserem super aquam posuam transiit, pedemque vestis marginem figeret, alter invertebatur eà ratione, ut inter ipsius pedes asseris acies existeret, in quam pondere testici ita comprebatur ut peritonæi atque testiculorum mixta confusio adedet, absque vulnere externo aut hæmorrhagia, donec dimidia post eam elapsa hora urinao emitteret, tunc enim primo tria circiter sanguinis coehærentia effluere, utina clara & sine sanguine mixta ubique, quæ acrimonia sua summos in uteris exulsiabat dolores, nunquam tamen sanguinem effluibile nobis retulit, nisi dum tuius urinam redderet. Cùm itaque per horam 4. dies non nisi exigua quantitas sanguinis per meam efflueret, opere pretium non exstimabat Medici cupulam auxilium implorare. Qui d'contingit? Quinto à casu die, cùm supra sedem sese ponens, partes confusas aliquantulum duras agitare, sanguis cum pulsatione tanto impetu per urethram efflavit, ut adstantes ipsum jam jam moriturum credere. Ne tam omnia sanguis uno impetu efflueret, aliquis con sanguineorum penis partem anteriorem tamdiu comprimebat, donec nostrum auxilium implorassent. Domum intrantes, inter uxoris, filioque filiarumque ejusdem, morbum, & sanguineorum suspicia, ægium in m'terimo illo statu invenimus. Lecti regumina & reliqua ipsi vicina non aliter sanguine erant conspurcata, ac si tubos in loco illi, ubi æger decumbebat, jugularis fuisset. Intelligentes modum quo cecidisset, & quod per 4. dies consequenter exigua semper sanguinis quantitas, solummodo ante urina emissionem effluxisset, judicavimus spongiosam urethre substantiam, ejusque arterias læsas esse, sicut tam imperiosus illius sanguinis effluxus causas non sufficienter conciperemus. Præterea explorantes in inferiore abdominis parte, immediate supra pubis ossa, tumorem inflati capitis infans magnus, adseruimus illum propter dictam penis configurationem à regurgitante in vesicam sanguine ori-

ginem habere, quem admodum dictum nostrum eventus confirmavit: & explorantes ægrotantis pulsum, enim debilem ac languidum, propter tantæ copię sanguinis effusionem, invenimus, quæ propter hæc dubii, quibus inter tot ac tanta hinc primò occurrentibus, cogitantes præteritum, quod à sanguinem fluentibus, sanguis in vesica nimium incrassatur, & ab attenuatibus cuncta sanguis in corpore fluidior evadens, majorem etiam copiam per arterias, ubi casum internè dilacerant, effluere. Tandem aliquando re, ut dicebas, examinata, ex arena epipimus consilium, & diximus invictum potius malo succutendum esse, quod cum à nimia vitium debilitate, propter sanguinis effluxum immineret, simul mixturam qualem magnus Professor noster Franciscus De le Bœ Sylvius in præxi sua, nuper edi expta lib. 1. cap. 3. proposuit, ægrotanti nostro ad vitium corroboracionem & sanguinis fluxum silendum præscripsimus: quandoquidem propter summam vitium debilitatem venæ sectioni non daretur locus, & præterea periculo, cùm partis effectæ compressionem per ligaturas non possemus insin tuere, medicamentum altissimum applicuimus, atque hic ægrotantis viram per illam noctem conservavimus, sequenti die reversi, cùm sanguinis fluxus necdum in totum cessaret, & vires paulo melius euntes, venam ipsi in brachio aperuimus, atque decoctum vulnerarium præscripsimus. Tertio die ægium nostrum, quem modico tempore tempore constitutum detel queramus, in pressima statu invenimus; nam præterquam quod ex urina inaniitione singulis, etiam à sanguine in vesicalis partibus corrupto, ingens febris excitata. Gravissima hæc symptomata, cùm post itera enematum ex lacte dulci & electuarii diacath. et mixta cum dimidia Infectione minueretur, decocto vulnerario quodam diueticis addidimus, quæ sanguinis grumos jam semi-consumptos scilicet ex vesicæ propellebant, efflante sensim cum febre sanguine. Pauci, præter ea quæ enastivimus, medicamentis ægium nostrum in moris bilance versante, Deo benigne annuente, paucis temporis spatio o. scilicet restitimus. *Regnes de Graaf libro de Viruum organo &c.*

Vena cranialis spontanea aperta.

Rossia quadrata triginta & quod exerat annorum, plurimum libertorum maris, enim demum conceptus, sub ultimum excidit gustationis mensem ann. 1685, quorid'ano labori vacans, in femore sinistro, non procul ab inguine, & vena cranialis tangente, sed ipsa aperta, hæmorrhagiam insignem præter, cui ligaturæ, altique vulgares albam ovi cum aceto rosæ, applicatis vicini occurrunt: quatinde eum ab hinc diebus, cùm præteritis sola inenibet, voluere nuperum enormiter erudit, cui miscella aqua frigida, qua corpus antipater potuit niedelam quærit, postquam binis hinc vicibus ultra quatuor libras sanguinis perdidisset, quarta septimana ægra mirum quantum intumescere cepit, imprimis collum verius, quod instat aquæ lymphæ pellucebat. Die 2. Augusti, cùm nos convenirent, atque narrarent, huiusmodi eventum prædiximus, in primis si dolores partus ipsam non corripere, huncque ob finem mixturam convenientem præscripsimus, quæ & parte hausta, ab ipso mane infans nullum felicitate exha est. Sub vesper. eam ipsam invicemus cum D. Schothopii, de partu gravati fuimus, iuxta vero ægram pallore deprehendimus, tumore colli quamvis

remittente, & circa præcordia per intervalla opprimere: exhibita hinc una alteacea dosi diaphor. jovial. cum mixtura cordiali additis blandis volatilibus porrectissimis, commendatis juxta fuscus & prohibito vino: quibus cum ipsa sedulo obtemperasset, licet paroxysmus graviores quandoque intercurrerent, attamen, Deo benediciente, pristinam sanitatem feliciter recuperavit. *Joh. Jacob. Harderus in observationibus Anatomico-Prædictis.*

De hæmorrhagia ex ulcere tibia varicosa.

Feminiæ quadraginta annorum ulcus in tibia dextra exortum est à causa interna supra varicem satis amplum, quod nullis remediis obtemperabat, aderatque tumor & erysipelas satis grave nullis medicamentis moram gerens.

Post aliquot dies inopinato ab humore acido, corrosivo illic hærente aperius est varix, ex quo admodum duæ libræ sanguinis nigricantis ac (ut affantes asseverabant) in effluxu valde særentis promanaverunt.

Ego placentiam illam diutiusculam ex medicamentis acidum temperantibus constatam, quam in Observatione sexta primæ Decadis laudavi, à Chirurgo imponi curavi, & sic varicem non tantum obstruxi, verum etiam aliam illam in ulcere hærentem temperavi, quod alias corrosione sua varicem facile iterum aperuisset, ac præterea ulceris curationem impedivisset.

Erat visa mirabile, quod, postquam varix foris peccato aperitus tantam sanguinis copiam profunderat, erysipelas, aliæque symptomata mox evanuerunt, & ulcus, de die indiem melius habens, intra tres septimanas solius prædictæ placentiæ ope protulsi coalescit.

Ego jam temporis minime mihi proposui originem ac modum varicis, olesteris, ac erysipelatis ita dedere, quandoquidem illud in observatione sexta primæ Decadis satis accurate excutitus sum, & mihi semper, si cuiquam alii, crambæ bis cocta mors est.

Sed animus mihi est hic loci per experientiam confirmare, quod dixi & egi in primæ Decadis observatione sexta, quam indubitatam nempe si erysipelas ac ulcus originem suam trahere ab acido, & quam oportune instituerim sectionem varicis in ulcere illo tibia varicosa.

Hæc autem sine ullo negotio ex aliaro exemplo deducuntur, nam nec erysipelas nec ulcus, ulla remedia cedebat, quando varix ille tanta oigricante & absque dubio mora sua ærescentis sanguinis copia repletus erat, & quam primum sanguis ille peccatus efflaxerat, erysipelas evanuit, ulcusque non longo post coalescit. *Johann. Mayr Præcepta Chirurgica ratione Decade.*

Ad hæmorrhagiam ex dente evulso, Remedium.

*Clariss. Sylv. Samuelis Anhornii De Hartwys.
Ephemerid. German. Cent. 1. & 2.*

Hærent dentes aliquando ita fortiter & profunde alveolis suis infixi, ut etiam expertissimis in hoc artificio genere magistris, licet sospetato feliciter labore, ex hæmorrhagia vix compescibili fletu dispendium quandoque imminet. Non pauci sunt, quibus constingit lacerata arteriola nulla arte potuerunt, donec cum meliore vltæ thesauro, ipsam vi-

ram expirarent. Facile & haud unquam fallens auxilium ad reprimendum fasale hocce diluvium, hic addidisse tanto minus lectori displicebit, dum ejusdem pluries in desperatissima hujusmodi sanguinis ad usque deliquia profusione, vires præsentissimas expertus sum. Est verò hoc nihil aliud, quam ducus juglandis particula accensa, & flagrans alveolo densis extrahi India. Ni statim voto effectus respondeat, secundi & tertii vice est repetendum, & nucleus fornix alveolo imprimeodis, quo læsa arteriola tangi, & calore ejus constingi commodè possit. Sic sine ullo excitato dolore omnis hæmorrhagia in momento cessabit. Patienti verò per horas aliquot quietus manebit, nihil masticabit, minis calidum quid hauriet, porus de aqua ad hæmorrhagiam Sylvii aliquid per horas degustabit, donec vires paulatim redeant.

Plura alia de Hæmorrhagiis videri possunt in Bibliotheca nostra Medico-Prædictis.

HÆMORRHOIDES.

Curationes.

Quamquam sanguinis omnis fluxus periculosissimus sit, is tamen, qui ab hæmorrhoidibus est, si modum servare videatur, consuevit sepiusmodum prodelle. Adverte insuper Hippocratis à diuturnis fausto hæmorrhoidibus, ovis una servetus, aquam intercutere vel rabem linsimere: hæc autem certo supervenient, cum immoderate fluunt, aut ictores inde exadant, ut pluries experientia comprobavit.

Tument autem & rubent omniumque hæmorrhoides, & dolorem acerbissimum asserunt, hoc & capiti gravamen cordi, & pectori oppellentiæ, stomacho nuseam, & alvo duritiem parant. Hoc incommodo variis occurrere consueverunt Medici: consuetiora verò purgant linimenta ex oleo virilium ovorum, seminum lioi, buxi, balsamo sulphuris Rulandi, lacte auro, sambucæ, augmento linariæ, populeæ, & malorum insinuant. Scribit Hentius ab Hæm. scriptum à Castenti Pastore edictum, experiri esse, minimum qui scrofulariæ, si ve radicis, foliorum cum cibo aut potu assumpere, itatim dolorem hæmorrhoidum sedare. Hartmannus & Hostius maximi faciunt horariam, quam in ligamento redigant cum vitello ovis. Et apud Rivetium Pacqueus ex Arnaldo Villano, summè commendat Infusum millefolii in aqua fervente, & per mensem integrum epotum. Chelidonium minus mirabile prædicat in omnibus hæmorrhoidum vitæ Solenander. Millepedes effert Quercetanus, & Hærens, in oleo nocum excoctis. Aliæ ex illi oleum conficit Borellus, illudque sæpius in die frigidius admovent dolentibus immensibusque hæmorrhoidibus. Hartmannus uritur decocto scabæborum rotundorum in oleo lini; itemque cinere suberis cum auxingia cati, vel oleo myrrino. Decoctum raphi barbat, malvæ, althææ, parietariæ, & quatuor anodymorum efficac aliis dicitur; itemque corpa alba sub cineribus cocta, & cum bnyro recenti subacta insit carapissantis. Helmontio commendantur annulus dentis equi marini, & modicum sudor, quo hæmorrhoides, & exuberationes quasvisque solo contractu compri, & complari scribit. Oleum ex Hostio sambucæ, vel ex cortice ejusdem interiori in oleo seminum lioi, vel nucum incoctis cum modico croci ex voto aliquando feliciter profecit. Cordilacius in Hartmannum, excellentissimum se exper-

tum

rum dicit emplastrum Apostolicum, quod dolorem sedet, & sanguinem effluere linat.

Ha puzetia immodice fluentibus medentur mellisfolium insitum, radia scrofularia, tormentilla, bistorta, C. C. usum, ut & suber eff. nia mart. in aqua sempervivis stillantia, & alia sistenda sanguini opportuna superius telata. Conficite Solaneder pululca ad bdello, trochiscis terra sigillata, & carabe, cum liquore & seminis corchorum ea aq. rosar. expiello, quas mirabiles facietur: scribit etiam, tribus feminibus genitrix mane quotidie sumptis, hæmorrhoidum, & cuspis sanguinis profluvium sili, itemque epota aq. stillantis chellidii, aut etiam (quod rarius ait) vino, in quo chellidulium ipsum fuerit maceratum. Externe vero fluentem sanguinem cohibere referuntur fumigationes ea thure, aloë, malliche, pier, carabe verbalico, foliis quercus, crepitu lupi, qui solus siccat, & venis sanguinem fundentibus adnotus, remedio est: fluxum quoque inhiberi ex croco mart. inferpo testatur alii: & Hæmum pulvere colchicatis, seu vitrioli usui. Si tangerent, inquit Frid. Hofmannus, hæmorrhoides tubercula radice chondillæ, siccantur, si chondilla siccatur, corruptumque, si corruptum, quare sub camino exicandam consolat. Cingulum conficit Hæmannus ex foliis hellebori nigeli recentibus, quo nudum corpus circumdari ait successu felicissimo: atque hoc etiam cohiberi etiam mensis immoderate fluentes. Suctus plantaginis iniectiones excas quoque hæmorrhoides sanare ferunt. Lotio ex urina propria, mox fumus sulphuris per tritorium exceptus dolori, & fluxui aliquando medela fuit, ea Velichio. Cætera alibi ad sistendum sanguinem descripra ex vitriolo, alumine, marte, opio, hic etiam adhiberi possunt.

Si denique à suppreffis hæmorrhoidibus mala in corpus universum proficiscantur, ac propterea opus sit illas referare, Interque sanguinem elicere, præcipuum erit elixir proprietatis Paracelsi simpliciter etiam insitum paratum. Conferunt pariter pilulæ Aloëphanginæ, Rasi, Rhafis, Aloë, croco, & succo ablinthi iustata, & quidquid ex Aloë est compositum. Interim adhibenda quæ venas ipsas emolliant, ac relaxent, ut potissimum sunt balnea ex decoctis laxantium herbis, malvæ, alchææ, anethi, violarum, quatuor anodynorum, & similibus. Post hæc solent nonnulli foliis ficus, aut frondibus parietaræ illas perficere, ut sanguinem deponant. Idipsum alii tentant succo comparum aloë misto. At cavendum ne nimio afflicto partes illæ exasperentur, & inflammationem contrahant quam non raro gangræna comitantur: quamobrem satius erit medicamentis internis sanguinis exitum per movere, vel ejusdem vitium moderari; exterius verb blandioribus uri. *Lucas Tazet Medic. Pract. lib. 2.*

De Hæmorrhoidum fluxu.

N B. Hæmorrhoides diuturnæ non sunt statim supprimendæ, metu refluxus ad ocelliores partes, unde phlebotomus, hæmipis, canceri, maniz, empietiz, aliorumque gravissimorum morborum impendentes periculum. Fluxus itaque non attingentibus illico sistendus est, sed potius revulsione, sanguinis acrimonia correctione, toni partium corroborazione, &c. sensim minuendus.

Viculis sic refrigeratis & humectatis. Vescatur ut plerumque carnis elixis juniorum animalium. Alteretur autem puleiola boragine, buglossio, portulaca, agrimon. plantag. pimpinell. pomis, trifolio, acerosia, sylv. fruct. berber. addit. C. C. ebote, dente squi marini, rad. chin. tormentill. Flant aut in

aqua tepidissime chalybeata, vel saltem in libere fetreo. Colatura acidula reddatur cum sp. vitrioli corallat.

Notandum, ea esse in cibo danda quæ non sint duræ substantiæ, sed facile periantent, & mollis reddant incrementa; siquidem durities fecum maxime noxam in hoc afficit. Ova scrobilia, succus caninum, sorbitionis crebræ maxime conveniunt. Abstineat ab omnibus acerbis, salis, præcalidis.

Petus sit prisca cum china, rasura dentis hippopot. ebort. C. C. rad. tormentill. glycyrrhia. Pomaceum cum isdem & rad. filipend. scrofular. major. &c. paratam, ita ut cum illis f. fermentatio. Amygdalata, & emulsiones ex quatuor frig. sem. maj. in aqua chalybeata, addit. plantag. sem. iopbie chiturg. & portulac. Julapiz item v. g.

℞ Ros. Rub. p. iij. flor. veron. rub. p. iv. violar. boug. buglossi. an. p. ij. rad. tormentill. 3ij. fant. citrin 3j. aq. fontan purissim. lb. iv. cum sp. vitrioli corallat. q. l. f. emulsa. Colaturæ addit. terentiam vel mediam partem pomacet, & saccharo edulcoratur.

Somnus convenit visceribus, ut labor articulis: propterea cavendum à vigiliis & lucubrationibus quæ sanguinem accunt & fluxum augent. Somnus omnes fluxiones sistit, excepto sudore & scemio fluxione.

Exercendum moderatè corpus ante passus, & abstinentum à vita nimis sedentaria.

Ad facces ea primis viis eliminandas injiciantur elixir leniens cum cassia vel elect lenitiv. Decocto autem admiscenda sunt robotantia & altingentia quædam, ut dum lignot enematis facces educit, qualiter intestino impressa remaneat, verbi gratia, tot. plantag. sophia, alchymill. &c.

Validiora purgantia noxia: Conveniunt syr. ex cassia, violarum solutiv. de pomis solutiv. cum camariand. polygod. cass. fenn. sem. & rad. violar. Prima laxantia cum manna. Horum ope si alias alvus non responderet toto curacionis decursu facces, antequam nimis induruerent, subducentes sunt.

Revulsio, præsertim in plethoricis, tentanda si per phlebotomiam brachiorum sæpius iteratam in parva quantitate, in aliis per cucurbitulas sæpiissime t. gioni hepatis applicatas.

Chalybs five ferrum, specificum in hoc affectu remedium est, obstractiones viscerum tollens, aram bitem (nam hoc noxio laborantes plerumque sunt hypochondriaci) domans & plurimum dulcificans, vicata robotans. Incipiendum à sycupo de scoria ferri vel alio chalybeato cum cichor. tormentill. scrofular. filipend. portulac. plantag. prunell. vinc. pet. vine. alchymill. &c. Inde veniendum ad vinum vel cerevitiarum chalybeatum. Patentur autem ex croco Martis aperient. parato ea ferro, non ex chalybe; vel ea bastitura ferri. Tandem progressus ad substantiam Martis, inter cujus præparata maxime in hac casu convenit ferrum cum aceto præp. Ex hoc fieri possunt Electuarium vel pilulæ, addit. margarit. corall. &c. tumend. man. per longum tempus. Horum medicamentorum formulæ sint hæc juscmodi.

Scoria ferri decies ignita & calcinata sit in succo plantag. & portulac. addita vin. alb. Rhenan. tertia parte. Pulvis hujus postea calcietur.

℞ 3vi. rad. sec. scrofular. maj. filipend. tormentill. an. 3j. rad. cichor. tapç barbar. an. 3iij. sem. sophiz chiturgot. plantag. an. 3b. rasur. dent. bipop. C. C. ebort. an. 3ij. santal. electin. 3ij. Omnia præparata macerentur in q. l. focc. depuræ. buglossi.

cera potuerat formati suppositoria ad necessitatem.

Ad fluxum immoderatum sistendum utiliter exten-
detur admoveat possunt sequentia.

2. Unguenti populei ʒij. mucilag. sem. pŷll. & cydus. extract. in aqua plantag. & spermat. ranarum ʒijss. osium humanum ad summum albidinem calcinat. ʒvi. bol. Armen. croci Martis attingent. sang. draconis, sang. human. vel bubul. desiccatis & subtil. pulverisat. an. ʒi. vitell. ovorum numero 2. scedatis Saturni ʒij. m. 6. & longa agi-
tatione f. Natrium applicandum ano com bombace molli. Vel.

3. Plumbi albi (vide de sumenda residua præ-
parata in parando lacte virginali) ʒis. croci ʒij. croci Martis attingentis, lap. testillis (ardais) an. ʒi. f. omnium alkool. excipient. unguent. popul. ag. ʒi. duo in mortario plumbeo, & f. linimen-
tum satis durum applicandum bis in die ex lini-
mento castro. Po. et excipit paribus duabus ver-
nicis plæorum, & una unguenti populei. Vernix
autem preparatur ex ol. lini ʒiij. terebinth. Venet.
ʒiv. sandarac. pulvill. live gum. juniperi ʒij. Li-
quenter simul leni igne.

4. Cochlear. liqac. in vitibus collect. mundat.
& in elibano calcinat. ʒi. cum ʒi. butyr. recen-
tis, agitur ramis in mortario plumbeo donec f.
linimentum.

Item aselli; vel as. utrum cum ol. rosæ agitur
in mortario plumbeum unguenti instat.

5. Suberis q. v. utatur, & in pulverem rediga-
tur, qui mixtus cum ovi albumine applicetur.

6. Tett. Sigillat. boli Armen. trochic. spod. de
carabé an. ʒi. succi urticæ alb. ʒss. alb. ovorum q. f.
i. liens quo ungatur anus ter in die.

7. Ros. rubr. summit. tubi, verbasci, caudæ
equinæ an. manip. j. cort. granator. balauil. nuc.
cupress. atomisat. ana ʒij. aqua plantag. ʒij. f. de-
coctio ad ʒss. Colaturæ adde mell. rosac. ʒi. f.
sorus.

Experimentum Patris Ortonal. Pulvis quidam in-
stat tursus qui adhaeret fillic, cæterach, olivundæ
regali; vino alb. vel aqua Rosat. locus humectatur,
mox pulvere aspergitur.

Balneario in aqua sabrorum moluum juvat.

Anus ablatur decoct. virg. aut. sanguinar. vinc.
petvine. sanguisorb. &c. parat. & in aqua chalybeat. &
conspargatur Cornu Cervi calcinato.

Soffus fiat ex eodem decocto cum dimidia parte
aceti projectus in scotiam ferri candent. excipiend. in
sella perforata.

Cataplasma lumbis potest applicari ex argilla
emollita succis plantag. potulac. sophiæ & acet.
rosi.

Si ab hisce fluxus immoderatus fuit nequeat, tunc
rebus desperate veniendum ad ferrum caedens quo
venæ sunt urandæ & cauterizandæ: quo casu venarum
unam intactam relinquere sæpe necesse erit, ne fluxus
omnimodò simul suppressio pars aliqua ex nobilioribus
penas luat.

Si sanguis ab hæmorrhoidibus internis immoder-
atè fluat, quæcumque ex prædictis commodè ano
inici vel indi possunt, similis hic ac externis opem
conferunt.

N. B. Ubi aliquid indendum est ano quod partes
affectas tingat, sumatur tantum lebon cervinum, da-
mæ, ycygicum, &c. ex quo, ut statim docet biter,
preparatio poterunt projecti in modulos suppositoria
paritè magnitudinis, quæ unguento populeo aut ver-
nice liquida delibata immittantur ano.

Sedum sic præparant.

2. Tapŷi barbari stotem albom gerehtis totius
minutim concili man. ij. foliorum hedetæ testellus,
chelidon. majoran. totius ana man. j. rad. scrofula-
lar. majoran. & chelidon. minor. an. ʒij. rad. hyo-
cyam. concili. ʒij. capite papav. albi majoran. nu-
mero quarto aqua vel succi rosat. plantag. solan.
ana ʒss. arungie foliis recort. ʒss. sibi cervia.
ʒiv. Coq. ad herborum putillag. & liquorum
consumptionem, & expressio foris pinguedinis ad
ulium dictum.

Quoniam autem hoc genus hæmorrhoides ex-
cedat, cum non fluant, sunt admodum dolosice,
sedati potest dolor à seq.

2. Emull. sem. papav. alb. fact. cum decocto
fol. tapŷi barbari. ʒiv. mucilag. sem. fenugrec. &
pŷll. extract. in aqua solan. ʒ. unguentum popul.
cum vitell. ovi dilloset. ʒss. m. f. pro injectione
facienda, quæ quamdiu fieri poterit, continuabitur
bis in die tepide.

3. Sebi hircini, vel, si desit, aiteius q. f. ad
formandum suppositorium; huic addit opŷ ʒss. Alli-
ga filo, immittite ano, dolorem tollit, formum
consequenter conciliat, qui, si sit nimis, extraha-
tur.

Unguentum anodynum potest sit ex succo stramonii
& arungie, formatur veluti suppositoria
quæ induitur ano. Compescunt dolorem hæmor-
rhoidum quasi miraculo. Stramonium autem sumat
ur spinosum Peruvianum. Theodor. de Mayerne Pra-
xius Medica lib. 3.

De Hæmorrhoidibus, ac earum Chirurgiæ hæc
habes Hieronymus Fabricius ab Aquapendente.

De hæmorrhoidibus agentes, non Chirurgiam
tantum trademus, ut in alijs factum est, sed
primò naturalem hæmorrhoidum historiam præ-
mittemus. Deinde quædam usus hæmorrhoidum
in medicina sit, explicabimus. Ulumò Chirurgiam
administramus.

Ad primum quod attinet, Hæmorrhoids est
vox composita, hæm in alijs, quod sanguinem,
& ʒis, quod suo significat, & sanguinis fluxum,
seu effluviu. ʒonaz. Quod licet ad venas refer-
ratur, sanguinem fundentes, non tamen om-
nes venæ sanguinem fundentes hoc nomine ap-
pellantur, sed tantum Cælus, & Galenus de
Theriaca ad Pisonem, Capite 5. venas sedis, &
uteri, hæmorrhoides appellantur, fontè per ex-
cellentiam ita nominantes, quod præ cæteris, venæ
cum alijs, tum utri frequentes fundere san-
guinem soleant: unde Cælus. Libro 6. Cap. 18.
idem assemanz, & loquens de venis sedis, dixit:
ora venarum, tangat ex capibus quibudam
surgentia, quæ vocantur sanguinem fondunt, hæmor-
rhoides Græci vocant: & subiungit; idque etiam
in ore volute formidant incidere consuevit. Idem
quoque sentit Paulus Lib. 3. Cap. 59. Quo loco
advertendum, Galen. Cælus & Paulum, postea
ora venarum hæmorrhoides appellare, quam venas,
& merito, quia ex oculis sanguis effundit;
& quia ʒijmodi ora sanguinem sæpe fundentia
sunt potissimum in utero, & sede, ideo
in his tantum partibus hæmorrhoides esse cen-
suerunt. Causa autem, cur in sede capta venarum
assurgant, & infundantur aque ora aperian-
tur, & sanguinem effundant, duplex esse potest: pri-
ma est, quando natura à sanguine crasso irritata, cum
ad venarum caput propellit, & ora aperit; altera
videt

verò causa explicatur ab Hippoc. Libello de Hæmorrhoidibus his verbis. Cum bilis, aut pituita ad venas recti intestini deobstruit, intelligatis vos, bilis, quæ à porto sellæ in intestina excutitur, & picuitum similiter in ventriculo genitur, & quæ ad intestinum rectum transmittitur, & ex mora calefit, & salsa redditur, utraque sanguinem, qui in venis est, calcificat; calcificantes autem venæ, ex vicinis venis sanguinem attrahunt, & ubi replentur, interna sedis pars intumescit, & capita venarum supereminent, & partim dum à stercore excurrente comprimuntur, partim dum à coarctato sanguine coguntur, singularem ejaculant; atque hoc maxime quidem unum cum stercore, aliquando verò etiam sine stercore. Hæc ait Hippocrates. Nunc hæmorrhoidum differentie proponenda sunt. Prima differentia hæmorrhoidum ea est, quia alii habent, alii non habent; quam differentiam posuit primò Hippocrates, dum dixit; Qui hæmorrhoides habent, &c. & ex ipsa experientia, & rei natura elicitur, quæ etiam differentia observatur, non solum in singularibus, sed etiam in una magna, quam in alia regione; unde qui septentrionalem plagam incolunt, paucissimi solent hæmorrhoides habere; contra qui Meridionalem. Puto ego id provenire ex friguitate, & caliditate aëris ambientis, quæ in illa quidem venarum ora adstringit, in alia verò humores, & sanguinem exurit, funditque, & ora venarum aperit. Secunda differentia fit illa, quam Paulus innuit Lib. 3. Cap. 59. item Aetius Lib. 14. Cap. 5. & ante ipsum Galenus in Hæcagogicis Introductionibus, quod alie hæmorrhoides sint cæcæ, seu obsecatæ, alie apparentes, & apertæ. Apparentes notæ sunt etenim sunt venarum ora hians, & aperta; cæcæ verò, seu obsecatæ sunt, ut puto, quarum alia ora aperta fuerit, nunc verò obsecrata sunt, & clausa; etenim eus, qui nunquam hæmorrhoides habuit, impropiè dictimus cæcæ esse. Ideò Aetius cæcæ hæmorrhoides appellavit, semper intumescens, nihil aut parum admodum excrementis. Tertia differentia est, quia hæmorrhoides alie sunt, quæ sanguinem fundunt, & ruidæ non sunt; alie verò, quæ sanguinem fundunt, & tument. Quæ non tument sunt vix, & inculpatæ, si modò moderatè fluant; quæ verò tument, signum est non omnem sanguinem emittere, sed etiam ipse continere. Rursus hæmorrhoidum, quæ cæcæ sunt, & tument, alie lehores effundunt, alie sanient; quæ sanient, sunt exulceratæ; quæ verò lehores, excoctæ non sunt, sed ex potiuscibus, propter intumescerant adaperit fluit; ideoque in nixu egerendum, sicut lehores affundunt. Alias quoque hæmorrhoidum differentias, videlicet quinque adhuc proposuit Gal. Lib. Definitionem Medie, quia à magnitudine, multitudine, figura, loco, & constitutione delinuntur. A magnitudine, cum alie magnæ sint; alie parvæ, alie mediæ. Amplitudine, cum plures in aliis pauciores habeantur. A figura, quod nonnullæ angulæ, quædam lora sint basi. Item quædam vix acinup referant, tum figura, tum magnitudine, tum aro colore. A loco, quando alie, in ano, quædam in sphinctere, id est rectore, alie in recto sunt intestino. A constitutione, quoniam alie mites sunt, alie malignæ, catenodes dicte; & præterea alie gangrenosæ, alie non. His propositis hæmorrhoidum varietatibus, & differentiis, ea postremo proponenda est, ut sciamus hæmorrhoides alias quidem fieri à vena portæ, seu lienis, alia à vena cava. A vena lienis hæmorrhoides fieri omnes tum antiqui tum recentiores testantur, & ipsa Anatomie con-

firman, quæ demonstrat, à vena lienis, à porta deducta, propaginem istam dignam recta deorsum ad rectum intestinum produci, & terò magis ad coecum in ipsum inferi, & propagari, at à vena cava, hoc est, à propaginibus venæ cavæ, quæ in magna cavitate ab ille laro, & coxendice efformata producuntur, duo effari digni rami antiquis ignoti, ad anum propagantur, à dextra scilicet, & sinistra parte; qui per intestini, & sedis musculos discriminantur, quæ ipsas venas, conflunt hæmorrhoidales, sanguinem fundentes, quæ non sine ratione sanguinem fundunt; nam venarum rectitudo primò confert, inde sanguis quo ponderat illic infusus, ac descendens, venas implet, ac distendit, postea sequuntur musculorum motus, qui costringendo exprimunt dilatatio intestini, & musculi à facibus succedunt. Omittit Hippocratis rationes superius adductas, quæ omnia, apertis ora venarum cogunt; & urlem profusionem promovent, ad morbus tum præcavendos, tum debellandos.

Sed antequam id disciquemus, videlicet, quomodo hæmorrhoides morbus tum accitit, tum sanent, non incommodum est, ante omnia, duarum propositarum venarum histoniam exactè recensere. Venæ hæmorrhoidales, quæ postea vasa hæmorrhoidalia dici debent, quod vix à cava deductæ comitem habeant arteriam, non rariè ab Antiquis vasa, sed venæ dicte sunt hæmorrhoidales; quod uti opinor, vena hæmorrhoidalis lienis arteriam non habet adjuncam, vel potius dicamus, quia venarum ora non difficulter aperiantur, & sanguinem fundant; attingunt vero ut nequaquam, aut maxima cum difficultate; quia arterie corpus durum est, & ora adstricta sunt, tum verò arterialis sanguis va ratione non indiget, cum tam quantitate, aut qualitate peccet, ut venarum sanguis, ideo cum natura qualitativum sibi conservat; hic igitur venarum sanguis, hoc sanè modo primùm à porta ad sedem derivatur, etenim à magno portæ ramo, qui ad lienem fertur, quasi ab ejus moderata, propagio effatu digna oriunt, & rectè per mesenterium ad rectum descendit intestinum, quæ longè supra in ipsum pertingit, & distendit, quam ad ultimas intestini oras finitur. Ultimò, oris sui terminum ad intestini finem habet, multis, non tamen omnino exiguis propaginibus, præsertim cum tument, & sanguinem fundunt. At alia vasa hoc sanè modo à cava vena, & magna arteria ad anum deducuntur; etenim à magna utroque distractione, ut sic loquar, in ultimis lumborum vertebis facta, duo maximi rami hinc inde, unus cum venæ, tum arterie in cæca propagantur, in qua parte privatim arteriæ venæ superflue; ab his duæ effatu dignæ propagines producuntur, & ambæ oblique ad rectum intestinum, non tamen in ejus corpus inferuntur, sed in musculum ipsum cingentem intestinum, sphincterem dictum, applicantur, & per ipsum discuntur; postea adhuc exterius excurrentes, podicem, & alium sphincterem curantem, & ipsam etiam cistem intereunt, atque in hæc finitur, Podex enim, seu anus, hoc est, exterior annus, seu ani pars, ex musculo, & cure constans, utraque pars tenuissima est; nam musculus ex tenuissimis membranis catenolæ fibris, in orbem ad podicem circumductis conficitur; cæca autem propemodum labiorum cistem imitatur. Tenuissima autem oportuit esse hæc duo corpora, alioqui adstringi admodum non possent; atque cum hic sphincter, superficialis muscularis, conjunctionem habeat cum musculo alio sphincteris interno, qui exterius intestinum obvolvitur,

fit ut propolizæ venæ cavæ propagines, quæ ad internum sphincter præius pertingunt, etiam ad reliquum podicem exterius perveniunt; ex quo sequitur, ut sanguis omnis utriusque sphincteris, & cutis, venæ cavæ sanguis sit, & externæ hæmorrhoides jure appellari possint, quod in exteriori superficie apparent, & fiant. Contra, quia vena lienis ad intestini corpus insitit, & ipsum irrigat, omnis venæ portæ sanguis sit; tum verò hæmorrhoidales venæ interæ, hæmorrhoides jure debeant appellari, quod ad intestini os perveniunt, quam non ita promptè, nisi digitis eam exterius trahendo, conspicias. Dux autem sunt hæmorrhoidales venæ, videlicet à portæ, & cavæ deductæ: propter eam causam, quoniam usus venarum, quæ in sede sunt, in genere idem sunt, qui aliarum venarum, videlicet ad partes sanguine nutriendas. Et quia in sede sunt partes ab invicem multò differentes, crassum intestinum & musculi, quæ anum constituunt; nam quatuor Galenus tres partes in sede constituit, anm, intestinum, & sphincter musculum; quia tamen per anum, forte musculum in superficie positum, renem, & coeliacum, ipsum quoque sphincter intellexit, propterea verè dictum est, in sede duas partes notari, quas diversò sanguine nutrire natura confluxit, nam intestinum crassum, cui omnia in abdomine, & à peritoneo membra continentur, & concludit, tanquam primæ, & infimæ animæ, vegetali nimirum, famulantiæ, à portæ ramis, & sanguine, scilicet chylolo, neque ita puro, nutriuntur, musculi verò omnes, & cutis, tanquam perfectiora nigra, nimirum sentienti, nervitque animæ dikata, à cavæ nutriuntur, nempe sanguine defecato, & puro, ut cateræ corporis partes, propterea consensaneum erat, in sede duplex genus venarum constitueret, & portæ, & cavæ.

Notandum autem est, quod rarum vobis videbitur, quod etiam Gal. deest non consentire apparet, qui omnia membra in abdomine coearent peritoneo obduci voluit, ut ventricolum, intestina, jecur, fellis vesicam, lienem, omentum, mesenterium, renes, vesicam, uterum, vasa, &c. quæ aliæ sunt in infimo ventre contentæ partes, cum tamen hoc verum non sit. Sed rei veritas sic se habet, quod omnia membra in abdomine coeant, quæ à portæ ramos habent, & ab ea nutriuntur, tantum à peritoneo comprehenduntur; quæ verò à cavæ, extra peritoneum sunt, etiam in abdomine coeantur. Quo circa renes, qui à cavæ per emulgentes, si peritonei separationem à subiectis partibus, ex Anatomicis, ipsi digitis tentabam; siquid enim apparebit, renes, & alia sub peritoneo non consistere. Quæ si vera sunt, nil mirum, si in infimo ventre, & recto intestino duas hæmorrhoidales venas constituamus, portæ, & cavæ, postquam & aliæ partes in hoc infimo ventre contentæ, à portæ quiescant, & à cavæ venas sortire sunt, non tamen pari ratione omnes, nam renes ita à cavæ venas sortiantur, or à portæ, nequaquam recipiant; at rectum intestinum, primo intro videtur tum à portæ, tum à cavæ venas admittere; quod tamen verum non est, quia vena hæmorrhoidalis à portæ, ad intestinum solum defertur, à cavæ verò, ad solos musculos, uti paulò supra dictum est.

Inque ad rem revertentes, duplex genus venarum hæmorrhoidalium constituit oportet, portæ, & cavæ; & quia apertiores, quæ à cavæ nascuntur, & numero plures, & mox majores sunt; etenim quatuor sunt musculi, omnes sphincter, qui crassus est, & in orbem elegit intestinum, & alii duo, hinc inde unus, intestinum attolentes, quatuor cutaneus anum constitutens, hinc factum est, ut venæ à cavæ deductæ, dux sint, à portæ verò una tantum, & à laceribus primæ producantur, quia hinc inde musculi sunt. Et quia musculi nobiliores partes sunt, ideo arteriam adjunctam habent, ignobiliores verò, ut intestinum, ateria sunt destituta, uti etiam plantæ hæc eadem anima predestit. Patet igitur, cur venæ in sede duorum sint generum, portæ scilicet, & cavæ, & cur una à vena portæ, dux verò à cavæ sint transmissæ, & quæ à cavæ, hinc inde possint, quæ verò à portæ tertio magis; denique quæ à portæ, ateria deliquantur, quæ verò à cavæ, ateria habent.

Ex qua hæmorrhoidum historia, & venæ cavæ nova hæmorrhoidum cognoscunt, multa licet ex his velut corollaria colligere, & Venæm de ceteris adicere; videlicet, venis hæmorrhoidales duplices esse, portæ, & cavæ; utraque autem ad sedem pertingere, ac propagari, sed portæ hæmorrhoides ad intestinum potissimum deduci, & cavæ verò, magis ad sedis musculos, quod est secundum corollarium. Tertiò, portæ hæmorrhoides tertio plurimum in intestinum ingredi, inde per totum disseminari; cavæ verò, ad latera plurimum portæ, inde per ambos sphincteres musculos progredi, & succedere. Quartò, sanguinem à portæ hæmorrhoidibus excurrentem crassum esse, nigrum, & faculentum; à cavæ vero, nuncquam, imò sepe tenuiorem, & rubicundiorē apparere. Propter quam causam, quæto elicitur, videlicet, insignes sanguinis hæmorrhoidales profusiones, majores fieri à venis cavæ, quam à venis portæ, ideoque priores cum majori periculo evenire; quod majores, & plures sint rami cavæ ad sedem delati, & dispersi, quam portæ; & propterea, propter cavæ grandiores ramos positi. Sexto elicitur, hæmorrhoides portæ subvenire morbis à sanguine melancholico, propter ejus communiorē, potenteris; cavæ verò, ceteris aliis. Item ubi crassum, & faculentum sanguinem erit videri, à vena lienis, ubi verò subcundiorē, à cavæ nante non perpetuo judicabit. Ultimo licet quæ aliquand colligere cetera huiusmodi applicationem, videlicet utilem, quimodè variam. Num si forento est melancholicum sanguinem educere à vena lienis, tum tertio spinam, & coccygem veteres, tum latera magis, ad intestinum applicare huiusmodi oportet, quod quomodo venæ propagantur; si verò alium quinquam à cavæ, tum à laceribus, tum superficie tenes, ubi venæ ejusmodi sunt, applicandæ erunt. Quibus ita de hæmorrhoidibus, tanquam ad naturalium historiam pertinentibus, exploratis, nunc quis nisi hæc orthoidum in medicina sit, & quomodo faciant ad morbos tum præcavendos, tum debellandos, inquirendum.

Ceterum est, hæmorrhoidibus abuti naturam passim ad sanguinem expurgandum; ut si quid prævi, aut immoderatè sanguinis sit, tum in portæ vena, tum in cavæ, extra corpus mi rari, atque ita, oculis venarum adaptatis hæmorrhoides fiant. Quam portio expurgationem, non per aliam partem, quam per anum commodè efficitur.

efficere oatura poterat, sanguinem per eam, quæ ab ipsa natura eorum leorina, & clota omnium extremorum confluit; est; ut propterea non sit mirandum, si venarum oculis appetit, nonnulli inculpat fruantur sanitate, nonnulli à gravissimis morbis tum liberentur, tum præserventur, ut dicit Galenus. Itaque hoc in præsentia dilquirere circa propostas venas opportunitatem est, nimirum quomodo, & quibus conferant, & ad sanitatem conservandam, & ad morbos tum curandos, tum præcavendos eandem tum apertam, tum occultam; nam si aperiantur, ubi sanguis in corpore est vitiosus, aut immoderatus, sanum corpus degit; si occultantur, ubi sanguis in venis putus est, bonus, & moderatus, sanitas similiter consequitur; contra verò, si contrarium accidat, si istidem aperiantur, cum morbus adeit, aut imminet, sanitatem pollicentur; si verò tunc occultantur, morbum præsentem auctum huius, & impendere certum est. Propterea Galenus Libro de Curat. per sang. misadversus Erasistratum Cap. 5. dicit, hæmorrhoidas servare hominem sanum, cuius ratio 3. de Hum. & de Morb. Vulg. Comm. 3. ab ipso asseritur, quia per hæmorrhoidas supervacui humores expurgantur. Ideoque Hippocrates 3. de Hæmorrhoidibus dicit, qui hæmorrhoidas habent, nullis tantum morbis conipi posse; propterea quod, si maximus morborum proveniens ex sanguine, & hæmorrhoidibus, qui in venis sunt, provenit, venit autem dux tantum in corpore fuit, porta, & cava, si per hæmorrhoidas utraque expurgatur, cum ambe ad eandem concurrat, omnino universum corpus expurgabitur per utramque, & ita corpus nullis corripitur morbis, ut dicit Hippocrates.

Ut autem hæc omnia luce metidiosa clariora sint, & vobis perspicua; & simul quibus morbis hæmorrhoides conferant, unum autem omnia vos ediscere convenit, & memoris mandare, videlicet, Priscos auctores nullam habuisse noticiam venarum hæmorrhoidallium in sede, quæ à cava proveniunt, quod verissimum esse patet ex eorum auctoritatibus, quæ omnes, tantummodo venam, quæ à ramo lienis fertur ad intestinum, à qua sanguis crassus, & melancholicus expurgatur, recipiunt. Una Gal. Auctoritas est 6. Aphor. 2. & 47. Per hæmorrhoidas, hepatis materia feculenta vitiosa expurgatur. Secundo, in hæmorrhoidas atram bilem descendere. Secundo, ad Clauca. testatur; & ob hanc causam dicit, naturam vix quoddam peculiare à vena lienis ad anam produxisse, per quod atra bilis, & omnino sanguis crassus, & melancholicus evacuatur. Tertia, 4. Aphor. 31. & 25. Hæmorrhoides sunt maximum remedium melancholiz, ita ut ipsam etiam furcam prohibeat. Idem quoque dicit 6. de Morb. vulg. Comm. 3. & est quarta auctoritas. Quinta, Hæmorrhoides supervenientes atra bile vexari, bonum, 6. Aphor. 1. idem 21. & 48. Sexta, Hæmorrhoides sanare atram bilem & lienem induturum, sexto in Sextum de Morb. vulg. com. 8. Septima, melancholia fit ex atra bile, scilicet hæmorrhoides, quando ad venas, quæ in sede sunt, cumulatur decumbit, 3. Aphor. 30. Octava, Attribulatio cum phlegmate occupata, si hæmorrhoides obducantur, bonum est, Libro de Iodicationibus, pag. 398. Et breviter, si Hippocraticis, & Galeni, Veterumque volumina accuratè evolvamus, nihil amplius invenimus. Illud autem inficiandum non est, Priscos ipsa experientia inductos, nonnumquam facillè morborum mentinem, qui ab hæmorrhoidibus sanantur, aut præcaventur, quorum causa abstrusa illis est, cum ignorent hæmorrhoidales venas

cava, ut constat, ex Hippocrat. 2. Lib. de Hum. or. & 6. de Morb. vulg. utrobique Comm. 3. Qui hæmorrhoidas habent, ille neque dolore lateris, neque pulmonis inflammatione, neque iurunculis, neque phagedæna, neque terribilibus, neque lepra, neque forè aliis corripitur; neque enim ullam communionem hæmorrhoides portæ cum pectore habent, & cum pleuride, & peripneumonia. Similiter cum dicit Hippocrates 6. Aphor. 21. hæmorrhoides supervenientes reum pulionibus, lonum peto, quid venibus cum vena lienis? Neque obstat Gal. in Comenno dicere, per hæmorrhoidas, crassum sanguinem evacuati, qui nephritim facit, quoniam crassus ille sanguis ex vena cava per hæmorrhoidas expurgatur, cum qua communionem, & rectum, ac propinquum habet ductum, nusquam ex vena portæ vena, quæ longinquæ est, neque cum ea societatem habet ullam. Unde hoc loco ita Galenum escusare licebit, sicut escusavimus, cum Pleuritidem expurgari per utrumque ducit per laves arterias, cor, & magnam atriædam, cum commodiore viam, rursorem, & faciliorem ignoraet, quæ est per venam sine pari recta ad emulgentes propagatam, & petriam. Similiter si hæmorrhoidas febres sanare passim dicant omnes, & id quoque capientis quocidie comprobemus, ac videamus, quomodo ex prædicta vena lienis sanatur, intelligere non possumus. Denique si Hippoc. & Galenus 6. de Morb. vulg. & 6. Aphor. 21. & alibi passim dicunt, varices fuorū cuteret; aut varices & hæmorrhoides infans supervenientes, infans solutioem sequi, certè, quomodo à vena lienis, natura per varices, quæ in cruribus, & coxis sunt, atram bilem transfusit, non licet ita fide assilari, si modo verissimum esse supponamus, venam portæ, cum vena cava communionem nullam habere, per magnos eorum truncos à oco, qui jam callemus, hæmorrhoidas vena cava, jam promississime possumus causam reddere, cur hæmorrhoides sanent tum Pleuritidem, tum Peripneumoniæ, tum Renum passiones, tum Febres, tum denique alias pleurales affectiones; & præterea, quomodo varices atram bilem à capite revellendo, furorem sanent, quod evocit propter maximam communionem, quam sedis vena habet cum cava, cum ab ipsa oriantur, & propter magnos vena cavae ramos. Si, similiter, crurum, coarumque varices omnes à vena cava procedunt, neque ullum cum porta habent como rum,

Quoniam verò hæmorrhoides interdum sanitatis causa sunt, interdum morborum, nonnumquam etiam mortis, ex Gal. præterea videre est, propter quas causas hæc eveniant. Eveniunt autem proculdubio, quia vel fluant, vel non fluant; & si fluant, vel sit moderate, vel immoderate; si verò non fluant, vel non fluant naturaliter, vel quia supplicantur; nam si fluant, & moderate, sanitatis causa sunt; ideoque dicit Galenus Libro de vena sed. adversus Erasistr. Cap. 5. Venæ hæmorrhoidales, sanguinem fundentes, servant hominem sanum, quod si immoderate fluant, morborum causa sunt, interdum etiam mortis. Idcirco Gal. in Lib. de Curat. per sang. mil. Cap. 19. dicit. Quippe cum hæmorrhoidum evacuationem veretur, ne in tantam evadat immoderatioem, ut hominem vel proinus interimeret, vel aq. inter eum obnoxium, aut cachexiz, hoc est, malo habitu reddat. Addit Aetius Lib. 14. Cap. 5. hæmorrhoidas cum deformitatem, tum vitam miseram, tum interdum mortem asserre; deformitatem, quia nimis inanitione universum corpus decoloratur, vitam miseram, quoniam perpetui imbecillitas occurrendum est;

morem, quia jecinoris affecto, aqua inter cutem supervenit. Quod si non fluant, vel non fluant, quia naturale alicui sit non fluere; quod scilicet sanguis neque qualitate peccet, neque quantitate immodicus sit, tuncque sanus degit homo, etiam si venæ sedis apertæ non sint, uti plurimos videmus sanos degere, sine ullo hæmorrhoidum effluuio. Quod si non fluant, quia aut sanæ, aut supprellæ sint, & excec reddite, eo casu, morbi expectandi sunt. Unde Hippocrates, quarto de Morb. Popularibus, ad finem dicit, quod Alcippus, cum hæmorrhoida haberet, sanatus, infansit. Idcirco Gal. 4. Aphorif. 25. formidat utramque immoderationem, sive supra modum sanguis excernatur: sive omnino supprellatur; propterea factum est, ut supprellis hæmorrhoidibus, vel scitibus lenis sit oboritur, vel melancholia, vel febris, vel tenum dolor, vel alia, ideoque Hippocrates in curatione hæmorrhoidum, ut accipiebat, unam esse aptam relinquendam. Cum verò Galenus, ex Hippocrate, utramque immoderationem suspectam habuerit, videlicet suppreSSIONem, & nimiam evacuationem, ideo 4. Aphorif. 24. dicit, non esse assuescendum ei, quæ sit per hæmorrhoidas, evacuatio. Ex quib. Galeni verbis, vidi aliquos Medicos ita formidare ubi huiusmodi, & sanguinis evacuationis ex hæmorrhoidibus, ut non solum rarissime huiusmodi assigant, ubi hæmorrhoides innatæ sunt neque fluunt, aut parvæ, sed etiam ubi patiens nunquam eas venas aut turgidas, aut fluentes habuerit, nullo modo admittant; dicentes hinc Galeni fuisse sententiam, non esse assuescendum ei, quæ sit per hæmorrhoidas evacuatio. Unde questio hoc loco exoritur ad praxim, & saltem ægrotantum maxime pertinens, utrum patiens, qui hæmorrhoidas in sedis partibus nonquam habuerit, hoc est, cui neque sanguis fluxerit, neque tumida fuerint venæ sedis, huic Medicus debeat per huiusmodi apollitas cum evacuationem tentare in morbis curandis; ut puta, in melancholia, pleuritide, peripneumonia, capitis dolore, febribus, liene affecto, tenim passionibus, & aliis affectionibus ab Hippocrate, & Gal. memoratis. Solutionem huius dubii, ex Galeno petamus, qui 4. Aphorif. 25. in cum hæc habet, sanguis supra, id est, per eas excretas qualicumque fuerit, malum; infra verò, id est, per hæmorrhoidas, bonum, quando nigra evacuantur, hoc est, quando hominis natura melius ralem accumulaverit sanguinem, aliter autem non est assuescendum ei, quæ sit per hæmorrhoidas evacuatio, ut quæ periculisam habeat utramque immoderationem sive supra modum sanguis excernatur, sive planè supprellatur. Causa huius à Galen. redditur Libro de curandi ratione per sanguinis mis. Cap. 19. ubi habet; quippe cum hæmorrhoidum evacuationem veteratur, ne in tantam evadat immoderationem, ut hominem, vel proximum inextrin, vel aquæ inter cutem obnoxium, aut cachexia, hoc est, mali habitus, reddat. Ex his Galeni verbis clare applicatur, sanguinem melancholicum in corpore cumulatam per hæmorrhoidas esse evacuandum; neque hæc in re Galen. ullam ponit distinctionem, sive sit, sive non sit innata hæmorrhoides. Huic rei rationes quoque adspiciuntur. Prima est verò, Namque per hæmorrhoidas solet sanguinem evacuare, cum evacuat, homines à melancholia liberat, & lienem induratum sanat, & neque Pleuritide neque peripneumonia, neque aliis corpi potest; ergo omnino existerat, & invitanda natura est ad hanc evacuationem eliciendam. Se unda, natura construat vas, immò vasa huic munere destinata quæ ubi munere suo funguntur, tantum degit corpus; ergo cum munere suo non funguntur, neque sanguinem evacuant, est apertendum, existerat

materiâ in corpore noxia, quod supponendum perpetuum est. Tertia, evacuationes, quæ sunt aut a natura, aut à Medico, quovis cumque adest materiâ noxia, sunt bonæ, quia morbos tollunt, per Galenum, ex L. b. de Confectud. Cap. 5. Quarta, si non sunt appendæ venæ hæmorrhoidales, quando homo malum sanguinem melancholicum cumulat, & tumore duro lenis, aut melancholia, aut similibus afficitur, neque etiam in aliis morbis est aut secunda vena, aut medicamentum purgans adhibendum, aut tale aliquid præstandum, quia par ratio est, quinlens illud assueverat aio, quod major ratio est, ut evacuetur sanguis per hæmorrhoidas, quam per venam sectam, & quod si non licet aperire hæmorrhoidas, minus licet venam cubiti aperire, ratio est, quia natura rectè operans in morbis ex se aperit hæmorrhoidas, nunquam autem ex se aperit venam brachii. Item, si narora ex Hippocrate est morborum medicatrix, & iis quidem medetur & curas adaperia venis sedis, ratio aliis; & nos quoque potius has quam alias aperire debemus. Denum, si natura naturâ venas aut frontis, quoquam rarissime aperiens, capitis dolorem à vestigio sedat; item si in crure varicem aperiens melancholiam tollit; multo magis apertis hæmorrhoidales venas, quas passim solet aperire, morbos frontis ipsa sic & nos curabimus. Ultimo loco unum audeo addicere, quod admiratione dignum iudicabit, nimirum cum hæmorrhoides venæ cavæ novum sit inventum, ideo nova erunt omnia, quæ ex his consequentur, præcipue aut unum, videlicet sanguis evacuationem ex hæmorrhoidibus, conferte magis malignis febribus, quam venæ sectionem ex brachio, quod est paradoxum prima fronte videtur, ratio tamen huic adli. ulatur, quia in malignis febribus putredo est in valis majoribus, ut constat apud omnes; at venæ hæmorrhoidales magis sunt vicinæ cavæ, ubi maxima est in lumbis, & ad os sacrum, quam in brachio, ubi longius abunt à majoribus ramis, ut puta axillaribus, & venæ cavæ truncus; ergo magis, loco putredinis subveniente. Quod autem appareat invidum non subvenire, & æquum opem præstare, ea causa est quod fortè Antiquorum tantum consuetudinem insequentes, qui cum igitarent venas sedis à cura purgatas, alias usurpant, quæ in artibus sunt vel fortè quia magis apparentes, & sectioni magis obvix atrium venæ sunt i. vel terro quia non ea sanguinis quantitas ex venis hæmorrhoidibus extrahatur, quæ ex artibus, ultima hac causa in culpam Medicorum rejicienda, qui si vellent, ex hæmorrhoidibus tantumdem sanguinem emitterent, idque cum evidentissima utilitate; quemadmodum non semel, sed iterum, ac sæpius mihi in praxi obviat præcipue autem in nobili muliere, quæ cum ante quinque annos bis concepit, & puellas duas peperisset, tum mensibus magna ex parte deficientibus, cessavit à conceptione; quam cum curarem; & manè hæmorrhoides per huiusmodi aperire, à praxio cum soli se dorso, ad dealbandos capillos exponeret, copiosum sanguinis per hæmorrhoidas profusum supervenit, & ab ea hora mentitur purgationes sufficientes apparere, quæque conceptæ, & quatuor masculos filios peperit, quam historiam pulchro infra latius prosequar. Id quod etiam confirmari potest, ex mensura sanguinis purgatione, quæ fit per venas hæmorrhoidibus venæ cavæ vicinæ; quæ ideo omnibus morbis mulieribus succurrunt, & ipsas sanas conservant. Quod si Galenus dixit, non assuescendum ei, quæ sit per hæmorrhoidas, evacuatio, hinc r. i. pendens, hanc Galeni auctoritatem nihil obstat, quia Galenus,

ex Hippocratis sententia, duo dicite; alteram, quod cum hominis natura multum sanguinem crassum, nigrum, & melancholicum cumulat, tunc bonum est sanguinem per hæmorrhoidas evacuari; cum alioquin, quando hominis natura talis est, ut sanguinem crassum non cumulet, tunc inquit Galen. non sit assuefaciendum ei; quæ sit per hæmorrhoidas evacuationi. Reddit rationem Galenus, quia Hippocrates habet, periculosum esse utramque immutationem, siue supra modum sanguis excernatur, siue omnino supprimatur. Quorum verborum sensus est; quia si assuefacimus aliquem, qui natura non cumulet sanguinem melancholicum, est evacuationem sanguinis per hæmorrhoidas, alterum potest sequi, in progressu ex hac consuetudine; vel quia nimis excernatur, vel ex toto supprimatur; utrumque autem incommodum periculum habet Hippocrates in jam facta consuetudine. Qui sanè locus nostram confirmat opinionem, quoniam nos si verbi gratia licet sit induratus, aut aliquis melancholia laboret, neque habeat, nec unquam habuerit hæmorrhoidas innatas, volumus esse apertissimas, nos verò hæmorrhoidas cum Galeno loco citato; quia cum supponamus, materiam noxiam esse in corpore cumulatam, igitur ex Gal. apertissimæ sunt; & corpus est assuefaciendum huic evacuationi, ac cum corporis ea natura non sit, ut talem sanguinem cumulet, neque etiam nos volumus, esse assuefaciendum corpus huic evacuationi, ne quandoque ad alterum ductum deveniant, vel ad nimiam excrescentiam, v. l. ad integram suppressionem. Quomodo autem una, plurimum consuetudo evacuationi per hæmorrhoidas, possit contrarios producere effectus, videlicet aut nimiam excrescentiam, aut perfectam suppressionem, non est difficile assignare; etenim ad nimiam excrescentiam deveniunt, ex frequentibus adhibitis contrariis, & excitatis; ad absolutam autem suppressionem, quæ potest contingere, quia ex nimia sanguinis evacuatione vasa exsiccantur in ea ipsa coeunt, & hac ratione omnino supprimatur. Quoniam verò Gal. nullam habuit cognitionem hæmorrhoidum venæ cavæ, ideo semper respectu affectionis à melancholia provenientis, & sanguinem melancholicum à ramo lienis ad sedem transmissum, quem voluit esse per hæmorrhoidas evacuandum, ubi scilicet cumulat in corpore est; nos verò, qui scimus, hæmorrhoidas duplices esse, & portæ, & cavæ, adhibere oportet motus à venæ cavæ sanguine provenientes, quibus succurrere hæmorrhoides possunt, videlicet ubi sanguis in cava vena existens immoderatus est, ita ut quantitate, aut qualitate peccet. Unde Galenus 6. Aphor. 47. dicit, per hæmorrhoidas excreti partem vitiosi sanguinis; qui si per se non fluat, est evacuandus per hirundinis apertas; sic enim corpus sanum conservabitur, nam si dux tantum in corpore venæ sunt, quantum sanguis si probus est, homo inculpata fruatur, sanitate, portæ, & cava, & utramque habeamus in sede sanguinem partem expurgantem, omnino ex iis sanitatem tuam corporis resultare necesse est, neque incommodum erit cavæ venæ hæmorrhoides, in vitio, mensuris multum, seu hæmorrhoidibus utri in mulieribus, cum & ipse à cava proveniant, comparare; ita ut, licuti per menses moderatè, & naturaliter fluunt, & utri hæmorrhoides mulieres sine digne, iis autem si suppreffis, omnibus sunt morbis obnoxie; sic in viris hæmorrhoides se habent. Ex quo absolute concludendum est, hæmorrhoidas in omnibus

ferè morbis cum præcavendis, tum curandis primas obtinere, & potissimas esse. Denique ita tuendum est, assuefaciendum esse ei, quæ sit per hæmorrhoidas, evacuationi; propterea quod evacuant vitiosus sanguis, nam qui in abdomine, & partibus ejus omnibus, & sima jecoris consistit, per venam hæmorrhoidalem à porta deductum; tum, qui in gibba jecoris, & reliquo toto corpore in cava redundat, per venas in sede à cava deductas. Ita tamen tali assuefaciendum est evacuationi, ut uterque victus immoderato, ne nimium fluat, neque prorsus cohibeatur. Est quoque evacuandus sanguis per hæmorrhoidas, quando suspicio est obstructionis, tum in venis mesentericis, tum in sima, & gibba jecoris parte; ut in casu Revertendissimæ Abbatis, qui ex arte levatus est per hanc evacuationem. Pariebant verò decem, aut duodecim dierum intervallo dolores, fluctuationesque ad hypochondria & ventriculum, quæ quadantenus levabantur, tum tussibus emissis, & aliquo sanguinis vestigio ad hæmorrhoidas apparente; tum quæ prolixè secedebant mitione urinæ turbæ, & quasi cretæ, & excitatis sivi dejectione biliosa, ac nonnullis æroginola; ex quo conjecimus, tum sanguinis melancholici exultu, à quo status, & dolores movebantur, redandis, tum obstructiones in sima jecoris parte, & mesentericis non solum adesse, propter aul fluentem, & vestigium hæmorrhoidalis sanguinis, sed etiam eadem subesse mala, hoc est: obstructiones tum in gibba jecoris; tum in cava venæ vitiosi sanguinis redundantiæ, propter urinas rubras rede diras. Propter quas causas iure consultum fuit, sanguinem potius per hæmorrhoidas evacuari; ut quæ utramque excipiant, & sublevent partem, ab utraque scilicet evacuando, quæ per brachii sectam venam, ut quæ tantummodo à cava evacuet, & gibba jecoris partis obstructiones releveret. Quoniam verò raro accidit, imò verò nunquam ut sanguis vitiosus, & obstructiones in sima tantum jecoris parte, & abdomine consistant, quia etiam & in cava venæ, gibba jecoris, ac toto denique corpore redundent; hinc tanquam corollariam eliciendum est, sanguinis per hæmorrhoidas evacuationem esse magis, quam per venam sectam, tenendam, suscipiendam, & explendam; id quod & Antiquiores quoque asseruissent, si non solius portæ, sed utriusque venæ hæmorrhoidalis, portæ scilicet, & cavæ, noxiam habuissent. Libet hic asserere caum, quem supra arripimus, de quadam nobili adolescente, quæ cum frigidi esset, temperamenti, ventriculique frigoris obtineret, & menstruas purgationes haberet, dimittas, ac duas quinque ante annis peperisset filias, amplius nec concepisset, cupiens non modo concipere, sed matrem parere, sese mæ commisit coræ. Ego autem primò totius corporis curationem intens, medicamentis atque venæ sectiones tum ex brachio, tum ex pede adhuc; ultimo hæmorrhoidas aperui, à qua parte circiter sex sanguinis uncie evacuatæ sunt; sed paulò post incuria adolescentis, quæ statim soli dorsi opposuit, ad capillos dealbandos, rursus ex hæmorrhoidibus excitatum profluvium fuit, & decem circiter uncie sanguinis effluxerunt, ita ut totæ sexdecim sanguinis uncie, & amplius fuerint evacuatæ; ex qua sanè larga evacuatione, etiam incommoda potius movebamur, infirmitas tamen sine omnia hæc commoda; primò enim cum prius menses non singulo, sed sepe tertio quoque mense fluere

soliti essent, jam à larga hæmorrhoidum evacuatione proximo fluxere menses; deinde tribus diebus confuetum tempus præterierunt, tertium commodum fuit, quod cum prius cum capitis dolore, cordis, seu oris ventriculi anxietate, tum vero etiam hypochondriorum molestia, ac rugita; denique cum d. rsi dolore supervenisset, jam hanc obnoia istiusmodi cessant. Ultime cum nulla expectanturæ mensura, propter copiosas sanguinis evacuationes factas, fluxere tamen uti prius fluxere solita erant. Ex quibus colligitur hæmorrhoidum evacuationem, eodem menses prohibere, sed provocare, faciliore, promptiusque reddere. Verisimile est autem, hæmorrhoidas sanguinem menstruum provocare, quod à venis ureti, ipsam propter copiam, & crassitatem infarctum; & affixum, & ut sic dicam, ineunatum, ad ora venarum sedis, vi vacui, retrahant, aut potius derivent, & ita uteri venas ad infarctum, liberatas, & vias redditas referant. Itaque, ut ad usum omnia referantur, in liene tantum indurato, possit ut hinc inde tum intrinsecus, tum posterius, coccygem versus, tum nonnihil ad sinistram affigerentur. In obstructionibus autem, ac tensionibus, tum in sima, tum in gibba jecoris, in Abbate, tum exteriori, tum interiori, tum posterius, tum ad latera, atque ut summam dicam, undique ad podicem affigere iussit. In renum autem affectione, necnon in pleuritide, peripneumonia, insuper in extremis afflictiis, ut lepra, furunculis, & de genas, commodum erit exterius magis; cum vero etiam ad podicis latera hiru- dines applicare. In febris vero, in quibus ferè obstruktionem tum in mesenteria, & sima jecoris tum etiam in gibba ejusdem, & cava viget, tum exterius, tum interius, atque undique, ut supra dixi, hiru dines affigantur. In mania tum interius, tum exterius, si exstiti humoris redundantia in ro- ro existit. In melancholia similiter. In phrenitide, exterius magis, & ad latera: verbo, prout evacua- re supervacuus humoris, aut à cava, aut à porta dependit, sic in podice locum eligere congruum oportet, aut exterius magis, & ad latera, aut interius retroque magis. Quæ omnia cum nova, et si expectantia comprobati hæcenus exatè non potuerunt, comperta tamen à me utcumque fuerit, qui multos passim à qualibet affectione curandos præ manibus semper habeo. Sed jam tempus est, ut ad nostrum institutum revertamur, & Chirurciam per- agamus; quæ sanè hæmorrhoidas respicit, cum non probè suo munere funguntur, quod est, vel cum ex toto suppetunt, vel immoderate fluunt; præ- terea alias, videlicet cum viciis tumores sunt, aut dolentes, aut inflammati, aut gangrenose facti, & exulcerati, & alia id genus symptoma- ta patientes. Quibus omnibus succurritur vel medicamentis, vel Chirurgia, vel utriusque. Primo autem de tumensibus hæmorrhoidibus agamus, de quibus Hippocr. Chirurgiam proponit in Libro de Hæmorrhoidibus, sed tumorem Hippocrates videtur conjungere cum sanguinis fluxu; tamen Chirurgia magis ad tumorem spectat, qui intelligi debet neque dolens, neque durus, neque inflammatus, quem vult accidere hæmorrhoidibus sedis, cum p. opte- bilem, cum propter pignitatem ad rectum intestinum transmissam; ita ut venis supercalidis, & plep- tis tum tumida sunt, tum sanguinem ejaculentur. Tumores autem, seu tumide hæmorrhoides, velut vix æni lividi sunt, ac Hippocr. quos hac Chi- rurgia framentis candentibus audacter tollit, cum dicit, R. cum (nim intestinum & fecans, & resicans,

& confuens, & urens; & putrefaciens, etiam si gravissima hæc sunt, nihil lesit. Primo igitur Hippocr. præparat septem, aut octo ferramenta palmæ longitudine, & etalitudine specilli crassi, cum summa parte reflexa, ac lata, veluti in parvo obolo, tunc circibus prius enerviis, & hæmorrhoi- dibus foras aut per abdominis compulsionem, splen- tuique cohibitionem, aut secum excretionem, aut aliter extrusis, ferramentis propolis candentibus urende hæmorrhoides omnes figillatim sunt, donec resiccati tumores sint; ita tamen ure oportet, notare, ut contingat nit Hippocr. Græca dif- fuso habet, *ἵνα ἴσῃς*, quod i. y. contingere, vel *ἵνα τὸ ἰσχυρὸν*, significat sub relinquere, quod idem ferè ac non contingere, etiam si non tangat, *ἵνα ἴσῃς*; propterea Hippocrates infia, seipsum de- clarans, nit; utro, cavendo, ut ne contingat ferro, sed propè admodis ferramentis resiccat, summation, Hippocr. vult ferramenta candentia propè hæmorrhoidas esse admovenda, abstinendo à con- tactu eorum, propterea quod intentio Hippocratis est, tumores resiccare, abique eo quod irritentur, quod fiet, si non tangantur, sed ferramentum tam propè hæmorrhoidas admoveatur, ut non irritentur, sed tamen vim ignis persentiant, ad bonam, ut puro, laborantibus tolerantiam, quod hæmorrhoi- des tumentes resiccentur. Cognoscimus autem, inquit Hippocr. ipsas hæmorrhoidas, propè quas ferramenta admoveat oportet, quia supereminet in interna recti intestinali parte, velut vix æni li- vidi, & simul ut sedes exuberat, & fetos pro- tumpt, sanguinem ejaculatur. His resiccatis tu- moribus hæmorrhoidibus, Hippocr. supra ponit lenem, & etrum in aqua decoctam, inde mollem spongiam, ad consummatam calcinationem, circa imas ilium, seu lumborum partes, quæ abdomen in ceteris facia obvolvitur, postea uno capite reflexa inter coxas ad anem, quo ulque supra ad ob- voluntam fasciam applicetur, pretingit. Et notatis quæso, quomodo Hippocr. manum opera, & fer- ramentis candentibus, quæ adurentia sunt, non tamen urit, sed tantum exsiccant, & digerit; tum vero exsiccando, & digerendo, tumores curat hæ- morrhoidas; est quippe modus talis, & ab Hip- pocr. tantum exagoratus; qui non solum exsic- cat, & digerit, & tumorem curat, sed paucum quoque laxum roborat, ignis enim vim roborandi habet. Huic similis esse videtur quarta Hippocra- tis Chirurgia, quam eodem l. b. proponit ad tu- mentes hæmorrhoidas calcandas; sumit arundinem sepiarium, phragmen appellatam, quæ in sedem indurati tum ferramentis candentibus, arundinis cavi- tati congruum immittitur, ac frequenter extrahitur, quo magis calefieri iussit, & neque ulcus et calore habeat, & vena resiccatæ sanæ sint. No- tandus vero error text. Hippocr. qui habet *ἵνα ἴσῃς*, loco *ἵνα ἴσῃς*, elyserem facere oportet, velut arundinem sepiarium quod est petinde, ac si dicat caenulum, seu tubulum, vel fistulam facere oportet, velut arundinem sepiarium, quasi dicat non ita crassam, seu laxam ut commissa arundo, sed ut ex, ex qua sapè fit; & hanc verb canna- lam vult esse efficiendam ex are, ut notat Gale. ad id ego, oportere tubulum esse aut in fundo oc- cidentum, ne ferramentum aliis quam oportet, per- veniat, aut obfistulum, ferramentum candens ha- bere, quod eundem præbeat usum. Proponit dein- de Hippocrates secundam Chirurgiam, quæ tumen- tes hæmorrhoidas, ut ipse dicit, præsecat, non tu- men scito, sed erodente medicamento; ideoque

pro; non tædentes, ad secundum apertum; si in anum vas meas, & in minap, eis florum costum, tritum, lactem inspergas, deinde diluas, & vas agitas, & in sole exicies; ubi vero siccatum fuerit, eradas, retas, & levigatum ad anum apponas, & sphaera oleo lambita addas, ac spongiam supra deligas. Rarius Hippocrates tertiam proponit Chirurgiam, ad curandas hæmorrhoides tumens, hoc modo; adnascitur ad venam sanguineam, exuberantem, veluti mosi fructus; & si quidem valde extra fuerit exuberantia, carnis rectorum circa ipsam nascitur; si igitur molis sit, & sub rectorio credat exuberantia, digito ipsam auferre oportet; nihil enim plus discolatus hęteret habet, quam si quis, dum oricula excorior, digitem inter cutem & carnem adigat. Quod si exuberantia penitus intra delituerit, ea per cathetrum inspicenda, auferre postea ipsam oportet vetusto nigro in anum subito. Huius Chirurgię similes sunt duę alię Chirurgię ab Hippocrate proposite, eodem Libro circa finem capitis; quę neque vici, & simpliciter Chirurgię sunt, sed ex medicamentis compoſitę, tumentes hæmorrhoides extirpare. Alit Hippocrates; si vero neque urere, neque reſecare voles, ubi multa aqua proluiti, & sedem eternam extitisti, myrtum tritam, lavigram, & gallum, & alumen Aegyptium ultum, una & dimidia, ac reliqua parte; ac melantem estandem accipe, ac hęc hic mēte, & dimidia chalcidida misce parilem efficiet; hæmorrhoidis enim ab his medicamentis decedet, veluti curium combustum. Ultimo aliud medicamentum proponit Hippocr. idem præstans, suppositoſiſſima forma; inquit enim. Si vero glandulis lanare voles, scipie testam, plumbum tertiam partem, bitumen, alumen, florem aris medicum, gallum, aruginem modicam commisceo; & mel coctum affundito, & formam ex hac glandis oblongiorem apponito, donec extirpata. Hęc funt, quę hæmorrhoidibus tumeribus, non hiluc sanguinis fundentibus, ex Hippocrate; Chirurgię proponuntur, quarum minime difficles sunt, nam ego experientia non potius unquam comprobare, rectum intestinum esse ſecandum, & reſecandum, & consulendam, & urendum, & potrefaciendum, sine ulla læſione, ut dicit Hippocrates. Quod si verum est Hippocratis dictum, quod sine ulla intestini læſione hæc peraguntur, non tamen a pleuristis tolerantur, & sustinentur, pars quippe ani sensu exquisita, imò verò, si aliqua pars corporis est, quę sensu exquisito prædita sit, hæc una est, propter quam causam ego tumentes hæmorrhoides potius medicamentis, quam Chirurgia curavi, ut incisio in aquis thermalibus, & spongia ex aqua thermalis expressa, & arctē supra anum alligatis, & compressis. Item radicibus pororum in oleo comuni, aut iynio decoctis, scrophularie radice in aqua decocta, coacta, & impoſita; spongia ex aqua calcis expressa, & alligata.

Quod si exulcerate hæmorrhoides sunt, ne in fistulas degenerent, si superficie tenui excoriatae sint, in aquis thermalibus, aut de Apono, aut Divi Perii, aut Montis agrocorum infusus eas curat, aut quod his æqualleat, uti alias dictum est. Quod si exulceratio profundior est, & maior, neque medicamentis cedat, non incommo- dum est ad Chirurgiam devenire, quę candentibus ſtramentis peragitur; quę exigua qui-

dem sunt, & his leviter tangere partem excoriatam oportet, quę neque etiam lenſum exquisitum habere debet.

Quod si hæmorrhoides inflammatae sunt, tumores, & dolentes, medicamentis res peragitur, potius quam Chirurgia; de quibus agere ad præsentem locum non spectat; sed tamen unum atque alterum medicamentum expectum afferte nihil verat, cuiusmodi est plantago, pastinacia, & malva, in aqua coctę, & cum oleo rosaceo, cataplasmatis modo impoſitę; interdum cum exicare magis intentio est, farina milli, & hordei admiscetur; si vero dolor utgeat, lac omne adijcitur.

Quod si gangræna jam ſit hæmorrhoides affecta, eadem Chirurgia proficit; sed ſentum, candens valentius impimicre, propter ſentum partis obtusum redditum. Quo loco illud mihi ſuccurrit, aliquando accidit eundem Medico con- obſcari nomina, qui curans uſiſe, neque locum affectum unquam perſpicit, tandem poſt aliquos dies Medicus me duxit ad ægotantem, ego autem statim locum affectum voloſi ſuſpicite, & conſpiciens, inveni ex omni parte multo ante ipſum fuiſſe gangrænam affectum, & nonnihil in ſuperficie ſphacello; quem ſervavi ſtatim ſtramentis candentibus, hoc dico, vos admonere, ut partes affectas, & malum videntis, quando patientes de his conqueruntur, etiamſi obſcure ſint partes; ſic etiam in mulieribus. Fuit aliquando mulier nobilis, quę peſterat, & de vulva conqueratur, obſtetrix, inungebat frequenter oleo amygdalino, & chamæmelino, & quæſe in dies augebantur, tandem vocatus, & videns locum, inveni labia vulvę multis in partibus ſphacelo obſeſa, quę ſtatim ſervantis candentibus inſuſa lavavi, quę alioquin obſiſſet, ſi olea propoſitis demum eſſet, & viſa à Medico non fuiſſet, ſimili modo, ut ſupra audiviſti, aliam obſetrix ſervavi, mori propinquam, inſpectione ſcilicet, quę hymenem habebat non perforatum. Non oportet igitur eſſe negligentem in re medica.

Vetustitatem quod in hæmorrhoidibus maxime formidatur, ex Hippocr. & Galeno, eſt eam cum omniſimoda ſuppreſſio, cum immoderata ſanguinis ſtatio; utramque autem immoderantiam, tanquam periculoſam habuit Hippocrates, fluxum quidem, veluti, aut prociſus interimentum; vel aquam inter cutem, & cachexiam excitantem, ut dicit Galen. Actius autem Lib. 24. Cap. 5. ait, nimium fluxum, cum defœciſſetate, cum vitam miſeram, interdum & mortem afferre; deformitatem, quoniam nimia inanitione univerſum corpus decoloratur; vitam miſeram, quoniam perpetue imbecillitatis occurrentem eſt; mortem, quia frequenter jejinoſe, ob excedentem evacuationem, refrigerato, aqua intectus ſuperveit; ſuppreſſionem verò, tanquam omnem morborum rubam ſuſcitare aptam, ſcilicet febrem, melancholiam, hęmifitium, pleuridem, petipneumoniam, maniam, & alia id genus cum ſymptomata, cum morboſis, qui reſpondeant vitioſis humoribus detentis, ut dicit Galenus 3. de tumoribus, nimirum humoris detorſa, ſymptomata, & non oſſeboa parere, eoſque, cuiusmodi ſunt humores, qui reſidunt. Et quæſia Paulus, & alii, ſuppreſſas hæmorrhoides curare non videantur, quod ab immodice ſtudentibus ſuppreſſio plenamque

fiat, tamen Hippocrates curat, dum præcipit, apertam unam esse servandam. Docet autem perbellè Cel. Lib. 6. Cap. de hæmorrhoidibus, quo signo fluxus moderatus ab immoderato sit distinguendus; tum verò, quando suppressendus, quando permittendus enim inquit. Parum rursù suppressit, iis qui sanguinis profluvio imbecilliores non sunt, habent enim purgationem hanc, non mortuum, ideoque curati quidam, cum sanguinis exitum non habent, inclinati in præcordia, ac vix cetera matetrix, sibilus, & gravissimis morbis patientes correpti sunt. Igitur si immoderatus ex hæmorrhoidibus fluxus sanguinis sit, qui necesse, & imbecillum hominem reddat, coactè ipsum oportet primo medicamentis, quæ à Celso Lib. 6. afferuntur; quod si his profuso non sistatur, Chirurgia opus est. Una est, quam proponit Hippoc. in Lib. de Ratione victus in morbis acutis, quæ vinculis præcedit, sicut lanx succida crassissimam, & maximam, in aciem immixtam transmittas, ex una primam parte hæmorrhoidis; inde dea comprehensa, ex altera aciem, & filum traheas, & ab eodem parte externa fila adstringas, mox medicamentum erodens imponas, donec hæmorrhoides decidant, & semper auxium relinquant, ait Hippoc. ne omnibus obstrictis, patienti in contadium incidat affectum, id est, in omnimodam suppressionem, & accidet, quod dicit Hippoc. 6. Aphor. 13. Hæmorrhoides sanant diuturnas, si non una servata fuerit, periculum est hydropem, aut tamen accedere; eorum sententia reddit rationem Galenus in Commento, quia obstrictis ex toto hæmorrhoidibus, per quas hepar transmittat sanguinem sacculentum, non est mteodum, si scilicet reddatur, & calor jejoris, à quo sanguis gignitur, extinguatur, unde hydrops superveniat, sanguinis generatione frustrata. Quod si jecus eussim materiam ad pulmones refundat, & venæ rumpat tabes seu phlegmones resultet, ut Hippocrates dicit. Huic tamen Hippocrat. legi de servanda una hæmorrhoidi aperta, se se opponit Artius Lib. 14. Cap. 5. qui ex Hippocrate affirmat non esse relinquendam nullam hæmorrhoidem apertam, dummodo servetur congrua victus ratio, & sanguis ex brachio mittatur. Quæ opinio neque Hippoc. neque Galeno consentit; nam licet ager, & cibi puritate, & aquæ portione detineatur, & alvus subducatur, de vena cubiti incidatur, ut Artius dicit, tamen quia hæc non possunt semper fieri, curari, & frequenter repert, neque viscera corrigi, quo minus superfluous sanguis gignatur, ideo tutius est Hippocratem aliter non exponere quam verba Torsani, & Galenus espouit, ut scilicet una relinquatur aperta.

Sed ad Chirurgiam redeamus. Galenus in liagogicis, Chirurgiam hæmorrhoidum his verbis tradit, Hæmorrhoides lino duplici per ipsum basin transeuntes, adstringentesque post horas duas abscindimus, Celsus verò Lib. 7. Cap. 30. de condylomatibus ait, si hæmorrhoids capitulum exiguum, basinque tenuem habeat, adstringendum lino paulum super est, quam ubi cum ano committitur; deinde supra nodum capitulum exulcerandum est; ut evacuetur sanguis, & spiritu ibi contento, & celerius id emoluitur; ac decidat, quod nisi factum est, magni dolores subsequantur, interdum etiam urina difficilis, quod si hæmorrhoidis capitulum majus est, & basis la-

rior, hamulo uno, aut altero excipiendum est, paulumque supra basin incidendum, neque relinquendum quiescam ex eo capitulo, neque quicquam ex ano deinde est; quia scitum est, necesse debet immitti, & infra eam, lino ad capitulum alligari; si duo tractus sunt, item quodque primam curandum est; si plura, non omnia simul, ne eodem tempore undique teneat cicatrices sint; si sanguis profluit, excipiendo est, sponsia deinde linamentum imponendum; post quoque aut sex dies articulo specillo linamenta educenda, si capitula simul non exciderunt, digitis promovenda, tum lenibus medicamentis, ut pura ceratis utendum. Hæc sunt Celsi Chirurgicæ, ad scissas venas languinem fundentes. Sed idem Celsus Lib. 6. Cap. de hæmorrhoidibus, ex Dioscoridi sententia proponit offiones per causticum medicamentum, quando alia medicamenta non proficiunt, hoc modo; Inspectenda sanctoria est, deinde imponendum quod ex his constat, squamæ ætis autipigmentum, singulorum partes quinque, saxi calis partes octo, postico die, capitulum venaarum acie empergendum; adultis capituli si cicatrix, quæ sanguinem fundi prohibet. Ultimo non est præterenda Pauli Chirurgicæ, quæ ad venas scissas sanguinem fundentes proponitur lib. 6. capite 79. primoque præcipit, clysterem, copiosissimum immittendum, compressione facta, quo anus inveretur, & hæmorrhoides extra anum creant, & appareant; solet autem non difficulter apparere interitum capitis, & ora ventrum sanguinem fundentia, interdum venæ nigrescentes, & tumide; quæ lino, quintephele vineolæ ligulæ sunt, una demonstrata relicta, quæ sanguis superfluous emanet, ut præcipit Hippocrates. At ubi hæmorrhoides vinculo contricte excludunt, linamentis vino maderacis cicatrix inducitur. Leonides autem, ut refert Paulus, non lino delgat, sed forcipe prehensas ample hæmorrhoides scalpo excidit. Alii tandem, inquit Paulus, caustico medicamento repleto concavo instrumento, ad ætendum anam accommodato, ipsique similiter hæmorrhoides affertur. Hæc ab antiquis de promptu sunt, qui, uti quidvis, & vasa, & incisiones, & erodentibus, & adustibus medicamentis uti sunt. Miror quod nullis antiquorum ferramentis candentia proposuerit, cum tamen causticis tutiora esse videantur, quod his more, quantum opus est; possimus, si vero legem nullam imponere non volumus, insuper, caustica partem putrefactæ possim videmus, contra ferrom candentem corroborare pro compenso habemus, nisi forte, Antiquos sectum candentem silentio præterisse dicamus, quod profusionem potius adjuget, cum producti rasi admoverent, ut patet; sed indolita ocula, jam sanguis cum his quoque cohercet. Propter quod cautus ego ferrom quoque candentem pto, cuspidatâ ferramentis singulis venarum orificiis adaptatis, admotis ut crusta excideret, satius autem est, gossypii flocculum ad venæ orificium appendere, inde vero intire, gossypium enim ita inaleum duo præstat, & valentius hæret, & minus patientes dolent. Sed ut ingenuè fatear, paucior ratio, & tutior ea est, quæ medicamentis pugnat, quæ valenter adstringentia sunt ex Galeno 5. de Medic. per genera. Quo casu nihil magis valere expectamus, immaturis fructibus coactis plantæ Egoi guajacæ, omilro ovi albumo cum bolo Armena, sanguine draconis, malliche, thure, & gly-

subactum

tubacum, & golypio alio exceptum, & impostum, omisso præterea, quæ per os assumuntur, aut revulsionis gratia peraguntur, tanquam ad hunc locum non spectanda. *Hælenus Phlegmonus Fabricius ab Aquapendente.*

Hæmorrhoides nascuntur, de quibus Marcus Aurelius Severinus quædam tractat de secunda ablessum natura; ut & hæmorrhoides utriusque quibus aliis, hic non describitur, quia si quid in ejusmodi morbis agendum veniat, ejus materia lo curatibus, contrahituribus &c. ad anæ hæmorrhoides facilius, abunde sufficit. Jam itaque continuo ad

Consultationes.

Hæmorrhoidalis moles cum Viscere.

Consultatio I.

Illustrissimus atque Reverendissimus Aristes quædam hæmorrhoidum ovarum amum agens, temperamenti totius ad calidum & siccum vergentis, febrili jejoris atque cordis, habita gracillioris & fusi coloris, arduis semper negotiis implicatur, & longa ieiuniis deditus, multis abhinc annis hypochondriacus fuit, eodemque tempore ultimum præsentem diem hæmorrhoidibus affectionibus obnoxius, quæ prioribus annis adolescentiæ dolores eidem Illustriss. inferebant, quia cæcæ tunc temporis erant hæmorrhoides ipsæ, sicut illidem adaperit iterum occasione, dolores infestare cessant, semper tamen paulatim earum moles tantum augmentum suscipit, ut modo acini uvæ, figuram præstarent, & quatuor abhinc annis confectu scæcæ evacuationis occasione, omnes extra mirantur, nec adeo facile mox intromitti possint; hæc ita enim præterito tempore quandoque ætiam, sanguinem effuderunt. Verum postquam mense Augusti proxime præterito duplici Tertiana fuit correptus, jam manifestis hæmorrhoidibus dolor accellit, qui exacerbarur semper post sæpam depulsionem, & plures horas, quandoque integram diem perleverat, qui dolore nunc acutissimus, & Vitiis Illustriss. Patavium ad me impellit, qui, facta loci diligenti inspectione, primo vidi hæmorrhoides ad predictam molem perductas, sed lividas & fere nigras, nempe atro sanguine repleta, sicut niger & crassus ex vena antea missus observatur quoque fuerat. Præterea in superioris parte vena coæcæ, costionem, ulcus præfæctum & alias interius leviores excoriations observavi.

Quod ab incante ære præfati Illustriss. melancholicam dispositionem nasci fuerit, mirum non est, cum à mitissime eam ipsam servidam, & æcæ præcalidam sortitus fuerit, nec mirum pariter quod hujusmodi dispositio majus in dies augmentum susceperit, & ab immodiis exercitiis atque itineribus petitis, & à perpetuis animi applicationibus, quæ omnia Viscerum dolorem intendere, siquæ sanguinem exulsum reddere poterunt.

Quoniam vero provida natura totius massæ sanguineam depurare totis viribus conata fuit, hinc factum est, ut niger & adusti sanguinis portiones ad vala hæmorrhoidalia depulserit, quibus repletis, hæmorrhoidales dolores distensivos immaturæ excitaverit, qui erumpente sanguine, quodammodo cessant. Venum quoniam Curatio, singulum totius massæ sanguineæ

depuratio, servide viscerum intemperie correctio, & vasorum hæmorrhoidaliū robustio neglecta fuit; idcirco invaluit semper quotidie magis & æcæ morbiacæ, & pravi effectus, quandoquidem & sanguis niger, atque crassus, in valis melencolicis stabans, Melancholiam hypochondriacam formavit, & ab eodem quoque parata massa sanguinea vitiatam reddidit totius, nutritionem, sanguineque stultam, ejusdem atel sanguinis portiones ad hæmorrhoides perpetuo, non solum per intervalla sanguinis exterioris sentate coacta fuit, verum superioribus postremis anni tanto cum impetu atque copia fuit sanguis effusus, ut deficiente nutritione, fere ad Atrophiam vit Illustrissim. ductus fuerit, qui tamen upote robustam paratam alloquin sortitus, supposito sanguine, pristinum habitum recuperavit, tempore inferius hæmorrhoidum malo quotidie magis augescere.

Tandem postquam mense Augusti proxime præterito billosa febre correptus fuit, ab ipso febrili calore visceribus ipsis una cum sanguine super exalescit, strigosa natura ejusdem actionem & magis acidam portionem per modum exilis ad hæmorrhoides deposuit, quæ sua activitate vasa ipsa erodere valuit, & ulcusculum in superioris parte vena coæcæ, atque leve excoarationem extintescere excitare; unde dolores atrociter procedunt, qui exacerbantur à sæcæ depositione, dum à facibus ipsis comprimuntur vasa, & exprimitur ichthiosa, æris & acida materia, quæ libia ulceris attingens, dolores infert, & ad externas hæmorrhoides extintescens expansis, alias, sed leviores, excoriations inducit.

Est quidem gravissima hæc hæmorrhoidalis affectio, non solum ratione causæ conjunctæ, verum etiam ratione antecedentium: naturales enim sunt viscerum intemperies, roxa massa sanguinea, ætiam sanguine infecta, & moles hæmorrhoidalis insignis & pravo colore affecta, quæ omnia vix jam contritum & excoriations fovete valent, imo necessario fovent. Quare Curatio etiam curativa ejus habet quam ætiam tempus non permittit, & ideo ad Ver venturum est differendi. Interim urgere dolores, qui strahendi novos humores viti obtemperant, & præterea vigilas inducendo, corpus extenuandi, ut propterea Hippocratici, Vigilas teraces appellavit, & quod magis ac pejus est, si moles hujusmodi hæmorrhoidalis adhuc à doloribus addeatur, calor naturalis partis, adeo à fronte remotus, non adeo facile humores ipsos, multos & pravos regere & custodire poterit, ideo usque ad illud tempus diligenti cura & prudenti custodia opus est, ut dolores quidem leniantur, sed calor naturalis partis conservetur, & excoriations pars ipsa à putredine & corruptione custodiatur.

Pro leniendis doloribus, materia illa ichthiosa quæ à sæcæ compressione fortas exprimitur omnium primò detersionem exposuit, ut citius & facilius & ulcus, & erosiones demulceri possint; id autem procuraret spongiosa madafacta vino tepido dulci, in quo capsa papaveris ebullierit, vel aqua hordeæ, in qua pariter papaveris capsa & roxa ebullierit, addita mellis rosæ simpli portione, illius quoque poterit unguento popaleo, additis gut. ol. Jascuam, quod si præfati non fuerit, reformetur unguinum cum ol. henaphatino. Sed in utrum quotidianum ducatur balsamus Saturni, ut qui restituerit & exiccandi, roborandi & emolendi quoque, imo & demulcendi facultates obtineat. At nullo modo erit omittendus ignis noster, adjuvando

prope partem laminam ferream omnino igniam, adeo ut pars ipsa clara durescit aque molem excaleat & exerceatur. Dux igitur patenter laminam ferream, ut altera admoveri, alia interim igitur & repeti possit.

Quibus jam dictis congrua erit addenda victus ratio, humectans atque refrigerans, alimentorum boni succi, facilis coctionis & distributionis, ut facilius proxiimo tempore mensentis oblationes recedant, magis sanguinea purgari, in temperies viscerum corrigi, & tandem molis hæmorrhoidalis, apte valde imminui, aut ex toto delecti possit. Interim tamen non erit inutilis usus emulsionis ex amygdalis & lentinibus melioduta, frequenter, vel summo mane, vel prima mensi assumenda, ut hæmorrhoidum prava qualitas quodammodo emendetur, eorum nimirum acrimonia & visciditudo edulcoretur, sicque minus acriter hæmorrhoides ipsas feriant. *Joh. Raymundus Ferrius, in Consilio Medici.*

Ab Hæmorrhoidibus Præservatio.

Consultatio II.

Quamvis Melancholiam hypochondiacam rotundis confirmari & confirmatam superare vellet vanus videatur, eoque magis, cum tota massa sanguinea eodem humore melancholico sit infecta adeo ut & hypochondria cum toto, & totum cum hypochondriis communicationem habeant, sibi que invicem materiam suppeditent, nihilominus hæc & illam non parum dimittit post pro certo habeo, ita ut facultas expulsi ab isto sanguine minus molesta, minus quoque impolita tum ad hæmorrhoides capellas atque deponat, sicque illius. Vit non parum ad hæmorrhoidali affectu saltem levati, si non omnino vincantur possit, præterquam quod ab aliis quoque plurius Melancholia hypochondriacæ symptomatibus multo minus divaricatur.

In hoc igitur finem primæ viæ à cruditæ humoribus sunt mundanda. Secundo Mesenterii oblationes spernenda. Tercio Massa Linguea purificanda. Quarto Hæoris & hypochondriorum fervor temperandus, atque tandem hæmorrhoidum cura est habenda.

Pro prima intentione, primum Leniens erit potio ex syr. ros. solut. rec. & ex manna clarif. vel ros. calidæ cum kaitivo. Primum præparatus erit hujusmodi.

℞. Julap. acer. $\frac{z}{ij}$. aq. Rosum citri $\frac{z}{ij}$. m. pro syr. & sic pro aliis quinq. Quibus succedat hujusmodi Leniens.

℞. Syr. ros. solut. de polyod. an. $\frac{z}{ij}$. aq. Rosum citri parum, m. f. p. v. præbeat elect. lenit. cum, taitaro, quibus superbibat per hordei.

Pro secunda intentione, medicamenta perspicua debent esse humectantia, non exiccantia, non calorisifica, siquidem & cruditates jam exiccate, & tunc ipsæ à calore cassior est factus, & in homin. ubi ductus persistendum, multo enim difficilior est humectare siccam, quam exiccare humidum, quare succi herbarum depur. humectantes & sperientes sunt in usum decedendi ita.

℞. Succidepur. & per arenam trajeci, cich. borag. pom. dulc. an. $\frac{z}{ij}$. decod. in juve pulz paratæ malvarum, violatarum, lupulorum, sonch. $\frac{z}{v}$. m. pro syrupo. Sequenti vero die assumat summo mane flor. calif. $\frac{z}{ij}$. & post horam superbibat per

pollz solis malvacum, borag. & sonch. aliam, tribus vicibus horis ab assumpcio jure prædant. Tertia vero die repetat succos, ut supra, & quartæ horam calif. cum jure, sicque ita trahit pecterevet ad hunc finem quæritur atque diem. Quo tempore assumat potio nem hujusmodi.

℞. Rhabarb. opt. $\frac{z}{j}$. fol. lenz mundat. $\frac{z}{ij}$. cinnam. integr. $\frac{z}{ij}$. aq. cich. q. f. m. f. m. per hor. xl. deinde f. jure expulsi, & expressi ad elect. syrupo. sol. solut. $\frac{z}{v}$. m. f. potio. cui, tribus vicibus horis, superbibat feri opt. depur. aut aq. Noer. lb. ij. duabus vero horis ab assumpcio jure prædant. Die autem sequenti repetat usum succorum appetentiam ita.

℞. Succ. depur. & per arenam trajeci, cich. borag. agrim. an. $\frac{z}{ij}$. fal. tart. fixi gr. x. decoct. in juve pulz factæ, malvæ, lupulorum, alparag. capill. Ven. $\frac{z}{v}$. m. pro syr. & sic per interm. hebdomada. Interim hoc tempore Jecoris dextera erit aperienda, & sanguis moliter educendus. Transacta autem hebdomada, succedat talis expurgatio.

℞. Flor. calif. rec. ext. elect. lenit. an. $\frac{z}{ij}$. Extr. cich. rhab. $\frac{z}{j}$. m. f. boli, vel repetatur infusum supra descriptum, quibus postea superbibat ferum aut aq. am. iode expulsi eorumdem loccotum usum interm. altera hebdomada, & tandem quoque idem medicamentum purgans, modo descripto, & toto jam dicto tempore illiusmodi quotidie totum abdomen ongerit tot. malvivo.

Pro tertia intentione explenda, rursus aliorum succorum usus erit opportunus ita:

℞. Succ. depur. fumariz, borag. pomorum dulc. an. $\frac{z}{ij}$. fal. tart. volat. gr. x. decoct. in juve pulz elect. endiv. agrim. fumariz, lupulorum $\frac{z}{v}$. m. pro syr. & pro alim. quædam; in quorum intermedio assumat hujusmodi medicamentum.

℞. Flor. calif. rec. ext. $\frac{z}{v}$. elect. de succo ros. $\frac{z}{j}$. i. extr. cich. linez, polyod. an. $\frac{z}{ij}$. m. f. boli, quibus post horam superbibat feri expulsi, depur. aut aq. Noer. $\frac{z}{ij}$. quod idem medicamentum repetatur in fine, interim prius diebus dictorum succorum operatur vera magis apparetis bolus finitri, & sanguis parce, prout Excell. Adami videbitur, educatur.

Quartæ intentioni satisfaciendum aquis stillantibus potius, quam theriacibus, tum quia ex hoc necesse est solent, tum quia ab illarum copia facile calor activus obuii possit, quare sit licet.

℞. Aque stillant. de succo cich. $\frac{z}{ij}$. z. Julap. v. ol. ros. an. $\frac{z}{j}$. pro jura manjini, quindecim diebus summo mane assumenda; cui præmitti quoque potest Consuev. rosarum cochlear. unum. Post hæc nullo modo conjunctus est usus lectis astitit, ut quid & obstructionem reliquis valde exiccatas humectate & sperientes possit, & præterea sicut refrigerare, totamque massam sanguineam edulcorare valeat, in cupis ubi quadr. ginta saltem diebus suscitandum.

Tandem hæmorrhoidum cura est habenda, quæ præterente dolore, Apodyna requirunt, jam à tunc in altera Consultatione satis proposui, absente autem dolore, exiguitate exiccatia, non tamen adeo valida ut nimis astringendo & contrahendo dolores suscitare possint, sit sit igitur, quod dum i. xces de posuit, ab illius hæmorrhoides ubi nigro tepido, in quo ebullit folla verbuli, ros. tub. myrt. & plantaginis, ut præterea eandem modum immoluerit cura ferocitatem opprellione.

Hæcque jam dictis omnibus congrua victus ratio, intentionibus medicis aque medicamentis jam proposui præposita, necesse est addenda erit, ab excellentissimo viro Adami singulorum præscribenda,

Ritanda, ut ad modo meliorem hanc red gaur
vie Illustrissimus atque Reverendissimus, quem eodem
opitum à Deo ex corde precor. Idem ibidem.

Plura super Hæmorrhoidibus: vid. in Bibliotheca Medica
Medici-Fraticæ.

HEPATIS MORBI.

Hepar est magna glandula de genere conglome-
ratatum, ex cujus valis exterioris in truncum
ab eo quibus enascitur vas illud amplum nomine poti
bilis insignitum, imo & vasa alia minora, radices
cystidis bilaris dicta: quæ omnia inferiunt abdomi-
de bili, per viam fermentationis, aut percolationis,
vel per utramque eam simul, in hoc viscere, effor-
matum, vel raurum à sanguine, per vasa arterie hep-
aticæ venæ Portæ ramificationes, in glandulas ex
quibus tota ipsius affurgit mole, accedente, iteretæ.
Ex hac compendiosa admodum descriptione, quis non
videt, si vel seculo h'is impediatur visio glandula-
rum visus componentium, et vel visio fermenti, si ali-
quod tale in hac operatione nature derit, ut plurimis
non mediocriter nominis perplacere: vel eadem b'is se-
recta propter obstructum porum bilarem aut ejus
præcipuos ramos, in insectina delabi non valeat: vel
viscidior redditæ imperfecte tantum illoræ de fluat: vel
æctior, fluidior, ac kerofior facta colloræ suæ canali-
que inde assurgentes vellicatas, imo etiam coctodes,
abundantius dectuat: Quis, inquam, non videt iode
procreatum tri multiplices morbos, inflammationes,
tumores, ulcerationes, fluxus biliosos, imò fluxus
hepatos &c? de quibus hic particularius quæ non
adjicimus, sed continuo ad singularia quedam in
hepatis morbis Chirurgiam maxime spectantia, descen-
demus.

Observationes.

Hepatis abscessus.

Cum anno 1675. Patritius Chirurgie operam dare-
mus, curæ nostre commisit fuit Vir constitentis æta-
tis faciei colore flavescente, pilis subruis, sed minus
laute conditionis, qui vulnere à gladii ictu profun-
diori inter costas nothas inflicto, abscessum hepatis
Incurrit, ita or per sex septimanas materia purulenta
copiose manavit, eò majori cum periculo, in he-
pati à parenchyma stylus profundius adigi potuit. Hic
ciciter septimanarum spatio ab effectu fune-
stro liberatus fuit, medicamentis bullariis ac vul-
nerariis, divergentibus ac consolidantibus, interne
& externe ulnariis; Nobili aliò, quem simili malò
Laborantem eodem tempore curæ suæ credidim, D
Morellus Chirurgus persissimus ter de die invidebat,
paucorum dierum intervallo è vivis excedente, adeò
abscessus fortis hostis homines qui indeoque præ divi-
ribus natura favete dicitur. Job. Jacob. Hædæus in
Observat. Anatomico-Medici.

Hepatis durities & suppuratio feliciter
finita.

Quantum sufficere possit præ adeò nobili præ
est hepar, Medicorum monumenta testantur. Hic
quoque tacelebimus ex-emplum non inaudiatum atra-
mentatum, quod in eadem parte accidit. Juvenis
quidam Amstelredamensis qui Chirurgie operam da-
bat, ætate tres fere annos nobis querebatur de epiga-

Est. Chirurg. Tom. II.

stril teitione, cum dolore gravativo ad hypochon-
drium sinistram fere exteudente, tandem tumor durus
ibidem ortus, cum æquali difficultate trispirandi &
fæbtilia. Hicce exploratis, hepar esse induratum ju-
dicavi, divitique emplastis emollicentibus applicitis,
tandem cataplasmatis matutinis adminiculò tumor
mollior redditus ac suppurationem petente, quò post
causæ potentiæ applicationem, phlebotomo apertò,
multum puris effluxit, & brevi post, ulcèr
purgato, san tus est. In hoc casu non est dubitan-
dum quin à præcisa inflammatione, gibba hepatis
pars factæ conat: peritonæo, unde ulcèr apertò,
puti deurgans fuit in abdomen cavum degub tuæ.
Ejusmodi exempla repetuntur quoque in observati-
onibus cæcioris Nobiliss. Viri D. De Marchetti, Pre-
fessoris Patavini, pag. mch. 110. Fridæri. Ruysschii in
Observat. Anat. Chirurgicarum centuria.

Hepatis inflammatio, ac suppuratio veni-
curata.

Mulier quantum completum climactericum, in
inflammatione hepatis cum fistula heca, spirand: dif-
ficultate & pungivo in hypochondrio dextro labo-
rans dolore, phlebotomisi alivæ non obstantibus re-
medis, juxta effatum Hippocræ. 4. acutos, eodem in-
laxe suppurata est, atque xl. die puris crassioris san-
guine illius libras sex ipone evomuit & convalescit.
D. Nicolai-Gulielm. Rocker.

Calculi ex Abscessu circa hepar.

Pauci elapsi sunt anni, quod hic Uralsiaviæ vix-
te, Johannes G. oichius, Oeconomus Xenodochii ad
Spiritem Sanctum, Vir robustus ac validæ Consti-
tutionis, temperamenti Sanguineo-cholesterici. Hunc
quandam mense Junio, anno ætatis 60. desubito Ri-
gore vehementi invasit, cui postmodum dolores in Hy-
pocondrio dextro ad regimem Hepatis una cum Tu-
more, nucem juglandem æquante, accesserunt. Tumor
is, doloribus persistentibus, intra semelisse spatum
adeo increvit, ut tandem pacem stil gineum Uralsi-
aviensem qui in itate tantum non superaret, sicque in du-
toir, in icitum reteret. Quamquam vero Abscessu
huius æli genitor adhuc bnda fuisset cura, ægrotus tamen
nec Medico nec Chirurgo alicui, sed sui ipse curam sus-
cipere ausus est: int.roc quidem Balsamum Sulphu-
ris, aliquand u singulis diebus deinceps bis terve
in Septimana, ut nonnullam pulverem cardui be-
nedicti adhibuit, & pro Evacuatione quandoque,
velut pro libito, Rheubarbarum: Externe vero ab in-
ticio ad finem morbi nisi Emplastrum Jeugigneti
Noninhergentis Tumori applicuit. Tandem aliquando
convirg: ut circa Festum Nativitatis Christi, dum
multo ægrotus dormiret le haur sentiente, Tumor con-
pactus, omne magna quantitas materie, pulvis instat
crassæ, cinetice coloris, intergus 4 septimanis pen-
fluxit, donec Tumor quasi omnino desideret.

Posthæc ex vulnere, quod interea in fistulam de-
gentaverat, æque in nonum usque annum, indito
in id instrumentum argenteo, aperum servabatur,
juxta cum humore ichoroso successisse plurimi lapilli
proveniente, diversæ magnitudinis, forme & figu-
ræ, sic ut alii triangulares, alii quadrangulares,
alii sexangulares, deprehendi sint, inter quos majores,
glandibus saginis, minores vero, granis edicæ simi-
les erant.

Idem Coloris sunt extrinsecus sub-puniceis, Instat
Castaneatum nondum omnino maturatum, induci
tenul quodam cortice, intinsecus lutei Instat Rheubar-
bari.

G g

bati, quo ægrotus sæpius utebatur. De cætero lapilli dicti sunt friabiles, pondere admodum leves, ac numerum eorum novem annorum spatio excrementorum, quingentenarium aut sexcentenarium æquare, hæres ægroti affirmans: Eorundem etiam lapillorum numerum ad 80. apud me æstivo. Quamdiu volnus apertum conservatum est, & lapilli excreti sunt, cætera vir ille bene valuit, & ad quævis sua mania obeunda, supra morem ætatis, expeditus & alacris; quam pulchrum vero vulnus ipsa sponte coaluit, in alios Morbos incidit, præcipue vero interdum in Asthma, interdum in Ictetum, sæpius in Diathoracæ, quorum morborum unus tandem quoque ipsi vitam extinxit, postquam ad 72. ætatis annum accessisset. *Gedofr. Thileph.*

HERMAPHRODITI.

*De Hermaphroditis, eorumque Chirurgiâ
sic scribit Hieronymus Fabricius ab
Aquispendente.*

Hermaphroditus dicitur qui utrumque habet sexum, olim *ἑρμῆφροδιτ* vocabatur, ex Plinio, ut apud Platonem, ita dictus, quia sit Mercurii, & Veneris filius, ut vocis compoſitio indicat; nam Mercurius *ἑρμῆς*, Venus *Ἀφροδιτ*, à Græcis dicitur. Ut fabulatur Poëtæ, fuit adolescens formosissimus quem cum esset complexa Salmacis Nympha in fonte, & blanditiis ac precibus in concubitu flectere non posset, illa à Diis petiit, ut ex duobus corporibus in unum tedigeretur; quod factum est. Plinius lib. vi. cap. 2. ait, quod olim in prodigiis habebatur, nunc in delictis. Quia verò multam utrique sexui affert deformitatem, idcirco Paulus ejus Chirurgiam proponit. Primum autem ex Leoolde puniſt differentias hermaphroditorum, in viris minimè tres, in mulieribus unam. In viris quidem modò juxta regionem inter scrotum & anum, modò in mediò scrotò mulieris pudendi pilis obſtiti forma apparere: Tertia verò ad has accedit, in qua nonnulli veluti ex mulieris pudendo, quod in scroto est unam profundunt. In mulieribus verò supra pudendum, juxta pubem virile frequenter reperitur genitale, tribus quibuldam exstantibus corporibus; uno tanquam cole, duobus autem aliis veluti testiculis. Hæc Paulus. Ego autem quid in hæc re observari dicam? Observavi enim in homine iocet anum, & testes, statim sub testibus, præter sua genitalia membra, formata quoque fuisse labia uteræ, sine tamen aliquâ cavitate, ita ut videretur nararum voluisse vulvum, & pudodum mulieris efformare, frustratam tamen fuisse: In mulieribus verò observavi nympham productam fuisse, omne ad duos, nunc ad tres digitos, quæ tamen erat flaccida, neque erigebatur. Nihil ultra fuit hæc in re à me observatum: Audivi tamen, & Perusii, & hic Paravi, mulierem fuisse hermaphroditum, quæ coocubulum cum aliis mulieribus habebat, hæc parte etestâ, ut dicit Paulus. Fama quoque est in bellò Ungaricò proximè præteritò, mulierem peperisse, qui ad intuitum mas, sed clam femina quoque erat perfecta. Notum hæc à namerâ fieri; quoniam in generatione, ut puta in naturæ operum maxime natu-

rali, totum fuit de successione naturæ tollere, ut potius abunda e in superfluis, quàm deficere in necessariis maluerit. Itaque primò sexus conceptum, ut scilicet unum scilicet, vel mas, vel femina, quod minus procreatur, fugiat. Sic in ovis quoque per duplicatum vitellum factum est. Propterea sicuti hominem fecit potestate feminam, sic feminam matrem evadere idoneam molita est. In quò tamen præpollerit femina, quod frequentius in femina, maris genitalia, non coacta, femine in matre posita sunt. Unde Paulus in mulieribus frequenter accidere dixit masculinum sexum. Ratio ea est, quia, uti ex Anato me dictum est, natura utriusque femineorum, quàm maximè generationem appetit, & intendit, propter causas in anatome allatas; ad quæ hæc fortè magis spectant, quàm ad hunc locum.

Sed nos Pauli Chirurgiam in Hermaphroditis æstetamus, & primò in viris feminæum sexum habentibus. Paulus dicit quòd tertia virorum deformitas, quæ urina per scrotum excrevit, curationem non admittit, reliquæ tres curantur, corporibus inpervacuis è mediò sublati, & ulcerum modò curati. Quæ Pauli verba nihil aliud præcipiunt, quàm ut excidentur corpora mulieris, & pudendum, ac vulvum facientia. Ego verò cum nihil istiusmodi viderim, neque actionem offere, neque incommodum esse, neque deformitatem ullius oculis æstere, satis fore existimavi, ab opere dolorem æstetere abstinere, & sine Chirurgiâ ea dimittere.

Sed de Nymphâ solum difficultas est (*sub eâ Chyridem complectitur Amor noster*) de quâ Paulus privatim agit: Tum verò ab Aegyptiis ex indici solet in virg'nibus, ubi scilicet multa promoret; quod duobus tribusque de causis factum esse notum. Primum, quòd existimantur hanc partem plus jussò prominentem, acutè venereo incommo dolum esse, quòd in vulvæ osticium incidat, & colu ingessum liberum prohibeat. Secundò, quia existimantur nefas & piculum esse mulierem agere quoque vitum posse. Tertio, ut modestiores feminas redderent, & inextinguibilem libidinem, locus illis astuosus feminas urgerent, per nymphæ ampulationem, quæ Veneris aculeus, & curigo est, actionent: Nam hæc pars, uti Anato me demonstrat, formam colis, & substantiam, corporis quoque proprietatem exactè refert, proindeque & oblectationem, & omnem penis actionem habere neccesse est. Sed jam tempus est ut hujus quoque partis chirurgiam peragamus; quam Paulus, resupinâ muliere, & nymphâ vollicâ ptehenâ, scalpello exindit; diligentè adhiberi ne tam aliè ipsam penetremus, ut finibus æstetibus, Rhizoda vocant, excideret. Sed melius est, tum ad dolorem, tum ad chyrida virandum, forcipe angustiore ipsam apprehendere, sensimque stringere, ut adstrictione sensus hebetetur, inde præcedere.

Observationes

De Hermaphroditâ perfectâ &c.

Abſit ab hoc capitulo lasciva perulantia, & procul hinc, procul eltores auræ profusæ & salaces. Medicis scribimus, quibus & saugere subinde permittit necessitas.

cas, quæ natura, sollicita pudicitie & conservatrix, velanda cutavir, his ergo non molestum erit audire, quid circa eas partes etiam extra ordinem aliquando ipsa illa omnipotens mare molatur. Obsupit mecum Gualterus de Pessy Amstelodamensi nolosomio præfectus Medicus, & aliquot celebres, qui aderant, Chirurgi, dum puellum & puerum vitabamus, quæ annu ætatis suæ læto fluxuorem mentium passa erat dismutatio & vehementem, atque ubi ea delectat, plurimæ concupis fuerat; ac d. u. collecta cum febribus cum ordinariis communiibus, & hic duo etiam sequacibus, tandem in regione pubis vehementissimus fuit dolor & passus ea paulatim inflammescens, anno ætatis septimo, quo hæc nuda nostris ulsupavimus, non puerum, sed penem produxit, qui perfectus, & perfoctus erat; in. ut utinam commode per eum redderet, testiculi jam etiam sui prodebat initia, nam in sinistro latere tangentibus occurtebat globulus, qui manus cedebat, omnium, qui aderant, iudicio extra omnem controversiam, testiculi lacerantis adhuc, sed le furas prorumpere cennatis argumentum. Quamquam autem parte recentis adnata utilnam redderet, non tamen tandem minus commode, qua antea solita erat via, emittebat. Mitabatur ista tam infolita naturæ molimina, & quo tandem evadent inter nos quærebamus, quod succedentia docebant tempora; vivit enim & valet hæc parva hermaphrodita, quæ non minus obstupuit, credo, quam famula illa Anna Weyde Angla, quæ ne quidem per umbra suspicari & aliam fore, quam feminam, sine ullo dolnis sensu anno ætatis læto tenuit prodire testiculos, quibus decimo terro aduatus est penis, ita ut univulgo sexus membra exhibuit, testiculi etiam, quam ordinatim viderunt sunt, majoribus, testiculis utrinque sexus habidine, sed quia penis non erat perforatus, semen, quod cum indatum impleverat, signidem id affirmanti fides potest haberi, deorsum per muliebria, effluebat. Curiosa alia de hac perfectissima hermaphrodita scire possem, nisi illa per totam Europam peregrata, penem & testis omnibus videntem, omnibus tangenda abussisset.

Itaque aliud in hoc genere mirabile refertam: qual etiam Amstelodami visendum fuit: puer est etiam annorum, in qui nec testiculi, nec scrotum apparet, sed tantum virgæ cujusdam imperforatæ exigui tubus, & infra eum foramen, quod caput majoris aciculæ magnitudine non excedit, per quod urinam reddit sine incommodo. Sed hisce stupendis naturæ exorbitationibus tantisper immoratum esse, sit satis. Legat, qui curiosus est hac super te, Ausonii carmen, non unum huius rei exemplum adferens, quod hic tibi suis admodum numeris.

Pallehana res nota, & vix credenda Poëti;

Sed qua de vera præstiterit historia.

Feminæ in speciem convertit masculus alas;

Pervagat de petra consiliis ante oculos.

Cuncti admirantur monstrum; sed mulier agna

Alis in iecurum de grege versa marem.

Quid solidi ad speciem nona nescitis haberi?

An vos Nigoris carmina non legistis?

Cæca convertit præles Sæternæ Confus,

Amphionque suis corpore Tiresias;

Vidit semivirum fœns Salmas Hermaphroditum,

Vidi natentem Plinius A. diogenem.

Nec satis antiquum quod Campana in Benevento,

Unum Epheborum virgo repente fuit.

Nolo tamen præter documenta arcescere fama,

Ece ego sem saltem semina de pueris.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Legat Fortunium Li. cum de Munstris, & Miraculum Delin in d. Iquisitionibus magicis, ubi hermaphroditum genuisse & peperisse narrat, alios ex femina subito in virum mutatos, alias ex aliculis in juveniles, nec negatur vir ille, tempus, locum, aliaque assignat circumstantias, quæ solent rebus fieri autuere. *Theoder. Kerkringius in Sp. elegis Anatomicis.*

De Hermaphroditi.

De hermaphroditis nihil omnino dicere statuissem; sed patrum, quia Fabricius de ii. nonnulli scribit, partim, quia mihi puella hermaphrodita ante bleonium inspiciente & post mortem examinanda oblata fuit, non possum quia aliquid addam. Qui plura de talibus scire desiderat, a secat celeberr. *Caspi. Beublii tractatum* abiolurissimum. Infantem illum cum virum inspicereamus, dijudicare non posuimus, quoniam sexum in eodem præpolleret, habebat enim penem, pro ætatis ratione longissimum, simul quoque externam pudendi mul ebriis imaginem. Post aperturam cadaveris inventus est uterus cum testiculis, tubis alique vesperitilium, tum & sine pudoris, in ejus superiore parte meatus urinarius quoque aderat, adeo oculatus, ut in viva eundem animadvertere non potuimus. Cæterum penis nullum habebat commercium cum vesica, eoque transversum dissecto, nulla speciebatur urethra, sed tantum duo corpora nervosa, quæ suis cruciatu adhererant ossibus pubis, ut elitoria mulierum. Porrovis hic sine dubio videtur, si longius habuisset viri sparium, & medio sublato pene tantum super vacuo, postea ulcere debite tractato, ut habet *Ægineta l. 6. cap. 59. Clariss. Joh. van Horne in Microtechnis.*

Conceptio Hermaphroditica seu Androgynæ.

Fortunius Afajatus, Physicus atque Theologus Italus insignis, in suis considerationibus Physicis atque Astronomicis, Paulo III. Pontif. Max. imperit, & Venetis Anno 1549. impressis, de conceptu Androgynæ cap. 2. hæc habet. Melinus Beltanus, divinus vares, anno à Christo nato 446. ex ea matre natus est, quem constabat sine viro concepisse, cum forte se cum viro jacere somniaret; id Sabellius scriptor historicarum diligentissimus, alique Historici & Chronologi, præsertim apud Anglos, literis prodiderunt. Averthoes asserit hujusmodi casum suo tempore accidisse, hoc est, virginem sine virili concubitu concepisse & peperisse. Divus quoque Thomas ait, suo seculo idem evenisse. Nostrates etiam paucis abhinc annis testantur idem Cremonæ conspisse. Vivuntque adhuc iam oblectantes boni nominis, tum probatissimæ quædam matrone, cum quibus hæc de re sæpe longos ipse sermones feci, quæ jurant, se huic spectaculo interfuisse.

Allegatus Auctor cap. 5. suam hæc de re sententiam fert, dum dicit: Dari hermaphroditos utriusque sexus minus egregie abiolventes, & alterum rancummodo sexum suis ostendentes: formicea genitalia exteriori conspicua esse, virilia intus latere, femine prolifica prædita; & per certum feminis ductum, quotiescunque opus sit, semen ad maricem deferre, vehementer aviditate illud excipientem; illudque penetrare illæsa intus virginea membrana in loco ad generationem accommodata, illicque residere, & ita conceptionem fieri, eodem modo ac si cum viro tem habuisset; & hoc plerumque fulere per somnium uti venire, quo tempore fixæ natura ad venientem excitandam variæ simo-

lacta confingere facile potest. Servatis igitur naturæ legibus, satis constare arbitrat, mulierem sine vitio foris adhibito concipere posse; qua in re provide & almæ naturæ gratias ingentes agendus esse censet, quæ nullo pacto gravis noxam perdit aut extingui voluerit: etiam si vir non invenirentur, aut feminas protus odissent. Immo omnia procurasse naturam statuit, ut humanum genus ueretur & conservaret, illudque homine etiam invito latius propagaret.

Rarus hic Tractatus plurima alia paradoxa in se continet non ubivis obvia: Speciosas etiam rationes complectitur, cur magis se ad polum vertat, in quibus eruditissimus hætenus plurimi deluderunt. An autem Lectori curiosio auctor hic in omnibus satisfaciatur, in medio reliquitur.

Schol. on.) Aristot. l. 4. de Gen. Anim. c. 4. judicat, de Hermaphroditis, quibus gemina sunt pudenda, unum ratum, alterum irritum habent. Non verum hoc Aristot. decretum esse statuit Joh. Faber Eynceus in not. ad Hist. Mexic. §. 547. certorum, inquit, mihi fide testimoniorum constat fuisse egregia statuta & venusta facie juvenem, qui modo gladium cingebat, modo colum tractabat, & agi parique pollet. Nisi Aristotel. intelligat, qui fecundum virile profundit semen concipere non posse, aut vice versa; quæ gravis sit in alia semina georare non posse. Contrarium, alii, ferè foveo, Aristot. sententiam. Externavit Theophil. Molitor Lynceus io Fabri ade mutem majorem, Ratum, qui Hermaphroditus erat & prægnans, novem maculos utero conclusos gessit, non majores quam aliqua magna formica, vivos omnes, & in quibus cor pulsare visum est: Erant hujus omnia formicæ coadunata generalia & semen præparantia, conscientis Testes ac deferentia. vasa una cum matrice: Altera ex parte adeant omnia vasa semen facientia & jaculancia masculina, cum ipso utero, testibus, vesiculis semine densis & optime concocto onustis. Hætenus Faber: Memorat Wolfphius in memorabil. com. 2. Camer. cent. 16. f. 510. fuisse Hermaphroditum Hieronymo Montrano Gallo satis cognitum, qui sexus mulieris putabatur, viro nupierat, cui filias aliquot & filios pepererat, sed nihilominus ancillas compreflerat, & in his generare solitus fuerat; licet itaque tarum ut Hermaphroditus utroque sexu & incubum & succubum cum aliis agere possit, & utroque fecunditatem exhibere; ut ramen solus sibi ipsi utroque sexu sufficere possit, res videtur esse valde difficilis quæ & credi & probari satis possit. *Georg. Christ. Peirl.*

De Duobus Hermaphroditis.

Inter praxim, quam in castris Brandenburgicis ad Anclamum Pomeranorum locaris, apud multos dynteria & febre maligna decumbentes, hoc Anno 1676. Moosæ Augusto, exercui, oblatum mihi fuit infans masculus, vix tertium anni quadragesimæ ætate superans, dyntericus, ex plebeia stirpe minime oriundus: Puellus hic, cum ultra octiduum laborasset dynteria, & ea muliercularum medicamentum ope jam esset sublata; accendit videbatur mihi insulsius epilepticis lissæ lethalibus decumbere: Cumque inret cætera insignicantia Clyster esset applicandus, & nemo in castris adesset, qui manum operationi huic adhibere gnatus esset, ipsem ego enema paravi & idque instrumeto apro infanculo infundit, ne aliquid damni impendenda sterius administrantis pareretur. Etenim non mihi aut alteri medico candido curpudiori ducendum existimo, quandoque Pharmacopœi aut Chirurghi vices supplere,

ubi id necessitas efflagitat. Cum inique canaliculum ol. amygd. dulc. oblitum cautè suis manibus admodum, ut sine oxa & dolore posset penetrare. Sphincterem ani (qui in dyntericis quidem relaxari solet) adeo amplum inveni, ut is primo statim insultu mihi potius membrum muliebte, quam anus videretur. Rima erat oblonga, ampla, labia sepa, quæ rugis quibusdam sed paucis erant plicata, & quæ partim sphincterem, partim vulvæ labra præterire videbantur. Præterea cum syringam, hinc inde in ano laxo agitarem, nec tamen illam penitus intrudere possem, cum semper aliquid obflare deprehenderem, quaquaversum canaliculum movebam, & liquor coemanus etiam resisteret, paulo superius versus os coecygi repertum logressum, quo syringa penetrabat & clyster plurimam partem infundi posset. Dubius igitur primo, an aliquid monstruosi & Hermaphroditici fobisset in reneo hoc subiecto, an vero fecum, & (quod in his morbis familiarissimum est) ani sphincter nimis esset relaxatus, & quæ intestinum rectum acrimoniam humorum dyntericorum exelam foramina acquisivisset, rogavi Patentes, ut iosanulum cum muliere, quæ illum à partu curaverat, lectica ad tentorium meum, quod iode ultra distindum milliare distabat, duci curarent, ut per integrum diem eo melius infantuli coram haberem, quoniam officii Eleæctotalis causa longius abesse non possem. Id autem feci ea de causa, ut præter diligentem curam illas partes exactius perlustrare mihi simul copia daretur. Consensere Patentes, & subsequenti die miserunt ad me puellum cum vetula. Illum ego lethalibus laborantem symptomaticis, quatuor opus erat, reseci medicaminibus necessariis, & postea partes diducendo interiora ani perlustravimus ego & vetula quid lateret post rimam, quam natura loco sphincteris ani produxerat. Diducis itaque labiis externis, rogis quibusdam (ut superius innui) sphincterem soi morientibus, ioveni nymphas & carunculas versus abdomen, inter quas hiatus erat pro vaginula uteri. Paulo superius versus dorsum, sphincter erat infestior recti minime, ut alias, contiguus, sed tanquam duabus membranarum rubris ex adverso sibi correspondentibus, alvi excrementis extrin præbenibus, compositis: Hic, valvularem mote aperiebatur, quoties infans ejularet, & (quod ob dolores internos fere continuo accidebat) vocem raucam minime sonoram ederet. At, quod assequi ego non poteram, supra hunc ani sphincterem internum aliud foraminulum parvum, ad formam meatus uricæ, in mulieribus alias versus abdomen, hic autem versus os coecygi, conspiciebatur. Notabile & hoc erat, quod Perinæum, forma sua futuram exactissime referens, ultra quatuor transversos digitos ioter penem & hunc monstruolum anum distabat. Ita latè hisce partibus percipis, infanculo hunc (Puellum ano-Puellum, vel quomodocunque eam appellare placuerit) cum vetula dimisi, qui etiam subsequenti die epilepticis moriebatur, statimque in proximi pagi templo sepeliebatur, cum Patens exterrationem, quam sollicitè implorabam ob internam partium struendum, penis abnegarent. Mulier quæ infantis curam à partu usque gesserat, eandem mecum sententiam circa muliebte membrum fovebat, quæ (ut aiebat) semper obtraxisset, Infanculum circa illas partes sese non bene habuisse, præsertim cum egesserit urinas & alvi excrementa.

Cadaver etiam denudatum mihiis eustodiam ad propugnacula urbis Anclamæ occisus, inter aliquos ocellus ita cum suis genitalibus utriusque Sexus fuit conspectum à plurimis, in quibus membrum muliebte peninæ locum occupabat. *Christian. Menzel.*

De Hermaphroditis.

Die 12. Julii proxime elapsi, comparuit puella quædam rustica, non imberbis, in nostro Ohinienſi Conſiſtorio, cui nihil in votis erat, prius quam ut nuncio de ſexu ſequor, & ejuſdem ſexus habitui, miſſo, ſibi integrum eſſet à Gynæceis ad maſculum & ſexum & cultum tranſire. Erat autem

*Mercuria genitrix ſans, genitrix Cythera,
Nominis ut mixti ſic corporis, Hermaphroditus.*

Androgynus bloce natus in pago Liouenſi, *Eſpe*, cum ſalutari Regenerationis cingeretur lavacro, dictus eſt Petrus, teſte ipſo loci illius Paſtore; poſtea autem, cum errorem Naturę obſervanteſ Parentes, ſalutabatur Petronella, ultra annos unum & vigenſi, in hunc uſque diem, quo captus vel tactio, vel odio ſui generis, ſpecta nobilitate ſexum & præſentia, (quam ſolam laudavit qui omnia vituperabat Agrippa) ad caſtra Virotum redire oprabat. Caſum hunc & cauſam ad forum Medicum mox devolvebant Aſſeſſores, ideoque remittebant ad utrumque Clarifſimum meum Amicum Dn D. Chriſtianum Henricum Lujā, Dn. D. Chriſtophorum Baſilav, & me ſimul, ut noſtra, qui una cum temporis aderam, valeret exiſtimario. Nos varia primum huc ſpectantia rogantes, tandem ipſum hominem oculis ſubiſcimus noſtris. Ubi jam oculi noſtri ad metam perveniſſent, obſervavimus in perineo, ſive interſcineo.

Pudendum muliebri, exiguum quidem, ſed non plane clauſum aut impervium, quod tamen oculolum judicavimus, nec omnibus, quod dicitur, abſolutum numeris, cum nunquam vel lotium emiſſerit, vel tributum penderit lunare. Prævaluit autem membrum illud quo Viri ſumus, in quo defectus apparuit nullus, niſi quod Peni brevior videbatur, verum, præ pudore, ni fallor, brevitate modo mentiebatur, confugiendo in viſcera mille opera tugi. Teſtes adeo accreverunt, ut non mereantur nomen Teſticulorum, communem quippe ſupe greſſi magnitudinem, Vervæcum porne adæquant. Atque ita non modo bene teſtatur virilitatem, ſed & ſalacitatem, cujus infimulari dicitur (ut cum Plauto loquar,) præſentibus teſtibus petalac adima & ru icolas. Percrebuit equidem rumor pamphila quondam ex ipſo gravidam eſſe, quod tamen ipſe, à nobis interrogatus, negavit conſtante, ideoque nec temere hoc affirmavero. Egrogii hi Teſtes rariſſimo turgunt ſcroto, non ad communem Naturæ legem formato, ſcil proriſ biſido, & in dextram ſiniſtramque partem exacte diviſo; quippe cum linola illa, in infima ſcroti parte ſecundum longitudinem communiter excurrent, penam fururam vocamus, heic ſedem ſuam circa Penis elegit radieem. Atque ſic ſerato ſæpius luſerat in hoc noſtro Natura, in loquum ſui ludibrium ipſum reſervatura. Immo & varias vices ac viciffitudines experta ſunt hæc membra, ipſo teſte poſſiſſore. Tempore quippe nativitat, & primis ſtatim annis, tavit Natura poſſiſſimum Virilibus, progreſſu temporis videbatur ad alteram inclinare partem, quaſi organo muliebrī dediticia futura, verum ubi pubeſcere cepiſſet, rediit ad priorem locum, unde diſceſſus fuerat, fuerat Naturæ vigor, quaſi eandem remenſurus fabulam. Cum vero ſe heic ſenſit diverſi commodius, tranſiit huc ſuas ſedes, maſculo generi fuerat hæreditarias. His omnibus rite penſitatis, ductum Naturę ſequor, Virotum numero hunc adſcriptiſſimus; jubentes ut, qui hætenus ſub muliebri palla max deliventer latavus, jam, complicato

Bibl. Chirurg. Tom. II.

ſpario, in ſcenam ſine ſuco prodierit, veſteque ſucinea cum virili mutata, maſculeſceret, & faciendo opere ruſtico, jam tum Vir futurus, digno Viro, læcetos poſthac exerceret ſuos. *Georgii Hannai.*

Andria, ſive mulier Hermaphroditica.

Emacularam ſœminam, non caridum luxu aut deſidia pronatam Andriam, non illam Tetenſi ex Inſula Leſbo ortam, ſed ruſtica gente in ſuperiori Bavaria ed tam ethiœo, cujus lepidum exemplar Matius Grapaldus lib. 1. Lexic. cap. 5. voce *and* in Latine redito Epigrammate exhibet.

Cum mea me genitrix gravida geſtaret in alſo,

Quid pareret ſeror conſulſiſſe Deo.

Mas eſt, Phœbus ait, Mars ſœmina. Junoque neutrum.

Quemq; ſeror natus, Hermaphroditus eram,

Quærenti leſbon, Jove ſic ait, occidet armis.

Mars erca, Ithacus aquas, ſers rata quagret ſui.

Arbor obſcuras aquas, aſcendo, decidiſ erſi,

Quem interras caſu, labor & ipſe ſuper.

Pes beſti rarus, caput incidit omne, cuique

Fœmina, vir, neutrum: ſumina, tele, ercem.

Andria autem noſtrę ruſtica *Martha Lechna* nomine, patriam habuit pagum ſuperioris Bavarie patrimonium ſuavit, qui ſere mediū itioris inter Ingolſtadium & Mouſachium peregrinantibus exhibet, à præterlabente Fluvio Ilne, & Conobio, quod circa annum R.S. MCCXV. ibidem exſtituctum Bavarie annals referunt, ita indig'atam, quam corrupto idiſomate incolarum dialectus nunc *Idelmayer* vocat. Parentem habet *Johannem Lechna* mercatorem, marrem vero, ob motum pedibus negatum ætate inque ſumma penuria decumbentem. Amor Judicis in egenam hanc decimum quartum annum ætatis nunc agentem literis hilece commendatilis pro viri poſſe munivit:

Demnach Mit Verwunder deſſen mein Unterthan Hans Lechna unterthanig zuvernehmen geben, daß er mit ſeinen fünf Kindern ein unſicham und armſeliges, völeches in gleichem Mann und Weib, nicht von ger deſſen Chevrürhin völegen zuſtandendem Unſtucke an beyden Fußen contract. Sieweil er aber vöoben greſſer Weib muth zu Curirung deſſen kein Mittel, auch mit ſeiner Hand Arbeit, als Tagewöhler, ſedlich zuverhalten nicht vöwiſſt, ſondern ihnen kann die Lebens Mittel ſchaffen kan, dahero gedungen, gute, fromme, ererbte Chriſten um das vöwürdiges Allmoſen um Gottes willen anzurufen und zu bitten, hat er mich ihme deſſen Atteſtation und Urkund zuverhellen unterthanig geben und angelanet, vöwleches Ich der Warheit zu Suer, vöwie es auch der Augenschein beweget, nicht vövervögen vövöwendemnach an alle und jede, vöwas Dignitaren und Standes ſe ſeyn, vöwelche mit dieſem Urkund erſuchen vöwerden, mein gebühr-dienſtvöwelliges und fremdliches Erſuchen, Sie vöwollen geſchicktem Lechna auß Chriſtlichem Mitleiden die Barmhertzigkeit ervövöſen, und ihme mit ihrer Gabe dem vöwürdiges Allmoſen beſcheiden ſeyn laſſen: Solches vöwird Gott der Allmächtige ſeiner Verbrüſſung nach her zeitlich und dert ewig beöhen, der arme Menſchlauch mit ſeinem Gebet gegen Gott forſindend nicht in Vergeſſenheit ſtellen. Der Verbeit zu Suer habe Ich auß beöwöbten Hanſen Lechna ſein gebührendes Erſuchen und Bitten ihme dieſen Schein vövöſſigen, zuſeſſellen und geben. Actum Nidmayer 20. Nov. Anno 1670.

(L. S.)

ULRICH VIRDE

Richer alda.

G E 3 — 2. Hg

Ilac ratione ostiatum victum quantitate Martha anno huc P. C. N. & Inc. MDCCLXXI. 5. Iduum Iun. quo die Romæ anriqultus Vestalia celebrabantur, ades meas adit, pro obtinendo Viatu; lectis literis salvi commear, eopiam videnti ut faceret hanc naturæ aberrationem petii, quæ antequam inspiciendam se præberet, una cum fratre suo Iacobo Lechna facta est, se à primis ungulculis & dam sacra initi fuderis cum ea celebraturus, Hermaphroditias suspitione detentam à postiori membri genitalis efficaciori signo, evitari Caspari impositione fuisse indigitatam: factescens vero annis cum & pudenda muliebris signaculi longintem rimam evidetia ostenderent, circa decimum ætatis annum, alterum, quod in ipso S. Baptismatis fonte infimol Marthæ nomen acceperat, pro diluendo scias dubio reassumere parentes anie laborant: bavaro hinc Diadecta nostra *Maribel* vocata, Monachiumque deducta est, atque cenium & suspitioni prædemonstratæ sagacioris Experientie Gratiosi Ordinis Medici ibidem commissâ fuit, huius fasus Marthæ nomen in hunc usque diem tenuit, atque vitili exuto habito, ob perpetuum urinx stillicidium, muliebrem utpote laxiorem vestitum induit. Pendulos vero testes cum seroto vidimus juxta adumbratæ figuræ lit. A. A. quas iusta figura & proportione efformatas deprehendimus, supra quas brevior ac natura in viris finxit, præputii ac penia effigies BB. imminebat, siquidem præputii involuorum medull glandis caput C. C. quadrantenus obvelabat, nec omnino oberebat: erat autem glans penis turbinata, ut in aliis viris, cujus balis reliquo membri vitilis eorpoti, abbreviato nimum circuli instar, sive in modum cotoneæ adharebat, molli admodum acutæ prædita: necutit *glandis alio* sive *ambræum* in glandis inferiori parte, quod quidam æ nervorum extremitatibus consistunt, pro contractione præputii factum, frenum esse annuntant D. Hoc suberat dissimilis, quod evitæ hujus penis in summitat glandis medio apice non fuerat pro mure perinatæ, ac in maricali sexu, sed in suprema membri parte rimam obducitur satis longam & profundam E. E. que se infra præputii partem pubi substram ad dimidii pollicis transversu longitudinem extendebat: diducta rima alæ pendendorum muliebrium conspiciebantur, quin & bini mæstrus F. G. huius prior & superior styli medioris magnitudinem admebat: perpetuo urinx stillicidio laquens, inferior & longe minor satis difficulte & cum dolore non ita easissime pervestigari potuit: ista rima, quæ mentula huic non in apici medio, sed potius in supetna parte sita conspiciebatur, diducto alius præputio, pollicis eatimo articulo longior erat; tenellis lanuginis vestigia in pube pubertatis imminere inditæ dabant. Penis de hinc male conformatæ ex brevitate nimia membri (quia præter glandis solius corpusculum tentillum nil de colli extensis parte residuum cernebatur, quamvis alias pro membrorum proportioni conformatum deprehendamus, & parvifatura quandoque magno eoque pedula membro conspiciantur) jostelium, quibus alre in mente harebat, hi corporis proceritatem, macilentiam, vocem & vires vitiles, promissiores comas, mammas ad latera minutas, & pudenda, non tamen ut in viris promissa adeo, cum appensis testiculis seroto obducta intuebantur, rimam elongatam cum binis ductibus alius rem ad rationis trutinam examinant Tribada cum Celio Aureliano, & de nequitiis atrectantea subiganties comici referendam genabant. Hos curiosos Genitalium observatio in

questionem intricatam satis adeo deduxit, ut de futuræ aut imprægnationis aut prolificationis munere sciscitarentur: alios movit Galeni auctoritas Comm. in 7. Aphor. 44. *zui aipudiz* *zupras*, mulierem non fieri æquimanum, cum eidem nil virile inlit, ex Divi Sculi auctoritate: alii pro ratione robotis genitalium dimittentis, vitili potius habitu incedendum duarunt: inter utrorumque divergentia alii media incedentes via utrumque veneris exercitium Marthæ nolite attribuerunt, quoniam juxta Suidam *z ni aipuz* *z muna* *z mæzina*, adeo ut merito querendum,

*Nam Dea fæmineum jam neglign Hermaphroditum;
Amplexu teneri sollicita viri.*

Favet horum semenij historia Keckermanni de milite Ungarico, qui in antique castris & Marti & Veneri litando assidue strennum se gerebat, tandem effeminatus præputii vices subivit. Ut taceam binos Monachos, de quorum altero *Gurigenus* illud. *Mat, Atuler, Menachus, Atandi Atavile Menstrum*. Sic Andriam Scotticam herilem filiam in uno lecto accumbentem Rupesse Anno 1461. Boerius auctor est. Et hæc de Andria nostra diasse sufficiant, Jo. Sculperi.

*Annotatio ad observationem præcedentem
De Andria.*

Quam ex cl. Dom. D. Joh. Sculteri relatione exhibuimus Andriam, illius descriptionem fuisse tradiderunt alii Duumviri Noribergenses, quorum narrationem nunc subiungo, ita ex. Dn. D. Joh. Georg. Volkamerus.

Puto eandem Scrotum intera crura sub inguine convenientis formæ propendebat; eandem canalis qui nullus surum adhebat cuti, sub cute glans prominere nullo tecta præputio, anottum conimilis cum aliis figuræ, ventrem vena versus ubi adhaerit, diducti poruit: extremum digiti apicem longitudine sua vix æquabat, connata deinceps pone præputium glandem vulgarem & quæret referebat.

Altera relatio communicata à Dn. D. Georg. Abrahamo Metclino Juniore Medico Noribergensi explicat magis magisque Andriæ statum, sic autem ille.

Quam multifariam ac mirabiliter in minimis, in maximis sæpe ludat natura rebus, præter Medicorum annales quotidiana experientia passim abunde docet: ludit quoque haud raro in nobilissimis etiam nobilissimi ipsius humani corporis partibus, sed & vix unquam frequentius quam in generationali dictatis organia, adeo ut ejus arearum & ocululorum vitium rarum non semper subtilius querenda, sed effectus solummodo cum admiratione spectandus, fatendumque sit cum incomparabili Tibna Bartholino, De insalutis partus humani vitis, cap. ult. multa in corporibus humanis quotidie fieri, quorum vim naturamque perspicere non possumus: Hujusmodi Naturæ lusum, dicam an errorem, notare licuit anni hujus 1671. mense Junii in genitalibus cujusdam vulgo, sed ut opinor, minus recte putat Hermaphroditum, quem puerum, si ita loqui liceat, suemellatum aliqui vocaverunt, aili. cinctis annotatum, in pago præpe Bavarorum Monachium finit, infimæ fortis patre Joh. Lechna, mercenario: Sacrum lavacrum nomen ei primum dedit Caspari, ut quod

quod mutarent, qui de fœmineo teau aliquid cum participare primitus obſervarent, hincque nominantur Mariæ, quo & Mariam & Martinum ſubintelligere voluerunt, quo etiamnam audit nomine muliebri incedat habitus, licet ad mafculinum quam fœmininum longe manifeſtius inclinēt ſeum; an ut ex veſica continuo ſecurientis urinae moleſtiam facilis eo ferret, aut promptius declinaret? an ut in curioſorum animis majus ēe videndi excitaret deſiderium? an quod parum curans qua Indurus ſit veſte, quæcunque ſuppetit poſthabito delectu aſſumat? Noſbergum venit, non ob aliam quam oſtiorum ſtuprem querendi cauſam, interceſſionalibus literis ab illo illius pagi præfecto inſtructus, qui pietate erga pauperum motus teſtimonium ſuūque infirmitatis ac indigentis impetivie; Maſ eſt, maris enim generationi externa dicata exhibet organa omnia, Teſtes ſeroto inclui ad naturalem alia eorum conditionem rite ſe habent, niſi quod minus quam par eſt propendeant, ac paulo laiores compreſſioresque ſunt, & pubis oſſi arctius adhaerent. Penis præputio quidem, ſed tetroducto, & glande, ſed denudata, inſtructus in hoc inſuper diſcrepet, quod longitudo vix digiti manus articulum ſuperet, ſupra cuius regionem pubes quoque ſpatium pullulare jam incipit, Mammarum quoque tantum abeſt ut fororiarum, ut poſtus admodum graciles & puerorum mammillis ſimilitudinē conſpiciantur, Fœmintientem autem nil proſtus habet, niſi quod Penis foramen, per quod ēe veſicae urina conſucta Naturæ lege prohibet, perampulum ſit, ſublongum, vulvæ ad inſtar, labijs, quæ diſceſſu poſſunt, & internis quibusdam carunculis conſpicue foratam, ſatis caſum admittens ſtylum, e quo utina ſubinde ſtillat, ideo ut ne momentum quidem conſiciat eam queat: Proſtruit hinc ſubuculum, & aditum cuius ita ſtrigat, ut ſua acredine eam adurāt, inſipientis naves graviter offendentem: Quam utinam inconſuetam ac ſola foraminis ampliſſitudine, hincque rite ac ſtude ſe conſtringentis inſeptitudine deduceremus.

De Hermaphroditi ſingulari.

Hiſtoriam (reſectam) de hermaphroditi, qualem nec Bauhinius, nec alij, qui huiusmodi meminerrunt, admitabiliorem ſcripſerunt, quamque egomet vidi Hæge-Comitem, & examinavi: Eſt paupercula, quæ pro nummis lucriandi ſeſe Medicis & Nobilibus quibuscunque denudat, quare nuper in Hollandia fui, jam, uti audio, ad Gallias ivit. Hiſtoria ipſa Regiæ Societati communicata eſt, ex qua ſequentia tranſſero. Nomen illi eſt Hannali Wilde, nata incenſe Februario A. D. 1647. in pago Agri Hampſtonienſis Ringrood dicto. Sexto ætatis anno inter ſaltandum cum pueris coarctans, exuberantia duæ, pro lucriis bubonocelis habitæ, primum emicuerunt: quibus in ordinem redigendis, Chirurgi diu operam luſerunt: Teſticulari enim erant, qui jam prægrandes facti, ſerotis duobus cutaneis, parum contugatis, ſed vix promiſſis, pilisquæ obſitis viſuntur, ex quibus diviſis & elongatis conſinguntur vulvæ labia: Adde ſinus muliebriſ, in quo nymphæ, & caruncula una vel altera myrtiliformis loto: Eſt & membranula, à petionzo ſuturam tendens, mediam rimæ partem tegens, unde non video, quomodo peni virili introitus eſſe queat. Clitoris non habetur, ſed loco ejus penis imperforatus, niſi forſitan is Clitoris dici debeat: Uique ad decimum ætatis ætatis annum pro fœmella habita eſt, cum forte pauci ſubigendo ſtreptuam navaret operam, deſerpente præputio h'c, ad

id temporis latens, magno cum impera ſotis erupit, accedente non levi corporis metamorphoſi. Penis hic aliquando erigitur, cum quatuor pollices p'ne æquat; præputio de frangulo, ut in viris ſit, inſtruitur, ſed nibi perforatio fieri debet, adde tennis membranula foramen obducens, ut nihil inde excreti queat. Uteri vagina, quantum videre conſigit, in ætatis à communi leqioris ſexus lege non recedit, in quam non pauci digitos intrulerrunt; quare hymenem, ſi adfuſſet unquam, corruerunt; ſed nec hoc effecere poterant, ſine flexura auriculorum propter membranam mediam rimam obvelantem; ob quam etiam non ſatis explorari poteat ſive oculis, ſive digitis, quomodo ſe habet uterus ipſe, aut cervix ejus: hæc tamen adeſſe valde verſimilē. Cum auroram eſſet ſcedim, menſtrua periodico & modo debito fluere corruerunt, & jam nunc fluunt, ut ipſa reſert. Barba ſatis denſa erupit, ſimō totum corpus eſt pilolum: Vox corporisquæ habitus viros amulatur. Mammarum nullæ caurgunt, papillæ præquam exigue, pectus valdē lacum. Dicit ſe ad utrumque ſexum comparatam eſſe, cum fœminas concupiſcit, penis erigitur, cum viros, ſacculus manet, Oculos aliquando conſciens in virum formæ venuſtioris, illum deſpectat ſocō, ut inſequenti die præ amoris viſtro, in paſſionem hyſtericam incidit, quæ comprobantur elevatio abdominis, crepitus, titus, ſtetus, uti & juvenia: convaluit enim ex emplastro de Galbano regioni umbilicali applicato, & alijs remedijs hyſtericis exhibitis. Tandem utrum vir vel fœmina ſit, nescio: Teſticulari adeſſe mobiles, ſatis largos, exuberantes, ſerotis contentos, uti ſupra his oculis vidi: præputi, qui erigi & ſtaccetate capax eſt, adhuc clarius videtur: quare vix dicatur. Adjunct rimæ, uteri vagina, nymphæ, foramen intra pudendum pro urinae exitu, quate ad alterum ſexum relegetur, vel ad utrumque vel neutrum.

De Hermaphroditi.

Ludete in humanis rebus Divinam potentiam; ac inter creaturas non raro monſtroſas, & contra ſolitas naturæ vias accedite, ſingulas, qui æqua rationis lance Phyſica ventitant, non eſt incognitum. Similibus extraordinariis contingentibus non immerito adnumerantur homines illi, hermaphroditorum nomine quos inſignimus, dum ſcilicet & virile & muliebri genitalia, bonam tamen partem ut plurimum impetecit, à natura ladente vel errante talibus inſimul impetiantur.

Cum horum hiſtoriarum in obſervationibus Medicorum non ſint adeo paſſim obvix, junioribus autem Medicis, aliſque intereſſet noſcere circumſtantias hujus erroris naturalis, ob divorium ſæpe ideo queſitum, & alia diverſa, lubet heic aliquam proponere; præputiis cum nonnulla ab alijs ſimilibus diverſa conti near, atque rariora: Civis quidam in vicino aliquo oppido honeſte vivens ſimili, id eſt honeſte propoſito matrimonium inſeſſurus, eligit ſibi virginem, parentum honeſtorem filiam, ſancq' idem non ſuboneſcit. Dum conſugij debitum ſponſæ ſux perſolvere aggreditur, dapes hæc veteres nequiquam experitur ita dulces, veluti quidem eadem ſibi promiſerat; (prima aurem vice, dum vixerat, coitum tunc exercebat.) Rem enim ſuam in novellæ uavis rem immiſſurus; (ignoſcant mihi caſti oculi, ſcribo; autem; Egomet caſus Medicus hæc caſiſ ſcribit; ſi quis Genius protervus ſcandalum inde accipiat, ſibi ipſi habeat,) invenit portam hanc nimis angu-

flam, & vix duos digitos transversos amplam; Et quod majus adhuc fortunæ adversæ obegit trigicum symptoma, membra conari violentioris intuitu sentie aliquid interius contra audentius se audens, atque ira huic introitum summe dubium reddens.

Mifellus iste cæci Coplidinis miles duellum hocce amariorum, præter opinionem ingratum, satis egre fectus, ex amicis calculum scilicet aphrodisiorum castrorum exercitia, consensuque circumstantibus, atque ita desiderata castelli hujus mirabilia atque miserabilia expugnatione desperat, propterea rem gestam Magistratui Ecclesiæ denuntiata, divortium petit, & quod petit, obinet.

Ocularis enim inspectio, Magistratus iussu à perito Chirurgo instituta, docuit, hominis hujus pudendum muliebri duos saltem digitos transversos esse amplum, atque intra hoc superiore in parte membrum apparere virile, primo intuitu duas aut tres digiti articulationes longum, inter leves autem contactus in æqualem magnitudinem adhuc excrecere, durius insimul rediit: Confectione aduatore idem edocente, sub carne adhuc latitare ejus portionem longam: Penem istum glande esse præditum non perforata, ac sine præputio; Labiisque pudendi muliebri diductis foras non apparere nymphas; Collo item uteri anteriore existente quasi cartilagineose duro.

Cæterum sanguineus illa erat complexionis, ac satis vegetæ, corpus obinebat forte, vocem virilem, mammae carens, barbe rudimentis de visum & tactum eludentibus, & quamvis tunc ætatis suæ annum absoluerat, menstruum tamen fluxum nunquam fuit experta. Modo dictis tamen non obstantibus, illa ipsa sese credebat feminam, pluribus jam annis malulorum inhians amoris ac contubernio; imò de congressu maris matrimoniali desiderans & sentiens, modo monstruosa conformatio, & confusa partium genitalium structura hæc ipsi non invidisset. *D. Gabriel, Claudi.*

Hermaphroditus.

In hermaphroditis Clitoris est quæ increscit virgam virilem effingit, ut ex eo patet quod nulla manifeste conspicua perforatio in ea oblectetur, quamvis testes ei foris interius à lateribus adhaere. Talem memini me prope Andegavum vidisse, ætatis 28. annorum, qui circum os, iussu viri, totus barbatus erat, & tamen muliebri vestitu utebatur, suæque genitalia pro viri pretio conspicienda exhibebat: Huic superiore pudendi parte clitoris excreverat ad mediæ digiti longitudinem & mentule crassiciem, cum glande, frenulo, & præputio, ut in viris esse solet, excepto quod fissura glandis non esset manifeste pervia: Inferius meatus uterinus & vagina uteri adhaerebat, ut in mulieribus; In singulis pudendi labiis unus testis consinebatur. *Classif. In Brandi de Diemerbroeck.*

HERNIA.

Non est quod humores tantum in causa esse imperiti credant, ubi tamidam curam conspiciant; cum circa umbilicum atque inguina hæc haud raro contingat, idque quod vel omentum, vel intestina, vel utrumque simul illic decidant: **Dicitur autem** Lactis morbus hic Rhexis, Ruptura,

Hernia à Græco *ἥρνα* quod satum innuit, vel à Sabinorum voce *Hernia* quæ idem quod satum est. Cæcis ad, *ἥρνα* & *ἥρνα* noceo: Quorum differentias demonstraturi, ab ea quidem initium sumimus, quæ & incompleta, inguinalis, *ἥρνα* dicitur, cum intestinum, vel omentum, rupto vel dilatato tantum Peritonæo, in alterius inguine subsistat.

Initio ne quid secro à nobis pede præteratur, Partium inferi ventris structuram & usum, Peritonæum, vasa semen præparantia, Testes cum tunica & scroto, quæ omnia hernias considerantibus explicanda præcipue veniunt, paucis repetemus ex Anatomicis. Peritonæum membrana vilceribus circumtensa, firmo eadem nexu continet, operit. Præterea subinde conspicitur, ut vasa transmittat, circa urem imprimis ligamenta rotunda, vermiformia. In Viris Proctus, Spermaticis vasis exitum præbentia. In utrisque Vessallo teste. Venam cavam, veniticulum cum nervis, aortam cum aliquo sexu conjugationis nervis, vasa ad umbilicum, podicem, & in feminis ad uterum excurrentia, quæque ad musculosa majores tendunt. Cohæret vero multa in locis musculis, Vertebriis, septo transverso. Spermaticis vasis præparantes adnascuntur venæ, arteriæ, (quam aliquando defectum vel absentiam observant Scizius, Bartholinus, Keteckingius, & nuper admodum Alaudus Hermannus Cummenus, Lunzburgerium Ducis Medicus, Carolus item Raygerus, Phisicus Polonensis, & Joan. Rhodius, cui Epididymides quoque desiderare vix in Mantissa Anatomica) ex aorta à dextris, ex emulgentibus ab altera parte, originem petentes: quamvis ab utroque nonnunquam latere arteriæ spermaticæ ab arteriæ magnæ trunco exortas, Antonius Molinæus, Venetus, Medicinæ Theoricæ & Anatomæ in Lyceæo Patavino Professor Primarius Insignis atque Celeberrimus observaverit; quæ corpora efformantes pyramidalia, vel pampiniformia dicta glandulose inscuntur Epididymidom substantiæ, ut icosos coætera testimonum un Epididymides testium crediderit tunicas Cæteris. Jam testes adfunt Epididymidibus conjuncti ac semini consensendo destituti, sero nequaquam attrahendo, quæ eorum est temeritas, qui incertam publicè sententiam in Theatris profecti si, inter partium generationis intersementum demonstrationes ausi sunt, vel argumento inconsiderate stibant: Si testes non junguntur Epididymidibus, semen neque per testes transmitteretur ad Parastatas varicinosas. Hoc vero imprudentiam sapit, foris ignotantiam. At si nostra illis tanti non videatur animadversio, Auctores habeant dissectionis pericula toto orbe Clarissimos. Velsingius.

--- Cuius solet eloquio florere Lyceum, Incumbunt inquit Epididymides subiectis sibi testibus, quorum propriæ membranæ quædam plurimæ fideles meatibusque conjunguntur. Deprehenditur hic nexus circa utrumque testium exterium. Spigelius, Serum, ait, repositus in testibus, sed alii usui dicatur, quia, juxta Galenum, scrota arteriarum substantia genitalis est, & ex sero à sanguine separato semen conficitur. Quid elegantius dici, quid clarius poterit; quid & hoc Glissonii paragrapho? Tunica testium nervosum ipsos adeuntum dilatare quædam est & expansio, à qua nervuli undique emittuntur versus testiculæ medium, ubi concurrentes vas nervosum oblongum constituunt; quod in epididymidis canalem manifestè exoneratur. Fernellius quoque habemus *scrotales*. In Animante, dicit, quæ à venere diutina abducesat, dissoluta, copiosissimum crassissimumque semen competitur, quo & vasa

vata, & testes, & epididymis rurgent. Pergunt autem, si ex testibus semen generatur secundum, testes nil conferunt. Epididymides eo interdum fungi monere non refragor, immo semen in illis equivocari *apud* non est, ut illud, meo quidem arbitrio: Eonachi semen emittunt, tanquam ab utero, animalia exsiccata lene, comode digne, & cures voraciores redduntur. Pollicissimis Italo, Anglo adfipulantebus: Testes igitur, si cultro remouendi: Desperato omnino consilium. At si ex filamento constat, Aloysii Trilini, Nobilia Vicentini, ingeniosum suo tempore phantasiæ, ratio valet: Cui sanguinis in vas quibulum albescit, similis: que sit vasorum tunica albis, in omnibus vero non item? an in quibus tantum diutius moratur, in illis albescit, vasisque similis sit: pars enim omnis alimentum sibi simile facit, ut in vasis feminis, que ob multiplices fluxus sanguinem diu continent, in nullo autem alio vase accidit, quod in nullo alio sit diu moratur; quamquam & vasis cuiusque humidum natum, à quo ipsorum tunica nutritur, est ejusmodi: Verum quomodo animalia quædam absque testibus generant, Scetvini quoque habet. Testes membranosæ circumdantur cute, Scroti nomine insignita. Hujus non simplex structura est, nam præter *scrotum*, albuginem etiam propriam, *duplex* est, & *duplex* live *ipsa*, quam unam eandemque contra Thomam Bartholinum, accuratissimum Anatomicum, & alios, vocamus.

Accidit igitur, ut vel ex *scrotum*, Celsi sententia, retere quoque diuini spiritus, vel ob læsam in genere facultatem, vel etiam externam, secundum Galenum, (neque prohibuitur sperma inter hernie causas cum Avicenna admittimus. Doctissimo notante Salto) illa abdominis membrana dilata, rupta interiori (dopex coim exiit), omentum, extenoi extensa membrana, in sacculus & stitica propaga-ta, foras contenta pinguedine, constat, illustri Marcelli Malpighii, Professoris Bononiensis Primiti, observatione, vel inestina, cæcum imprimis aut ileon (præter rationem esse, ut velamen live peritonæum descendat, Salto contra Avicennam disputat) circa inguina subsistit, & tumorem, *primæ* dictum, primam Hernie speciem ab A-quapendente constitutam, efformant. Hic cum sepe impingatur impetiri, signa proponenda erunt, quibus accurate ab aliis diceretur. Bubonocæle quidem ex eo cognoscitur, quod Tumor equalis sit, nonnullus, compressus etiam facile cedat, vel penitus evanescat ubi Bubo, tensio adfuit, remittentia, aliquando rubor, calor, nonnuquam febris: ut plagiarius merito censeretur debet barbitonici, cum in tenuiori fortune homine Bubonocæle, veterem bubonem credens, sectionem, abruente agro, egredietur: qua perpetrata, promittentibus fecibus in lipothymiam incidit puerulus, sed brevi tamen tempore spatio à Petro Marchentia testatur, or habet in Observationum Chirurgicalium Sylloge. Hieronymus Senex Juvenis recenset Historiam, quicam circumforante testium soam exposisset elevationem, difficulti illum labore hernia, & brevi, si opem respuerit, satis celorum prædixit. Credulus homuncio, quo præsentissimum evadere mortis periculum scilicet, sectionem, barbitonici fuso ad-misit. In eo jam erat carnis, ut testem extra-heret, ubi Patet ætenuis cruentas retinuit manus ægyptæ accessit Medico, qui nulla potum delinere hernia asserbat. Joannes Prætorius Professor Medicus Patavinus celebris, rutilum vidit, intestino tenui dissecto à Cautione, qui se bubonocæle en-

zaratum proferebant, ex inguine toto vitæ decursa alvi feces excipientem. Affertus protius similis aliam descriptionem Hildanus notavit, qualis etiam decumbentis rutili fuit in valerudario D. Francisci Patavino, cui intestinum in inguen prolapsum nati cum scroto computretur, ex Elegantiis Rhodii Observationibus. Testiculus quoque in inguine larena hernia fingit speciem, narrante ex Jacobo Aethio, Joan. Schenckio, & in Spicillegio Theodoro Ketchingio. Brechtfeldus testiculum circa annum ætatis octavum & decimum primum erupisse, io Hafnienfium Actis Medicis recensuit. Alia igitur via tentanda Cæsar, & prolapsum quidem fo-tinum digitis, quod si raturat stercore accepto, vel ære, balneo, foris, lenicibus, vel imposito, ubi indurata feces, cataplasmae quod recipit, radie, v. g. alth. & lilior. alb. an. *z*ij. folior. metacul. malv. viol. an. m. *ss*. sem. lin. *torregio*. an. *z*ij. flor. chamom. melilot. parietar. an. m. *ss*. coct. coctat. ac per fetaceum tæcitis add. farin. sem. lin. *z*ij. ol. lilior. q. *ss*. vel corporis etiam concussione aut suba-gitatione, capite deorsum reflexo, id unice agen-dum, ut sita testiculatur in abdomine contenta vi-cera. Quippe Michelotium quendam, quod imperiti barbitonici cure, qui inguen, intestino ad partes superiores nondum testituro, devinuerat, se commiserit, & visa didicentem idem introducit ex Benivocio Scheuchius.

Hic pro virili peractis, novus intestinorum def-census facile prohibetur, si & diæta, v. tandis scilicet quæ flarus, borborygmos, ac humiditates ni-mias procreant, & exacta quietis & *diæta* hab-beatur ratio. Putgantibus imprimis blandioribus opus est, clystima, medicamentis adit agentibus, aggloriantibus, exsiccantibus, quæ hinc iode ab Auctoribus recensentur proliquis. Fænelius inguen decombeant supior fovet decoctione, quæ constat Pisdix, Balsamio, Nucum Cupressi, Gallatum an. *z*ij. Alum. ni. *z*ij. cum aq. fabarum. Ambrosius Paræus, Primarius Francorum R. *g*. Chirurgus, to-tum habet ex corticibus *amaror*. cupressi. nucib. gall. alum. caud. equin. *sanctio*, beioetibus, aq. t. bor. incocis, immo, amidi fide, magnetem in pollinem reditum commenda, & limacum ra-brorum pulvrem. Crato, Tulum Augustissimum Imperatorum Medicus, in bubonocæle detersis pilis, tumorem terebinthina inungit, tum pulvrem in-spergit, qui habet Sang. drac. mast. thur. myrrh. an. *z*ij. iumach. balaust. an. *z*ij. aloës. torment. mum. coloph. bol. arm. ao. *z*ij. xylol. *spic*. an. *z*ij. Hieronymus propolitis Avicennæ, Pauli, Celsi etiam medicamentis, & emplastro, quod ingreditur mal-loricis, boli armenæ. lang. drac. ao. *z*ij. tegul. pulve-rat. *z*ij. pulv. blinguz *z*ij. cum ovi albumen, modico aceto & colophon. Agrotantem quadraginta dies in lecto continet, tui, venete, balneo prohiberi, ac bis de die sequenti electuarii dimidiam un-ciam præscribit. Accipe thabarb. affi. consol. maj. nuc. moich. noc. cupressi. cymini. vagacorch. gum. arab. mastich. bol. arm. lang. drac. mum. pic. grecæ ao. p. *z*q. in alcohol. contundantur, & cum melle desposito f. electuatum. Nonnulli pulvrem leporis combusti addunt. Propinetur vinum austerum, vel aqua chalybeata, aut fluvialis cui folia cupressi, myrtique incoctent. Schroderus, in Pharmacopœia, ad quamvis herniam excepta hydrocele, emplastrum posuit, cuius sunt, gluten ex anguillarum exuvitis paratum, lapis hematitis, saccharum Saturni stano-ult. gum. ammoniac. in aceto ad. solnt. & cum myrrh. ol. *z*ij. mist. repertur in gedanensi dispendio

Juste Magnus ille Avenzoar scriptis, nullum fuisse unquam virum castratum qui esset opem intellectus & bonorum morum, unde Vos considerare, quæ ratione homines tardos & stupidos appellatis testiculos. Ne Ennechor, Castratos, Spadones iustos sibi habeat Arabi, ob confictam fabulam, vel Sacra Philosophorum Decreta, propter translatam in testiculos animam. Incomparabilis Cætesio, quod in pipæali glandula namque quæviserit, virio veniat, quæ tamen vicissimul longè, quam verus illa de Testibus sententia. Historiam taceo, quibus ea, quæ diximus comprobant, Homines altero scilicet orbato teste, virorum strenue obitile officia, si locum requirunt, nullo negotio possent. Sed & alium eadem dealbare fidelia pariter oportet. Novæ de *Empysemæ* Dissertatorum Auctor ad Indos, qui castrant, *Empysemæ* temere relegat, nullis instructis argumentis, aut aliena, vel sua fassus fide. Minor Homines adaciani, qui *Empysemæ* vulgarem sectionem, iteratis vicibus revocant, videt Paulius, quod miser Petiomarum usum neglexisset. Sapienter tandem cum Phrygiis natuclis, & exemplis discant, communem operationis methodum in junioribus, si unquam, locum obtinere, quod vicinæ partes facillius coalescant; at in provecioris ætatis Viris, quibus mederi chirurgus aut barbitonsor studet, testiculam erimat. Neque Patæi quidquam obiecto intet at barbitoniorum desumpta incidia: Castratores dum timent ne Curatione absoluta iussus sit relaxatio, violento tractu Petiomæi processum at paribus divellunt, unde dolor, Convulsio. At Chirurgorum impetria operatio nil detrahât. Quod si neque stillicidium, inquit Cræzo, ex aquis Monti. Orehonis, in quibus res adtingentes bulliscunt, conculcatis, conculimus, ut ad extirpandum testiculum deveniant, adeo enim destitit nobis Ministris hoc munus obire, ut omnes incolumæ evadant. Fredericus Hoffmannus Emplastum magnetici consuecit, quod lumbis impolitum intestina fixum trahit & illica licet passim addit (verba sic habent,) totum iuxta sapiendo Ventris atrocissima, introita, dislocata (ossa rectius dislocata pronunciamus) & incarcerata in scroto intestina quam primum incalacere, ad pristinam abdominis transverti sedem, ipsi etiam ægrotia non quidem sine molestia vim quæ attractivam animadvertentibus: si habenda Auctori fides, qui in Clavi Pharmaceutica pagina nobis victoriarum plenissimas obervit dætarior, ut depictæ graphice in frontispicio Tabulæ cõrespondet voluminum scilicet. Charrasius, Clatissimus in Galliâ Serenissimæ Regiæ Pharmacopœiæ, Inscitæ & Gallicæ levitatis memoriæ Excellentissimo, si Dñi placet, Germano reficavit. Processus facta nobis est copia, cujus tamen inventorem non ita multum à veterum recessu formulis raptemur. Agricola, Hartermannus, ejusdem naturæ malagma ad malignos humores alliciendo, præmisso vesicante, commendant.

Creduia mutorum superstitio latus serpit, ut posthabitis Prudentum Consiliis aniles fabulas, Magos, Præstigiatores, imprudentissimum vulgi genus, consulant. Doleo vicem plebeculæ: quis enim sana mente prædixit ratione orata credat mulierculis ita me berce est. Magos utrimum non veneficos, non fascinatores, sed insanos, vel supersticiosos credimus. Demonstratione quid facilius? Patet familiis rudis, nullis instructus Scientiis, credulus, vinoque sepultus, infomes se transisse noctes inter spectra, larvas, immodi homina, maria transiecisse, & quot necio, confocissæ miliaria momento

cirius, hostiæ pagæ, Urbibus, Regionibus, Regibus, infelici fideiæ naris domesticæ: ac pro veris obtrudit historiâ. Misera gens, verum infelicis lenis perterita, ne dubitare quidem audeat: cum sublequeat mox nocte in eadem se venturi navi existimet. Hac pro sui ratione incantatorem crevit vinctus vel insipientium & sola aliquando carminis violentia homines intererit apud Poetas. Quod si cum melancholicis impollicum aut maniacis ad Antiquas ablegaret fascinantia, ubi esset navi existimet. Nemo tamen me adeo secutum credat vel impium, ac si nihil posse præter vel supra naturam fieri, assererem: cum potius Deum O. M. posse, quæ & advera humano apparent capui, ea S. Codice & D. Augustino didicerim. pletoque tamen ex Venechiæ pro clavis habeo. Nec mea hæc est & nova sententia, sed Scripturæ S. & Philosophorum fassula testimonio. Quidni Regnum Satanae destruitur? Mundi Principes in abyssum dejectus, & postquam Christus apparuit, nullam in nos habet auctoritatem Cæli ægelus? Coram Deo non inferis expavescimus. Bernierius, Doctor Medicus Monpelienis, in contrariâ Gassendi Celeberrimi Philosophiæ idem sentit. Joannes Schefferus, Vir Eruditus, ac Regius Upsaliæ Professor, speciose fortè Religioni præterito, contrarium adstruit: Non pincit, ait, qui, ut sapere conditus quam vulgo alii viderant, Magica omnia pro veris habent formis, & aniculatam oculularum nugis ac commentis. Cur negant tandem? an, quod Diabolus non possit solia emere, an quod nobis immo velle, ægelimus, dammodo possit. Ad Permissionem enim Divinam, in his talibus, statim am præmitte contugere, res est non simpliciter tantum pudentis, sed & insignis impetritas, cæte superstitionis. Quid igitur de Caratombus magica ope factis? Ad Hernias quæcumque perhorant ut *Empysemæ* puer aliquoties excavatam subcat arborem: Sunt qui dicunt vitiolum ovum Gallinaceum è nido adhuc calidum torbent, & testam herniosi urina repletam in camino suspendent. In Pluristis; dolore lætatis, cultum laniunis, qui amore madet, vino Imponent aut potui, ut propinequet. Sæpi collectionibus five Cathartis indultis medentur: Singularibus, inverso cultro: & quid attinet demumque tormia exponere? Theologum ferunt quærenti circumforantem, & stollida sua factiora præterant, annon adstantium plerique velent decipi, applausum dedisse. Idem nos facimus. Vulgus, quo est perverso animo, nullis subtile parat legibus, dissolutis moribus, quousque de sceleratissimo seducatur, obtemperant. At quo scroto? qui iudicio pollent, ed non abici si sinu recedat, ut magis ac ineptis signaturis vim quandam incell aut virtutem opinentur.

In *Empysemæ* si quid deciderit, (hinc *Empysemæ*) vaginali topica ex tum præbente cupis studio superbedimus recensere causas, quod & Practicorum peti quant voluminibus, & levissima lapenumero occasione evengiant. Naturæ illius calculo, cui, peritonæi processu ob factum naufragium aque ætis accepta incommoda in ingulie relaxata, intestina in scroto devoluta, perhibente Nicolao Talpio, Amplissimo Amstelodamensi Consule, fungorum esu ex Hildano) duplex oritur Rupturæ species, intestinalis quidem *Empysemæ*, & ubi omentum descendit, in multibus præcipue, *Empysemæ* dicta. Opertum si quidem ita Vetalia vidit in testis tunica æquum, ut quatuor aut quinque librarum pondus excederet, ventriculumpoe deorsum ita traheret, ut deficient munere, multique obotus singularibus, id pondus mortis

mortis causa fuerit. Intestinal prolapsi Signa Cel-
sus habent & Mercurialis: Tumores facti ab omen-
tis & intestinalibus contingunt, diversitatem quan-
dam & actionis & dimissionis nec non levitatis ha-
ber: videntur. Amplius, qui sit ex omento pro-
fus est sine dolore, & sine multa torriditate: Ite-
rum Tumores facti ab intestinalibus & omento, dum
agri balneo se lavant, vel fricantur, vel rebus
emollientibus tractantur, vel corpora motu vehemen-
tiori movent, incrementum indeque suscipiunt. Ac-
cedit postremo, quod qui sit Tumor ab omento
protus digito absconditur, & erudit facili sine rugi-
tu: Factus vero ab intestinalibus, tedit cum rugiu, cum
intestina vel plena sine statu vel fecibus. Hac quam
gravia sequatur symptomata, Hilidanus duobus de-
monstrat exemplis, & Meckerinus, quod Tumor ad
genus usque prolapsus fuerit. Verum ut contineri
aliquo modo possint, lacculum idem prescribit Hil-
idanus ex ros. rubr. absynth. fol. prunor. sylvestr.
caud. equin. fol. sal. musc. querc. Cort. querc. sem-
fornic. anis. vino rubro laccatus. Quoad Curaticem,
eandem utriusque quoque inguinalis ratio est, & si
quorundam morbi initio instituitur, felicem nobis spon-
dere eventum licet: cum hac Imperialis ratione Pa-
risiis quoddam in valetudinario à certissimo mortis
periculo liberatos viderim. Severum Hernia laboran-
tem, cui intestina ad scrotum delapsa scississima ex-
citaverant symptomata emollientibus & relaxantibus
intra paucas horas transiitum, ex Holzachio Chen-
eckius habet in Observationibus. Enterocelen in qua-
dragenario absque sectione subligaculi foli-
o pe-
vanillæ, Parzum, Meckerianum fidelissimos habemus
testes. Quid de Hollerii herba proferamus aut po-
lygono ramosi, novem diebus oportuit consolidan-
te, si Hollerio credimus, Fallopio, Marthiolo,
Piconi? quid de aqua ejusdem stillaritia, cujus
haustu puer sanatus, & emplastro, quod acci-
pit: Emplastro, contra rupturam, & de garla
Dii an. 3j. Sanguin. dracon. olivund. regal. oilib. an.
3ij cum oil. myrrill. f. massa apud Valerium: Si
harolari fas est, ac d. vinalis locus, temerarios
aut plebeculam gentem Medicis sapè imponere, sus-
picor. Quis enim rei peritus aquam cedat destilla-
tam simplicem, vel succum herbe expressum, cum
vino albo propinatum, uso eodemque impetu ver-
sus Peristomæum fecti, ut ramici medeatur, ubi Cero-
ti Virtus exultat? Morbus iste nullis medecis
in adultioribus credit Medicamentis, nullis Medicorum
sistemulis, omnia seipsum, præter manuum operam.
Ubi facta est per fracturam Hernia, Mercurialis di-
cit, in parvis quidem, ob corporis tenebrositatem,
esse per medicamenta curari: sed, ubi est in cor-
poribus adultioribus, nequaquam nisi manuum opera.
Nam, ut habet Hippocrates, Peristomæum distillum in
dioribus corporibus non coarctat. Timzus puto
Enterocelen ex rupto in dextera parte, Peristomæo, la-
boranti sequens Electuarium & Emplastrum præscri-
bit, post decoctum Herniarie ex viuo tubello cum
symplo de symphyto dulcoratum. Rec. Rad. consol.
maj. 36. fol. herniar. perfoliat. fenicul. nullefol. an.
3ij. in pollinem redacta cum syr. de symphyto q. l. f.
Electuarium. Rec. Pic. Naval. 36. Aloes 3j. lytharg.
gyl. colophon. galban. ammon. an. 36. visc. quercu.
liquid. 3vj. Anidol. rot. myrrh. thor. mastich. bol.
armen. an. 36. Conf. major. 3vj. lumbrior. ter-
rest. gallar. an. 36. sacrocoll. 3vj. Terebint. &
Cera q. l. f. Erioplastrum. Joannes Uldaricus Rum-
lerus, Medicus Augustanus, in Observationibus, un-
guentum habet Medici ejusdem Viennensis quod in
magno ipsi secreto fuit, eoque infantes plurimos,

nullum autem adultorem, restitutos, affirmavit:
Acc. Conf. Mij. 3. Confol. Saracen. Agrimon.
Caryophyll. fenic. ped. Pcon. Mill. fol. prim. vet.
plant. an. m lbi. msh. th. thur. cupul. gland. noc. col.
ptess. gallar. an. 3v. rad. tomentill. lerpent. an. 36.
burya. majal. q. l. f. f. a. ungu. cui adm. vin. libuli-
mat. ut fiat flux. le, instat liniment. Hieronymus
Reusnerus, Medicus. Noerd. ingenis hanc Curam pro-
ponit. Acc. Beton. Ausic. muc. veron. alchimill. py-
rol. conf. Saracen. agrim. laic. an. m. 6. rad. caryo-
phyll. 36. incis. & confut. coq. io mij. aq. ad con-
somp. med. bibar manè & ciperi baculum. Postea
acc. Lap. magnet. mastich. an. 3ij. lap. calam. sang-
drac. an. 3j. fetri 36. boli arem. 36. vin. libullum. quan-
ten. in hoc pannus duplicatus intingendus hernia loci-
ter adligabatur bis quotidie, mane & vesperi cum su-
bligaculo, ac brevi convalescit. Monachum Deggingen-
seum in utroque latere ex casu hernia intestinali
laborantem, præter alia Symplo quoque vulnerato
scilicet sanatum in istem habet observationibus.
Ad Sympum autem conficiendum acc. rad. Car-
ry-phyll. 3j. D'atam alb. conf. maj. an. 36. H.
Leonopoli in Santic. pyrol. aucur. Mar. Solidag. Sa-
tar. conf. ol. med. vine. pervine perfoliat. nymular.
agrim. an. m. 6. thapont. opt. scot. commun. 36.
3ij. ros. rubr. p. iv. fant. rubr. 36. 6 calam.
arom. 3j. mac. mosch. an. 36. i. q. font. lb. iij. stent.
24. hor. in loco calido vase bene obturato, & pri-
mum lentu igne, post vehementiore fervent ad
conf. med. ubi restiterint, col. & cum sacch. alb. f.
3 viz. coq. ac. co. fult. Symp. Scuteros hoc sub ha-
bet inter assumenda expertissimum: Accipe conse-
serv. symph. 3ij. ros. antiq. 3ij. cort. citr. cond.
arant. cond. an. 36. pulv. herb. perfol. herniar.
ling. serpent. rad. consol. maj. an. 36. iemlo. plantag.
3iv. cichor. fenicul. an. 36. corall. rubr. prap. 36.
marg. prep. 36. lap. chrysol. prep. 3j. Symp. myrrin. vel
corall. q. l. f. M. f. Electuarium, quatuor ante prandium
& tribus ante cenam horis nunciis inglandis quantitate
deglutendum, cui vini rubri austeri, suspensio nodo-
lo, haustum superaddat. Acc. herb. fragar. consol.
med. vine. pervine. equiset. ling. serpent. perfol. an.
m. j. rad. ligill. thom. 36. consol. maj. 3j. lem. phar-
tag. 36. cichor. 3ij. fenic. 3ij. camin. 3j. incis. &
confut. mis. ad laccalum in trib. vin. rubr. vel alb.
meof. suspend. Marcellus Cumachus medulla Citri her-
niæ intestinalis Corationem molitur: Acc. Medullam
Citri subtiliter incisam, bulliat in axungia porci excen-
ti, post coletur per periam, & iterum ponatur ad
ignem, in fine miscetur mastix, olibanum, cera alba,
etique optimum unguentum Citrinum.

Vitum recordat Parisiis eruditum, operam S. Lio-
tis strenue navantem, qui, ut superfluitas quoddam
Anix Solemnitares intueretur, equum concidentem,
nullis credo instructis subligaculis, ac si corporis cal-
lentiari satis, & ne cura esset, eorum studio pos-
haberet. Post hoc, si recorder, in scrotum devoluta
erant intestina, devolutum in scrotum, cum rubore, in-
flammationis principio, ac gangrenæ metu, conspici-
tibus, quibus demandata erat Vri egregii cura. Ade-
rant ex præcipuis & fama inlytis, qui ictationem om-
nibus modis urg. bant, & contra insinistram atque ingu-
brem pollicebantur eventum, ac certo certius prædico-
bant: alii alia voce reclamantibus, feces intestino-
rum induratas cataplasmate vel sora posse emolli-
inflammationem facili negotio curant, neque extrema
subito exponendum esse corpusculum in mediis. His
relinquebant agrotantem prognostici, hæc ad-
stantium erat altercatio, immo, ut, quod res est,
eloquar,

Profectore Patavino: Quando Varices, inquit, immaturæ & præparæ, Medicorum imperitia, prohiberi fuere, vidi ego atra bile & infania vixatos, immo & intercostalis inflammatione, & renalis calore, sanguinis sputo attonito morbo, & intercutanea aqua eodem detractis. Quod si vel à violentia proveniant Corpora æreaticata, gelato pondere & stando nimium, sed eleganter & ad usum medicurialis: Marium Simus omnes, ex Plutarcho in ejus vita, laboriofum vitum existisse, ob quod, si quis dicat vel varices quibus afflicti bar, in ambobus contribus ortos; ob nimis in stando labores, cum minus erratum, existimant. Fortunarius verò Fidelis: Prodidit, air, memorie est, gigendi facultatem his tolli, qui à varicibus tenentur. Quod si, inquam, his de causis varices odantur, puillates implore manus convenit. Veterum mos erat referre Celso fibræntis acuta candentibus scroam adurere, tum farinam ex aq. frigida subactam fuperspergere, terebellie lenticulam cum melle imponebant; poli ejectis crustulis, ulcera melle purgabant, rosis implebant, & ad cicatricem ardis linamentis perducebant. Similiter, tumenibus medie tunice venia, inguen incidebant, venas digitis separabant, & filo utrinque injecto, sub vinculis præcedebant repposito testiculo. Ubi verò inter imam membranam & testiculum generatur varix, testem abicidere veterum ductu oportet. Nostra ætate, cum gigantum humeris insidentes pignat longius propiciant, Magno Anglie Cancellario, Barone Verulamio, explicante, vix reperies, qui id perferre supplicii, aut injungere ausus fuerit. Recentiores tamem cum æger duci, ab utraque varicis parte venam bamulo atq. digitis elevarum constringunt, ut scalpello incidatur, ac sanguis probe extimi possit. Acquiescens hoc loco, adstringentia componit ex tragacantha cum vino granatorum, oleo armenæ, mastiche, fanguis draconis, juxta varicis longitudinem conformata.

De *βουλονέει*, *δουλονέει*, *πυλονέει*, *ωφλονέει*, *πυρματονέει*, *ερατονέει*, rupturis in inguine, lictoto, inferioribus partibus conticipis, verba fecimus, & ad nauseam fortē. Superiōra versua hēmie contingant, Græci *ἐπιφασαί* & *ἐπιβουλονέει*, umbilici procidentia, & cervicis vitium.

Tumor qui umbilicum obfidet, umbilicus promi-
nens, prociidens, umbilici emineantia, hernia umbili-
calis, puerum plerumque morbis accenseri folet:
quamvis feminæ laborioſo quoque & difficili partu
umbilici herniam incurant. Mercularia rupturæ
vel cum inflammatione ſcit, vel ſine inflammatione
Pharyngitis hæc. Tumorem atq; magnitudinem
perhibet, cum dolore, & pulſu: ubi ſcilicet um-
bilicus in recessu naris male perſiſcitur. In her-
nia verò umbilicali, propriè dicta, omentum, in-
teſtina, aqua, ſæpius, caſo ſupertereſcit. Diagnosticæ,
prognosticæ, ex Celſo ac Iuſerpiis adducta reſpond-
enda. Quod si *Pharyngitis* Curationem exigit, injungantur re-
frigeraantia, bamediana, embrya, quæ loco coti-
reſpondeant. Ad petitioni verò conſolidationem,
antegre manu, ferroque utamur, ſubducta alvo,
Celſus tupeꝝ umbilicum imponit: Cicutæ & ſilipi-
nis, ſingularum P. I. Ceruſæ cloꝝæ P. IV. Plumbei
clori P. VIII. cum ovis duobus, quibus ſolani ſuccus
adjuſcit. Auctores, reſp. omento vel inteſtinali, id
quod memoria perpetuo tenendum, pilulis, electa-
ria conſiſcunt & ceratum umbilico. Habent tꝛones
formulas. Acc. limarut. ſert. ʒi. Nuc. cupreſſ. ʒiij.
muri. ſarg. dracon. thur. corall. rubr. an. ʒi. conſide-
cum melle. doſ. ʒiſ. mane & veſperi, ſuperbiben-
do medicum vini adſtringentis. Acc. radic. conſolidæ

ma. caud. equin. bnf. pastor. rub. canin. an mē.
coq. opt. vin. adstring. add. maflich. corall. rub.
bol. armen. noc. cnpell. an. 3i6. cinamom. 3i.
cum melle f. electarium cuius dol. dimid cochlear.
Ac. gummi. Arab. tragacanth. maflich. bol. armen.
fang. dracon. corall. pic. coll. de corio bovis an.
3ij. thur. 3ij. Pic. græc. 3i. Pic. nav. 3ij. liq. ad
ign. f. Magdaleon. vel. acc. bol. armen. fang. dra-
con. maflich. furocoll. an. 3i. bisling regul. pulv.
an. 3ij. resin. pla. 3i6. Ov. album. & ceræ q. f.
puerum exomphalo f. umbilici exitu laborantem.
facillimo remedio sanatum Hieronymus vide Reas-
neros. H. nempæ & rad. fasilic. in aq. cocta & ca-
lida applicata. Eodem cum inflammatione & eu-
miditate additâ hiliola, feg. pulvere inperfo con-
valuit acc. bol. armen. vet. 3i. myrrh. 3j. pompho-
ly. 3i6. f. pulvis. Aquapendens subligaculum ex
lintheis componit, in cuius medio globulus intes-
tinalis vel omentum protrudens reprimis, & betinis
umbilici fasciâ sublevari exempla afferunt Hildanus.
Umbilicemque olim Phisicus Joannes Sculterus quod
vis vel in tenellis corporibus Medicinam reipar. Vis
pura scissione curare incumbit. Hæc priusquam la-
stifuerit, repetenda quedam ex Celso erant, & in li-
quime quidem curationi neque infantem aptum, ne-
que decrepitem exponendum. Quod superest, de
3i6. mē. nihil adijcimus, cum nemini non, vel
patria Artis rudimentis instructo, quam notissima
esse debeat. Clarf. Ludovic. Van Hummen Diffre-
tatione de Hernia.

Curatones.

Etiamſi quævis illa non facile Curam ſuſcipit, in infantibus tamen facilius curatur; ipſi ſenſibus diſtinctius ſunt, aut nunguam. Quod ſi inſectum ſtibi- bus aut extremis repletum ſit, ſequitur dolor, ac quæ hunc, ſi non illico tollatur, inflammatio, gangrena; hinc paſſio illa, ac ipſa denique mori læcedit. Rarum eſt, quod reſert Fabricius Hildanus Cent. 1. Obſerv. 55. foemina ſeptendecim annos hæmia laboraſſe, & circa annum ætatis æritum & ſexageſimum maxime vexatam fuiſſe torminibus, inſectumque in abdominæ rupturam impulſum ac inibi retentum dolores non leves, ſimul & inflammacionem, aliæque graviora exacerſaſſe ſymptomata. Vocatus ad Curam Hildanus invenit dextrum inguem gangrenæ affectum: Tumore itaque ſcandificato, & exterius quæ ad gangrenæ curacionem ardent adhibitis, caro putrida & calloſa rupturæ excluditur; unde dolor, inflammatio, febris, tormina, lipothymia, naſea, vomitus, omnia denique ſymptomata ſedata ſunt: ſed intelliſſimum materiam, novum præius excrementum; velut ilei & cæci. per abdominæ rupturam excretaſſet, circiter duos meſes. Ægia tamen admittentibus omnibus curata, & à rupturæ perfectæ ſanata fuit, nullâ reliſſa ſiſtula.

Arquitratio curandi Herniam, in primis intesti-
nalem, in hiis tribus consistit: viz. in intestini intra
abdominis cavitatem repositione; in repositi conser-
vatione, ne rursus descendat; in relaxati peritonæi
constrictione.

Verum ante sepoſicionem Chirurgus diligenter confideret, an hernia ſit parva, vel magna; an tectea, vel inflammatione coſtipa; an flaccidum adhuc, vel materia aliqua repleum ſic inteſtinum?

Si hernia parva sit & secens, intestinumque vacuum
facillimè reducetur si æger supinus in lecto colloca-
tur, capite declivi, pedibusque elevatis, quoniam

hac ratione intestina ferum roentia secum trahunt id, quod prolapsum est.

Sin vero magna sit & recens hernia, oportet Chelururgum intestinum nulla materia dilanatum digitis tractare, idque, egrotantis capite declivius posito, sensim tamdiu molinet circumagere, donec paulatim abdominalis cavitatem ingreditur.

Aqui hernie quum afficiatur aut inflammatio, quam indicant dolor, calor, febris; aut flatus adhar, qui cognoscuntur ea eo, quod æger percipiat totum abdomen à flaribus distendi, si flatus emittat, & rugitus in intestinis audiantur, dolorque extendens sine fine gravitæ; aut faeces, alvulque supprimuntur, tumot sensim increfcat, & pondus majus, majoque durities percipitur: tunc à reductione intestini desistendum est, usque dum inflammation abicit, faeces egressez, & flatus dissipari faciant.

Igitur inflammatione cum addit hernie, scitoto vel inguini calide imponatur cataplasma emolliens, digentens, simulque corroborans, ex farina bordei, fursuribus citrici, foliis malvæ, alihæz, floribus sambuci, rosarum, vino rubro, &c. idque identidem renovetur. Eriam ea Fallopio, pars affecta forerit potest lixivio calido, in quo cineres ca ligno figino ebulliant. Accipiantur itaque duz fili crudi massæ, indantur cacabo, & coquantur cum m. B. seminis cumini in lixivio acri; deinde massatum una catrahatur, quæ inter duos discos exprimitur, atque capsula calidè, quantum ferre potest æger, apponatur; verum tepescens renovetur, & alia substituitur, eaque repetatur, donec omnino sublata sit inflammatio.

Si cum inflammatione concurrant faeces, quæ repositionem intestini impediunt, casus quidem est maxime desperatus: nihilominus tamen sacum repletur eductio clysteribus lenientibus, identidem injectis, nec non fomentis; aut cataplasmatibus distensionem relaxantibus. v. gr.

℞. Fol. parietariæ, malvæ alihæz an. m. i. ss. flor. camomillæ, meliloti, sambuci, sum. anethi an. m. j. sem. cumini, feniculi an. ʒi. incisa & contusa coq. in L. q. lactis vaccini pro forma.

℞. Rad. liliorum alborum ꝛc. ʒi. fol. malvæ, violariæ, parietariæ, flor. camomillæ, meliloti an. m. j. fursurum m. ss. coctis in aqua puta ad molliem, & in mortario minurim contulis add. farinæ alihæz, Hordei, lini an. ʒi. olei rosarum, liliorum alborum an. ʒi. ss. m. f. cataplasma. Vel Tumor continuo foveatur mappis calefactis, Oleo camomillæ & Anethino imbutis, atque subinde renovatis.

Sed & flatus non raro absque inflammatione intestinum replent, quo in calu usurpanda sunt Fomenta ex emollientibus, calefactantibus & discutientibus composita; nec non Clyster calefactis & extrinsecus injiciendas est, haud secus ac de Intestino Prolapso, & vel inflammatione obfesso vel Facibus repleto, Reponendo tunc duximus.

Sublata vero inflammatione, cæteris Facibus, Flaribus dissipatis, reponitur in propriam sedem intestinum. Viz. collocetur Ægrotus capite plurimum demisso, affecta autem parte elevata, deinde manibus Tumor capiendus, tentandumque ut materies paulatim eo, unde exiit, regrediarur digitum nempe sub tumentem reponendo, repellendoque leniet in ventrem, quod ex eo delapsum est, atque diligenter cavendo, ne consensu livore int. rino adferatur, quod ea pars Gangrenæ obvia sit, & opportuna.

Atque è contrario cum omnibus flaribus tentatis remediis, intestinum prolapsum, & vel inflamma-

tum, vel facibus flaribus repletum reponi nequeat, adeoque periculis Ægroti immincat periculum, extrema quoque sentanda sunt. Quo in casu Ambrosius Paracelsus Chirurg. lib. 7. cap. 15. ad Chirurg. am accedete, & ducum illum, per quem intestina elapsa sunt, Sectione dilatare laudet, lic ut digito reponi queant. Sed ardua est Mania in hæc Operatio; quæ quomodo fit instituenda, videte Iosuper est apud Nigizum præz. Chirurg. lib. 1. Cap. 41. & præsertim apud Jobum Mecketanum observ. Chirurg. Cap. 45. 46.

Ubi jam intestina reposita fuerint, proximum est cavere, ne iterum cadant. Quem in finem maximi sunt momenti fasciæ seu Subligacula, adeo ut in Herniis recentioribus tota sere Curationis spes in iis sita sit. Parandi autem fasciæ commodissima hæc videtur ratio. Fiar cingulum seu fasciæ ex corio, quæ lino molliori seu panno gossypino, atque etiam gossypio nonnihil suffulto inducantur, quæ ligula stringi possit. Atque hæc fasciæ ventri infra umbonidia supra coarctandem prope inguina applicetur, ita tamen, ne partes quæ sunt supra lina & ossa laedat, & atterat. Huic autem fasciæ seu Cingulo alia fasciæ cum splenio seu pulvinari quodam ita adaptari debet, ut quantum opus est contrahi possit, ipsiusque pulvinar recta loco affecto seu parti ubi intestina exciderent solent, incumbat, suoque incumbu intestinorum prolapsum prohibeat. Quod ut rectius præstet, fasciæ, quæ ventrem ambiat, nonnulli geminas habebas adaptant, quæ ad humeros ascendunt & collum ambiunt.

Fasciæ loco parari potest Cingulum fereum cum Scuto ferreo, quod locum ubi Intestina protrudent arctè tangit, & Int. sinuorum Prolapsum prohibet. Rationem vero conficiendi omnia hæc Instrumenta Præz docet. Icones habentur apud Paracelsum Chirurg. lib. 7. cap. 15. Sculietur Armament. Chirurg. Tab. 39. alioque.

Equidem intestinum postquam repositum est, priusquam adhibetur Brachierum, Adstringens aliquod relaxatio peritonæo applicari potest Emplastum, quale est oxycroceum, seu Emplastum ad Rupturas in cotio catentum, vel simile v. gr. illud Pigræ.

℞. Gummi Elemi ʒi. Multichis ʒi. alibi, Sarcocollæ an. ʒi. Emplastri contra Rupturas ʒi. ss. Pulv. Boll. armeni ʒi. ss. Olei thebæicæ q. l. M. F. S. A. Emplastum. Emplastri loco nonnulli laudant forum Adstringentes, adeoque relaxatum peritonæum Roborantes, ex Corticibus Granatoto, balustia, Sumach, nucibus cypressæ, floribus camomillæ, alumine, similivulve, in aqua fabrorum, & vino rubro adstringente coactis. Alii inungunt oleum ovorum. Sed imprimis Quis hic impetanda est, quæ sola nonnunquam graves sanantur herniæ; cujus rei memorabile adfert exemplum Hildanus cent. 5. Observ. 54. cuiusdam generosi Beronensis sexagenarii, qui viginti annos insigni Hernia Intestinali laboraverat & cui citandæ tum Hildanum, tum alios in Gallia & alibi expertissimos frustra adhibuerat Medicos & chelururgos: tandem cum de recuperanda sanitate ne quidem cogitaret amplius; & subligacula, ne malum ingravesceret uteretur, in morbum incidit, quo ultra sex menses lecto affatus fuit. Post morbum hunc ne minimam quidem herniam, quæ tamdiu laboraverat, indicium perirent, nec amplius splenici aut subligacula uti necesse habuit.

Igitur fasciæ intestina, ne rursus prolabantur, contineri possunt: quod ubi factum, danda opera, ut excrementa potius molli sint, quam dura, alvulque ne supprimantur; atque in egerendis facibus observandum,

ur manu inguina & scrotum probe contineantur, ne faeces emittendo intestina extrudantur. Deinceps abstinentiendum à cibis flacculentis, ne flatus intestina distendentes producantur. Insuper omnis vehementer motus, saltus, cursum, oneris gravioris gestatio, vociferatio, aliaque vehementiora vitentur exercitia. Denique in tussi & hæmorrhoidum idem observandum, quod modo in egerendis alvi facilibus attendendum diutius.

Hæc alii reddunt ad accelerandam relaxati peritonæi confirmationem varia inuisi sumenda medicamenta & inter alia huic affectui curando specifica, qualia dicuntur Radix consolide, osimunde regali, herniaria, hypericum, &c. quorum formulæ plures habentur apud auctores.

Verumtamen si integram sanitatem iis æger consequi non possit, brachetio contentus sit, quod solo si rectè contineatur intestina, omnibus vitæ actionibus sine magno impedimento vacare poterit. Atqui hæc qui contentus non est, semet ipsum Chirurgiæ tradat, quæ per ablationem Didymi Herniam peritæi curare potest est; de qua videantur Pigræus præz. Chirurg. lib. 2. cap. 40. Scultetus Annot. Chirurg. Tab. 40. Cl. van Horne in Microtechn. Sect. 2. par. 6. §. 24.

Quæ autem hæcenus de Cura herniæ intestinalis dicta sunt, quoque applicari possunt herniæ ex omenti prolapsu oriæ. Iidem enim in ejus curatione sunt scopi. Primum nimirum reducendum est Omentum maiorem opera; deinde prohibendum elapsus, quod idem brachetio fieri solet. Atqui si omenti prolapsus non exactè prohibeatur, adeo ut frequentius illud elabatur, facile peritonæi processui per fibras artissimè accrescit, hinc reduci in abdominis cavitatem nunquam potest, manetque immedicabilis epiplocele.

Hydrocele porro pro Causarum varietate nunc magis nunc minus periculosa est: quæ enim cum Hydrope conjungitur, non curatur, nisi sanato prius Hydrope, ejusdemque causa ablata. Nam licet aquosus humor vel discurrat, vel Scroti aperture evadatur, novus tamen rursus affluit. Si vero causa Aquam generans minus gravis sit, facilius curatur. Equidem inveterata hydrocele, ne Testes corrumpantur, baud immenso suspecta est.

In Curatione autem herniæ aquosæ, Universalibus ad tollendas Causas Antecedentes haud neglectis, ut de oedemate, nec non de Tumore tum flacculento, tum aquoso curandis dictum fuit; vel Topica Scroto præsumto applicentur calida, Siccantia, resolvantia, Digestiva, contrariam adco in eo aquosam item abundantiam vel Scroti quocunque modo aperture aquosæ materies educantur.

Fallapius tom. 2. tract. de tumor. p. n. cap. 74. haud abs re duplicem statuit heretiam aquosam usam, in qua dilataro nimium peritonæi processui, aqua ex Abdominis cavitatē in Scrotum descendit, adeoque florere & effluere potest: hæc autem non curatur nisi prius ex Abdomine omnis educatur aqua.

Altera herniæ aquosæ species est, in qua nimium non aperto peritonæi processui, aquosæ materies per extrema tum sanguineorum tum lymphaticorum vasculorum oscula in Scrotum, vixinalem inter & albuginalem testiculæ tunicam effunditur. Arque in hac specie Topica Medicamenta calida, Resolventia, & Digestiva adhibitis multum prosunt, eaq; semper expetiri oportet, priusquam ad Scroti aperture veniantur.

℞. Rad. cucumeris asinini ʒi. fol. calamenthæ, abroroni, rutæ, Sæm. Anethi, flor. Camomillæ, sol.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

rubr. an. Mj. Sem. cumini ʒvi. coq. in aq. puræ de vini albi an. p. æq. ad ʒxxx. colatura sit pro Fomento. Magnæ quoque efficacis talia dicuntur medicamenta, si Aceto incoquantur.

℞. Rad. Cucumeris Asinini Bacc. Lauri, Sem. Cumini, Agni Casti an. ʒi. fol. lauri, rutæ, ros. mariani an. ʒi. decoq. in aceto ad ʒxxx. colatura patet affectui cum spongia succentur. Vel Fomentum fiat ex lixivio cinetur Sacramento visci, in quo similia cocta sint, nec non sal. sulphur, aut alumen liquatum fuerit. Etiam Litus hic multum profuit. ex gr.

℞. Olei Cucumeris Asinini ʒi. Rutæ, Laurini an. ʒi. Cum. an. ʒi. gatt. x. Miscantur pro Linimento. Laudant alii emplastrum ex Stercore vaccino, mixtis cineribus Plantarum Digestum, aut Seminalibus Rutæ, viticis, cumini, baccis lauri, Juniperi, similibus.

Nonnulli imponi volunt Emplastrum de melliloto, de cumino, vel simile.

Scoltæus Consil. Medicin. 131. vehementer laudat, id quod sequitur.

℞. Rad. Cucumer. asin. rec. contrif. & in Aceto scil. macer. ʒi. Mellis despumati lbj. Miscantur, & bulliant in cetrati consistentiam, addendo in fine Sem. Cumini subit. pulv. ʒiij. M. F. S. A. Emplastrum.

Sin his, similibusve remediis Tumor resolvitur nequeat, ad chelurgiam, hoc est, Scroti aperturem veniendum. Quo modo autem & ordine Scroti Apertio instituenda sit, docent Paulus Ægineta lib. 6. cap. 62. & C. Cælius lib. 7. cap. 18.

Nonnulli Scalpello Scrotum aperire solent, cui tamen methodo vix assentimur, quoniam id ex collecta aqua differtent admodum, & si cidum difficile consolidatur; atque non raro ob partis affectu porofitates obstrictas, spirituique per eam radiationem valde immensam Gangrena accedit.

Alii hanc aperturem caustico, vel Ignitiæ ferreamenti efficiunt, atque appetum diu servant foramen canna immissa Argentea vel plumbea.

Quidam Scroto aperiant, Acum filum duplicatum vel quadruplicatum ducentem Scetæi in modum trajiciendo, & quotidie bis terve protrahendo.

Avicenna in Inguinis regione candidioris ferreamenti laurit, ut pars corruptæ aqua iterum delendete possit.

Sed prius Scroto aperiat acui perforata Barbetiana vel Blockiana, heque aquosæ educantur materies. Atque hac methodo sæpius hydrocelem curavimus, eduximusque aliquando ex Scroto tres, aliquando quatuor aquæ libras. Etiam nunc inter mortales veretur Vie septuagenarius, cui singulo præter propter biennio Scroto perforata acui apertus solet, ad collectum in eo aquam evacuandum. Similiter Fabricius Hildanus Cens. 4. obs. 66. testitur, se novisse virum Sexagenarium, cui ob Herniam aquosam singulis annis Scrotum ex inferiore parte perforabatur, & fetidus humor evacuabatur, ac postea ad ecaricem vultus perducitur: ad tunc hominem illum ad summam pervenisse senectutem. Equidem circa Scroti aperturem utiles quasdam admonitiones & observationes proponit idem Hildanus Cens. 4. obs. 65. 66. 67. 68.

Adesse Sacrocelem cognoscitur ex eo, quod Tumor in Scroto durus sit, sine ignis remore, sensimque aductus, quo ligno distinguitur ab hernia intestinali, quæ mollior est, & subligatur: insuper majores hic molestia est, quam dolor, nisi præ humores constuant. Indagandum quoque diligenter, ne Hydrocele vel alius Testiculi Tumor pro Carnea Hernia

Hernia habetur; quod interdum contingit, si aqua profundius lateat, & sosis nulla sui signa exhibeat. Tale exemplum proferit Forestus libr. 27. observ. 25. In scolio, de quodam, qui testem unâ cum seroto in modum scythi, paulatim majorem in molem auctum, & durum per quinquennium habebat, ut omnes Sarcoceleum putarent. Postea tamen cum emollientia & manutentia applicaretur, tumor molli evasit, & facto abicellu magna aq. copia, quæ intus latebat, cum impetu erupit, unde scrotum & testiculus detumuit, ægerque penitus curatus fuit.

Equidem medicamentorum ope vix unquam curatur Sarcocele. Sed Chemurgici opera tolli solet, ut plurimum cum didymo, cui adhæret, vel Inhareret heterogenea hæc substantia. Ad inguina ubi se gatendit, scire incurabilis est.

Quoad Medendi Rationem; ea duplex est, scilicet ut vel tumoris incrementum prohibeatur, & puto tumor absumatur: vel substantia hæc extenuata chemurgia tollatur. Primæ intentioni ut scitis, medicamenta interna ad tollendam Sarcoceleum quoque commendantur. Et scribit Matthiolus in Dioscoridum libr. 3. cap. 18. fe novissè quendam, qui ononidis radicis pulvere duntaxat plures menses sumpto, carnosum ramum absumpsit, & sanatus est, licet à Medicis nullo alio remedio, quam sola sectione, ulsioneque hunc curari posse esset statutum.

Inter Topica Medicamenta valde hic commendat Rulandus Cent. 9. Observ. 66. sum oleum Sulphuris, hoc est, Balsamum Sulphuris quotidie bis illitum. Alii imponere malunt hoc emplastrum.

℞. Gummi Ammoniaci in aceto soluti ℥ss. Bdelii similiter soluti, pulv. feminis sinapi, utricæ an. ℥i. Aristolochiæ cotundæ 3ss. Sulphuris ℥ss. theerebinthiæ, Lapidis spongiæ an. ℥i. spiritus vini ℥ss. Cere 3ij. olei olivæ ℥liij. Ea hisce S.A. fiat Emplastrum. Sculetus post armament. Chirurg. Observ. 74. scribit, plures se curasse, exhibito quotidie pulvere radicem Ononidis, & imposito hoc in Emplastro.

℞. Gummi Ammoniaci, Galbani, Bdelii an. ℥ss. dissolutis aceto addæ adipis anatis ℥ss. Medulle cutum bovis, olei Liliorum alborum an. 3i. Misceantur in formam emplastri, quod linteum inductum Scroto applicetur, & quarto quoque die renovetur.

Sin hoc modo Carnosa Hernia non imminuat, sed e contrario augeatur, sequenti methodo temari potest Curatio. Fiat fortamen exiguum in Scroto parte superiore: per hoc petiæ npe medicamenta applicentur suppurantia, quo hæc carnositas hæc substantia tolli possit, quavis degeneratione pus expurgando; verum non totum, ad meliorem reliquæ carnosæ substantiæ consumptionem.

Quod si nec hæc successerint, Testiculus extrahendus, & sectione tantum carnosæ extrinsecæ tollendum, quantum sine læsione fieri potest: hinc restituerendus iterum in suum locum Didymus, & quod reliquum est carnosæ substantiæ suppurantia auferendum.

Quum verò nulla spes sit, diutius modis sarcocele tollendi, Didymus, cum sosis, ipsi carnosæ substantia, vel tota sua substantia cum sosis extrahenda est.

Præterea Venæ spermaticæ in Scroto Varicum ad instar dilantur nonnunquam, & Tumor in Scroto efficitur, quæ Scrocele seu Varicosa hernia oncus-

patur. Ea namque nihil aliud est, quam in Testiculos spermaticæ Venæ dilatatae, & Varicum modo congestæ, contortæque.

Hinc & eadem hujus affectus causa est, quæ Varicum; viz. sanguis crassus, ac terrestribus, citra valvulas venarum spermaticarum subulstus, atque Vaticolum hujusmodi Tumor in Scroto castrans.

Facile quoque manifestum sit hoc malum, quod in Scroto supra Testiculum circa Peritonæi Processum venæ rigide, conglomeratæ, & capreolorum modo innotæ tangerentur; quodque deortum magis descendat Testiculus.

Cura equidem hujus Affectus facilis non est. Ea tamen ut observatur, commodo aliquo subligaculo, aut fascia convenienter appolita Scroto cum ingulis testibus sustentetur; hoc namque tam certum est remedium, ut teste Fallopio, quidam eo solo curatus fuerit, quod testes per duos menses fascia suspensio gestaverit, & quotidie aquam à Nucibus cyperi desillatam adhiberet, eaque Scroto humecta esset, & per se calicari siverit.

Alii emollientibus & discutientibus Curam molliunt, ideoque Balneum usurpant, seu semicupium ea Radicibus altheæ, semine Lini, simili buve in aqua decoctis; ac deinceps oleo amygdalatum, vel quovis alio locum inungunt. Alii id quod sequitur, imponunt emplastrum.

℞. Picis navalis 3vi. Colophonie 3liij. Gummi Ammoniaci, bdelii, opoponacis, Mastichis, lithargyri, theerebinth. an. 3j. bol. armen. thur. sanguis dracon. sarcocoll. alois. cernit. symphyti, gallarum, malicorii; nucum cyperi, hembritic. terrestr. an. 3j. glutin. pellis arietin. dissol. in aq. chalyb. & aceto q. l. M.F.L. Emplastrum.

Quod si nec istis remediis morbus hic curetur, ad Chemurgiam deveniendum, & vel, spectans in scroto facta, vaticole testium venæ incidantur; vel simul cum didymo eadem eascindantur. Joh. Mannicki in Chirurgia ad Praxim hodiernam adnotat.

Oncos illi qui Hernia gerunt, sive veras, sive falsas, si prædentes fuerint, lobietatem colent, veritate immoderate non vident, ea omnia que harum invalitudinum causa esse possunt, vitant, & quandoguidem partes quas occupant debiliores reducant, carum indulgentiam imbecillitati, & ad diætam attendendum. Vitanda itaque veniunt omnia ipsi concitata, qualia sunt legumina, fructus recentes, omne atrocitatis genus, vel panis butyro conditus, & nodi sacri easoctus; carnes multa condire, pilas, & cætera; inter equitandum horum Scandalarum brevius faciendum, eo latere quod hernia afflicti; in sede humiliori non sedendum, nec brachia nimium elevanda; in caeteris præterea assurgendo pedes, pro aliqua re in aliori collocata loco arripienda, caligant zona non nimium constringetur, alvas servabitur libera, & si aliquando difficile solvantur, in ipso nisu manus subligaculo pulvisco imponentur, violentiora deviantur exercitia, præcipue si hernia laborantes veris apsis & validioribus subligaculis chalybis aut aliis à hinc ferreo consuetis, non fuerint instructi. Hæc subligaculis jam mihi verba veniunt facienda.

Subligaculum apud Gallos variis donatur nominibus; liquidum apud plurimos bandage; apud aliquos ramen vestitissimi nomine brayer; apud Normannos ceint; apud alios tettecint, erin ut alii que ynonimis loquuntur, quorum primum est & decentius & convenientius.

Pro conficiendo subligaculo apto vel è chalybe, vel è filo ferreo, attendendum ad ea omnia quæ in superioribus de herniis curandis diximus; indeque indicationes veniunt deducendæ pro subligaculi forma: nam si corpus fuerit macilentum, alla debet subligaculum ratione confici, quam si obæsum fuerit.

Viri macilentæ & obæsum datus constituunt generalis differentias formatum subligaculorum, ut & eorumdem applicationis, sed alie exque insimulæ particulares dantur, corpora liquidæ in omnia in sua variant forma, unde necessarium est etiam innumeris modis subligacula variare, ut superius annotavi. Hoc non parum facit difficultatis ignavis, qui unius tantum generis subligacula conficere norant, arbitrari satis esse, si pro varia corporis crassitie valde constiterint.

Nou sic se gerit ille qui ad perfectionem tendit, quàm magna reuera inter meam theoriam & praxim quam hic demonstrandam suscipio, intercedit differentia, & quamvis Guido dixerit peritum praxicum, operari pro modulo theoriæ suæ, dantur tamen quedam facienda quæ scriptis explicari nequeunt, & quæ in demonstratione oculari posita sunt. Exempli gratia pro apèr flectendo subligaculo, illique iis proportionibus donando quæ herniis maxime conveniant, necessario subiectum inspicendum venit, alias in aliquibus semper deficit. Itaque multo commodius foret me operantem cernere, quàm docentem audire, sed quandoquidem in omnibus Ditionis Gallicæ regionis præfens adesse non possum, ut inspicere ab his quos capio doctos facere in cura Provincialium, qui tam expè inceptis assiligi subligaculis Lutetiam adveniunt. Hoc unicuique mihi liberum est, scilicet, pro ea qua polleo accurate scriptis edoceam methodum in subligaculis mihi familiarem, cui si adjungatur periticia iis necessaria qui Chirurgie se dicant, non dubito quin facilitè acquiratur quod summo plurium annorum labore conquiesivi.

Primum quod faciendum venit examinatis indicationibus necessariis, possum est in mensurâ crassitiæ, sive vis, sive nullæ, sive puelli; hæc autem mensura insinuenda est cum iis materis quæ nec elongari, nec abbreviari facillè valeant, v.g. cum charta pergamenâ, vel tenui limbo donata validior, incipiendo ab eo loco, in quo hernia apparet, & ita circumducto corpore ad eandem tendendo partem. Illa autem circumductio variè insinui debet, unde non parva rationibus creabitur difficultas; alii quippe subligacula altius collocata, alii inferius, pro corporis forma, gerere debent. Quibus altius sunt applicanda subligacula, sunt illi qui crassiores habent nates, nam secundum eorum maiorem aut minorem crassitiem subligaculum variè flecti & ad superiora reflexi debet. Iis vero quibus subsident nates minus necessarium est subligacula ad superiora reflexa dare, imò aliquando omnino hac ad superiora flexione abstinendum est.

Subligaculum pro subiecti sui crassitie, debet ut plurimum ad duas suæ longitudinis tertias partes, aut paulo plus, è chalybe aut filo ferreo componi, reliquum verò debet ex corio robustiori confici, si subligaculum duplicem pulvillum laminæ armatum ferrea habuerit, pro secundi pulvilli longitudine minuenda erit totius prædicti longitudo.

Chalybs autem debet esse mellioris notæ & ejus

generis quo effinguntur loci, & ita ut illud subligaculum non possit abruptum patiens frigidum cadatur, & interim ea flexibilitate & vi elastica polleat, quæ apèr corporis circumductioni necessaria sit. Hæc Fabrum spectant Ferrarium, cui probe & accurate significandum quod ab ipso exquiratur, ut qui in Chirurgia instrumentum aliquod aliud advenit, illud operationibus suis instituendis aptum, cultario cadendum exhibet.

Secundum quod in subligaculi fabrica attendi debet, est validitas necessaria.

Duas de causis necessarium est subligaculi satis robusta effingere, primo in herniis majoribus atque fluxibilibus, secundo in obæsum subiectis, quod tamen commisso prædixit chirurgi qui malum attentius examinavit, unum admonendo, attendat scilicet exercitio illius cui applicabitur subligaculum, nam si fuerit homo magni laboris, aut exercitiorum violentiorum, subligaculum debet esse validius, ne herniam patiatu elabi, aut inter utendum abruptu.

Tertium quod annotari debet in eo possum est, quod chalybs aut filum ferreum è quibus effinguntur subligacula, è securo sive pulvilli lamina, ad suæ longitudinis dimidium, una quanta parte validior & crassior fabricari velit, scilicet minuendo ad finem usque, ut sic vis major adsit elastica. Si verò necessarium fuerit pro duabus herniis, subligaculum conficere, oportet ut illud scilicet quod zona seu tiugulo continuum est ponatur super molestior hernia, sive illa è latere dextro, sive à sinistro fuerint. Observandum autem quod è omnium subligaculorum laminæ sint suis pulvillis minores, nam hi illarum oras ad dimidii saltem digiti quantitatem excedere debent, & præterea quo magis elevare velis eisdem pulvillis, eo minores debeant esse laminæ, ingulsa enim quibus applicantur, nequeunt grandiores laminas pulvillis instructas elastioribus ferre, præterquam quod parum adferant commodi.

Quarta etiam horum dignior subligaculorum pars, pulvillus est, qui compressæ vices gerere, atque partibus è quibus hernia elabuntur imponi debet, ut sic impediatur quo minus vel incutiam, vel epiploum vel utrumque simul excidat.

Generalior regula exigit, ut quantum fieri poterit pulvilli effingantur minores, nam sic & utiliores & minus importuni evadunt, & præterea ad peritonæi annulos commodius perveniunt, nec ita facile de loco moventur ac grandiores. Interim necessarium est eos tam variè effingere, ut illud descriptum sit impossibile, in hoc iudicium excutendum, advertendo ad herniarum exitum unde tam multiplices enascuntur effusæ. Præcipue vero observandum ut prædicti pulvilli proportionentur parti cui imponuntur, nam aliquando requiruntur depressi & molliores, ut in subiectis macilentis, in quibus hernia non fuerit grandior, nec in inguine cavitas; ubi verò cavitas adfuerit major minorve, pulvillis exigitur plus minuseve elatus ac rugens, ita ut cavitas repleatur, nec tamen pars ad atrophiam deducatur, quod evenit quibusdam novis Sectatoribus qui instrumentis utuntur acuminatis, quibus præter dolorem, substantiæ deperditionem, faciunt per impediam spirituum irradiationem, & nutrimenti appulum; sic etiam annulos apertos servant, & unioni ad curam quàm maximè necessitæ obstant.

Omnes herniæ contineri debent in eo è quo egres-

Hb 4 disjunctæ

diuntur loco, non verò in illo ad quem devolvuntur, itaque semper supra os pubis debent reprimi adque eorum praeputium, ubi annulorum ledes est, & ubi vasa viciantur spermatica; nam si subligaculi scutum proprius ad penem adducatur dolor in prædictis patitur vasia, quæ inter pulvillum & os pubis sic arctius iocunterantur, præterea enim os pubis sit hic clavius quam prope coxam, impedimento est ne pulvillus cavitate repleat, sique hærnia elabatur, præsertim inter sedendum, aut corpus curvandum, jam verò hoc attentius observandum ut devitentur mala quibus viri mederi valeant pro voto, cum sc. subligaculum elabi sinit intestinum, unde periculosisima evadit strangulatio.

Regulam generalem flexionis subligaculorum quod spectat, attendendum ut circum totum corpus circumducta illi undique quam accuratissime & immediate applicentur, ne sc. facile de loco moveantur quod ipsorum operationi non parum officeret. Particulares flexiones differentias quod attinet, in variis subjectis, illæ nullatenus possunt doceri, & etiam, subligaculum quantum ante applicationem possibile, ad perfectionem suam deductum, necessarium est ipso applicationis momento variè flectere, ut corpori aptius commodeetur, propterea melioris notæ metallo constitui omnino debent.

Quod subligaculum è filo ferreo conficere notant hoc tenuit priv legio, quod sc. filum ferreum minus facile in variis uti: si alonibus abruptatur, si fuerit melioris notæ, quod è Germania adfertur inoptum propterea est.

Hæc Subligaculorum species inter præclarissima reponi meretur inventa, nam sic omnibus prope in locis, nulla fabri ferrarii adhibita opera, subligacula è apta & si missima possunt effigi.

Pro cond. ndo hoc è filo ferreo subligaculo eadem quæ in subligaculo chalybeo sunt adnotata observanda veniunt, & quoad menturam sc. & quoad ferri longitudinem, validitatem verò quod attinet, siquidem variæ crassities dantur fila ferrea, illud pro prudentia sua sel. ger. artifice, aptum illi firmitati suo subligaculo exhibendæ quam intendit. Observandum tantum quod cujuscumque demum crassities filo utaris ferreo semper duplicandum sit, ad utrumque sc. subligaculi ut & ejus ferri limbum, & quandoquidem filum ferreum eundem est per totam suam longitudinem crassities, igne temperandum est ut ab ea parte cui cotium alligari debet minus firmum evadat.

Conficiendum subligaculum postquam ad corporis modulum egeritis, & ad indicationes necessarias attenderit; validitatis aptæ filum ferreum sel. ger. ejus longitudinis ut commodè duplicari possit, & ab altera parte manuali aliquo instrumento hæctes extremitatem tam ferri superioris, ut ea ea constituas scutum, vel à dextris, vel à sinistris, ejus figure quam aptam videbis pulvillo sustinendo hærniam tuæ continendæ accommodata. Hocce peractio produceretur mensura usque ad fili ferri partem igne temperatam, ubi subligaculi funis est extremitas, indeque illud duplicabit. Quando secundus iste ramus duplicetur paulo ultra scutum deductus fuerit, eum priori subficies, & filo multiplicitate complicato subligabis, cum ea extremitas quæ scutum excedere lima cotardet ut deperfectionem aliquam acquirat, postea eandem ad interiora contorquens ad prædictæ scuti figuram, ut illud è ferro duplicato constituat, ut ipsum cingulum. Continuabis validam ligaturam duarum extremitatum,

quæ in unum scuti locum coibunt; postea subligaculum pro lubitu flectes duabus adhibitis manibus, si clare incipiendo quasi ovalem aut aliam apertam figuram conficere in animo esset, recutavisti postea cingulum prope aut longè à scuto, prout necesse fuerit altius illud applatire; reliqua & perfectior hærnio malleo conciliabitur, tantum ferreum interius leviter tundendo ut ad motum corporis exquisitè adapteretur.

Quando subligaculum pro voto efformatum habueris, duos ramos simul deligabis, eos invicem complicando, & tertia fila tres lineas lara circumducendo. Hæc ligatura duplici adhibetur usus, sc. validitatis æqualitatem tamis duobus conciliat, & præterea prima est subligaculi instructio, cui secunda è tela coniecta, bombace, aut lana tenui & bene carpta repleta, per totam longitudinem interius adjuvat, ut sic ferreum minime lædat. Secunda hæc instructio non adfertur quin prius artemitatem loco coriaceo, clavo adfixo, vel tela ipsius ad aliquam longitudinem producta, armaveris, postquam eandem illam extremitatem lima cotardam deperfectionem feceris, ut sic minus crassa fiat atque minime lædat.

Pauci admodum eudendotum subligaculorum chalybeorum sunt periti, nullique in provolucis Gallicis tales reperiuntur, quantumvis aliis instrumentis eudendis; apti interim illud utilissimum foret, cui ego pro virili meâ bor. dummodo ubi scum chor. gi attentius animo & ingenio cum studio legere voluit quæ hæcenus à me hic fuisse præscripta.

Verum quandoquidem tendit à me descripta fibro pro conficendo subligaculo est insufficientis, consulo unicuique chirurgum patet libet exemplar aptum ex unico filo ferreo ejus crassities quæ facile fieri possit, ut sic apte curvetur ad figuram corporis cui applicari debet, & postquam filum illud ferreum ad corporis extremitatem acquisitè egerit, cum faber viro exemplari facillimè subligaculum euder, unicuique supererit, scilicet præteribatur & crassities latitudo cinguli, cui demonstranda castareum omnino aptum fuerit: Scutum quod attinet, conficiendum ad normam illius quod per fixationem fili in altera extremitate; & quoad magnitudinem & quoad figuram necessariam, descriptum erit.

Hæcenus subligacula chalybea fracta mixte inventionis, quæ sapientissimè Magnaribus exhibui. Unico aut duplici armantur scuto, prout liboerit.

Quæ duplica scutum gerunt per scuta sua disjunguntur insedante cochlea à dextris vel sinistris polita, hoc est si è duabus hærnis quas seprimere necessarium est major à dextris fuerit, cochlea in eodem latere poni debet, & à sinistris, si hærnia præcipua in eo fuerit latere. Hæc cochlea insinuat in istiarum cavum in altero scuto efformatum. Subligacula hæc, præter scuta sua è quatuor alis concinnantur partibus, quarum prima, eaque brevissima, cochleæ concinnatur, hæc à secunda, secunda à tertia, tertia à quarta, & quarta à quinta concludunt; quinque autem debet adhiberi scutum coriaceum validum pro subligaculo claudendo.

Subligacula fracta unico armata scuto, è quatuor tantum conficiuntur partibus quæ clavo scuto ita compinguntur, ut ad interiora tantum si cl. queant, sic magnum subligaculum in per. g. statui potest. Eadem ratione munimus ac alia simplicia, è chalybe aut filo ferreo, & eo eo tantum differunt quod pro secundis partibus clavo compactis,

compactis, necessarium sit tria formina, seu portus aperturas, in instructione, quæ ipsi adjuvat, conficere.

Subligacula hæc sunt admodum commoda atque præcipue his, qui de die & nocte ea gerere necessarium habent.

Omnia subligacula chalybea, quæ noctu gerere animus est, laciundine eorum aut quatuor pullicum breviora esse debent, quam ferat dum tenet crassitie corporis partes, ut quando flet pullicum extremis cubatur, minime sic seuerum aut ejusdem pulvillus de loco moveatur.

Pro infantulis fasciæ suis adhuc dum circumvolutis, aut aliis eadem mentis se inquinantibus, componenda sunt subligacula, quibus urina & sordes adherere non possint, ne ea postefaciant; ejus conditiis sunt, quæ de duplici filii ferrei tenuis ramo concinnantur, ad modum quem supra in majorum descriptione enarraui, sed alia instruuntur ratione, tam scilicet duo non simul colligantur ut in majoribus, sed inter eos canticum reponitur segmen, duas aut tres lineas latum, circum allata valida è filo cannabino tenia, in totum cingulum producta, & etiam multo ulterius per portuli crassitie, quod ultra cingulum producit ut replicetur in sic ligule coriaceæ, quæ hamulo aut productioni ferreæ è scuto ea linteæ ad magnitudinem olivæ confecta, assurgit alligatur, vices gerat: mox memoratum scutum parvæ aditus lamellæ, quo peracto, introductæ tenia ramos ferrens inter & canticum per totam cinguli longitudinem, post ceræ albe fuscæ per totam sui longitudinem exquiritur immergetur, ut sic ab urina non corrumpatur: frigiditatem ceræ cultello levabitur, æque ita subligaculum applicationi aptum habebis, quod de die & nocte gestum necessarium hernia infantulorum intestinalis, curabit, & his minime molestum erit.

Pro umbilico conficitur etiam subligaculum ea chalybe aut filo ferreo, sed dissimilis tantum; pro varia magnitudine corporis variè curabitur, ut in aliis diat, in hoc tamen differat, quod ea partes, quibus hocce in casu applicatur, sunt omnino dissimiles iis, quibus alia admoventur. Lamina media sit grandior & ovalis figuræ, aliquando rotundæ; vultus conficitur hæc lamina, ut abdomen, quod in obætionibus semper prope acuminatur, contineatur.

Si subligaculum hoc fiat pro intestino, & intestinum integrè reduci valeat, in media hac lamina collocatur mollior globulus ad umbilici formam constitutus, ne cavitas eo repleti possit.

Si subligaculum è filo ferreo contraxerit, necessarium fuerit, postquam laminam mediam duplicata spissioris reator tela introstruxerit, illi aditus aliam laminam è tenuiori subere Hispanico, aut è duplici ceræ lufaria confectam, prius appositam æque alligare hamulo ferreo illius laminæ parti media. Hujus subligaculi cingulum laciis esse debet, per vaginam laneam aut sylinam, quæ propterea ab utraque cinguli parte frequentibus densabitur punctis.

Subligacula omnia, quantum fieri potest, levia sunt facienda, siquidem eorum majus pondus post aliquod tempus molestum est. Si materia è qua conficiuntur melioris fuerit naturæ, frigide faciliè candit, & subligaculum exhibet leve, quodque eo validius est quo magis auditur, sicut tenuior lorica malleo pube cula, ictibus fortius resistit, quam quæ è peioris naturæ metallo & ponderosior fuerit.

Subligacula chalybea, ut & è filo ferreo etiam volunt vestiri instructa, tam quoad scuta, quam quoad cingula.

Primus introductus è spissioris textus tela cannabina confici debet, quæ adductæ cum laminis seueri sustinendo, dissimilis, tum cingulis, sed super memoratis laminis semper duplicari debet, ut sic seuerum five pulvillus, v. vidius col ligari atque oniri possit, ut & hamulus ferreus ipsi commode inherere valeat in subligaculo è filo ferreo constructis.

In omnibus subligaculis hamulus qui ligula coriacea connectitur in media lamina pulvillo subiecta semper collocabitur; hamulus vemm, cujus mucro ad inferiora vergit, commodior erit, & indurum non lacerabit.

Ligula coriacea, cui oscilla inferuntur pro claudendo subligaculo, è corio constituitur valde ne facile elongetur & oscilla confertim interi possint, ut sic constructio pro libere fiat, & predicta oscilla nullatenus lacerentur.

Secundus introductus cinguli vagina erit, de qua mox verba feci, & quæ componitur è fascia linea oblique fissâ & gossypio aut lana repleta, post sobus cingulum chalybeum à pulvillo ad oscilla usque confusa. Hic instructus efficit, ut ferrum minime lædat, utque subligem non contrahat; ejus loco preest etiam substitui limbus panni lanei retinuloris.

Pulvillorum secundum instructum quod atinet, multipliciter in forma & materia variant; forma pendet ab ipso artificis judicio, superius pronuntiavi minime esse optimos, quod non ita intelligendum, quasi omnes eadem ratione efformari debent, penes optime erit magnitudinem aptam scilicet.

Si necessarium fuerit pulvillum paulo longiorum conficere, aden ut utque super in pubis ascendat, quia scilicet intestini erumpit juxta illud os reperiunt, parique macrior est, oportet pulvillus sit mollior, ut predictum os in illum pulvillum inferri queat, alias vacuum fiet in loco, unde intestinum elabitur, & præterea si durior foret pulvillus hoc in casu, partem cui applicatur læderet; ut autem mollior evadat pulvillus, replebitur lana carpa, aut gossypio.

Quando agitur de durior conficiendo pulvillo, adhibebitur tomentum pannum malleo cinctum, & in sacculum è largioris textus tela cannabina immisum, qui sic melius super lamina ferrea collocabitur; pilos equinos ad id etiam assumitur, qui medias inter lanam & tomentum occupat. Aliquando subere utri Hispanico pen ea quam in pulvillo capere duritie, semper satis lanæ superimponendo, ejusque bene carpat; ut pars præ pulvilli applicis duritie non atrophietur aut mactetur.

Pulvillus pro Epiplocele, in his, qui magnum gerunt abdomen debet brevissimus fieri & obustus, æque in sui superiore parte depressus, lavis, & in versioris commodæ, ut abdomen non lædat, nec effectum impediatur, quem ab arcta compressione exquirit, hæc autem compressio per partem pulvilli inferioriorem perficitur, quæ propterea magis æque minus tenebit, pro civitate parit; observandum præterea, quod semper pulvillus à parte coræ magis turgere debeat, nec durior effici. Jam verò ut qui subligaculum gerit, illud inferius quam par est applicare non valeat, in quo error committitur satis ordinarius, oportet pulvillum magis in transversum deducere, ut immediatè infra os pubis semper remaneat, oportet præterea cum è molliorem & depressiorem à parte vasorum & penis efformare.

Temper

Tempus mihi deficeret si tot pulvillorum genera, quæ herniæ pro sua varietate conficere cogunt describere tentarem, in hoc exerebatur artificis iudicium; nec mirum si qui chirurgiæ genus non satis possident, nihil boni conficere queant.

Medium omnium pulvillorum, cujuscunque demum fuerint formæ, durius esse debet, quam ejusdem limbi, excepto eo qui pro testiculo tentato adhibetur: Necessarium autem est pulvillos laminis suis probe assuete, & postea corio ovillo albo, aut porius caprino regere; eadem ratione regitur cingulum, hicque tertius & ultimus instructus est; futura vero cum pulvillorum, tum cingulorum, debet quantum potest à limbis eorumdem removeri, ut sic minime lædatur.

Aliquidquid fascia quæ coram complectatur opponitur, cujus aliud extremum cingulo appenditur, aliud vero hamulo scuti alligatur; hæc autem fascia ante ligulam coriaceam hamulo debet inseri, ne sic solvi nullatenus possit.

Et quandoquidem sepius de vita proximi agitur qui subligaculis in suis herniis confidit, eorum faber per propriam tenetur conscientiam, se in hoc negotio peritum reddere, & omnes herniarum species nosse, propterea si artem cui se voverit dilexerit, in easque delectetur peritus evadet, sin minus in difficultatibus multis impinget.

Debet præterea & prudens admodum esse, & in arcano tegendo religiosus, ne scilicet morbi ipsi commissi divulgentur. Inopibus etiam in charitate succurret, ut sic ab omni parie conscientie satisfaciatur, sed potissimum quod ipsi impossibile est nunquam pollicebitur. *Nicolaus La Quint Traité de Hernies.*

De Operatione in Herniis aliis incurabilibus exercendâ.

Herniarum causas cognitis facile intelligi potest in quo consistat curationis ratio. Nam sicut causa herniæ est illius meatus apertio, seu per relaxationem, seu per rupturam: Ita curatio è contra ejusdem est meatus confictio. Illa confictio aliquando conficitur per pharmaciam, nempe per medicamenta stricteiora, vel consolidativa intus exteriusque adhibita, & per Zonam simul gestatam, cujus constrictione impeditur, paritum prædictarum exitus extra illum meatum; quo impedit, paulatim meatus consolidatur, præsertim cum tantum est dilatio, & non ruptura, vel cum ruptura est exigua, & in ætate puerili. Interdum non potest per medicamenta, & Zonam curari, præcipue cum hernia est non à dilatazione, sed à ruptura, & quædam ruptura magna, ac jam antiqua, & inveterata, tunc enim debet corari per Chirurgiam, nempe, vel sectione, vel unctione. Quando ergo per chirurgiam curatio instituitur, cura ratio ejus in eo consistit, ut illi meatus, seu dilatazione seu ruptura dilatati contrahantur. Confictio illa non fit per sectionem, sed sectio præcedere debet, ut postea confictio fieri possit. Contrahere enim meatus non potest, nisi prius sectio ad meatum usque fiat, & talis per quam Chirurgus ad meatum illum possit pervenire, ac eum posse contingere, non enim potest meatum contingere, nisi prius ad eum manibus pervenire possit. Cum ad meatum pertingi potest, tunc ille vel futura, vel unctione, vel stridura filii aurei aut plumbei circumducti contrahatur, & quo latius.

Incipit ex præcedentibus & ex eo quod sectio-

nes hæc sint periculose colligere poteritis, quod non facile, neque temere ad eas sit progrediendum. Nam si tantum sit hernia inguinalis, quia illa tantum est incipiens, & incompleta, & tantum à dilatazione peritonæi, & quia ibi omentum vel intestinum facile per Zonam retrudi potest; ideo sectio non est necessaria, sed tantum per pharmaciam cura est instituenda, nec propter parvum malum debet tam periculolum remedium sustineri. Si etiam sit hernia scroti, & sit parva, sic ut omentum tantum incidat, non opus sectione; omentum enim quia superius est ligatum, non potest procul, & non nisi exigua sui portione in scrotum incidere, & sic illa hernia non est tam magna, ut tantum remedium exigat. Si sit major, sic ut intestinum in scrotum incidat, sique parva & recens, & in juvenili ætate, primum tentanda est cura per medicamenta: nam sæpe adhuc curatur, & ideo non est temere ad sectionem veniendum. Sin inveterata sit, & tumor maximus, & pharmaciam omnis frustra adhibita, cum primum de sectione debet cogitari: debet autem ea fieri in ætate juvenili, lenilis non sufficit tanto remedio ferendo. Est patro hæc sectio omoi valde periculosa.

Verum quia plures ejus differentie sunt, illa quæ fit modo ordinario, quo utuntur Empirici, & circumforanei, hernias secantes, quæ scilicet cum exsectione testiculi fit, omnium est periculosissima: quæ verò fit per punctum autem vocatum, est etiam sit valde periculosa, minus tamen est pericula præcedere: hisuper quæ fit modo empirico, exponit hominem periculo sterilitatis, perpetua quod fiat cum ablatione nris testicul: imo, si hernia sit ab utroque latere, & ab utroque latere fiat sectio, facit hominem absolute sterilem, quia talis fit cum ablatione utriusque testis. Punctum verò autem non aufert testiculos, ideoque hoc periculum sterilitatis non adducit. Sed in universum modum Chirurgiæ curationis est triplex. Unus fit per unctionem. Secundus est ordinarius, & communis empirico-um, & fit cum extractione testiculi: Tertius vocatur punctum autem, propterea quod fiat cum filo aureo, meatum per quem intestina labuntur, contrahente.

Primum modum curandi per unctionem docent, Avicenna, Rhafus, Nicolaus, Theodoricus, Guido, & alii. Alii autem faciunt eam cum cauterio actuali, alii potenciali, qui istum modum docent, dicunt, quod æger debeat collocari supinus, cruribus elevatis, capite depresso, quodque intestina, si exciderint, debeant intra abdomen reponi. Inde, inquirunt, debet adui, super inguen cum canteris ignitis, usque ad os pubis, eo scilicet loco, per quem descendere solebant intestina: & debent fieri unctiones plures, incipiendo à sursum, & descendendo per totam regionem rupturæ. Tunc curandum est, ut elcharis collapsis loca ulla consolidentur, & citati resintur, & ut æger interim 40. diebus maneat supinus, nec moveatur, ut interior intestina non descendant. Cavendum autem est, ne intestinum aliquod vim ignis sentiat, nec vasa quoque spermatica, nam sic vitæ generandi lædetur, quævis, inquirunt, æger fieri possit, ut illa non offendantur. Theodoricus, & Guido, docent, unctionem facere cum potenciali composito. Ergo, ut prius, ærgo & intestina intra abdomen repolitis, laxiorem productionis peritonæi partem, unaque spermatica vasa, & cremasterem musculum ad ictum os adducunt: tum reliquias proculius peritonæi partem caustico medicamento validiore,

validiore, vel debiliore, pro ratione corporis intus cautio recta ad os perpendiculari affixa ea patte, qua intestinum prociubat, effcharam, qua inde produciatur, ad vivum usque divellunt. Tum aliud iterum causticum, eodem loco, quod ad os usque eaurat apponunt, ut sic processus ille peritonæi aduratur, & in effcharam convertatur, tum faciant medicamentis, ut illa quoque effchara cadat, & ita locum effcharæ caro, & dura cicatrix, ac quasi callus succedet. Nam cum processus ille peritonæi, per quem intestina incidere solebant, si dura ac solida ac callosa cicatrice est obstructus, fit, ut omentum, & intestina non possint amplius per ipsum in scrotum prociudere. Hæc ergo utiones ea ratione curant herniam, quatenus faciunt talem constitutionem, & coarctationem in loco, in quem intestina relabuntur, ut deinceps delabi per illum non possint. Cardanus Comment. ad Aphor. 17. 1. 6. Hippocr. ait; quod ille modus sit facilius, & securior quam secundum modum, qui ordinarius, & empiricus dicitur, quippe cum ex sectione testis sit, idemque etiam Patavi. Verum tamen monet, ut ista curandi ratio tunc non teneatur, quando ipsum omentum, vel intestina ipsi processui peritonæi tam foriter sunt agglutinata, ut inde divelli, & in locum suum compelli non possint: tum enim intestina adhesionem illa tangentes & violarentur, unde gravissima mala sequerentur. Secundo etiam, ut non teneatur, cum illius processus dilatatio est valde magna, aut cum processus est ruptus, & intestina magna mole excidunt, tunc enim usso ad curandum non sufficeret; quia satis callosa cicatrix non esset tunc satis fortis ad illam molem incumbentem retinendam; sed effringeretur & malum recideret. Tercio, ut etiam non teneatur, cum agri adhuc in illa ætate sunt, in qua non possunt se immotos continere, & excrementa alvi ad arbitrium tenere.

Secundus modus, qui est ordinarius, & empiricus, & per sectionem fit, adscribitur à P. Agneta c. 65. lib. 6. & sic hoc modo. Ager debet collocari supinus super scammum, aut mensam, cruribus divaricatis, & extensis, non autem curvatis. Tunc intestina repoi intra abdomen, & retro diligenter debent: & porro palpandum scilicet ut testiculus sit in bursa, an vero lustum terraquis. Si sit in bursa, erit tum atramento sciendum signum, pro vulnere faciendo; vulnus debet fieri in inguine lateris, tam alte aut paulo altius, ac est origo seu radix penis. Oblivum debet esse vulnus, longitudinis fere duorum digitorum transversum. Ejus signo sic atramento notato, debet cutis in illo signo apprehendi, & secundum latitudinem transversam plicari, sic ut plicatur, cum linea notata, faciat crucem, & unum extremum plicaturæ tenebit, & alteri famulus assistens: alterum extremum, & quod versos se est, attollet sinistra manu, ipse Chirurgus.

Tunc secundum, & supra lineam ipsam, cum rasorio facienda est sectio profunda. In vulnus debent immitti duo digiti anteriores, & cum his vasa spermatica, & processus peritonæi, illa vasa cingens, apprehendi, & à partibus, quibus adheret, violenter separari, & separata uno cum testiculo ipsi vasa annexo extrahi per vulnus factum. Cum extracta sunt, & extra vulnus pendente, debent vasa spermatica, & processus peritonæi illa vasa circumdare, altiori, quo possunt loco, ligari serico filo valde longo, & tunc sub locum ligationis amputari: alii amputant tunc, alii extrema solius adurunt. Quod amputatum est, nempe testiculus cum

portionem illa vasorum spermaticorum, & processus peritonæi, tunc mandari potest; quod supra amputationem est, ei corpori interius adhæret, reponi per vulnus intra abdomen debet: sic tamen, ut fili oblonga particula extra vulnus pendula maneat, quo postea possit filum extrahi, ut in corpore non remaneat. Per foramen potest olei aliquid rosati immitti: penicillum cum oleo rosato, & vitello ovi imponatur, & desuper stappa cannabina cum onguento stipitico, & repellente, quod sanguinem compescat, & inflammationem arceat, ex albumine ovi, aceto, oleo rosato, bolo, sanguine draconis, &c. Ad latus vulnere linea multiplicata, quasi pulvinaria quoddam ad compingenda labra vulnere adhibeantur. Postquam intra corpus, quod sub ligatura est comprimitur, & filum decidit, filum extrahendum est: extracto, vulnus curandum, claudendumque. Iterea dum illud quod sub filo est, putrescit, & decidit, generatur caro & callus durus in locum vinctuli decidentis, qui callus extremum processus peritonæi abscissum, per quem intestina incidebant, & seminatum vasorum, qui in illo processu sunt, occidit & obturat. Illo extremo sic per callum occluso non possunt deinceps per illum processum intestina delabi in scrotum, & illa hernia est curata. Si hernia sit ab utroque latere, quod jam de uno latere dictum ab utroque esset faciendum.

Tertius modus vocatur aureum punctum. Vocatur autem sic, quod fiat stringendo cum filo anteo, Vetus est notandum, quod sub hac puncto atro comprehenduntur varii modi operationis, qui omnia verè & propriè non debent dici punctum aureum, cum non sunt omnes cum filo anteo, nec omnia sunt eo modo, quo punctum aureum propriè dictum, tamen impropiè vocatur punctum aureum, & comprehenduntur sub eo per hoc, quod setæ sic fiant, sicuti punctum aureum, & in eo cum puncto aureo, ab empirico, & ordinario scindendi modo differant. Hæc lata puncti autem appellatione sunt plures auri puncti modi.

Primus est, Agro supra mensam collocato, & repositis si exciderint intestina in inguine, supra radicem virgæ, hæc oblonga, & obliqua sectio, tam profunda, quo usque perveniat ad vaginalem peritonæi proosium. Cum jam ille processus detectus est, debet blande digito à circumjacentibus partibus paululum separari, ut sub illo aureum filum duei possit. Cum ergo separatum est, tenue aureum filum, crassiusculum acieula majoris, subcurvum, sub illum processum duei debet, duplici circumductione, circumducti extrema debent conjungi, ne dissolvantur. Itaque debent per tenacula ferrea sibi mutuo inorquari. Ab intortis, quod super est debet abscindi, & extrema abscissum ita deorsum, & ipsi nodo implicari, ut ipsa circumjacentes partes non pungant. Hoc est propriè punctum aureum, quo hernia curatur hac ratione, quatenus scilicet per illud filum aureum circum vaginalem peritonæi processum circumdandum, ipse processus qui antea laxatus, vel ruptus, & per quam propere omentum, & intestina in scrotum incidebant, ita constringitur, ac coarctatur, ut illa deinceps non amplius per illum dilabi possint. Verum sciendum est quod cum per illum processum debeant naturaliter spermatica, & deferentia vasa transire, ideo illa strictio per filum aureum non debet esse nimis arcta; nam si esset arcta nimis, tunc illa vasa ita comprimenterentur, quod per ea non possent esse materię seminalis transiras, & sic homines impotentes fierent. Deinde, si nimis arcta esset,

teiles qui sub loco constrictionis sunt, putrescentes, quia privantur fluxu sanguinis alimentarii, & spiritui vitali, qui per illa vasa spermatica ad testes debent pervenire. Debet ergo strictio cum filo autco esse moderata, sed ita arcta, ut nec omentum, & intestina per illum meatum & ciculum aureum circumducendum ei prolabi possint, & tam laxa, ut commodè & sine coactione possint spermatica, & deferentia vasa per eum transire.

Notandum præterea, quod in pueris strictio debet minor esse, quam in adultis, præsertim quod pueri adhuc debent crescere, & ille processus & vasa spermatica debent in sua cum ætate adhuc ingrossari. Itaque debet in illa strictura proportionari crassitudini, quam processus, & vasa illa sunt habitura in adultæ ætate, ut illa nimirum tunc adhuc sit satis libera & laxa in ætate prædicta, quia illa vasa non amplius crescunt. Possit si lætio proportionari crassitudini processuum, qui tunc est. Filum illud autem debet ibi tota viâ relinqui, & vulnus factum debet desuper uniri, ac consolidari, modo quo alia vulnera curantur. Postmodum debet æger adhuc 20. diebus in lætio contineri, capite demisso, & pedibus in altum elevatis, ne intestina contra partem lauciam, & à lœsione & contractione debilitatam incumbendo, eam dolore, & inflammatione afficiant. Caput vero ad hanc rem filum aureum potius quam alterius metalli, quia illud est imprimis valde flexile, & ideo aptissime accommodatum, ad illa facile introquendum. Secundo illud metallum in corpore remanens non corumpitur, nec putrescit, nec eruginem contrahit, nec maligna qualitate afficit partes, quas attingit. Et hæc modus est propriè dictum punctum aureum.

Secundus modus puncti auri est, qui sit ferè eodem modo, sed non omnino. Dissert autem à priore, quod filum, quod circumducitur, processui illi peritonæi, ad eum constringendum, non relinquatur in corpore, sed postea educatur, qui modus à nonnullis ideo est excogitatus, quod putrem, malum esse in corpore metallum aliquod, aut aliquod naturæ nostræ heterogeneum, in corpore trahitur. Incidunt ergo in linguam, ut prius, & processui peritonæi vel vaginali, eo modo, quo antea dixi, uno tantum ciculo circumducunt, virgulam plumbeam, & quantum sufficit coarctando intercurrent, & simul extrema virgule, quæ longiora esse debent, extra vulnus pendere sinunt, eum æger in lætio continendus expectant, donec naturam in loco coarctato jam callum duxisse verisimile sit. Cum hoc factum arbitrantur, eam virgulam plumbeam iterum evolvunt, & explicant, & blande exaltant, & tunc vulnus consolidant, & tunc hæmia est curata, hæc nempe ratio, quatenus in loco illius processus vaginalis, ubi coarctatio à filo plumbeo facta fuit, est à natura productus callus, qui facti quæ processum non ampli possit dilatare, & intestina non amplius possint per illum (ultra locum, in quo callus generatus est) protrudere, qui callus non potest à natura produci, si processus ita laxus permansisset, & si locus per circumductum ejusmodi plumbeum, filum non fuisset sic coarctatum. Ideo autem hi capiam filum plumbeum & non aureum, quia plumbeum adhuc est mollius & ideo postea tilius exaltatur, & educitur, quam filum aureum. Verum multo non placet ille modus, qui imprimis per hoc, quod filum aureum in corpore remaneat, nihil mali potest corpori inferri. Videmus enim aliquos globos plumbeos multo rotæ viâ in corpore sine noxa gerrare. Secundo, quia non puto per ejusmodi callum induratum, sufficienter hæmiam curari posse, præcipuè, si magna sit: nam incumbens de quo

magnum illud intestinum pondus supra calli locum, eum facile estringere possit, neque videtur, quod callus semper tam fortis generabitur, qui pressu incumbentibus intestinis resistere.

Est & tertius modus filii auri, quem ex Paræo vobis tradam, & est talis. Incisio fiat super os pubis, in vulnus imponatur specillum simile cannula. Illud specillum per foramen sub peritonæi præcessu, secundum ipsius processum longitudinem impellatur, tum stringendo specillum, diuellatur eo dictus peritonæi processus, à vicinis, & fibris, nevisque partibus, quibus adhaerescit, mox & spermatica vasa à cetera mittere, restitenti musculo, abstineant. Quibus perfectis, Chirurgus ipsum processum testium adducat, ejusque quantum laxius est, exiguis, & laxis retractoribus, foraminibus in medio prævisis comprehendat, atque acuta duplex filum ducere transiagat, proximè prope vasa spermatica, & cremasterem testiculæ munitum, sed de iterum ducenda erit acies in ejus, quod ex processu peritonæi restat medium, una cum pechente vulneris labris: tum arcto modo filum restringendum est & postea perferendum: sed ipsius tantum restringenda est, quantum satis est, ut exitorum à vulnere pendat, illud filum partem sensum ex le dissolvant, nec vix ante abstrahendum, quam notata in ligaturæ locum carne generaverit & repositur, illas frustra omnis labor. Inde vulnus detergendum, carne implendum, & cicatrice obducendum, cujus callosa duntaxat lapsus iterum intestino, vel omento obstat. Hunc modum illis verbis describit Paræus, & ponit in modis puncti auri, quarev propterea nota sit punctum aureum, sed ab eo multum diversum. Id tantum omine puncti auri appellatur, quod sic sine exemptione testis, sic ut punctum aureum, & quia in hoc cum puncto auri convenit, quod sicut in puncto auri processus ille peritonæi, seu meatus vaginalis, in quem ruptum, vel laxatum, intestinum, vel omentum incidit, mediante filo aureo circumducendo, stringitur, & moderata strictione coarctatur. Ita in hac operatione, idem processus primo mediante sutura, postmodum vero callo in futuræ locum succedente arctior fit, quæ actione fit, ut omentum & intestina non amplius per eum incidere possint. Verum Paræus hanc modum valde obscure describit, & multa sunt, quæ vix intelligi possunt, nec ipse intelligit. Interim tamen notandum, quod hæc sit summa operationis, nempe ut in inguine oblonga læsio fiat, donec processus vaginalis detergetur, cum est directus aliquo specillo seu instrumento, à vicinis fibrosis partibus blande abducitur, cum est abducitur, videtur quantum processus ille excidit in laxitate, vel ubinam sit ruptus, & quanto sit meatus ille laxior quam debeat esse, aut quam pro transitu spermaticorum valorem requiritur, in quanta parte laesura excedit, in tanta debet mediante sutura corrigi, sic ut sufficiens tantum portio cavitatis restet, per quam liberè spermatica vasa possint deferri, sic ut non sit totus processus laceratus, aut futura occidendus, sed tantum aliqua portio unius lateris ipsius. Ut autem futura illa commodè fiat, debent vasa spermatica, quæ in isto processu sunt, ad unum latum illius processus seu meatus adduci, nempe ad latus quod non debet fuisse, ne ab eum pungatur. Tunc portio ejus quæ superflua est in laxitate debet apprehendi, & attolli, & conjuncta una cum labris vulneris, aut cum ipsa cure sui cum filo serico, ejus extrema extra vulnus pendere. Sutura facta, tam diu æger in lætio detinendus est, donec filum putrescat, tunc in locum iterum à natura generatur callus. Callus, in illa portione superflua laxitatis ipsius processus productus sit, ut ille processus

fit strictior, & quia sic strictior factus est, fit, ut omentum, & intestina pro ipsum non possint amplius decidere, callo nempe transsum impediante. Verum quia totus processus non est sic factus, nec callo ocellus, sed tantum portio ejus, quæ erat superflua in latitæ, aliqua vero portio ejus est relicta, & non contracta, & conqueperit, in ea callus non est factus, ideo per illam possunt vasa spermatica libere transire; Ergo per hanc operationem hoc efficitur, ut ille processus peritonæi pro tanta solum portione restringatur, pro quantâ erit nimis laxus, quo fit, ut hernia creetur, & tamen semina vasis transire non impediatur, atque hi sunt auri puncti, omnium hernie sectionum modi.

Modo quaeritur, an hæ sectiones in viris tantum, an vero etiam in mulieribus locum habeant? Videtur enim, quod non habeant locum in mulieribus; quia hæ sectiones maxime sunt pro hernia scroci, ea autem mulieres non laborant. Secundo omnes hæ sectiones sunt pro hernia, quæ fit ab omento, & intestinis incidentibus per illa foramina peritonæi, quæ sunt in inguinibus, per quæ vasa spermatica extra peritonæum ad testes extra corpus pendentes feruntur, & sic tantum oro illa hernia, quæ fit ab omento & intestinis in processum illam peritonæi à diâta foraminibus ortum habentem, & usque in scrotum, per modum canalis pendentem, decidendibus; atque illa foramina peritonæi, & illi processus non videntur in mulieribus esse; Ergo illis hæ sectiones, quæ pro tali hernia sunt, non videntur locum habere. Quod talis portio testis, & foramina in mulieribus non sunt, docet Vesalius c. 2. l. 5. & ratio videtur suffragari; quia illi processus, & illa foramina tantum sunt facta, ut per eos deducantur vasa spermatica, extra corpus ad testes, quæ testes eorum interius latent, ergo non sunt in illis foramina illa aut illi processus. Verum respondeo Vesalius in eo errasse, ut Columbus, Fallopius alique notaverant, quod mirum est, & ideo dico in mulieribus etiam illa foramina & illos processus peritonæi esse, verum per illos non deferuntur in eis nec spermatica, nec deferentia vasa ad testes, sed uteri masculi, cremasteres, & sic quia illos processus & foramina etiam habet, ideo quoque in eis hernia illa, quæ ab omento & intestinis, in illos processus delabentibus, fit, contingit, quæ hernia in illis, tamen non est hernia scroci, cum scrotum non habeant, sed tantum, hernia inguinis. Verum cum hernia inguinis eodem modo, & ab eadem causâ fiat quæ hernia scroci, & hæ sectiones etiam in heria inguinis locum habeant, etiam hæ sectiones in curandâ mulierum herniâ locum habent, Thom. Fimus de præcipuis Artis Chirurg. controversiis.

De Herniâ sic scribit Clariss. Anton. Nuckius in suis Experimentis De Herniâ Umbilicali.

Vas umbilicalibus infans, jam in lucem editi, minus bene ligatis, an non ita ut decet, compressus, & umbilicali vinculo munitis, sanguis motu particularum intestino, vasorum latera transopere distendit, ut Umbilicus iode generetur admodum deformati, membrum potius virile referens, quam Umbilicum.

Aliquando ab aliâ causâ, quibus Enterocœle ortum debet, Peritonæum extenditur vel dilatur, idque quidem eo in loco, ubi in abdomine concursus vasorum umbilicalium conspiciuntur. Hinc status, vel Omentum, vel Iostini illi portio umbilicum subit, eumque distentum repræsentat.

Leviori itaque digitorum compressione, Umbilicum distendenda versus Abdominis cavum (quod facili communiter peragitur negotio) propellantur, Umbil.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

licoque prominens jam compresso, *Emplastum ad Rupturam* unâ cum lamina plumbea, vel eoil crassiusculi particula, cum linteo ter quaterve duplicato, fasciæ opè jejuno vnticulo applicetur, eoque in statu continetur tandem, donec fibræ Umbilicali viciniores contractiores reddide, umbilici proidentiam impediante.

Hinc nihil juvenibus, Umbilicus compitendus, & vicina Abdominis cutis portio levioribus icsarificationibus vulneranda, labilique vulnusculeorum *Emplastris Glutinosis adductis*, ad cicatricis perducenda erit, ut ita fibræ laxiores ante, jam contrahere, Umbilici prominentiæ obtineat.

Si verò nec his cedat malum, ultimum refugium erit (propulso in Abdomen intestinio aut omento) Umbilicum prominentem, filo serico triplicato cerâ obducto, decenter ligare, ligaturaque extra ligaturam relecare. Hemorrhagia sectionem subséquens, *Petræo Cyprino* stillat; quâ sedatur, leviori *Hyssico* unâ cum *Emplastro applicato*, filii separationem, Umbilicique consolidationem brevi spectare licebit.

lo adultis autem & corporibus cacædibus ab hac Operatione manus retrahat.

In obelis *Hernia umbilicali* notabile aliquando sumens incrementum, nullo melius & rectius comprimitur, quam (apposito prius cerâ) Cingulo umbilicali ex linteo duplici gossypino parato, quod ea parte, quâ umbilicum tegit, scutum cutiusculam obtinet, in cuius centro prominentia apparet, quæ in dilatatum Umbilicum sepe insinuando intestini, omenti, flatusque exitum prohibet: quale Cingulum describit *Sculetus in Armamentario*.

Quod si relaxato aut neglecto Vioculo, vel alia de causâ ex improvviso major intestinorum portio Umbilicum subeat, & excrementa in eadem hærentia iustâ duriora testitronem impediunt, Umbilici cutis erit incidenda, & dilatam foraminis intestinum reponendum.

De Hernia Inguinali.

Non raro casu, saltu, ponderis gestatione, vomitu enormi, tussis gravi, motus corporis vehemenniente, intestina versus inguen prolabantur, unde Hæc species oritur, quæ *Bubonocœle*, *Enterocœle* sive *Hernia intestinalis* appellatur.

Hæc amen vel uno ictu & actu deteponit, vel scotum producit. In priori casu licetrum, n posteriore vero traxatum & extensum esse Peritonæum, sunt, qui asserunt; oos verò in utroque casu relaxatum solummodo invenimus.

Ubi repente oritur, & intestina prolapsa durioribus fecibus statim distenta conspiciuntur, intestinum illud collitui debet, quod si negligatur, funesta symptoma, dolor videlicet atrocis, excrementorum vomitus, inflammatio, gangræna, & substantia mors plerumque subsequuntur.

Hoc itaque in caso æger supinus, capite declivi; genubusque sorsum prot-osis, collocandus; quo modo sua sponte prolapsum intest. num aliquando intratum recedit aut leviori manû compressione in Abdomen repellitur.

Si verò status aut excrementa obstant, lege aliquod alvum laxans offeratur, aut Clyster emolliens injiciatur. Quibus nihil juvenibus sequens applicetur cataplasma.

℞ Radic. Alth. ʒ ij ʒ.

Herb. Malv. Mj.

Visier.

Parietar.

Flor. Chamœmil.

Mellis. aa. M. ʒ.

Parf.

Forsitis Mj.
Cog. ex Ag. Comm. fustilique
Expressione; Adde
Farin. Herd.
Falar. aa. ʒij 6.
Lini ʒij.
Ol. Rosar.
Lilior. alb. aa. ʒj.
F. Cataplasma calide applicandum.

Balnea ex Lacte dulci, Ag. commun. in qua Herbae emollientes sunt coctæ, ut & linimenta varia externe calide applicata, magnum habent usum.

Intestino jam restituto, *Emplastique stypticæ Crostii*, aut ad *Rapt. Fernel.* applicato, fasciis vineisliquis commodioribus, tamdiu detinenda intestina, usque dum Peritonæum aut consolidatum, aut contigatum fuerit, quod in infantibus sæpe semper felici peragitur successu.

In adultis sæpe periculum in mora, potissimum ubi præscriptis medicamentis intestinum non statim restituitur, hinc Mannas Chirurgica sequenti methodo Operationem aggrediat, maximopere erit necessarium.

Agro decenter collocato, omnisque incisione factâ, externum Peritonæum, quod intestinum includit, in conspectum prodit, quo item incisio, intestinum sensim & prudenter repellendum. Nonnunquam tamen partes trium musculorum Abdominis tendinosæ, transversales scilicet, oblique ascendentes & descendentes (quæ in linguine angustum quasi hiatum formant, ut via, sed obliquâ, Vasis Spermaticis transire præbent) adeo angustæ sunt, ut sine illarum dilatatione intestinum restitui non possit. Ad viam itaque hanc dilatandam, *Specillum Excavatum* introitur, factique biatus incisione, intestinum in abdomen propellunt. Cavendum interim ne intestinum lædatur, nec incisio nimium extendatur, cum alioquin facile vas aliquod arteriosum lædi posset. Tutius ideo erit anulum digito eo usque dilatare & expandere, ut intestinum prolapsum reponi possit. Si verò contingat, intestinum atque in tantam molem esse distentum, ut commodè restitui non possit, vasis in locis subtiliori acu erit perforandum.

Reposito itaque, ut dictum, intestino, hiatu, ad cicatricem fortissem obtinendam in circumferentia scarificandus, vulnerique turunda vitello ovi illius immitenda, & applicatis plumaceolis atque compressis deligatio instituenda.

Aliquando eodem modo ac intestina, Omentum probabitur. Qui affectus, Hernia Omentalis sive Epiplocele appellatur, minus est periculosus, adeoque ad aliquot annorum spatium sine notabili incommodo patientes eundem ferre possunt. Alioquin factâ, ut ante Peritonæi dilatati incisione, & ligata prius inflectâ, omenti prolapsi resectione, haud ita difficilè restituitur patienti.

De Puncto Aureo.

Præcedenti Operationi commodè annectitur illa, quæ *Punctum Aureum* dicitur, quæque instituitur, quando intestinum restitutum continuò iterum in serotum prolabitur. Agro itaque ut decet locato, & intestino, cutis incisione factâ, ad interiora propulso, instrumentis separatim obfusori, aut unguibus Vasis Spermaticæ unâ cum extenso Peritonæo (quod hic vaginæ instar sese habet) à vicinia paribus separanda, acutisq; filo aureo instructa per ipsius vaginæ lacus prope inguē, illius Vasis Spermaticæ, transmittenda, filumque eo usque adducendum, ut viâ hoc modo angus-

tatâ intestinum produbi non possit. Non tamen nimis contringendum filum, ne simul Vasa Spermatica contringantur, sanguinique per ea circulanti viâ præcludatur. Factâ contractione fili extremitates Forcipis ope interquendæ, ut culpidibus suis partes vicinas, ipsiusque processum, sive Peritonæam extensum ledere non possint.

Præterdictum filum, alio Serico quadruplicato, aut Lignâ lineâ, cujus extremitates extra vulnus pendulæ relinquuntur, paulo supra Autem ante nominatum, processum contrahere aliquando solent, ut hoc modo Peritonæum ampliatum angustius reddatur, intestinumque alias prolapsurum, duriori stractû patienti principio nec molestum, nec dolorem creet.

Quo facto Turunda Digestivo quodam obita immititur, & apposita Compressâ Vino albo calido imbutâ, unâ cum Fasciâ vulnus ad cicatricem perducitur.

Hæc tamen Operatio in adultis tantum locum habet; Infantes enim Faciaturum aut Brachetorium ope haud difficilè restitui possunt.

De Testiculi Extirpatione, sive Castratione.

Si præcedenti methodo instituit, minus cetera videretur Operatio, vel Testiculorum alter corruptus, Scirrho aliquo caneroso, aut excessivâ carnosâ obfessus fuerit, affectum Testiculum simul & semel auferre, tutissimum erit remedium.

Agro itaque firmius ligato, quo minus se movere queat, Chiturgus, factâ incisione lentè processum separaret, eumque unâ cum tunica vaginali (cui Testiculus includitur) ex seroto extrahat, & acutis, filo serico fortiori & cerato instructum, prope inguē per processum traducat, traductam bis circumducatur, atq; conerhat, & nodum duplicatum (ne decidat) imponat, fili verò extremitates extra vulnus propendere sinat. Tutius autem ut succedat Operatio, alterum filum paulo supra primum circumducatur; Forcice denique Testiculum abscindat, vulnusque ut supra dictum obliget.

De Hernia Aquosa.

Non raro contingit aquarum mole Scrotum aut ea parte aut in totum mirè se distendi, quæ distensio vel Akitem vel Vasa Lymphatica Testium disrupta, antecedentem causam agnoscit.

Dignoscitur hie affectus ex tumore, & transparentia, nonnunquam dolor quoque adest. Si Akitem concomitatur, mane nonnihil Scrotum detumuisse apparet: Si verò à Testium Vasis Lymphaticis disruptis originem ducit, Scrotum æqualiter distentum manet.

Hæret autem aqua vel inter Scrotum & Tunicam vaginalem, vel vaginalem inter & albuginam.

Præmissis generalioribus quibusdam internis remediis, externa quoque conducant, inter quæ primum locum obtinet *Radix Bryoniae conursa*, & *Spiritu Feni* itrotata calidè admota. Vel Fortis & Cataplasmata ex Cephalicis, calefacientibus & penetrantibus parata. Vel seq. Empl.

ʒi. Emplast. de Cumin.
Mellis.
Rolis cum
Merc. aa. q. f.
M.

Quibus nihil juvantibus, ad manuum Operatiorem confugiendum, quæ triplici instituitur methodo: Aut scilicet, *Lavetia*, & *Cantorio Pæmiali*.

Galli

Galli Cauterio magis, quam Nostrates utuntur, radiūque Acu Operatio peragitur. Vulgarissima namque methodus est, quæ Lancetâ abolvitur.

Facili Lancetolæ ope incisione, aqua statim tivosâ prodit, quam (si in ipso Scroto extravasationis ejus causa lateat) simul & semelentrarethe licet. Si verò ab Altre origine traxit, prudenet procedendum, parti-ijque vicibus aqua evacuanda erit.

Ubi foret tunicam vaginalem & albugineam aquæ collectio observari, lancetâ inimicius erit adigenda, alioquin ne poterat aqua exiret.

Evacuacione peractâ, volnus, immixtâ turundâ &c. ad cicatricem perducere oportet.

Quod si vas lymphaticum, semel diruprum, inducâ cicatrice denod lympham eructet, singulis sequentibus annis semel operationem reiterare licebit, quemadmodum tales novimus, si quibus eum successu quotannis infiliuntur. Si verò operationem toties repetendam, ægrè ferat patient; testiculos necessariò extirpandos erit, quod ablatâ lymphæ stillicidium certò cessabit.

Consultationes.

De dolore colico & herniâ Bubonocœle. Pro Illustriſſimâ Matronâ Anglâ.

Dolor ille, quem à multis annis in ventre inferiori non raro recurrenter patitur. Nobilis Matrona cum nausea, vomitu, & adirictione alvi, quinque aliquando annexum habet tumorem insignem in inguine dextero, eumque valde dolorosum, & insensibiliter evanescentem, alioquin non est, quàm colicus, excratus à flatibus in intestino colo conclusis, & præsertim in regione ejus dextra, ubi facta peritonæi dilatatione, ex prolapsu intestini huius, illa herniæ spurie species suboritur, quam Græci bubonocœlen vocant, quæque plurimum sponte subsideret, ubi primò statu diffuso, inopinare recidit in naturalem situm. Plurimæque hæc materia elevatur ab humoribus crudis in ventriculo genitis, imbecillitate reddito cum ob errores præteritos, tum de magis ob intemperiem frigidam, & humidam ejusdem ventriculi.

Affectus equidem coratu difficillimus, cum sit antiquus, & confirmatus, qui propterea, nisi congruis remediis occurratur, vel ipse cum hydropem detinet, ex Hippocrate 4. Aph. 11. vel in paralyticis, populis Testimonianis familiarem: vel iliacam saltem passionem, propter nauseam, & vomitum in dies graviores facit. Propterea medicis prædictis tentandus est.

Ac proinde præmissa universali corporis expansione blandioribus lenientibus, præparantibus, & purgantibus, attenuandis, incidendis, & evacuandis sunt homines peccantes, status discutendi, ventriculique & intestina calefaciendibus purgandis variis præfidiolum materiis.

Propterea si nobilis Patiens hæserit Patavii, totum hoc negotium absolvetur aquali Thermalibus, primo Terentianis, cum melle ros. fol. telidæum assumptis. Hæc enim sua lalacine attenuant, detergeat, & evacuant materiam peccantem per alvum; deinde aquarum Apontianarum interius ulu, & exteriori forma stillicidii administratis: discutiunt enim status, & intemperiem corrigent, calefaciendo, & exsiccano. Quod si alibi locotum erit Medicorum se commisitit, tunc decoctum præscribi poterit, præmissa semper universali purgatione, quod parabitur ex fistulas, tamarisco, seminibus feniculi, croci in inter Galli junioris salis, præmisso bolo ex castoreo, & Theriaca antiqua, interpo sitis clysteribus attenuantibus, & detergentibus, & de disculforia ex melle ros. fol. electuario de benedicta laxativa & de bacis lauri, cum oleo rutaceo, & de

coctione cymini, feniculi, otriusque centaurei, & florum chamædii. Conferret quoque summo pere familiaris usus specierum Herniæ simplicis, & ad quando Herniæ Archigæni, cum castoreo, additis à propietate juvantibus; qualia sunt lotellinum lupi exciscatum, avis Galeris usque, & in cinerem redacta, ad unc. 1. hæc tamen lege, ut ligaturam sibi cuncti patari herniosis familiarem, cujus beneficio compellat continuo declinat dextra para, quæ intemereceter solet, metu citi, volvuli, à quo præsentia imminet periculum, si ea solutus fuerit. Pro ventriculi corroboracione vinum generosum abstinuit, ex uso erit, vel aqua vitæ, cum cinnamomo, si buccella panis prædictis interiecta summo mane singulis diebus sumatur, mensis cicet spatio, & alvus continue lubelica servetur pilulis de herna cum agarico.

Ceterum congrua victus ratio instituat, omnia placenta, lacticiis, limacibus, piscibus palustribus, aliisque omnibus saculosis, & crassis succi, ac difficilis coctionis. Bened. Silvatici Consil. & Respons. Med. Cent. iij.

De Herniâ Sarcocœle, Tumore lienis, & Dole ad os Coccygis. Pro spectabili Mercatore Vicentinâ.

Ingenius juvenis, temperamenti calidi & sicci; gracilis, octo abhinc annis gonorrhœa violenta menses aliquot laboravit, quæ alexipharmacis extioctis, aliud nullum symptoma Gallicum ab eo tempore se prædedit. Nunc vero de tribus alvi potissimum affectibus sunt querelæ, tumore scilicet insigni, duro, & doloris experte in hypochondrio sinistro, in totum fere inferiorem ventrem diffuso, & quidem à pueritia, minori licet. Hic accessit ab anno tumor alius in inguine sinistro, propagatus ad sinistram testiculam, qui sensim ad magnitudinem ovi antieris excrevit, dolorificus antheas, artolens & subdens, nunc vero consistens, durus & doloris experte. Accedit & dolor ab eo tempore in articulo sinistro femoris, mox circa os coccygis, ubi nunc continuus cum torquet, licet non acutus, invalescens tamen per vices, cum potissimum equo vehi cogitur. Copiosa insuper illi fuit elapsio anni exspulso materie aqueæ, quæ nunc omnino fere nulla est.

Ex enarratis constat tres esse partes affectas, lienem scilicet, testiculam sinistram, & postremas dorsi vertebra; quarum & variis sunt affectus. Lien siquidem afficitur tumore scilicet thoso, duro, doloris experte, ad inferiorem declivi, amplo, totum fere abdomen obducens; qui sicuti in pueritia ortum habuit ab heterogenea materia, crassa, & melancholica, à febre diuturna superfluit, & cruditate puerilibus annis coacta, ob errores in victu, ut nunc senium adeo excrevit, & continuo hujusmodi materia puerilis & melancholica confluxu, ut in scirrhum verum, & legitimum obducitur; ad inferiorem declivem, ea mole, & amplitudine quæque verum, cujus Hipp. meminit 2. to 6. Epid. 34. his verbis: Lien durus, non superius, sed inferius, latus crassus; ut propterea non comprimat diaphragma, ac proinde respiracionem gravem non efficiat, sed decumbente saltem ægro in laus dextrum, pondere quodam sit molestus. Testem aorem sinistram tumor occupat carnosus, sarcocœle à Græcis mucopuræ; vel porius scirrhosus, amplius, ad lividum vergens, ab hujusmodi materie heterogeneæ decubitu, per vasa spermatica ad partem afficiam; præpollente tamēo melancholia, ut ex colore patet. Dolor tandem

primo ischiadicus; mox circa externam spinam, seu os coccygis, causam habet catarrhum, à capite calido & humido ad partem affectam ex frequentibus equitationibus imbecilliorum decumbentem: qua protius ratione Hipp. ævo Scyri's contigit, ischiadi opportunit ob equitationem continuam.

Quorum affectuum alii sunt incurabiles, alii difficillime curationis; quam alii admittere possunt. Incurabilis est scirrhus levis; quippe auribus, & confirmatus, ex Gal. 1. ad Clisc. 4. ubi de Scirrbo; nec solum incurabilis, sed hydropem quin etiam minatur, ob consensum jecoris. Non tamen propterea medius prædixi superferendum, præservationis saltem causa.

Præmissa itaque totius evacuatione, nrispanda erunt emollientia, ærenantia, & sensibilibus, ac insensibilibus evacuatione, quorum ope dolosi quinetiam coccygis occurrentis, ratione autem sarcocoles putrescentibus, & sensibilibus evacuantibus utentur.

Leniatur autem alvus melle ros. sol. & syrup. de polyopido composito, cum decoct. cord. Præparentur humores oxymel. simpl. syr. de pomis, & melle ros. simplici, cum decoct. betonicæ, fumarie, lupulorum, agrimonie, & cetrach. cum decoct. betonicæ, fumarie, lupulorum, agrimonie, & cetrach. Purgentur demum agarico trochisc. & foliis fenæ; in decoct. cord. infusi, addito syr. de polyop. compos. & manna electa. Reperatur mox ipsorum præparatio validioribus attenuantibus, incidentibus, & emollientibus, puta syr. de fumaris composito, de pomis composito; & byzantio cum aceto, addita decoct. radicum feniculi, asparagi, corticum radicum capparium & althææ, præmissa diachm. 1. ammoniaci, boli furmæ, assumpto alterius diebus decocto epithymi Metuea loco prædictæ decoctionis: quorum usus erit novem dies. Reperatur tandem purgatio exactio heliebosi nigri, confect. hamech. & elect. lenitivo. A quibus jus galli antiqui ex usu erit, sic paratum.

℞. Corticum radicum capparium, frazini, asparagi, an. unc. sem. radicum enulæ campæ, feniculi, malvæ, an. unc. i. seminum castoli sancti cymini an. unc. ij. incidentur incidenda, contunduntur contundenda, & immittantur in ventrem galli antiqui, flagellant, deplamant, & viscerant, atque decoquantur in sibus xij. aquæ fontis, & tribus libris aceti, lento igne, ad perfectissimam carnis cocturam, addito splene bovis minutim concisio; factaque fori expressione, subfidentia, & colatura serventur ad usum; cujus singulis matutinis horis assumantur unc. v. cum decem gurrulis chalybis potabilis, præmissa diach. 1. ammoniaci, viginti dierum spatio; usurpatis interim clysteribus ex crassiori jussu parte, cum mel. ros. solut. oleo chamæmel. & decoct. catinativa; præscripto exercitio duabus horis ab epoto jure; atque applicato lini cerato ex ammoniaco dissoluto cum aceto & succo herbe regine. Cui parvi apprimere quinetiam conferent lura emollientia Divi Bartholomæi in agro nostro; vel stillicidium ex oleis chamæmel. anethino, liliotum, rutaceo, & laurino. Ceratum Rhui item 7. ad Almanfortem, omnibus scirrhis accommodatissimum, sic paratum.

℞. Bdelli, ammoniaci, galbani an. partes æquales, oleo irino, vel liliotum alb. emolliantur in mortario calido; deinde adde mucilag. fenugrec. & sem. lini, ad pondus omnium, æque additis caricis pinguibus, fist emplastrum, applicandum præmissis somento ex decocto malvæ, althææ, & fenugreci. Sudor autem tunc temporis excitari poterit in aquis Thermalibus, vel in fovea, ad umbilicum, usquequo discutiatur

tur materia in extremo spina impacta; applicato dein de cerato sacro, vel citrino. Sarcocole licet difficillime est curationis; ad quam nihilominus commendatur quammoxime à Marthiolo rdx ononidis pluribus mensibus assumpta; cui tamen præferret curationem Hieron. Fabricii ab Aquapendente, libro primo sui Pentateuchii Chirurgici cap. 29. ut nempe altius potestis tumor in medio sacro, dummodo hernie carnosæ accedat aqua, & deinde immittatur turunda longior, medicamentis pus moveret oblit, puta Terebinthina, cum thure, ovi vitello, & butyro; superaddito emplastro de melliloto, vel diachilo, primo cum butyro, seu de pinguedinibus, mox ex gummi pararo, idque plures dies, absque puris evacuatione. Hoc enim cicatrix pus, atque ita per partes puretfect tota caro superflua; excutata deinde, & cicatrice obdusa parte. Quod si non observetur aqua, superferendum erit operatione illa; siquidem live secto fiat, live non, res periculi plena est, folaque perforatio gangrenam inducere possit. Atque hæc in medium attuli; patientis precibus potius satisfactus, quam de ægri valetudine ulla spe concepta. Idem ibidem.

De Herniæ Enterocæle. Pro Nobili Ragusæ.

Tumor ille, quo laborat generosus patiens in inguine dextro ter abhinc mensibus, alius non est, quam qui à Græcis σκῶν, à Latinis verò Hernia nuncupatur. Cujus cum plures assignentur differentie, epiplocele scil. sarcocæle, hydrocele, phyllocele, & enterocæle; pro varia materia eam producente, omento scil. descendente vel carne adnata, aqua, fluxu, vel intestinis ipsi; hæc species enterocæle censenda est; cujus utpote causa est intestinum extra peritonæum protuberans, in eam quandoque molem, quæ manum compellam æquet. Est tamen imperfecta; intestinum non prolapsur in testem, vel foris, sed hærent in inguine; quo nomine à parte affecta, bubonocæle nuncupanda venit.

Cujus causa est statum, & humorum pituitosorum copia; qui ætate in ventriculo coacervati, ejus dolorem, nauseam, & vomitum induxerant; atque ad intestina, & peritonæum decumbentes, hoc potissimum dilatato, & laxato, illapsum intestinum ad inguina, tumorem in eo excitavit, doloris, ac sensum intestinentem ex ingressu; quod sine non contingeret, ex rupto peritonæo; quinimo intestinum confertim protuberaret, nec tanto cum dolore. Causæ autem producentes hanc pituitæ copiam, sunt eructus in victus ratione; cum decubito materiæ catarrhalis à cerebello humido ad ventriculum; quæ vero eandem in ventriculo genitam ad intestina propellant, sunt magno sonamine concitata vomitus, exercitia violenta, & equitationes, verbo, eructores externi.

Quæ cum ita se habeant, quoad essentiam, & causas præteritis affectus, si de prognostico sermo sit; quamquam herniæ in adultis plerumque sint insanabiles; de hoc tamen in bona spe sumus; nec difficilis forsitan negotio, cum quia recens est, tum quia imperfecta, tum potissimum, quia levis, tumore vix conspicuo, compresso licet spiritum, nulli excitata, & adhibitis aliis conatibus, soluto cingulo; quamquam sensim excrescat, eam aliquandiu ambulavit discitudo patiens.

Curatio autem in eo sita est, ut excutatur, adstringatur, & roboretur pars affecta, prohi beatu generatio materiæ, quæ illuc confluit; vel saltem alio divertatur; præmissa totius cura, exigente usu: quod ideo monemus, quia forsè abunde fuerint externa, & quidem leviora præstidia.

Nunc itaque sufficiat, ex medicis prædictis, ce-
ratum adtingens magistrale, quod hic prostat
parti affectæ applicatum, obductum membrana per-
gamene, aceto imbuita, superaddito cingulo, con-
tinuo girando, cum accomodato victus ratione,
in qua abstineat ab omnibus cibis stulentis, &
crassi succi, quales sunt pascuæ, legumina, brassi-
cæ, lactarij, rape, cactance, carnes bubulæ, li-
porine, fuisse recentes. Vina item crassius substan-
tiæ, & recentia, aliisque huiusmodi. Quorum lo-
co pane oratur condito fomiculo, aniso; & cami-
bus aviculatum, cum cydoniis, vel diacydoniis vel
saccharo rosato, aut aliis huiusmodi cibis fa-
culente adtingente pollicentibus; idque duos, aut
tres menses. Quod si eo temporis spatio non cedat
affectus, ad generosiora deveniendum erit, de-
prompta ex Chirurgia, & Pharmacia, una cum
recta victus ratione præscripta.

In Chirurgia convenit missio sanguinis ex vena
communi dextri brachij, commendatur & fonticu-
lus in brachio sinistro, & si possit usus, insulto
partis affectæ, ad validiorem ejus exsiccationem, &
roborationem, quod tamen hec litiis ceteris.

Ex Pharmacia, leniatur alvus electuario lenitivo,
& speciebus blentæ; vel melle rosato solutivo, &
manna. Præparatus humore syrupo de mentha,
de betonica, & oxymelitis simplicij, cum decoctione
betonicæ, menthæ, feminum citri, & cichorii.
Purgabitur demum corpus medicamento jam præ-
scripto; addita portulacina agarici, & thabarbari.
A quibus utatur quatuor dies aqua Teruianis, ad
libras quinque, cum melle rosato solutivo. Hæpe-
ræctis, localibus internis & externis demum locus
erit. Interna erunt decoctum ex radice china, sal-
sa, & visco quercino, addito polygono, consolida
minore, bacis myrti, & capiteili, cum folijs plan-
taginis, rosarum, & portulacæ; cuius usus erit se-
mel in die, hosis maturinis, ad micas sex; præ-
missio bolo ex pulvere radicis figilli Salomonis, va-
lerianæ, mumie, & chalybe; tenuissime pulveriza-
to, exceptis syrupo de ribes, citato tunc sudore,
cum tenui victus ratione, & continuo decubitu
triginta & quadraginta dies. Externisque parti affectæ
applicabitis ceratum ex mastiche, albano, sacco-
collæ, sanguine draconis, mumia, & limatura cha-
lybis, cum aceto, & albumine ovorum, commen-
dantque ætus globulum ex charta pergamenâ aceto
macerata, supra partem affectam continuo ge-
statur, non neglectis caputpurgis, & lotionibus
capitis ex luvio dulci alterato betonica, agarico,
salsa, stuehade, rorematino, tosis, & corticibus
granatorum.

Victus autem ratio sit superius præscripta. Qui-
bus ad simulam observatis à Nobili Patienti, præ-
stam valetudinem ipsi spondere audent. *Idem
ibidem.*

Hernia ad Scrotum.

Adolescenti XX. annorum, temperamentis san-
guineo-phlegmatici, habitus mollioris, cum ante
biennium motu fortius ageretur & certatim fol-
sum quandam transiliendo fatigatus effec, domum
redux teneit in scroto præter gemellos testes tumo-
rem quendam indolentem sinistro latere emergere,
primum magnitudine castaneæ, hinc nucis, imo
pomi majoris, cum moveat imminuta promptitu-
dine; inde studiis diligentibus operam navans rarius
motu digressis torporem, cibis delectatus grossiori-
bus, brassicæ, carnium infusarum, suillarum,
leguminum, esu a iola fere ceteris contentus, ne-

Bibl. Chirurg. Tom. II.

que corpus æque à frigore defendens, sentit à patu
ordinarie dolore gravativum abdominis, ad locum
affectum protensum, inde vero tumor magis inflatur,
cum reothione & torminibus circa umbilicum, nec
prius conquiescit, quam desidendi vel decum-
bendi quoque detur occasio. Dolores idem à
diutina sessione & corporis inclinatione ac motu
continuat, tumor vero ab iracundia vel moerore in-
crescit. Decubitu longiori retrocedit & quasi nullus
est tumor, extraversio veto & caput quandoque do-
let. Petit Consilium.

Affectus, historia præsentis expressis hernia est;
generali nomine, speciali *oxyntica*, seu hernia scro-
ti dicta, quo ipso ab omnibus aliis speciebus, sub
uno eodemque genere militantibus, distinguitur.
Uti enim hernia, si latinam significationem, Sabini
debitam, spectemus, durum, monticulolum & as-
perum notat, proprie hoc loco in abdomine, in
proprie paulo in gutture ubi bronchocele audit, sua
originem græcam, ubi ramum significat, qui vide-
tur quasi protensus à trunco, res eodem recidit. Sic
utrumque hic visitur, tumor durus idemque aliun-
de velat ramus protensus.

Omnis hernia nomen sortitur vel à subjecto, vel
prædicato, quo ipso differentis specificæ confun-
gunt & intermiscetur statim. In nostro casu dum
herniam scroti, seu enterocelen dicimus, ab hernia-
quacunque locali alia, non minus ac duritie mo-
dis, ut hernia aquosa, canosa, struente, varicosa,
vel ipso nomine sit distinctio. Id vero ut ad di-
agnosin sic ad prognosin & curationem quoque
multum facit. Ruptura adeit, ut Latine alios vo-
catur rupta vel in consuetudine, vel in contiguitate
re, ruptura partis continentis *pericælonem*.

Demonstrat id ex utraque fontibus signorum
I. Essentialiter Inherente, seu *παθητικῶν*, tumor
mentis nescius, sique in se indolens & subsistens,
testibus gemellis contra in sinistro latere exortus,
de quo & hic valet, ubi tumor, ubi dolor, ibi
morbus.

II. Essentialiter Consequentia symptomata idem
confirmant, potissimum ex adionibus læsa anima-
libus, seu immunitatem movendi promptitudinem,
seu dolorem gravitatem ordinari à patu ad locum
affectum protensum, seu abdominis circa umbili-
cum tensionem & tristem sensum, seu hoc ipsum
quoque circa meningis capitis expressum spectemus.

III. Cause prægressæ subscribunt, & per alias
quidem saltus inimpedite institutas & frequen-
tas, ubi item grossiores & struente, corporis in-
frigidario & alia.

IV. Similitudo denique ultimum momentum ad-
dit, cum tali modo decumbentes hoc affectu labora-
re suppis quoque & torporibus notum sit.

Subjectum huius morbi est scrotum, si quidem
herniam ut tumorem reputemus, illud enim intum-
escit, sique in dimensionibus suis augetur.

Est vero & scrotum de horum genere, quæ ut
membranae conahi & corrugari, hinc & dilatari
possunt & solent per modum coarctatorum, qualia
quidem in aliis varia occurrunt.

Sin subjectum causæ lustrare velimus, non aliud
nisi peritoneum est, ejusque processus lateralis si-
nister. Proprie enim scrotum est subjectum reci-
piens, cum tumor præsertim hic non sit immanens,
non substantie scroti proprius, sed transiens, pro
illapso ponderis vel egressu.

Subjectum Adequatum sunt intestina, proxime
huic loco accumbentia & ordinariæ ab his thyma-
pylis seclusa, ut per mechanicam quoque potum

est, per minores canales concedi posse transitum peculiarem, citra adpersionem portam pro aliis quibuscunque. Hic verò amplius concessio spatii & ponderis suo prol-buntur mox intestina, & eodem ampliant sibi spatium, cumque mis & ipsa magis exarsa. Nominandum speciatim hinc ileum, quod & longissimum omnium & lubricitate magis ad exitum pronum, & quod palmarium est, ac ubi hanc regionem; illud cuius exiit, citra ullam *opponitur* quod proximam est, stidentibus vel cedentibus quoque superioribus.

Locus illapsum est processus peritonæi, quo mediante communicat cum reliquo corpore testes, extra monia quasi publica locati, latius illic valis spermaricis, & communis speciei ului & proprio testium dicitur. Processus concedit transitum his canalibus, & per accedens quoque intestina, facta hic locorum lectione particula, nam & plura alia dantur, & vicina inguntur etiam in vitia, ut ut minus constantem, ramicem sustinent non raro.

Causa Immediata est decubitus Intestinelorum laudatus. Omnes siquidem tumores materiale aliquid possident, quod velut causa continens eosdem fovet, quo ablato tolluntur & ipsi. Triplex talis cum esse possit materia, fluida, vaporosa & solida, posterior hoc loco accutanda est. Omnis enim tumor fovetur ab intestino hac delatante, idque immediate.

Causa mediata Proalio est extensio peritonæi inæqualis, Extensionem vocamus, ut hic satis fiat, quibus vel ruptura, vel relaxatio saltem in causa videtur. Medium hoc aliquid est præcipue morbo conveniens, & utrumque complectens. Nunquam fieri potest hernia citra extensionem, tamque inæqualem. Inæqualitas hæc propter herniam facit, seu protuberantiam; in statu enim naturali æqualiter obtensum undique, visceribus intimis ventris visitat. Si que extensio fiat æqualis, sive per ætatem, exemplo adultætam, seu per morbum, exemplo hydro-pocorum, nulla fit hernia. Ubique vero inæqualitas talis manifesta in extensio observatur, ibi eandem sedem suam figit, seu in umbilico, seu inguine, seu cetero, seu aliis quoque his illa abdominis partibus.

Ita enim cessat munus hoc non infimum membræ hujus, quo integumentum est proprium intestinelorum, quod cum musculis cum habent commune, sic illi extra omnem culpam suam, tum aliis in spatis definitis, & relaxatis & inæqualiter tensis eorumdem fibræ membræneis, tum in nostro casu inferiori ad pubem, quorum & moles intestinelorum reclinat magis, & ad exitum vasorum pro testibus perforatio datur.

Licet speciatim de muscolis laudare pyramidales, quorum ulus inter alia est firmare basin musculorum reliquorum & una processus peritonæi, ne tam facile laxentur vel tendantur.

Inæqualis extensio est tum absoluta & confidatata in se, ibi facta, quousum tendunt ut a lineum vis incubit, tam re-p-ève. Consensum eum in hoc anatomici & medici, dissimipi in hernia hæce tunica peritonæi internam, externam vero duratam relaxati. Id omne extensio inæqualis supplet & comprehendit.

Mediate causæ Remotioris etiam subeunt omnia ea, quæ quocunque modo extensioni huic & consequenti prolapsui vellicantur.

Temperamentum agri est sanguineum pigmaticum, cumulantis in corpore cruditatibus & impuritibus serolis aprum narum, & ob id laxitati maxime conveniens, imo partium dispositio mollior &

zator, concurrente causa violenta, multum ad hancnam conset.

Ætas consentit ipsa. Cum omnia ætas huic malo obnoxia esset potest, tum plerumque tamen iuvenes & pueri, ob turgentem tenaciorem, adolescentes & juvenes, ob licentiosam vitam & errores diæte varios, frequenter sibi hoc malum accerit, quod dæmo suo expertus non minus est æger.

Fiabius corporis mollior fibrarum minus robur ac carniū denotat, unde facilius labes oboritur potest tam ab interna humorum indispotione, quam ab externa infirmitate.

Ex non naturalibus accendendus venit Aër frigidus, qui & in genere calorem concentrando, potest: cuncta occludendo, insensibilem transpiratorem prohibendo, sanguinem coagulando, ad varios morbos corpus nostrum disponere potest, & speciatim intestinelorum roto intestus est. Inde statum provenit largissimus, ac exacerbatio ramicis. Videtur laxa quiete degere herniosus, simul vero aëri frigido exponit corpus, accendi dolorum faces, tuorem asperi, indurati, incarcinati, & mirari symptoma horrenda aliis. Idem longe magis fit in mollioribus, & tali temperamento, quali æger nostris gaudet.

Cibus & Potus magnum morbo addidit momentum. Cibi grossiores negotium faciunt arduo, minus obsequi calori & menstruo, *diætem & ruyum* instituentibus, nec prompte evolvuntur inde alimentarie particule, malum vero accumulatur retentientia. Pinguis, oleacea, leguminosa ex hoc censu sunt præcipua, fiabius producendis & gravandis intestinis aptissima. Ea hoc vero inflata magis, non continens spatio pristino, novum afficiunt, exuberant, prolabantur magis, ut contra ea si tenuia subsistant, contrahi amant magis secumque habere.

Intemperantia ergo in victu cum morborum genitrix, tum nutrix amplissima etiam herniosis onerosa evadit & lugubris. Eæcessus omnis talis cruditates, cruditates statum, statum tumores, tumores dolores, singula obstructions & iliacum passioem facile inducunt herniosis. Accidit, quod non vini potu cruditates corrigit fategit roborando sic calore, & præpendens fiabius. Tacemus inde quoque laxari magis debuisse vincula.

Motus gemino vitio accutandus venit, excessu & defectu. In promptu affectus causa est potissima, motus caecus, saltus citatus cum violentia conjunctus, quando certatim fossim transilivit plus vice simplicis. Vix ex adultis centesimus corripitur hernia, citra hunc tyrannum, ut in tenellis quoque motus sui generis tensivi clamorum, & jeditigationum malum hoc totu de producat. Motus talis hernie auctor est, tum ntu illo summo & conatu ad impellendum, unde diaphragmatis focum & fororians paritensum Interdicitur magis, facileque laxationem vel rupturam subit, tum pondere & mole corporis gravioris, quod ut non labatur, periculosam tamen quoad hoc concussionem patitur utrobique conjuncto violento impetu, quod sensus ipse testatur, si de loco in locum fossim transilivit quis, vel transilientem videt, abdomine non cincto vel muotro, nec corpore alias satis robusto, vel jam dum disposito.

In defectu peccavit vix illa defensoria, quæ affluui quædam quidem, eo ipso vero excrementa congerit magis, unde nec alvus responderi d-oir, nec transpirant fuligines serole, sed in grandulis stagnant & cum massa sanguinea remiscuntur.

Imo violentia hæc morali compuncta ad Causam Præternaturalem classem referri meretur, siquidem adu lædæ magis, node ut tussis, stragulationes vehementes, vomitus contumaces, alvi obstructions petriueæ, indeque orti nifus coactivi, ac plura alia hujus mali certissima auctora esse solent; sic & ipsa hæc exterior violentia.

A talimodi ac tantis causis productus affectus, non minusmodum est, quod sequentia posse se præstare symptomata, quæ signorum loco habita explicanda nonc veniant.

1. Tumor subitaneus fæciti notat præternaturalem contentum ibidem non natum, sed factum, & speciatim ab ingressu intestini per proceffum peritonæi.

2. Tumor sensim incretens primum castanet, hinc oculis jugandis, postmodum pomi majoris magnitudinem assequens, magis magisque dilatarum ductum ab incumbente volumine intestinorum, sicque per ruptum magis patientem designat.

3. Tumor indolens est, ob æqualitatem læsionis majorem. Dolor enim omnis inæqualitatem tensionis sequitur & conjunctus habet; quæ si adit, minor vel nullus est, quod per solutionem consensu in fieri & facto explicari communiter.

4. Imminuta movendi promptitudo adest, partim ob articulationem fæciti per accidens ac consensum læsam, ob tumorem sensum sensimque adactum, qui illam impedit; partim ob tensionem majorem, motu & decubitu gravium inductam, utrobique spiritibus magis fatigatis & impeditis.

5. Sentit ordinariæ pæni dolorem gravatum abdominis, ad locum affectum proceffum, ob chyli evolutionem & diuturnam & visper impediam, indeque consurgens fluxus dolorificus. Hi cum per intestinorum girometamina volvantur, ad locum affectum tanquam debilitatem pertingunt quoque, ibidemque magis exprimentur.

6. Tumor inflatio major, cum tensione & torminibus circa umbilicum, debetur inflationi & obstructioni; fluxus enim aduæti descendunt colon & reliqua intestina, distantia majus occupant spatium & pondere suo fibras intestinales vellicant, sicque tanquam in centro tistum sensum exprimentur.

7. Desiderati vel decumbati levamen contingit, cessante sic tendente pondere, & motu petistaleico seu circumperforatorio liberia succedente. Imo tumor sic recedit omnino, coactis ob positum hunc corporis pristino spatio, quo pondus extraversum minus.

8. Exacerbatio dolorum à diutina fessiope, corporis inclinatione ac motu continuato, eidem adscribenda tensioni, pondeti ac communioni intestinorum minus æquabili.

9. Tumor à motu animi & corporis incretens. Illud ob spiritus efforatos, viis minus patulis facilis in motu ordinario turbans; hoc ob pondus gravium lædorum intestinorum, ceteroque inobocorum, successione illa magis delabentium.

10. Capot quandoque dolet, extraverso nemote, cum ob vapores illos peregrinos, inæqualiter membranas afficientes, cum consensum nervorum fæciti parit.

Perillustrata nonc insigni hæc symptomatum turba, ad Prognosis facieus est accessus.

In se affectus hic nullum lethaltatis notum incurrit, intestinis loco quidem alieno exceptis, ibidem tamen non extra archet forum & imperium penis laris. Aut in adultis rebelis est, & sæpe incurabilis, ob indolentiam neglectus, sicque pro-

ductus uplurimum, præcipue vero ob inrepositam hiarui remoram naturalem, ipsi vasis genitalibus ad testes eunibus, & intestino illic p. n. inherente. Nulla vero solutio continui curari potest, nisi extantia quævis unionem impediencia tollantur vel removeantur. Accedit diuturniore mora velut callus quidam, sive consensu positus. Nihilominus remota illis ablatis, dicendis remediis, visi sunt etiam adulti curari, eademque spes ægro integra esse potest.

Ab altera vero parte metuendum est, ne vel raptosa negligentia reddatur major, sicque ad motum inconveniens dispositio, vel incaucata, obstericantia frigore, obstructione alitque cavendis. Incarceratam vero vocamus, quando intestina non tam quoad continentem suam tunicam includuntur hanc male mensionis, quam quoad contenta stylala, ut protrahi nequeant penitus, oculis ob tumorem & duritiem extraordinaria porta, qua eludari eadem oportet, sicque illa passione inducitur. Id enim si fiat, lethalis eventus accidere potest, quod tamen alios est loci.

Si, circa heroicam operationem ad remoram illam tollendam, cautio speranda fuerit, illud quoque longius temporis requirit spatium, unde *evacuatio facilis* solet & ad mortem ulque comitari. Id vero cum vatiet secundum præstidia proponenda, liberum fuit ægro, saluti sue cupido, eligere quod magis ex usu est: Est enim hic morbus ex genere illorum, qui dum facile feruntur, nec periculum innotant majus, servantur iis statim tolerabili, ceteroquin partim sanitati vel vitæ obiciunt.

Modus eventus erit ad salutem, vel in totum, repositis in pristinum locum intestinæ, inque eo de totis per deliquionem & applicationem emplastrorum fortiter agglutinantur, membranarum tunicarumve tono iobato; vel io tantum, ut cessent symptomata a malo exacerbato oriunda, ipsum vero conquiescat & inducias incolumitati relique præbeat.

Curatio innixa methodo medendi ad indicatorem modum instituitur. Curatoria pro diverso respectu variæ, mala enim, quæ molesta ac non ferant, seu non lædunt, suo modo sanitati quasi æquiparantur. Si ergo læsionem hanc intrinsecam, ex hujus regula vel ablationem completam medicabimur, curando intestinorum per lapsum bocce, vel incompletam, seu quasi talem, repulsionem & gestationem tolerabili solum procurata.

Præservatoria, causis lotentia, omnia illa attendere jubet, quæcumque vel tendere vel ampliare intestina possint, seu præcavendo, ne id fiat, seu auferendo fomitem imprimis fluxus.

Vitalis vires attendit dejectas, & tonum viscerum sibi restituit ac conservat.

Hanc in rem si consulas institutos fontes, Chirargus imprimis heriosis salutem, si aliqua reliqua, certissimam promittit.

Prima cura fit Repositiois, quæ facili quidem est, ut in nostro hoc casu, nulla incarceratione præsentente, sed ut constans sit, non æque. Altera, ut repositum maneat, longe potior.

Omnis igitur opes navanda, quo repositio intestini in abdominis cavatem rite & legitime fiat, alias deligatio ex voto non contingit, nec motus perversus inde contingit.

Ut melius illud fiat, æger supinus in lecto vel alio loco conveniente ponendus est, capite quidem decliviori, ceteris vero paribus eminentioribus, unoq;

elumbus pulvinar subijci potest. Hinc cratibus divaricatis locus affectus inspicendus, sensum & mollior contectandus, digitis & vola manus oleo amygd. dulc. momord. vel alio inunctis, donec insectum prolapsum sensim sensimque in suum locum reducat. Possunt etiam hoc sine limineo emollientia, ex argenteo, dialich. oleo ovor. aneth. bals. tramat. aliisque illini, ut lubricatis partibus & discussis flatibus facilius fiat introitus.

Ut vero repositum maneat, fusiendos 1. Decubitorum continuatur per aliquot hebdomadas, ut sic recubans pondere suo domi manere discat intestinum, & tempus concedatur coarctationi & consolidationi, quæ alias fieri minus potest. Facit hoc ad bene esse, si id æger velit & possit.

Observatum est idem non solum in hoc decubitu, verum quoque per accidens & præter expectationem, herniam, sed per ligam. cutaneam fuisse, cum ob fracturam ossis decumbendum esset longius, quod *Helmenius* mem'it.

Opus est 2. Roborante emplastro, quale est empl. contr. ruptur. seu de pelle aselin. vit. & imprimis 3. Deligatore, quo per fascias tanquam vincula occludatur aditus, sicque ars leve naturam firmando parere debito.

Deligationem commendabimus duplicem, unam suspensivam, alteram stringentem. Illa duplex iterum est. Una cingulo constat latiori, ex paono xyliño, cum hembace intercepto, solo, vel ferro simul ad se conformato, quo firmetur hypogastrium circa inguina. Huic vero iterum anierius splenium so pulveris modum compressum, lateri affecto respuosco, adhiæreat, & ad petineo ad lumbos ipsi cingulo illigetur.

Firmius idem reddit pro te nata calcitra adhuc alia, in medio perforata, et dimitti penis cum testibus, onoque tegmine subligaculo melini sic deligati & coarctati vagina queat. Variandum hoc pro partium illarum in ægro modulo.

Altera *emplantatio*, quæ ad modum humeralium, Germ. *ein Tragband*, humeris utriusque suspendatur, sicque gestando onus scroti leve, firmeturque.

At cum probe quidem hæc se gerant, quododo æger decumbat, flexo veto corpore vel ipsa lesione firmitudinis robur cedat, nec par sit occlusioni illi, cogitatum quoque est de alio modo, quem ob firmitorem detentionem stringentem ommunimus.

Stringeos hæc deligatio sola sit fasciacione, quando fascia linea aliquot unarum, longiorem enim esse oportet, circa lumbos cingitur corpus, affecto veto latere artificioso circumvolvitur & decussatim traducitur extremum, sicque quasi nodum efformat, quo stringitur egerie vagina, tæpetendo hoc ipsam, ex humbis ad petineum utrinque progrediendo, quo pacto & desumbare potest æget sine molestia, aliaque prestare moxia.

Propositum hæc singula ægro, ut commodius eligat, & ex viciis approbet. Ita coim, si consolidatio plenaria speranda non fuerit, precavere tamē elaplum potest, & suppleri illud damnum internum artis hæc ope.

Cumque natura sit morborum medicatrix, quod nullo magis quam soluta unitatis exemplo videri potest, expectandum est, quatenus conferte suo loco possit hæc secundum ipsius intentionem administrari. Si pertatus mali, & tenax locutis desiderata iterare, non contentus palliativa hæce, graviorem curam non adveniat, ablegandos foret ad *hypocritas* peritum, qui cum exsectione testicul. citra metum impotentie, id præstat.

Ea Pharmaceutica Fonte primo loco Læntia le sistunt, magni usus in herniosis, quoniamquidem alvo obstructa congeruntur & regurgitant flatus, sicque rumorem inflant & augmentant; unde alvum apertum esse in his coosultum est.

Cordi sit ægro, talibus *insuperatæ* benedictis aliquando uti. Omnem veto obstructionem long.orem & dolorificam cumprimis habere suspensio.

Promovebunt alvum ea lubricantibus butyri assumptio, ol. amygdal. dulc. cum pulcho avena, manna, & pulsat. laxativ. 1. x stimulantibus & detergentibus aloetica, & alia.

Æ. Aloës rosat. virgo tattareat. an. ʒj. croc. mar. apert. ʒss. ol. anil. g. j. c. f. q. elix. prop. laxat. F. l. a. Pilule minimæ. S. *Erasmeus Pullen*.

Æ. Crystall. tart. ʒss. tart. viniol. gr. viij. ref. scam. gr. iij. ol. mac. gr. j. M. F. Pulvis. D. ad chartam. S. *Lind Pulver*.

Æ. Est sollenn. rhubarb. antim. an. ʒij. M. D. in vitro. S. *Lind Efflu*.

Ad hunc ceotum etiam spectant Clysters scobi obstructions faciliant negotium, vel aliquod minuerunt periculum, sine ullo metu, imo certa cum spe promiti auxilii adhibendi. Cita tumorem enim illum ac molestiam emolliunt duras feces, demulcent tenia intestina ac elutriant, unaque flatibus exitum pacatum monstrant ut mirandum sit, innotata à monouillis hæc in hernia præstidia haberi.

Æ. Rad. althææ, lil. alb. malv. an. ʒss. fol. rut. tor. marin. mellis an. m. j. flor. chamom. verbasc. lil. alb. an. p. ij. bacc. laur. juoiper. sem. aol. an. ʒj. fœn. g. ʒij. Coq. in f. q. aq. f. Col.

Æ. ʒj. add. elect. de bacc. laur. ʒj. mell. rut. ʒss. ol. lil. alb. ʒvj. vitell. ovor. n. j. M. F. l. a. chylima.

Æ. Rad. apii, malv. gram. an. ʒij. herb. ʒ. emoll. flor. verbasc. melilot. an. m. ʒ. sem. perfol. fœn. grec. bacc. laur. ao. ʒij. castic. ping. n. vj. Coq. ex l. q. fer. laet.

Æ. Col. ʒx. elect. diaphæro. ʒss. ol. verbasc. ʒj. vitell. avor. o. f. f. l. a. Enema.

Tacemus, in casu rumoris induci & obstructis, ætuduam decocti clysteris in cataplasmata aptari posse emollientis, exterioris lætuo affecto imponendum oon minimo cum successu, cum emollientia clysterum sine materia prima.

Respondent bis in stimula alvo Suppositoria, quorum usua etiam hic locum aliquando habere potest, apparatus vero cum in officina sufficiens extet, non opus est denuo præscriptionem fieri.

Purgantia tum præservandi fine, tum vel autumnali tempore, ex usu esse possunt, tum curandi, si fors ita ferat. Observatum quippe est, in *admodum* nihil magis prodesse quam opiatæ purgantia, illa compescencia acherum, hæc in viam ducenda cum juramine.

Æ. Spec. diagalp. ʒj. scam. rosas. mag. g. g. an. gr. iij. crystall. tart. ʒn. ol. anil. gr. j. M. F. Pulvis. D. ad chartam. S. *Purgier Pulver*.

Æ. Conserv. rosat. e. mann. rob. passulat. an. ʒj. poly. laxativ. vegr. ʒj. polychr. gr. iij. crem. tart. ʒss. fyr. de pom. laxativ. q. l. F. l. a. Bolus.

Cumque in laxantibus ejusmodi membranarum lymphæ copia & qualitas plurimum momenti addat, tum ad ipsam lubricitatem, tum affluxum & *scier*, huic sufficient Diaphoretica, vi sua baluosa lympham in motum clientia, rarefacientia, dispensia & per poros cutia expellentia. Imo hoc pacto diaphæro sanguine & discussis, ob affinitatem operandi, flatibus, consolidatio non leviter promoveri, symptomata vero arceci possunt.

℞. Bez. martial. gr. xv. mag. C. C. 36. cinab; nativ. gr. vj. laud. opiat. gr. 6. M. F. Pulvis D. ad char- tam. S. *Schreyer's Pulver*.

℞. Tinct. bezoard. effensif. M. S. an. 3j. eff. catm. sp. sal. armon. vin. an. 3j. M. D. in vitro. S. *Zertheilende Mixture*.

℞. Rob. ebol. 3j. antimon. martial. cachect. g. xij. conch. opt. 36. cinab; autim. gr. iij. sacchar. q. l. M. F. Bolus S. *Schevcliz-Zucker*.

Diutericiis abstergi amar amurca venarum, fluxilitas veto & fetoritas superflua, alendoque corpori inq; convenienti educi, quo facto, minor pituita proven- tus torporem molorem intestinorum relinquit, eli- gendo soporim's magis polychresta, v. g.

℞. Magist. oc. cancr. tart. virriol. an. 3j. sal. opon. 3j. ol. lign. cassia. gr. i. M. F. pulv. D. ad char- tam. S. *Zertheilendes Pulver*.

R. eff. anim. tartariz. succin. an. 3j. ol. lign. cassia. gr. iij. M. D. in vitro. S. *Erschende Essenz*.

℞. mixtur. antiscorb. sp. aper. Fenoi. an. 3j. M. in vitro. S. *Erschende Mixture*.

Complementum addunt Altitantia & Roborantia, non tam archæum universalem attendentia, qui cæteroquin bene habet, & si vadit, aliunde repen- dendum, quàm intestinorum & processus affectotum. Specifica hinc, quæ puta indicationibus determinati satisfaciunt, esse possunt duplicia, carminativa & traumatica, quibus nervina, paretogica, adstringentia, allaque ministrantia & secundaria includuntur.

Carminativa sanc omnem absolvent paginam, quatenus & archæum irritatum placant, & diffusis flatibus intestina, minoris sistio contenta, domi manente discunt. Unde, Helmonstiano experimento optimum est in reducendo tumore duro & inflato, vinum leviter bulliant cum sem. 4. carmin. & coriand. ana.

Traumatica verò lympham alimentarem apant, ut *paraglimm* sua gaudeat, siquæ firmari magis laxæ membranæ & stringi possint.

℞. Ess. contr. h. a. n. Mich. 3j. tinct. marc. D. in vitro. S. *Geilende Tinctur*.

℞. Ess. traum. Wedel. carminut. an. 3j. anodyn. 36. M. in vitro. S. *Mixtur*.

℞. Aq. plantag. zedoar. gentian. traumat. an. 3j. magist. corallior. ocul. canr. an. 36. cat. tormen. antim. diaph. an. 3j. lye. de lymph. Fern. cont. citr. an. q. l. M. F. L. a. Putio. S. *Siarck Transckiria*.

℞. Rad. consolid. maj. arbol. toc. plantag. ul- mat. an. 3j. herb. herniar. sinic. millefol. chamom. flor. hyper. balauit. an. p. ij. sem. 4. carmin. co- riandr. sand. oran. an. 3j. oc. cancr. 3j. nucist. n. j. Conciif. contus. g. m. D. in ch. S. *Hellende Beier*.

℞. Rad. onon. 36. fol. herniar. 3j. sem. 4. cat- min. persol. oc. cancr. ana 3j. macis 3j. sacchar. ad pond. om. M. F. Pulvis D. in scar. S. *Siarck Pulver*.

Externa, immediate loco affecto applicanda in- figorem ferunt opem, merito hinc commendanda, cum balsamica traumatica, quæ vigorem archæo addunt, bal. Hispanicum; tum oleosa, ut quæ repositionem adjuvant, ubi pte aliis ol. ovot. & momordicæ opime se gerit; tum emplastica, quæ firmant, coagulant & roborant.

Tacta sunt hinc Emplastra pelle arsetina, ad her- nias Fentellii, Weckerii, Empl. ad rancies Agil- colæ, Grülingii, Schuoteli, Jessenii, contra rup- turam Felici Wuzii, & alla.

℞. Empl. contra hern. Myrs. 36. sem. persol. cu- min. an. 3j. becc. laur. 36. pulv. flypt. Croll. 36. gum. tacamahac. 3j. ol. ovot. q. l. pic. naval. parum. M. F. L. a. Empl. S. *Bra hpfaster*.

℞. Empl. contra rupt. 3j. magnet. A. S. 3j. ol. aneth. carv. chamom. destill. ana gr. iij. momord. q. l. M. F. Empl. S. *Heilpfaster*.

Agmen claudat D. xia, in terram non naturalium legitimo usu comprehensa, quem merito ager noster attendere debet.

Ex Vitali aër vitandus est frigidus & humidus; nervis enim & membranis simul & intestinis inimicissimus est. Eligantur patius, amemus, temperatus, nullis obitus inquinamentis aut aliis miasma- tibus imprægnatus, qui facile stercorationem ex- citare possit, herniosis cane pejus & angue fugien- dam.

In Naturali Cibus, cum suggerat succis vitalibus pabulum, sit *vinum* & *viuum*, temperatus, boni succi pro optimi sanguinis generatione. Vitentur frigidi, flatulenti, crassi, leguminosi, inacidiles, olereci, acres, salii, pania non probe fermenta- tus, carnes fæto indurate, fructus ætivi & omne- genus ciborum, quod ventrem contipare & flatus inducere aptum natum.

Potus ut cerevisia, ab omni heretogrenitate fe- culenta libera, non recens, nec accidens. medi- cata etiam ex herbis traumaticis & roborantibus usum habebit egregium. Vinum, imprimis ru- brum, tam adstringend, quàm roborandi sine, maxime cit conveniens & stomacho gratissimum.

In Animalis motus quieti oppositus, moderatus & parvus suscipiendus: ut enim tacanus communes no- xas, in nostro casu nil magis prolapsus intestino- rum veliscentur, quàm motus. Quicri ergo porius indugiendum est, ira tamen ne obliuisciones pariat, atque calorem nativum obnuat. Hinc leniter & æqua- liter omnes partes exerceat, & nullo tempore modum excedat. Equitatio, saltatio, cunctis pet loca declivia, eo, quod corporis viscera quiescant, summo vitentur studio. Elevatio oncis gravioris, juculatio & quicquid musculos & ligamenta extendere & rumpeere valet, procul ablit. A clamoribus & vociferationibus maxime fici caveat, quæ omnia peti- torum tendunt & exerceant gravia.

Somnus cum animalium fæcularum quies sit, vi- res testaret, & dolores miiget, ægro commenda- tus esse debet, ut sufficiens sit, non immoleratus, ut sic aliena requies etiam intestinis quietem vel ipso decubitu concedat. Vigiliæ productæ exulare debent.

Excerta assumtis respondeant de curiole inprimis alvi munus cordi habetatur, ut non cesset, vel, si id fiat, admonetur lenientibus laudatis.

In Animalis, Animi Paubemata omnia dictamen sane mentia sequantur. Vitet æger iram, quæ sin- guine circa cot effervescente humorum varias com- motiones excitat. Animi sui sit compos & placidus. Pellat rimorem, nec dolor adit. *Joh. Marimus Ebnick in Dissertationibus Medicis selectis Clar. Wedelii*.

Observationes.

Gangrana ex hernia intestinali, cum intestini- cresione curatio.

Nobilis matrona Margaretha à Clereffe, septem- decim annis insigni heptia laboravit, qua circa annuq

annum ætatis sexagesimum tertium, mense Decembris Anno 1597. torminibus maximis vexata est. Intestinum in abdominis rupturam impulsim, æt inibi retentum dolores non leves, simul & inflammationem, aliæque graviora symptomata concivit. Vocatus demum K. Januarii 1598. inveni dextrum inguen gangrenâ affectum. Scanditio itaque rumore & cæteris, quæ gangræne curationem arrirent, adhibitis, cito puriora & callositas rupturæ excrescit: unde symptomatica, dolores, inflammatio, febris, tormina, lithymia, nausæ & vomitus sedati sunt: sed intellectum notum materia, non dum penitus excrementosa, velut ilei & cæci, per abdominis rupturam excrebatur, circiter mentes duos. Egro tamen, malum tantis adstantibus, favente Numine, sanata & à rupturâ perfecte curata fuit, nulla relicta fistula, aut herniæ indicium.

Curationis sepius interfuere, qui & sanationis testes sunt, Nub. Gabriel à Bloney, Baro in Chastellaz, & Nob. Philippus Cœsius, Dominus de Denef, & Reverendus Claudius Merlinus, Villenanz & Culicem. Eccles. pastor, Moyses Benetus, & plurimi alii, quorum etiam mentio facta fuit in prima Observatione, vixit autem matrona illa neque ad finem fere anni 1613. obituque pectore. Ex his duobus jam recitatâ Observationibus, palam fit, intestinorum vulnera non esse protus deplorata. *Gualtero, Fabrici, Hildan. observatio, Chirurgie. Cent. 1.*

Ex epiplocele & enterocèle, gangrena & mors sequuta.

Anno 1585. mense Augusto, robustissimus quidam faber lignarius, quum Genevæ elevallet possum ingens, omentum ei p. olapium est in scrotum; & quia reductum non fuit, incrementum inde dolor acutissimus, inflammatio, febris, vomitus, aliæque graviora symptomata exorta, denique mors sequuta est septimo die. Ego una cum Joanne Grillonio, Chirurgo præstantissimo vocatus, a scrotum præsentem Jano Antonio Saraceno, Medico regio, incidimus, & invenimus omentum, imo etiam testes & vicinas partes plane corruptas & gangrenâ infectas.

Anno 1596. euidam intestina in scrotum ceciderunt. Unde, quia reducta non fuerunt, exortus est dolor aliæque symptomata graviora. Barbitoniformem in consilium advocat æger. Is fomentum ex absinthio & rosæ, vino rubeo coctis applicari iussit: sed ut erant aliena à morbo, sic quoque ingravescebant morbus. Ego vocatus cum clarissimis doctissimisque D. Jano Antonio Saraceno, & Andrea Bonero, apud Genevenses Medic. Doctores, scrotum magnitudinem capitis excedens invenimus; febris erat vehemens, syncope, & vomitus frequentes.

Statim fomentum ex radicibus althææ, semine lini, fenigraci, feseleos, floribus chamomillæ, meliodi, foliis malvarum & violarum applicuimus. Deinde capite inclinato & pedibus in altum elevatis, reductum est intestinum. Sed quia propter inflammationem & compressionem, in rupturâ abdominis jam coeperat corrumpi Intestinum, paucis post horis è vita decessit. *idem ibidem.*

Ex herniâ gravissimâ symptomata & mors.

Nobilis quidam in Cuilly ad Lacum Lemanium,

Daniel de Challon nomine, per annos aliquot Enterocèle lateris dextri laborans, tandem 20. Octobris, anno 1606. cum violento nimis exercitio atque motu usus esset, intestinum in scrotum delapsum fuerat. Unde statim dolor ingens & rotius ventris exortus, eadem nocte quoque vomitus frequens, inquietudines, omniæ item, & excrementorum retentio supervenerant. Ille vero remediis neglectis, symptomatice indies ingravescentibus, propter doloris vehementiam, die 2. coctus fuit accersente D. Jacob. Martionem, apud Lausannenses pharmacopolam exercitissimum; Qui ægrum in summis angustiiis constitutum videns, iussit ut me advocaret, verum ne interea temporis in mei absentia, oculos sibi degeret, Fomentationes & Enemata emulsiencia, anodyna & flatus discutientia exhibuit & applicuit. Ego 24. mensis huius die, qui quartus morbi erat, illum inviens, maximis doloribus & inquietudinibus, vomitu quinque etiam continuo infestatum, retentione item excrementorum, & urinæ laborantem, offendi, id tamen, quicquid nunc excrementum, subrubicondum erat. Arque illa retentio urinæ ad 15. diem usque persistebat, quæ sub crepusculum urinam maximè fuscataeam excrebatur. Exinde verò absque omni difficultate, imò quod magis mirandum, ad ipsam horam mortis usque, urinam cum colore, tum consistentia sanorum urinis plane similem reddebat. Scrotum porro inflatum ac durum adeo erat, ut tactui omnino remitteretur.

Statim itaque illi sequens Enema præscripti:

℞. Radic. & fol. malvarum, althææ, fol. violarum betæ, patietariæ an. M. j. flor. chamomel. melilori, sambuci an. M. i. sem. fenigraci. i. lini an. ℥i. anisi, fœniculi an. ℥j. Coquantur ad tertias. Colaturæ sume ℥v. In quibus dissolve electuar. diacathol. ℥i. vitellor. ovor. n. ij. ol. chamomel. anethini, buriy recentem, an. ℥ij. Misce, hat Enema.

Scroto verò & sculum ejusdem Enematis radicibus, herbis, floribus & seminibus confectum & aqua coctum, calidè applicui.

Idem quoque Scrotem & ventrem oleo anethinò & chamomelinò inunxi.

Enemate reiectò, aliud denud exhibui, sacculum præscriptum calidè applicui, scrotumque & ventrem, ut prius, inunxi.

Repositò verò & hoc enemate, ægrum in lectò capite reclinatò, pedibus verò elatioribus collocavi; atque intestinum in locum suum reponere tentavi, sed frustra. Quamobrem ne quid forte mihi exprobraretur, si res ex animi sententia minus succederet, iussit, ut D. Abelen Roscium, apud Lausannenses Medicum celeberrimum ac doctissimum, accerterent, ille, cum advenisset, voluit, ut eadem die denud de intestinò reponendò periculum facerem, id si minus succederet, fomentationes, inunctiones & enemata continuarem, quinque etiam, ut herbe, radices, & residuum ex decoctione clysteris in mortariò lapideò contunderentur, postea per cribrum capreum p. siliò lignèo tradocerem, ex illicque cum micâ panis, vitellis ovorum, oleo anethinò & chamomelinò fieret emulsiencia, quod calidè ac frequentius applicaretur. Idem quoque Medicus, ut æger sequenti nocte ter aut quatuor aliquid olei amygdalar. dulcium biberet, alterâ verò die tempore matutinâ potinnculum laxativum sumeret, imperavit. Circa vespere itaque an intestinum reponi posset frustra cum tentassem, Enemata, fomentationes & inunctiones continuare coegit. Oleum verò amygdalar. dulcium, quia sibi nausæam movebat, assumere non posuit.

Alterâ

Altera die Potiunculam hanc à Ruscio præscriptam illi exhibui.

℞. Expressione rhubarb. in aq. menthe infusi ℥j. syr. rosat. solaz. ℥j. syr. violac. ex infusionibus ℥j. Misce, & dissolve in aqua menthe & byssopi, hancque potior quam hanc quatuor ante prandium sumat.

Sed quum potiunculam hanc paulo post cum picuita multa, & nonnulli humoris biliosi vomivisset, denudò fomentationibus usus fui. Enemæque ex præscripta decoctione, in qua parum Electuarii Benedictæ laxat, & hieræ simplicis cum virellis ovorum, sale & oleis præcedentium clysterum, diffusum erat, infudi. Cujus beneficio nonnulli excrementorum induratum se feciderum excreta cepit. Hinc dos hanc aliqua ex parte fuisse diminui, infusio item & tumor nonnulli subsidi, ut scroto manibus tractando, murmur intestini obdormiret. Circa vespertinam cum denudò simile Enema exhibuissem, multum reddidit excrementum, intestinum quoque levi compressione manuum simul ductum fuit, scroto tamen adhuc vehementer irascens, induratum, ac dolore affecto, adstringentia applicare non licuit, sed frequens Cataplasma emolliens, & flarus discutiens admovei.

℞. Farinæ fabaz. ℥ij. Pulv. flor. chamom. meliloti, Sambuci an. ℥j. pulv. sem. anisi, Feniculi, communi an. ℥j. polv. baccar. liari ℥j. Cum decocto radic. cum althæa, malve, parietarie, florum chamomel. meliloti, sambuci, & feniculi seminatæ, fiat Cataplasma, quod bis aut ter in die calidè applicetur.

Die 28. mensis hujus circa vespertinam, jeculolum quod paulo ante sumperat, cum multa picuita feculosa evomuit; cum nihilominus tamen ea nocte spontè alvum, & quidem excrementum laudabile, benèque digestum excretaisset.

Vigesima nona die, mane rursus spontè beneficium ventris habuit, sed excrementa livida, aut cinericea, coloris infusæ, & foetidissima erant. Eadem quoque die bis jeculola illa, quæ assumperat, mixta picuita foetidissima revomuit. Nocte verò sequenti vomitus continuus & foetidissimus cum lipothymia supervenit, unde cordi Epilepsia aliquod applicui.

Die trigesima mensis, quæ morbi dies decima erat, continuus, & quidem materiam foetidissimam adeo copiosè vomuit, ut intus, ubi tanta in corpore copia materiei retenta fuisse. Assiduis quoque egrediendi conatibus, cum modicâ tamen egressionè vexaretur, atque excrementa foetida, nunc solida, sed cinericea coloris, nunc verò liquida, purulenta tamen, aut sanguinolenta excreta, atque sic totâ illâ nocte, quæ principium erat undecimæ, in eodem statu permanebat, ita ut jeculola, vinum, & quæcumque offerrebantur, recusaret. Sequenti enim die, quæ finis undecimæ; circa meridiem placidè ex hac æruginosâ vitâ ad beatioram sedes demigravit.

Porro nonnulla in hoc morbo observatione digna occurrunt. Imprimis enim viua à sexto mudi die usque ad extremam vitæ horam, sanctorum urinae similis planè conspiciebatur. Contra verò pulsus à quartâ die morbi, quod primò ad ægrum vocatus, ad finem usque continuus tam debilis, tamque exilis & obsecutus, ut hominis jam tum mortuorum pulsui similis omnino esset, reliquæ tamen facultates & actiones adeo valide, ut interdum vestes indueret, & in conclavi ambularet. Materiam illam viscidam, pistulosam, ac foetidissimam, quam vomeretur, non omnino ex intestinis, sed partim abunde, ubi diu inclusa fuerat, processisse, inde apparere, quod ante morbum aliquandiu valetudinarius adeo fuerat, ut & à pulu. sabulosis (qui

gravis ac fuscus, præcipuè tempore maris) illi quâ difficultate laboraret, rursus quoque sicca, ad mortem usque illum comitante, continuò vexaretur; de dolore item stomachi spiritibus consequeretur. Ex quibus perspicuum sit, ipsam non solum propter intestinum prolapsum, sed aliam quoque internorum vicierum putredinem exincholem fuisse; facillè tamen concessero, intestinum aliquam corruptionis notam præ se tulisse. Quandoquidem fieri non potuit, quin pars illa intestini, in ipsâ abdominali rupturâ, lex dictum spaciò compressa atque coarctata, al menud suo privata, ac tandem corrupta fuerit, (sicut etiam ex Observ. 2. Censur. 1. colligere licet) ex quâ tamen intestini putrefactione tantus fœtor, quantus hic aderat, promanare non potuit. Utinam igitur Amici post mortem ipsius casaverit dissectionem concessissent, multa dubio procul rata & notata dignissima nobis innotuissent. idem Censur. 4.

De nobili Enterocælico. Et Enterocælico curatè Divinitus.

Observatione transmissa, præstantissime Medice, amiceque observande, verum te Hippocraticum exhibet, reterique dignus singulari, d vinum nostrum semem in epidemias, describendo singula morborum Nobilis Enterocælici tempora.

Quantum vero istiusmodi conducant singulares, confirmandis medicis catholici theorematibus est, testatur Galen, nos, argumento primi epidemicorum, verbis hîc notari dignissimâ. Singularia, n. quæ, autumant Empirici universalis constitutionis esse principium, illaque tandem afferunt vera præcepta esse, quæ consueverunt ab experientia. Nobis multo alites, adeoque numerois præcepta inventa esse ratione videntur, quorum tamen de veritate judicium rationis, prout stabiliantur. b experientis, & hîc accipiunt. Nam sic quidem, etiam quæ inventa ratione, ac demonstrata sunt, de eo quid magnitudine Sol à Luna distet, his credamus tamen, cum à sensibilibus multis aliis, quæ Geometricæ docent rationes, & ab Ecclipsibus singularibus, confirmantur, fidem habemus majorem. Quando igitur ab experimentis singularibus comprobata quæ per Geometriam demonstrantur, accipiunt maiorem fidem, stabiluntur finibus longe magis, quæ ex Medicâ disciplina sunt in universum inventa, singularibus sunt probationibus constituenda. Quæ nos observari in libris vulgaribus morborum docemus. Hadenus Galen cum igitur, Prædantissime Fabr. quæ ex medicâ disciplina in universum sunt inventa, singularibus suis tamque æque probantibus continuas atque fulcias, profecto institutum hoc præclarissimum prosequi, tuamque sic nomen, & publicam utilitatem amplificare constanter debebis.

Neque vero Pathologicæ tantum parti Medicinæ lumen affert Observatio tua mihi communicata, verum etiam Therapeuticæ, dum remedia reponendo intestino feliciter, & ex arte adhibita Enemata, Fotus, cataplasmata, inunctiones, & reliqua commemoras. Quin & illud ex eadem patet, haud solo prolapsu intestini, sed alio quoque intestini affectu, nempe corruptela visceris alicujus extinctum ægrum, Qui viscidam illam, consentaneque odore tetram, vomitu rejectam materiam, intestini profecto sedibus diu conclusam abesse videtur. Recte item urina illæ sanctorum similis, observatæ abs te. Quæ declarat eorum de vulgo losipientiam, quod medicos (celato etiam ægrati nomine) ex sola urina de morbo ut pronuntietur, cogere volunt (qualis & mihi

nonnunquam molesti sunt) cum u. lina nullius sepe morbi vestigium prae se ferat, quemadmodum ex hac tas liquet observatione. Igo vero ingratus sum sane erga Deum Opt. Max. censui potius, si duobus nobilibus Viris commemoratis, enterocoele mortuis, ego eodem affectu demum, decimo nempe octavo anno, solo Dei nutu absque seditione liberatus, id beneficium tam memorabile silentio praeterire.

Anno superioris seculi octogesimo quarto, tempore belli Colonienfis, in exemplo Gymnasii, & coram amplius centum discipulorum, ideoque contentione voce docenti mihi, primum solâ rupture intestinis membranae peritonæi, prolapsusque intestini tumor in solâ inguine exortus est, non longè verò post tempore, cum dilatio quoque accessisset, ejus membranae, quæ in scrotum devolvitur, hoc pariter distentum fuit. Adhibeo Emplastum vulgatum ad rupturam, sed eo diu frustra usus, uno cingulo peritonæate, à dicto jam octogesimo quarto anno ad annum usque hujus seculi secundum, meæ vero ætatis quadragesimum primum, hoc est, ad annum usque morbi decimum octavum. Quò spaciò totò cum nequies curando necessaria concederetur, nec orthostoma mihi probaretur, graves perferendæ, ac molestæ (per ventositatis præsertim) elabente læpius intestino, fuere. Gravissimus supremus mali dies exstitit. Nam dum Einshemii, Alsatiz Urbe, stipendii Cæs. Majest. Rudolphi II. Cariz Austriae medicinam facerem, celebri quoque vicino Xenodochio, D. Antonii Ellenheimenij ejusque Administratoei Reverendissimo Domino Suffraganeo, Francisco Bero, summo Viro, salario annuo obligatus fuissem. Itaque inde Gebvellerium, Principis Murbaens. (qui opera quoque utebatur mea) sedem, verno tempore proficiscenti, immanis cum dolore, universum intestinum enupturum videbatur. Nunquam ante, totos octodecim annos tumor major. Reversus ab amicis domum, insensu quodam anodynò dolorem paulum lenivi, motque peritò lectò, summo expectatus mane, & resensa continè suò loco re-irrupt, & peritonæam ira firmatam atque consolidatam deprehendo, ac si nullò unquam tempore enterocoele laborassem. Cumque nullo unquam ante die peritonæate cedere ausus fuisset, jam abiecerit illud, absque eo interdere minime dubitavi, nec in hanc usque diem eo egui, annosque amplius jam quinque, nec quicquam illius affectus (Condurci æternæ laudes ac gratiæ) percipio. Certe tam inveteratus affectus, in homine quadragenario, tempore præsertim, quo summam incrementum sumptuatur, Physicis remediis, tanque brevè depelli non potuit. Quare verum *aliquando* & liberatorem meum D.O.M. agnoscam, laud boque quando sacro, cuius proinde insinuat, & hætenus (mihi quidem) insauditi beneficii prædicandè gratia, ac gratitudinali ergo, locò ut arbitror, non incommodò, sub mentione scilicet duorum nobilium hæc malò sublato, hæc adscripta volo. Gravissimò sub id tempore, per formam manifestissimæ inferioris affectus ærium meorum damno fueram, quod Majestatem Divinam tantò beneficiò (quod quidem multis præsertim) compensare, facereque voluisse crediderim. Eademque ab aliorum quoque me adversariorum machinationibus, quæ denud paratæ mihi videntur, paternè tuetur, teque diu incolumem servet & solpserit. Fryburgi Aventicor. Calend. Feb. Anno 1697. *Sebastianus Mererus Med. Friburgen. ad Fabry, Hilden, observat. (Chirurgie. Cent. II.*

Intestina in scrotum prolapsa, quomodo repelita?

Quam gravissima symptomata, ac tandem mors quoque, ex prolapsu intestinum in scrotum sequuta fuerit, tum præcedenti observatione, tum etiam Observe. 7a. primæ Centuriæ, satis suppete demonstra-Imus. Nunc quomodo his in finem naturalem reductis, ægri convalescant, exemplis tribus sequentibus declarare oportet præteritum erit.

Generoso cuidam ex familia Hartzfeldorum, à multis æonibus hernia laboranti, cum quadam die intestina in scrotum prolapsa, statique protinus distressa essent, dolor maximus totius ventris, vomitus continuus, cibi fastidium, vigilis, inquietudines, præcordiorum angustia, & lipothymia exortæ sunt.

Ego altera die ad ipsum vocatus, quamvis graveret, & non absque mortis periculo ægrotaentem offenderem, tamen aliquod roborandum fuit. Quocirca statim sequens exhibui Enema.

℞. Radicum altheæ, malvarum cum toto folio; violarum, parietariæ, stor. chamomil. meliloti, sambuci an. Mj. sem. fennicæ & lini aliquorum contusi, an. ℞. f. sem. anisi, fenniculi, carvi, cumini an. ℞. Incidantur & contundantur omnia, postea indantur sacculo, ejus magnitudinis, quo totum scrotum pressis coepetiri, qui intestinas coquantur in lb 12, aquæ font. Hujus decoctionis.

℞. ℞j. In qua dissolve Electuar. diacanthol. ℞j. vitellor. ovor. n. ij. butyri recent. non salini, & ol. commun. an. ℞iij. Misce, fiat Enema, quod protinus inficiatur. Sacculus vero parum expressus calide applicetur scroto, & recalcet in eodem decocto, & applicetur, quousque opus fuerit.

Post mediam horam rejecto Enemate, totius aliud ejusdem decocti Enematæ, cum admixto Electuario, oleo, butyro, vitellis ovorum, parumque mellis infundi, & sacculum calide applici. Qui enemate de novo rejecto, & sacculo calido intestino probe lubricato, ægrum in lecto capite declivi, pedibus vero in altum elevatis, collocaui. Postea mano sinistra scroto apprehenso, eoque ventrem versus lubrevato, & aliquo modo compresso, dextra vero imo ventris admota, reliqua lustrata sursum versus pectus retrusi, sicque Intestinum prolapsum felici cum successu in locum suum naturalem reposui. Deinde ad intestinum suo in loco cobibendum, sacculum hunc additigentem applicui.

℞. Rosar. rubr. absinthii vulgar. folior. prunor. sylvestr. caudæ equinæ fol. salicæ & mulci quercinod. an. M. f. corticem querc. ℞j. sem. fennicæ & anisi an. ℞j. Incidantur & contundantur, postea indantur sacculo, qui filio interfectus, & vico rubro incoctus, calide frequentius applicetur. Postera die, corpus sequenti portuncula expurgavi.

℞. Radic. fennicul. petrosel. gramin. polyop. querc. an. ℞j. herbar. agrimon. veronica. eulcor. an. M. f. sem. anisi fennicul. an. ℞j. folior. fen. mundat. ℞j. Coquantur in aqua, ut colatura redeat ad ℞iij. In quibus dissolve Electuar. diacanthami & diaphanici. an. ℞j. ag. cinamom. destil. sine vino ℞j. Misce, fiat potio.

Tandem Emplastum aliquod adstringens applicui, & subligaculum adaptavi. Sic divini favore gravissimò hoc periculososque affectu liberatus fuit.

Joannes Hoff. Grammaticus Hildenz, comparat meus plurimum honorandus, à multis annis Enterocoele gravissime vexatus, cum anno 1593. in seipsum aliquo modo defessus, in terram somni capellendi gratia

gratia decubens, obdormivisset, intestinum ad magnitudinem ferè capitis infantis in scrotum prolapsum est; quod quia illico repositum non fuerat, ab ætè tam temporis factis frigidò in ipso scroto frigidatum & intubat est. Hinc dolore exorto, ipsoque à somno expergesto, vix domum (à qua iter minus horæ aberat) prae maximo cruciatu redire potuit. Ego ad illius accessit, ipsum quasi semianimum cum animi deliquis, vomitionibus frequentibus, silique fortidâ, offendi. Dolores item tam maximi, tamque frequentes aderant, ut subinde sese ex una in alteram lætæ partem jactare, coactus esset. Statim itaque supra scriptam Enema exhibui, & facculum loco affecto applicui. Postea pedibus elevatis capiteque declivi posito, intestinum feliciter repositi. Tandem expurgato corpore, & subligaculo applicato, plenissime convalescit, multoque dehinc annos sanus vivit.

Anno 1607. die 26. Augusti, Joannes Nadler, faber scopelæstus, civis Paterniæ, homo septuagenarius & herniosus, dolore colico cum intestini descensu correptus fuit. Ego quia ta die morbi vocatus, ipsum febricitantem, cum maximis doloribus inferioris ventris offendi. Intestinum cum nonnullis excrementis in eo contentis in dextrum inguen prolapsus erat, superaque modum durum percipiebatur. Quapropter cum illud vi redacere, consultum minus fore animadvertente, prociuis ventrem, scrotum & inguen, oleo liliorum albor. pinguedine anter. & caponis nunci, facculumque ex emollientibus qualem supra descripsi, calide applicui, & enemata infudi. At quia in reductione intestini quæ contra violentiam maximam fieri non potuisset, timendum erat, ne intestinum izderetur, in usu medicamentorum prædictorum, per dies aliquot pergere visum fuit. Interim excrementis in intestino prolapso inclusis, emolitis, injectis quoque per intervalla enematis emollientibus & attrahentibus, intestinum paulatim in locum suum naturalem retrocessit, ita ut ex maximo illo periculo Dei beneficio liberatus fuerit. *Idem ibidem.*

Sarcocelen ut plurimum dextras occupare partes probatur.

Generosus quidam juvenis, cum amasium suum amplecteretur, atque cum ipsa in actu venero esset, & jam semen ejaculare vellet, à quodam cubiculum ingrediente in actu ita deturbatus fuit, ut semen retrocesserit, retentumque fuerit, quapropter dolor in inguine exortus est, & testiculi intumuerunt. Cum vero morbum propter veterandiam celasset, dolor in sinistro inguine paulatim per se remissus, intumescitio evanuit, & testiculus ad naturalem statum rediit, circa dextrum vero tumor remansit, qui successu temporis in ingentem herniam carnosam excrevit. Ego cum aliis magni nominis Medicis in consilium tandem adhibitis, non solum carnem circa dextram testiculum concretam, verum etiam scrotum scrotois humoribus ita extensum reperi, ut magnitudinem capitis infantis fere adæquaret.

Ante annos aliquot patritium Coloniensem unum cum clarissimo viro Dn. D. Joanne Slotano Medico celeberrimo inveni: Laborabar & ille maxima hercia carnosâ, eoque ex dextra parte.

Anni elapsi sunt ceteris à quibus Bernam Helvetiorum ad vitam quandam nobilem unum cum clarissimo viro Dn. D. Paulo Lemnio pollatro Bernensi vocatus fui. Laboraverat ille per annos aliquot hernia carnosâ ex dextra parte, tandem quoque

hydrocele accessit, ita ut scrotum in illam magnitudinem extendetur, ut membrum visile planè absconderetur.

Ante menses quatuor Paterniæcensis quidam Johannes Comes nomine, viginti quatuor circiter annorum ætatis, Lsuiannam ad me venit. Hæc testiculus dexteri in massam carneam durissimam, quæ magnitudinem pugni longe superabat, excreverat. Deliberavimus inter nos, ut inveniunt Vere maxum adhiberem. Verum cum aliquantisper diutius apud vos moram traherem, & affectus de die in diem mita celeritate accresceret, Frisiburgum se contulit, ibique curationi cupidam Chirurgi sese submisit. Quid vero cum ipso factum sit, nondum intellexi.

Cum ante menses duos apud vos viverem, in pagum Vauxhallançon ad Reverendum Virum Dn. Casparum Petterum, ibidem presbyterum vocatus fui. Illi autem non solum testiculus dexteri, verum etiam vasa spermatica veluti in lapidem induruerant, ita ut manu compello abdomine, dextram illam in ipso quoque hypochondrio dextro perferre possem. Malum autem ad ipsam originem usque visorum spermaticorum ascendere, dolor ipse, quem è regione visorum spermaticorum ad remem usque dextrum continuo perferrebat, indicabat. Aderat præterea vomitus, & appetitus prostratus, non tamen propter herniam, ut quidam, qui ipsam ante me inviserat, statuit, sed ratione timoris dolorosi & duri, è regione fundi ventriculi existentis, quique compresso abdomine, tactu facile percipi poterit. Quid præterea in tota praxi mea unicum solummodo, ex similitudine parte laborantem hernia escrofa (quæque tandem in cancerum exaceratam atque insanabilem degeneravit) me vidisse memini. Peculiaris itaque hujus rei ut aliquis sit causa, necesse est. Te, Vir doctissime, ut pro acumine ingenii tui, usû, atque expertentia rerum medicarum, illam inquireret, mihi quæ hæc graviter communicare velis, obnixè rogo. Ego quid sentiam hac de re, paucis annectam.

Hernia carnosâ, quam Græci Sarcocelen vocant; teste Galeno, fit testiculo indurato, & ut idem Galenus testatur, cum scirrho convenit. Causam vero, humorum crassorum, ad testiculorum decursum tum abundantiam, atque patris affectus debilitatem esse, Guido & alii statuant. Platerus ex constitutione visorum spermaticorum in scroto, item ex succo è vasibus illis luxuriantem; Petrus Pigezy vero ex humore non naturali è venis exsurgente, ac paulatim in carnem substantiam transiente, fieri scribunt. At vero Vido docet, per affluxum aliquum humoris fieri herniam carnosam, nempe cum hujus materiei intubilis pars propter calorem testiculorum in halitum resolvatur: quicquid vero crassum & viscosum est, remaneat, in scirrho tandem illam indurescere. Prædictæ porro causæ, etsi minime sciendæ, atamen ut potius in dextro, quam in sinistro testiculo locum habeant; nondum satis manifestum sit. Etenim potius circa sinistram testem herniam carnosam gigas debere non immerito cūpiam videti possit. Dexteri enim testiculus cum propter vasa à magnis vasibus delecta, sit calidior sinistro, ipsum robustiorem quoque esse sequitur. Ad calidum enim & sic cum temperamentum (Galeni verbis utor) quod actionum robur consequatur, omnibus in confesso est. Potius itaque circa sinistram testiculum, qui dextro imbecillior est, sanguineoque impotentiorem, ut idem Galenus testatur, ad se trahit;

K&

fluxum

Auxum illum humorum delabi; ac proinde carnolam illam substantiam procreari posse, verisimile esse mihi videtur. Id vero cum facilissimè observatum sit, causam carnosa hernia obsecratam esse, cum Paulo Agneta Raro, Quod si tamen poterit prædicare causas, retentionem & alterationem, aut veluti corruptionem quandam seminis hujus mali causam quoque esse, concedere velis, non usque adeo difficile erit causam invenire, cui in dextro testiculo potius quam in sinistro gignatur. Et tertia retentionem seminis in Generoso isto viro, cuius ab initio memini, causam totius mali fuisse, certum est. Cum enim vasa omnia semine & spiritibus turgere, & natura ut sese exoneraret, intenta esset, retentionem, ac veluti refluxum illum seminis absque ingenti periculo fieri non potuisse, doloe ille, qui in inguine subortus est, testis fuit. Idem fortassis & in reliquis, quorum facta fuit mentio (qui forsitan causam morbi propter vetustitiam celarunt) accidit. Hujusmodi enim hernie ut plurimum in juvenibus, qui sanguine & semine abundant, & in coelibatu vivunt, accidere solent. Raro autem sit ex sinistra parte, quandoquidem sceminalis vena sinistra non à vena cava, quemadmodum dextra, sed ab emulgente sinistra vena exoritur. Itaque verisimile mihi plane esse videtur, cum semine ex vena emulgente nonnihil intestina & nigrositas, que crassos viscososque humores incidat & resolvat, excidat, & putredini advertetur, ad sinistram testem deluere. Idem Cens. 4.

De Hernia aquosa, in qua præter speciem & opinionem carnosa quadam substantia, vasis spermaticis adnata, reperta fuit.

'Argentina discedens, in Alsiario nobilissimum quandam juvenem, hernia agnosa laborantem invisi. Huic quia spatio quatuor annorum varia medicamenta, cum à me ante annum, tum etiam ante ab aliis frustra præscripta & adhibita fuere, perierunt parentes, ut tentarem an aliqua alia via sanitati testis possit filius, se quoque fore contentos, ut incidere scrotum, dummodo conservaretur testiculus. Parvi, intra 3. septimanas curationem me feliciter abolvere posse sperabam: quandoquidem exterius nihil aliud præter aquam, que sive ad radios solares, sive noctu ad candelam exponerem scrotum, limpidissima, & in vesicula veluti in ampulla inclusa, apparebat: tactu quin etiam nulla durities percipi poterat, ita quidem, ut nihil præter aquam fuisse putarem, uti & ante me ab aliis Medicis & Chirurgis judicatum fuerat. Sed bone Deus, quam me refellit opinio! quam verissimum esse divini Hippocratis sententiam, *Judicium difficile*, teipsa inveniri purgato enim & præparato prius corpore, cum caustico meo, absque ulla tamen dolore, scrotum perforassem, & tertio die post applicationem cisternæ separasse, præter aquam etiam catenam quandam & induratum materiam circumcincta vasa spermatica juveni. Post excisionem itaque elcharæ, cum nonnihil humoris testosi effluxisset, dolor ingens in infimo ventre, imprimis in inguine dextro (qui erat locus affectus) subito exoritur, sed momentaneus; antequam enim anodynum præparassem, per se, & nullo aucto medicamento, remisit. Sequenti nocte scrotum aliquomodo intumuit, & tumor durissimus in superiori parte vaginæ, circumcincta vasa spermatica plenius percipiebatur. Tunc gravissima illa & periculosa symptoma,

que ex hujusmodi apertionibus aliquando provenisse scribam, mihi in mentem venit. Ante annos enim aliquos, cum perthanissimus ille atque Excellentissimus Medicus - Chirurgus Dom. Johannes Grissonius, pie memorie, Sabauda cuidam Lausane scrotum aperuisset, & nihil aliud præterquam de hydropice cogitasset, carnosa quoque substantia, testiculo & Vasis spermaticis adnata; sed terroso humore velut submersa & recta, reperta fuit, que & paulo post in cancerum malignum degeneravit, ubi medicamenta, ferrum simul & igem, frustra adhibuit Grissonius.

Ante annos cecidit igitur Lausane idem fere mihi in quadragenario accidit. Sed ambo isti viri, quod non omitendum, pravis humoribus refecti erant: Nobilis vero noster æget sanus est corpore, interum tamen ferid apud me pendens periculum, anxius sul, præcipue eam ob causam, quod de periculo ab initio nihil prædixeram. Ageti tamen ætas juvenilis, constitutio corporis optima & sana, & quod ad illud usque tempus ab omni dolore, inflammatione, & febre immunis fuerat, obediens præterea, cordatus & ad omnia, que agenda & paranda, paratissimus esset, animum meum à sollicitudine abducebant. Iterum igitur expurgato corpore, que leviter emolliant, simul & discutiant, veluti emplastrum de mucilaginis cum gummi, de meliloto, & de ranis, per dies aliquos applicui. Ex illis cum malum minime ingravescere, quin potius duntaxat decreveret, ac nihil maligni subesse (ab emollientibus enim medicamentis, inquit Galenus de simplicibus medic. lib. 5. cancerosi tumores exasperantur, uti quoque in prima centuria observationum mearum exemplis demonstravi) inde cognovissem, ad fortiora perveni. Ulceri itaque pulverem insigniter emollientem, & materiam ex profundo extrahentem quotidie semel inspersi. Exterius linimenta, emplastra, cataplasmata, & similia emollientia applicui, quibus remediis Deus Opt. Max. ita benedixit, ut per singularem Dei misericordiam (cui in omne ævum laus sit & gloria) spacio quinque septimanarum, curatio felicitate ad optatum finem perducta sit. Vides clarissime mi Dom. Schlanovi, quanta in hisce affectibus sit difficultas, quantaque diligentia & vigilantia requiratur, quod si corpus eacochymicum existeret, procul dubio propter accensum humorem de ipso actum fuisset. Hæc non sine causa, que te non laet, ad te scribo, & ut litteras nobilissimum viro, simili affectu laboranti, communicare vela suadeo. Idem ibidem.

De Hernia aquosa felicissima sectione.

Hernia agnosa, si ex causa interna ac latente originem habet, ne plurimum sinistram partem scroti occupat, serosusque ille humor in membrana rectem involvente, Erythroidea dicta colligitur; idque præcipue sit tene sinistro, ut Dodonæus rectè annotavit, male affecto: quapropter serosus humores non attrahens, & ad vesicam mittens, per venam feminariam, que isto in latere ex emulgente procedit, in membranam Erythroideam delabatur. Sectio autem hernie aquosæ, si ex hujusmodi causa originem traxerit, & testiculus simul exemptus fuerit, periculo non vacat, ut idem Dodonæus observat; cap. 39. & 40. annotavit. Itaque ne temere quequam hæc in te tener Chirurgus, suadeo. Ne tamen Tyrona cum meo in præcedenti observatione exemplo,

tom exemplis à Dodonæo recitata deterrantur, & ab officio atque instituto abducantur, sequenti exemplo illis animum erigam.

Jacobus Gerbertus, vir pius & illusterrimus Reipublicæ Bernensis Comensarius dignissimus, quadragenarius, robustus, & bono corporis habitu præditus (cul & fo præventus calculus per incisionem ex vesica extractus fuerat) à multis annis hernia aquosa ex sinistra parte vexabatur. Multa ipsi cum à medicis aliis Medicis doctis præscripta & adhibita, tum interna, tum externa fuere medicamenta, absque fructu tamen omnia; ita ut tandem in magnam molem excreveret scrotum. Cum vero æger tumorem in dies augebat videret, denuo me advocandum jussit, peritæque, ut exterrum sibi auxilium adhiberem; quod etiam periculo omnino non vacaret, experiri tamen potius malui, quam in hujusmodi miseris vitam diocretare. Quamvis enim dolorem non adeo gravem inferret tumor ille, equirando tamen & ambulando ipsi maximo erat impedimento.

Preparato itaque facis corpore, tum optima victus ratione præscripta, tum purgationibus aliquoties reiteratis, & venæ sectione, septima die Maii Anno 1603. ægrum in sedem collocaui, deinde in superiore parte usque ad tunicam Erythroidem inciso scroto, ipsum ex anteriori parte ab ipsa membrana aliquantum separavi. At quia tota aqua lo tunica illa continebatur, ita ut restituta ei iocaretur, ac in posticum denuo descenderet aqua, acui incurvata, se illic reduplicato universam hanc tunicam (præter vasa seminalia) apprehendi, & medio cruce constrinxit atque ligavi. Postea ex inferiori parte figuræ, membranam tum ante dictam secundum longitudinem incidi, & aquam ad libras aliquot extraxi, paulatim tamen, ne vires deficerent: Deinde turoandam satis longam crassamque, ex stupis factam, ex albumine ovi madefactam, ad laus testiculi & inferiorem partem scroti versus infixi. Inguina & anum ventris oleo rosaceo unxui, & halpum cantharis vitello atque albumine ovi, cum pauca aqua rosacea conquisitum madefactum applicui. Postea die iterum ventre & inguine inuncto, sequens digestivum applicui.

℞. Terebint. lotæ ʒij. ceta novæ ʒß. gummi elemi ʒj. ol. rosac. & amygdal. dulc. an. ʒß. ol. de vitell. ovorum ʒij.

Dissolvatur gummi lentissimo igne cum oleis, terebintina, & ceta separatim cum & paulillo olei liquefactis, & additis, fiatque unguentum: tum admisce vitellum ovi, croci ʒß. Unguentum ruzandis longis & crassis vulnere impositum, & emplastum Basiliconis applicui. Neque processum huncce, necquam vulnus probe esset digestum, mutavit. Tum pulverem mundificativum oleati, & turoandis quotidie semel aut bis inperferi, & ulcus per menses duos apertum tenui: interimque scrotum omni diligentia mundificavi, corpus item per intervalla purgavi. Tandem vulnus cicatrice obdixi, bona ægri cum valetudine, quæ etiam ad hunc usque annum 1608. quo hæc scripsi, fruiat. Ab eo tamen tempore optimam victus rationem observat, & singulis annis aliquoties superfluos humores pharmacis expurgat.

Annotation.

In hac operatione cautus ut sit Chirurgus atque circumspexus, propter pessima symptomata, quæ supervenire solent, necesse est. Inprimis autem

Belg. Chirurg. Tom. II.

nullo modo operationem hanc, nisi prius bene preparato corpore, incipiat. Quod si intemperemur vitium aliquod in te, & subesse cognoverit, aut ab ipsa operatione omnino abstinere, aut scrotum in inferiori sua parte tantomodo incidat, ut serofus ille & inclusus humor effluat, via tamen nullo modo (ut sit cum testiculari absconditur) obstruitur, & serofus humor, qui à tene attrahi non potest, in abdomine retineatur, sed si opus est, denuo illic desistere possit. Vidi ego Bilacii sexagenarium vitum pium ac probum cui Dom. Johannes Griffonius, Chirurgus præstantissimus propter herniam aquosam singulis annis scrotum ex inferiori parte perforabat, & serofum humorem evacuebat, postea ulcus ad cicatricem perducebat. Peritæ homo ille ad summam senectutem. Sin autem in tene vitium non fuerit, & deluxum plane impedire volueris, succisumque superiori parte scroti prope inguina sed expediat, quandoquidem duplex Chirurgus est scopus, prior evacuare serofum humorem, posterior prohibere, ne rursus de novo aqua in scrotum debeat, coarcteturque. At cum aqua hæc ut plurimum ex corpore in tunicam erythroidem distans debeat, eamque extendat, necesse est ut laceris in superiori parte scroti fiat: sic enim tunica dilatata corrugantur, & cicatrix impedit, ne aqua postea facile in scrotum debeat. Ut autem hæc operatio rectè & majori cum facilitate administraretur, non super scamum ligandas est æger, nec supinus decumbere, sed in sella sedere debet, ut melius aqua deorsum descendat, & tunica in inguine facilius separari, & acu apprehendi possint.

Idem ibidem.

De hernia aquosa periculosa sectione.

Hernia aquosa aut simplex est, aut composita. Simplex appellatur, in qua sola aqua scrotum extendit; & composita, ubi circumscissa testiculari materia purida collecta, aut denique varices ortæ fuerint. Accedit & nonnunquam, Camerario testis, aquosus heteroie, prolapsus intestini in scrotum, quod & ego observavi. Caro item lapillimè testiculi & eorum tunicis adnascitur, serofus enim humor ille nonnunquam acris factus, venas canthas, pilares, membranasque leviter erodit: hinc pars illa sanguinis, quæ paulatim exsudet, quæque optima & laudabilis est, beneficio caloris innati in carnem substantiam concretit. Indurecit autem firmam, propterea quod calor natus paulatim debilitatur: interim tamen in illam aliquandam molem augetur atque accrescit, ut magnitudinem capitis humani, Monagnana conl. 2. 7. Forstio lib. 17. scabulo, observat. 23. attestantibus, accedit. Reliquum vero sanguinis, quod serofum est, paulatim membranas totumque scrotum adeo extendit, ut caro illa, quæ testiculo adhaeret, digitis palpari non possit. Hujus rei exemplum memorabile clarissimo, ac longe celeberrimo Viro Dn. Johanni Griffonio Præceptoris meo perpetuo honorando obsequere contigit.

Quadragesarius quidam, natione Sabaudus; à multis annis hernia aquosa laborans, in Hispania, à Medico quodam per scrotum trajecto setaceo, parvo cum negotio primo sanatus fuerat. Post annos vero aliquot, cum in victus ratione peccasset, & in Pharmacia sumendis negligens fuisset, denuo in scrotum delapsus est humor serofus, qui non solum membranas totumque scrotum in maximam magnitudinem extendit, verum etiam carnem substantiam

K 2

procreavit;

preceperat, quæ tractu temporis supra modum indurata, narium cancelli sapiebat, idque eventus demonstravit clarius. Accedens enim Lausannæ, ubi Dn. Grissonius tum temporis degebat, nulla in ipso cognosci potuit hernia carnea, ita seroso humore exentum erat scrotum. Inciso scroto plurimum effluxit aquæ. Hinc scrotum primò subsedit, post paucos tamen dies sequutus est dolor vehemens, inflammatio & cancrum nunc maximeque malignum, quodque adeo impetiosè adiacentes partes occupavit, ut ipsius malignitas nullo modo arceri posset. Itaque intra paucos dies maximo cum cruciatu è vita discessit.

Admonitio.

Diligenter itaque Chirurgus signa omnia, quæ de herniis à Celso, Paulo Ægineta, aliisque medicis & Chirurgis describuntur, examinet, essentiaque morbi accurate investiget, antequam minus operi adhibeat, ne malum in pejus ruat. Præterea videat, ne corpus multis humoribus pravis scatens, aut virium aliquod insigne in tenuibus subsit, quemadmodum fuerunt in istis viris herniosis, quatum Dodonæus Observat. 39. & 40. mentionem facit. Quotiescunque verò Chirurgus una cum aqua carnem circumcirca testiculum concretam subesse cognoverit, præstat scrotum incidere, testiculum, & quicquid circa ipsum concretum, separare atque excidere, dummodo id radicatus fieri possit: Si enim scirrhosa illa materia processum sive diaphragmæ, ut vocant, jam occupat, & abdomini adhæret, frustra tentabitur incisio, & chirurgus infamiam, ægro vero immaturam mortem inferet, *Idem ibidem.*

Ex hernia aquosa inepta sectione immatura mors sequuta.

Dominus Petrus Crotteusius, Patemiaceus Senator prudentissimus, Vir genere, virtute & pietate verè nobilis, quadragenarius, robustus, & optimo corporis habito præditus, cum anno 1606. ex equo in terram cecidisset, scrotum & testes sibi adeo contudit, ut inde exorto dolore, sequuta sit inflammatio, scrotum quinientiam & testes mox in tumorem magnum elevati sint. A principio propter verecundiam malum celavit. Tandem cum me in consilium adhibuisset, victus rationem tenuem prescripti, corpus purgavi, & vena in cubito incidi. Loco vero affecto ab initio anodyna, discutiencia & quæ simul aliquo modo repellunt, quale est seq. cataplasma applicui.

℞. Farinæ hordei ꝑj. farinæ fabarum ꝑj. Coquantur posca ad formam cataplasmaticæ, in hoc admisce pulveris rosarum odoriferarum ꝑb. & post unicam ebullitionem remotis ab igne, admisce vitellum & albumen unius ovi, olei rosarum parum, fiatque cataplasma, quod scroto per dies tres tepide applicet, bis in die. Deinde quæ magis resolvunt adhibui: quale est sequens cataplasma.

℞. Farinæ fabarum ꝑij. hordei ꝑj. Coquantur vino rubro ad formam cataplasmaticæ, postea admisce pulveris rosarum, Florum chymomill. melliloti ana ꝑss. Olei rosarum & chamomill. ana ꝑj. Vitellum & albumen unius ovi. Misce, fiat cataplasma.

Hæc medicamentorum beneficio dolor & inflammatio omnino remissæ sunt, inflatio quinientiam præcipuè ex dextra parte scroti subsedit. Circumcirca verò testiculum sinistram in membrana Erythroidea, tumor quidam ex seroso humore remansit. Denovo itaque corpus per intervalla purgate visum fuit loco

affecto fomentationes & cataplasmata, quæ includunt, resolvunt, & discutiunt, admovi. Verum enim vero cum frustra hæc omnia esse viderem, vixi ut scalpello sub novacula scrotum incidere permitteret: sic enim inclusum humorem facile & abique periculo evacuati posse, ipsi promittebam. Ille etsi non reculebat, quia tamen tunc præ aliis occupationibus ipsi non licebat totum negotium naturæ ramisferi, donec tempus esset aptum, committere voluit. Porro etsi tumor scroti paulatim accresceret, & serosus humor magis magisque in membranam Erythroideam deflueret eamque distenderet, exiguum tamen incommodum inde ipsi sequebatur. Quapropter cum hac de re non usque adeo sollicitus esset, res in annum usque 1608. prolata fuit. Tum me absente, plane imperiti in manus empirici incidit. Is nulla habita ratione corporis, atque quod hestimo die in magnifico quodam convivio fuerat, & proximam præcedentem noctem inter pocula cum amicis absumpserat, vigesima tertia Maii, postquam laute jentasset, & vino generoso atque mento iterum incalescit, ipsum in scannum collocavit, ac resem vi quadam extraxit. Post operationem mox supervenit & febris ardens atque continua, vigilie alique typromoria, quæ pluri sum optimum huncce virum, ad finem usque vite suæ continuo ac miserè extorquebant. Et quia artis periti homines in consilium vocari minime solet, lipothymia quoque & sudores frigidi tandem supervenerunt, ita ut vigesima die morbi animam Deo pie reddiderit, maximo cum luctu civium & reipublicæ dispendio. Post mortem scrotum rotumque sinistram sanis supra modum intumuit, nigrum lividumque evasit. *Idem ibidem.*

Pro Hernia Inguinis.

Puella quædam duodecim annorum per dimidium anni hernia inguinali laborans, quum à Medicis quantumvis doctis, quorum opera uta fuerat, sanari non potuerit, ad me accedens, in hunc modum cum ea processi, ut sequentem bolum omnium primo devoraret præcepti.

℞. Cass. rec. extract. ʒij. sem. dyuti. palm. ʒiij. lach. aspersio. F. bolus. Deinde hoc tota us sumus.

℞. Rad. alch. ʒij. fol. malv. fl. chamæ. mellilot. summit. aneth. an. Mj. sem. lini ʒss. F. decoctio in aq. pro ʒiij. quo tota sine magno negotio intestina in locum suum reduci fuere. Deinde iussimus, ut quotidie locus affectus inungeretur oleo ovorum, myrteo, & hyperici simul mixtis, & ut mox emplastrum contra rupturam applicaret per plures dies: & ut subligaeulis ad hoc aptis utens, recte clusa semper procederet: præterea præcepti, ut in interea perpetuo uteretur cerevisia in qua decocta esset radix consolid. maj. adjecto exiguo saccharo ad saporem: istis continuatis hæc tandem rectè curata fuit, Petrus Forestus, obs. 111. lib. 27. *De Scroti & Testiculorum viis.*

Inter arcana Jo. Tiengii Medici quondam Amstelodamensis hoc erat, quod quidam potius tribus septimanis ex decocto rad. sigilli Mariæ in vino curatus sit à ruptura. Ego etiam felicissime utor rad. sigilli Mariæ vel Solomonis. Petrus Forestus, obs. 15. lib. 27.

Avonzoz refert de Juvene quodam qui hoc malo laborabat decubuitque duobus mensibus in dorso suo, & cum bono regime sine medicinarum applicatione liberatus est. *Idem obs. 9. lib. 27.*

Danda

Danda opera ut alvus sit lubrica : tumorem totum laungat terebinthina, sed prius foveatur decocto absynthii, ex vino : facculas etiam parvas ex foliis absynthii apponi poterit. *Id. Cras. consil. 17. lib. 7.*

Oleum hyperici compositum, quo utor per se illitum subinde calidum, mirum in modum in hoc effectu efficax atque ut le compert, quemadmodum alitis rupis, convulsis, tectis vulneris, maxime ubi membranae aut nervosi generis aliquid oblatum est. Oleum ita fac.

℞. Ol. opt. ℥iij. sem. & fl. hyperici. ℥ij. vini Hispan. vel malvac. ℥viij. rad. trimeini l. ℥ij. myrrh. gummi elemi, la cocoll. thur. aloës. an. 3℥ss. lumbelic. locor. vino ℥ij. M. S. A. coarsa bulliant ad dimidii consumptionem in duplici vase, deinde exprimendo coletur oleum : in eo dissolve croci ℥iij. ol. abietin. (resinam vel lachrimam abietis ita vocant) vel ejus loco terebinthin. puræ ℥ss. fl. maturor. hyperic. M. j. infunde misce per dies sex aut octo, ad Solem diligenter obturata. Solis calore deficiente, post panem extractum, imponatur furno, deinde diligenter peritibus flottibus expressis infundantur secundo, tertio, quarto, alii recens hyperici flores, prioribus exemptis : atque ita comparatum oleum servetur in usus.

Emplastrum sequens continuo geratur.

℞. Empl. contra ruptur. ℥j. mastich. glucin. pistacem, iascarcoll. an. 3j. pulv. rad. oimund. regal. sang. drac. an. 3j. thur. alb. pulv. rad. consolid. maj. mumie, an. 3℥. gummi dissolvantur in aceto & cum olei hyperici luptadisti, q. f. f. empl. S. A. *Reimerus Solenander. consil. 14. sect. 4.*

Pro Hernia intestinali ascheoccele.

Novimus illudisil. principem, qui jam annos circiter vixit & tres intestinorum suis magnum tantum perferret solius fasciæ apæ beneficio, & tamen sine ullo valendinis dispendio, omnes pilosorum actiones etiam vehementes & graves in venisitionibus, equitatione frequenti etiam in succulante equo, in longis & difficilissimis peregrinationibus, in intenso frigore subire solet. Si quando tussidum erit, item quiescuntque alvus egredita, maxime si ea durior fuerit, inguen oblatum retinendum, atque utraque aut saltem altera manu adducendam comprimendumque in cibus cuncta, que ventrem fasciæ implere nata sunt ac distendunt, vitanda : quod si accedat ut ileum intestinum vel quid aliud prociat & descendat in scrotum, & mora ibidem statibus aut induratis fascibus ita distendant, ut difficulter reduci possit, ex usu erit (quod in ista necessitate subinde factum uille compert) ut ex stercore ovillin dulci lacte incosco focus subibatur, tum etiam idem cataplasmatum in modum apponatur, reteraturque ut postea blandis manibus contraham reducatur. Ego istud facio me aliquoties ito. focu prædicto, cum res alioqui videtur in præcipiti esse, prolapsa & aliquando extra corpus existentia intestina teposuisse, antea tentatis frustra aliis remediis, quapropter hoc te celari nolui : quidam ad hernia fametius fuit periculosus usus, non tamen sine apta fasciæ. Ego non paucos hernia affectus juvenes in quiete degentes fasciæ commodæ opæ percuravi, non admodum multis adhibitis medicamentis : ad hernias probantur lymphatum majus, sanicula, facia alba & nigra, sigillum Salom. quinque, folium, cotinerrilla, filix, pilosella, cuius integræ herbe pulverem Malo collectæ, infansibus & pueris herniosis continuo in cibus, in lachrimis, puerilibusque palatibus

exhibitur compert mirum in modum profuisse. Quidam perfoliata ad rupturas sanandas feliciter utuntur. Novi qui hunc affectum novem ex oide ne diutius cinere lactantis leporis in vino rubro vel decocto consolidis maj. exhibitio sanatur.

Caspar Pencerus, Vir & pietatis & doctrina insignis narravit D. Adolpho Oeconomi medico & mihi, se puerorum hernias recentis coagulati & in calcem formati lactis impositione curasse. Scribit Hollerius se berniarie hercule sicco expellere assidu vino exhibitio novem diebus perfecte hunc morbum curasse, & Antonius Valerius, qui loculentis exercitationibus Hollerii præxin nemare, testatur aque ejus herbe Alliaritæ unico baulio percuratum Parulis adolescentem, cui citius salus insignem berniam induxerat : adhuc tamen, ut testis, emplastrum. Vocatur hæc herba Holleriana, quod Hollerius primus ejus in hoc affectu efficaciam observavit. Præscripta hæc omnia ex simplicis medicina desumpta remedia tam exterius adnota, quam intra assumpta in proprio dicti hernia prodesse mihi sicce possunt : quæ tamen in præsentis casu maxime profutura arbitror, hæc inequitaria ex prænominalis selecta notate placuit : itaque reducto intestino applicetur ceratum hoc triquetrum inguini superposito plenio (quod fasciæ annexam inguen ne dehiscat aut laxare continere debet) ut totum inguen contegat, prius nudato loco pills.

℞. Noc. cupress. gallar. an. 3℥. balauft. hyp. cyst. veni. an. 3j. mastich. 3j. rad. consolid. mai. pulv. perfoliat. hermar. an. 3j. ss. bdeli. 3j. ss. boli ameo. 3j. sang. drac. 3j. pic. grec. 3j. resin. pin. 3vi. cum terebinth. ceta & oleo, vitell. ovor. vel hyperic. magist. q. f. coctum : hoc feliciter usus sum.

Venam usitatum illud commune Arnoldi de Villa Nova ex pelle arteriæ dictam mihi præ cæteris omnibus maximopere probatur.

Recedit me Medicum exactitatem vidisse, qui assumpto quantum visibat gummi elemi, assiduebat acutum, co macerabat donec acutum in superficie obduceretur, alba pinguedine, tum assidui olei paucis guttis (solum & vitell. ovor. vel hyperic. magis probarem) coquebat gummi lento igne ligatum ad firmam curati. Quando ego ipsius usum commodum scio, improbare haud quæro. Ego hoc in paucis aliquoties feliciter sum usus.

℞. Perfoliata viridia folia, & rad. consolid. maj. contem. ut plane subacta simul sint & levigata, addo ceræ novæ vel propolis tertiam partem, vel paulo plus : concoctata & bene commixta induco pitatio, ut inguini affecto sub splenio imponi possint : re autem suadeo, ut hoc quod sequitur simplicissimo utaria.

℞. Consolid. maj. radiceis solam ab omni sorde ablutam, munda nihil insectis abradens, istam exquisite tritam, & levigatam, calefactam leviter indue pitatio aliquo lineo albo & impigne emplastri modo inguinali rupto sub splenio : mutetur bis in die, inducto alio. Observevati intra dies quindecim ista ratione coalescere : possunt consolid. maj. radiceis saccharo conditi, subindeque exhiberi. *Reimerus Solenander consil. 13. sect. 4.*

Ætius jubet papyrus (nos charta emporerica utri poterimus) triduo in aqua macerari atque in globum coactum inguini apponi, teposio prius intestinos. Soler enim triidiana adhesionem à delapso vindicare sed citè effusculis in aqua alstringenti, ut puta rosæ, myrtac. papyrus vel charta maceretur : hoc remedium ait Patreus se multos sanasse. *Rodericus à Finesca. tom. 2. consil. 36.*

Filiolus quidam pharmacopæi hernia intestinali laborans hac ratione feliciter curatus est.

℞. Beton. auric. muris, veronic. alchymill. pyrol. solidag. sariac. agrimon. fanicul. an. M. b. rad. caryophyllai. 36. incil. in hoc panis duplicatus intestus hernie foriter adligabatur bis quotidie, mane & vespert cum scilicet brevi convalescit. *Hieronymus Rensnerus. obs. 95.*

℞. Lapid. magnet. malleol. an. 3j. lap. calaminis. sang. drac. an. 3j. ferri 3j. bol. armen. 36. vin. sublimat. quart. j. M. in hoc panis duplicatus intestus hernie foriter adligabatur bis quotidie, mane & vespert cum scilicet brevi convalescit. *Hieronymus Rensnerus. obs. 95.*

Enterocelen adsumpta limatura ferri atque empl. magnesi appposito sic seipso sanavit natus Thom. Campanella, lib. 6. Medicin. cap. 20. art. 2. quam tamen curandi rationem frustraneam doctissime ostendit Athanasius Kitcherus. lib. 3. De Magnete part. 7. c. 2. & contra Piazum uiget Vop. Fort. Placompus. schol. in Ebn. Sin. lib. 2. quanquam non magnificam rationem, sed propter vii secundam admittit author Enchiridii medic. pract. cap. De Enterocoele. qua ratione hic quoque probari debet. Hieronym. Velschius. *notis ad obs. 95. Rensneri.*

Generosus quidam Bernensis sexagenarius spatio viginti annorum ingenti se maxima hernia intestinali laboraverat, ad quam curandam, cum me, tum alios in Gallia & alibi experientissimos adhibuerat Medicos & Chirurgos, sed frustra: tandem cum de sanitae recuperanda ne quidem cogitaret amplius, & subligaculis, ne ingravesceret malum, uteretur, incidit in morbum, à quo ultra menſes sex lecto affixus fuit. Post morbum hunc ne minimum quidem indicium præcedentis hernie sensit, nec amplius vitur splenis aut subligaculis. Ex his manifestum fit, quietem & decubitum in dorſo, tunicam esse panaceam benedictam. Guil. Fabricius Hildanus obs. 34. cent. 5.

In Enterocoele, Bubonocoele & Epiplocele valet balsamus salis gemmæ, arcantum summum in rupturis, qui hoc modo fit.

℞. Salis gemmæ 4jj. solut in igne (in sigillo) & postea solvatur in aqua pluviali destillata, filtraret, & vicissim coaguletur; his operationibus liquefactionis, solutionis, filtrationis, & coagulationis tantisper repetet, donec sal gemmæ ad summam subtilitatem fuerit perducendum, quod inde cognoscitur, quando eus particula ad candelam admodum, statim liqueſcit: serva in vitro bene clauso: cura sic fit.

Repositis, si opus est (ut in Enterocoele & Epiplocele) partibus prolapsis, locus affectus lavetur cum aceto destillato acerrimo, vel cum spiritu vini, quotidie bis post fomentationes statim luvigetur locus cum arcano salis gemmæ: ad intra exhibe ungulus diabetur mane jejunio ventriculo essentia consolid. maj. cochlear unum cum guttis ij. balsami salis gemmæ.

Si intestina & reliqua præminentia difficulter reponi possint, etiam si emollientis per infusiones & fomentationes fuerint submissa, ut scilicet absolva- tur cura, cæteris non neglectis, sic procede. Post adhibitas fomentationes quotidianas patienti exhibe per tres aut quatuor dies cor talpæ excisam & pulverisatum (quotidie cor unum) menſe Maio collectum cum aq. cinnam. & facilem videbis operationem: inongetur locus cum balsamo sulphuris. *In Hartmanni. prædic. chinatur.*

Pro Hernia intestinali & omentali.

Post univesalem & ordinatorem remedium cum *alium*, exhibetur cochlear inlequentis pulveris,

manet & vespert, hora una ante cibum, continuando usque ad perfectam sanationem.

℞. Coric. myrobal. indar. chrbul. an. 3j. nasturt. portulac. plantag. sumach. an. 36. corall. rob. lapid. hzmatic. ezrab. an. 3j. cignam. cl. 3ij. lacch. rosæ. 3ij. F. pulvis. *In Fernelius. consil. 66.*

Pro Hernia hydrocele.

Vit quidam herniam aquosam, *id est* hydrocele, vocant Græci, patiebatur, quam cicillime removit oleo sulphuris: quo totum ramicem perungebat mane & vespert, & applicabat fœcculum ex calen- tibus cineribus factum. Martinus Rulandus. *curat. 81. cent. 8.*

Pareus cataplasma ex stercore vaccino rec. & ter- tia parte pulv. bol. arm. ad idem maxime valet & nihil valde probatum est Cataplasma nunc descri- bendum.

℞. Stercor. capræ 3j. cochlear. cum suis testis, confusis 3j. cumen. poiv. sulph. an. 3ij. M. Cataplas- ma, parti affectæ applicandum, & tape renovandum quod si hisce non cedat malum, punctione cum phle- botome vel sectione tandem utendum est. Jo. Zecchius. *consil. 63.*

Iussus quidam undecim menses natus, laborabat hernia aquosa dextrum testem occupante, ita ut testis ovi exigui magnitudinem æquare videretur, vocatus ego, sequens præscribo cataplasma.

℞. Farin. 36. decoq. cum vino generoso ad pulvis consistentiam, deinde adde oxymel. simpl. 3ij. F. cataplasma, admovendum sero & maore: intra octo dies hoc solo remedio tumor omnino dissoluitur est. *Lazarus Riverius. obs. 4. cent. 2.*

℞. Fol. origan. rusc. absynth. chamem. an. M. j. bac. lauri. 3j. sem. anis. fenic. cumin. sn. 36. coq. in l. q. aq. & aceti pro ſortu, quo foveatur scrotum ter in die cum spongia. Postea applicetur hoc empla- strum.

℞. Empl. de bacc. lauri, sterc. caprin. an. 36. coch- leat. confus. cum testis. 36. sem. cumin. sulph. an. 3j. misceantur cum olei rutæ chamem. an. q. i. F. Em- plastrum. Hicce puto convaleſcit. *In Petrus Læticinus. obs. 10. cap. 3. lib. 6.*

Vit quidam Nobilis hydrocele laborans, ita sanita- tem obtinuit, primo, consilio D. Ferriand periculissimi medici, & meo, jalapo purgatus fuit, postea foras emollientes & discutientes admodum, & tandem lan- ceola perforatus, in parte decliviore scroti, vitran- do testiculum, & lineam interstitium inter testi- culos facientem, testis autem transversi digiti pro- funditatem attingit antequam aqua exivisset, quæ hactenus vicibus exacta fuit, clara & non foetida, eaque ad libras duas, cura hæc satis rara fuit, cum paucis post diebus ad negotia iveret. *Petrus Borellus. obs. 4. cent. 1.*

In Generoso quodam Viro, quam omnis periculi plena sit scroti, & erythroidis membrana in hydro- cele per scapellum aperto, teste non subleato, com- petum est, ab aliquot annis sinistra parte hydroce- le hinc molesta fuerat; frustra cataplasmaticis, ac aliis remediis crebro usus, tandem temerarij Chirurgi consilio acquiescens, aperiri sibi scapello tumorem permittit: effluxit cito omnis humor, tumor quo- que subsedit; sed cum testis ipse omnino esset cor- ruptus, vicinas partes facile infectæ, subsecuta mox scroti univerſi, ac etiam penis cum tumore & ingenti dolore gangrena. Delirium cum vehementi febre pro- pter dolores magnitudinem superarent, sc non ita mul- to post mors accessit: rem hujus similiter corruptus fuit,

fuit, & seminalia in erythroidem descendens valde ampla & multum patens. *Remier. Dodonæus. obs. 40. vide etiam obs. 39.*

De Hernia Omphalocele.

In oppidulo quodam mulierem interixi, cui ex hernia omphalocele, universa pene intestinorum mole, è peritonæi cavitare procidente, tumor immensus ac velut novus venter, à vero ventre flaccido & depresso, & in hunc tanquam Succum inanito appensus propendebat, quæm & facies circumducta, ut onus hoc sublevaret, collo suspensum gestabat. *Felix Platensis. obs. lib. 3. pag. 759.*

Pro Hernia sarcocele.

Juvenem quendam hernia sarcocele laborantem abique incisione facit ita curavi.

℞. Pulv. sen. laxat. ʒi. vini absynth. ʒi. mace-
rentur pro infuso. De quotidie bibit ad ʒiij. colatas.
Post sufficientem purgationem, utebatur ante & post
meridiem balneo aquæ, in quo coquebatur tartarus
ad ʒij. ante & post balneum frungebatur tumor oleo
suavis. nostro, motus tamen erat, quies vero in le-
cto multa, atque his sine remediis tumor in dies de-
crevit, & per Dei gratiam spatio quatuor hebdo-
madum ex toto evanuit. *Martinus Rulandus. cu-
rar. 66. cent. 9.*

Chirurgus quidam insignis contra herniam tam
carneolam quam aqueolam emplastro sequenti felici-
tèr curavit, quod singularis loco secreti mecum
communicavit, eoque nobilius aliud in hoc as-
fectu remedium se non habere discitèr profite-
batur.

℞. Gummi Ammoniac. ʒi. bdell. ʒi. farin. sem.
linap. sem. urtic. lap. spong. an. ʒi. aristol. rot. ʒvi.
sulph. ʒi. terebinth. ʒi. sp. vini ʒi. ol. olivar. ʒiij.
cetera ʒvi. M. F. S. A. emplastrum. extendi super
ulceram, & loco affecto applicetur, continuo ge-
stando. Si hoc non juverit substatuatur certum de
pelle arctica tam à Medicis Augustanis commenda-
tum: intus vero de sequenti pulvere quo alias contra
hernias prodesset solet, aliquot mensibus assumat.

℞. Pulv. rad. consolid. maj. ʒi. pulv. herniar. ʒi.
perfoliat. ʒvi. spong. combust. spongiz. cynosbat. ad-
nascent. an. ʒiij. lap. spong. ʒij. spod. terr. figill. an. ʒi. b.
cinnam. fanic. dso. ʒi. F. pulvis.

Aliquando etiam assumptis de sequenti pulv.
contra strumam, qui Arnoldo de Villa Nova af-
feritur.

℞. Spong. combust. pilæ marin. tost. ossis sepiz.
pipet. long. nig. zinzib. cinnamom. salis gemmez. py-
rethr. gallar. lap. spongiz. an. ʒi. M. F. pulvis. Jo. Petrus
Leichner. obs. 9. cap. 3. lib. 6.

Vix quidam Sarcocele laborans, quam cataplasma
ex althea, farina fabarum & lacte caprino frusta
insurpasset, jussus à Gaffero decedendo locum in ace-
to facto locum fovere, deinde suffire cum thure,
& superponere emplastrum de melioto cum fribus
construere mixto; quæcumque non statim resolveretur tu-
mor, & thermas ferreas cogitare cepit, quas ipsi
Gafferus dissuadere noluit. Sed his ipsis quoque non
satis operanteibus, quod unicuique supererat remedium,
ad sectionem devenit, quam feliciter pæcure, tan-
dem administrare coegit. Jo. *Valerianus Rinterus obs.
ferre. 91.*

Alius quidam hernia carneola laborans à Chirur-
go quodam curatus fuit testiculorum ex vino subli-
quato, & imposito cataplasma ex absynth. malo,

chamæm. rad. alth. & sect. lini, an. part. æq. con-
tictissis & in lacte caprino coctis. Alius etiam eodem
affectu laborans, sectionem postulat, sed Chirur-
gi præsentia terrens, mutavit sententiam, & emol-
lientium ac resorvorum usu continuato, tamè in
abscessum transiente, & suppurato, feliciter tandem
percuratus fuit. *Idem obs. 92.*

Ileus ex Hernia curatus.

Sepuagenarius in scroto verabatur tumore val-
de magno ac dolorifico, ejusdem cum case sana
coloris; tormina sentiebat in abdomine ac evo-
mebat quicquid assamebat; jam per viginti qua-
tuor horas hoc in statu constituta opem meam im-
plorabat.

Æger inter examen à me institutum retulit, se
jam per longam annorum seriem laborasse hernia,
quæ læpius eum, intestino in scroto prolapsio, mi-
rum in modum molestabat, ac iterum nullum affe-
rebat incommodum, cum intestinum in locum suum
recessisset; intestinum autem hoc nunquam ante-
hac tamdiu extra abdomen exulcrasset, quam
jam, & quicquid moliebatur æger, illud tepone-
re non poterit.

Morbum hanc satis periculosum esse, amicis
prædicti, qui tamdiu extra abdomen permaneret
intestinum: (Sic vit 40. annotum Ultrajecto Ate-
næum pedes profectus incidit in herniam scrotum
infestantem, cui antea etiam obnoxius erat, sed
tantum in inguine, & tamen adhuc per quatuor
horas faceret pedibus, unde tumor valde exte-
ravit, curaque valde durus & dolens; æger inter-
tin tempore vomebat, ac frigori expositus in stru-
mine per totam noctem jacebat apud rusticum
postero die curru advectus est Atenæum consue-
vomens. Mixtura ægro ptopinebatur status dila-
tationis, sed eadem mor vomitu rejiciebatur; ita
præterea clysteres injecti sunt, sed sine fructu; æger
in bono seu potius est, locus humidus sicque im-
ponebantur parti affectæ, sed his nihil juvenitibus
ægrois quanto ægrationis die è medio sublevis
pulvis sensum dimittit. Aperto eademer intestinum
ileum inventum fuit gangrena affectum spirans
longitudine, ac situm in scroto cum flaccidis & ex-
crementis duris; præterea magna pars omenti con-
tinebatur in scroto convoluta instar pileæ cum vasis
singulis valde distentis.) Interea autem amicos
ægri admonui, ne animam nimis desponderent, ac
eum in finem illi narravi observationem octavam Ri-
verio communicatam à Domino Ozia Aimat Chi-
rurgo Gratianopolitano, in qua post multa ter-
media per novem dies in casum utrupta, intes-
tinum per totidem lucas in scroto commotum,
repositum fuit feliciter incisione facta usque ad
productionem peritonæi quæ intestinum strangu-
lat.

Sed inde provenit, quod in hernia intestinum
prolabatur in scroto, aliasque partes? Ob rela-
xationem peritonæi, quæ exoritur ex eo, quod multæ
ejusdem tubuli obstruantur, inque illis flagrant ac
coarcentur humores, qui progressu temporis se
insinuant inter fibrillas peritonæi, illudque hoc pa-
do relaxant.

Cur jam intestinum in scroto nostri patientis
dilatatum, non tam facile rediit in abdomen, quam
inde egressum est, cum via sit eadem? Hoc præcipue
contigit, quia intestinum tamdiu ex-
tra abdomen permanerat, ubi minor est cal-
or; nam pori intestini eo modo aliquatenus

obstruati impedire quo minus vapores ob minorem calorem etiam aliqua ex parte condensati ex intestino in fetore decubiente liberè quaquaversum egredierentur, quapropter illi conseruati sunt in intestino, illudque distenderunt flatibus vulgo nuncupatis.

Hinc igitur manifestum satis evadit, præcipuum huius mali medellam consistere in eo ut post intestini cæcitatem exulantis obstricti recludantur iterum, ac vapores aliquosque condensati, maiore motus ac agitationis quantitate domentur, ut sic rufus citato gradu citra propria sua cætera rotentur.

Utramque hanc effectum consequutus sum linendo recenset contorto ac nondum coctione depurgato, nam ubi hoc prius in lacte dulci coctum calidè per quadantem horæ fuisset impostum parti affectæ, intestinum blanda manus agitatione, in abdomen ægi in bono situ collocati remigavit.

Æget hoc pacto ex vicinis orti fancibus ereptus postea cum plicatore ictus lapsus, ac gestavit vinculari fetorem extremè vestitum ad intestinum intus retinendum; nam homines provecæ ætatis à tali malo proterus velle sanare, est oleum ac operam perdere; coniugit enim admodum raro, quod Fabric. Hildanus refert in lib. suorum observationum, nimirum sexagenarium per 20. annos hernia magna laborasse intestinali, quæ à nullo Chirurgo aut Medicorum potuit sanari, eumque senem postea sine medicamentis in totum esse restitutum pristinae sanitati, postquam morbo aliquo periculo decubuerat in dorso per semestre spatium, ideoque optimum contra herniam remedium citatus Autor esse affirmat quietem & decubium in dorso.

Hernias vetò puerulorum sæpius sanatas esse vidi, & quidem præsertim circa octavum ætatis annum, bona fasciæ ac linteæ confectæ ac emplastro carminante Syllis extenso super coctum, quod reperitur præf. lib. 1. cap. 12. tit. 58. in quo tamen unum errorem, quem neminem secutum spero, annotare lubet, sc. quod gummi, galbanum, aliisque solvantur in aceto salem volatilem eorum non parum infringente.

Juramentum Medicorum in Academia Ultrasectina habet, audita vel visa inter curandum, non enuntianda, involvere silentio, hocque strictè observandum puto in herniis juvenum, quandoquidem hoc malum poellis insilium magis esse solet quam pat est, quod, antequam hanc observationem finiam, exemplo declarare mihi propolui.

Reveret nupta virgo, ubi prima vice lectum cum suo sponte esset ingressa intrepida manu mox illas manit partes contractæ, quas Admus sibi fecum foliis statim post lapsum contastile legitur, atque ita eundem hernia dixerat ex vinculo quod gestabat animadvertit, unde ferè in furorem acta, hæc in verba erupit: pudeat te conjux quod Amasiam tuam tam impè deceptis quid consilii mihi miseræ? Petii profecto, num tam malè conformatum corpus poellæ in flore ætatis constituit, ac annum decimum octavam nondum egresse satisfacere possit. Minime, actum est de me; emoj malleum, quam teum amplius habitate.

Maritus, hæc super te inæte tempore serio philolophatus, placido sermone tandem respondit; bono animo sis, anima mea, vanam ac supervacuam

hanc, meum coeculum, depelle sollicitudinem, quoniam polliceor tibi, me pro viri conatusum efficere, ne unquam hæc de te conqueraris amplius, ac novem mensibus via elapsis experientia marci verba confirmavit gemellis, quos enixa est uxor, postea mutæ vitæ audens de imaginaria conjugis impotentia, Joh. Mays in præf. Chirurg. Rationali.

Hernia inguinalis, cum gangrana.

Thomas Adcet, eques Anglus sexagenarius, herniam in inguine sinistro per multos annos habuerat. Anno 1637. mense Septembri intestinum, quod in herniam incidit, oimibz flatibus distentum, atque huic distruptum fuit, ita ut sterora in hernia capaciatem prolaberetur. Hæc prolasie gangranam cum fetore intolerabili pari flatum induxit, quæ inde cito putredine & distrupta fuit, atque ita fæca alvi ordinariè per hemiam foras profluxerunt, nunquam per anum. Ego vocatus prædixi ægrum evadere non posse; ne tamen incuria mea perire videretur, per Chirurgum applicare iussu spiritum vini cum melle rosato & unguento ægyptiaco, usque dum partes gangranosæ à sanis separarentur & deciderent. Tunc intestinum non tam ruptum, sed omnino transversum abruptum esse, eoque partem superiorem foras propendere, hincque sterora profluere animadvertimus. Hic intestini finis progressu temporis carnosior evasit, & quasi carneum annulum acquisivit, qui annulus cum vicina carne semiter coaluit; ita ut postea intestinum hoc loco semper fixum & apertum remaneret, atque inde ægro præter voluntatem alvi feces semper effluerent. Huic parti postea cacabam parvam æneum, commode adaptatum, semper appensum fuit, sic reliqua sanis, quocunque vellent decubantibus, Nonus jam agitur annus quo huic molestissimo oneri assuetus nunquam ægotavit.

Rarissimum hoc est & notari dignum exemplum. Antehac nunquam credideram intestinum abruptum in inguine cum vicina carne coalescere posse, quod tamen in hoc ægro oculatus testis me vidisse testor, nonquam antea à me observatum, licet huiusmodi intestinorum rupturas in aliis aliquoties viderim. Si forte intestinum abruptum inter carnosos abdominis musculos foras erumpat, tale quid aliquando contingere possit: verissimile viderit, curus rei notabilem casum Platerus observat, lib. 3. sic describit. Capitaneus quidam ante annos multos in ventre vulneratus, sterus per fistulam, quæ sanato vulnere illic remaneret, multos annos incolebat aliquot & superstes, excrevit. Cujus causam investigans ex anatomicis observationibus, certis argumentis collegi, intestinorum vulnera, si illis in locis, ubi carnes musculorum abdominis portiones existunt, ventrem penetrant, agglutinantur tunc utrinque, & intestinorum & musculorum carnis, vulnere in ambro labiis, viam fieri posse, per quam sterus extra corpus educatur, & in abdominis cavum excidere prohibetur, eaque vulnera licet consolidari nequeant, minime tamen esse lethalia: quod est tantum sit, tamen & in aliis partibus, ut vesica, accidit. Idem Platerus proximè sequenti observatione adhuc aliud similem casum enarrat. Joannes Horning Medicus Heidenheimensis, epist. ad Gregorium Horstium, enarrat historiam rustici cui à vulnere abdominis intestinum rectum vulnere lato apertum exivit, neque à Chirurgo iutus redactum est, sed sanato abdominis vulnere, toto vitæ tempore foras propendit, naturalem colorem retinens.

retinens, sed panlaim crassius ac carnosius evadens, per quod propendens intestinum faeces alvi cum magno labore excernebantur, neque amplius ab anno probabant. *Isbrand de Die meibrecht in Olservat. & Curatim. Medicæ.*

Epiplocele cum sarcocèle conjuncta, ex erosione omenti complienti, enata carne in spithama longitudinem ex inguine propendente.

Quidam Estensis in Patavino Xenodochio habuit prominentiam longam spithamam, insitit ptiapi ex inguine luxuriantem, ubi processus peritonæi, crassum vero duos digitos transverſos, adeo ut non inconcine simularetur forcam alterius membri virilis. Cum vero ab ægro quærerem hujus morbi originem, atque negaret esse intestinum prolapsum, ex ejus verbis conjectura affecus sum, esse omentum complicatum, cum prius Bubonocèle laborasset, postmodum abscellu, quo disrupto prorupit omentum, atque sensim ita convolutum fuit, illique propter erosiorem caro quadam inter plicas accretæ in prædictam forcam: quem hoc modo curavi. Primo expurgatis humoribus redundantibus, portunculam dictæ prominentiæ feci, ampliato utique adeo vulnere, ut omentum implicatum se prodere; quod duobus, vel tribus post diebus fecui ex toto ad inguina usque, rum digerentibus; demum confectis exsiccanibus cicatricem obdixi; incolumi adhucnum ægro, & omni molestia vacuo. *Petrus de Marchenit in Olservat. Medico-Chirurgicar. Syllage.*

Bubonocèle loco bubonis Venerei ab imperito barbitonfore scella, prodeuntenus alvi factus, brevi temporis spatio sanata.

Villicus quidam Bubonocèle laborans, barbitondorem accersit, qui Venerem bubonem cum existimaret, ejus proinde sectionem suadet; quamquam æger cum nulla alia muliere, uxore propria excepta, rem se habuisse sancte affirmaret, honesta equidem, ac pudica; cum vero tonior opinionem suam tueretur medicus, atque omnino sectione opus esse, eam tandem misit villicus admitti, ex qua cum feces erumperent, statim in lipothymiam prolapsus est, tonfore obtusescente. Ego verò cum calu illac transirem, vocatus, statim digito compulsi intestinum in locum proprium, applicato ovi albumine, cum sanguine draconis, atque linæolo quadruplicato compressione facta artibus nonnihil costricti quatuor dies, à quibus cerato demum ad herniam ab Aquapendente usus, spatio decem dierum, scilicet partes coalescuerunt. Tandem meo consilio totum vitæ tempus gestato cingulo, multos annos incolumis vixit. *Idem ibidem.*

De Hernia intestinali.

Filiolus nondum bimulus pænobilis Viri S. P. heretofus, ptiapis per peritonæi processus intestinalis, catarrhis & ruii molestissimis gravissime affectus, agrotavit hyeme jam adulta. Adhibita in reu plurima, Concessio corporis à ruii intestina, quamvis, reposita & fasciis ac subligaculis conficta, sede tamen suo continet non est passa. Accessit Lithotomi mox, ad ducta à peregrino Chemiatro, quæ ventri Cobi-

tides barbarulas imposuit, ut nescio qua virtute intestina prolapsa retraherentur, & loco suo firmarentur. Sed puer tamen obiit. Unde conentiones haud leves mixtis conviciis inter Medicos utrinque, parum decore, magnetismum hinc illo defendente, illioci autem altero mortis causam interminante, quæ quomodo tandem transacta fuerint, non satis constat. Nos interim interrogati respondimus, curiosior ejusmodi mere empiricam, non quidem lethiferam, sed tamen ineptam, & multum fuisse, ipso eventu attestante, dum nugis ejusmodi certiora præsidia intermitteri oportebat. *Georg. Hieronymi Velschii.*

Hernia intestinalis cura temeraria lethalis.

L. B. I. F. de K. hernia intestinali, seu bubonocèle per multos annos laboraverat, cui sæpius intestinum pars, neglectis fortasse fasciis & decente subligamine, in inguine aliquando valde prominens ac refrigerata dolores acerbos clausit, & nullo modo quam fomentis tepidis emollita loventem recessit. Sed cum sexagenario ob statum abundantiam iterum accideret hoc malum, intermissa deligatioe solita, intestinum diu nimis propendens refrigeraretur & indurasceret, circumforaneus quidam perleveraret promissæ, se intestinum propendens facile introsum, & heriosum hunc affectum perfecit curaturum; vetum ob renitum & contradiotionem curis dilaceratæ, ac intestini inflati & indurati magnitudinem, scalpello cutem & peritonæi membram prolixius dilatavit, intrusæque violetoe intestino nec prius emollito nec tepescido, curis difficile ora contulavit, ab emplastro imposito fasciæ deligavit, attamen brevi post patiens febrem ardentem cum animi deliquis lentius, & accedente sphaeculo intestinalium, paucos iotta dies vitam cum morte commoravit. *Helwigii.*

Schal on Schroekii. Ut Agyrtarum in decipiendo promptissimo temetlate ubique circumvallatur, sic & in herniis eandem maleolies spechandum impone exhibeat, quas duriter tractare, & absque necessitate crudeliter secando adgedi sunt paratissimi, necessaria parium, quas incidunt, cognitione vacui, nec symptomatum supervenientium medela instructi, sed uoico experientiorum, quam morte aliorum ubi comparant, fulcro cæci incendentæ, vilissimoque ut plurimum ab oitu ad opus hoc accedentes; qualem herniotomum Guil. Faber Hildanus præfat. Oper. Chirurg. delineat, qui subulcus porcos caltrare cum didicisset, in hominibus postea idem tentaverat. Sed præstat unum alterumque exemplum in curando & secando temerarioe hominum ac imperitorum nebulosum indiguisse: Hernie omentalis io lanione, nec non intestinalis in alio perperam, & cum ægrotum interito curatæ habet Malach. Geigerus Kelegraph. cap. 3. Adolescenti in præpostera herniæ inguinalis sectione, ab agyrtâ pensato coxas fallax animæ sacco holoflerico ioculus fuerat, intestinum vulnertum narrat Philipp. Hochsteternus dec. 10. obs. med. cas. 3. Intestinalæ agyrtæ rusticus, sarcocelen forte reputans, suppuratione curatos, in exitum deturbaverat ægrotum, cui refert Henz. Salmoth. cent. 1. obs. med. 11. Contra Gallom agyrtam, herniarum cutam filo auro centissimam pollicum, Henricus ab Heer obs. med. 21. invenit, quem filo ferreo metacurio crudo obliro, intestinum licum una comprehendisse, & valida contorsione fecibus per inferiora exitum

exitum lethaliter præclusisse, memorat. Bartholinus impetum villico bubonocoele, quam venereum bubonem crediderat, laboranti, ejusdem sectionem persuadens, purulentæ materię loco, feces erumpentes obstruxit; ægroto tamen exercitissimæ Petri de Marchettis ope, resistente, quod ipse recenset observat. med. chirurg. 55. Cui consimile exemplum producit Hieron. Fabricius ab Aquapendente tract. de operat. chirurg. cap. de bubonocoele. Sic etiam, quodam Naturæ lusu aut errore, testiculum in inguine recouditum habentem, aut tertio insopet præditos, pro herniosis miseris frustra quædam diu vexatos scimus: quales vidisse se testatur citatus Geigerus, nec non Ambros. Paræus lib. 7. oper. chirurg. cap. 16. Notabilis quoque est historia, quam Aquapendens cap. de intest. hern. exhibet, adolescentis nimirum, testiculorum naturalem in magnitudine diversitatem ignorantis, atque ex sinistra majore mole herniam perimecensis; quam cum herniotomo ostendisset, & nisi testis extraheretur, mortem instare, persuaderi sibi passus fuisset, jam legatua castrationem expectabat, nisi Fabricii consilio à curiis ista liberatus fuisset. Scilicet quæstiosa cum in illa sectionis crudelitas, quam præter dolores, testiculi iacturam, ipsiusque vitæ periculum, care facis redimere ægroti coguntur, herniotomi isti inhumani ad persuadendum cum ferro medelam sunt expeditissimi; quamvis plurimi, non pueri tantum, sed adulteros quoque, solo medicamentorum uso, sedulaque deligatione, vel omnino curati, sed saltem minori cum differtine degere possent. Hinc Bartholinus cent. 4. Epist. med. 22. Herniam, scilicet, inguinalem in adultis pro incurabili non habeo, si vel recens sit, non inveterata vel imperfecta eorum sit, tunica vaginali nonnihil dilata. Utroque enim casu non difficulter primo respondentem est lincellum, deinde pars emplastro adtingente & vinculo munienda. Sic Paulus Ægineta lib. 3. de te. med. cap. 53. multos pueros citra manus operam medicamentibus impositis, & convenienti de ligatura perianaxos tresset. Joh. Scultetus innumeros, longo temporis progressu, magna adhibita cura, remediis, brachio, victusque bona ratione perficere sanitati se testituisse; quos vero vel ob affectus magnitudinem; vel ejusdem diuturnitatem integre, sanare non poterat, incrementum saltem enteroceles se prohibuisse, testatur part. 1. Armament. chirurg. tab. 39. Hinc male facere, part. 2. obs. 64. iudicat, qui maluit à Castratoribus torqueri, quam Medicis meliorem bene consulentibus per mensem obedire; prout nec illos Medicos laudem mereri, qui ab ægro rogati Orchotomis adstant, & Circumforaneos male operantes non corrigunt. Quod etiam de inguinibus puorum herniis Ambros. Paræus l. c. cap. 15. facit, remedium ope multos à se sanatos, & castiores manibus, testiculorum pueriliam avidis, exceptos scribens, quin & de adultioris ætatis homine exemplum profert. Et præfatus Fabricius ab Aquapendente, Horatium de Norcia, operatorem hac in re maxime exercitatum, & qui plurimum ducentos quotannis castrando curaverat, postea nec inter viginti sectioni huius subicisse refert, cum brachio & adstringente medicamento imposito plerisque sanari observasset. Quin & Nicol. Monardus de simpl. medic. ex Novo Orbe delat. cap. 71. solum ligaturam decentem sufficere posse existimans, nulla herba aliave te imposita, cuiusdam Cordubensis mentionem facit, qui omnes herniosos eo modo curaverat. Atque Jo. Bapt. Helwigius hernia bene ligata citra expectationem sanari meminit et. Puzos. humosiss. vindict.

p. m. 323. cum pariens ex offitaggio diu lumbis decubisset.

Hernia inveterata periculosa.

Dn. V. C. de W. Ann. 1663. die 29. Aprilis ventris constipationes flatulentes & dolores lancinantes sentiebat, & inquirere doctiverat, ideoque sequente diluculo Medico accersit jussit, de iis dolentibus, præsertim in lumbis ad latus sinistram ac in inguine dextro, calculum renalem fore putans, querendus remedia perit. Sed cum exgressis & loquelæ difficultate Medicus jamdudum herim quendam suspicatus, quam æger per viginti septem jam annos tolerans, præ pudore celaverat, nulloque unquam medicamine, nec auxilio, nec ligatura ad sublevandum tam grande pondus usus erat, inde omnium medicamentorum successus difficilis fore hic aperte pronuntiavit, nihilominus pro morbi statu & qualitate cautè procedens ad ventrem leniendum, ac dolores flatulentes amolendos, portionem brevem laxativam & catminatam, atque fomentationes externas, itemque alia interna, non omisso cordialibus, præscripsit, per quæ die 21. Aprilis evacuationes etiam leves ille habuit, dolorum mitigationem quandam sensit, sine illa videlicet difficultate, ac oppressione, quapropter pariens bonam revalescentiam sperare conceperat. Subsequente vero nocte diei 22. Aprilis morbus, per dolores lancinantes cum corporis in lecto circumjactatione magna, recruduerunt, quocirca inter alia mitigationia, ad instantiam ipsius ægri, infusus balnei ex decocto emollientium & flatus discutientium, cum bono, quamvis infedat, sublimine, quod ipse prædicabat, concessus fuit, sed subinde adveniente ob longam moram in balneo, virescenti prostratione & spiranti difficultate, ventre rursus constipato, circa vespertim portionem quandam calidæ extractæ in jusculo sumptæ, inopporiorumque sub nocte applicato, quæ tamen præter spem oculam sedem moverat; uox quidem paululum quietior fuit. Mane autem, die videlicet 23. Aprilis circa horam quartam, eorum Medico nihil p. ne quam anhelum diffilem quærens pariens, maturus leviter desideravit & cum Medico vix quicquam scriberet, & ad pharmacopolium mitteret, æger ad alvi fecesum se propere commovens, administrantes advocavit, tunc subito illi spiratio defecere videbatur, & lente sic inter suorum brachia occubuit. Post obitum hernia inspecta, quam vivens ille valde pudibundus ab aliis conspici & contractari unquam noluit, inventa est magnitudine caput viri robustissimi excedens, atque pondere aliquot librarum extra corpus dependens, vixit vero ille ad mortem usque in calidatu. Helvigil.

Schollus Schwaigi.) Ex incuria, pondere & negligentia maximas tandem ostii possit hernias, non est dubium; intestina enim, via ad lectum inventa, cum pondere gravia sint, sensim magis magisque eo devolvuntur. Tales amplissimas hernias Olavus Borrichius in centur. 4. epist. medicæ, Bartholini 92. Joh. Meckerus cap. 5. observat. Chirurg. Felix Platerus lib. 3. observat. pag. 756. & Johana. Freitagius apud Gregor. Hottium lib. 2. Epistol. medicæ, lect. 19. &c. descripiunt. Quarum sane cura difficillima & ex plurimum frustranea existit; præcipue si quod facile accedit, inflammatione, & quæ eam insequitur, gangrena corripiantur intestina prolapsa sive à frigore extremo ledantur, statibus scilicetque distantia compactionem passurus, adeoque sanguinis

sanguinis liberior ibi transitus inhibetur; siue jussu calidiora interna extempore remedia in usum ducantur, aut etiam violentiori manu tractentur; quæ ratione, animæ sunt animadvertiones, in curatione enterocæles notandas Dominico Panarolo cent. 2. observat. med. 49. primo loco monere placuit, à Chirurgo sepius manum hand admoventam esse, cum alia dolat, & cum dolore attractio crescat.

Hernia Curata.

Filium meum Henticom, cum in Patriam meam missilem, ut fugetet pestem Brigæ grassantem, ibidem herniosus factus est, intestinum prominens in Scroto dimidiâ digiti longitudine. Postquam id digitis intro adipsilem, præscriptis pulverem, qui Rec. Fol. Contol. Satac. Sem. & fol. persol. ana. 3ij. Fol. Pilosell. rad. Coosol. maj. ana. 3j. Sach. pensil. 3v. M. F. Pulvis. De hoc in dies mane usus est in jasculo & quiescit aliquot horas. Invenit etiam inguina OI. mæmord. & impolui Emplastum conera Rapturam. Subligaculo etiam usus est aliquandiu; quod tamen postea amovi, & ita integrè Dei beneficio curatus est. Egit annum fere quintum.

Schellon.) Fuit Enterocælex, Curatio, quam evenrus comprobavit, est egregia, & nullus dubito, quin ille alia eundem exitum & emolumentum præstatura sit. Æger fuit Avunculus meus, qui in senium & ad Motrem usque eoquam hoc malo amplius fuit afflicti. Ita ut sane integrè & perfectè restitutus fuerit. Christoph. Rosleri.

Enterocælex desperata, curata.

Andreas Nock, Gottlaviensis, anno 1661. d. 8. Aug. hernia intestinali diu laborans, agros sulcandi ergo campus adit, sulcando autem, nimiumque in movendo, intestina in scrotum prolapsa sentit; domum itaque delatus, varia adhibuit remedia domestica. Patum aorem istis proficientibus, quin potius symptomatis aliis plurius inveniuntibus, in pejoratus. Obortus enim deplorandus ille affectus Miserere mei, singules insuper vehementissimus, à vicinis ultra sextam etiam domum auditus. Summo itaque in periculo constitutus æget meum implorat auxilium. Insulto autem misero ægri statim, ipsemet expavi, tum, quod remedia convenientibus non satis effectum instructus, tum quod scirem frustraneos esse tali in casu sepe constans. Quod autem adstantium, ægri impetratis, votis satisfacere, de illis, que in pago ad manus erant, medicamentis, sui sollicitus, ex horro itaque prope ad ipsæmet collegi seq. herbas pro clystere fœmoneque v. g. herb. malv. alch. viol. alin. chamom. an. M. ii. coq. in 3ij. lact. vacc. & dissol. buryt. rec. 3ij. mell. 3ij. diversis vicibus injectos est clyster &c. Species autem sacculis duobus indinas, fomentationis ergo alteratim calide impolui, totumque abdomen fovi. Coxi & insuper portionem sequentem, quam frequenter assumpsi.

22. Herb. equil. M. i. rad. liquirit. sem. anil. carvi. an. 3ß. Quamvis autem hæc omnia ritè facta sunt, de mortis tamen occellitate nemo non cogitabar. Convocatis itaque amicis, Parochoque Dn. Scheftero, voluntatem suam inclinavi vicinam, viarique facto accepto, & mihi & adstantibus cæteris potè recta manu, vale dixit. Continuantiis autem nobis medicamentorum applicationem, fomenta imprimis diligenter adhibendo, insigni crepitu ac strepitu, ingesta in abdomen sunt segrega. Hinc locum per

superiora ejectio, singulantes inhibuit. Æger autem paulo post optimè exoptateque restitutus est. Vivunt autem hujus rei in Gottlavi. hodie nam adhuc & æger, aliique adstantium testes veridici plures. D. Johanni Friderici Allmæcheri.

Enterocælex enormis dextera manu reducta Reduciva metui castratione post feliciter instituta.

Devolvebatur frequenter in scrotum intestinum Mag. N. B. Hologlogiæpæ Gœnervensi: Anno 1670. tam enormis supercristo illi delapsus, ut omnia intestina illuc devoluta credidissim; Scrotum ad capitis biconis pueri magnitudinem immutaret; Advocat Chirurgi, illic non impetier, operam insanam fudebant, nec enim reductionis alium exordium apparebat: Inflammatio tantum progressum fecerat ut gangræna in prociutu esset, jamque spes omnis salutis ægri & assidentibus excedisset. Nomen mihi erat peritissimus Herniotomus in proximo districtu obitans; Coterius Filius; Fortuito & sanste ea die in urbem advenerat; & quantum de successu dubius effem; ille tamen repautionem intestini aggressus, tam celeri manu eam absolvit, ut duodecima horæ partem interim vix efflueret: Cohibito gangræne progressu, sedata inflammatione, ac spatio concessu ut æger vites collapsas resumeret, Eunuchismus ab eodem Coterio susceptus, cui non invire se subiectis miser, eadem felicitate & celeritate petfecto, adeo ut intra octiduum planè convalesceret: Eundem Operatorem, in non dissimili Enterocæle, ante biennium in consanguineo cognomine, eadem industria evoratoque æque felici præstiterat: Ut hinc, aliisque exemplis, colligere liceat affectum hunc hæreticis admodum randum esse: Neque tamen artis pericia (per chieurgorum quorumdam tumore & vanitate) jux civitatem comparare illi Herniotomum liceat, etiam apud nos endemium sit id malum. Th. Rosleri.

Hernia Curata.

Dominus Balthasar à Rortkirsch cum jam 50. & aliquot annorum esset, dicebat se curatum Subligaculo & crebro usu Consolidæ saracenicæ & persoliatæ in jasculo cum axungia gallinæ, melle & buryto majali. Sed per anuum his usus est.

Schellon. In Poeris quidem cura herniarum non tantum difficultatis habet, quantum in Senibus, cum ipsorum Humidum radicale adhuc inexhaustum nec humores tanta acrimonia læstant, ut glottinationem impedire possint; tamen aliquando hanc curam etiam in senibus succedere, si in usu medicamentorum perseverent, inter alia & hoc Exemplum restitutum satis luculentum exhibet. Sed in hoc volupioso seculo necessum esset ut Medicus Patientiam, si vendibilis esset medicamentis admisceret, nam delicatissimi homines, cum adhuc in primoribus labis medicamentum versaret, effluem & levamen desiderant. Ad curam quod attinet, Consolidæ saracenicæ vulneraria est, & attingit, ut & persoliatæ; itaque diutius utratque optimam effectum dederunt. Christ. Rosleri.

Enterocælex per tiliam fissam sanata.

Puellis sonorum octo hernia intestinalium laborans cum aliquandiu hic Chirurgi alioquin satis periti, opera frustra usus esset, quod sectionem non

admirarentur

admirerent parentes, revocatur domum, conferant consilia vicinæ, exempla carent felicitis illiæ ad urbem Halmetadium enatæ, ejus ope plures ab ejusmodi malis liberentur. Quid multis persuaderet sollicita mater, & cum filio illuc excurrat; quaeritur in nemore viribus incluta arbor, & tandem reperitur. Hic puellus eversæ se omni vestium apparatu, & in morem Dianæ nodæ (ita enim jussit atri huic præfecta nescio quæ Candida) per rimam illiæ hujus junioris manibus duorum valentiorum juvenum eo ipso temporis articulo distinxit: res saltu celeri se prospere. Peracta fabula vestitur iterum puer, timæ arboris cetera & terebinthina admittit coctum, & nobilis effectus sensim promittitur securus. Ne longus sim, convalescit paulatim faucis arbor, & cum arbore paulatim æget, utque frondere iterum illi incipit, ita firmari sanitas pueli. Quo audito subit animum conatus Maroniani illius amaroris Eccl. x.

*Certum est in styris Inter spelæa ferarum
Malle pati, tenerisque metus incideret amores
Arboribus: crescent illa, crescent amores.*

Similia memini ante paucos annos in Harlemensi nemore attemperata fuisse, & cum quidem in fissa iquestu successisse experimentum: Scrutentur hic alii occultas rerum abditarum causas, Ego nihil video præter superstitionem. D. Olai Berrieki.

Sarcocœle ex operatione infirma lethalis.

Vix quidam honestus septuaginta circiter annos natus ad nos non ita pridem adveniebat. Is jam dudum Sarcocœlen gestaverat, ejusque grandioris pondus, quantumvis molestum, tacito coneluserat dolore; verum dolores ultimum adjuncti, cum tandem ad opem chirurgicam imploratam compulerunt, idque tanæ malis suis fati; nam cum Chirurgus è nostris alias dareturimus, ac in ministris suæ artis peritissimus, separationem sarcocœles moliretur, nec satis explorasset: hoc hæc separatio intracto testiculo fieri posset, incisione sufficiens factâ, atreptique tumore per eam extirpandò, testiculari ondiq; adhærens identidem soboleguatur est, sicque castratio deceptio peragenda fuit à minus ad hanc operationem præparato artifice, quæ quidem satis bene pro tempore credere videbatur, at tertiâ die de repente suborta est pessima omnis rueredo, atque mors quinta subsequuta. Vidant itaque quibus talia committantur negotia, ne temerius rem aggreddantur.

Anatome Sarcocœles.

Sarcocœlen variè definiunt Auctores. Celsus l. vii. c. xviii. Raro, inquit, sed aliquando caro quoque inter tunicas (testiculi) interfectæ *enagium* Græci vocant. Galenus l. de tumor. præter naz. testiculos vocat induratos, & l. xiv. meth. med. eandem scirrhia non improvidè comparat. Hodie tamen Medicorum plerique, et clarius rem expriment, Sarcocœlen interpretantur, quosdam carnosum quiddam in scroto testibus adhaescent. Atque id quidem nonnumquam contingere, haud inficiandum, prostant apud Hildanum, & Loëchium exempla; frequent tamen sarcocœle non tam adhaescent testibus, quam innascent, hoc est, totum testem, ejusque vasa omnia materiz novæ accessu ita infarcit, & potitig, ut aliquando etiam vicecuplo se ipso gravior, et ampliorque evadat. Hoc ut sæpe alias, ita superiori quoque hyeme

in mercatore Samio mihi observatum, cui abluas fetto chirurgi trismicosus testis pendebat lemanicus xxxiv. durus ille quidem toto corpore, & massæ carneæ nervosis hinc inde gyris d. stinctis similis, sed neque ad latus, atque in gremio suo ullum alium testiculum naturalem complectas. Difficili enim quaeritur infirmi mole, ut testiculus verus, quem intus delitescere quidam suspicabantur, in conspectum veniret, deprehensum clarissimè fuit, totum illud enorme corpus testem fuisse, sed testem à sanguine, ut conjicere licet, admisso, verum propter vel contusionem, vel frigus, vel pituitam nimiam ad superiores partes non remissis, eoque in eam degenerem coagulato distentum. Proinde non satis providi rei æstimatoris mihi videntur, qui confirmatam *enagium* vel medeamentis diffusissimè se, vel diluenti posse evulgant, quod nimium occalleat massa illa & mille plebis nervosis, illic solis coarctat in vitam ducit. Crediderit Martholus in Dioscoridem, crediderit Scultetus in Armam. chirurg. scilicet sarcocœlen pulvere oonidis percutasse, nihil tamen mihi sit verisimilius, quam fuisse hydrocœlen duriori cortice circumdatam, atque ideo sarcocœlen meo-riorem. Atque ut id credam, præter jam allata, persuadent tum similia pulsim exempla apud Forcellum, Sennertum, alios, docentia artifices sæpe aquas profundius in testiculorum sinibus latente deceptos pro carnosis æstimasse hernias, quæ fuerint aquosæ; tum docet radix ononidis. quæ enim inter nobilissima diuretica sit, aquas haud dubiè in sinu testium intimo occultatas paulatim eduxit, atque ita coincidentibus sensim in se involvitur durioribus, sarcocœlen æstimata fuit sustulisse. D. Olai Berrieki.

Ufus Catechu in hernia varicosa.

L. L. Studiosus 24. ann. cum ante aliquot annos laborasset hæmorrhoidibus, Splenicis, in sinistro latere in vasa spermaticis, ubi ex pectore processu in scrotum ingeruntur, tumorem varicolum modicrem duos jam annos passus est, durissimum & dolorificum, præsertim, si stare diutius cogitur. Adhibitis resoluentibus & aperientibus, externis & internis, molliri redditus est tumor, à frigore jam recedens, contractus sc. vasis, quod etiam decumbenti contingit, tandem dato pulvere terræ Japonicæ præp. tam solo, quam cum Antimonio Martiali cachectico remixto, optimum præ reliquis sensit levamen, immo scilicet eandem referens, & melius habere. Non dubito, si continuaverit, eo est affectus chronicus, & pars corporis remotior, plenariè propediem ipsum testiculum iri. D. Georg. Wolfgang. Wedeli.

De Enterocœle abscessu inguinis spontaneo sanata.

Opetatis quidam enterocœle laborans sinistri inguinis, repositis intestinis, gestatoque trium mensium spatio subligaculo, per integrum postea trisennium absque obsecro iocommodo viagerat. Quo tempore elapso, à motu vehementiori, laboribusque durioribus, denuo in hemiam loci illius, maximis hunc ventris doloribus, incidit, quos variorum calefacientium fomentorum, ex cumino &c. concinnatorum, applicatione uxor ejus abigebat diu, sed frustra tentaverat, tandem à Chirurgo intestinum quidem, diffidili licet & multo cum labore repositum, atque subligaculo ope egressu via rursus oclusa fuerat. Paucis tamen post diebus, inguinis illius dolor

dolor & inflammatio supervenit, in abscessum denique terminata; quo brevi, ab impolito pharmaco, rupto, copiosum pus evacuatum vulnufque amplum facta & profundum debite tractatum, labia impietis ejusdem invicem adducta, & in cicatricem ut abirent, curata fuerunt; quo partes subjacentes duritie sua comprimens, ne deliquio iterum intestino transitum concederet, præcaverunt. Adeoque, quod antea brachetii solius gestatione effecerat, jam colloca curis duritie periculum felicius avertit. *D. Luca Schroëckii Luca Fili.*

Sarcocele.

Sectioni Sarcocele in milite in vico Aurigarum interfui cum D. Moinschenio & D. Kolichen, à Lithotomo Laurentio Nicolai feliciter & deatre administrata. Aperta cute inguinis dextri, testiculus dexter, qui ad capitis puerilis magnitudinem excreverat, separato & alio seroto, extractus & testiculi vas spermaticum, proinsæmptum fuit, magno militis siliis conditissimi ejulatus. Ligatis vasibus, confusum serotum, & cætera, ut vulnus deceret, curata. Dissectus hic testiculi dextri tumor, glandulosam substantiam ostendit eae magnitudine auctam, ut oncel esset militi satis valido. Infima vero parte vesiculas intra membranam continebat, sanguine plenas, qua parte de maximo semper dolore, ob distentionem tunice sensilis, conqueles fuerat. Tormentorum obliquis ad militares functiones postea rediit. *D. Jacob. Schmid.*

De osculis ex Sarcocele suppurata prodeun- sibus.

Quam varia sæpe & insolita reperiantur in corpore humano, & suboriri imprimis in eo abscessibus corpuscula, sive aliunde eo translata, sive in ipsis etiam genita, plurimis observationibus passim eantibus docetur: Imprimis vero Calculus in omnibus fere partibus genitus quis ne ciat, qui etiam nec partes generationis dicatas immunes abire permittunt, velut in prostatic lapidem infixum fuisse deprehensum refert M. Donatus lib. 4. H. m. m. csp. 30. Calculum magnitudine pilum fere sperantem describit. I. R. Salzmanus in observ. anat. ultimis: Ex testiculo quoque ulcerato lapides caermos habet Pachegus in observ. 2. Riverius 44. Ipsum semen in vasibus ejaculantibus petriicatam legitur in Zodiac Med. Gall. Anni. m. Marr. Obs. 4. Alii ossa etiam in abscessibus quod reperta fuerint, id revera inter rarissima est connumerandum, Cujus tamen fidem faciet sequens, quam commemorare libet observatio. D. P. G. aurisaber, per plurimos annos dextri testiculi tumore ad capitis infantilis magnitudinem tandem aducto, & ipsum inguen, ut hinc bacilli crassilem aquaret, simul occupante, à variis in consiliis adhibitis Chirurgia primo Hydrocele, postea cum testiculum equo infidens durius epibipio impigisset, Sarcocele pati creditus; tandem frustra in osium ductis plurimis remediis, ante septennium à Natura ipsa, optima morborum medicatrice, auxilium invenit; siquidem in eodem latere sponte aperto seroto, serum primo aliquandiu, tandem plurima, & vel ad quinque uncias quandoque, purulenta materia egressa fuerat, sique usu mundificationis & traumaticorum per siphonem injectorum, tumore paulatim decrecente, durum quid in officio mlieris Chirurgis, *Jean. & David Fraitegus*, patri & filio, quorum deaterrane tum contrabatur, sese obtulerat; quod vellella extractum, esse osculum plurimis eminentis alpe-

Bibl. Chirurg. Tom. II.

rum, & inaequalem comparuerat; cui dein successitve plura alia diversæ figuræ & magnitudinis infecta fuerant; usque dum tandem alterum, etiam non sine magno labore extenuum fuerit, consolidatione vulneris mox sponte succedente, & integra cura intra novem septimanarum spatium ad finem perducta; ita ut nunc salvus adhuc, & senio licet pressus, sat tamen vegetus vivat, testiculique morbosum bene jam constitutum circumferat.

Schulm.) Adfectum hunc ad nullum alium commodius quam ad Hydrocele cum Sarcocele conjunctam refecti posse, mihi equidem hand est dubium. Quamvis enim (ut de hydrocele, à seroso stillicidio ea vulnere primum observato satis demonstrata, nihil dicam,) sarcocele testium & vasorum adnexorum in molem insignem à sanguine in eis subsistente & concretescente, factam extensionem, ac in massam quasi carnosam indurationem, ut plurimum denotet, quam ideo discutientibus posse curari negat Excell. D. Ol. Boerhaavius Vol. 1. Act. Med. Hist. observ. 97. & si quæ hoc modo sanata perhibeant, hydrocele potius fuisse statuit; sique etiam per suppurationem, salvo remanente testiculo, tolli haud posse, addere liceat: hic non tam testiculum auctum, quam potius carnosam tantum quandam substantiam fuisse eidem adnatam, statui posset. Licet fortasse, sanguine carra vasa effusa & in eorum interstitiis subsistente, aut alio quocunque modo intassato & indurato, per succedentem autem suppurationem evacuat, vascula illa & membranas sensim sic denuo contrahi, & naturalem, quam antea habebant, conformationem adipisci, dici posset. Unde vero difficula illa in locum istum plane caosum pervenerint, magis intricatum esse viderat. Non enim ab ossi aliquo per corruptionem abicidente, & in hunc locum depositas fuisse particulas, sanieas cæteroque sat integras, juxta cum osculorum multitudine, persuaadet; nec per fascinationem, cujus nulla hic suspicio, injecta fuerant; nec etiam extranea saltem forma ossium substantiam referunt, cum solida admodum sint, rasura in ossam scobem abeant, & igni subiecta, præter odorem, ab ossibus crematis aut etiam congeneris cervino cornu eahalanti similem, remanens corpus, ulla talimodi ossibus omnino respondens suppeditaverint. Unde à sero extra vasa effuso comodem ortum deducere opus erit; quod uti in statu naturali consistens, membrana, cartilaginosa, ossifera naturam adsumere aptum esse, siue particula in ejusmodi corpora consulari prona continere, nutritio istam partium nos edocet; ita & hic gelatinosa ejus particula, discussis aquosioribus, in ossa abire corpuscula potuerunt. *D. Luca Schroëckii Luca Fili.*

De hydrocele à Catharro orta.

Invetetatem hydrocele medicamentis externis impositis uti raro & vix curari, celeberrimos Prædici observant, ita recenset exortam hilem aliquando cedere, nocum est. Sic *Laz. Riverius cent. 2. Observ. 4.* in poeulo herniam agnosam per cataplasma ex facina fabarum cum vino genoso coctum, admixto etiam oxymelice simplici, intra octiduum fuisse discussam, memorat. Ingeniem quoque testiculi sinistri tumorem aquosum, adhibito ex convenientibus cataplasmatum, sanatum refert *Henn. Salmuth. centur. 3. Observ. 93.* Idem & mihi anno præterito observare contigit in Juvene 17. annos nato, qui dolore capitis insigni & tumore genæ sinistra, ut & colli; circa mensis Angusti principium correptus, cum ab adhibitis 5. & 6. die didi mensis, medicamentis

Ll serum

serum blande per sudorem evacuandum, externe vero adpositis discutientibus, levamen habuisset, remittente nempe dolore, & subsidebat paulatim tumor, eodem tamen tempore per latus sinistrum juxta dorsum descendere aliquid percipiebat, testiculumque sinistrum non sine dolore in molem ingentem attollere; quod cum velper di. 6. mihi anxius indicasset, bydrocelem esse deprehendens, Cataplasma ex mastiche, Botibus chamæmeli, sambuci, & salviae, & rosarum rubrarum cum lacte paratum imponere iussi, quod non tantum sopiendo dolorem, sed tumorem etiam notabiliter imminuendo, optime conduxit, ut, cum insuper 7. die Aug. portunculæ ex resina jalapae parata purgatus fuisset, paulo post planè convalesceret. Mira hæc serosi humoris, copia & stagnatione peccantis, & hinc tristite capiti sensationem inferentis, nec non tumorem genæ collo inducentis, præterea majorem admirationem parit quod serum discutientibus interne in usum ductis, ob copiam non prompte cedente valens, non in vasa lymphatica readmittitur, siquæ ad scrotum, sed testiculi via per latus sinistrum sensim eo derivatum fuerit. Quod si consideret, catambosus defluxiones non simpliciter delictamenta in posterum esse dicenda, evidenter facit adstruit. Vias tamen, per quas fluxio hæc processerit, satis obliquas nobis reliquit Natura, nisi forte nervorum, & quidem, si ordinem à Cl. W. ILLIO nervis assignatum sequamur, quincei paris, buccarum muscularum furculos muentis, & postea una cum sexti paris ramulis, nervum intercostalem, ad rebes etiam abeuntem, producentis, id beneficio accidisse dicere liceat, intra quorum membranas inuans se lymphæ illa extravasata, per latera eorum sensim usque ad testiculum descendit. *Idem.*

Monstruæ umbilici prociencia.

Superiori anno Bernæ monstrem quinquagenariam, robustam, sanam, obetam & pinguem valde, invisi. Illa ante multos annos in difficili partu relaxationem umbilici contraxerat, ex qua relaxatio petionem, paulatim et omphalus plane monstruosa facta fuerat, quandoquidem ad magnitudinem uteris, qui secum matrem gerit umbilicus p. opendebat, venit nihilominus suam levatam proportionem. Extruberantia verò illa umbilici, veluti ingens sacculus ita propendebat, ut manum facile totæ ventrem & faciem istum imponere possem. Porro tumorem hunc ex omento prolato, & sensim in istam magnitudinem aucto, prognatum fuisse, verisimile mihi videtur absque dolore enim tracheo, mollis & undique equalis erat, à naturali colore non discrepabat, murmur nullum percutiebatur, ut in hernia sit intestinali: in ventrem retrocedebat nunquam, etiam si alvum exoneraret, vel in dorsum agri decumberet, sed semper in eodem permanebat statu. Ex quibus apparet, fuisse omentum, idque in istam molem & magnitudinem auctum, sed hæc obiter, quæ si non probabilis, verisimilis tamen esse videtur.

Ceterum etsi sacculus iste ingens & ponderosus esset, ita tamen corpore erat valida atque sana femina illa, ut negotia sua domestica ipsam administraret. De generatione verò tumoris omenti, cujus mentionem facis, nescio quam aliam adferre debeam causam, præterquam illam ipsam, quam tu quoque statuisi. Ludit enim aliquando natura, ut plus nutrimenti ad partem aliquam, quam pro sua nutritione opus, amaret. Hinc accretiones præternaturales & aliquando monstruæ sunt. *Guislain. Fabry. Hildan. Oiser. Chirurg. Cens. 3.*

De ingenti umbilici prociencia, historia altera.

Ante aliquot annos de quadam monstruosa extruberantia umbilici ad te scripti, sceminam illam etiam nunc superstitem esse arbitror. Ab eo tempore similem affectum in Germania, in nobilissima & singulari virtute prædita matrona vidi. In illa tamen non umbilicus ipse, sed paulo supra ipsum petionem, & per quædam abdominis, veluti in saccum maximum dilatata propendit. In isto autem sacco non solum omentum, sed & intestinum aliquod continebat, aliquando enim mutatur in ipso percipitur, & tunc quoque dolor adit; nunc vixit, nunc vero ten efflor, pro flatuum copia. Affectum huncce in difficili partu se contraxisse, mihi affirmavit.

Ceterum quæ huiusmodi prociencia umbilici aut abdominis, raro in ventrem retrahi possunt, aut si retunduntur, difficultat tamen retinentur, maximæque molestias agitis patiunt, dum propter pondus superiores partes secum deorsum trahunt, faciem quandam isecularam excogitari, quæ extruberantia illa tam commode iursum retrahitur atque tubervatur, ut nullam ferè molestiam aut incommodum patiat.

Primo autem ex reâ reduplicata, parandus atque adaptandus est thorax; ita tamen ut ultra primam costam mendoiam non descendat. Thoraci porro isti in dorso, & quidem è tegmine homoplaturum, ex utroque latere præcia, diuisi dug tot in hæ tudine positi latet, & undique perforata, annexenda est. Isth præterea fasciis parvis fasciæ magnæ & sacculata, beneficio loturum annexenda est. Elevatur autem & delabitur secundum necessitatem em & voluntatem agri, beneficio loturum & foraminum.

Fabricatur fasciæ illa, ex duabus particulis relex, in exteriore parte confutæ; ita ut in medio sacculus efficitur, *Idem ibidem.*

Hernia umbilicalis monstruæ præfusa magnitudinis

Nobiliss. Dom. annos circiter 40. natus, constitutionis ex naturâ admodum robustus ac obertissimus, Hernia laborabat umbilicali, cujus primordia inde erant fuisse quod jam à 14. annis, dum lædica vechterum, buviolumque extra ripas tum excurrentem transiret, non parum contergionis subibat ne in medio subvertetur fluente. Scatim fabre magnitudinis tumor visus est, qui subsequenibus annis, tum ob matronæ obertatem indeque productum totius habitus corporis mollitiem, extensionibus admodum aptam, tum ob photes advenientes partus, in eam accrescebat molem, ut tandem capite humano duplò major foret; in hoc tantum ab eo quem mox ex Clat. acutulus Fabricio Hildanò, divertus quod umbilicus supra illum esset, se contra hujus medium occuparet. Petionem, musculi abdominis, ac cutis ipsa, inde quasi lacera ac monstruosa expansa, facile permittebant ut contraherentur omentum ac in istam contenta, imò etiam illorum motus peristalticus deprehenderetur. Strangulationem tamen nullam præstabantur intestina in tam amplum devoluta saccum, quia ejus ostium non patum patebat, atque ita & rediit eorum non officiebat; nunquam interm ad dimidiam sui partem decreverat tumor etiam post longum decubum, nec omnino in proprium situm reponi valebant intestina, quin ex levi etiam compressione in deliquium animi incuterebatur agri. Continuo præterea dolorem non mediocrem in lumbis percutiebat, quem nec suspensoria Herniam, prout licebat, reprimencia, aliæque artis præsidia, satis mitigare valebant, Pro-

pretea Luteriam Parisiorum, egregius illic subligaculorum confector, Herniariorumque celebres consultura iuit, sed nihil inde levaminis reuult. Imò amplior ex iternis factus timor, doloresque colici qui subinde matronam nobilissimam excruciant frequentiores facti, tandem in illacum abiecti passionem quâ trium dierum spatio, postquam per 12. horas alvina evomuerit faeces, magnò noliùm, omniumque sanè proborum luctu, tam admodum exempli mulier subacta est. Taceo illa omnia quæ adhibuimus auxilia, hæcque tantum consultationem adficio quam Clar. quidam Medicus Germanus Lugduni Gallorum, dum Parisiis reverteretur pro Nobilissima Aegrâ conscripsit.

I. B. Consilium Medicum.

De Nobilissimæ Dom. Morbo & raritate curioso, & curationis difficultate gravi huiusve causi, amplum ut faciam discursum superfluum duco, de hisce quoniam Iudicium illibatum erit difficile, qui vel primis saltem labris delicis degustatis anatomicis; Omnia prout rari hejores Casus peritiosior delineatione, ad ipsam statim progredior curationem seu potius allevationem, totalis cum cunctis omnis spes non sine ponderata ratione ab Experientiss. Chirurgo sit præcisa, palliativa proin quæ testat Cuius in hoc consilii, ut quantum possibile & præsens Malum demulceatur, & incrementum modis omnibus impediatur, ad quem scopum pervenire licet, exquisitè remedium appropriatum selectione, consummative rati applicacione; Ordinar ab ipsa Venæsectione, cuius usus non solum proficuum sed & necessarius videtur, vel ob solam mentium fluxus cessationem, addo Nobilissimæ Dom. Temperamentum sanguineum, ut & corporis oblectatum, unde facilitatè accedit ut Vasis sanguiferia à pinguedinis mole valdè coangustata, motus sanguinis necessarius retardetur, qui hinc circa intestina coortea sensumque majori copâ collectus, stagnatione acrior redditus facile inflammationem causari in illis possit, accedit quod ex ipsâ hac ratione venulæ aliquot capillares vel in Cerebro vel in Pulmonibus ruptura cum funesto exitu contingere queat, interveniente præcipuis à vehementi quadam animi commotione, imperiosiore sanguinis motu, funestus proin hic ne accidat eff. Cuius siogulis annis ad minimum bis, Vere nempe & Autumno larga Venæsectio celebranda est, ut ita detractâ quadam sanguinis portione sanguinis motus liberior reddatur, hæc verò ut salutaris esse possit, corporis preparatio perquam necessaria, quæ sit vel clystere solummodo, vel purgante leni, si nempe primæ viæ succorum vitiosorum laburâ obesse sunt, quod sit vel Syrup. de chichor. cum theo ad aliquot uncias in julsulo assumptis, vel si insufficiens sit, infusum rhubarbari convenientissimum erit paratum ex rhubarbaro electo herb. cardui benedicti, cortic. citri siccis, santalo rubro & nigro preparato cum Aqua chichoræi, addito sub finem Syrup. de chichor. cum theo, observatè interrim circumspicere rhubarbari dosi, exulent pulveres, extracta, pillulæ &c. oportet quæ sæpe tarde & non sine terminibus operantur, quæ hic omnibus modis evitanda sunt, hanc ob causam masana, folia feniculi, jalapa &c. mihi sunt suspensa, si verò Nobilissima Domina flaccidis admodum diversæ sit, non abs re erit ante hujus usum clystere carminativo uti, parato ex radice althææ, fenniculi, Herb. malvæ, violariæ, mercurialis, abynthi, floribus hyperici, chamomillæ, femin. lini; anis. additis melle mercuriali & oleo anethiolo,

omissa omnibus acerbis, dissipatis ita flaccibus sequentis dici assumptum purgans melius & minore cum dolore operabitur, cavendum tamen probe à frequenti purgantium usu, utpote à quibus Intestinatorum tonos destituit & tora Massa sanguinea acris redditur; Et quia totius hujus curæ palliative cardo primatio in hoc vertitur ut alvus semper sit libera, hæc proin ut coarctetur aperta utmi studio allabotandum, quod obtinebitur diligenti Medici in dandis remediis circumspectione, ut & exacta nobiliss. Dom. præcipui regiminis observacione. Medici expropter & præsentia molesta & periculosa symptomata pro virili corrigere & mitigare Nobiliss. Domine v. o. exquisita Dietæ observacione impedire ne eadem mitigata recrodescant; Frequentissimum verò & periculosissimum quod in hocce affectu contingere potest symptoma est Colica passiva, cuius præcipuis comoracionis Pedisquæ sæpe est implutum funicula illac passiva; Cum verò Colica triplicem agnoscat originem, triplici etiam methodo tractanda venit, vel enim provenit à fecibus induratis, vel ab acido viscido seu Piruita Intestinatorum tunice tenaciter adhærente, vel etiam ab acido acris vitiiolico, à visciola bilis & succi pancreatici constitutione oborto ac renellis intestinatorum fibras vellicante; Illius signum evidens alvi pectinax obstructio; Illius copiosa flatuum insipientium erupcio, ructus acidi, appetitus dejectus à ciborum viscidorum esse proveniens &c. Hujus verò ardor in intestinis insignis junctus cum exquisitissimo dolore à visciola succi Pancreatici cum bile fermentatione, flatuum acrimia ejectio, ructus Saporis cuppei, oris siccitas, sitis magna, appetitus adauscus, prægressa vehementis animi commotio, ut & ciborum acrimia & aromatis nimis conditorum usus. Probe hic attendendum, quænam præsentè insulsa colico ex dietis tribus peccet species, si prima Fæces sc. induratas remediis humectantibus & emollientibus internis & externis certandum, quæ inter primarias tenent clysteres emollientes parati ex radicibus lilior. alborum, althææ, herbis & emollientibus, floribus chamæmel. sumulcar. anethi, feminibus, lini, fenogreci, additis oleo lilior. albor. & butyro recentis non talito, quod si consipacio adeo pectinax, ut clysterum ejusmodi reiteratorum, ut & interne assumptorum & externe applicatorum remedium eff. Cum eludar, & metus sit subsequens passivus illacæ, dictis clysteribus permiscenda fortiora, ut mell. mercurial. scyllitic. Elecluar. lenitiv. simplex, de hiera picra Logadii, fil commune, gemmæ, Syrup. emetic. Angell Sal. vin. emeticum, cum hisce postremis summa cum prudentia procedendum, quæ non in usum sunt vocanda, nisi urgente extremâ necessitate, ubi extremo morbo extrinsecum adhibendum remedium; Suppositoria hoc in casu, experientia teste, sapientissimè magis obstant quàm profuunt, etenim ab irritatione quam faciunt fibræ intestinatorum hæcæres vehementius consurguntur, igitur hinc devenientibus magis induratis, Per os quæ dantur remedia varia sunt, maxime julsula emollientibus herbis alterata frequenter deglutita, Oleum amygdalar. dulc. recentat expell. (Si Nobilissima Domina ejusmodi piogioia fuisse potest) ad uncias aliquot in julsulo propinquatum, vel cum Syrup. de althæa Fennel permixtum paratum magni sæpe effectus est, sperma ceti recens & non rancidum ad 3j. in julsulo dissolutum assumptum, item serum lactis capilli cum cremore tartari præcipitatum & copiose haustum, sæpe acidulorum largus haustus pectinacissima solvit alvi obstructiones, conducit & boryrum recens assumptum, quoad purgans, lenis nullius effectus.

validiorum eventus dubius sæpe auxilio faciunt, sepe etiam damno, ego omnibus aliis præferam man-
 Calabrinam elect. ad omnia aliquot in sero
 lactis capilli dissolutam, assumpcam; externe con-
 ducunt linimenta, Fomenta maxime verò Balnea
 medicata (Gallis demy Bain) hæc parari possunt ex
 dictis emollientibus, & discutientibus, pro fomen-
 tis dictæ herbe lacti incoquendo, quo sæpe soveatur
 pars aff. & tepidè imponendo, ubi finem inter lin-
 tea duplicata ipsum enalagma; Illa verò parari pos-
 sunt ex unguento de althæa, martiaco, spemiste
 cæri, pulvere florum chamomillæ & oleo lilior.
 alborum, quibus statim post fomentationes inungat
 ventriculi regio calide: si hæc non sufficiunt,
 addi possunt unguentum Agrippæ, de athanita ol.
 colocynsid: Si verò secunda colicæ species orta ab
 acido viscido seu pituita peccet, Dissoluta & in-
 cidentia remedia locum habent, Clysteres carmina-
 tiri magni sunt usus, paratis ex radicibus althææ,
 angelicæ, Herbis malv. parietar. origan. rutæ, flo-
 ribus lavendulæ, sambuci, hyperici, Bacis lauri
 seminibus fennug. fennicul. oleis additis Electuar.
 de bacis lauri, oleis anethin. & hyperici adjectis,
 oleo destillato chamomillæ guttis aliquot, & si dol-
 lor valde urgeat thetiacè optimè & castoreo, qui
 pro ratione durationis reiterari possunt; Per os
 exhibentur Potiones cordiales, Electuaria, Tra-
 gez, Pulveres, essentia &c. Potiones parari pos-
 sunt ex Aq. menth. melliss. flor. tiliæ, pæoniæ, cla-
 momom cum aqua destillat. lyriopi cortic. arantior.
 spiritus niri dulci, confectioes de hyacinth. &c. co-
 chlearia lumen. Electuaria parabis ea con-
 servis betonic. menthar. boragin. melliss. flor. pæo-
 niæ, corticibus arantiorum conditis, radice helenis
 condita, speciebus diarrhodon. abbatris, Oculis
 cancr. præparatis, succin. albo præparato cum
 syrup. de cortic. citri, de manè & vespert. duabus
 horis post cenam magnitudine Nucis molcaræ de-
 gluciendam superbibendo 3. cochlearia aque flor. tili-
 æ, Trages stomachica fiat ex pulvere stomachico
 Blickmant, herbæ mellissæ, flor. arantior. semine
 peron. Oculis cancr. præp. cinamom. & saccharo pet-
 lato, de quo sub finem præparandi & cancr. coelestis unum
 pan. roslo & vino madido inspectum assumat. Pulve-
 res carminativi fiant ex Oculis cancr. pp. Ebore lin-
 igne præp. Unicorni fossile, antimon. diaphoretic. te-
 netur & bene præparato. corticibus acantiorum sic-
 cis, tartaro vitriolato, salibus juniperi, absynth. &c.
 adhibendo gutturam unam vel alteram oleorum de-
 stillatorum citri vel chamomillæ, vel anis. &c. si mate-
 ria adeo tenax ut horum remediiorum vim trespas-
 veniendum ad fortius penetrantia, qualia sunt Essent.
 corticum arantior. Zeduariz, Tinctura Castorei cum
 spiritu salis armoniaci parata, Eliat Proprietar. s.
 Paracelli cum spiritu tartari volatili paratum, spiritus
 salis armoniaci anisatus, maximam vero metetur lau-
 dem spiritus niri anticolicus sequens, Recipe flor.
 hyperici & chamomillæ recent. & dimidiis ex parte
 licetatorum aqua quantum vis, affunde spiritus vini op-
 timi ad eminentiam 2. digitorum, sicut in infusione
 in loco calido aliquot horas in vase probe recto,
 postmodum eundem spiritum vini affunde aliis flori-
 bus, repetendo ita tertîa vice, huius spiritus Vini
 & spiritus niri recipe ant. partes æquales, destilla
 per alembicum lento igne ret. repetendo & ita pa-
 ratum erit spiritus anticolicus; Eiusmodi vero
 volatilis semper aliis liquoribus permiscenda & cum
 grano salis præferenda, probe notandum ne hisce
 contraria acida scilicet addantur, sæpe enim talia
 volatilia fortiter exhibita in parva etiam dosi maxi-

mo fuere sæpe nocumento, purgantium loco
 esse possunt pulula de ammoniaco & de tartaro Quer-
 cetani, catenè conveniunt. Balitum stomachicum
 statim resolvens paratum ex ol. absynth. anethin. Nu-
 cellæ express. dest. illato cortic. arantior. an. s. Balitum
 peruvianum & cæta, item Fomentationes ex carmina-
 tivis, ut radice peron herb. menth. calaminib. melliss.
 fumentarib. anethi, flor. hyperici, Bacis juniperi,
 Corticibus arantior. sic. & semin. anethi, quibus in
 aquâ de vino decoctis lacteis quadruplicatis, soveatur
 ventriculi regio tepidè, imponendo sub finem ipsas
 herbas; profusæ & B. lineæ ex iisdem herbis paratæ; De-
 ventio tandem ad tertiam passionis colicæ speciem, cu-
 jus natales sunt acdum acce vitriolicum, quod parti-
 cipat & de bile & de succo pancreatico acidiore, in
 hocce colico insulsi eximium apparet solatium nitru-
 m & omnia quæ nitrosæ sunt virtutes, quæ inter
 admitandi effectus clyster ex simo equino adhuc calido
 paratus v. gr. 3. Fimi equini adhuc calidi m. j. flor.
 chamomill. mili. affund. aque communis q. s. sicut in
 infusione in loco calido q. horarum spatio, colatur,
 expressæ sibi admisce olei violacæ & hyperici an. 3. ss.
 F. clyster, vel si simus haberi non possit, fiat clyma ex
 radic. l. lior albor. cichor. Herb. violar. malv. endiv.
 flor. papav. theados, chamomill. semin. melon. &
 fenniculi, fiat decoctum cum sero lactis capilli, co-
 laturæ admisce olei violacæ & chamom. & si ictus
 compatiatur aliquid de trochiscis de camphora; In-
 terne conducunt iuscula alterata herb. violar. cichor.
 lactuc. flor. papav. theados, cichor. ut & Julepi pa-
 rati ex Aquis cichor. violar. flor. tiliæ, cardui be-
 ned. syrup. violar. papav. theados, Corn. cerv. phi-
 losophicæ pp. & nitro petlato per cochlearia sa-
 mend. item Electuarium confectum ex conservis
 boragin. flor. violar. melliss. radice cichor. condita,
 corticibus citri conditis, Oculis cancr. pp. Corn.
 Cerv. philosophicæ ppt. & syrup. papav. theados, de
 quo manè & vespert. tota somni capiat magnitudine
 Nucellæ; profusæ de tinctura violar. cichor. papav.
 theados & præparata si magnus illic præiens sit, nec
 non serum lactis capilli succo citri paratum. si Bilis
 abundat leni purgante supra indicato edul potest,
 imo si tota Massa sanguinea valde æstuet, venæ sectio
 modica negligi hauri debet; Quod remedia extrema,
 Balnea temperata lenimen afferre poterunt, sed
 cavendum ne nimis sint frigida, exoptoer fomen-
 tationes ex frigidis paratæ haut magni assilmo,
 quia ab insita quadam virtute insupradante fibræ
 contrahuntur, poris hinc stricioribus existen-
 tibus, exhalationibus à continua effectiveness
 obortis exitus intercludunt, & ita æstus adaug-
 tur, accedit quod ejusmodi Fomentationes sapissi-
 mè schittosæ post se relinquunt. Si verò dicitur ex
 dictis speciebus simul junctæ sint, malum judiciose
 examinandum & maxime cavendum, ne a remediis
 nimis violentis propinatis, excitata convulsio fune-
 stam post se trahat passionem illacram, Medium proin
 in tali caso remane beatiss. Ut vero Nobiliss. Dom. huius
 passioni, Colicæ frequenter invasionem evitare pos-
 sit, ut exactissimum oblectet vitæ regimen, necessum
 est; Fugiat proin Aërem calido siccum, ut & nimis fri-
 gidum, Temperantem ventosum, ablineat ab omni-
 bus cibis qui fermentum ventriculi emovere, bilem
 adaugere, succum pancreaticum corrumpere & statim
 progignere valent, ut sunt omnia viscidula, dulcia;
 sacchara, acida & pinguis, ex quorum censu sunt
 legumina omnia, fructus omnis generis, caseus, lac,
 pices, acetaria, placcæe farinaceæ, ut & cibi nimis
 saliti ac nimis aromatizati, panis nimium fermenta-
 tus nec satis coctus &c. contra alimenta assumat boni
 lucci & facili digestioria, ut sunt Carnes virulina,

ovina, caponum, gallinarum juscula alterentur cerefol, betonic, petroselin, meliss, violar. &c. hordeata etiam profunt, & brodia carnia putata; conducunt & poma regia (Gallii Renetree) cocta præparata si alvus adstrictior sit assumpta horâ unâ ante cenam, ut & pruna damascena cocta &c. Potus ordinarius sit Vinum album, vel tubellum tenue aquâ (in qua prius frustulum panis tosti fuerit extrinctum) dilutum nec nimis frigide haultu, post partum Nobiliss. Dominus non statim letis vacet negotiis, quia spiritibus animalibus aliâ vocatis, digestis in ventriculo non adeo felicitè pergitur. Ad stomachû confortandû & flatûs dissipandos proficuum nec ingratum remedium erit sequens. Recipe Malum aurantium dulce, quod cruciatum incellum indatur vasî terreo, affundendo vini rubri generosi aquâ partem diluat ad eminentiam unius digiti, in quo dissolvè facchari hñssimi quantum placet, & coquantur invicem lento igne vasè probè cooperto ad consistentiam syrupi tenuis, de hoc pome ita cocto Nobiliss. Dominus singulis diebus & horâ ante prandium & cenam assumat frustulum rotundum sopesibendum duo Cochlearia liquoris admixti, quò remediò vero non semper sed certis solummodo temporibus utatur, si nempe statibus se valde molestatum sentiat; Omnes dein violentos Animi & corporis motus cane pejus & angue fugiat; somnum nimis vigilis hauri torquet; Alvus semper respondeat, si non, dicto modò sollicitetur; Hæc ita rigide obstat variâ Nobiliss. Domina non opus habebit multis remediocum Præsidis, nec approbent frequenter horum ulum, que tamen urgente necessitate non sunt negligenda; Remedia prætin quæ in hoc meo Consilio medico consignata sunt pro lubro & circumstantiarum varietate in ulum vocari possunt. Verùm cum frustra pleritè Paulus, & riget Apollon, nisi Deus det. Benedicere, calidissimum exoptor meum est Votum ut Archiatre Cavellis ad cuncta, quibus Nobiliss. Dom. opus habebit, Remedia divinam suam Benedictionem largiri vellet; Cujus Divinæ Protectionis Nobilissimam Dominam una cum Tota Nobilissima Familia recomendo.

Periculosa Hernia sanata.

Nihil herniæ intestinali periculosius est, quam ster-cus per os reddi. Arguit quippe hæc regurgitatio manifestam motus peristaltici officinam. In quò cum consistat verum intestinalium stabilimentum, mirum non est, si eo labefactato, postum erit homo. Licet interdu repertiar nonnulli adeo validi, ut devictâ tam exitiali oosa, adipiscantur iterum pristinam sanitatem. Quod tamen albo corvo rarius.

Nauæ ex hyberno naufragio diu madido, ac frigido intendebantur tantopere à spiritu Intestina, plus æquò refrigerata; n̄ distendit peritonæi processu, descendit non modo in inguina, verum in ipsum scrotum. Unde difficulter retro compulsa; si ve ob distendentem spiritum, si ve ob induratum stercus, læsere non parum motum peristalticum. Et cum non possent se infra exonerare, eiecerunt supra per os, cum bilem flavam, tum fordida alvi excrementa.

Quæ præternaturalis excretio aliquandò continuans, licet videretur b̄bere certam desperationem: vidimus tamen die tertio decimo intestina hæc à Cornelio Subourjo ritè in locum suum reducta, & ægrum quantumvis summe debilem, inde mortis jam vicinum, præter omnem spem, enavigasse feliciter periculosam hæc obaybidem. Niclaus Tulpius observationum Medicarum lib. 3.

Similem sane casum vidimus in viro quinquagenario: is enim postquam ex Hernia grandiori in ileon

Bibl. Chirurg. Tom. II.

misere deductus, & continuis doloribus lique atro-cidius imo horrendis vomitibus per sex dies excatilisatus fuisset, tandem in totalem anæsthesiam cum ster-corace materis per os regessione, incuriebat. Cum advocabar jam à 24. horis in tam dispersis statum versabatur æger, nec erat quid consilii illi darem; Quandoquidem tamen opem meam, mente amano constans, voce admodum languidâ, avidissimè exposcebat, accersiri curavi Celebrem Chirurgum D. Stephanum Denrand, qui cum arte sibi anè singulari Intestinum promptè ac sine violentiâ, repulisset; cessare symptomata, pollicis & vita tum prioris fugitiva, lenim reducebantur. Ex hisce addicant Medici atque Chirurgi prognostico minimè esse derelinquendos ægros etiam desperatissimos.

De Enterocœle in viro senè, lethali.

Inter affectus omnes, qui magno numero hominibus molestiam afferre solent, haud infimæ notæ intestinales Herniæ, uposte quæ variis exitiales.

Tilemannus Nucketen, Pellio, senex, temperamento siccus, per multos annos Enterocœle molesta, incelsis omnibus, laboraverat. Anno 1653. refrigeratis pedibus, imo totus frigidus, lectus se commisit, ventris hic subito contulit dolor, mox vomitu gravi, undè intestini in scrotum secus prolapsi.

Vocatus Chirurgus arte nulla efficere potuit, ut in situm restitueretur intestina; in consilium adductus ego, summo mane, inveni hominem dolore ventris, febris, vomitus, suppletionisque excrementorum alvi-orum & urinx, decubentem, consultum videbatur Enema hoc præscribere.

℞ Rad. Lilior. Alk. an. ʒi. Fol. Violar. Malv. Parietar. an. M℥. Flor. Chamomill. Mellilot. Anethin. an. M ʒ. Senin. Linf. Anis. Cumini, Fennugr. an. ʒ ʒ. Coquantur in aqu. put. & cerevisan. part. æqual. q. l. in col. ʒviii. dissolv. Elect. D. acarth. ʒv. Vitell. ov. n. i. Ol. chamomill. Verbas. Aneth. an. ʒi. Anis. g. ii. F. Clyster. Pro fomento Teigream hæc præscripimus, in lacte dulci decoquantur.

℞. i. ol. Parietar. Malv. Verbas. an. M℥. Chamomill. Mellilot. Aneth. Sambucan. M. ʒ. Sem. Anis. Foenic. an. ʒ ʒ. Præparata denur usq. in chartâ. Fotus antequam applicaretur Lirus hic usurpandus.

℞. Ol. Aneth. Melilos Chamomill. an. ʒ ʒ. Anis. gr. x. M. f. Linimentum. Mediis biçie exiguo tempore adhibitis, cum in intest. no facculo contento non tantum flatûs, sed & alvinae forces retentari, constaret, leniter Intestinum manibus nostris tractare, secundum munium Hieron. ab Aquapendente quod habetur parte 2. de tum. or. præternaturalibus lib. i. cap. 3. aggressi sumus, quod sic, foribus emollitis, lenissime ad interiora protruis, etiam Intestinum ipsum reponi suo loco potest. At irritus omnis labor, eo quod partes omnes, diutius jussu à Chirurgo nocte præcedente tractatas, inflammatas, & non parum confusas, sine dolore gravi apprehendete hauri liceret.

In re ejusmodi gravi nobis jungeret placuit constan. guineis Virom Ampli. D. Nicolaum Tulpium qui, ex tempore accedens, habita consideratione affectus perceptique illius prægressu tempore fuerant prædicta, necessarium omnino duxit Enematis admodum à nobis præscriptum præparati iniectionem, hinc, pannorum ope Olis sequ. applicationem.

℞. Olei Anethin. Chamomill. an. lib. i. M. Usurpetur calide. Indò quo mollior Intestinum reponere nobis liceret, consultum judicavit ægrum eo in siti detinere.

L. I. 3. nec.

ne, ut pedes sursum sint elevati, caput vero infectoria spectet. At ne quidem hoc tempore de novo ad intestinum prolapsum delatae fœces ad interiora deduci à nobis poterunt, quancunque etiam diligentius adhiberemus; imò ab opere desisteremus vomitus gravis materiam pituitosam, biliosamque, coëgit.

Ita sine ulla doloris in agro anxietative remissione tempora nostra trivimus usque in diem tertium, qui, cum doloris eoque decemto, ad vero febris incrementum, vomitus fœcum foetidissimam gravis valde acque molestus fuit, quod ob angustiam intestini descendere inhiberetur. Considerabile enim in hoc agro, ioteff in scroto detenta convoluta aliquomodo fuisse, unde, impossibile stercorea per anm evacuari, quin contra, ad gyrum intestinali delata, retrogredi necesse habuerunt.

Ad hujus affectus curationem, quo & dolor & anxietas tollitur, medium aliud hæcenus haud cognitum, periculofum licet, incertique exitus, quam quod lib. 4. cap. 40. describit Chirurgus Regius Petrus Pigræus, nec est quod id rescribat Marcus Aurelius Severinus; nostro sane, imò & Ampl. Dn. Tulpii iudicio facilius longe operatio hæc instituitur, quam fœcus cesare.

Declarata operationis hujus utilitate, incerta licet, periculofaque, consensu agrotantis, consanguineorumque, die quarto agrotum accessimus, nil obstat sperantes quo minus eam instituere. At opus hoc inhiberunt varia, animi impræmissi deliria, sudores frigidos, imò scroto ipsius gangrena, quæ omnia, ad mortem usque, circa meridiem supervenientem, continuant.

Quo vero junioribus consist, qualis opetandi modus in desperato ejusmodi casu à Celsore, p. 6. describitur, cum semper ex sententia Celsi, aliorumque in morbis gravioribus præter cœdem adhibere anceps quam nullum, & necessario ejusmodi heriosos modi debeat, si nullum adhibeat medium. Verba Aut horis hæc sunt.

Sⁱ, inquit Vir expertissimus, intestina coacta, facereque in ita conclusa esse cōnigrit, nullatenus produnt quæcumque manibus fœces coactæ riones live coortiones, aut cujusvis generis exhibita medicamenta, ita ut ad ultimum remedium, peritonæi nempe sectionem contingere sit necesse.

Quæ quidem ut debito modo perficiatur, primum, secandus facie coramversus, sive supinus stendendus est, atque adhibenda scissura duorum circiter digitorum latitudine supra eum locum, qui archæ conclusus est; quoniam ipso hoc loco sine manifesto lisionis discrimine jam peragi nequit.

Factâ ad peritonæum usque apertura, in adversum latus componitur scâli corpus, quo facilius intestina ab eo loco, in quo peragenda scâli recedere valeant; immissoque in volnus digito (qui butyro recentis aut oleo Amygdalarum Dalcium inungendus) intestinum mollior ac pedecentum loco naturali restituerit. At vero si tanta intestinorum copia erupisset, ut opus esset apertura latiori, ad conclusum locum osque ea perducenda foret, supposito Interim ad intestinorum lateralem digito aut ipso apert, quod si intestina flabibus tertia, unde operatio difficilior, ac (res etenim periculo catet) perforanda, quo eisdem exitus præbeatur. Postremo repositis loco luo intestinis, vulnus, si itates exigat, confundendum, ea methodo quam nos in ventris vulneribus adhibendam præscriptimus, ac tandem vulnere consueta in aliis admovenda medicamenta.

Hæcenus Pigræus, cujus accurata descriptio explanatione nullâ indiget, addemus tamen sequentia.

Locus operationis bulæ accommodus latidus sit oportet, detineatur eo meofa pulvinaribus variis instructis, his impoitur æger, docto incumbens, adhibita, vel, pro rei ex gentia, neglectâ, artuum mensuræ conexione. Hinc enim adductis, ad duorum digitorum transversionem à processu fœci petronæi distantiam, pollice digittique manus fœcitæ elevet Chirurgus, altera vero dextrâ manu, loco eo, qui ad latus musculi recti, proximus est parti angustiori contractæque, vulnus cuti partibusque subiectis infligit, de sanguinis fluxu, qui levior, haud sollicitus; scâli hinc institutâ, hamo peritonæum elevet, quod manu levi, sensum dissecet, scâli caveodo ne intestina subiecta culleto valentetur. Foramine in peritonæo facto, cullellum in extremo, ne partes subiectæ laedantur, globo donatum, per illud inserat, euique ope, sursum, deorsum, ad latus hoc, illudque, pro placitu, peritonæum dissecet. Pigræus loco cullelli dicti aliò instrumento utitur, per cuius sinum dom cistram ducit, latissimis partium lubidarum nullis meris.

Peritonæo dissecâto indicem suum, imò, si possibile, cum eo pollicem, digittumve alium, oleo lubictus, dimittat in ventris cavum, ad utique petronæi processum, ubi inveniet intestinum coactum, superius omento nexum, ad scrotem descendisse; hæc, digitorum incurvatione ope, leviter trah. odo, sursum in ventris cavitatem deducat. Operatio hæc felicius, citiusque abolvetur, si manu altèrâ, planiore, scrotem leviter commoveatur, ventrique appropinquaret, sic totum convolutum intestinum melius solvetur.

Hic periculis vulneris habenda ratio; intestina quod si extra vulnus prodierint, adeoque ab externo aëre alterata fuerint, flatu sæpius insuper d'latata, ac acutiores; locis variis, ad flutuum eruptionem promovendam, perforanda, ex doctrina Pigræi, hinc vulnus fœcitæ ea claudendum, quæ Pigræo in vulnere abdominis curâ usualis est, tandem curatio ea obaneet quæ in vulneribus aliis locum habere solet.

Suturam in ventris vulnere convenientem, quæ Gastrographia dici solet b'ia verbis describit lib. 4. cap. 2. citatus Pigræus. *Sutura hic instituenda incarnatio enim est; hic peritonæum una parte ac perforandum est, altera manente integra, mox hac parte perforanda, resilla imperforata ei opposita, & sic procedendum, quo inter quatuor perforationes carnis particula præstaret, sique incarnatio, interque cicatrizatio promoveatur.*

Explicatione prolixa verba hæc haud indigent, per se satis clara; notati tamen necesse, acum, quæ hic ad vulneris consultationem utatur, falcisatam debere esse, solum eidem duplicatum requiri, cera incrustatam.

Carnis cum mentionem facit Pigræus lib. 6. meth. cap. 2. Musculo abdominis intelligit, fœcita hic obtinet similis illi quam pelliciones instituere solent, ubi alternatim utriusque lateris partes, exteriores, interiorisve, ac perforantur.

Audi quæ Galenus de vulneribus ventris lmi proponit. *Ad id, inquit, in intestina reponatur, vulnus amplietur necesse est, hinc fœcita eo modo instituat, ut modo musculus cum peritonæo, modo ltram peritonæum cum musculis connectatur.*

Plura hic facientia qui desiderat legat quæ de gastrographia habent, inter varios alios, C. Celsos, Hier. Fabr. ab Aquaprod. Jacob. Guilleman, alique, qui surarum speciem variis, curiosas, facillique, in vulnerum abdominis curatione summe necessarias describunt.

Supereff, ubi, intestinis prolapsis repositis, gastrographia hæc instituenda, utrinque ventris partes vulgeti aduæ manu molli ministri comprimantur, quo minori

noxi cum molestiâ sumus perficiatur, eaque sit ceteris.

Molestiam hanc, licet dubiam, operationem ne fugiant Chirurghi, placeat, observationem aliquam in canibus annotatam adductis addere. Cl. Henricus Blaud, Medicus, haud ita pridem in cane Lienem eascindere volens, peritonæo illius magnitudinis vulnus inflavit, similiter ac ventris integumentis communibus, ut intro missum digitorum ope & intestina micis modis loco suo dimoveret, & lienem extra id extrahere, potuerit, hoc facto, infutura futura ea quæ pelliolum est, vulnus clausum, brevique canis curatus, qui etiam postea sanus vivit, impossibile dixisset, si quidem vulnus dâum, mdrumque intestinorum agitationem manu operatoris peractam, considerare licuisset, animal ullam, ita constitutum, vivere posse.

Capiti huic ut finem imponamus, Auctor sum, quoties occasio conveniens se offert, operationem hanc instituerim, nunquam eam fugiat Chirurgus, tanti periculi haud est quanti eam habent vasa; io morbo per se absolute lethali, præstare instituerem remedium dubium, quo salvati possent egrotantes ratio & experientia docent, quam nullum. *Job. à Merckem in Obs. Medico-Chirurg.*

De Enterocœle ex processu peritonæi laxitate in Viris.

Nec intestina, nec scrotum Herniæ causa unquam dici haberi que possunt, sed tenera consilium processuum peritonæi in his enim, levi ex corporis motu, dilatatis, sanctorumque extensis, imò, ut volunt alii, omni modo turgitis, facilius intestinorum ad aliena loca prolapsus.

Civis quidam Amstelodamensis, scicioria constitutionis, ex inordinato pedum motu, dum ea sedili suegeret, subito contraxit buboocœlem, mox, ex prolapsu intestini in scrotum, Enterocœlem. Chirurgo se committere non suctus, ex Herbasio Remk. *Dodones*, qui in promptu erat, herbas florere dolores mitigandi vi pollentes collegit, ex pharmacopœia perita hæc medicamenta in lacte decoqui curavit, tamorque applicati, bene cessit negotium, dolor remisit, tumor imminuit.

Hoc in statu, sine ullo vinculi Chærectii usu, solâ oleorum inunctione contentus, aliquandiu vixit. Tandem cum io convivio quodam postvè ventriculorum plus julto replevisset, in tumorem inguinis non solum sed & scroti incidit, periculo sum non minus quam dolorificum, accedente illico intestini in scrotum prolapsu, horrendo aded, ut & scroti rupturam, & egrotanti mortem minaretur.

Vocatus juveni hominem pedibus minibusque aded perrepantem, quod dolores ex ruptis dictâ intolerabiles, in scrotum prolapsu intestina manibus tractare permittebat; cauterizans hæc tumorem magnitudinis immetens.

Milero nostro egrotanti quo quantum possibile succurreremus, primo Enema aliquod ea emollientibus & atodynâs paratum, ita tamen ut decocti minor adsumpta quantitas quam ordinatio fieri solet, oleorum contra, ut Amygd. dulc. verbasco deca. major.

Ad inflammationem ex intestino, fluxu, scorbis, que cauteriam, quæ gravâ his aderat, cataplasma hoc præscripsimus.

℞. Fario. Tridæ bord. an. ℥i. Fufur. Tricic. ℥iij. Flor. Camomill. Sambac. an. M. l. Ol. Mynill. Rosar. an. ℥iij. Vin. rub. q. t. M. F. Cataplasma.

℥ hæc loteres dum præparabatur, nocturni fui molliorâ mano, adhibitis linetis calidioribus, intestino-

rum repositionem procurare, quæ etiam bene successit, magna enim intestini hujus portio jam suo loco restituta, anequam præscripta pharmacopœus adfueret.

Injecto hinc Enemate, applicetque Cataplasmate, (quod post horam, duplici quantitate renovari curavimus) repositio intestini longè facilius fuit, integreque absoluta.

Repositum suo loco quo reservetur, consultum vinculum processui peritonæi d'urato appl. care ad eum modum formatum, quo parare ea solitus Nicolaus Minneboeder. Chirurgus hujus loci, qui etiam vicior simili maio affl. ctos curaverat. Vinculum hoc haud differt ab aliis, nisi quod duplex fasciâ, ntrinque una, ad majorem firmitatem, ne d'osum decidet, humero incumbat. *idem ibidem.*

De Herniâ flatulentâ scroti, seu pneumatocœle ex vulnere Thoracis.

“Vulnus thoracis non penetrans, Fabr. ab Aquapendente inquit curatur ut vulnus simplex. In penetrans autem, præmissa corporis cutis præcautione purissimum in id incutendum, ut evacuetur colluvies, & humiditas, qua in thoracem à labijs vulneris descendit, ne putrescent mortem inferat. Evacuatur autem per tres vias per vulnus orificium, per os scilicet. insufflendo, & per urina viam.”

Georgius Strak, discipulus. Notarii curandam à condiscipulo vulneratus cultello caisgo pectoris latere dextro. Propter exilitatem foraminis & aëri & sanguini transitus omniò denegabatur.

Vocatus febrem aded repetiebam gravem, cum asthma, pectoris fuge duritie. Ministrorum nostrorum aliquis per vulnus sectione notabilem sanguinis quantitatem extraxit, quo facto ad modum ab Aquapendente præfcriptum processimus.

Die tertio quatuor scroti pars dextra cum in molentia innumet, ut caput infantis minoris magnitudinis referret. Flatuloribus hæc tumor, cuius causam cognoscere ut aduam, ita curandam instituere. Haud improbabile oobis videbatur statim hic collectos ex cavitate pectoris descendere, adeoque diaphragma etiam perforatum esse; in ventre autem hærentes, ubi varii tumores in eareinis notabiles producere videbantur, per processum peritonæi ad latus viciorum spermatum testes accedere.

Coratio difficillima, atrophia aded, indies magis magisque notabilis, expectoratio materiæ sædæ continua, cum tussi gravi. Febris continua, cum sapore frigido, vomitus molestus, adsumptorum marasme, vigilie diurne nocturnæque valde vexabant.

Tertia septimanâ tussis ejecit materiam quandam crassam, longam, rotundam, p. solum, importam, hanc particulam carnosam diaphragmatis habebamus, quod hic vulneratum conspicebamus. Ea cæceta febris, sudor, respiciendi difficultas, debilitas plurimum remiserunt, unde, consultum visum naturæ operant succurrere; in locum adeoque apostematis ex Rad. Chinæ parati, quo hætenus usus, vulneratum hoc substituitur placuit. ℞. Herb. Tussilag. Mij. Capill. Vener. byssopi, Saniç. V. rben. an. Mj. Vinæ perv. Mss. Rad. Petroselin. ℥iij. Flor. Beron. Liquirit. Oculor. cancri an. ℥b. Coq. in aq. bord. per. ℥ij. Moll. parte, Urebatur hoc quotidie bis terve. Sympom etiam confici vulneratum curavimus ea brasice rubræ & coasolidæ succo.

Ex horum usu id effectum, quod vires corporis indies locreverint, parvitasque materiæ per fistulosum pectoris foramen, evacuatio successerit; Hinc plummaceolum planum Oleo ceræ madefactum vulnere luppo;

impositum, plumacolo lineum quadratum, quadruplicatum, lineo vero tertium igitur, & hac ratione olei dicti virtus interioribus communicata. Ter quaterve hac methodo ubi in curatione nostrâ processimus, vulneris foramen claudi permiximus, & sanitati restitutum agrum observavimus.

De aëria ex thorace per diaphragma apertum in scroto motu in prægressis egimus, haud & re erit exemplo aliquo notabili illustrare.

Petrus Jacobi, Diemenfis, rusticus, ebrius cultro interfecit Cognatum, vulnerat intestinâ cognato. Vultus erat abdominis inter costam spuriam secundam & tertiam per quod ex Imperio aër extortum protrudebat, ut vix derecti poterat. Unde hic aër congestiam inter medicos Chirurgicè movebat; erant enim qui non nisi in ventris sinu cavum penetrare vulnus credebant, at bonum opinionem accedente haud poteram, quod & ratio suaderet, & præcedens observatio docuisset, non nisi Diaphragmate lito aëri per vulnus viam concedi; unde oblique hoc vulnus sursum per diaphragma in thoracis cavitatem penetrare credibile mihi videbatur. Post diem tertium quatuorve aëris per vulnus dictum egressus haud amplius notabatur. Hic nova querendi occasio, quid causæ subisset quod status haud diutius se exhiberet; ad hoc respondere nobis placuit, probabile omnino nobis haberi, vulnus intra costas & hepatis partem exteriorem penetrare in thoracis cavum, hoc autem ab hepate iocumbente hoc tempore claudi.

In aperto cadavere (insidens enim sellæ camillicis manu caput ablatum) suspitioni nostræ correspondere omnia, visum. Primum enim hepatis partem convexam sursum versus diaphragma elevatam notavimus, unde vulnus in eo obturatum. Secundum non solum vulnus diaphragma penetrasse, sed & pulmonis partem inferiorem fuisse ablatam, quam seorsum in thorace collecto innatantem vidimus.

In gratiam curiosorum hic loci addere placeat, in Cordis ventriculo dextro sanguinis ne guttam à nobis fuisse reperiunt, in sinistro vero ipsumolum omnino sanguinem; quod senex iam scriptoribus illorum confirmare videtur, qui volunt, in illis, qui violenta morte intereunt, sanguinem ipsumolum in venis contineri. *Idem ibidem.*

De Enterocèle gravi.

Anno 1653. occurrit nobis vir satis annosus, qui Herniâ scrovi laborabat enormi, erectus quoties incederet, tumor se extendebat ultra genua, evadebatque crassitiei satis notabilis.

Tempus hic quoties in scroto appareret, venter adeo detumescerebat, ut etiam manus plura premendo ventera lumborum attingere liceret. Hinc ubi tumorem hunc tollere auiemus, elevatione leni omnia intestina in scroto prolapsa, per peritonæi parietem valde aperuram facillimo negotio venterem pretebant, nec ullâ in hac restitutione molestia afflictebantur, nisi quod, ubi intestina reposita diaphragma astugebant, animi deliquium non leve incutebat.

Admiracionem omnem superabar, hilari ad id ipsam animo fuisse, atque ad opera navalia promptam, ut etiam mal. considerare, ea celeritate dexteritateque valuerit, qua oculus sciorum.

De quo præcipue conquereretur hoc unum erat, quod una ad latus scrovi distanti stillet, unde exortio gravis & dolor insignis, membrum etenim vitile scroto ita arde unum erat, ut impossibile esset urinam ex debito emingere. De curatione hujus

affectus videri possunt quæ in prægressis observatione duplici habentur. *Idem ibidem.*

Hernia exulcerata, unde excrementa alvina predebant, feliciter curata.

Clariss. Samuelis Ledelii, Miscell. Curios. Decur. iij. Ann. 2.

Decur. 1. Anno 3. Observ. 122. Ephemeridum nostrarum, legimus de herniâ exulcerata, unde excrementa alvina sine ulla saurita & noxa fuere egesta. Simile quid mihi exhibuit pagus noster Wittenau, in rustici quorundam quadragena. Hæc eandem patiebatur calamitatem: quia vero ipsi molestum erat, excrementa videre prodire & loco inconsumto, ergo ex consilio vienatum, succo ablyosii expulso, per longam tempora intercapedinem delinuit, tandemque claudit, & excrementa ad consuetam exclusionem deducit. Hoc tamen mali iude habet, quod, veluti constituta in sinu, procedit, nec corpus satis extendere, aut caput debite excolleat, nec onus gravius sine summa molestia sublevari valet. Aliâ mediocriter vivit, non sana, non agra, sed in statu neutro. Docet hæc histotia, intestinorum vulnera posse etiam coalescere, quanquam difficultat.

Hernia Inguinalis, cum abcessu, per Naturam curata.

Clariss. Alardi Mauriti Eggerdes, Miscell. Curios. Decur. iij. Ann. 4.

Graves sæpe post se affectus relinquant Laboriosi patius, quod Mercatoris cupidum nostratis uxor, non ita pridem est experta; hæc per ejusmodi partum herniam inguinalem contraxerat, cui post menses tres, dolor acerbissimus supervenit; mulier dolorum pertæsa me vocari fecit, cum eam accessisset, de dolore generis intensissimo conqueratur, herniam vero ex pudore tacebat, impositura precibus auxilium & levamen flagitant, mixturam pædagogicam, ex v. mallich. menth. syr. Corr. Citr. Spit. Carmosm. & paucis gran. Laud. op. præcipi. Clysterem etiam ex decoct. Ennoll. & Carminat. Oleo autem Ruland. & Sale gemm. acuarum injici, & abdomini Cataplasma anodyn. imponi curavi. Hicce dolor per noctem ita tuit mitigatus, ut patienti sibi sanietatem persuasisset, nisi odor illecebreus, quem ex stomacho ad os ascendere sentiebat, ileum jam fututum præmonstrasset. Hoc signo inductus, ex patiente quæsi, utrum præter ventris dolorem nullum aliud lentiret, incommodum? respondit, se in ultimo partu per violentissimos conatus tumorem durum in inguine sinistro contraxisse, quem cum examinarem, duas in illo reperiendi particulas instat farcinibus lucanici, oblongas & duas, quas portiones intestinorum illuc in partu per violentam pressuram protulisse judicabam, quare reductionem sedulo adhibitis quibusque interinfecia & extrinsecis, incessanter urgebam, sed eludebat omnem diligentiam peritax malum. Mulier interim summo cum fastidio foreces alvinas per os continuo rejiciebat, donec die morbi, ni fallor vigesima appareret in tumore illo herniâ pultula nigra, quæ paulò post excidua largum effluquebat foramen, per quod, cessantibus omnibus aliis symptomatibus excrementa alvi cum impera effluabant, & licet dicitur hoc accidens instat mon-

At horridi patientem perterrita faceret, recipit illa nihilominus intra paucos dies appetitum & vires, quo viso recordatur fenicula iunior, cujus histoniam Ephem. nostrorum Decur. 2. An. 6. p. 414. retulit, adductoque ex ea prognostico, montis proximæ riuem ad patientem meâ abegi. Sed ecce miram Metamorphosin, quam quia non male miraculum Medicum dixerit. Postquam enim per trea scet septimanas ex dicto jam foramine excrementa effluissent, mulier pristinae integritatis avida, Clysteribus à me ante præscriptis proprio Consilio alvum sapius sollicitare, pristinaque facibus alvinis viam aperire totat, neque vano effectum aut irritum conatu, redierunt enim relicto foramine ad antiquum canalem excrementa, vulnere intem à Domino *Bæser* erimæ scientiæ, & experientiæ Chirurgi, ad id deligato percuratque, Mulier quæ lecho jam adjuvata fuerat, per Dei gratiam, integrè convalescit.

Hernia Sectioni, Spasmus Superveniens lethali.

Clariss. Eberhardi Gockelii. Miscell. Curios. Decur. iij. Ann. 5. & 6.

Anno 1696. Mense Novembri, Joh. Bisselg Russicus medicæ artis herniosus, ex Pago Psil, prope Ulmam, ad recuperandam per sectionem pristinae formæ valetudinem, Ulmam se recepit, ibidemque se manus alicuius exercitæ Chirurghi submisit, à quo etiam, in præsentia quorundam Medicorum & Chirurgorum feliciter læsus & decenter tractatus est; Hic Patiens ad duodecimam usque diem bene habuit, quibus præteritis, et improvise spasmo laborare cepit, qui etiam in tantum invaluit, nervosque ac musculos gutturis, temporum, ac genarum ita obdidit, ut os ad comendandum viz aperire, nec deglutire vel respirare potuerit, & capite pronus in lecho, ac li fume testus & ligatus esset, sedente coactus foret.

Colas causa externa, corporis refrigeratio ab ætate externo algido, per incuntes & exuentes tempore hyemali lapsus in angulum hypocaustum immisso, intensa verò humores acidi-salini, austri & aluminosi, nervos infestantes & contrahentes, vel sanies nervos vellicans, & sursum versus suum principium contrahentes fuit.

Ego ad hunc Patientem vocatus, ipsi sequentia remedia præscripsi. Et quidem intermè n. Pulv. lumb. zerr. ʒj. C. C. phil. prep. Pulv. Epilept. Matchon. Cephal. Michael Augusti. aa. ʒi. Castor. ʒss. Ol. macis gutt. iij. M. f. Pulv. subtil. de quo, quantum cultri culpidè capi potest, de æ aliquoties in aqua Cera. nigrot. patienti exhibeat. Et n. Ag. Cerafor. nigr. flor. illis, Pocon. aa. ʒss. hincund. quatuor. Epilept. Lang. aa. ʒss. Coosct. Alkerm. ʒss. Lapid. Bezoar. Ot. gr. V. Margarit. prep. Pulv. Matchon. Cephal. Michael. aa. ʒss. sacch. perlat. ʒij. M. Dosis Cochleate unam vel alteram, sepius repetendo. Ad hæc Clyster etiam sequens fuit applicatus. n. Herber. y. emoll. Ros. Chamomill. Veib. sc. Summit. aneth. aa. M. & Sem. Lini ʒss. Decocti hord. q. l. fiat l. a. ebullitio, Colatur. n. ʒij. in qua dissolv. Electuam. lenic. Florenz. Diacathol. aa. ʒj. ung. Clysmat. ʒj. Axung. anser. Gallin. anatis aa. ʒvj. Vitell. ovot. Num. a. M. f. Clyster. Externè, nucha, collum, genæ, spina dorsa, & venter tali linimento calidè foete inuncta. n. Ol. Chamomill. Rosat. Lumbic. verr. de castor. acoth. aa. ʒvj. Terebinth. pingued. hominis & Canis aa. ʒj. M. d. ad fideliè,

Sed omnia hæc remedia sine opero successu iocere adhibita, ac dictus patiens, ingravescente morbo & symptomatibus occubuit, sicque eistum Hippocratis adimpletum est, qui sed. 5. Aphorismorum secundo inquit, Convulsio (vel spasmus) vulnere superveniens lethalis.

Hernia Pubis ab Obstetrice pro Utero habita, pessime tractata.

Clariss. Joh. Petri Albrechti. Miscell. Curios. Decur. iij. Ann. 9. & 10.

Nocivos inter errores, quos ab Imperitiâ Obstetricibus sæpius comitæti quotidianæ docet Praxis, m. rito ille, quem jam referendi animus est, locum habet, dignus sanè, cujus hic aliqua sit mentio. Mulier quadraginta circiter annorum, vendicose Malotum Citeriorum hic loci victimæ quæretis, Anno 1694. incidit in contumacissimam alvi constipationem ac rominibus colicis miserè torquetur, succedente mox contionio vomendi conatu cum anxietatibus præcordiorum. Prostrat igitur mox obitumit, ut mulieres in suis morbis prius vetulas ac Obstetrices, quam expertos ad auxilium vocet Medicos, sic & illa, de qua nobis sermo est, earundem quandam accersi curat, remedia ex ea anxie expectant. Obstetrici plurima de usuto male effecto blaterat, ac ipsi unice causam morbi assignat; id quod eandem morbo affirmat, dum denudato abdomine in inguine sinistro protuberantiam quandam gallionæc ovi magnitudine advenit; quæ conspectâ, uterum à sede naturali discessisse, eamque ob id indignabundam, tormina & alia symptomata citre, imprudentes exclamat, addens, sui jam officii esse, ut eundem contratio motu ad naturalem redigat locum, quo factu futurum, ut quævis mala iterum evanescerent. Quid sit? Agrotata dicta Obstetrici verbis aures præbens, huius fidei & curationi se committit, ac insuauto admodum eventu; illa enim ter quaterve quoridie inoffensam accedit, repositioneque putrilini uteri operam dantis, tumidam partem premitt, fricat, vellicat, trudit pelleque ventris interiora, nihil interim remittente malo, quin paulatim eodem magis magisque in detritus tuerent. Pinc petmorus marinus, meum effligit auxilium, orque citò citius ad ejus me conferam uxorem, summo opere perit. Adsum statim ac miseram lo deploandam invenio statu, fortidus jam & stercoreas copiosè evomentem sordes. Quæro ex Marito, num in uxore onquam vel ombilicæ, vel pubis observaverit herniam? Respondet ille, planè sibi ignorum esse, quid hernia nomine veniat (*Er wisse nicht, was ein Bruch zu sagen sey*) bene quidem se scire, quod uxor ab aliquo tempore quandam in pube senerit tumorem, hand tamen eo credere, eundem adhuc adesse, cum adhibita Obstetrici, illum nihil aliud, quam uterum fuisse perhibuerit, qui sede sua naturali relicta, sinistro latus versus obtraverit; cuncta præterea enarrabat, quæ ab illa ad reponendum uterum hætenus peracta erant, annedens, auxilium semè eandem dixisse, q. d. ille iam debitum iterum occupet locum, factique omnibus quæ sui muneris esse potaverit, Medicum jam sit consulendus, qui ceteris Accidentibus idoneo subveniat consilio. Imperatâ tunc licentiâ inspicendi locum affectum, Babonocle oculis statim occurrit, omnium malorum quæ hætenus Agrotam excruciant, vera causa, Ali, quod maxime dolendum erat, Tumor à pessima Obstetrici correctione, violentis tractionibus, frictionibusque inflammatus, planè ad suppuratum;

putationem tendens, mitum fuisse incrementum ad labia usque podendorum jam proleptens. Detestor temerarie hujus vetulæ frivolum omnino facinus, inestque nonnullis Clymæacibus ac per os exhibita iis, quæ emolliendi virtute prædita, alvi exonerationem promovere possent: Brevis, Deo sit laus! ejus naturalium iterum obtrivit apertionem, cum vomitus thetorei notabili temissione meliorique paulo post adipitante sanitas autâ. Ulceris interim, quod sponte apertum, puris ingentem eructavit copiam, Chirurgus caidam commissa est curatio, ejus destituitate & diligeniâ, illud quoque, licet post aliquot demum menses, feliciter consolidatum est. Quot verò molestiæ ac rædia integra Agrote, tum ob dolores exin obortos, tum ob ægitudinem animi, quam ob parvum genitalium quociens tepenter deligationem, pudor naturalis causabat, fuerint devorandæ, norunt omnes, qui tum temporis cum illa conversantes, ob puniendam Obstericis temeritatem, haud adeo faulta huic apprecabantur.

Sarcocele ingens, variis accidentibus stipata.

Clariss. Gußavi Casimiri Gabriel. Ephemer. Germanic. Centur. 1. & 2.

Vir honestus à tenetis mihi familiarissimus, dum in Academia Francofurtensi studiis mecum vacaret, ab Ephoro Nobili ducum Comitum Polonoium, quem discretis se vexaret, dum aliqualem vindictæ loco, titillando paulo nimis tristerat, jactu cepidæ sinistram inguen & ictorum graviter non sine insigni dolore læsus, postquam ictus paululum dedoluerat, contusionem illuc factam, ut solet juvenilis ætas, fusque deque habens, post facti ingens temporis intervallum, testiculum sinistram læsum sensum ac sine sensu incrementum aliquod notabile coepisse, ac multo majorem suo à dextris vicino factum animadversit. Quod tamen, cum inde incommodum notabile nullum adhuc sentiret, patienter tulit. Præteritum cum postea anno ætatis 33. contracto matrimonio, generationi proli utriusque sexus obicem nullum obtrudere, à natiuitate filii primogeniti sætis grandis, septimo à partu die Epilepsia sublati, & filiarum duarum, quarum prior anno ætatis duodecimo, posterior quintæ à partu septimanæ sætis cessare, deprehenderet. Nihilominus tamen, augmentum continuari, marcescente interea, ob præteritum à compere suo nutrimentum, didymorum albero. Defunctâ post quindécim annorum conjugum prior uxore, liberis orbus, socio suo superstitie septuagenario majore, quem hæcenus altum, in es orbitate desecere religioni sibi docebat, à biennii viduitate ad secunda vota transire coactus, iterato matrimonio, duorum filiorum ac filiarum duarum proflero factus pater. Quorum tres, filius nimirum ex illo connubio primogenitus ac filia duæ adhuc superstites. Unde, ut in parenthesi quasi hoc addam, incedendo illius affecti Democritici, cujus Columella lib. 6. c. 18. meminit, satis apte dicitur: quo à dextro testiculo mares, à sinistro feminas derivari ex Democrito affectu, ac ligato (de Caballia agens). sinistro testiculo mares, dextro ligato feminas generari contendit, cum unicuique hic, ilque læsus & æger, emarcido altero, ad utriusque sexus generationem penum contri-

buerit sufficiens. Sublatâ demum & post recedent annorum connubium & hac alterâ uxore, ac substitutâ illi ob liberorum, filiarumque præfentem educationem, post unius & dimidi anni viduitatem tertiâ, Sarcocele jam manifestâ fili indicia prodens, ob paucius fortè ætate jam provectâ Veneria exercitium, brevi tempore immensum aucta, ut caput infans propè biennis facillè æquaret, ac ab ulcerio tandem illius usu planè attereret, interim nec mole prægrandi, nec pondere satis gravi, aggressâ aut inaccessâ eâ ætate satis alaci & expedito, incommodum illud aut impedimentum ultra septuagesimum annum jam provecto aduleret. Donec 78. ætatis anno, post multas ærumnas simul trimentæ corporis animique ægitudines & afflictiones in scorbuto, hypochondriacum malum, febrem quotidianam leniam cum consumptione carnis & spirituum omnimoda incidere, soblato penitus appetitu, cum nauseâ assumentorum omnium ferè invincibili ac victum totali prostratione, facies Hippocratica in procindu, deque recuperatione sanitatis firè conclamatur esset. DEO Opt. Max. sic clementer dubio procul, disponente, Natura fidelis ejus seiva ac sui conservatrix planè sedula in ipsâ Sarcocele abscessum molita, sublati in tumorem coniformem paucis diebus satis grandem monstro illo sarcomatosis ictum contem! verum (quod fundè mirandum) sine insigni aliquo dolore, nisi forte tenui sætis tolerabili, sine ullâ pulsatione, quæ in abscessibus, dum pes sit, rarissimè abesse solet, fortè quia hic nullum subetat, sine omni molestia aut incommodo admodum sensibilis, nec ullo signo ominis finisset, nisi quod in apice com illius macula initio parum, successu magis rubescens, vix pili citius magnitudine æquans, sensum in pulsulam epid. tmdem elevans, mutata appareret, quæ post unum alterumve, octava tandem Augusti die circa meridie, præter omnem expectationem, spontè absque ullo sensu ullius doloris rupta, madore solo limbeciminum adiacentium aperturam prodere, ac subitè tantum, non sanguinis meri, nec cruentis nec laevi vel puris propè dicti, usque omni odore aut fetore destituti, nec ichoris, sed humoris talisculi copiam eructaret, ut non solum linteum circumjacentia omnia contaminaret, sed & ipsa, sic venia verbo, caligis inundaret, & equalore immenso, ut vix esset ferendo, suberaret. Unde tanta illius copia, & qua cavitate collecta, cum tumor super dictus capiendo illi non sufficisset. meum non est determinare. Triduum fluxus ille copiosus continuavit, qui puri nihil analogum, præter aliquem consistentiam, ab illius plane difforem habebat, miscelæ potius similis laticis, cui pollen laticis commixtus, qui limco exceptus, exhalante paulatim liquoze & exticcato penitus, minutissimis micantibus falsis quasi crystallis scætere videbatur. Constatnabat initio patientem spopinatam illud profluvium, hinc cum diem unum ad alterum continuaret, nec sponte silleretur, nec plagula aut Emplastris, nequæ difficulter admodum illi plagæ applicandis aut splenis coaceret possent, vocatur tandem & accessit in subsidium Chirurgus alius non inbabilis, qui attonitus phenomenon illud contemplatur & nunquam tale antea sibi visum asserit, tandem ampliandam esse aperturam censet, quo materie effluenti liberio pateat exitus, ne fortè partes reliquæ scroto contentæ, à puritagine illâ (ab acrimoniâ tamen omni, quantum adverti potuit, planè immuni) illic

diutius

dilucius morante in partem corruptionis trahitur; turandam itaque applicat paulatim ab humore turgescens, & foramen ad pili paulo majoris capacitate restitutum, turandolâ è lino capro paratâ, ac balsamo Areei imbutâ obducit, sicque dietim semel deligatur aliquot hebdomadas tractat, nec quicquam fluore indies continuante proficit; sed palliat, & latet spem & metum zgri curat. Materia interim, tam quâ consistendam quàm colorem & copiam subinde variante, ac pulvere illo rufo paulatim magis minusve deficiente, & in liquorẽ tandem, locutæ cæcis aliquatenus similem, moxatâ; quandoque dilutiorẽ nonnquam & subtiliorẽ, amyli instar diluti liorea, ubi fecata roboretis colorem & consistentiam induente. Denum Chirurgus à tempore modètam patienter perfoliandam præstat, capætionis curæ malum committit, additâ prognosticâ egro nequaquam acceptâ, fonticuli vices subituro illud foramen, ac à multis incommodis ætatem banc provecctâ, aliâs sæpius gravaturis, præservandum censeit, sicque cum nec coisilli nec auxilii ulterius nil ab illo expectandum, ab egro corporis sui Chirurgum posthac acturo dimittitur. Ab eo tempore varias subit abscessus ille mutationes, nunc fluxum aliquot dies continuos servavit, nunc vero quasi epitomio eundem diem unum alterutve ac si plenam sanitatem promitteret, sufflaminavit, ac ne gustam quidem liquoris stillavit. Insuetæ temporis successu papulæ, una prius, mox & altera pium in medio scissam referentes, à cute emerlerunt, haud procul à foramine priori, quæ telâ fetè lineâ viciniam piosis occupant, calami anteriori minoris transverli spatio ab invicem distantes, proxima priori tunc rudius paulum coarctato, paulo major teriti, colorem cutis initio non mutant, humorem tamen nullum adhuc sudantes. Postmodum mediâ illa papilla major concupâ, quâ teg-barur, aditru ipsiata liquorem priori similem quoque cæpit fundere, priori quâ obliteratâ, quæ tamen post unum alterutve diem recrudet, madorem priore tenuiorem excludans; semel etiam lapillam (ar obiculum dicam ambigo) semen siapl magnitudine æquatam, unâ cum lactice extruist. Demum & teriti papilla ut ut carius & parcius lachrynas quidam sudat corpis. Nunc quandoque alternant, modò illa, modò altera, rarò teriti, modò due modò omnes, licet tarâs lymphum suum, nunc rariûs nunc parcius ut lactice exstillant, quandoque nunc una, nunc due, nunc omnes tres sursum ad tempus clauduntur, sicque ægrum inter spem & metum suspensum tenentes, an noquam an nunquam à fonticulis spontaneis liberandis sit, placidam tandem analysin à divinali gratiâ expectare jubent.

Cum obligatoria vulnèrum, quæ splenis ac vinctis sit, ab initio admodum in hac plagâ molesta, imò ob eorum orine redditionem penitus incommoda, coactus est æger loco ipsolorum ac vinculozorum busiam ac balgam, ac cypiam, vocet quisque, prout ipsi vitium, cupreum stanno soerant obductam, & externe corio molliori vestitum excoxitare, sibi que comparare, quâ reclusa suat, patri monium istud eternum, impositio foramiolibus Emploist tribus turandolâ balsamo Areei præmuniti, & applicato desuper pulvillo, ab ulcerioli deligatione immoali, his dietim recondere, sicque hoc adminiculo, à singulo fori coalesco, illa ambiente duobus locis connexo ac suspensio, adutus dies noctisque

gestare, ac sic ut commodè tolerare possit. Maxima exque non indigna cetera hunc casum occupant. Unde nimirum abscessus ille sine omni dolore, sine pulsatione in parte aded sensibili, tam subito congestus & ortus, tam propere suctus, tam inopinatè abique ullo doloris prodromo sponte appetus, taotam subituz copiam (cui capientes tumoris capacitas nequiquam sufficisset) eructaverit? An pro evacuatione critica habendus sit ille fluxus, quo motum præcedentem gravem in marasimum tendentem solvete Natura sit conata? Annon Naturæ conatus ille, præcipue indicationi virium iustaurandis, quæ corporis mactescens nutritionem porius & augmentum effugitare videtur, quam tanquæ humoris copie, in sine penitenti subitachione, è diametro contrariis sit iudicandus? An fluxus ille etiam nunc perseverans, pro insulso an pro salutarî indico sit habendus, an ægro à majoribus incommodis præservando, ut quidam non infima nominis Medici censuerunt, servite possit? Num verò pro lethi feto cum tempore sit habendus, pestilans ille lactis fluor? Mulum humoris, fortassis & nutriti, corpori subtrahendo, eoque calhauriendo potius suoque vigore, satis jam exhausto, ulceris ipsiandando, aptus sit iudicandus? Quis illa & unde derivanda pulvis illius laterio pollini similis, tulli ab initio tanta copia, & illius per aliquod tempus continuata eructatio, jam verò sensim deficientis paucitas? Que isodori illius ac quantum scilicet iudicio aliqui datum, omni penè accimoiâ carentis, lactici, cui pulvis hic immixtus, origo? An vas aliquod lymphaticum in secoto per arteriam, vel disperditi, aut anostomoliam apertam illum sensim excreant ac excludit? Verum horum evolutio ac resolutio animi mei ac iudicii provecctâ hac ætate aliquatenus jam torpentis horizontem transiecedunt. Aliis ergo ingenio vegetior præditis neque sagacioribus lampada trado.

(Berolins Augstam Vindel. die 8. Decembris.
An. 1708. Nissa.

Monuit postea, die 6. Junii An. 1710. Nobis hujus Observationis Auditor, faciem ulcers descripti quotidie fetè aliam induere faciem, tam quoad exteriorem affectum, quàm quâ reduciendam materiam, tum consistentiâ, tum colore, tum copâ semper variam: ab aliquot hebdomadis præter faciem paulò quàm ante crassiorẽ, frustularim aliquando cum impetu tanquam è siphone ejaculata ad distans nooouam, potissimè particulas camuleotas, pallide navescentes, diversas tam copâ quàm magnitudine, feminis papaverini & cannabini, pili etiam rari majores quàm minores, quas ipsem testis esse substantiam suspicatur, paulatim fatiscerem ac lecedentem, sed abique omni dolore ac foetore, cum aliqua tamen, sed vix scilicet corporis alteratione, ne, vitiumque iactura.

Enterocle magnetica, seu per Sympathiam curata.

Clariss. Joh. Georgii Heyeri Ephemer.
German. Centur. 3. & 4.

Curas Sympatheticas ad lydim recte rationis lapidem

lapidem examinanti; triplicis generis occurrunt. Sunt enim (1.) parē naturales seu rationales, cuius Medico Christiano & rationali concessa & usitata; (2.) Superstitiosæ à Medicis rationalibus negligendæ, quando verba vel preces simul profecerunt; (3.) Magicæ, animo nocendi, seu proximum damnum inferendi insititæ. Nullus enim dubito, quin plurima veneficia per sympathias & antipathias explicari possint. Scilicet Cacodæmon cum supra naturæ vires agere non possit, abstrusio-ribus his mediis utitur.

De istis Observatione CXVIII. Censuræ I. & II. Ephemeridum Nat. Cur. corrente hoc anno editarum, subis dictum. De his inferius non- nihil dicemus. Illarum verò exemplum sequens hæc observatio nobis submisit. Puer quatuor annorum, tenetioria constitutionis, alteruto pe- rionem processu, per casum ab alto disrupto her- niosus factus. Itaque parentibus ejusdem non sine summo animi dolore animadvertentibus, scrotum à prolabantibus per rupturam intestinis sepiuscul, mirum quantum intumescere, magnasque sibi mo- lestias, & majores filiole dolores afferre; quin etiam reposita intestina post levissimum motum de- nouo relabi, variis remediis, cataplasmatibus, em- plastris, ligaturis &c. frustra adhibitis. Deliberanti- bus, an tenetrium corpus crudeli sectione peri- clitari velint, venator quidam herniosum magne- ticè curare spondet. Quare filiolam in proximam Syliam apponatur, ibidemque fissâ, mediante cu- neo ligneo, quercu teneriori, eoque donec dictus puellus per fissuram trahi possit, tenuis vicibus per dictam fissuram trahitur atque retrahitur, su- peradditis quibusdam verbis uscio qualibus. Post- modum quercus fissâ ligamentis sedulo deligatur, stercus vaccinum vulneri corticis lassi illinitur, cuneusque sub quercu retri- immittitur, superaddi- to prognostico: Quamprimum quercus fissata fue- rit consolidata, & cuneus sub quercu defossus putrefactus, herniosum cerè certius sanatum iri. Id quod felicissimus eventus plane confirmabat, hernioso post semestrem spatium perfectè, super- stitiose tamen curato, & ab hernia adhuc libero existente. Regetur aliquis: Bona verba fuisse, quæ venator mulitavit, & forsitan invocationem nominis divini. Sed Numen divinum in omni- bus corporis necessitatibus invocari posse ac de- bere, dubito. Cujus quidem dubii decisionem Theo- logis relinquo, qui cum rationalibus Medicis loquor.

Bubonocle periculosa.

*Clariff. Gusevi Casimiri Gahrliop. Ephemer.
Germanic. Censur. 3. & 4.*

Philippina honestorum parentum filia proba, natu Palatina, teneræ constitutionis, sexto for- te ætatis anno, Patentibus ob Gallorum, Pala- tinatum invadendum, tyrannidem, exortibus ex- tra partem denatis, orba, à cognata quadam Consulis uxore in familiam suscepta, & sat ri- gide educata, servilibus & pro ætate ac viri- bus nimis gravibus laboribus exercita, decimo quinto ætatis anno, ab onere nimio, cui tol- lendo impar, dolore cum aliquali tumore in inguine sinistro sensit, qui postea in bubonem excrefcens, deito inflammatus in apostema transit,

obitu-ocibus, febrî, torminibus, aliisque sym- ptomatibus, superveniente quoque interdum ileo, horrendis alpacum; tandem post unius alteriusve diei moram, perforato bubonis cacumene, tribus successive inde erumpentibus lumbicis, spitha- mam & ultra longis, exulceratam, quod dicitur sa- uiem purulentam cum quibusdam excrementorum indiciis foetidis eructavit. Hec oegleciis, licet illud trahente, remediis quibusdam domesticis, interque ea decocti herbarum quarundam dubio procul vulnerariarum, usu. Dei potissimum gratiâ & ætatis juvenilis, si quid illa contribuere va- luit, beneficio, ulcus illud diurnum ac perico- lolum tandem coaluit. Ipsa fortiori quidem ali- quatenus testitura, variis tamen infirmitatibus ac accidentibus lobbine infestantibus obnoxia. Tan- dem ab hæc illa severâ dimissa, Berolinum venit, novoque ministerio paulò tolerabiliore mancipata, triennium fortè firmiori valeudine gavisâ. A ti- melti autem malum illud tandem lopicum recru- descere cepit, occasione nimirum rursus oneris oimili elevati, à quo in dolores colicos aut illa- cos, quantum recordatur, devotè sociidit inte- tol- rables; quibus sub hypochondrio sinistro ad in- guen usque vergentibus, & immensum diu no- ctisque totqueantibus, gravissimè afflicta; obstru- ctionibus quoque alvi perstinacibus, in perneciem simul conspirantibus, eodem, quo ante inguini loco, prapè cicatricem ab ulcere priori relicta, tumor rursus bubonem, aut bubonoclen potius, mentis, emetit. Adhibetur, uti solet, in talibus ab aliantibus egens, graves iu Medicis, Pharmacopolas, & Chirurgo, erogandas im- pectas vitantibus, tursus domestica & euporista tam utute, quam externe, sed frustra: tumor enim ille nequiquam ille cedens, indies potius au- getur & altius adollitur, ac gravia illa sympto- mata magis ingravescunt, gementem interit & mi- serandam ejulante ægeritima & miserima patiente; demum & vomitus foetidi superveniunt, illi in- stantissimè prodromi haud obsecuti. Sollicitor tandem, eoque cum deventum, ut opem ægre fecim. Symptomati itaque urgentiori, ut aliquomodo saltem occurrerent subvertentis, primum Enema satis validum emolliens ac stimulant, in Pharma- copolio Regio parandum, & proutius applican- dum, ordio, sed lrito effectus. Patitur postea, me iuscio, à Chirurgo pauperum, ex mera uri- na, sale & oleo aliud, sed eodem successu; ac- curritur devotè ad me, prescribo cataplasma, validè admodum emolliens, tumori aliquoties calidè adhi- bendum, ejus ope cacumen tumoris sub Epider- mide aliquatenus attenuatur, quo auditio, enema aliud validius prescribo, paulò post iteratam Ca- taplasmatum applicationem administrandum, pio al- vo pertinaciter adeo adstrictâ, magis lubricanda & ad viam ordinariam sollicitanda. Quo vix dum petado, Bubo ingenti cum fragore, dispoite in- stat bombeardæ, præsentè & assidente Chirurgo, crepat, atque copia insignis stercoris liquidi, cum pure admodum foetido, tandem & iocetidi enematis liquoie succedente, effluit. Unde max insignè levan- men cruciatuum, quibus miserima hæctenus torra, obortum. Deterio tandem sollicitè squalore, ulcere mundato, ac rite pensato vulnere, ut & propinatis ioterdum vehiculo commodo guttis aliquot Essen- tiæ traumaticæ D. Wedelli, alvus demum ad officium debitum redit, consuetâ vi recrementa secretans & eliminans. Vulnere itaque medi fere- se digiti longitudinem ac transversè latitudinem, æquante,

equante, sicque tranſverſum ab inguine ad pubem deſcendente, Chirurgorum duorum dexteritati ac ſollicitudini commiſſo, ſub ſpe recuperandæ propediem ſanationis, ac integræ tandem valetudinis ulteriori me ejus cutâ ſubſcens, pene reſtitutum deſtinui.

(Berolino Auguſtam Vend. d. 28. Junii
An. 1712. miſſa.)

Postea inaudivi, illam aliquando ſitis incolorem viſiſſe; verùm haud ita pridem recidivam eſſe paſſam, ac malum illud tecturiſſe, quo evocata, cùm in auxilium non faciem vocatus, ignoro. (Idem d. 6. Maji. A. 1713.)

Anatomica inſpectiones.

Hernia à ruptura Peritonæi.

Anno 1613. Septembris 24. aperui corpus cujuſdam decollati, in quo cùm rupta inſteſtinali laboraret, affectum & peritonæum ruptum oſtendi, quomodo per eam rupturam inſteſtina vel omentum deſcendunt. Modum etiam incidendi & ligandi demonſtravi. Plures idem in utroque latere habebat venas & artenas emulgentes, Job. Rudolphus Salzmännus Obſerv. Anat. p. 42.

Epterocele à dilataſione ſola proceſſus peritonæi citra rupturam dependens.

In Hernioſo hydropico ſectò poſt mortem, ejusmodi foramen per quod inſteſtinum in ſerorum deſcendens tranſmitchatur, tororum margine integrum, nec dum iſſum vel ruptum ullo modo deſcribendum. Per quod inſteſtini tenuioſa porſio illa, quæ ſupra cœcum eſt, in ſerori, aqua pleni, inſuam ſedem ulque ſerbatat, totoque illo docti huic proceſſui peritonæi buſus aqua cauſa, quæ tuncas has erodendo ut conglutinentur facit, ſummiter accretæ & adnata erat, nihilominus ſine incommodo excrementa egredite, nec dum de dolore conſequente. *Plinius Præſid. lib. 3. cap. 2.*

Vafa Seminalia Peritonæo obvolvunt ex ſeſſione Anatomica Hernioſorum patet.

Notandum quod quando muſculi oblique deſcendentes tendo modice relaxantur, ſit Hernia illa ſpeciea quæ Bobonocœle vocatur: Quando vero valde dilatantur, tunc ſunt Herniæ duæ ſpecieſ, Inſteſtinalia & Omentalia: Valent namq. corpora hæc in ſerorum deſcendere. Neq. ſi alicui ſit mitum ſi contra opioſionem cujuſdam Excell. Medici ſententiam qui cum Fernelio credebat vafa ſeminalia à Peritonæo non eſſe inducſa, neque ita de facili tendinem hujus muſculi perforari poſſe, cùm jam tæpe, ut vidi, & celeberrimis Medicis oſtendi rem aliter ſe habere, non ſolum in cadaveribus, ſed in vivis, præſertim anno 1506. In quo vidi puerum qui Hernia inſteſtinali afflictebatur, & cum à Chirurgo à Murcia per incisionem curaretur, Teſticulo cum ſua vafa avulſo manifeſte inſpecti, atque oſtendi vaginam ut ita dicam, teſticulari à peritonæo factam, quæ ita erat dilatata in ſuo vocatu, ulque ad finem & fundum, ut duo digiti manuum meæ facile inſederentur, quod credo omnibus facile eſſe viſu. *Hippolitus Boſſus de Facult. Anat. L. 11. p. 9.*

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Mulieris Hernia eſſe obnoxia oſtendiſſe diſſecti virginitatis, qui à relaxatæ Peritonæi Inguinalis accidiſſe.

Ligamenta uteri Rotunda oriuntur à fundi uteri lateribus, iis præſertim in locis ubi Tube Ellopiatione utero committuntur, & inter duplicem Peritonæum verſus inguina utrinque aſcendunt, & ut vafa ſpermatica in manibus, ita hæc Ligamenta in mulieribus extra abdominis cavitatem procedunt; hinc illa eadem ratione ut viri Hernia ſunt obnoxia, quatenus ſcil. Peritonæum eo in loco, ubi ligamenta erant, præter modum dilatatur: Quæmadmodum hiſce diſcus obſervavimus, dum Filiam Hernia laborantem poſt mortem diſſecavimus, eo namque in loco, ubi rotunda uteri ligamenta abdomen deſcendunt. Peritonæum adeò relaxatum invenimus, ut integram foream ſive hiſtam efformaret, per quam inſteſtina in inguen deſcendendo herniam inſteſtinalem producebant. *Regnerus de Graaf. de mulier. organis. cap. 10.*

Hernia ope ſubligaculi ſolius curata, natura hiatum materia adipoſa oſſercente.

Sacrificulus in ædibus S. Andree Activi ſacris, nomine Ioan. Moterus, Hernia completa laborans me acceſſit, opem eſſigilians, maximo enim ſe dolore afflictiſſe, præterim ubi officiũ cauſa eſſe canendum: Viſo loco laborante; à cantione abſtinentum dixi, n. inerte alteri conſeſſo; hinc pluriſimis morbo congrua præſcriptis, inter cætera ſubligaculo deſcendunt coh bene juſti, quo & quinquenni vel ſexenni ſpatio uſus eſt; atque ex eo quærens quæ valetudine fruereſſet, ſe ſanum eſſe aſſeruit: Quo de rei veritate conſtaret, in ædes meas cum deduxi, examinaſſiq. genitalibus, nullum Herniæ veſtigium comperiit.

Eo autem ſemeſtri poſt ex Pleuſtide deſuncto, cadaveris apertione a conceſſa, inſpiciſſi ſedulus quibus ſpæpulis narva deſcendunt inſteſtina obvi. in iſſit: Fidem teilor me circa foramen producentium peritonæi, inveniriſſe ſubſtantiam adipoſam, magnitudinis mediocris globuli ſphæriſterii, tam acutè dicto proceſſui adnexam, ut vix ſine dilacitatione adiacentium locorum divelli poterit: Quæ inaptonis cauſa fuerat; Multos poſterea novi qui à peritonæi ſubligaculi geſtatione, eaque ſola citra aliud præſidium ſanitate conſequuti ſunt; quibus, prius macilentia, poſt obſeſ facta, circa inſteſtina colligitur pinguedo, à qua innumereſcunt, unde nullus in ſerorum pater tranſitus, relicto poſtmodum ſine recidiva ſubligaculo. Ex quibus pater temete inſtuenam non eſſe caſtigationem. Rea certo admittatione non caret, nam tam morboſi incurabiles credites, ſuperare, levi auxilio adjuvant. *Parvus Operum lib. 8. cap. 15.*

Extraordinaria Herniarum ſpecies per Antætomem deprehensa.

Hæ ſunt ſimpliciter & compoſitæ, prout vulgo deſcribuntur, ſed nobis plures alias præſis demonſtræ, & quæ apud Scriptores non repertiuntur; nam experientia me docuit Peritonæum etiam ſi parce poſteriori verſus Dorſum poſſe diſtumpi, & ibi Herniam eſſe: ite: Inguina ſunt locus Hernia conſuetus, verum noli tibi perſuadere Peritonæum in aliis locis enam non poſſe diſtari aut diſtumpi, & ibi Herniam eſſe: Supra umbilicum non ingit, ſed ruiſſime, infra umbilicũ, & ad ejus Latera, & longe ſupra Inguina,

Am

non

non duntaxat ego, juxta alios Hernia vidi, sed cum illis tanquam cum abscessu agebatur, & Chirurgus non aliam sui erroris rationem in medium prorebat, quam quod ibi Hernia coniotus locus non esset. *Barbæus Chirur. parte 1. c. 7.*

Bubonocèle à descensu Coli in inguen.

Occurrit ante aliquot annos mulier 40. annor. quæ jam à sex annis hernia gravi ex casu laboraverat: sic ut subligaculo forti propendens, detinere coacta fuerit.

Aperto in cadavere: Intestinum Colon, rupto peritonæo, dilatatis extremis, cavitatem ventris magna parte reliquissè observabatur, loco eo ubi ad constituendum Rectum flexuosum valde sinistro in latere detinebatur. *Ger. Blasius observ. medic. 8.*

Hernia ab intestini Cæci descensu.

Cum Cæcum intestinum prope senem dextrum peritonæo contomaciter adhaereat, non possum adduci ut credam cum Galeno solum hoc intestinum omni vinculo solum esse, ob idque facile in scrotum decidere: Experientia docet solum ileum publi proximum Enterocolon facere; Invent tamen in pueris, quibus cum ossi sacro incubat, in scrotum delapsum. Ex super in Pharmacopei cadavere juxta inguen provolurum observavi. *Riolanus Anstropog. lib. 2. cap. 12.*

Hernia à descensu omenti.

In subiecto vituli ob cusam monetam strangulato 1638. Paritiss, Omentum in inguen dextrum producebatur: Deinde vero musculo circumscripti ita adnatum videbatur, ut naturalem nexum diceret. Epiplocele enim laboraverat: Utque quoque Testiculæ Hydrocèle infectæ. *Bartholinus com. 2. observ. 89.*

Hernia à descensu intestinorum inter cutim & musculos.

Experimus etiam processum peritonæi in Inguinibus ita posse dilampi, ut intestina non in scrotum, sed inter cutim & musculos versus femur sese urgeant. *Barbæus l. c.*

Hernia ab intestini & omenti prolapsu.

Pagino cuidam viro robusto cum duobus lincinet, & in tentam dejecto, advectionem aliter pedem in Inguinis dextræ regionem adeo impetuose impexit, ut vehementer inde cruciatum mox sentiens, vix iterum potuerit effurgere: Inde in lectum collocato, statim tumor in eo loco amplius apparuit. Chirurgus & Lithotomus vocati, rupturam in peritonæo factam, atque identidem intestinum sequutam judicabant, aliquotque dies in reponendo intestino laborarunt, fametibus, inquisitionibus & manuali operatione adhibitis: Quibus cum nihil proficeretur, dolorque in dies augeretur, & tumor admodum ruberetur, ad nos advectus fuit: Cum vero cognovissim illum totos octo dies, ex quo latus fuerat, nihil per alvum decessisse, vomitumque ex nocte excrementorum alvi frequentem, & postmodum omnino intestina prodidisse, uti & omenti portionem tumore in inguine persistente, nec in scrotum descendente, intestina ex latione inflammata, uti & vicinas partes

affecit: Er. quia tumor mollis, plenus & lividus erat, sanguinem quoque illic collectum ex latione, etiam ex diutina retentione corruptum esse judicavi. Quibus consideratis, cum nulla alia spes salutis esset & gangrenæ indicia, excitatis jam nigris in inguine postulis, exodontaque ichore appareret, perfectionem curæ viam patefaciendam & per rupturam peritonæi tunc conspicuam, intestina reponenda, Agro etiam hoc unica rogante, necessarium fuit existimatum. Itaque Chirurgus, cuem tumori infiltratam attollens digitis, ne dum secaretur, insectina forte læderet, cum novacula aliquouique didicid, agro nullam inde dolorem sentiente, quod emortuus cancer & gangrenæ signum erat, statimque sacus fortissimè & corruptus sanguis lividus, cadaverosus & abominandi odoris, per totam peritonæi scissuram, & vulnere erupit, tanta copia ut pelvim pene impleteret: Inde sectionem longo vulnere continuant, omentum, quod omnino corruptum erat & prociatissimum cum intestinis, ab his, amplitudine duorum palmarum abruptis, atque hæc eidem admodum rubentia cruentaque per rupturam intindere, rursumque etiam peritæa retinere studuit, quod dolorem agro pariebat, ut omnino interdam deficeret: Postea pannis duplicatis & involutis, applicatque cum emplastro, ne erumperet intestina cavit, mortem interim prædicens, uti & ego, cum pulsus in eo deficeret, extremitates frigerent, quare tres tantum horas in agone veritus exspiravit.

Abdomine latione tolerato, intestina intrinsecus livida aliquouique, uti & peritonæi inferior sedes, carnosæque vicinas loca consula apparuerunt, ex quibus ea inflammata gangrenæque fuisse satis apparuit. *F. Platerus observat. lib. 3. pag. 756.*

Ob Herniam castrati plerique intereunt, ut illata peritonæi processu, nervi sexti paris, & vasis spermatici.

Et si ex curandam Herniarum via, quæ aeternum puncto sit, dolore ac periculo non vacet, tunc tamen est quam illa quæ sit per castrationem, quæ egros remodis crudelitate necesse manifeste moris periculo exponit: Castratores enim, dum timent ne curatione absoluta superflua sit relaxatio, violento tractu peritonæi processum à paritibus quibus subiacet divellunt, unaque nervum à sexta conjugatione, qui ad testem pergit: eandem vim spermatici vasis inferunt, quibus ex rebus dolor excruciat ingens, convulsio, hæmorrhagia, inflammatio, putredo, ac denique mors, ut ego in multis observavi, quos paucis post diebus quam exacti fuerant, exfecit mortuus: Hæc pericula & damna, est nonnulli evadant, illi tamen generandi facultate per omnem de hinc vitam privantur. Quare nunquam castrationi Testium subscribam, nisi forte latecèle aut gangrenæ ipsos invaserit. *Pareus lib. 7. cap. 16.*

Enteræ-Epiplocele lethalis ob sequentem gangrenam. 1. Ob ilei & Epiploæ cum aqua & fluitus. 2. Ob Epiploam maximam partem devolutam. 3. Ob inflammationem Epiploæ & intestinorum. 4.

Accerfros olim fui ad Senem quandam hermosolum, cui intestina in scrotum prolapsa erant, & qui varia illicque gravibus ob id molestabatur symptomatibus.

Apud.

Apud quem Chirurgum repertum illa in suum redigere locum antientem, applicatione solum & unctio-
num, ex rebus magna ex parte adstringentibus appa-
ratum: Ego animadvertens eorum usu impediti
potius quam promovet curationem, confectum ex
emollientibus & relaxantibus curavi concinnanda reme-
dia, quorum usu intra paucas horas suo loco fue-
runt restituta intestina, & dolores quibus acriter in-
festabatur sublatis. Post aliquod autem temporis spa-
tium, quia falsæ ulum avertabatur, seclapsum cum
essent, denuo ad illum sum vocatus, ac eadem quæ
antea per aliquot dies usque remedia, ni-
hil profeci, nec ullo modo intestina potuerunt
restitui, & sic me patiente bonus senex aspira-
vit.

Ego hærens qua ratione id potuerit accidere, quod
usu convenientium remedium morbus, quemad-
modum antea, non cesserit, perii ex uxore defun-
ctæ ut liceret dissecto cadavere ejus consumma-
re investigare causam: Illa non refragan-
te, Ego & Chirurgus opus anatomicum mea ag-
gredimur, & repetimus intestina, unâ cum epiplois,
admodum livente, in scrotum decubuisse, & eo
intestinis adeo intricata, ut ob id impossibilis om-
nino fuerit eorum restitutio. Et sic æstus in
veram ejus contumaciam pervenimus notitiam. Ex Ob-
servat. huj. Cypria Helicæ.

D. N. herniosus erat; In scrotum pars ilei devo-
luta erat cum Epiplois, præter usque copiam: Col-
lon fluitans turgidum. Vide lib. 8. de pulpit. cordis.

3. Dom. du Lac, annos ætatis quinquaginta
natus, ab inenarrabili Entero-epiplocele vexatus, cum
Tumorem ad immensum magnitudinem devenisse ob-
servaret, Tertio Arremotum, patria, Lugdunum
medelam quærens concessit: Convocati in consili-
um D. D. à Claustro, Grassius Aeg., Mag. Pantho-
tus & Benoist Chirurgi, exitum lethalem & cala-
mitatis plenum prædiximus, qui sectiosi soli cede-
re possit, evidenti periculo obnoxio, ob debilita-
tem partibus inductam, gangræne & sphacelo ex-
positum: Obiecit æger se ab anno bis vel ter vol-
vuloso affectu affectum fuisse, ob quem in exitum
penè deductus esset: malle se remediis aleam labe-
re, quum nihil morte funestius ipsi accidere possit, lan-
guoribus finem impoñitur: Mafculus ægi animus
assensum Medicorum & Chirurgorum obtinuit: præ-
parato ergo corpore Celoromæ peregi, atque Omen-
ti uncias octodecim calcui, membranas renaciter an-
nexi, immutato quadantenus illius colore: Opera-
tione peracta curam juxta methodum institui: sed
Anima ejusmodi domicilii penæra, id atrophiam con-
sumptum septima die deseruit.

Præsentibus dictis D. D. Medicis & M. Chirurgis
cadaver aperui: Omenti vero tantum portioneulam,
ovo columbino magnitudine parem intestino ileo
hærentem, repertum, cujus pars gangrænâ erat affecta,
convulsionem & mortis causa:

Inde colligo in affectibus qui minus spæ quam ti-
moris præbent, non temere ad operationes acceden-
dum esse, sed demum habito consilio, & perito à
viris Artis petitis, quo præcedente matura delibe-
ratione & prognostico, libera sit erga Deum & ho-
mines conscientia. Josephus Crovillard *Operationum
Iatro-Chirurgicæ Gallicæ edidit* 17.

4. Illust. J. H. Hederus, ab octodecim annis Her-
niosus, vehementi correptus tussi, intestinis vi deor-
sum pulsus & quasi incanescens, tandem inflammatio-
ne & ingentibus doloribus superveneribus, bis vo-
mutus nigra, cum præ anxietate non posset contineri le-
tali. Chirurg. Tom. II.

cto, & omnibus invicis sepe fugeretur, à loci muta-
tione remedium dolorum sibi promittens, tandem
sedili locata, lethali animi deliquio correptus pla-
cide exspiravit.

Aperto cadavere scrotum dextrum omento & ali-
quibus intestinis plenum inventum, ita erant impa-
cta, ne quamvis corpus adhuc caleret; via exstabil
sine ruptis potuerint: Inflammata erant, tenuia erant
quasi: Inde biduo ante obitum à lecto surgens, ere-
ctio non poterat ambulare corpore: venient semper
peonus curvare cogebatur. Ruffinus Epitomes meriti
& cur. cap. 26. lib. 3.

*Hernia à prolapsu partis mesaræ & intestino-
rum in scrotum, cum putredine.*

Nl. Hernia labotans suis amicorum agyram
conducit, qui ad suppurationem illam perducere aus-
sus est, (Existimans, ne credo, esse sacrocelum) itaque
ad eam stercore mebrato capillo destillato: circa 14.
diem oborta febre, vocat & ego tum prop-
ter febrem, tum propter urinae difficultatem: Ad-
veniens igitur & omnia diligenter perpendens, peti-
culum exitimo agyæ cura ægro illi allatum: ni-
mirum ob febrem symptomatam, item quæ dysuri-
am ex consensu istarum partium ortam, & insuper
quod hernia esset intestinalis, quæ cresceret nonni-
hil & decreveret: adeo decubitus vel ascensus;
præterea membranosa illa partes ad suppurationem
protius esse inhabiles, & rem nonnihi gravissimam in-
tervenientes symptomatibus in effectum posse de-
duci: Quin & ut effectus responderet, ramen cor-
ruptis illis membris functiones naturales necessario
aboleri: Ager contra malle se periclitari quam con-
ceptam curam intermittere, neque rogare ut febrem
tantum curam habere non gravaret: Pergit itaque ad-
huc per tres septimanas: tunc redit agyæ iste, ru-
sticus qui erat, & cum phlebotomo incisionis insti-
tuit per fundum scroti fauis altas, ad materiam ex-
hauriendam, tertio vero die æger moritur.

Aperio cadaver, altante ipsius agnato, & mesaræ
partes cum intestinis prolapsas putrescentes jam
& corruptas invenio, itemque in collo vesicæ ab-
cessum quantitatibus noctis avellane, ut non tantum
ratione consentiens, sed & abcessus difficultas illa
utrius caussa fuerit, Phil. Salmon *centur. observat. ur.*
In consultatione referebat nobis I. Dom. Sala vi-
disse se mesenterium cum intestinis tenuibus omnibus
in scrotum delapsum, abdomineque alteram præ se
natisse, qua mole compresso vesicæ collo, urinæque
impedire transire, necessitatem moriendi ægro esse
accitam. Th. Bartholinus *cent. 2. hystor. 95.*

*Hernia vicennalis, solo pondere molesta, ex
decubitu ilei & Epiplois in scrotum.*

Anno 1678. 18. Jan. dissectum est cadaver Ca-
soli Ludovici, in Nosodochio Genevensi, à Magi
Baillij Chirurgo, me præsentem & Dom. D. de Com-
munis, Nosodochii Medico ac Mag. D. Dentand
Chirurgo petitis. Septuagenarius erat dictus Ludovi-
cus, Vir procerus, vino & veneti, dum juvenis, ad-
dictus, qui rotam Persiam persgraverat: Obiit an-
tem ea Pleuropneumonia. Ante 20. annos Hernia la-
botabat, quam præ pondere & magnitudine subliga-
culis sustentabar, cæterum immensis omnium affe-
ctuum quos hernia comites sibi accersit:

Dissecto scroto, primò se obtulit Omentum eo de-
volutum, paucula pinguedine obductum, flavescens:
hinc intestinum ilcum, cum annexo mesenterio, ad

ulnæ nostratis longitudinem devolutum, circa illas lationis notas: Peritonæi productio, adeo expansa & dilata, ut nequaquam detractis intestinis & omento, quinque digitos conjunctis admitteret, manum integram, alias exceptum: Omentum autem peritonæo & intestina arte invicem cohaerebant, ut hinc conspicuum sit operationem sine dilaceratione impossibilem fuisse: Testes exigui, compressi, flavescentes, nudi mollioræ magnitudinem vix æquantes: Stenotora voce erat prædix: Diversorium, cui pro insigni appendebat effigies viii sylvestris, in suburbio San-Getvasiano, ejus fuerat: Coma autem & barba hirta, effigiei prototypus videbatur. *Theophilus Bohemus in Sepulchro.*

Enterocoele nativa. 1. Incurabilis ob substratum scroto adipem, & illeum vaginali tunica affixum. 2. Ob prolapsum ilei intorti, cum dilata-tione externa tunica vagina, interna rupture 3. 4. 5.

1. Job. le Charron vulvulo affectus evasit, ex-actique aliquot annis alio morbo interit: Aperto cadavere, observatum est medium quandam partem intestinorum & mesenterii rupto peritonæo in scroto amplissimum, & omni fide majus prolapsam, ut etiam inde trahi nequirit: Et illa prolapsio erat illi naturalis, intestinaque tanquam in loco nativo & agebantur in scroto & notiebantur: *Iac. The-wert Annot. 2. in conf. 24. lib. 2. conf. Ballonil.*

2. Cui scroto naturaliter nullus intervenit adeps, retulit tamen mihi Christ. Riedinger se illum observasse in Dom. Martino Schario, qui cum intestinali Hernia laborasset, nullus Chirurgo-um unquam ea, quæ in scroto prolapsa videbantur, ita redacere potuit, quin semper adhuc præter testem, tumor instat ovi gallinæ majoris remaneret.

Aperto mortui cadavere observant in scroto fau-do multum pinguedinis extevisse, & intestinum ileum vaginali tunica plurimum fibrarum inter-ventu humiliter accrevisse: *Regnerus de Graaf, lib. de virorum organis pag. 30.*

3. Anno 1664. Dn. Christoph. Heidenius in Herniam intestinale inlascetaram in scroto, cum stercoris vomitibus, obstructionibus alvini, tormi-nibus ventris, singultibus &c. incidit: Elapso scru-tinio in consilium vocor, examinante ante à Dn. N. adhibitis clysteribus emollientibus & humectan-tribus, infusibus, inunctionibus & aliis remediis, testor nihil amissum fuisse quod ad restitutionem in integrum requireretur: Sed quam operose, imo im-possibiles hermarum istarum in abdominis cavitatem per hæc media, ut & manuale operationem, sint re-positiones, tot logubria hæcenus facta testantur exem-pla & in demortuis *avro-fis*. Quæ causa etiam est quod dicta præsidia suos sæpe deserant auctores, ut agros postmodum prognostico cogantur relinqueret: Proximam curationis artinge metam qui dilatio-nem & prolapsum intestinorum in scroto corrigere novit: Hoc me cum Deo & rei veritate gloriari possum me ope Emplastri mei magnæci (propria experientia à me inventi, inque pluribus diversæ ætatis, constitutionis & lævis subjectis, eodem etiam malo plures per vices ad desperationem ul-que aliorum recorrente, multoties non sine fructu probati, quod satis dilandare nequeo, Lumbis applicati, tormina juxta sopiendo ventris atrocissima, intorta, dislocata, & inlascetata in scroto intestina, quamprimum incalescit, ob proximam abdominis

transfert sedem ipsius etiam ægris, non quidem sine molesta, vim ejus etætrici animadvertentibus.) dicti Domini intestina convoluta, & in scroto in-carcerata, in pristinum tepuissæ locum: Nam quamprimum die 2. Januat. 1665. bocce Emplastrum ipsius lumbis circa horam noctis novam fuit ap-plicatum, vix dimidio horule elapso spatio tantum exerceat tractum, ut præ cordis angoribus & levi-bus leipthymis, nihil adstantes qui tum excubias ageretur generosam emplastri virtutem ipsi quasi ma-nibus palpassent, vi abruptere tantum non com-moveretur, donec ipse salutaris extraxione *hæcenus* eandem perceperisset, eo quod intestina sen-sim ac sensim in abdominis cavitatem seipendo re-trocedere sentiret: Dum hæc ita peragebantur, lo-co vini meri, id quod Divinus Sexus inculcat, in-ternotum confortantium usus interius & exterius cordialium non fuit posthabitus: hisce per aliquot horas continuatis, optima recuperanda valetudinis spes affulsit, dum boni vulvuli hujus insequat fuit exitus, quos Hippocr. 2. Epid. l. 6. in comment. Vallesius recenset, scilicet somnus, lassitudo & diar-rhœa, quæ ex fræcibus constabat nigris, gangrenam minarantibus: Ad œsophagi tandem & faucium asperitatem, & læsionem ex stercoris & aliorum acrium humorum transita causatam, profuse len-nientia mucilaginosâ & putredini resistentia: Steno-dolenti Empl. Oxytocum levamen attulit, Et sic D. G. præter omnium expectationem cum tempo-ris ex Acherusia quasi palude liberatus est æger: Sed quid sit? Ne de bujus Emplastri virtute ab aliis frivole ac temere impognata, ullus dubitationis re-linquantur locus, ecce idem Herniosus cum anno 1665. 19. Junii, hemiam suam sine subligaculo gesserat, in idem malum, sed alijs comitatur symptomatis incidit: Ille illico, idem etiam Emplastrum adferri è mea domo jussit, Lumbis ut denno imponeret: hoc quidem iterum suam exercuit vim attractivam, sed irritò conatu: Ego clasp jam dam biduo do-mum revertens, illico ad ægrum accessus, deventi, habito ultero ceteroque mentis discursu, ad impediti effectus causam, quæ fuit 1. vis emplastri veteris exautata; 2. doxis ejus malo expugnando inæqualis, 3. nova symptomatum syndrome, quælis, præter ob-struções alvina & urinarias, vomitus stercorum, ventris tormina, fuerunt, summa virium diminutio, dyspnœa, nephritis, emphysema ventriculi, cum incipiente tympanide &c. Ego vero seposita omni-am horam affectum medela, iterum aggregatus sum dilocationem & prolapsum intestinorum in scroto, sine his enim reliqua non insequuta essent sympto-mata. Emplastro meo renovato, & doxi ejusdem au-cta, pristinum iustitiam curam semestrem, quæ licet lente procederet, levibus tamen aliis juxta adhibitis, intestinorum ditiosio & dislocatio probe fuit corre-cta, subligaculis tamen semper coëctenda. Sed tandem anno 1666. 4. Maii dictus D. æger lethalem metam attinge, superveniente ex lapso prono in ter-ram vasis cujusdam ruptura in scroto eodem affectu defunctus.

Cum corpus ad inspectionem aperiretur, observa-vi prolapsum intestini ilei intorti in scroto cum di-lata-tione externa tunica peritonæi, & interna ruptæ & dilaceratæ: Intestina iussura cum peritonæo & omento & mesenterio etiam inflammata, & tantum non gangrenosa, ob circulationem sanguinis im-peditam & spiritus vitalis oppressionem: Vesicu-la fellis erat instat ovi anserini in magnitudine: Ad mediolus: Rex dexter fuit minor sinistro: scroto scissionem mensura una & circiter feri currenti

crentia effluit; Constitutio Hepatis & Lienis Ulteriorum cultri progressum adstantes prohibuerunt: Emplastri compolitionem libens communicarem, nisi tetraxisset quorundam obijugandi audacia, fiet tamen si benevolum aliquem obijugaret. *Fridericus Hofmannus meth. med. lib. 2. cap. 2.*

4. Mense Dec. 1676. obiit famulus Chirurgi Noso-dochii Georvenis, Enteroccele obnoxiosus: Eâ tam temporis prehenfus, per vehementia doloris, accedente syncope, intra horas 24. extinctus est. Ante apertionem loci affecti, perpendit Mag. Bailly, Chirurgus periculisissimus, viz tritum digitum (spatium inter umbilicum & pubem intectissimè, Scrotum vero misce tumebat à facibus in intestino conclusis; facta autem hypogastri dissectione, reperit intestinum ileum bis, in formam læcis S conduplicatum; adeo in via coactum ut neque hinc impellendo, neque inde trahendo, in sedem naturalem compelli potuerit, etiam ablatis in intestino contentis.

5. Anno 1674. Apparitor Genevensis, nomine Dominice, septicaginta quatuor natus annos, ab Enteroccele extinctus est, post tulum septimanarum largituem: In quo etiamnom ileum intestinum eodem modo conduplicatum deprehensum, atque tam arcte incuratum ut nulla vi, etiam remota impedimentis, in abdomen compelli potuerit. *Theophilus Bonnus in Sepulchro.*

Epiplotele lethalis ob corruptionem Omenti, Testis & vicinarum partium 1. A maxima Omenti parte in scroto. 2. Epiplotele ab Omenti in Testis feminaliumque vasorum tunicam descensu. 3.

Anno 1585. robustissimas quidam Faber Ignarius Genevensis, quem elevaret pondus inguis, Omentum ei copiosum est in scroto, & quia reductum non fuit, Instrumit, Inde doloe acutissimus, inflammatio, aliaque gravissima symptomata, denique mors sequens 7. die.

Ego scrotum incidi, & Inveni Omentum, imo etiam Testes vicinasque partes plane corruptas & gangrena infectas: *Fabritius Hildanus cent. 1. observat. 72.*

2. Conspicatus sum Omentum scilicet extra umbilicum; Et in scroto Omentum libram & amplius *Columbus de Re Anatom. lib. 15.*

3. Ego non semel sane Omentum in eam testis feminaliumque ipsius vasorum tunicam (cui peritonæum originem præbet) devolutum, ac miris modis mediotem omenti alias constitutionem adhaerentem deprehendi: Nam cum tota omenti pars aliquo intestinis incumbens su mediocriter pingui homine vix libere aut sesquialibre pondus excederet, Vidi tamen omentum ita p. n. in ea testis tunica auctum, ut quatuor aut quinque librarum pondus penderet, & ventriculum ex sua sede ita deorsum distraheret, ut ventriculi deficiente munere, variisque abortis singulicibus id pondus mortis occasione fuisse inter secandum collegerim, cum in morbo quodam laterali, qui aliquo bene expurgatus fuerat, scrotum ex more ab agro adstantibusque subligari neglectum fuisset: Quin etiam quo exactius ramicum herniarumque, uti vocatur, rationem perquirto, eo etiam magis omnes illos molles ramos, quos carnosos vulgus appellat, ac merito à varicosis affectibus distinguit,

ex omenti prolapsu incrementoque progigni mihi persuasero. *Vesalius Anat. lib. 3. cap. 4.*

Hernia triplex lethalis, ob putrefactionem intestinorum in scroto incipientem:

In quodam magni nominis Viro, vicaria ledentariam agente, temperie humida prædito, & diu in viduitate vitam transigente, hernia cum aquosa, tum carnosâ ac intestinali (de qua ultima tamen semper fuit dubium cum nullos dolores sentiret vehementes) excreverat in tantam magnitudinem ut ultra 40. libras penderet, & ipse amplius hoc pondus propemodum seste non posset, propterea difficultatem spirandi, cum omnia magna vi deorsum traheretur, semperque ledio affectus decumbere coactus fuit: Tandem cum nulli amplius remedio locus esset relictus, & mors illi brevi immineret, de consilio Medicorum & Chirurgorum, prius tamen prognostico indicato, cum omnibus copia aquæ adesse videretur, sectio fuit adhibita in loco inferiote, ubi undans aqua percipiebatur, Quæ adhibita sine magno dolore, effluit cum impetu illius ad libram 1. sed foramine obstructo tunc, Medici noluerunt plus excerni: Sequentibus diebus tribus plus illius evacuatorum est, & æge non male se habuit. Vetum quæto die febris supervenit cum erysipelate, quod aliqui illi fuit sæpe molestum, præsertim in pede altero, qui ob scitum edematolum insolentæ quædam magnitudine, ac paulatim vices decesserant ut paucos post dies placidissime obierit.

Apertum scrotum, quod ex sectione aliqui facti decesserant, & sperm aliquam coalescentiam præbuerat, Reperit intestina putrefacta, quæ proculdubio mortem accelerarunt. *Observatio Joachimi Camerarii.*

Hernia ex Aquosa, Varicosa & Carnosa confusa.

Nobil. Ramæus accepit in sinistra naris partem superiorem & externam interosum & deorsum leviter tendens vulnus, ex quo statim concidit: Huic accessit vulnere, inter alia symptomata, sinistra testiculi cum dolore & summo dolore inflammatio, quæ tamen post magnam pariem sublata, remanente solum levi duritie, iocunde & dolore: vocatus deprehendo herniam, non ventosam; ob defectum flatus; nec simplicem aquosam, quia scrotum nec lucidum, nec aqua turgidum; nec Carnosam simplicem, ob dolorem. Sed Herniam, ex Aquosa, Carnosa, & Varicosa constitutam: Aquosam quidem incalescit tumor testis ovi oblongus, cum testiculi occultatione, quoad tactum & visum, Accedit & hoc quod sinistro lateri aquosæ herniæ valde sint familiares, quod nempe vena spermatica sinistra oriatur ab emulgente: Carnosæ vulnus ad sinistra naris partem superiorem vergens anulum dæte ponit & causam; generatur enim hæc hernia ex sanguine testis & icotum obruente; ibique in molem carneam mæto: cui affluxit vulnus poruit, ut disti, ansum dare, ut oon solum in principio statim testiculi sinistra inflammatione, sed & dolor sequens fuerit: Suppetas fert sanguis adustus melancholicus à vizio lienis oriundus, renisque sinistra debilitas: Varicosam monstrat dolor, qui exacerbatur in distensione vasorum spermaticorum; unde erectionem penis cruciatos intensissimi comitantur: Omnia incallum remedia, nam sequenti mense moritur.

Aperto corpore, Renum loco positionem pinguem quasi, Lienis vero loco ovi gallioarei quantitate nigram frustum, sanguinis coagulati facie, inveniebamus: Cavitas, (circa vesicam) abdominis, aqua erat repleta, ut & scrotum circa sinistram testiculorum positissimum, dextro longe minus: Vasa testiculorum varicam modo consistebant; Dexteri testiculæ substantia spongiosa & purida, tunicaque adnata erat, In dextera scroti parte caro adiposa. L. D. Hoffmann observ. Anatom. 6.

Herniosi calculosa vesica unam scroti partem implebat, Intestina tenuia alteram.

Venetia quendam Herniosum novit I. Dom. Sala, cui omnia signa calculi vesicæ videbantur adesse, nec tamen cathetere aut caudela posuit deprehendit In mortui cadavere calculus cum ipsa vesica unam scroti partem impleverat, intestina omnia tenuia alteram, Th. Bartholinus cap. 4. observ. 28.

Hernia à descensu Ilei in scrotum, subsequente Iliaco affectu, irreducibilis ob excrescentiam circa meatum ematam.

Dom. à Charancon, Senatus Cambesiacensis, cum quodam die in Vineta aliquid magno cum nisu ageret, repente sibi inmo ventrem crepati sensit, atque intestina in scrotum prolabi, quæ cum reponere conaretur, nec posset, in Iliacam passionem incidit, secundo eodem die rubicibus & vomitibus assiduus vexatus, alvum habuit penitus suppressam; difficultas etiam urinx illum comitabatur: Sub vespertam febri, siti, acris amator ingens, vigiliæ, jactationes, ventriculi subversiones, dolores, seu potius cruciatus, clamores continui illum torquebant, adeo ut nihil per os admittere & retinere posset. Ego accessus sub vespertam secunde diei, ex pulsus inæqualitate, inordinatione, parvitate & celeritate etiam, ex tot symptomatum vehementia & subitanea visum dejectione, morbum acutissimum & quartum diem non præteritum pronuntiavi. Atque præteritis quibusdam topicis, ne nihil facillè videret, catheteris, anodynis, ad discessum me paravi: Sed visus precibus remansit, & protinus enema emolliens & anodynum parandum & inficiendum curavi, post tres horas iterandum: quæ ambo ante diluculum tertie diei per os reddidit: Tertium post meridiem injectum, sub vespertam adhuc tunc eromuit, & ea nocte facies ipsa lætentes, & iterum bilis copiam cum violentia & cruciata maximo per vomitum rejecit, sicque viribus & spiritibus exhaustis, corpore prostratus inanito, sub vespertam quartæ diei defecit.

Dissedo cadavere, Ileon intestinum, quod in scrotum descenderat, livens invenimus, & supra os pubis, in meatos initio (quod notatu dignum) spongiosam, seu potius fungosam carnositatem repperimus, intestinum circa meatum involventem, membranisque vicinis adeo adhærentem, ut vix manibus & ungibus avelli posset: Eam excrescentiam primo statim die enatam, & à sanguine ob dolorem & rupturam in plagam cofluxo, & ad locum laceratum concurrente, penitus fuisse autem, quæ fungositate viam obstruente, facta fuit impossibilis intestini delapsi redactio. Avel Regius ad Fabricium Hildannum cent. 6. observ. 70.

Hernia à vase deferente in scrotum delapsa.

Præterea non semel tantum observavimus vas deferens corruptum in scrotum descendisse & ibi Herniam effecisse, quæ manuum ope facillime reduci poterat: Imo quæ, si corpus resopinaveris, sua sponte intro recedit, à qua tamen nihil mali expectandum aut metuendum est. Talis Hernia *Spermatocele* improprie à me vocatur. Idem ibidem.

Hernia ab aqua testiculorum replente.

Quidam ex phthisi obiit: Illi Testiculorum alter in magnam molem excrescerat, durus, qui aquam fundebat circum, ut in hernia aquosa: membrana, quæ aquam continebat, erat plæoe cartilaginea & quasi cornea: ipse enim testicularis sua propria ab hac diversâ cingebatur. Rumlerus observ. medicæ 52.

Hernia ab aqua inter testiculorum tunicas.

Ego in testiculo dextro hydrocelem vidi: Aquosus humor inter nervicam tunicam & erythroidem continebatur: Evidentes erant tres aut quatuor propaggines vasis deferentis intra testem vicinarum & sanguine sanio testem dispetitæ. Riolanus Annot. pag. lib. 2. c. 29.

Scroti apertio inutilis in hydrocele ob corruptum Testiculum.

Io Generoso quodam viro, quæ omnis periculi plena sit scroti & erythroidis membranz in hydrocele per scalpellum apertio, teste oon sublato, competum est. Ab aliquot annis sinistra parte hydrocele huic molesta fuerat; frustra cataplasmatibus ac aliis remediis usus crebro, tandem memorati Chirurgi consilio acquiescens, aperiri sibi scalpello tumorem permisit: Effluxit cito omnis humor, tumor quoque subsidebat: sed cum testis ipse omnino esset corruptus, vicinas partes facile insecit: Subsequuta mox scroti universi, ac etiam penis, cum tumore & ingenti dolore gingivæ, delirium cum vehementi febre, propter dolorem magnitudinem, supervenit, ac non ita multo post mori inaccessit.

Reu hujus sinister corruptus fuit, & seminalis in erythroidem descendens, valde ampla & multum patens. Dodonæus observ. medicæ. 40.

Tumor, seu Hernia Umbilicalis, lethalis ob Jecoris lobum alterum, extra Peritonæum prolapsam eidem accretum.

Beaverat Deos Illustr. Mariam Henly prole mascula, in hoc infansculo fuisse Junone Lucina recens nato, observavit obstetriz quendam umbilici tumorem, natus mox hæc magnitudinem æquantem: Uterque Patens Medicum & Chirurgum in consilium adhibent, & me quoque ad octo miliarium distantiam vocari curant: Convenimus omnes intra 30. horarum spatium, jamque tumor ad pugni magnitudinem accrevit: Quo diligenter examinato, caudela admodum, conspicienda se præbent Intestina vesiculosa, in eum prolapsa, rupto peritonæo: deinceps verb à dextra tumore

tumoris parte, quæ sphacelo correpta erat, nescio quam carnem substantiam, intestina deprimentemprehendimus: Chirurgus cum altero Medico spem unam in tumoris incisione collocatam esse asseverabant, fore, sic ut intestina in suum locum tepidius queant: Ego contra diffundebam, quod intestina sphacelo correpta videntur, & infantulum admodum debilem, mortuum dicebam, & præstare eum intactum relinqueret, quam artem apud plebem maleficam defamare: Parentes vero, filiolivix desiderantissimi, his auscultantibus, anceps potius remedium experiendum constituerunt, quam infantulum sine auxilio, etsi dubio, Libitinae absorbendum relinqueret. Facta ergo incisione, cum Chirurgus immisso in vulnus digito intestina in suum locum reponere anniteretur, tenente carne substantia, ipsi incumbente, eademque deprimente sinistra laborabat; infantulum mox vitalem aueam, quam vix haurerat, innumerare effundebat.

Aperto à morte corpusculo, ne vestigium quidem omenti conspicendum erat: Lien præterea exiguus admodum apparebat, intestina tenuia, rupta peritonæo, in umbilicum prolapsa & sphacelo corrupta: Hepar verò, quod continuum esse solet, nec in lobos, ut in quadrupedibus, divisum, in duos lobos profunde scissum erat, quorum altere in propulo loco, dextro scilicet hypochondrio, sub diaphragmate & costis notis conspiciebatur: altere vero extra peritonæum prolapsus, eadem adeo firmiter accrevet, ut novacula ab eo separari minime potuerit: Cætera laesa. *Fridericus Lassus observat. 30. lib. 2.*

Omphalocele ab ortu contracta.

Puella modo nata, tumorem immensum in umbilico propendentem secum in lucem attulit. Quem cum vocatus inspicere, deprehendi tenuia esse intestina per umbilicum prolapsa, globi magni instar convoluta, tenui membrana pellucida, qualis amnion foetum involvens existit, involta, in quam chorda umbilicalis desinebat, & vesica ampla humore plena adheret; infans cætera bene habitus erat. Cum autem intestina premendo reponere studeremus, videbantur nonnulli in abdominis cavum ex parte remeare; mox ramen rursus cum emicare egressi: Quæstio erat in vesica aperienda, digitoque immisso, foramen per quod egrediebantur investigandum esset, ut per illud intestina reponerentur: Verum quia mox postea intestina inflammata esse conspicebantur, atque infans stercorea eromens admodum debilis erat, nihil tentare voluimus.

Cum expirasset, atque abdomen aperiretur, intestina quæ exciderant, membrana amnio qua ambiebantur, adeo connexa invenimus, ut nulla ratione ab ea avelli potuerint.

An hoc sita in utero foetu existente & crescente intestina collocata semper fuerint, vel postea antequam naceretur præciderint, vel in partu, in dubio vocabatur. Ego prociديو antequam in lucem ederetur ex eo collegi, quod dum eum mater utero gestabat, ob excrementorum duritiem, conaribus magnis abdomen premere coacta fuit, & quod amnios membrana illi fuerit adnata: Potuisse autem foetum, dum utero inclusus calore matris fovetur, citra incommoda hoc perficere, quæ postea cum à matre separaretur, supervenerunt, eamque à medio sustulerunt, censui. *Plateri Observ. lib. 3. pag. 75.*

Hernia cystica, cui ex terrore juncta bubonocèle.

Herniam magis esse expansionem, aut extensionem peritonæi; quam rupturam, aut dilacerationem ejus, haud dubio, quin inter medicorum filios satis constat. Hic affectus nomen mutavit à contento; sic hernia dicitur intestinalis ab intestino in ea contento, & omentalis ab omento, &c. Non minus etiam cum vesica urinaria probatur in scrotum, hernia cystica dicenda foret, qualis mihi bis occurrit cum Andrea Boë Kelmanno Chirurgo expertissimo. Amplissimus vir, Dom. N. N. Mercator Amstelodamensis, ab aliquot annis in tantum mingendi difficultatem incidit, ut urinam reddere nequiverit, nisi manu scrotum elevando comprimeret. Retinuit hoc malum tamdiu, donec simul, mirum dictum in bubonocelen solo terrate incidere: Dolium enim ingruvini de improviso rumpebatur in ejus cella, unde ita obstruere præfens, ut illico in bubonocelen incidere. Id quod semel mihi adhuc observare contigit in alio, qui solo terrore subito huiusmodi factus erat, retulitque mihi supra citatus Chirurgus in hernia sanandis veratissimus, se se hoc quoque pluries observasse. Hæc igitur bubonocèle confixæ ægrum aliorum manus auxilium implorare, vocabatur ergo cum D. Bellangerio, Medicine Doctore eximio, And. Boëkelmanno, Petro de la Nou, & Petro Adiani filio, Chirurgis dexterrimis. Vetusnimen bubonocèle tam arcte complimebatur à tendinibus musculorum adductis, ut ulla nostrum opitulari ægro potuerit, ita ut brevi diem suum obiret. Multiplicis huius hernie apertionem concesserunt nobis consanguinei, in qua notavimus bubonocèle dissecta, intestini illi portionem inflammatam, & gangrenam (ut sæpius contingit) obstrictam, aperituramque (ut vulgo loquuntur) vel potius dilatationem adeo enilem ut arctum circa tendines musculorum abdominis, ut digiti petraenise vix potuerit; unde dicti intestini portio reponi nequebat. In scrotum posthæc trigim vesicam urinariam prolapsam offendimus. *Fridericus Hoffschii in Observationibus Anatomicis - Chirurgicis.*

Hernia intestinalis curata post mortem dissectio.

Cantot quidam quadragenarius, sæpius cantando in herniam intestinalem incidit, non absque dolore, præsertim inter cantandum. Chirurgus advocatus illum à cautelis abstinere jussit, & brachium inguinibus accommodare, quod sex annis gessit, interea temporis se curatum confessus. Post illud tempus, sex mensibus elapsis à pleuritide tollit.

Aperto cadavere invenit idem Chirurgus multum adips in eo loci ubi peritonæum fuisse dilatatum, & per quod intestina deorsum premebantur, ad magnitudinem pilæ. Adeps dilatationis ita erat accretus, ut nisi cum laceratione circumjacentium partium divelli quiveret.

Omnia ea quæ peritonæum nimis inrumpere cogunt, ad herniam procurandam animum præbent. Hernia nihil aliud sonat quam dilatio peritonæi, idque quovis in loco Brachio postea ita constitutum est, ut dilatatum concreverit; valcula ramen adiposa ob summam dilatationem tantam adips quantitatem in se collegerunt, ut locum inter

At 4 dilatatum

dilatatum repleverint: Stephanus Blancardus in *Anatomia Præliæ*.

Bubonocœle Ileosæ.

Puerum crassi quadrimum, diu torminosum, acriter febricitantem & interdia triotique ejulantem, necnon susque deque omnia rejicientem alimenta, excrementa, remedia. Quarto die extinctus est. In linguae dextro ileon reperi ab agryta *bubonocœle curanda specie*, scuto ita compressum ut gangrena & sphacelo fuerit occupatum. *E. Collegii Clarissimi Caroli Drasinensis.*

Epiplocele mira.

Puero salu inguen sinistrum intramissi. Judicatum est, *ileon* eo delapsum, Retrusum & contentum. Sed rursus ludibundo puero caribus & saluta non minus Inguen, sed & scrotum rursus evasis. Primis mensibus terulum est denuo epiploon suas in sedes & scuto firmatum. Tandem neglectum est ligamen, specie curati morbi. Verum interjecto tempore præparato tumor majorem in molem surrexit, sed quoniam indolens, in cura fuit nulla per menses plorimus. Tandem vero tumor inguinalis dolorem peperit, & ad ligamen pilus impulit. At industria nulla prior aritex omentum expellere potuit. Nihil igitur admodum, sed res narure commissa. Puer interim & adolevit & virilitatem attingit. Is vero febre synocha puti cadaver evasis, in quo summa cum volupate omentum dextra iura scrotum rursus erythroides penitus accretum fibrillis scilicet velud hederaceis in illam tunicam penitus infixis, singulas autem omentum arterias atque venas non modo crassiores detexit, sed elongatas omnino & per modum vegetationis intra scrotum ita radicans, ut non nisi filamentis disruptis illud è crypta sua in appetam locum protrahere valuerim. Quid miri igitur omentum istud reduci non potuisse. *Ex eisdem Collegiis.*

Enteromphalocœle feminina virilisque.

Mulier ætæ 35. annor. in laborioso partu ob spiritus contentionem laxatus est umbilici circulus, & ileon leviter enripit. Retrusum est primò facile & contentum per aliquot annos, sed deinceps conamine quodam alius protulit ileon, nec amplius ita regressum, ut antea. Mansit ergo tumor, primis quidem mensibus æstivis indolens, sed autumnò & hyeme sævus, præsertim horeæ flante. Deinde autem, non ad unius horeæ statum, sed ad quovis limitem dolor repungebat acutior & acutior, donec tandem intersticio chylo tam enormiter repleverit, ut nec remediis cessaret. Toto denum ambita livescens, febris, vomitus, convulsio, sudor frigidus & syncope ægram de medio sustulerunt. Repertum est ileon duplicatum laqueo veluti constructum intra umbilicalem annulum, livens omnino & sanie olida fluxum.

Id ipsum in Causidico sexagenario vidi qui ventriculosi admodum erat, & per multos annos tumorem illum levi scuto compresserat isdemina. Sed venit tandem suprema dies qua umbilicus dicitur torrens est, donec accedente sphacelo febrilis indolemia superveniret cum animi deliquis, sudoribus frigidis & ipsa morte vomitum occupante, aliis in proclitu uri paratis è nausea & singultibus. *Ex eisdem Collegiis.*

De Sarcocœle & Hydrocœle quadam rursus ex eisdem Collegiis.

Lucipetas extor barbionofotes qui satcomati testiculorum hydragryosin adhibent, quæ loculos emungit, sed de causa conjuncta nihil demit, imò majas exinde & dolentius futeatam vidi saccomas;

In Hydrocœle; tunica inter erythroidem atque testicularem nervacem, setacum notavi quæ longe ad recensum morbi arcendam quàm simplex paracœtesis. In Physocœle autem quam in recens tatis millies vidi, neutrum convenit, sed cataplasmata admodum è rosæ rubis, balanitis, caphura & salis armoniaci tantillo.

Anatome Mulieris Omphalocœle prægrandi, defunctæ.

Clariss. Iob. Henrici Hottingeri. Miscell. Curios. Decur. iij. Ann. 9. & 10. p. 410.

Mulier triginta sex annos nata, à matrimonio contracto pluribus infestata erat morbis, Febrium acutam, Pleuritidis vera altero subsequente anno excipiebat: quas tamen feliciter superabat. Puerperium primum, in coque parum laboriosissimum pressio, ut alunt pede, Umbilici ad pœm majoris magnitudinem protrudenda sequebatur, Paupertula, tam ob rem angustam quàm etiam malum haud adeo incommodum relictis ac neglectis. Alterum puerperium nec minus laboriosum ac diu retinens, quod annis ab hinc duobus erat, protuberantiam mirum in modum auxit, ut globum majoris molis superaret, sen si diametrum ipsius considerasses, pedem vel ultra adæquasset. Reddita hinc ad omnia officia petagenda in idonea, emacata, anhelosa ac hectica; Sumptibus ulterius parere studens, ex linteis, sed minus dextrè confecit subligaculum, non tamen intestina la locum suum naturalem recipere valuit. Anno plus hoc contenta, symptomata modò recensita magis increbuerunt, appetitum amisit, sitis acerbit, calidos cibos rejecit, frigidis autem in deliciis habuit; Statu miserrimo constituta, malo quosidie magis ingravescente, Opem Chirurgi alicujus experti effugitate coacta est. Subvenit ipsi statim Emplastro ac subligaculo accommodato, intestina reducere dno, sed frustra laboravit. Levamen hinc haud leve se percipere, ob pondus non amplius ita grave dependens, assensuit. Ob diariam verò minus convenientem (cum enim Lacti & Lacticiis frigidis nimis indulgeret, frigidam pro siti salenda copiose, ingurgitasset, &c.) omnia in pejus ruabant, lincianonibus ac torminibus abdominis vexabatur, clinica & lecto affixa per duorum mensium decursum permanebat, tandem à doctoribus exercitata nostra è vita discessit. Subsequente die defunctæ cadaver perustivimus, tumorem aliquo modo subsidentem deprehendimus, Cum crudiatur pro more inciam separavimus, Aponeuroses Musculorum oblique descendentes crassas valde extensas, ipsos verò Musculos planè depressos & in Hypochondriis residentes observavimus: Recti verò mirum! ita expansi & totum abdomen obducentes, duas ferè palmas latitudine trisque superabant, separati verò ordinario non meniebantur. Ceteri Musculi Abdominis, ut obliqui descendentes, corrugati, minutique conspici in

Hypochondriis debebant. Peritonæum cutis exterioræ crassitiem & densitatem æmulans lecatu difficile, apertum, intermè intestina firmiter adnexa tenebat, liveſcebat grandinibus copioſiſſima, quaſi glandulis duris ſchitroſis piſum aſtequantibus conſperſum apparebat: Onenſi nulla ampliùs veſtigia aderant: Omnia inteſtina tenuia, æquè ac cralla abdominis parietibus adnexa erant. Ventriculus, Hepar, Lien ac Renes ſimilibus grandinosis proliſibus circumdata conſpiciebantur: Cæterum in Hepatis, Lienis, Renumque parenchymatibus, interiorum ſporum ſubſtantiam concernentibus, nihil deſideravimus. Uterum, qui humoris caſeoſi quaſi micam condebat, valde potum & coarctatum, ovaria in utroque latere ipſi appenſa putrilaginosa, bis cum ſeparabant: Veſica urinaria conſerta, omni lorio depauperata erat, ceu quæ aliquot ante ipſius obitum dies, nectam abſque ulla perceptione de ſe miſit. In thorace, veteris Pleuritidis umbram invenimus, Pulmones parvo, ſinſtro latere accretos, pleoramque materia quendam cartilagini haud abſimilia veſtebat, ejuſdemque lateris lobus in putredinem inturebat, Alter etiam ab aliqua labe infectus, à priore tamen diſcrepat. Peticardium poſita corium durum, quam membranam recentem credidiſſes, pulmonibus agglutinatum, uti & cordi aſſectum hærebat, ac carceri quaſi auguſto ita arctè cor detinebatur, ut ab eo ſcalpello manu ſuſpenſa carne quamvis abſque ipſius ſubſtantie læſione ſeparari ac avelli nequiverit, neve guttam quidem liquoris continebat. Cor flaccidum planè molle, ac vel ſolis digitis facile diſcepti poruillet, in utroque ventriculo molleculas polypotas reſecondat.

HERPES

, Vid.

COTIS VITIA.

HORDEOLUM.

Vid.

PALPERRARUM AFFECTUS.

HYDATIDES.

De Hydatidibus ſerſan hic in ſpecie non ageremus, ni de Doctiſſimi Leſſeris utilitate crederemus, Exercitationem Anatomico-Chirurgicam quam in hoc argumentò conſcripſit Clariff. Godtfridus Bidloo; ſaltem jam tradere: qua hæc eſt.

Lymphaticorum, qui, cum ortu, diſpoſitionem viciniquè cum partibus, negotium eorumque cum myriadibus, uſum obſervavit, inſectis non libet, vaſa hæc, in magnam Reipublicæ Medicæ commodum, ab celebrandis omni veneratione eorum deſectoribus, memoriæ typis tabuliſque tradita eleganter abundanterque, ut totum perſcrutant corpus (quod, docti ligato thoracico in genere; lienia omni conſtricto vaſorum apparatu, ante eorum in ejus molem in- et egreſſum, in ſpecie liquet) ita ubique locorum, tam reſpectu ipſius machinæ liquoris in ea contenti, cum illorum officiis, agri- tudinibus ſymptomatiſque ſubjici quæ plurimis concedetque multum nos; ſi non omne id, quod nobis de eorum revera tunoteſci ſtructura, hujus & ſuperioris ſeculi debet diligentiæ affirmabique tamen necum, retum ſi fuerit arbitet æquus, de

eorum morbia, machinam ſive, ſive contenta hominiquè reſpiciat uſum, oondum eſſe diſtinctum diſtinctè; exemplo ſine de aquoſorum (quod aſunt) tumorum, hæc vaſa reſpicientium genere Hydatides & cum iſis cæteræ partium diſtentiones; harum enim de originatione, progreſſu coeſcentiquè liquidi diſpoſitione ejuſque ab ſtata naturali mutatione, ea ſententiarum eſt varietas & conſuſa doctrina; ut de iſa diſcretè utile mihi videatur & neceſſum maxime.

Vaſorum lymphaticorum, perſpectam Erymologiam hiſtoriamque lectoribus benivolis aſſertraque (ut pinguedine turgere hydatides & quæ poſſe de iſa hallucinata eſt veterum Medico-Chirurgorum ſchola) jam dudum eſſe & abundè reſutata; ne quod dictum ſit prius & ſaris, dicam iterum, ſupponens, contendo; Hydatidum multiplex; ſed v. r. diſtinctu facile, eſſe genus.

Primum, ex dilatata, inter valvulas, vaſis intercapedine, quæ diſtentione, vaſe obſtucto ſuperius, pro liquidi contenti majore, vel minore ex glandulis imperi, citò, vel tardè abſolvitur.

Diſtentionem hanc valvulas inter; non autem in earum ſecti regione, demonſtro ipſis ex vaſis diſpoſitione, ſive ſtructura; valvularum enim latera hoc vinculo; ut ab ſeſe invicem recedant nimium, eo onantur loci atque hoc modo, diſtentioni deſſi opportunitas.

Secundò; eſſi lymphaductus, in genere, ab anguſto in anguſtum tubum propagentur abeantque; multis attamen, inter valvulas, locis, variis obtineat, reſpectu latitudinis, diſenſiones ipſarumque valvulæ, varia, reſpectu longitudinis, diſtentione, ab ſeſe invicem diſtant; ut Mercurio, aliove, ipſis inſundendo liquido, apparet liquidè; quinimò pondere, aut vi inſuſionis, quocunque eruperit loco Mercurius, aut aliud ipſi inſuſum liquidum, nunquam è regione valvularum vaſorum latera franguntur.

Obſtrui & quo modo, vaſa lymphatica, annuitor demonſtrare ſchematicis iuſtra propoſitis. Primò, loco, quo vaſa lymphatici latera, præter ordinem, extenduntur, eo loci excitari quandoque obſtrictionem, ipſis patet, cum in vivis, tum demortuis animalibus; digito quippe eo loci, vicinæ partes tumentes, indurata & ab obſtrictionis termino hydatides de majoribus in minores abeantes, explorari ſuot faciles. Illæ ſim exemplo, quæ in labiis, palpebris aliſque tenuioribus quatuor involuſorum toti corpori communium, velamenta ornatis partibus, obſervantur. Hæ obſtrictiones in vaſorum ſi accidunt, mox ab glandulis, egreſſo, digito explorari non poterunt cruraque parvi momenti; vas etenim hoc uſu jam nunc deſtitutum, evaneſcit ſuperius, id eſt, oculum fugit & ut multa vaſa, in formam membranaceæ ſtrix ligamentive obliterat, deſteſcit; ſi ſo parte, ab glandulis remotiore, ipſa cum concreti inſipiaſique liquidi maſſa hydatidumque ſerie (ut ſupra) erabane demonſtrabiles.

Secundò; ſi volueris, ulceriſve cicatrice, vas hoc interceptatur obſteturque, aut membrana, cui inhæret (ſunt enim membrana, quorūque & quo ſine loco, ſingule & omnes, tendine) convulſione alibi locorum conſtringatur, vel ipſum vas ab viciis hoc, illove loco, cum in modum, comprimatur partibus, ut muneris obeundo par omnibus, vel parietum coaleſcentiæ officio deſtituatur, excitati neceſſariò vaſa interioris partis diſtentionem formati, que hydatides, nemo oegaverit Phyſico-Chirurgia.

Iade

Inde patet; fungente; cum artetis, glandula suo munere, debere primò; interapedines prædictas inter valvulas, oburationis terminio proximæ, deinde & exteras extendi, mutarique vasis, hæc paræ, longitudinem, principio in ovalem, posteaque plus minuse rotundorem figuram.

Cum autem vasa hæc variam patientur, respectu latitudinis, ut & distantie ab se invicem, vulvarum dimensionem; quinimò eorum corpus substantiâ, fabricæ ubique locorum ejusdem non sit firmitatis, duritiæ, mollietis, tensilitatis &c. fit, ut hæc hydatides quoque magnitudine, figurâ, duritiæ, tensilitate &c. differant.

Secundum hydatidum genus istis nascitur locis glandosis, in quibus arterie finem venæque initium statuo, utriusque ab sanguine separata materia vasque initium ducunt lymphaticæ.

Hujus generis ortus progressusque hi videntur. Liquidum in corporis incrementum ab sanguine segregatum in partes, quibus erat destinatum, ægritudine, sive mala dispositione, correptas, non transiens, sive non oppositum, extendit tractu temporis, (arteriâ huic parti propriâ laricem continuo effundente suam vasique recipientibus venosis reducendum sanguinem) ista loca & quoniam illa circumseptione non casent, formam manupæque obtinent glandulæ, extruitur sacculus membranaceus immorquetur hic, qui non raro multas, primi generis, complicatur hydatides, adeoque tandem incrassatur, ut dimidii digiti quandoque superet latitudinem, membranas autem ægritudine accedentium, ut & contentorum liquidorum, correptas, mole angere semper, verum, quàm quod verissimum est. Huic hydatidum eorum sanguifera inhaerent vasa copiosa, imò & in parte tumoris interiori conspicienda, quæ in primo genere, ut plurimum, via deteguntur.

Datum horum generum tumorum quamvis plurima mihi sint exempla, unum tamen lissimum; sed utrumque comprehendens genus, referre astrictaque mea quoque commostrarè prædictæ deque curatione, juxta animi mei religionem, operæ pretium credidi, agere oportere.

Morere autem mihi liceat in anecessum, Primò hæc & similes hydatides non curari, nisi chiurgicè, id est, comprimendo, deligando, extirpando scalpello, fornice, igne; resecio enim, ni fallor, jure merito de inspellectile instrumentorum, hoc in morbo, acum aream cum ferrea. Secundò; causticis (potentialibus ut vocant) nihil effici turdè; è contrario, digito, quæ explorati possunt hydatides, instrumentis prædictis tractaturque cujuscumque sint magnitudinis, loci, aut figuræ, ullo sine vitæ discrimine austerique probè. Tertiò; glandosa obidentes viscera hydatides, puta hepar, llorem &c. curari nunquam. Exemplum mea indigitatum, hoc est.

Anno 1699. Octobris 11. post itetatis tumoris uniformis, uni coloris, durioris, parvi doloris, magni tamen oneris: erat enim spicamæ dimensionis, ab atriæ regione usque in posticam superioris scapulae dextræ costensi partem, inspectione atque cum celeb. medico van Leeuwen, dexterrim. chirurgo van Eyk & Kock, consultatio, abstinui, Rureladam, viro mercatori, sacculo van Helmont, statua procetiorè & tobulâ, annorum 32. hamero ipsi jam ab sex annis impostam fasciam, hac methodo.

Diffecui, linea, tumoris parte mediâ, perpendiculari, etia generaliora corporis, manu mea ebi-

turgique van Eyk elevata de tumore velam nâ; vetum eo non prodente, membranâ maulicoriam, totâ systemati universalem perforavi; sed neque de nunc in conspectum assurgente, maulicum trapezium, parte qua ab collis vertebrarum spinis decendit, findere non desisti, obliquè hoc modò pectus recedentibus hæc fibris morticibus vetis tendinum alligaciones; erumpi: mox tumor, qui, dum cum digito liberum ab vicinis sistere molior partibus, ea rumpitur vltus ego & adstantes (inter quos quidam Med. Audiolii) ejus laticè conspigeretur computrareturque foddè; eo partim capillo, immisso vulnèrî digito expetiorque intus monstra ali, tumores, nempe, latitare intus varios; compri-mo itaque cloacæ ima, profundius illic varis magnitudinis, figuræ & distantionis tumores, quidamfoli, quidam connei inter se invicem, quidam pellucidi, quidam opaci, ad numerum 36. & plures (abstulerat enim mox clanculum discipulus chiturgos quosdam, quorum octo mihi postea tradidit) hæc sepositis, arripio, cui infasati erant separatque de vicinis partibus, multa non sine molestia sanguinisque effusione, sacculum impleoque hiantis magnique vulnèris cavam, capto gyro conspecto propicioque laceribus labilius compressis, ligatis, verbo chirurgicè. Perlustrato res quaterve postea vulpèris statû, committo ejus curationem, cum medico, chirurgo, qui cû diligentia eaque felicitate tem peregit, ut intra quatuor septimanas domo eiecit; «Davâ autem integerrimè existerit curatus, fruens in hoc uique momentum, ut hujus anni 1700. septimo Martii mensis, mihi tabellis primò; deinde suis præsentia significavit gratulabundus, valetudine prospera.

Concatenatæ hydatides pondere moleque minores, aut moru non agitate violenter sacculo p mediò; aut parti, in qua cæcitantur, manent affixæ.

Si verò, tractu temporis, pondus & moles ingravescat, aut moru agitentur violentior, prædictum in sacculum, aut partes inter vicinas, ratione majoris, aut minoris configitatis, mollietis &c. cedentes, loca quærent huncque erantque & huncque hydatides plus, minuique pendulæ. (1)

Quod si pondus, moles & violentior morus ingravescat ulterius, decidunt in prædictum sacculum, aut partes inter vicinas, quibus recedere facta est opportunitas aique hoc casu non, aut multæ sunt; sed sine sacculo & liquore cui innatent, hydatides decidunt. (2)

Quod si excident in partibus, cavitate donatis; quibus quidam de corpore rejiciuntur. (3) quoniam nonnuncupanda rejicienda, videlicet, virtute machinæ corporis, aut medicæ; raro chirurgicè.

Trium harum specierum recitaturus exempla, non possum in anecessum non narrare, quid Amsteladami, simili cum Helmonti tumore acciderit.

Similem cum, forte fortuna, ante aliquot annos, aperuisset tumorem Amsteladami, medicaster quidam Valenryn, perhasit agere, ea incantatione malum hoc trasilis originem, credulam mox spargit in vulgum fabulæ tumor impostorque lucipeta, famæ quoque inhians, pendulas deciduasque hæc hydatides ei pro ovis obtrudit, cû quidem impudenti & aniri fumatæ, ut, non agra, ut non vulgus tantum; sed & non infectoris sublell cives (raro quidam medicastros lipposque aliosque imperitos, sed mortibus

alias specabiles viros) de tramite rationis prudentiæ & pietatis seducterentur figmentisque fidem adhiberent ipsæque ego (fotes enim ipſius populi nocte dieque retum novarum cupidi obſidebar agmen) interumpere vix poterim poſteaſque fuerim expertus, eorum multos in hoc uſque momentum, credulitatis huius, ne dixerim fidei, ſervare reliquias & ſignata.

Hæc teſero, ut tyrones medico-chirurgi, dum aſtu quid opus ſit, ſimul & diſcaut reſiſtere præjudiciis, fallaciis impoſitoribusque, quorum ruſta medicinarum chiturgiarumque, pro viribus ſuis laceſſere, deprinere, perdere deſiſteret nunguam.

Primo in membranis quæ naſcuntur hydatides, velleculæ exſtunt depreſſæ, vel ſunt pendulæ rariſſe, aut citius, magno, aut parvo pedunculo, pro minore, vel majore ſucci lymphatici in eas imperu, aut minore, vel majore tenacitate, vel denſitate ipſius, cui aſſignatur, membranz. Maſus exemplum, ut minima & ab aliis recitata, taceam, vidi ante aliquot annos Amſtelædami, cum famigeratiſſi Medic. Egb. Veen, in cadavere uxoris ſuoræ, una quæ hydatidis pendula (nulla quippe alia et erat infecta) ovario alligata dextro, libræa capicbat liquidi noo fuerentis; ſed tubiduli et, ea cum ventris diſtentione inferioris, ut impregnaram juraſſes & non ſine veritſimilitudine, quoniam antea trium liberorum extiterat mater, annoſque ultra 37. non numeratſet.

Huic obſervationi non imparem videat leſt. beniv. quoque apud alios, quibus hæc hydatides, placentz glandulæ miniſſimæ videntur, cum probatur ſit facile, eas lymphaticorum ſyſtemati ſuam debere originem.

Secundò, deciduas hydatides, fornicatum ovis ſimiliſſimas, in hepate, multo, variis locis, pure turgente, atque hoc modo locum ipſis in eo latente cedente, quatuor aere annos, auditoribus meis demonſtravi in noſocomio.

Tertiò, reſiſcendarum hydatidum (preſtitz clafſis ſpeciem) æceros in naſo, ſtomacho, inteſtino, utero, veſica &c. locia excretioni cuidam aptis naſis, derepi multoties.

Hæc reſiſcendæ hydatides, vel ſi malueris, deſectæ jam nunc per aum, quæ in corpore ſtactæ quandoque cum iotmetriſ membranis gluten album albumenque exprimunt ovorum multaque quandoque expelluntur ad libræ.

Quærat quæſpam, non immeritò, quid obſtet, quo minus tenetæ hydatides tumoreſque decidui non frangantur ſacientque inter & in aliis partes non effundant ſuum, multo vicinarum partium motu & alligone agitatæ ſemper?

Reſpondeo: Primo; hydatidum membranas, morbo correptas, nempe, denſiores fieri tenſilioręſque, atque contentum in iſis liquidum, purum, purum diu poſſe reſiſtere motui, mutationi putredini atque proinde non frangi ſemper.

Secundò; fieri & accidere illud ſæpius, medicis, vel chiturgis id non obſervantibus indeque varios latentes (reſpectu commiſſendorum, cum bocce vicinarum partium liquorum) forma ſub varia varioque ſub; ſed non vero nomine, nunc medicis, nunc chiturgis, nunc & virtute organorum, quæ occupant, de corpore eliminari.

De hydatidum poſſe figura nemini non conſtat, tam; videlicet, ut platiſſimum eſſe rotundam, vel ſphæricam; ſed vero ratione ipſius vaſis lymphatici inter valvulas varia dimenſione (vide pag. 12. lin. 5. 6. 7. 8.) quandoque & debere eſſe

variâ, verum globola, ex parte, ſemper.

Eſt & aliud hydatidum (tertium) genus, cognitum appetimè dignum, labiis internè icorbuſcorum familiaris morbus: invadit illa ex albo, nempe, livida, ſine dolore, quantocyus ſcæſcens, albescens ulceſque formam ſingens indeniſque depreſſum tuberculum, quod, ſi memoranda mox exceptis methodo, cum labiis genas cumque hiſce oſia g. ngrana, ſphacelus, carie contampt & non raro homini vitam adſumit.

Eſt principium huius mali partemque primò ſectam, loci in quo nutritionis negotium abſolvitur, lymphaticorum vaſorum, cum levi eorum eminentia; ex hiſce liquet phenomenon.

Primò; priuſquam, hoc tuberculum, vel ejus generis quædam apparent, ruget languido ſonolentoque homini in genere facies, in ſpecie labium, vultum reſpuentem alvumque non deponenti, torpent artus omnique totique deſt corpori vigor.

Secundò; tuberculum hoc nunquam in puſtula formam, tubidine conſeſſam, ſequenti quod in claſſe plus, minusve pro corporum diſpoſitione, obſervatur, aſurgit; ſed ab apparitionis tempore brevi ſcæſcens, intra biduum ulcuſculi impoſiti, in fundo albefeſcentis, cum labiis duris, obinet faciem. Fundo petraſo liquidi aliquid; ſanguinis vetò, niſi profundius et intraſcutis ſcapellum, emittitur nihil.

Si unquam, jam nunc res agitur magna, chiturgio petraſtanda; ſed conſeſſum; quod ſi etenim moras neſſitaverit, peragenda procraftinaverit, egerit impudenti; totam itaque hanc, imò & vicinas petundat, convulſerit partes, uſque dum ſanguinis puri, poti inſignior deſtatur copia, crebris ſcapellæ ſcibibus (ſcatificationibus dicunt) ſilcerque variis cyprini ſolutione, repetatur hunc ædum bis, vel ter ea die agarque, reſpectu totius corporis, temodiſ volatilibus medicis: crudeſcente jam oanc parte affecta, inſicit et chelidoni ſuci ſacchari, vel ejus nominis mel, largam portionem genique maxillæque inferiori ſapiliſſimè irradantur ex herbis ſeminibusque fragrantibus &c. forum; caveat aurem ſibi, ne hoc tempotis morbiſque ſtatu ſpiritus maris vini; ejus enim inſperſione ulcuſculi, vel aperte hydatidis, cum fundo, margine indurancur: abſtineat quoque mirra, aloë, &c.

Hæc ſervavi methodo, Deo adjutore i Nobiliſſ. Juvenem annorum tum tempotis vix quinque, hoc jam tempore, noſtro in Athenæo Themidem venerantem, in quo hic morbus deretent, ſed eſt, duorum dierum ſpatio, ab aciculæ capitis magnitudinis tuberculo, ad digiti latitudinis circulum inferiori in labio ſcapatium divagantemque vidimus.

Curavi hoc modo, haud ita pridem, Amſtelædami, poſtquam ſexto, aut ſeptimo ab morbi initio die, eum deſcervat, ut moris caudidatam, chiturgos, paſterum 8. annor. Judem: curavi, inquam; ſed non ſine ſiniſtri totius oſſis proprie dicti, maxillæ ſuperſtoris ablatione, quod in rei exemplum poſſideo; ſed non tridem eo in ſtatu morbi, ſtentibus, nempe, ſquallentibusque partibus mollioribus oſſique nigricante, ſine ſpir. vin. ſug. ſuſt. Felic. Worraſ iterata cebererrimæ inſpectione, quod mirabere (leſt. beniv.) tota quanta, tanto, quæ juveni jam nunc de vulnere relicta, vix hoſus appoſiti circuli circumſerentia, parva cum faciei deformitate, cicatrix eſt.

Majoris momenti poterit videri tertium, quod ſequitur

sequitur, exemplum; pulmaris hac in curatione Amstelredamensis medico-chirurgus eo tempore habui consultores adiutoresque, habeoque & hoc tempore rei gelæ testes.

Filius factoris annos agens circiter novem, Amstelredami hoc morbo adeo corripiebatur violentius ut quarto, aut quinto die, livido fœtenteque ex ulcuscule, totum scet inferius viâ erraret destitutum labium. Prestabam, quod potis eram, medicamentis incisionibusque leviusculis (scarificariis) sed sine fruge. Hoc in casu dubio; si unquam, chirurgico ausu (absit præstantia) fortice partes tesiculæ correptas atque elatiles, mediis vulgariis, obduli facili. Inter curandum autem observabam, deficiente labio, parte maxima, salivâ madere conspicuante pueri pectus de die in diem fœdus; ita ut bractei tandem capsulâ, mento appensâ, eam recipere adigeretur usque ipsi tingens, nobilioris in artibus dedecus, ab me factum videretur; ut non sine indignatione operationis meæ censores & post idem cum piscatore sapientes omnothere quidam medici & chirurgi increpitabant: hoc, etsi stomacho vix statid illo valebam; concoquere tamen non valebam: aliud propterea quid aggrediebat audebamque, cultello, nempe, myristicini, quod in mento labii reliquum erat, ab cohererentis resolvi uniusque cum angulis superioris labii sinuâ intercepti confirmarique solidâ: en itaque felix calamitopham liberati enim puerum memoratis ab mollissimâ eo quoque usque, ut applaudendo criticis meis erraret exemplis.

In cætera hoc grassari morbi genus vehementer, autumnali præsertim tempore regionibus (sub jove frigido, prætermittendum hic non videtur, ut & prædicto pede curari sitit.

Hic enarratis perceptum concessique facilitatem etiam cogitata rationeque, quare hunc morbum, genus speciemque dixerim hydatidum sphaelumque sit aliam aliterque constituerim, quam ceteris corporis partibus; Ut rem extra omne dubitatio, collocem aleam, audi (lector: beniv.) multa, quæ doceant propoliti veritatem ulterius: unicuique pari corporis, pro sua dispositione, esse específicos morbos, in consilio apud omnes est: ex: gr: arteria, vena, nervus &c. ex morbo an labore? phenomena indignant specificis, nulli alteri parti tribuenda. Sic in hoc morbo quæcunque apparet, virtutis lymphaticorumque spectant, cum partis vesiculari elevatione, ut supra & ex ipsa jam liquet curatione, organum.

Mocenatur autem, hoc morbo affectu partes citius, alio quidem quidem aliz sphaelo corripiente; qui partes hæ in antecellum, stagnante liquido nutritio, partim in organo secretionis partimque in lymphaticis (sanguinis proinde quoque munere destituti valis) jam nunc intrusâ in eam, ad sphaelum sunt dispositæ proximæ; cum in alias partes, puta carnem, vasa sanguifera, glandulas &c. prævia non sine & in partibus vicinis perseverante inflammatione, sphaelum agar eique viralis mobilitate resistat later sanguineus: esse & sphaelum, ratione dispositionis partium, varium, in nervorum cætu patet dissimile: nervus quippe inferius, pone in manu sphaelo exceptus, separatur, vicinis conservatis partibus, atque quandoque in ipsam axillam; hic verò arteriaque venaque &c. conservantur sphaelo in totum corrupto muculo eis adherente quàm proximè.

Ut autem in hoc morbi genere nutritionis lymphaticorumque cum contentis organum & vasa destitu-

untur munere, sanguifera illaque cum iis perduntur; ita in frequenti genere lymphatica per sanguifera perduntur.

Sed vide (lect: beniv.) hunc affectum ne cum ulcere vitulento, cuticollo, atropente, neque cum ulcere in genere, quod Græci *phala* dixerit, confundas: omnia enim illa ulcera alia principia, alios progressus, alia phenomena aliamque obtruncat curationem, de quibus singularim dicere minus dissertationis, nec pagellæ est: ne autem de verbis his & in verbis veritari hæc videtur doctrina concedo facile, lymphatica in hoc morbo, cum organo secretionis succi nutritii, sphaelo verari sui generis i. e. ab omni sphaelo distinguendo & hac dicendi nuncupandæ methodo posse renuntiare, hunc morbum esse lymphaticorum & nutritionis organi sphaelum: esto, modo phenomena descripta curatio sequatur præscripta, juxta rationem, semper, sufficiat. Quare autem hanc lymphaticorum affectum ad hydatidum quoddam retulerim genus, monui supra repetitoque verbo; quia in eo morbo ab initio vas lymphaticum organumque secretionis succi nutritii naret.

Ubi arteriæ & venæ, laice nutritio in partes detraho lymphaticorum radices, paululum ab eorum glandulo de organo (supra descripto) progressu, extra impliant, inticant, obambulant, adeo; ut munere suo debite fungi nequeant, nascitur tumor hydatidico-sarcomatæus, id est, in quo sanguiferis luxuriantibus, lymphatica optinuerunt citissimè eorumque limpidis latex parum, in initio, postea verò nihil augetur: exus itaque sarcomatis ex livido rubentis, intrusâ verò hydatidis, latente, retinens primam, præbet faciem.

Hoc tumorum genus, labus geritque frequens, vulgò cancerum; sed malè, vocant; cancer quippe glandulatum conglomeratum, non verò lymphaticorum morbus est.

Huiusmodi tumorum, memorie mandanda plurima suppeditavit exempla, præis mihi mea chirurgica; præprimis in vitro publicano, Annorum a6, aut a7. cui inferius labii hic tumoribus usque adeo intrinsecebat, claudi, ut nullo poteris modo, botrendo adpectu nodi profluerent dentes salivæque de ore, cum dolore fluerent acerbior continuo. Multis incassum ab alijs adhibitis remedijs, mihi tandem, de vita jam quasi desperans, curationem commisit, quam scalpelli torficisq; ope aspicio; quam autem operationem, nisi post integre horæ intervallum multasque ægri vociferationes, absolvo. Horum tuberculorum, variz magnitudinis, quædam ræmixta coherentia (femina cancer vocant) sua vice, quædam verò singularim, ad insignem numerum, multis sectione atque incisione ausuro: omnium maximus tumor, dimensionem nucis avellanz non excedbat; multitudine, non autem magnitudine, conspicui extant. Hænorrhagiam testinguo spongijs, gyro auxiliantique juvenis digito, capro obvolvo, vulnera vasa comprimentis. Peractis negotio omnique singulorum deposito tuberculo, vulneribus lacerationibusque prospicio chirurgicè. Sequenti die, apparatu amovio, pendulum video & quâsi sine morbo & vita labium; videt lentique illud & æget, heu! quibus me, impatiens itæ dixerim, an tuoris, non lacertæ scinditque dicitur & fœomatibusque! ut me criminat incitit, crudelitatis &c. contumeliosè. Sed expedio rem: curatur; notissimis ex melle spiritibus viis remedijs labiumque spiritus & machinisque ex chara, liguo, linteo, olio, pro re nata, confectis insulsum, corrugatur; ita ut, quod parulum invitus naper, jam nunc, si velis, oculum habeat os.

Non

Non possum satis mirari, Clariss. Sollingium, vtrum mihi amicitia quondam conjunctum, cap. 36. Operat. Chirurg. de Laville, *forsem* & hac in operatione nullius, acum vero vultus esse usus hæmorrhagiamque cauterio extare deprimentum actuali. Crediderim ipsi, veteres, hac in parte, imò & nominis hujus morbi respectu, sequenti, veram non innovasse hujus tumoris dispositionem, nec extirpationis methodum, ab qua tamen tota & omnis dependet rei exitus; videlicet, labium pollicis & digito indice ad ejus extima ora simillimè arrepto, invetrendum exteriorum & nunquam, nisi re peractâ plenè, dimittendum; quinimò quemcumque avulserit tumorem, eum auferendum per alium, cui & sanguinis repletio, ut supra, commendanda. Si æger lassus tunc digitos remittere cogitis, fac genia istius lateris labiumque detegas, perinilites exploretque, an tumoris quid, quod omiseris, transierit, reperiatne & pergas eodem, quo incepisti, modo. Post curationem labium illud tene cum superiore (& hoc vice versa, in superiore si sit) quantum mole differt, interiori solummodo conjungitur clauditorque, eminenti atque propendente labiorum altero.

Hicce anatomicè perillustras tumores, eorum, ut supra innui, detexi dispositionem, fabricam, texturam; esse, nempe, hydratides sui generis, babbentes, cum tumore *mora*, committente nihil: quod mor tumores difflectit ad oculum pariter liquidus in *mora* intus eum nihil, hinc verò in tumoribus pellicula incus durior obvelat liquidus purior, vel post longum tempus intervallum, tenacioris multum; purior tamen, ut hoc obiter moneam, formam induens, nunquam.

Ne postremò vobis (Tyrones medico-chirurgi: quibuldam enim imposuerunt) similitudine cum prædicto alitque impostant morbis, qui pessima ex confusione, ita, aut futuro, ab dentium compressione in labia, exstruuntur tumores, hæc vobis animadvertenda.

Primò; hocce tumoris livescere, dolere, extorberet post ædum mor; sed secundo; pallefcere, non dolere, livescere itidem mor curatque brevi, ahibita, tertio (demibz carpo obvolutis, ne de novo inter se se collidantur eundemque compaissant locum) spiritui vini *rapido diluto*, parti affecta ipsique labio exteriori *defens.* Fige, quod si avolsi quid vix labio cohercat, forfice auferendum illud vulnereque primò; *aq. libarg.* deinde *mel* inspergendum *rosaceum*.

Quamvis (lector beniv.) hac exercitatione de generali specificque Hydrope tumoribusque symptomatibusque chyli limphaque organa potè dispiciantibus; diurni nata mihi proba factaque videatur opportunitas, subsisto (affinitate etenim non fecta, cum hisce & alia conjuncta incendant tumorum genera, longum quorum dimittetis syra, non negligam impostum) ne ab scopo, mihi hoc temporis momento proposito, avettar, quàm oportet, longius.

HYDROCELE *Nid. HERNIA*

HYDROCEPHALUS.

Hydrocephalus Aquosum Capitis Apostema, seu aquositas gaz in Capite repetitur dici consuevit.

Eibl. Chirurg. Tom. 11.

„Congregatur autem interdum, inquit Maraudus „Epistol. Med. lib. 7. Epist. 2. in capitis præter „ita punctum aqua in medio auriculis, aut pe- „riculis, aut hujus & ossis, quam *idempasidæ* „Graeci vocant. Pariter Galeosus Aquam in capite „exta cranium interdum esse admittit, tuncque mol- „lem apparere tumorem; aut quodamque sub crano „existere, neque tam foris conspicui; vel nonnun- „quam utrobique inesse. Assistent porro nonnulli, „ejusmodi morbum nequaquam fieri, neque inchoari, „nisi in recens natis puerulis, idque ex morbi hu- „jus casus nre periculatis constare putant; nihilomi- „nus tamen observatum fuit, potos septem, „otto, decem, duodecim annorum hoc Affectu la- „borasse.

11. Est autem Hydrocephalus Tumor aquosus; vel tutam exteriorem capitis partem, vel majorem ejus portionem occupans; hinc quibuldam hæc immetio Hydrops Capitis appellatur.

3. Causa itaque hujus Affectus est Humor Aquosus in toto corpore redundans, hinc in capitis partes, exterioris plurimum, effusus, qui nonnunquam fetulos, aliquando pituitulos, & subcraneus, lemper verò letur ac subviciandus existit.

4. Cæterum quatuor hujus Affectus enumerati solent differentie, desumptæ ex sede diversa. Aliquando namque aquosus humor inter cutem consistit & peticranium, tuncque mollis est tumor, doloris expertus, etique impressa digitorum inhaerent vestigia. Nonnunquam peticranium inest & cranium humor colligitur, etque Tumor magno cum dolore, neque tam facillè tactui cedit. Aut inter cranium & crassam meningem; Vel sub meningibus in ipsius cerebri ventriculis humor consistit, atque tum foris nulla tumoris mollities est, sed futurarum cranii dehiscens sentitur, quemadmodum vixit in bienni puella, cujus meminit Aodatus Vesalius, intra cujus cerebri ventriculos novem prope aquæ libras deprehenz fuerunt, ut refert *Ebmami corpus. Fabric. lib. 1. cap. 5.*

5. Equidem Aquosus Humor si extra cranium hæreat, Hydrocephalus aliquando curatur, nisi ob enellam patientis ætatem remedia adhiberi nequeant. Sed sub crano, vel ipso in cerebro si humor collectus sit, lethalis est affectus: hinc rectè ait J. C. „Arantius lib. de Tumor. p. nat. cap. 1. eorum qui „ab interna causa Hydrocephalo corripiuntur, & præcipue alitis latitante malo, neminem evasisse vidi. Si apoplexia aut Lethargus accedat, mors præ fortibus est.

6. Ut autem tollatur hic Affectus, Antecedentes Cause primo sunt removende. Quæ in finem citæ Vitiæ, Resque cæteræ Noanaturales, & circa Remedia Universalia, si ægrotans adulescens, eadem conveniunt, hæc pro Ordinate curando proposuimus. Sin vero infans sit, Nutrix parce renuiterque vivat, & siccabilibus utatur, humidantia fugiat, ac parum bibat; dein curandum ut tum Infanti cum Nutriæ alius semper libet sit.

7. Sed ad Continensem Causam ex parte læsa tollendam, duplex occurrit Curationis Methodus. Altera est, quæ Topicis convenientibus absque manuali operatione omnem humiditatem absumit. Altera vel unica incisione, vel pluribus (scarificationibus aquosam materiem educit. Prima Curationis Methodus sane tutior est, in Puerulis præsertim nato minoribus; atque potos cutaneos Aperiendos, Materiamque Conjunctam, Attenuandam & resoluendam perficitur, sub quacunque forma Capiti applicentur, ex. gr.

N 8

26 Rad;

26. Rad. Calami aromati 3ij. Fol. betonica, majorana, Salvia, rosmarini, Summ. Anethi an. Mj. flor. Stachados Aarb. M&S. bac. Juniperi 3j. Sem. Cumini 3ij. Cerevisia tenuis vel vini albi Gallici 3ij. S. A. in Diplonate pui futa. Hoc fumentum cum panis laneis Capiti calide admoveatur, se identidem renouetur, exade interit cavendo, ne unquam tegetetur. Et quia saepe id prohiberi nequit, hinc fomenti loco Capiti imponatur cucupha ex foliis majorana, Betonica, Salvia, calamentha, floribus stachados, Lavendula, rosis Rubra Nuce moschata, &c. quæ sæpius permittetur.

8. Maligni alii totum caput linimento inungere.

26. Olei cucumeris alutini 3j. Roræ, anethini an. 3j. Il. Absynthii stillat. gutt. xv. M. F. Linimentum, cujus immersione facta mappæ probe calcfactam, vel modo laudatam Cucupham imponere.

In adultioribus haud insensibiliter Spiritus vini calidi caput fricari solet, quod tamen non temere in Infantibus tentandum.

J. B. Corticis laudat Unguentum à Focetto descriptum & probatum, quo spatio trium dierum, in puero quindocim dies nato Hydrocephalus se cutasse refert.

26. Pulv. Absynthii. flor. Camomilla aut meliolini an. 3ij. buryti recent. Olei camomilla aut Anethini an. 3ij. Ceræ parum q. f. M. F. S. A. Unguentum. Alii Cataplasma ex Cephalicis in vino coctis compositum, & capiti applicatum multum laudant.

Cataplasma ex Cochleis cum Decodo Cephalico minutim confusus exollit Avicenna, eoquæ Ægiam se sanasse refert Carolus Piso.

IX. Sed remedia huic si morbus non cedat, ad alteram eutactois partem, Chirurgiam pura, deveniendum est, quæ proponitur ab Aetio & Paulo Ægineta, dicenda: "quod ubi aquosa materia inter cutem & pericranium, vel inter pericranium & cranium constricta, & tumor major sit, duas petas ut ait, apex ipsius unica incisione per diametron à parte postica ad anteriorem ducta incidenda. Si vero materia inter pericranium & cranium constricta & tumor major sit, duas petas medium se motum secantes, crucis instar incisiones molietur, vel triangularis formæ. Sin grandior adhuc sit tumor; remas literæ H figuram æmulantes, aut etiam plures iuxta tumoris magnitudinis proportionem.

10. Equidem Cautio hæc, quæ per Incisionem fit, quavis à gravissima defectiva sit Audacibus, cum vix tuta sit, mihi non probatur; atque de periculosa illa Hydrocephali operatione testatur Fabricius Hildanus Cent. 3. obs. 19. imprudenter illos agere, qui in Hydrocephali vultu præmittunt, sectionemque tentant. Si tamen sic imposita extirpantia & resolventia medicamenta, viscosus humor abstinere nequeat, atque ad Chirurgiam requiratur, præstat in pluribus capitis locis maxime tumida (cavendo à musculis temporalibus) cum Phlebotomo parvas facere incisiones, quales in Venæsectione, aut partis post appositæ encurbitalis scarificatione: fieri solent; Deinde mappæ sicce ac probe calcfactæ imponantur, quæ identidem quoties à suscepto humore fetoso madefactæ sunt, permittentur, usque dum omnis aquositas ablata, & Hydrocephalus sanatus sit.

11. Alii Cautio capiti cutem aperire, vel Aquæ li Cauterio inungere, quinque, sex, pluriusve in locis suadet: sed videtur talis Chirurgia merito suspecta, & ob Cerebri vicinitatem admodum periculosa. Atqui porius usæ veniant Vesicatoria, fonticuli, Scaræ,

12. Si sub cranio, viz. cranium meningem inter & cranium, vel sub meningibus ipso in cerebro hærent aquosus humor, nulla tentanda Chirurgica Operatio, sed per tota Topica procedendum, & reliquum opus naturæ committendum: recte namque inquit Ambrosius Parvus Chir. lib. 7. c. 11. 1. ex tumore & humore intus sub cranio contento neminem convalescere vidi. At de variis, nec non monstruosis Hydrocephalis videantur Serenius et al. medic. lib. 2. p. m. 10. 11. 12. Fabrikus Hildanus Cent. 1. obs. 10. Cent. 3. obs. 17. 18. 19. Cent. 4. obs. 10. 1ob. Monnier in Chirurgia ad Praxim bediernam adnotata.

De Hydrocephalo, sic scribit Clariss. Antonius Nuck in Experiment. Chirurgic.

Dant Hydrophis species ὁδὸν ὁδὸν Græcis dicta; ab obstructis aut distensa Valis Lymphaticæ capitis originem trahens. Hinc Tumores, & aque collusiones in eo sunt vel externæ vel internæ. Externæ inter cutem & cranium, Internæ inter Cranium & Duram matrem, nonnullæq. inter Duram & Piam matrem, subinde inter Piam matrem & cerebri Corticem, vel denique in ipsis cerebri Ventriculis aque colliguntur, quibus caput in monstruosam magnitudinem extenditur.

Infantes frequentius hoc malo corripiscuntur quam adulti, quoniam eorum vascula, postea adhuc molliora, livi nigoris extendi, nimis vel extensa faciliè distendi possunt. Sanguis insuper succi, quæ ab eo dependunt vasculis, & ad obstructionem magis apta sunt præditi.

Chirurgi prudenter hic procedat summo opere necessarium putamus; Chirurgia enim, incisione & perforatione instituta, nunquam Hydrocephalum remittunt auctivus, sed omnes, in quibus Operatio suis administrata, extincta inde fuisse, Prædicti fide dignissimi unanimiter testantur.

Si malum internè à lymphæ crassa & viscidis, Valis Lymphaticæ obstructis, originem traxerit, medicamenta Volatilia atque Sudorifica, Diuretici maricæ, internè assumpta, utramque absolvent paginam.

Externè Cataplasmata, vel Fomenta capiti calidè admovenda v. g. Ex Fol. Artemis. Major. Fennicæ. Absynthii. Cap. & Croci cum l. q. Vin. alb. Gall. quod bis terve de die renouetur. Vel

26. Pulv. Rad. Cucum. Asin. Trid. aa. 3℔.

Sem. Cumini. 3j.

Folia. Fævæ. 3ij.

Flor. Malvæ.

Ambræ. q. pl.

Cum vino F. Cataplasma eodem modo applicandum.

Hæc Cataplasmata Prædicta quidam singulari cum successu sunt usæ.

Nonnulli fasciæ admittunt, quam Caputalem Latini, La Capelline Galli vocant, quaque totum caput obvolvunt, Hydrocephalum remittere conantur, sed inuito planè conatu.

Si vero malum foret externum, & in principio, vel si levioris humoris extravasati pressione, Suturae à se invicem recedant, impositus pius Emplastro de Camisio, dictâ fasciâ patientem aliquando resiliunt novè.

Quæritur, an Fonticuli, Scaræ, & Vesicatoria aliquis utilitatis hæc in actu esse possint

Resp.

Resp. Si lymphæ actiores fuerit, Vasis Lymphaticis adhuc integris, præter interna medicamenta, eadem profuissè prædictis observatum. *Hac Clariss. Nuckius.*
Sequuntur jam Curationes alia &c.

Curationes.

In Hydrocephalo llemacea cum suis testis pistentur & seducantur in formam emplastrum, quod capiti applicatum & relictum, donec sponte cadat, mirabiliter resolvit. *Johann. Hartmann. in Pract. Chymiatricæ.*

Curatio hydrocephali in infantibus adhuc lactantibus admodum difficilis est, quod infantes sint tenerissimi, & medicamenta purgantia non tolerent, quocirca caute admodum & lumina cum prædiorum cum his procedendum est. Solia topicis fovendum est caput, ut roboretur calor eorum nativus & sic per insensibilem transpirationem materia hydrocephali evacuetur. Topicum autem medicamentum, quo solo tenellorum infantum caput refocillari, & materia hydrocephali evacuari potest, sic componi debet.

℞ Ess. rosæmar. & salv. an. ʒj. pulv. cinnam. & nuc. moschat. ana ʒss. caryophyll. ʒj. ceræ ʒ ij. picis navalis ʒ ij. fundatur & liquatur cæta cum pice, in quibus liquefactis adde pulveres, & ultimo infunde essentias, dum materia oleum reper, ne essentia evanescent, & lege atria fax cerorum, quod deterso capillitio semel in die capiti infansulum applicetur, donec caput omnino desiccat. Quod si veto infantes sint robusti, ut purgantia medicamenta sustinere possint, mercurio dulci ipagyrice præparato purgentur sequenti modo.

℞ Mercurii dulcis ʒ i. diagrid. & succo liquiritiæ dissolvi & rursus exsiccat gr. v. conserv. viol. ʒ j. m. f. bolus, deinde mane cum regimine de custodia aris. Per espiciapurgium nostrum ac steruacamentum etiam expurgati quoniam, ut materia hydrocephali per nates educatur, sicuti pariter per sudores & urinas hæc affectio exterminari potest. Sudores sudorifico nostro cum jove & mercurio parato promoveatur.

℞ Milii lollis ʒj. satrag. & test. bovis an. m. j. reserbatum. Venet. ʒij mell. opt. ʒiv. spiritus acet. rectificat. ʒj. f. omnium destillatio per alembicum vitæum in cineribus ad materiam siccitatem, ita tamen ut caveas, ne materia comburatur: Hujus liquoris destillati ʒss. misceatur cum jusculo pulli, & detur mane semel in die, essent. etiam salv. gurt. ʒ. aut. 4. in jusculo pulli propinatæ ad hydrocephali curatione valde cõterunt. *Johann. Perr. Faber in Patholog. Animal.*

Autor hic docet, quid sollicito medico in cura hydrocephali cum primis agendum, ut scopum suum consequi feliciter valeat: Nimirum talia esse adhibenda dicitur, quæ calorem nativum specificæ virtutis (medicamenta cephalica, & aque calida dubio procul hic subaudit) exhilarare ac recreare ita queant, ut refocillatus denique functiones suas exerceat, ac possimum collectum æquorum recrementorum copiam expellere aspiciat: Hoc enim nisi fiat, prognosticum mali omnia insinuat Autor, & infansula hinc moriendi necessitate imminere non immerito prædicat: Exinde enim non tantum calor nativus penitus æternum exingul aut suffocari potest, verum etiam utelli credet violenta ob pondus retenti copiosissimi feri compressio, vel lethalis eisdem obstructio se per consequens aut apoplexia aut lethargus pertimescendus erit. Duo

Will. Chirurg. Tom. II.

sunt in Arte Medica juxta Epiphani. Ferdinandum ardua, quæ difficultatibus sentent non cõtemnendis, ac tirubantem proinde Medicum, gravidis nempe & infantibus mederi. Infantes enim quod attinet, ipsi sanè secundum ipsius Galeni confessionem quàm maximè Intractabilia existunt, præsertim quod medicamenta convenientia, prout par est, insinuari ipsis nequeant; & quod tanto insuper robore non polleant, ut remedia illa & ex illis quidem purgantia, quæ tunc eaque fortiora medendi methodus requirit, tunc potiri possint. Ergo ut in dubium aliam hic utique, intr, & valde anceps propterea infantium morborum curatio deprehenditur, quæ totper cuncta prudeniter & caute hic petenda erunt; ne conscientie sue Medicus injuriam faciat, hoc est neque temerarius nimis, neque formidolosiorum etiam se in hoc casu exhibeat: Hac ratione enim penitus vitanda non adhibebit & usi panda non expavescet aut abhoretbit. Turb autem hic tui progressi clica renellorum lcteniumque hoc malo afflictorum eorum se existimant Aurores, si ad sola topica tunc refugiat: Unde etiam hujusmodi formulam remedii seu ceroti adposuit, quod tamen ut ut juxta componentem leges se recte omnino habeat, nostro quidem animo nisi universalia hoc est rlystera ad minimum ac sudorifica debite præmittantur, non tantum nequaquam secure, sed cum exirio potius applicabitur, quoniam eo ipso potius (qui nil aliud sunt, quàm quædam insensibiles transpirationes ac sensibiles pariter seu sudorem potius) ob admodum undique cum pice ceram, conglutinabuntur aut obstruentur, adeoque materiz peccantis vitium quo minus exiret queat; cilius retardabitur, verum etiam quum topicum illud vim calefaciendæ ac fundendi habeat, sic confortior calore nativo aut spiritui, & proinde exstimulata in simul expultrice colluvies ferula deorsum citius pelli, atque ad vitalia seu præcordia precipiti poterit, ut vehemensissima rursus, gravior anhelandi difficultas aut caratibus suffocativus facili hinc succrescere valeat: Nos itaque hujusmodi characteristica topica, nisi balsamica & secretè habenda virtute (sic namque efficaciam præstabant æqualem seu ferrosam hanc colluviem quasi magnetè extrahendi) singulariter dotata sine, nisi que in forma liquida præscribantur, nullo modo commendate possumus. Aut nihilominus calpiam hic curandi modus vel hoc ipsum Aurores topicum artifice, suademus ut in antecessum elypteres supra à nobis designati & postmodum sudorifica nobiliora pariter superius laudati præmittantur: Hac enim ratione rursus quoddammodo Auctorita methodum sequi licebit. Quod faciendum cum robustioris constitutionis infantibus hydrocephali fascina onusta nunc subjicitur, & propterea purgantia potrigendum, utpote cuius vim sustinere sic valebunt, abique hesitatione ulla confusetur. Verum nec forma cathartici illius nedolus approbanda nobis videtur, siquidem tam in forma boli medicamentum infantibus vix se ne vix quidem insinuari posse ex præxi conflet, quoniam ipsam dosim mercurii dulcis videlicet ad ʒj. pro hac ætate esse evidentem nimiam, vel quilibet statim conspiciat. Verum instabile fortassis quispiam primò, remedia ex mercurio præparata rursus exhiberi non posse, quàm in formula pilularum aut boli vel etiam eleasaril, quod mercurialis exaltus sic subigi ac commisceri queant, ut in deglutendo faucibus vel esophago non adhæreat, adeoque salivantes aut hujusmodi incommoda alia exinde aliquotum provenientia oppido sic præcaveri possint: Deinde in hujus

malis cura mercurium dule, nequaquam negligendum esse, quod in lerositate & humoribus noxia per reliquis omnibus purgantibus masculis sed sine perturbatione ulla ac hlandè educat, & proinde infans etiam securè præbeat. Respondemus his omnibus nos etiam nullatenus contradicere; sed tantomodo in dosi huius mercurii primò decedere, quod tunc gr. v. vel vt. ejusdem & diagrid. gran. 3. vel 4. (accutur enim mercurialis purgans non absque ingenio cum fortioribus purgantibus, ut eo citius nasci hoc stimulo, operationes suas perficiant, nec diutius in corpore permaneant) sufficere possint. Dein & de quod formam pharmaci concernit; rectius eleuatium liquidissimum hinc conficietur, addendo scilicet conserv. viol. 3j. & parum insuper de syrupo viol. admiscendo, quo modo sicut nec minus vel cum syrupo solo purgans illos facilius insinuari posse infanti hydrocephalico non desperamus. De capis purgibus sen sternoratoris, quorum quidem usus premissa idem universalius in hoc affectu plurimi valens est, dum materia peccans per nates velut per propiore viam & confectum sic educi potest, adorta, quod infantes valde inepti existant ad applicandum sibi remedium genus, dum fortiter id natis attrahere, prout requiritur, non eant, nisi pulvis cannula beneficio natis infundatur, aut si liquidum sit præmixtum per siphonculum immittatur. Ideoque tunc balsamus majoranae commodius substituetur, qui narium interioribus innotus suaviori modo ac perentius sterora ac omnia concitabit. Deinde circa sudorificum maximum seu juvenile nullum est dubium, quin id cum facilio successe tunc adhiberi poterit, præsertim si ad gran. 3. cum aqua sudorifica ac cephalicam propinetur, licet etiam diuretica sed pariter præstantiora multum auxilii præstare id possint, quorum mentio & catalogus alibi plenius oblata occasione examinabitur. Illud vero diureticum, quod in præfati ab Autore adscriptum concetimus, tenebrosam constitutionem idem valde ingratum ac horridum est, cum præmissa in tanta dosi ad 3 6. nempe cum iusculo portrigendum: Cui accedit, si ingredientia nullo præoccupati affectu æstimare non veteramus, quod singularis aut nobilis tanque Chymiaro digni remedium titulus huic dioretico nulla ratione attribui queat. Præstantiora ergo quam habemus hodie non seculo huiusmodi effecit a medicamina, & quam ipse Autor de aliis in hoc tractatu suo excellentiora diuretica nobis communicaverit, quorum dosis ad quasdam guttas dimittat aut grana se extendit non injuria levioris conditioni. medicamina præscribimus, aut secro pede præterimus. Specifica cephalica, quorum numerum adornare etiam possint essentia rosarum. & Liv. spargic. aut peculiariter menstruo parare non penitendum operationem exierit; modo præmissa universalibus curæ huius primordium fuerit institutum. Quod autem tam frigida huius aff. ctus curatione tractaverit Auro; forsitan deficiet occasio, & dum malum hoc (prone rarum id est, ac proinde Medicorum paucis huiusmodi observatio contigit,) ipsi curandum non occurrat, non male adhibebimus: Unde & nobis consilium videtur hic nostro, quoque loco abstinere manum, quod sub scuto experientie de hydrocephalo restatum dare parum aut nihil valeamus; Interim tamen hoc saltem adjicimus: Medico illos non abesturatos, qui ad nobilissimum emeticum aliquod in paucis dosi datum in principio mali, ubi vires adhuc constant, præmissa tamen conventum enervare, possunt; utpote cujus beneficio ex capite

(factum excludit concussione compatiente) serosa hæc materia commodissime & movet & promovet, hoc est evacuati poterit; Deinde cum spiritum nostrum cephalicum in peturando hydrope tantum lingulate & probatissimum specificum fuerimus experti, quædè magis is & quidem duplici ut patet vel multiplici potius (viscera enim mirè confortat, calidum innatum recitat, sudorem & urinam suaviter provocat, imò cruditates digerit, ac superfluitates omnes potenter consumit,) nomine ad hydrocephalum ex sententia tollendum conducet, videlicet in aq. quadam cephalica v. g. saliv. vel crass. nigr. vel flor. lilie &c. ad gut. vi. vel vii. sedulo exhibita. Ad extra tantum aquam nostram salutaris nunquam non feliciter in sublevandis omnis generis immotibus calide adhibitam usurpavimus. *Christianus Lænius in Animadversionibus ad Job. Petri Favi Parabolam.*

Hic icame nris abumentibus aquosum humorem, simulque etiam affectam partem roborantibus utendum, qualia sunt sequentia.

℞. Ros. rub. turtur. mellilot. an. ʒi. j. flor. anth. chamæmel. saliv. heron. Rorh. an. p. j. bulliant in f. q. aq. addita vini aut teri quarta parte, quo decocto modice calente, infans caput singulis saltem octo horis frigeatur quinque vel septem diebus continuè deit.

℞. Oi. chamæm. aneth. an. ʒi. pulv. absinth. ros. rub. an ʒvi. sulphur. exacte pulverat. ʒij. ceræ. q. l. l. linimentum, quo ter in die caput infans liniatur, & lanâ succidâ obtegatur; interposito interdum præscribendi nunc cataplasmati usu.

℞. Mell. lib. i. origan. m. j. sal ʒss cum modico violi austeri & croci gr. iv. vel v. F. cataplasma capiti infans de more adhibendum. De Ch'urgia nihil proponendum dico, quod tumorem hunc prædictis præscriptis ex arte administrationis omnino cessurum putem; verum si punctione seu incisione pro educenda aqua opus erit, aqua sensim ac paulatim, non autem tota simul evocetur, ne infans vires deiciatur. *Jo. Zeechius consilio, 64.*

Hic. Fabric. ab Aquapendente, in hydrocephalo infantium maximo, ut remedium efficacissimum, laudem aquam calcis vivæ, si ea calida spongiam buatur, & capiti imponatur, ac hoc solo remedio se hydrocephalum curasse scribit. Idem commendat spiritum vini primò deillationis, cum parte quarta aq. scabios. cum spongia impositum. Monet autem hic spongiam novam esse recipiendam, & archi fasciâ capiti alligandam, ac ne refrigeretur, calido linceo superposito moderate calefaciendam esse. Exsiccent & therme sulphures, ubi earum est copia, si spongia in his madefat, & capiti imponatur; in defectu vero coquantur in aqua sal. sulphur. & alumen, & eodem modo applicentur. Avicenna ususque cochlear, quas coquit in decocto artem. stoch. calamith. vel ebol. easque ita coctas contrudit, & calide capiti taso applicat. Sed ante usum discussionem & exsiccantium medicamentorum evacuanda est aqua de toto corpore (si per artem fieri possit) hydragogis, sudores & urinam moventibus. Adulcoribus pil. coch. exhiberi possunt, vel succus iridis, vel gr. ij. elatelli cum pil. convenientibus; per sudorem serotum humorem evacuant decoctum lig. guajac. suspiralli. salissas, vel balneum laconicum, & sudatorium; per urinam evacuant decoct. betonic. rad. cornicul. asparag. sem. arif. & alia. *Decret. Senzarus præf. lib. 1. part. 1. cap. 22.*

(Continuatur)

Consultatio.

Puello omnia & dimidii anni, per sex menses ablato, cum à parentibus pauperioribus fere negligeretur, nec ei alimēta convenientia, sed lase presūm, erudum, fructus horarii crudi, aliaque similia dantur, & caput etiam hyemno tempore non satis reclusum servaretur, caput in parte capillata & fronte usque ad oculos caput intumescere, qui tumor spatio uolus mensis in tantum aductus est, ut fere ad vitilis capitis magnitudinem excreverit: facies tamen non intumuit. Et autem tumor ille modis & albiens, eique alte impressa digitorum vestigia inhaerent. Post interea medioctiter edit & bibit, non febricitat, sed fomiculosus est, & totius corporis membra languide movent. Nares pariter consensuendū sicciores sunt & lēva paucior ab ore profluit, Utina & liquidae alvi deiectiones satis copiosae procedunt.

Huius pueri affectus Medicis hydrocephalus appellatur, qui est tumor capitis, quo caput à serosis humoris collectione intumescit. Hic serosus & pituitosus humor collectus est extra cranium, & latet sub cute, quod tactu percipitur, quia nulla ossis durities sentitur, sed tantum mollis tumor. Serotum, pituitosum & copiosum, esse humorem qui colligitur, patet ex colore cutis albicante, & quod alte impressa digitorum vestigia capiti inhaerant sine dolore. Causa antecedens huius mali sunt humores frigidi & humidissimi in toto corpore, & imprimis in cerebro collecti, qui extra cranium elati, & sub cute condensati, causam continentem constituunt. Humores huius generati sunt, tum ob partem vicinam pituitam crudamque humores producentem, tum ob frigidam & humidam totius corporis constitutionem, quippe horum ratione viscerum coctiones debiliores evadere, unde multi pituitos & serosi humores generati sunt: qui partim per urinas & alvi liquidas deiectiones evacuantur, partim ad caput delati ierunt, cumque per nates & palatum more solito non effluerint, à cerebri calore in crassos vapores attenuati, crassius poros & suturas transeunt, atque sub cute rursus condensati, ibidem consiliunt & collecti sunt. Per nates & palatum evacuari non sunt, quia sua crassitie ductus eo tendentes obstruxerunt. Sub cute autem collecti sunt, quia ab externo frigore ejus potius singuliores & humores ipsi densiores evadunt, ita ut ob crassitatem per contractos poros permeare non possint. Cumque quotidie novi humores ad priores accesserint, & nulli vel admodum pauci per poros dissipati fuerint, hinc factum quod caput ipsius unius mensis in tantam magnitudinem immuerit. Ager alimenta adhuc alsumit, quia ventriculi appetitus à cruditate sibilura non multum imminuitur, cum illa per copiosas urinas & liquidas alvi deiectiones satis evacueretur. Non febricitat, quia humores non putrefcunt, nec calor est nimis excessus aut malignitas. Somniculosus est ob frigidam & humidam cerebri intemperiem, cuius ratione non tantum nervi sensus lacerati, & spirituum animalium transitum, atque obiectorum sensibilibus receptionem minus apti sunt, verum etiam pauciores spiritus animales generantur, cum à frigida humiditate angustiores seu striciores facti sunt arteriolarum in plexu choroide, atque hinc pauciores spiritus vitales transmittantur, qui quandoquidem maiestas sunt & qua animales concinnantur, sequitur si illa materia pauca sit, necessario quod

inde generatur paucum esse debere. Hæc spirituum animalium paucitas etiam in causa est, quod æge totius corporis membra languide movent; cum enim dicti spiritus pauci ad partes & musculos influant, necessario motus animalis languidus est. Alvus liquida est ob copiam serosorum & pituitosorum humorum, qui in corpore generantur, & magna parte ad intestina delinunt, quorum renior pars sanguinei permista, & in renibus ab eo separata, urinas quoque facit copiosas.

Hic affectus admodum periculosus est; licet enim collectio feri sit extra cranium, atque hinc magnam sanationis spem promittere videatur, tamen periculo non vacat, cum capitis intemperies, totiusque corporis cachexis magna sit, serosus humor copiosus, & atrox retella, quæ fortis remedia non fert. Quia tamen in te dubia adhuc spes apparet, curatio quamprimum est instituenda antequam affectus peior fiat.

In curatione serosus & pituitosus qui in toto corpore redondat humor, in primis ille qui lo capite colligitur, quocunque modo elementer evacuantur, & viscerum corroborations ac intemperiei sublatione ejus copiosior generatio, & in capite collectio impedienda.

Primo cum cochleari exhibeat syrupi de cicchori laxativ. 3 ss. cum pulvere jalapæ gr. v. vel vi. vel passulorum solutivum 3 v. vel vi. comedenda dantur. Postea subinde exhibentur pauxillum chusiacæ veteris, & si fieri possit, sudor provocetur. Offertur etiam ter quater de die pauxillum consue. anihos & mellis, aut Borum salivæ. His præmissis sequenti fomento tepido caput sepe fovetur.

℞. Herb. betonic. rosmarin. origan. thymi. flor. chamomill. melior. stachad. an. m. j. fol. laur. m. ss. sem. anis. fenicel. cumini. an. 3j. viol. alb. q. l. coquantur ad lb. ij. pro fomento, cum magna spongia seu panno laevo admovendo, diligenter cavendo ne refrigerentur. Postquam usu hujus fomenti tumor capitis maximus ex parte dissipatus est, & ulteriores intemperiei sublationem, iungatur caput mane & vespertim hoc unguento calido.

℞. Olei chamamel. unguent. albastin. an. 3 j. olei nucis moschatæ expressi 3 v. pulv. cidior. hyssæ. calam. benzoin. an. 3 j. misce & unguentum. Post inunctionem imponatur capiti tale capitium.

℞. Fol. rosmarin. majoran. flor. chamomill. mod. illot. an. m. ss. beozoini, gariophyllorum, nucis moschatæ, an. 3ss. & pulvis grossul. & quo in ferico rubro conficitur secundum autem capitium interfectum. Postea reliquum crassum linimento, hoc solum capitium diu in capite gestare debet. Interdum etiam ad viscerum corroborations bis terre de die exhibetur cochleari huiusmodi mixtura.

℞. Aq. flor. tillie. liliorum convallium, ana 3 ij. aq. cinna. 3 vi. syrup. de stachad. 3 j. misceratur. Vel huius loco detur subinde pauxillum melicrati. Regioni ventriculi, hepatis & lienis hoc linimentum iungatur.

℞. Olei lausii, chamamelin. unguent. marti. al. an. 3 ss. olei nucis moschatæ expressi 3 ss. misce fiat linimentum. Si hæc non profuerint, in capitis tribus quatuorve locis maxime humidis lateoali perforatio exigua per curem facienda est, non major quam in vena sectione fieri solet, ut per illa foramina serum paulatim efflulare possit, quod maxime calidis impostis excipiendum est, usque dum fluore desinat, postea antedictum capitium capiti imponendum est.

In videri fit aer calidus & siccus. Cibi offerantur paulo sicciores quam ordinarie huiusmodi puellis exhiberi solent; ut panis biscoctus masticatus: offere ex pane albo cum decocto passularum, aut iusculum gallinæ humectatæ, ac cinnamom. & sacchari paululo conspersæ: Pulvisculæ etiam conficiantur ex farina tritici cum decocto passularum, illique aliquantulum vini addatur. Bibat æger subinde lac amygdalarum cum paucillo acis cinnamomi. Abstinendum ab usu iactis pressi acri, ieri lactis, ceterisque tenuissimæ, frigidum horariorum, & pomorum, licet coctorum. Somnus sit mediocri, non nimis longus. Exetera naturalia si non procedant, arte provocentor: *Ibidem. de Diemerbroeck de morbis Capiti. Med. dicat. 25.*

Observationes.

Quamvis in ventre ut plurimum sese manifestat hydrops, cum tamen in omnibus fere corporis partibus nasci posse experimur. Præter abdominis enim hydroperem, sive ascitem, pectoris etiam datur hydrops, capitisque ac testiculorum, tam visillum quam muliebrum, oec iocernis tantum, sed & in externis corporis partibus, cujus veritatem demonstrabo obs. 28. hic loci saltem acturus de hydrocephalo, quem mihi videre licuit 4. Decembris, ann. 1685. in filio Chirurgi cuiusdam Haglensis bimulo, cujus caput latitudinem adoli capitis multum excedebat, hoc enim rotem ambiens, à syncope videlicet ad occiput, litreum tres spiritusmas, sive ulsom longitudine aequabat. Infans ille sano quamvis, & bene disposito corpore in lacem fuit morbo, à quo usque tempore caput primo increverat, visulque sensum immului cepit, tandem omnino sublatu.

Quemadmodum diversus admodum est abdominis hydrops, ita etiam hydrocephalus, qui tam partium capitis distenturam, quam causarum intenu multiplex est. Collectio enim aquarum contingit, vel in toto capite vel in aliqua parte; siquidem nonnunquam in externis tantum advestatur partibus, inter cætem videlicet, & pericranium, vel inter pericranium, ac cranium, quandoque & internis tantum partibus inter cranium, & meningis, inter duplicaturam dæte meningis, falsivæ, vel ipsas inter cerebri membranas, aut inter piam matrem, & cerebrum, imo aliquando in dimidia tantum capitis parte, interdumque simul tam in internis, quam externis. Attestante Vesalio lib. 1. de humani corp. fabrica cap. 5. Ut & Fabrici Hildano cent. 1. obs. 20. in ipsa interdum cerebri cavitate reperitur aquæ quantitas, hydrocephali sæpius causa. Dionys. vander Sterre tract. de patu fol. 168. se duos hydroperes in embryonum partibus capitum exterioribus vidisse narrat, à quibus, aperta tantum cute, equa profluxerit. Similis rei mentionem facit Carolus Piso de morb. à serosa colluvie sect. 2. part. 1. c. 2. fol. 49. Puellæ, inquit, caudam frons, palpebreque supra admirationem tumbænt adeo depellæ, & conovescentes. ut eas tollere, occlusosque aperire nequaquam posset: sed & calancam, sive redmiculum capitis abjicere à me iussu, universum pariter caput immulavit conspicimus, in eodem sepiusculæ manu contestato mollitiem deprehendo insignem, & humorem sub cute fluctuantem, qui ractum subterfugiens quidem, sed mox refluens, recutientque evidenter se prodere. Hoc malum, cum ad mensuram purgationem, hæcenus omnino suppressam, cum ob

alidnam sub sole moram, cui ejus loci tocolæ multam vix in honorum, virumque cultu transigentes vivunt obnoxii, ortum fuisse autumo. Non multum differt quod habet Epiphani. Ferdinand. bift. 21. fol. 66. & Joh. Baptit. à Lamazverde append. obs. ad armament. Chirurg. obs. 33. fol. 253. Henricus Regius Præz. med. cap. 13. fol. 57. Poeti meminit simul, cujus caput contectum molle erat, & digitis pressum subsidebat in fossulas, radiisque foliæ vel candellæ expulsum pellencebat; quamvis ille jodiaverit malum intus in cerebro latuisse, quia puer sensibus erat stupidoribus, & somnolentus, reliquo corpore, licet sufficienti cibo, potaque frueretur; macilentus, pallidusque. Credidit Riolanus humorem in externis hydrocephalis transire ad cerebri ventriculos, verum Joh. Jacob Wepferus exercitat. de Apoplexia fol. 20. statuit ipsum non primo externe congregari, posteaque versus interiora prorumpere, sed vice versa originem habere in cerebri ventriculis, interdumque versus exteriora adeo expelli, ut ibidem animadverti queat. Andr. Vesalius lib. 1. cap. 5. de non exiguo agens hydrocephalo humorem nonnulli in cerebri ventriculis reperiri ait. Humorem illum omnium primo in iis provenire ventriculis G. Fabrici. Hildan. cent. 3. obs. 17. scribit: alius enim (inquit) nonnulli post mortem vix reperirentur, per quas ille à partibus externis deductus fuisset ad cerebri ventriculos, quas tamen, etiam diligenter indagaret, reperire non potuit. Zacutus Lusitanus præz. admit. lib. 1. obs. 5. humorem invenit inter duplicaturam dæte meningis. Theoph. Bonet. Anatom. præz. lib. 1. sect. 2. obs. 45. fol. 112. ejusmodi liquorem lymphaticum à Chirurgo Bayly non tantum inter duram meningem, & cranium, sed & in falce, & dæte meningis duplicatura, ad quinque circiter libras Medicas repletum fuisse refert. Expetitiff. Steph. Blancardus collect. phil. med. cent. 1. obs. 73. fol. 65. se in septem mensium abortu inter duram, & piam matrem magnam aquæ sanguineæ latentem quantitatem animadvertisse memorat, cujus forsitan causa, ut ait fuerit præcedens matris lapsus: cerebrum autem ejus molle & aquosum erat. Johannes Jacobus Wepferus exercitat. de Apoplexia hist. 13. fol. 376. & hist. 14. fol. 398. se non cavities tantum cerebri, sed & locum illum inter duas meningis plerumque vacuum lero repleta invenisse narrat.

G. Fallopius obs. à Francisc. Michino edit. indicat se intra pueri cuiusdam sexennis piam matrem, & cerebrum, ut & inter hujus gyros aquam conspexisse. Andr. Vesalius lib. 1. de hum. corp. fabrica bimulæ puellæ meminit in cujus cerebri ventriculis septem mensium spatio novem aquæ libras collectæ fuerint. Quamvis autem cerebrum ejus juxta veritatem ita pressum, & in se contractum reperiretur, ut membranam aliquam crassiorē refert, & genivæ cerebri membranz sibi adeo essent contigæ, ut unum, idemque corpus videretur, ceteribellum nihil fecius, ejusque basis, & nervorum processus naturaliter se habebant, quare puellæ ad finem usque vix mens sana fuit. G. Fabrici. Hildan. cent. 1. obs. 10. fol. 19. pueri cuiusdam mentionem facit, cui caput in tantam exceverat molem, ut ejus rotunditas ulnam & quartam ejus partem, aliudum autem ab aure ad aurem totidem æquaret longitudine: is autem non ita natus fuerat; sed cum septimum ætatis mensem vix attingisset, caput mirum in modum ei tumescere cœperat. Intra triginta autem menses paulatim ad didam magnitudinem exceverat, unde puer in lethargum inciderat, nec

nec ita diu post obierat. Dissecto cranio in duobus anterioribus cerebri ventriculis aqua crystallo lucidior ad libras Colontides 18. apparuit. Hæc autem non ventriculos tantum, sed & substantiam cerebri distendebat, ita ut totum cerebrum (cerebellum exceptis Hildanus) in Sacculum extenderetur, unde circumvolutiones, gyri cerebri, turgentibus omnibus, non apparuerat. Dura & pia matres integre erant, atque ita dilatae, ut totum cerebrum cooperirent: etiam similiter dilatarum erat, sed pallium membranolum postea, quàm osseum, nec speriebantur meatus, per quos serosus ille humor ad caput delatus fuerat, quantumvis accurate dispiceretur omnia. Cui autem, dicit quispiam, hoc, quiddam est liquoris, in cerebri ventriculis apoculis non producit? Resp. Quia aliquo modo est spiritus respectu aliarum squarum, & conglutinationis expertus, addo quod sensum in cerebro colligatur, & non subito; sensum enim ibi collecta sensum quoque poros, subolusque cerebri dilatat, & non comprimit, vel obstruit, ut quidem fieret, si uno impetu fuisset collecta. Idem Hildanus cent. 4. obs. 10. fol. 294. pueri cuiusdam quintum ætatis annum nondum prætergressi meminit, cujus capitis circumferentia consinebat pedes Geometricos duos, cum sesquipedem, & pollicem, altitudoque eadem erat: cranium utique durum erat, & nonnulli quibusdam locis membranolum, relique vero corporis partes proportionem pueri cuius ætatis obtebant, non ita, ut hydrocephalus non esse corpora, extenuata. Ingenio puer stupidus admodum erat, visu, audituque, nec non loquela destitutus: Id veto malum ex eo provenerat, quod circa annum ætatis suæ primum morbo laborasset gravissimo, & acuto. N. Tulp. obs. med. l. 1. c. 24. fol. 49. de puero memorat quinquenni de cujus capite post mortem educit fuerit quinque aque libras, quibus effusa omnia aded vacua apparuerunt, ut plerique Medicorum præsentium, sed præpropere, hic caput sine cerebro conspici judicaverint. Tale autem hydrocephali exemplum affert. Theod. Kerckring. obs. Anat. 46. fol. 102. & Zacut. Lusitan. præf. Med. admir. lib. 1. At oculi acies illic penitus diiecta, talis perspicue liquebat non detulisse cerebrum, sed amissa figura globosa, formam convexi fornici indidisse, ut intus membranae crassiores undique struere dissolutorum ossium circumferentiam adhæresceret, quali etiam modo le habuisse puellam And. Vesalii, de qua loco adducto, idem affirmat.

Demonstravit an. 1666. D. Joh. Hornius Anat. Professor Leydensis hydrocephalum pueri anni unius æ quo 29. & 36. bautiebantur. Th. Bartholin. cent. 1. hist. 80. fol. 40. exemplum habet pueri quinquennis hydrocephalo laborantis, cui capiti tantæ molis erat, ut tria adultorum superaret, circumferentia ulnam æquaret cum quadrante, duaque spithamas altum, fronte ita elevata, ut oculorum orbitæ mediam faciei partem occupate viderentur. Struere laxate omnes à summo capite ad occiput, & in utroque capitis latere. Nulla verba aspicula tunc proferte, nec eborum quicquam manducare potuit, quia superiorem dentium series longè ab inferiori propendebat. Os perpetuè mædebat scito copioso afflatus de capite profluente. Pedes sustinendo corpori impares erant. Hoc suum malum inde ortum attribuitur Barthol. quod matri puericula, quæ undecim sine labe tali pepererat liberos, quum hunc utero gereret, præter consuetudinem morem gravitatem omnem emiserit, uterique aded inermis, ut prono in terram corpore

progredi fuerit coacta. Plura hujusmodi habuit M. Anrel. Severinus de noviss. obl. abicell. c. 9. Schenck. pag. 11. & 12. Paulus Æginet. lib. 6. c. 3. Actius tetrab. 2. item. 2. c. 1. Philip. Ingrass. lib. de tumor. præter naturam et. 1. c. 1. fol. 380. Nonnunquam dimidiam tantum capitis partem occupat hic hydrops, cui rei bina proferit N. Tulp. obs. Med. lib. 1. c. 25. fol. 50. liquoris, vel in dextro, vel in sinistro cerebri ventriculo hærentium exempla: in quorum alterutro se ultra duas aquas libras tam stricte ubi illi parti inclinas vidisse ait, ut altera illa planè esset, & integra.

Differunt autem hydrocephali ratione temporis, ventositatis, & magnitudinis. Nonnulli se ante partum in utero materno manifestant, sive ex imaginatione, sive sepsis matris, aut ipsius fetus incommodum intra uterum circa ortu, vel etiam matris nimis crassius alimentum, aut fructibus, aliisve refrigerantibus utente, unde sanguis ejus nimis crassius, & tardus, vel etiam, quando illa tempore gravidationis aliis obnoxia fuit morbis. Bol. duimus Ronstau de extract. fetus c. 27. Gonda anno 1564. de puero quemdam vidisse hydrocephalo laborantem scribit, cui mortuo in lucem prodire caput toto corpore fuerit gravius; quumque illa plura extant apud Helvigium obs. phys. med. 3. fol. 9. Joh. Kechel. ephem. German. decur. t. ann. 1. pag. 138. necnon Stephan. Blanchard collect. med. phys. ut de morb. pueror. fol. 208. Nonnulli post natiuitatem demum ferus, citiusve se manifestant hydrocephali, quumvis raro, vel non adeo magni conspiciantur in illis, quorum crania jam omnino elata sunt, quia oia tunc sollicita evadere, & per consequens intrinseco contento liquori non facili cedunt. Hujusmodi autem pueri prius obirent, quàm semel occisa crania dehilicent, quamvis G. Fabric. Hist. cent. 3. obs. 199. exemplum habeat juvenis cuiusdam 18. annor. cui monstruosum valde erat caput; rotunditas enim ejus duos pedes Geometricos, & pollicem decem continebat, altitudo capitis ejusdem erat magnitudinis; reliquum corpus, imptimis pedes (qui contorti erant, & tetracti) & crura extenuata erant; cranium autem non membranolum, ut plerumque hydrocephalorum esse solet, sed durum, solidumque Meniere non uque adeo constabat: loquebatur tamen satis distinctè, comedebat avidè, & multum; sed mirum in modum ipsum à morbo epileptico vexari referebant Parentes. Caput vero accretis inceptis tercio ætatis anno, cum morbo quodam libertas esset acutior. P. Borelius hist. & obs. rar. cent. 1. obs. 38. fol. 43. de puella quadam 12. ann. nata nacta, quæ maximo continuoque verticis, sumatque coronalis dia laboraverat dolore sine febris tamen, tumoreve, sui subore, cuius remedia omnia utiliora inefficax admovebantur, ita ut tandem mors finem miseris, & doloribus ejus imposuerit. Aperto autem capite, abscessus repertus fuit natibus, & insudibilo cerebri hærentis, de quo aq. clarissimam cum impetu ad libras duas exivit quasi è fonte scaturiens, & in altum proficiens: causa verò hujus mali fuerat, quod quinque vel sex ante morbum mensibus scabiem capitis, sive achores passæ à Monachis quibusdam malè curatæ fuissent repellentibus, frigidiisque anguentis, unde caput refrigeratum, serositasque in eo cumulare fuerint. Zacutus vidit hydrocephalum in puero decem annos nato. Roge quipiam cur magis affectus ille in infantibus quam

adultis observetur? Ratio est, quia tunc arteriarum iis sunt molliores, atque poris, tubulique sagittiores, nec motus sanguinis tam efficax. Interim quoque arteriarum facilius dilatantur, & particulae crassiores in cerebrum deponantur. Quæritur autem, anne & in brutis reperitur hydrocephalus? Eos in viridis, bobus vaccique observavit Joh. Jacob. Wepfer, cæcæ de Apoplexia fol. mihi 69. & Thom. Barthol. act. Hæm. rom. 1. pag. 249. indicat quæ idem Wepfer, Colonosia animadvertere posse in brutis, quando in præia vertigine corripuntur, testaturque se audivisse apud Subfylvanos in Helvetia frequentem hunc boom esse morbum, ac se vertigine prodere. Addit & bubulcos esse, qui ipsi medeantur. Hi primo malleolo post cornua pulsant, ubi ex sono aliud vacuum spatium, ac vulgo sunt in cranii bubulis, percipiunt, eamque mox perterebant, ac forasmini-pennam inducunt, & attulso spiritu vesicas hujusmodi extrahunt. Si in superficie existat prompte succisione cedit; si autem profundior, & cerebrum immersa sit, succisso frustrantur. Ac tum quidem quantocyus hoc machinandum est. Idem hoc modo multa animalia cetera fuisse ait, memoretque quom juvenca in paucis cerebri vertigine corripitur, se machinæ caput, quod quo causa mali laterat, forte fortuna obtinuisse, quo aperto, ac cerebro denudato, sinistram lateris sub lyncipite tumidius & mollius repensit; quod cum durius attraxisset, profluisse aquam limpidissimam, faciemque el conspicuam. Post quod, inquit, tumor subsedit. Divulso autem cerebro ad corpus usque callosum ventriculorum sinistram aperuit, inveniente vesicam teneram, rotam anteriorem ejus partem occupantem, quam citra ulteriorem lacerationem integram extraxit, ovum gallinaceum magnitudine superantem. In ventriculo, verticem versus superius, & infra, asperitas levissima ubi vesica anata erat, apparuit, ac si semilib, papaveris albi aspersus fuisset; Ventrículos autem similiter duplo major erat dextro: in anteriore parte superior ejus pars, & lateralis tempora vetus, propter extensionem, tenuis vix cuticelli dorsum aquavit: cetera omnia in cerebro sana erant. Similem, ac paulo minorem vesicam idem Wepferus in bovino cerebro, dextri ventriculi anteriori parti undique accretam se invenisse ait, in cujus fundo mucus instat sedimenti crassioris, a quo candidi lapilli, itaque creta strabiles, subderant. Si quis quærat, quo pacto liquor ille in cerebri cavitates perveniat: dicendum est, varias circa illud phenomenon occurrere considerationes, licetque adhuc sub judice esse. Existimant Riolanus, Regiusque poros in dictis cavitatibus existere, humoremque illum à circumferentia cerebri ad punctum, hoc est, ad cerebri cavitates transire, hæc tamen opinio à Wepfero fol. 60. refutatur. Thom. Bartholinus lib. 3. cap. 6. anarom. reform. negat ibidem poros esse conspicuos, & etiamsi darentur, facillime, utpote minimi, obsterentur, unde hic illic defectus in sensibus, aut etiam apoplexia oritur. Stansane alii malum hoc internè ex debili cerebri calore originem ducere, quia hoc valde refrigeratur; humectatque nutrimentum suum debet præparare, humoresque ab inferis partibus illapso sufficienter transpirare non possit. Quidam autem asserunt vitium hoc externè à quadam violentia, lapsu, allusione, contusione, dote, impetigine obsterentur concretatione in patru, vel alio quodam violentiori modo provenire, unde cerebrum pororum ledatur sum-

phanturque lymphatica vascula, sicque magna tandem lymphæ colligatur copia, qua oondum occiduum, tenerumque cranium sensim extendatur; unde etiam fiat (ut alunt) ut morbos iste in pueris magis, quam adultis repetatur. Nonnulli etiam vas lymphaticis obstructis, hydrocephalum produci asserunt, unde lymphæ, cessante circulatione, aequo tanta sit tumoris. Nonnulli quoque opinantur aquam illam ex arteriolarum extremisibus, vel etiam per motum transudationis ibidem colligi. Hydrocephalus autem externus meo quidem judicio, quod tamen meliori nihil derogare opinioni velim, à superfluo plerumque quodam humore provenit, qui ex arteriarum extremisibus, vasisque lymphaticis procedit, vel propter illorum abundantiam, vel obstructionem, vel etiam rariorem sanguinis intra arterias motum à viscoso, crassoque humore sanguini mixto ortum, unde hic necessario minor vi in vasa lymphatica propellitur: quamvis etiam fieri possit, ut tenerum necnon potius valde infantia caput ab ætæ frigido non bene deflexum fuerit, unde humores in vasis lymphaticis facilius condensentur, sicque ad motum evadunt ineptiores vasis ipsis magis, magisque ioremescimus. Hydrocephalum hujusmodi externum potest esse posse ab arteriarum extremisibus vel hinc magis patet, quod tales hydrocephali non tantum à violentia, aliave causa externa nascuntur, sed & quod in illis limosa quedam, vel sanguinolenta, turbulentaque semper reperitur lymphæ, cum tamen in internis hydrocephalis ea clara semper, & limpidæ apparet, hæc sententiam confirmat præter alios Epiph. in. Ferdinandus hist. 21. fol. 66. Si verò quipiam dubius cogere, ondam contigit, ut in cane Richardi Louveti tr. de corde c. 2. pag. 123. ligata vena jugulari, omnes lypasit; musculi, & glandulæ liquido, pellucidoque repleti fuerint fero: id fortan configit, quia sanguine per ligatam venam jugularem versus inferiorem non retrocedente, sed in ipsa arteria manente, per poros tunicae arteriolarum, quæ lo extramissionibus non duplices, sed simplices sunt, non nisi pusum serum transcolatur; illarum enim arteriolarum textura transcolationi tenuis ejusmodi humoris satis idonea est. Quantum autem ad internum autem hydrocephalum, lymphæ in cavitates cerebri, aliave capitis locum eodem defertur modo, quo ille humor, qui in aliis corporis partibus producit hydropeem, ut in tunica visceris circumferentibus, testiculis nam vitilibus, quam foramineis, peritoneo &c. in quibus ultimis partibus multoties quidem centrum, & quod excedit, aqua libere fuerit repertæ. Verosimile est hoc, quidquid est lymphæ, per arteriolas in glandulas cerebri corticales delatum, ibidemque separatim per canaliculos (eodem plane modo, ac in ceteris aliisve corporis partibus humores sequuntur) ad cerebrum deduci, esseque hæc hydrocephali lymphæ ejusdem plane naturæ, cujus est illa, quæ in ventriculis cerebri sanorum hominum semper repetitur solet, quemadmodum abunde è sapore & colore colligitur; qui humor naturaliter semper à subsequente oovo inde propelli solet. Verum quovis ille, cavitatibus cerebri irrigatis, in sanis defertur, an scilicet ad osium, sive oculos, aureas, aut ora cavitatem, non adeo exploratum est. Joh. Lechellus Ephem. Germ. decus. 2. an. 2. obs. 178. fol. 363. exemplum habet pueri masculi, cui recessus nati caput hydrocephalo obducatur, cuiusque non magis post mortem totus cerebri cortex non cecidit

debat calami lictiproti crassitudinem, quo separato, loco ventriculorum offendisse se ait amplam quasi vesicam limpidissimam, & insipida aqua repletam, quantitate uncias 50. excedente, neglecta ea, quam spougie, & lineamina imbibebant; effusa autem hac collapsi cerebri ventriculi manifestò docuere illam in utrumque ventriculum per conicis quosdam tubulos, à recentioribus Anatomicis passim descriptos destillasse, ac undique sui coeui cerebri substantiam, cranium, pericraniumque extendisse, atque capiti illam deformitatem produxisse. Fieri etiam potest, ut abscessus, sive vesiculæ aqueæ in cavitatibus cerebri tam brutorum quam hominum repetitæ primo ex aliis parvis vehiculis plexui choroidæ annexis consentiant: quia glandulæ illæ tunc etiam tumide sunt & induratae, quæ successu temporis ita accrescunt, dum superflua humorum propter obstructionem tevebi nequit. Ita Willis glandulas illas plexus saepe se vidisse testatur tumidas. Scribit etiam Flacus Sylvius d'iput. 4. se glandulas illas in foliis moribosis reperisse; forsitan quia tunc temporis superfluum humorem tumefactæ melius conspici poterint. De glandulis hinc agit quoque Wharthan. Adenogr. cap. 24. fol. 142. ut & Theodorus Kerkringius observ. 10. pag. 29. Testatur D. Fred. Ruych. Medicus, & Anatomicus Amstelodamensis expertissimus se in dissectione cadaveris cupulidum fœminæ glandulas copiosas magnitudine sem. milii reperisse plexui illi annexas: Joh. Jacob. Wepferus pag. 275. se non cerebri tantum cavitates humore plenas, sed & ipsum plexum sanguinis fœtè expertem vidisse ait, in quo multæ conspiciæ fuerint glandulæ, sed albicantes, limosæ, tæchique duræ; fol. autem 475. se observasse ita dicit variis hydatides tam in sinistro, quam dextro plexu choroidæ, necnon fol. 410. se varias in plexu dextro hydatides animadvertisse scribit, quarum quædam plin majores fuerint, ut & pariter in sinistro, quarum una avellanæ nucleis magnitudinem excesserit. Quando itaque liquor hic vasculorum lymphaticorum præter consuetudinem, & naturam viscosam quamdam sanguinis materiam incrassans est, obstructi onemque ibidem produxit, vasa lymphatica continua subsequentes lymphæ pressione tandem rumpuntur, sicque liquorem suum inter membranas effundunt, & teceptaculum quoddam ibidem efficiunt, vel etiam inter valorum lymphaticorum valvulas hydatides producunt. Contingit etiam, ut extremitates arteriarum à viscoso quodam humore sint obstructæ, vel vasculum quoddam alicubi tumore quodam prematur, unde sanguinis circulum suum per arterias absolvere non valens tenuis, & æquos liquor extra ipsa per poros transcolatur, qui ita hydrocephali interni causa est. Sicut qui dubitant an in cerebro vascula dextra lymphatica, verum testatur epistola quadam Steno sæpius se vascula quoddam lymphatica circa glandulam pinealem animadvertisse, quæ, ut ait, eorundem forsitan vix fuerit lymphaticæ hæmorrhagiarum ventriculorum cerebri destinatae. Er, si quidem eadem in pectore, abdomine, aliisne externis membris reperitur, non ita eraverit forte an, qui nec caput ipsi destitui dixerit, hoc erit in istar gazophylacii copiosum humorum, utpote lymphaticum liquorem, arteriisque liquorem istum advehentibus abunde dicitur. Ita ut dubitare non liceat, quin caput aquæ, ac thorax, ventervæ, sur alia corporis exteriora membra, suis scateat vasculis lymphaticis. Ac quamvis nulla adhuc cerebro reperta sint hujusmodi vascula, non tamen non ex-

istè dicendum erit. Sed quamquam quies, fuit causa, cur infimæ corporis partes illius, de quæ reuill, ut & in aliis, quæ adduxi, exemplia, adeo fuerint macilentes? Nos cautam fuisse posuimus, quod durante hydrocephali accretione, ille parco admodum, imò saepe nulli fuerit alimentum, solo matris lacte contentus. Accrescente itaque capite, reliquæ corporis partes decreverant, quod nutrimento destituerant, quemadmodum aliis paribus, nutrimento alio delato, accidit. Conferatur obs. 49. tom. nostri primi, ubi de magni lenie. Sic etiam refert Thom. Barthol. Act. Med. Hæstu. vol. 1. obs. 92. Quomodo D. Botrichius duarum gallinarum, quas macrescere quotidie & sine manifesta causa, suppetente licet sagina largiori, oppido attenuari videbat, in conspectum prolata viscera omnia flaccida, & exsucca, præsertim quæ in abdomine continebantur, repetit, Solim. ibi. hepatis præter morem immutans, adeo non videbatur immutatum ut plus, quam decuplo auctum creveretur, & quod accedit, pinguisimum: quæ quid etiam observatur, Job. Læscel, in tenui scrutinio, Olavusque Rubecq. obs. anatom. Quod autem in gallinæ genete visum deprehendit, id in ante ibus delictum inco in cæca antiquorum æstimatum fuit. Hinc *Manualis lib. 13. Epigram. 58.*

*Aspic quam timent magno jecur anferre majus
Mævus dices, hoc, rogo, crevis ubi?*

Juvenalis Satyra. v.

Anferit ante ipsum magni jecur anferibus par.

Certum autem est l'quidam hydrocephali è sacco quodammodo constare nutrimento; idem enim satis lentur, qui post ejus evaporationem animadvertitur, demonstrat. Infirmitas pariter materis fœtalem inde quoque ortus fuit, quod sanguis clarum portum crassior plerumque, minusque spirituosus existat magis suppetatur, nec non quia ille per secretinam magis cop'æ tenuis liquoris in capite aliquantum crassior factus, obstructione inde in vasculis sobotta, infernas partes tam bene nutrire nequeat, vel denique, quia tubuli nervorum aliquomodo pressione lymphæ sunt obstructi, unde spiritus satis abunde in partes, pro circulatione humorum nutrimentum propaganda infuere nequeant. Puer autem ille sensum visum amisit, quod tubuli nervorum opticorum paulatim magis, magisque materia viscosa intus contenta obstructerentur, vel etiam nimia ejus quantitate comprimerentur.

De signis, prognosique hydrocephalorum legi poterunt Paul. Agnetae lib. 6. cap. 3. D. Sennertus lib. 2. prax. part. 2. cap. 28. necnon Ambros. Paræus lib. 7. opet. Chirurg. cap. 1.

Dicendum restat, an hydrocephalus queat curari? externus quidem facilius curatur, sed internus, præsertimque locum habens in ipsi cerebri ventriculis, nulla est sanabilis ars, teste etiam Galeno lib. med. introduct. Quam autem medico consistat in medicamentorum internorum usu, longoque tempore ea assuimul debeant, difficile ad eorum assumptionem adducuntur infantes. Balth. Timæus lib. 5. de morbi infans. cal. 5. fol. 144. dicit se puellam bimensem fuisse, quæ tumore capitis insigni, & pellucido ejusdem undique coloris afflicta, tumor in alium elevatus tactui cedebat, rursusque assurgens compressus aque fluctuantis motum probebat sine dolore. Ab humore autem seroso extra cranium, lu-

ter enim, & pericranium collecto, tumorem hunc exciurum fuisse signa modo enumerata satis ostendisse ait, sensum autem, & in utero materno coaceratam esse serum exinde collegit, quod mater aliquoties valetudinaria, & ad hydrotem disposita, toto gestationis tempore poti cerevisia tenuis, sive secundatæ usq. molum aquosi, & serosi humoris cumulavisset. Quare nuricem sanam, & boni habitus subducendam fuisse, cumque infanti tunclo ea medicamentis internis nihil adhiberi posset, externis agendum esse censuit, imposito sequenti cataplasmate, cuius solius usu aliquandiu continuato sensum disparuit tumor. *M. Pulv. rad. cucum. albuini, tridit an. ʒi. sem. cumini ʒi. far. fab. ʒi. mell. anthos. q. f. cataplasma capiti raso calide applicandum.* Laz. Riverius obs. med. à Sam. Formio communicat. pag. 340. infans recens in lucem editi, hydrocephalique laborantis meminit, qui totam caput, cum magna furfurum dilatazione occupabat, dictique sine ullo impedimento, aut alio remedio hunc se catasse, sola scilicet fascia Guidonis in formam cucuphe concinnata, qua totum caput obvolvatur fuerit. Hæc autem fascia, Gallis *Capeline de Guidon*, quotidie renovabatur, & intra 15. aut 20. dies tumorem prorsus evanuisse tradit. Circa hydrocephali curationem inquit Steph. Blancardus lib. de morb. puer. fol. 208. optimum esse calidum, ut caput valde calidum fervetur, sique infantes in cunis decumbant, calidus aliquis lapis, vel arena calida circa caput ponatur, unde obstruções interum telerantur, & lymphæ liberum acquirat transiunt; sudorifera quoque, ut cimetille, hoc casu utilis sunt. Idem collectan. med. phys. cent. 3. obs. 47. fol. 248. exemplum habet hydrocephali cuiusdam in sutura lambdoideæ sui, magnitudinem æquantis panis albi, quales binos argenteorum quatuordecim minimis nostratæ emunt, qui foru quodam ab eodem descripto, præmissa æquorisi debita evacuatione, sublati sunt. H. Montanus Pueror. Pragmat. cap. 8. Opifici coldum instat bovini caput intumuisse memorat, ita ut eo pota faciet, nasulque contegetetur. Huic autem consuleret, ut lignum in os immitteret suatum, quo facilius respiraret. Aquæ ita quidem porto avertentibus à capite remediis, sobriaque vivendi lege percuratus est. De puero sexenni sanato vide Ephem. Germ. ann. 1. pag. 137. Quartior porro, in hydrocephalum, curandi gratia, incidere fas sit? N. Tulpus obs. med. lib. 1. cap. 25. fol. 51. binis hydrocephalis dimidiâ capitis, de quibus supra, Chirurgorum varia inoffuisse ulcera, cutemque non uno dissecuisse loco, sed utrumque, æque improptere cessisse ait, effillante humore magis guttanti, quam eam efflue, ut levaret cerebrum & exhausteret fontem, vitalem calorem aliquem ætæo extingueretur. Deinde, etiam si aq. majori copia ex cerebri cavitate simul effluxisset (quod tamen isto modo fieri nequit) alia tamen in effluæ locum successisset: adeo, si malum diu duraverit, crania valde distensa, & aucta esse, unde posita collabi nequeant. Non minus infelicem eventum habuit infans quidam, de quo Schenk. obs. med. lib. de monstros. cap. conformata. Ex Joh. Franc. phys. Cambricensi fol. mihi 11. G. Fabrit. Hild. Cent. 3. obs. 17. fol. 198. exemplum habet infantis cuiusdam, cui cum tertium ætatis mensem vix absolvisset, caput paulatim accrescere coepit, ita ut infanti caput antequam ipse octavum ætatis mensem attingeret, magnitudinem capitis cuiusvis

hominis longe excederet; usque adeo namque aqua limpidissima extendebatur cranium, ut cutis, omnesque subjæctæ partes pellucidæ redderentur, & posita ex adversa parte candela, aut ad radios solares collocato capite, aqua facillime conficeretur: Interim Chirurgorum juvenem, ingeniosum tamen satis, in consilium adhibuerant, qui, inciso bregmate dextro, aquæ clare ad libram unam eliceret, prima vice extraxit, mox turundam imposuit, & emplastro quodam vulnus obstravit, sed quia caput aqua valde torgebat, ita ut ea continere, & copiose efflueret, vites infanti adeo fuerit debilitatæ, ut intra horas 36. è vita discesserit. Periculosa itaque valde est cranii apertura, & aquæ evacuatio, nec sine ratione continetur enim, inquit ille, aqua ipsius cerebri ventriculis, ideoque si quis illam educere tentet, meninges simul, & substantiam cerebri incidat, necesse est: cerebrum etiam, præsertimque partes ejus internæ, liquefacto, præcipue si diutius ibidem hærent, adeo debilitantur, ut materia nutritiæ illuc deducta in laudabile nutui nequeat nutrimentum. Hanc quoque ob rationem Cæs. Atan. lib. de tumor. sectionem in hydrocephalis internis non admittit; ut nec P. Argineta lib. 6. c. 3. neque M. Aurel. Severinus Chirurg. effie. part. 2. fol. 135. Non nisi externi itaque incidendi erant hydrocephali, nec quicquam adhiberi exterioribus, interioribusque remediis, approbante Ippocrate Galen. lib. med. introduct. c. 18. dum dicit hydrocephali pericranium duabus, vel tribus, prout est, id magnam fuerit, incisionibus aperiendum esse, quæ tres lineæ secundum Arginet. l. 6. c. 3. instituendæ sunt ad figuram literæ H. Idem Patissot affirmat lib. 9. c. 1. necnon Epiph. Ferdin. hist. med. 21. fol. 67. ut & M. Aurel. Sever. G. Placentinus, Forest. &c. Carol. Pilo sect. 2. part. 1. de morb. cap. extr. ab illius serosa c. 1. fol. mihi 52. se ejusmodi hydrocephalum senis cuiusdam multis tam internis quam externis remediis inaccessum adhiberi: fonticulo occipiti iusto periculae scribit. Joh. Bapt. de Lama-verde obs. ad armament. Chirurg. obs. 33. fol. 253. hydrocephalum quandam in muliere quadragenaria curatum fuisse ait, cui diu crudeli capitis dolore interno detentæ, tandem media hyeme caput extrinsecus tumore œdematoso in tantum accrevit, ut duplo fere majus videretur, & oculi amplius aperiri non possent, atque ad pollicis crassitudinem intumescente. Per quam humorum metastasin internam, acutissime dolor externus evasit, multoque levior. In curatione autem caput variis vulnificulis lanciola factis hic illic perforari se iussisse dicit, è quibus serosus liquor copiose exstillavit, sique caput paucis diebus multum deminuit; adhibere etiam fuisse fomentationes, & cucuphe è cephalicis calidis, ac discutientibus confectæ, & sic ægram convalescentem affirmat. Hoc autem malum infantibus, inquit, raro, sed adultis rarissime accidit. *Cornel. Stulp. obs. rarior. cent. 2.*

De periculosa hydrocephali apertura.

Aquæ ad Rhodanum fluvium, in disione Reip. Bernensis superiori anno 1668. puellus ex parentibus honestis, corpore quæntiam satis bene constitutus & temperatis natu fuit, nisi quod mater quæ antea, si recte memini, bis utero gestaverat, etiam natura satis rebulla, totum tamen gestationis tempus præter consuetudinem corpore aliquo modo imbe-

imbecillior fuerat. Nihilominus, nato infanulo, nulla deprehensa fuit in ipso deformitas, aut vitium in conformatione, omniaque ut videbantur, secundum naturam sese habebant, præter oculum sinistram, qui aliquo modo depectior altero videbatur. Quam vero tertium mensem ætatis vix absolvisset, caput paulatim accrescere cepit, ita ut antequam infanulus octavum mensem ætatis attingisset, magnitudinem capitis ejusvis hominis longe excederet, ita enim aqua limpidissima extendebatur cranium, ut cutis omnesque subjacentes partes pellucidæ redderentur, & posita ex adversa parte candela, aut ad radios solares collocato capite, aqua ista facillime conspiceretur in capite. Interim etiam infans continuo valde morosus esset, lactabat nihilominus, & alimenta infanciam mote sumebat, quibus tamen corpus minime nutrebat, sed nutrimentum totum ad caput deferrebat. Porro cum genere & virtute vete nobilissimus vir, Dn. Antonius ab Eilach, ejus loci nomine Reip. Bernensis pro tempore præfectus prudentissimus, fautor meus omnimodo observandissimus, hujus rei inspectionem ocularem ipsemet habuisset, meque ætatem rararum curiosum agnovisset, mense Martio proxime elapso, ut ad se proficisceretur, per literas me monuit, idque ad eum finem, non solum ut infanulum suum bernia laborantem, quemque tunc sub curatione habebam, inviserem, verum etiam casum huncce infrequentem annotarem, ac consilium imo & auxilium meum adirem. Sed quia Burgum Segusianorum, Gallie Provinciam, ad nobilem virum Dn. Jacobum Walli istu sclopeti graviter læsum, tum vocatus fuisset, puerum huncce adire mihi non licuit.

Cæterum, interim dum per menses aliquot Burgi & Lugduni hæsi, Chirurgum juvenem, ingeniosum tamen salis, in consilium adhibuerunt. Is incito brevitæ dextro, aque claræ ad libram unam elicitæ per prima vice extraxit; mox tutandam impoluit, & emplastro quodam vulnus obtinuit. Sed quia caput turgibat aqua, ita ut & continuo & copiose efflueret, vires adeo debilitate fuerat, ut intra horum triginta sex dies decederet, cum meosque oves, & dies quatuor vixisset.

Hæc ex relatione ipsius parentis habeo. Quam enim vicesima die mensis Junii, Aquileam ad prædictum generosum vitum vocatus essem; parentem defuncti infantis, Jean Baptiste Petranz nomine, advocari jussit, qui coram generoso viro Dom. Præfecto, omnia quæ acciderant, narravit.

Vides itaque, vir clarissime, quam periculosa sit apertio cranii & evacuatio aquæ hydrocephali, idque non imminuto. Continetur enim, ut ego bis in hydrocephalorum dissectionibus observavi, aqua in ipsis cerebri ventriculis, ideoque si quis illam evacuat tentat, meninges simul & substantiam cerebri ut incidat, necesse. Hæc autem absque mortis discrimine fieri nos posse, etiam tyrones norunt. Quid igitur, inquires, erit agendum? Profecto ut ingenue fatear, morbum hunc planè incurabilem esse, cum ratio tunc etiam experientia mihi suadet. Quoad experientiam, scio clarissimum acque doctissimum Dn. Johan. Slosanum, apud Colonienfes Doctorem Medicum longe celeberrimum, in infanulo suo, cujus ad calcem observat. 10. Cent. 1. fit mentio, non solum omnem curam, diligentiam, industriam, atque scientiam suam adhibuisse, verum etiam aliosum ite medica clarissimum virorum per Germaniam, con-

silium auxiliumque implorasse, sed omnem, ut dici solet, & operam perdidit. In altero præterea infanulo, cujus io eadem observatione fit mentio, similiter multa variæque medicamenta à vixis doctis frustra adhibita fuerat. Quod ad rationes spectat, nullas negare potest, morbum hunc magnum esse, ideoque juxta Hippocratem extremam indigere remediis. Extrema autem remedia sunt sectio, stillicidium, evacuationes item fortes, & exquisita vitæ ratio. Sed quis quæso hujusmodi remedia in renellis istis infansulis adhibere ausus esset? Adhuc præterea tanta cerebri labectatio atque imbecillitas, ut non solum major pars nutrimenti sui propè in serum converteretur, verum etiam excrementa fetida ex infimis partibus corporis recipiat: solent enim membra fortiora continuo ad imbecilliora demittere. Hinc accidit, quod reliquum corpus hydrocephalorum minime nutritur, etiam membra nutritioni inservientia, optime & secundum naturam sese habeant, ut in istis dissectionibus, quatum observ. 10. Cent. 1. fit mentio, observavimus impendunt itaque agunt illi, qui in hydrocephalis multa promittunt, sectionemque tenant. Tibi quid videatur recitæ. *Gulielm. Fabric. Hidan. Obs. Chirurg. Cent. 3.*

Artificiosus Hydrocephalus.

Anno 1593. Lutetia Parisiorum puer quindecim aut octodecim circiter mensium ætatis vius est, cui capitis ita extensa erat cutis, ut magnitudinem caputem infanulorum, quorum observatio decima Centuriæ primæ fit mentio, excederet. Parentes autem hujus infanuli ipsum de oppido in oppi um circumvehabant, ac ut monstrum videndum exponerent, indeque maximum lucrum quaestione recipiebant.

Tandem vero cum concutus hominum esset magnus, & magistratos Parisiensis pro singulari sua prudentia dolum malum & fraudem subtile suspicaverat, parentes in vincula conjecit. Quæstione adhibita, delictum crudele atque impium falsi sonitum, nimirum se cutem capitis infanuli sui, circa verticem ad musculos usque incidisse foramine parvo; ac per illud ipsum (inter cutem & musculos immixta fistula) incidisse, ac paulatim, & intra menses aliquot (insillendo singulis diebus aliquoties) cutem capitis infanuli in istam extendisse alacritudinem, cuiusque hinc inde per Galliam, quaestus facienda gratia, videndum exhibuisse.

Foramen autem ea industria fecerant, ut extra fistula, cetera aut simili aliqua materia illud facile obstruat possint. Nefandæ ac immanis scelere satis explorato ac cognito, parentesambo morte multati fuerunt.

Historiam hanc nobilissimum Dn. Ludovicum Wallier, (qui se puerum huncce Parisiis vidisse affirmat) præsentem nobilissimo Viro Domino Philippo Deshayes, Domino de Molondins, mihi anno 1609. 23. Mali communicavit, eamque hic adiecte videri esse. *Idem ibidem.*

Hydrocephalus Incipiens Curatus.

Anno 1667. Hannoveræ curæ meæ subministrabatur puer sex annos natus, hinc in tantum caput auctum erat, ut mule vel juvenis 18. annorum caput æquaret: totam verò cum naso faciem occultaret, artus è contra & venter tæbescerant. Ego primò omnium suadeo, ut quantum fieri possit, baculo

baculo fo os immisso illud apertum teneant: hinc capite raso singulis diebus, bis aut ter, caput oleo chamemelino in quo stachas Arabica, spica, lavedula &c. per aliquot dies infusa erant, fongo, inde aqua vitæ Anhalina abluit. Nonnunquam quoque aquam St. Elisabethæ Regiæ Hungariæ applico, liotetique madefacta frequenter foveo. Utique Cruri cauterium applico, corpus quater singulis septimanis cum Symplo diaconi purgo, in potu semper aliquald, de oleo rasiati per deliquium fuscit exhibeo, in cibo sæpius aniso, cumino, aneto ut utatur suadeo. Hoc modo, sensim caput detumuit, veotet & artus nutritionem suam recipiunt, adeo ut intra duos menses puer ioregæ sanitati fuerit testificatus. *Alardi Herm. Cumini.*

Anatomica Inspectiones.

Bogislav Nicolai, &c. Sexto mense gravida abortum rejecit, cætera non inelegantem, sed à temporibus & fronte nucham vertus tumore ingenti deformem, qui mixta Turcica similitudinem gerebat: Mox tamen sponte aperta propè sinistram autem eue, evacuataque inde aqua loturæ catenium simili, concidit & staccida eue quasi disparuit, nisi quod immisso stitu eandem figuram turbinarum & ovalem nancisceretur. Relecta ista in particulis membrana crassiore, calvaria ostendebatur naturali forma, sicut in puerulis solet: E jugularibus autem venis, intra procellum ossis jugalis temporum, ambiens & futuras mendolas, ad os frontia ulque sese ostendebat, proximæque cum pericranio copulatus cernebatur, qui crassitie stilum ferreum intortum teferebat: Iconem non addo, illi hydrocephalo similem, quam dedit M. A. Severinus de Ablesci. cap. 9. ut ovum ovo similis non sit. Th. Bartholin. tract. de Cometa, pag. 97. ex communicatione I. J. J. H. Flammetici Med. Helsingensii.

Augustæ Vindelicomum puella bienni caput in mensibus plus minus septem ita increverat, ut nullum viri quovis viderim quod non mole illi cederet: fuisseque illa affectus quem veteres hydrocephalum vocarunt, ab aqua que in capite asseruatur, sensimque colligitur: Quoniam ea non inter calvariam & exterius ipsam succingeoem membranam, aut cutem, (ubi alias aquam reponi Medicorum libri docent) huic puellæ fuerit collecta, verum in ipsius cerebri cavitate, adeoque in dextris sinistrique illius ventriculis, quorum cavitas amplitudineque ita increverat, ut ovum fere aquæ libras, aut tres Augustanas vini mensuras continerent: Adhæc, ut cerebri in capitis vertice, membrarum quali modo erat & quodammodo continuum cum tenui sua membrana corpus, ita quoque calvaria fuit prorsus membranæ, tantaque duotat sede ossa, quanta calvaria puellæ erat amplius, priusquam caput extra modum intericeret: ea fere ratione qua in nuper natis pueris frontis os & verricis ossa constare cernimus, ubi illa alioquin mutuo sunt contemina, & in admodum pueris insigni intervallo amplitudineque visuntur membranæ: Cerebellum interim, cerebrique universa basis secundum naturam habebant, uti & nervorum productioes: dein nullis prorsus sedibus quam in cerebri ventriculis, adeoque atque disti adactis, aquam tegeri, & puella ad mortem usque sensibus omnibus integris est usa: Ex quoties caput, quam illum paucis ante mortem diebus conspexi, ab adstantibus movebatur, & nonnihil, quantumvis etiam leviter, erigebatur, gravis illico rursus puella molesta fuit, cum

difficili respiratione & totius faciei micro rore, sanguinisque iustulione & lacrymarum proventu: Reliquo corpore mediocriter habuit, erit laxis infimisque, sed oon resolutis tamen fuerit articulis, neque præsentem etiam infirmam macie, aut etiam sero in membris tumore, aut morbo comitali, aut tremoris alicujus notis. Jecur cum paulo post mortem spectaretur, subpallidum, & nonnihil naturali alias jecore contractus densiusque occurrit: Liene interim maximo & molli conspicuo, perinde ac si jecoris vices aliquando obivisset: Adeo ut cum præsentibus Medicis nihil æquè admiratus fuertim ac tantam aquæ vim in cerebri ventriculis, abique majoribus symptomatibus tandiu collectam fuisse. *Vesalius Fabr. corp. hum. lib. 6. cap. 5.*

Difficabatur Lugduni Batavorum ann. 1666. Infans unius anni, à puero hydrocephalus: Ex hujus capite D. Van Horne extraxit vicias 36. aqu. limpida subfalsa: quibus extraxis adeo apparebant condita vacua, ut quis existimare potuisset cerebri hic plant dehere: sed oculi acie rō penitus detecta, apparebat cerebri nequaquam desule, sed amissa saltem figura globosa, indusile formam convexi fornici & ab exuperante aqua sequacem ejus medullam adeo foille distentam, ut instat alioquo crassiora membrana, adhærebat ondiqne arcuata ossium circumferentia, ita tamen ut tam exterior cinereus cortex, quam interior albicans medulla optime discerneretur. Præterea t. sub eue nulla cooptiebat pinguedo. a. lo thotace ootubilis aquæ quantitas, illi que in capite continebatur similis, 3. venes adhuc inæquales. 4. glandula pituitaria & pinealis nullum vestigium, in pavimento tamen cerebri notabantur aliquo filamenta nervorum, materia quadam mucilaginosa obiecta, quæ credita sunt esse filamenta seu propagines nervorum sexti paris. Ex observationibus Alardi Hermannii Commisit, Atchisti Brunsvicensis in Miscell. curios. ann. 1670.

Infans octimestris hydrocephalo affecti à Cl. Hornio dissecto capitis perimetret erat 1½. unæ: Tumore digito prementi cederat, non remanente vestigio; Cranium ossa, quamvis habebant ab joviem, eo quo pueris solent loco, solito tamen ampliora erant, magis tenuia, ita ut cultro commode secari possent; non multum abulmilia coramibus ex quib. lucerne fiunt. Dura meninx cranio adiffimè annexa, aqua, nec inter cutem & pericranium & cranium, nec tute hoc & duram meningem, oec, quamvis obfervari poterat, inter meningem, sed intra ventriculos cerebri laterales continebatur; ejus quantitas octo pintas laterales, five 156. uncias medicinales, b.e. tredecim libras excedebat: aqua erat limpidissima, nullo notabili sapore prædita, nisi quod aliquantulum ore detenta, salugine quadam linguam ferret: Cerebrum amplum, & pueri cerebri densius densiusque. Ejus austractus omnes peotus obliterati, contra cerebri lamina egegie distigebantur, Cerebellum totum cerebri minus affectum, vasa quædam per suspensicem cerebri (sepeuria sanguine ruidia, sinus falcis superior planè sanguine vacuus: Cerebri sinus laterales, quibus aqua continebatur, pro quantitate aquæ distenti, adeo ut totum cerebri nonnihil saccus videretur. Glandula pituitaria staccida & laris magna; glandula pinealis ovula inventa, nescio an errore dissecta ablarave: In plexu choroide glandula nulla observata: radia spinalis medullæ quasi lo filamenta fissa, quod memini in cerebri ovium aliquando obfervasse. Omnes fere corporis glandulae solito majores, in musculum totum plurimis glandulis rubeculis, lenesque parva: æquantibus consunt. *Manbians Pajensius in miscell. cur. ann. 4. §. 5. obs. 197.*

Solutio

Solutio continui contingit aliquando in cerebro à causis internis &c. Vera autem causa est aliquando et capitis funditur solvantur magno spatio : quod vidimus an. 1598. in filio Dom. Merindoli Aquisanis, è cujus capite dissecto effluxit ingens copia feroci humoris, qui in ventriculis & tota cerebri substantia inclusus manebat : Distabant autem summe 4. fere digitis à se invicem. *Jacobus Fontanus præli. lib. 1. cap. 3.*

Vidi quatuor infantes hoc capitis affectu laborantes, è quo numero unum mortuum dissecui : Et sanctè testor cerebrum me reperisse pilam palmariam vix mole æquans : neque sanatum vidi cui aquosus humor partibus internis conclusus est magna copia : si verò partes ætiores obsideret, sanationem non reperiit : si ergo humor inter cutem musculosam & pericranium, aut inter hoc & cranium, si pauca iosis quantitate, resolvebatur tentanda ejus discussio. Si non succedat, ad incisionem transiit fiat, vitato maculo temporali, expressio inde humoris lorum carolum simili : ater aliquando sanguis concluditur : si contusionis soboles sit, sanguinis grumi humores permixti aderunt : humore vacuato, linteis disceptis infunditur vulnus oppletur, factaque idonea ligatura, eaque artia ad cicatricem deducatur, *Parenti oper. lib. 8. cap. 1.*

Decennis puer percussus est cum ense in parte superiore capitis ; hic passus est vulnus satis magnum, cum incisione ossis, velaminum, & depredatione substantie cerebri, nam hæc exivit quantitate nucis juglandis : curatus convalescit citia noxam. Hic post tres annos, consensibus succis ad partem debilem, hydrocephalo correptus emoritur.

Apertum caput sine cerebro est inventum : dura meninx in conspectum apparatus duplicata, hæbebat tamen in se aquam limpidissimam, bonique odoris, quæ ab adstantibus gustata, insipida videbatur : at in præsentia puriliginis tantæ jocundum odorem persentienti monitrosam est, cum ingens corruptio graveolentiam ex se prodire manifestam. *Zacutus præli. admin. lib. 1.*

Colonie multoties inivis puerum robustissimis pauperibus natum, cui caput in incredibilem molem increverat, ita ut ipsius rotunditas ulnam & quartam partem ulnæ Coloicosis, ejusdemque altitudo, ab una aore ad alteram, ulnam cum quarta parte excederet, non autem sic natus erat, sed cum septimum mensem ætatis vix attigisset, coeperat ei caput monitrosè excrefcere : nullus præcesserat morbus, reliquum tamen corpus vitiose nueriebatur : verum caput intra menses 30. paulatim in illam magnitudinem accrevit, ac tandem puer in soporem lethargicum incidit, nec ita paulo post chitit.

Cranio dissecto, invenimus in duobus antetioribus cerebri ventriculis aquam crystalli clariorem, ad libras Colonienfes 18. illa autem omni solium ventriculos, sed & substantiam cerebri distodebat, ita ut totum cerebrum (cerebellum excipio) in sacculum exanderetur : hinc fiebat et circumvolutions & gyri cerebri non coalescerentur, sed tangerent omnia, dura & pia matres integre erant, atque ita dilatate et totum cerebrum operient : cranium similiter dilatatum erat, sed passim membranosum, potius quam ossium : tertius ventriculus antetioribus confusus non apparebat : in quarto viscidam quandam materiam, parva tamen quantitate invenimus, reliqua in cerebri basi secundum naturam erant, nec reperiuntur meatus per quos serotina ille humor ad caput delatus fuerat, quantumvis accurate dispiceremus omnia : Partes vitales & naturales petquam sanæ erant, unde

eorum functiones parum ladebantur, ita ut vix febre uoq. am laboraverit, quinimò edebat, bibebat, excruebat, & dormiebat ut sanus, ipsa tantum deerat nutritio : totum enim corpus (excepto capite) petenigum & extenuatum remansit ; adionibus autem animalibus, quæ ex cerebro prodeunt, puta ingenio, loquela, visu, &c. destitutus fuit, brachijs autem & tibias, labia, palpebras, oculos voluntarie vix movebat, at involuntariè capitis h.c. coarctabantur & convellebantur continuo, abique tamen dolore. *Fabriz. Hildanus Cens. 1. Obs. 10.*

Humor capitis hydropem inducitur, inflat, & extendit interdum tam late oobile hoc mentis palatium, ut in ætate tenella, nonnunquam excedat magnitudinem vitilem. Delitescere aqua, non minus extra, quàm intra calvariam : & utrobique, modo supra, modo infra membranas obvolventes, vel cerebrum, vel calvariam ipsi circumpositam.

Puer quinquennis, dissecus in valetudinario publico, congesterat in capite tantum liquoris ut visitata naturali figura, tantopere inter se desicerent dissoluta ossa : ut dilatata ipsorum compages, haud parum discrepat à vitili magnitudine. Cui oceris impar cum foret exile corpusculum, coquebatur, vel perpetuo desidere ; vel assiduo incumbere cubili : saltem coque, dum fixam miseriam imponeret mora.

Qua defunctus ostendit, in capite suo detinere ; quinque aquæ libras : quibus effusus, fete omnia adeo vacua, ac insanis, ut plerique Medicorum prætorium, sed præpropere, judicaverint hic conspici, caput sine cerebro. Ad oculi acie, illac penitus directæ, vidimus satia peripice cerebrum ooo defuisse : sed amissa figura globosa, induisse formam convexi fornicis : & ab exuberante aqua, sequacem ipsius medullam adeo fuisse distentam, ut inflata aliquos crassioris membranae, adhaeresceret undique, arcuata, dissolutionem ossium circumferentia. Miscebantur autem summpere, qui sectioni inmerant Medici, qui, ex tam deformi cerebro, & medulla adeo extensa, ac irrigua, proderint (quod tamen sanctè adseverabat pueri pater) lotergeta mentis munia. Quum in aliis, vel solius figuræ vitium, inducat, siue morbum antonium, siue lebergium, vel fatuitatem, vel insaniabilem aliquam amentiam. Aliis veto suggestit, confusa hæc lotricæ cerebri congeries, inexpugnabile argumentum, adversus distincta illa loca, quæ nonnulli assignant, cui libet animæ facultati. Alii vicissim credebant, hic confirmari dogma Aristotelis, assentens cerebrum, non mentis ergo, sed refrigerandi cordis causa, constructum. Et prout quicque, vel amore, vel studio fuit, in hanc illamve partem, pro eo, etiam auxilium eiecit, vel hujus, vel illius tententiam. Sed exercitationes, confugiebant ad ingenuum illud : Quantum est quod nescimus ! velut namque in aliis, sic centè credibile est, potissimum nos excutire, in genuino cerebri regimine : cuius opera multo fortissimè sunt diviniore, quàm quispian hætenus, suo comprehendit caput.

Sicuri autem priori ptero, totum caput : ita protuberat aliis, duntaxat media ipsius pars : hærente liquore, vel in dextro, vel sinistro cerebri ventriculo. In quorum alterutro, memini me bis vidisse, oltra duas aquæ libras, inclusas tam stricte uni illi parti ; ut altera foret planè illæz ea integra. Insisterat quidem hisce caputibus, ulcers chirurgus, & dissecuerat non uno loco, cutem : sed utrumque, æque improspere exallante humore magis guttatim, quàm tam effuse, ut levaret cerebrum, & exsorbiret

fontem, vitalem calorem; alias cerdè extinctum.
Nicol. Tulp. Obferv. Med. lib. 1.

Anno 1676. Calendarum Januarii decimo septimo discipuli Leovardiz septem menses abortum. Mater gravida ac paupertula desiderabat comedere carnem vaccinam saltam, quam pax egestate ad habitum habere non potuit, tandem à vicinis vel ab aliis civibus candem nata est. Cum potèd fere satiebat, quidam cornice fores pulsar, quas ut aperiat, à mensa surgit & per gradus descendens, cecidit, frustum istius carnis adhuc bucca tenens. Postea abortivit. Abortum paulo post præsentè Augustino Reinaldo aliiq; Chirurgi aperuimus. Caput permagnum, intra spatium crassæ & tenuis meningis duæ circiter librz lymphæ cruentæ continebantur, glandola pincialis solito maior & lymphæ turgida. Cerebrum aquosum & molle. In ore habebat vesicam lividam & carni salta, colore similem; primo inuitu carnosum quid esse putabam, sed incisione facta, lymphæ uncie fere triginta ad laqueare vi quasi adactæ saliebant; hæc vesica totum os implebat ac linguam adeo premebat, ab interiore gingiva oritri videbatur, cum alias ortum multo posterius habuit. Cystis aquosa videbatur mihi esse partem orophagi posteriozem, & hinc liquet cur ventriculus adeo parvus erat, hujus vesiculæ constituendæ gratia, ventriculus insum trahi debuit.

Potèd quoad hydrocephalon ex lapsu matris ortum, dicimus matrem unà cum fœtu eadem quasi vita fini, eodem modo ac surculus arbori interitus: omne enim quicquid patitur mater gravida, idem patitur embryon; matris terror fuit & embryonis; vascula lymphatica matris, satis rigida ac tenacia; ante ne à terrore rumpantur, sed in fœtu nondum excluso mollia admodum, ac facillè fragilia, unde vascula lymphatica, cerebro contenta, ruperunt; liquorque effusus, cranium necdum coaleum, immensum dilatatum, hinc hydrocephalus seu capitis hydrodrops. Sed unde vesicula ori contenta? Experientia satis docuit, quid non possit matris imaginatio. Fibre nempe orophagi adeo à liquore ex rupis lymphaticorum vasculis dilatate fuerunt, ut vesicula extra os quasi propendere coacta fuisset; interius vascula quædam in sanguine, cruentem reducere impotentia, rubedinem & livorem vesiculæ induxerunt, eo modo ac si carnem saltam, vocatèr à matre ingestam representaret. *Sepp. Blancard. Anat. præli.*

Hydrocephalus cum vesica carnosæ circa suturam sagittalem.

Anno Christi nati 1666. die 7. Martii, Norbergæ, uxor J. W. terroris fecit, juvenula, & anno pæterito oupra, filiolam peperit facie quidem formosam, sed capite monstruam, in cuius apice, circa suturam sagittalem excrecentia vesicæ instar, aqua repleta, multo maior puellæ capite prominuit, rotunda, rubicunda, tactu mollis & pellucida, maculas aliquas habens nigricantes, putredinis accedentis indices; circa radicem cutis apparuit naturalis & pilosa; Tertio post diè noctu vesica hæc multo quam ab initio minor, sponte per vesiculas hinc inde exortas & apertas multum humoris ferofi & rubicundi instar lotæz ornis exsudavit: Ideo 10. Martii Fredericus Kühn, Chirurgus celebris, accessit statim hanc vesicam monstruosam in parte anteriore versus radicem aperuit, cumque multum humoris ferofi instar lotæz carnis effluisset, totam vesicam jam semiputridam, ad cutem

usque naturalem abscedit, absque nullo puellæ ejaculatu. Digito cavitatis superficiem explorans, ad magnitudinem ovi gallinacæ, cranium nullum, sed loco illius cuticulam expanfam reperit. Adhibitis postea emplastris suppurantibus aliisque remediis convenientibus, effecit ut cutis ad radicem vesicæ abscessisse posita sensim abscesserit. Infans inde lac quidem materiam fugens & pulce pro more comedens, valde tamen debilis, diè decima denique vitæ suæ mortem obiit. Posthinc accuratiori facta inspectione in loco concavo excrecentiæ abscessisse, subius cranium nullum, sed meningis apparere, nec intus in latere dextro cerebrum, sed loco hujus carnosæ & glandulosæ moles, in sinistro veto latere cerebri substantia naturalis inventa fuit. Ex communicatione D. Pauli Freheii.

Scholien Helwigianum. Præfili communiter statunt Hydrocephalum esse tumorem, seu collectionem humoris ferofi, vel in toto capite, vel in parte aliqua capitis, scilicet nunc inter cutem & pericranium, nunc inter pericranium & cranium, nunc inter cranium & cerebri membranas, nunc inter membranas & cerebrum, itemque, Vesalio attestante lib. 1. de corp. human. fabric. cap. 5. & Fabricio Hillano cent. 1. obs. 10 in ipsa interdum cavitate cerebri. Causam autem hujus morbi constituunt duplicem; internam, nempe cerebri calorem debilem, cum cerebrum nimis refrigeratum ac humidatum, alimentum rectè elaborare, vel humores ab inferioribus partibus transmissos discutere nequit; vel cum vasa capitis rutescant, & aquosam illam substantiam, quæ sanguini mista, in locum aliquem effundunt; Externam causam atque evidentem, plagam seu contusionem, quæ præsertim ab Obstetricibus fœtui in partu, vel alibi radius contrictæ & appressio capitis inferatur. Inde morbus hic in infantibus, quam in adultis, ob calvitæ ténerratem, frequentior, periculosior, ac ut plurimum lethalis. De diagnosi, prognosi, & curatione hujus affectus latè satis scripturæ Daniel Sennertus lib. 1. Præx. part. 1. c. 28. & Ambrosius Paræus lib. 7. Oper. chirurg. c. 1. Hydrocephalum nostrum in utero ex interna causa ortum suum habuisse, historice series demonstrat, ac paucos dies vixisse. Alioquin cognovi Ratiponæ uxorem cujusdam vigilum præfecti, impetamenti frigidi & humidii, corporis obesi, fere quadragenariam, quæ sæpius lingulis pene annis, accrescente Luna, calvitæ furoris se dilatantibus & adactis capitis tumore, hydrocephalem singularem patitur, sed malo huic mature hydragogis, præsertim gargarismate quodam certo occurrat. Duorum hydrocephalorum etiam meminit Thom. Bartholinus observat. anatomic. cent. 1. observ. 28. Curationem & anatomiam hydrocephali ab Alhardo Hermann Commisso conscriptam lege in Miscellaneis Anni primi Academ. Naturæ Curiosor. obs. 46. & 47. Nicolaus Tulpus habet etiam lib. 1. observat. medicar. c. 25. historiam hydrocephali, ac ejus curationis infelicis. Jo. Petrus Lotichius lib. 2. consil. & observat. medic. capit. 1. obs. 7. refert, sibi Anno 1633. Mindæ puellum ejusmodi semetipsum coofili causa oblatus fuisse, sed noluisse quicquam tentare, ac sub prognostico illum dimisisse.

Additionum Schroëli. Omnis morbus monstruosus quid is se cuniet, cum præter Naturæ ordinem & intentionem generentur. An verò Hydrocephalus proprie sic dicta inter Monstra referri queat, merito dubitatur. Communiter oon monstrorum, sed morborum in catalogo ponitur, & illustris Thom. Bartholinus in tract. de Cometis, abortum,

Hydrocephalus vitio spinæ bifida.

abomino Helingorensi hydrocephalum, quem pro monstro vulgus habuerat, morbis, non monstris, adnumerandum fuisse, deceat. Hydrocephalus unicus, dum non nisi hydrops capitis existit, semper morbus est. Quandoque tamen revera monstrorum numerum augere probabile est. Id quod parebit, si monstris definitio el apud Pet. Borellum, quod juxta Læcetum alioque, est Vixens tuberculose, membrorum constitutione enormi, videntibus horrorem cum admiratione incutiens, raro admodum nascens, ex secundario naturæ instituto genitum, propter aliquod impedimentum in principis suæ conformationis. Fortis enim, cujus caput ab ingenti fœt copia in immensam molem extensum est, deformi loco & improporcionado capite, videntibus, non tantum vulgo, sed & Medicis horrorem cum admiratione facile incutere potest, in primis cum rarus admodum sit, paucisque Medentibus videre tales contingat, ac fortum magnopere deformet. Cæterum ex secundario Naturæ instituto semper generatur varias ob causas, interdum etiam propter aliquod impedimentum in principis suæ conformationis. Hydrocephalum itaque & morbosum, & interdum quoque monstrum dari, dici posset. Ille non tantum embryonem, sed & adultus invadere valet, collecto nimirum p. n. in capite aquoso humore; præterea intra cranium quandoque consistit, laterique, qualem Pet. Borellus cent. 1. hist. 8. describit; unde nec deformis nec horridus videntibus asperare potest; interdum in fœtu sine errore formatricis in utero, abundantis, & vel ibi sponte stagnantis, vel ob externam aliquam violentiam, ubi percussionem, casum &c. cum primis in partu contractam durius & compressam ab incauta vel impericia obstetricis manu tenellulam calvariam, collecti feri soboles esse potest. Hic autem, scilicet monstruosus Hydrocephalus quod dicitur, ipse Bartholinus laudatus nō planè contradicit, dum à morbo illo Helingorensi actionem sympathicam excludi haud posse, cum Cl. Friderico Hammero assumat; hæc enim, refert, mulieri hoc facta gravidæ in fixa memoria info tunum, quod p. n. ejus culpa infanti Chirurghi acciderat, qui in lebetem ferventis aquæ demetris paulo post exp. raverat. Sic etiam Guil. Fabric. Hist. cent. 5. obs. 3. pællam ætatis undecim ante duodecim circiter annorum, ob inceptivam curiositatem, continuo circa infanimum hydrocephalicum fuisse versatam, caputque ejus tractasse commemorat, tam alie memorie ejus idea hydrocephali impressa, ut aliquot post annos viro cum nupisti, roto gestationis tempore monstrum illud caput continuo ferè ante oculos ipsi observaret, scitumque pariter hydrocephalicum enixa fuerit. Imaginationem itaque hujus mali præcipuum fuisse causam apud me, sic Hildanus objungit, nullum est dubium. Idem confirmare posset hist. à Levino Lemnio lib. 1. de occult. natur. miracul. cap. 4. descripta, p. internam etiam capitis, stupenda magnitudine, à phantasia matris ex conspecta hydrocephali pictura atrox, deformari constitutionem traderet; ubi quidem fœtus copiosus non defuisse, suspicari licet. Et cur phantasia carnosas, aliasque præternaturales exescentias embryoni capiti sæpius adnectens, humoris feroci cutis uberior ad partem illam pariter aniam præbere nequeat? Quisquid sit, præsens casus, ob miram, quæ post mortem comparuit, capitis constitutionem, monita inter referuntur potest. *Alardi Hermannii Comm.*

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Anno 1683. d. 22. Febr. natus est infans magnus Parentibus quibusdam magni nominis, non sine magno gaudio. Sed ubi statim post partum tenelli infans corpus paulo exactius examinarum, duos tumores, unum lo occipite, alterum in spina dorso offenderunt. Ille in medio occipitis juglandem magnitudine æquavit, tactu mollis, colore fusco, multis pilis obfusus, similibus murum pilis. Mater hujus tumoris causa fuit, ut postea dicitur. Alter tumor in spina dorso, magnitudinem ovi asserini habuit, initium sumens ab ultima thoracis vertebra, tendens usque ad os coccygis, colore sanguineo, tactu mollis, inflar fungosæ carnis. Ad latera vero tumoris spinæ dorso divise, margines neringe facis lacerantes digitis tangi & distinguui potest. Medicos & Chirurgos consulente, quid circa istum tumorem agendum? Chirurgorum intemptiva suppuratio rejecta, Medicorumque opinio admissa, nempe & naturam tumoris & conditionem corporis infantis requirere lenia exsiccantia ex variis herbis & floribus, quæ etiam adhibita, & sæpe quotidie tumori calide imposita.

Secundo à partu die apparuit totalis utriusque pedis paralysis à coecondice usque ad plantam, non sine suspitione illum morbum ortum vitio spinalis medullæ. Varii spiritus & aquæ spirituosæ membro affecto adhibita, sed incassum, uti etiam exsiccantia pro curando tumore.

Interea caput sensimque in molem præternaturalem extensum, ossa calvarie nec dum ferruminata ad pollicis latitudinem & amplius ab invicem distare observata, petricranium pellucidum & reliquum corpus macie consumi deperchensum. Lacte interea vite tenellis nutritus, excrementa debite reddidit, somno relictus & cæteræ mediæ & infimæ ventris functiones integre repetæ, nil quod tussiret quandoque & difficulter respiraret, quæ tussis eo aucta, ut sub initio. Mali usque ad finem vitæ cum sterore & sonitu clangosum duxit spiritum.

Interea moles capitis adeo aucta, ut truncum corporis præponderaret, cum summa misci infæcia molestia.

Die 28 Maii placidissime hic infans absque motibus convulsivis animam efflavit.

Die 29 Eisdem; permixti Parentem, corpus exa: oime disquisitioni anatomicæ subjectum

Aperio abdomine, nullum fere omentum, nisi tantillum, quod fundo ventriculi adhæsit; intestina verò laudabiliter constituta reperia. Venterculus, hepatis, renes, optime, in pectore pulmones & cor absque omni culpa.

Exemptis his, spina dorso ab altera parte tumorem supra descriptum, obtulit.

Quo dissecto duo cochlearia aquæ insipidæ & limpidissimæ, crystalli inflat efflueret, nihil cruoris, nihil substantiæ fungosæ vel peregrinæ; nihil, quod magis, spinalis medullæ, reperiunt, filamenta quædam alba & tenuissima si capillis rodere potius membranas investientis spioalem medullam, quam nervorum.

Vertebræ vero ipsæ, ab ultima thoracis usque ad os coccygis suppurato, in utramque partem dilatata, admodum deformes, quarum structura depravata spinæ bifidæ, quam Tulp. in obs. 38 l. 3. exhibet, tam similis est, quam ovum ovo. Per foramen ultime thoracis vertebra hæans in apertum tumorem.

O e a &

& explicatas lumborum vertebrae, stylo Chiruegus penetravit, usque ad tertiam colli vertebra.

Medulla spinalis in utramque crus nulla divisio, quare tota in liquorem limpidum soluta, curibus nibili virum affere potuit.

Potro caput in tantam molem cœtum insolita promissit.

Pericranio facili negotio in cruce dissecto, ossa cranii insanum more nullibi conglutinata, in naturali statu omnia apparebant, nisi quod longius quam solent, & latum pollicem ab invicem squjungebantur.

In medio quoque occipitis osse, rotundum foramen, crassum digitum admittens, in conspectum veniebat, omnino præternaturale, pericranio eo in loco, ut principio dictum, in levem tumorem elevato, ac pilis confuso.

Meninx dura piaque, ut & cortex cerebri, quoad externam faciem, erant finissima. Cum vero in cerebri corticem ad ventriculos ejusdem explorandos cultet suus, viderant corticem non excedere calami scirpenti crassitudinem, quo separatò, loco ventriculorum offenderunt amplam quasi vesicam, repletam limpidissima & insipida aqua, quantitate oncia quinquaginta excedente, neglecta ea quam spongiae & lineamenta imbibuerunt.

Hac effusa collapsi cerebri ventriculi manifestò docuerunt, illam in utrumque ventriculum per corticem, medianibus tubulis, à recentioribus Anatomicis passim descriptis, delillasse, undique sua copia cerebri substantiam, cranium, pericranium extendisse, atque capiti illam deformitatem conciliasse.

Reliquas cerebri partes, glandulam pinealem, nates, vulvam &c. examinare non permisit præceps aequatum affluxus, & hanc infusca partium illarum confusio. Ex cerebello tamen adhuc integro, & naturaliter constituto pars in spinam dorsi pro medulla deferrebat, quæ solummodo unam & alteram thoracis vertebra afflicta in brachia dimittebatur pro motu illis conciliando. In reliquis thoracis vertebri medulla sensum deficiebat, & in prima lumborum erat plane nulla: Altera pars cerebelli in aquam cerebri per occipitis ossis foramen insitatum supra descriptum, propella, ibi tumorem illum pilis confusum formabat, qui signata muriformis ante obitum credebat.

Mater Infantis quædã, an tempore gestationis terrorem ex re aliqua adversa passa sit, unde signaturam illam muriformem fetus acquisivisset? Respondit, se quidem à muribus ordinario non moveri, sed accidisse ante 4. menses, ut maritus parvulum sacculum herbarum odoriferarum plenum, lusus ergo ipsi ex improvviso in occiput jaceret, quo perterrita sibi imaginatam esse, matrem ab alto in occiput cecidisse, & citius locum affectum digitis parum fricasse.

Cui verò tumorem spinæ adscribere deberet, nescivit: Nisi quod cecidisset aliquoties graviter, & semel cervi copulam vertebrae ad alium econonomicum in longum diffundere paulo attentius inueta sit. D. Joh. Lebelli.

In Hydrocephalo, qui puerilis & jam pridem notorum, forte etiam nascentium, est morbus, serosa colluvies nonne cerebrum atque membranas, stans membranas & Cranium, Periossiumque & crum inter, septus tamen in Cerebri cavitatibus, ut quæ natura excipiendo sero sunt destinatæ, deprehenditur. Unum ego Hydrocephali anatomicam, quod rara sit minusque pro sui prelio descripta,

curiosius exponam. Anno vicesimi seculi sexagesimo sexto à B. D. van Horne, Anatomico celeberrimo, Infantem dissecti vidi fere septuagesimum, cujus caput jam inde à ovaritate ex Hydrocephalo tumescens tandem cæteri corporis statutam enormi magnitudine infamata & vitam copia inundantis feri obruere cepit. Utrum septuagesimus Criticus tantopere nonnullis & ipsi M. A. Severino, in Hydrocephalo Hilandi & ipso septuagesimo, formidatus, an secretor impetus tempus hoc defuisset, superstitionis oculi caloribus interpretandum relinquo. Certe Infanti nostro statim à partu secundum omnes dimensiones caput in majus augeri cepit, invalescente tumore ad mortem usque, adeo ut peripheria capitis æquaret unam ferè & dimidiam. Reliqui corpulculi & ipsius vultus proportio longè pro stilo capitis ossis tumore minima; iustas universis tranco vultuque detractam humiditatem in unum caput concessisse, adeo macra omnia atque strigosa. Tensa quam maxime capitis caris, nec Periossium, ullis aquis rigabantur, ubi tom ossium compages alia apparuit, quam esse solet. Hiatus ille rhomboides, Fontanellam vocant, longe patentior quam oportet, continuato etiam per suturas, sagittalem & coronalem, plus quam digitali divortio, satis ostendebat subiectam Cerebri molem in dies auctiorem coarctum impendisse, atque hinc in illo futurarum divullarum spatio curis ipsa cum dura meninge arctissime concreverat, adeo ut laboriose fecerim potuerit. Tenuiora adhuc videbantur Bregmatis ossa & cornea fere, in oris etiam quæque suis cartilaginosa ad notabile intervallum, ubi radiantium fibrarum ostentum lufum pulchre animadvertere liceat. Nulla interim aqua, neque cranium inter & crassam membranam, neque hanc & tenuem, superficies duntaxat cerebri solito humidior; hic vero ingens cerebri tumor complanata undique superficie, manducatorum, qui alias distinguere corticem solent, vestigia abolerebat, adeo & venæ, quæ copiose strigate cerebrum debebant, pauca apparere, & in ampliata propulsaque Cerebri convexitate exiles. Itaque, cum intus ali monumentum videretur, acum admovet Anatomicus, qua in Paracensis visceribus, cerebrumque, cujus passim crassitudo vix digitum æquabat, percutit. Fluere statim limpidissimi feri rivus cepit, quem, quod deliquium mensendum non erat, ad uncias CXXII. non numerato, quod in antrobus cerebrique basin le diffuderat, excepit. Subsistebat interior Cerebrum pro ratione & modo fluentis aque, jamque formam & magnitudinem subsidentem amiserat, cum interiora ejus cultro rimati curiosa manus cepit; reperit autem ipsam illam Cerebri substantiam remanere admodum, intus etiam rarissimis sanguinis permeantia vestigiis persulam. In Ventriculorum fundo lenta reliqua erat & pituitosa Lympha, quæ se glutinis instar parietibus cerebri medullaris & ventriculorum limbis applicaverat. Quid quod radix Cerebri à perpetuo illo diluvio & feri incubitu in fibras diffuissse videbatur, quibus alias constare notatissimè solet. Loco suo quantis glandula Pinealis non apparuit, sive avulsa seu deliquio soluta. In plexu Chorioide nullæ etiam glandule conspexer. Cerebellum autem plane integrum & nulla fuit parte labefactum, nulla etiam aqua in Ventriculo ejus, adeo & quod mirandum, gyri anfractuque illi & lætore sanguinis colore persufi. Et hæc quidem erat Hydrocephali historia, cujus causam si alius repero, non ambigendum, quin

quam levis Oculictricis manus intempestiva compressione ossium Bregmatis plurimum eo contulerit, & coarctato infimul venarum spatio lentæ Circulationi & hinc ortæ secretioni Aquosæ occasionem dederit, quæ deinde laxat & fibrarum medullarum intervallis se in Ventrículos, ordinarias humidi lymphatici officinas, stillandum effuderit. Vulgato experimento jam olim cognovi, ligatis venis jugularibus internis in vitulo seminato ut cerebrum encephalo se restagnante sero inundatum fuisse; adeo & à remissa circulatione lentissime eunt. sanguine idem fieri probabile est. *Ioh. Nicol. Pechlinus in Observat. Physico-medice.*

Hydrocephalicus & hydropicus.

Sigmond Biermann adolescens 27. circiter annos, in tenera ætate, ut scilicet natum nobis confessus est, motibus convulsivis valde obnoxius, à cathartico toto reliquæ vitæ decursu nunquam immunis exstitit. In Notostraphium, propter summam inbecillitatem, sex circiter ante obitum septimanæ sad. vectus præcipue tum de diarrhœa querelas movit & appetitu prostrato, cum scilicet, quæ tantum non ad finem vitæ usque duravit: manus erant tremulæ, pulsus nunquam naturalis, sed tremulus & æther. tractu temporis. seri effusionibus magis magisque urgentibus, & infuso veniente plenius intumescente, æger Creatori spiritum reddidit.

Presentibus Medicis aliquot inter quos tum erat Clariss. D. D. Stokerus Scaphusianus, sub vesperam operi sectionis nos accessimus Ann. 1677. mens. April. Cuius præcipue fuit cerebrum, unde cranium ablato illud studiosius iustavimus. Dura mater densissima fuit, & Pia ipsi parum absimilis, si non densior, sanguine præterea corrupto ac putrido penitus putrescit. Cerebrum, quàm metâ gelatina obductum esset, per hanc ipsam transparuit, ejus substantia tota flaccida fuit, & aquis humotibus irrigua, qui pia meninge ablata copiose in fugam dabatur. Ventrículi antedotes, una cum tertio & quarto, ichore aquoso erant repleti; in plexu choroidei glandulam utrinque repetimus durissimam, nili magnitudine. Aperto abdomine, al quot mensuræ feri putridi, summæ fuerunt etiterunt. Epiloon putruit, pancreas albicans & durum, hepatis parte cava inflammata & corrupta fuit. Ex vesicula felis, cujus facies exterior gelatinosa videbatur, distilla effluxit humor, qualis ex ovo putrido prodire consuevit. In Mesenterio lympham in vasculis stagnantem suumadvertisimus, in quam vero, uti nec in thoracem media urgente nocte, studiosius inquirere non licuit. *Ioh. Jacob. Harderus in Observation. Anatomica - Præfatio.*

Jacobi Calvas Metacorei Nemausensis filius, tertium ætatis annum agens, vegetus & elegans, sine causa manifesta soporatus & torpens, & & post multa valida & confertum sine fructu adhibita remedia, pulsus & respiratione paulatim deficientibus, è vivis excessit.

Aperto capite cerebrum sero è vasis sentiente inundabatur.

Filius Causidici Nemausensis prius nominis, in eadem ætate constitutus, actis ingenuis, haud multum absimili, verum iniquiore fato functus est; etenim ophthalmia & Lippitudine frequenter laborans, per dies quiduodecim sustinuit convulsivos motus, quos exceperet veterum & moris.

Apertum caput, fontanellam oppido hiantem, futuramque sigillatam ex coronalis iusticindentem,

Bibl. Chirurg. Tom. II.

& ad usi usque radices protensam exhibuit. Dura meninx admodum densa fuit, ejusque vasa, quæ sub osse parietali sinistro sita sunt, fuisse turgida sanguine, & inflammatione occupata. Paucissimus adhuc sanguis in vasis cerebri, quod ut & fistula spialis, vasto seri gurgite restagnabat. Dum viveret mihelus, meniculum infra sinistram aurem situm, lymphæ petpetuo madentem, verum post mortem proflus obliteratum, gessit. Malè huic se habuere pancreas & mesenterium; magnaque fuit ipsi vesicula felica, quam limpidus, sed fusci coloris succus adimplebat. Ann. 1679. *Ex communicatione Clarissimi Viri Domini Rivallii Medici Nemausensis &c.*

Sotoris Nemausensis filius ab ipso ortu laboravit Hydrocephalo, ex quo caput in molem immensam, & solita q. adimplendo majorem, creverat, cranii suturis quatuor ferimè transsectorum digitorum spatio delincentibus, Nibes & sensibus propemodum orbatus, oculi que mite in vasis, ad omnia, præterquam ad exciccandas nuchæ mammas, male se habens per sciquiannum vixit. Tandem motibus convulsivis fractus fatalem diem clausit. Ann. 1680. *Ex eadem communicatione.*

Historia Anatomica Hydrocephali 1665.

Mulier statore mediocri, sanè, bene colorata, secundò gravida d. 14. Dec. statò tempore & absoluta quadraginta septimanarum periodo mane stimulis ad patiendum pari coepte, post micidiale nixu increbuerunt, ac vesperi horis tribus vehementissime ipsa affligerunt; quibus clapsis prodit totus pedice & festina reliquo corpore ad collum usque: caput diu in utero pressit; post multos & validissimos conatus tandem factum mortuum totum exelavit, cujus motum toto hoc die non amplius animadverterit. Fœtus erat maculosis aspreto monstruosus: caput enim vitile æquabat atque in dorso gibbus videbatur. Circa quintam vespertinam Patens vocatus factum huic cum chirurgis diligenter perlustravit. In capite Frons, Tempora & Occiput protuberabant admodum & Sinciput in fastigium monstruoso arcobebatur: Facies tibi qua bene conformata & parva erat te. oculi, natus, penæ, labia à venustate matrem referente prius nihil abscidebant. Omnes future se. ossis frontis, coronalis, sagittalis, Lamdoidei & temporum plurimum hiabant, adeo ut ossa perunque ultra unciam distarent: In dextro latere se. In fronte & bregmate sub cui capillaria, ut & ibi, nbi suturarum hiatus tangebatur, fluctuantem humorem sensie: In sinistro autem latere cutis capillata arctis ossi adhererat. Totum caput albicans erat, exceptis hegmate dextro & suturarum divulsarum sedibus lividioribus incisâ, cui in sincipite dextro profluit aqua lotore caruim simili, fetoris expens copiose atque inclinato capite ad libras tres circiter emanavit. Hinc ampliato vulnere & cuti antiorum usque ad frontem, retrosum usque ad nuham & in latere usque ad autem dextram incisâ, iniecit ossa sincipitis & frontis profus non solum à cute sed etiam petricranio forte denudata ac imprimis os sincipitis avulsim ab osse temporis prominebat inferius petrenne & quasi petren lais & in acumen desinentibus Stylum dentibus: Iorus verò ossa hæc deta matre naturali castrific arctissime obducebantur atq; ea intermedia cetera hiantes futuras uniebant excepto illo loco, ubi os sincipitis petrennâ quasi protruberat. Dura matre ad oculos & in latere ad autem ossis falciformis à fronte ad oculos & in latere ad autem

incita, reclinatis offibus occurrit cerebrum, cujus superficies anfractibus ferme destituta, rugosa tamen instat boræ capacitoris semivacuæ atque hinc inde aqua loturæ carnum simili inundata. Spatium inter duram & piam matrem in hoc latere amplissimum erat. Luculo cerebro ad interiora ventriculi dexteri, deprehendit illum capacissimum, spatium namque ejus antrosum, rectorium atque ad latera expansum fuit ab aqua: Fornix & paries ejus dexter tempus versus crassitie parvi digiti multo minor fuit: continebat aduc aquam euentam, & quamvis cerebri substantia intus, extrinsece ab ista aqua madefiebat & continuè abluebatur, nihilominus tamen multo densior, firmior & tenacior erat quàm aliis in hac ætate immo adultioribus observatur: speculum lucidum robustius erat solito, nec facillè rumpebatur. Plexus choroideus in glomerem quasi contractus, totus posticam partem occupavit, præditus copiosissimis & amplissimis vasis sanguine nigro tingidis, pendebant ex ipso aliquot corpora atro-rubentia, quorum tria papillas unciam semissem longas referebant, graciles & in apicem acutum destinentia, ex quibus pressis stillavit aqua suberuentis; alia minora insuper aderant. Præter hiatum naturalem hujus ventriculi circa crura medullæ, vidit in latere dextro posteriora versus ipsum lacerum fuisse, adeo ut foramen facile digitem admitteret: quod tamen recenter vel in ipso difficili partu factum fuisse conjicit, quia ejus labia inæqualia & proflus albicantia erant, similia scilicet illis quæ fecit dum ventriculolum istum studio pectupit.

Tota interna superficies hujus ventriculi lævis subflava & firma fuit ac si membrana debito densiore involta fuisset. Incisa dura meninge in sinistralatere ad latera corporis falciiformis & ad latera secundum ductus fucuratum, nullam aquam inter cutis capillatam & ossa invenit, nec uti in dextro latere cutis ab offibus scississet, verum quoque plurimum hujus aquæ suberuentis in spatio isdem amplo inter duram & tenuem meningem deprehendit, non tamen tam copiosam ut in dextro latere. Aperto ante ejus sinistralatere ventriculo ac vulnere ad occiput usque dilatato invenit quoque aquam suberuentem absque ullis grumis: parietes videlicet medullas hunc ventriculolum constituentes, longè graciliores erant, quam in saulis videretur: Spatium quoque illorem amplum erat, minus tamen quam dextrum, prope quoque aqua in minori copia quam in dextro supererat, quamvis plurimum quoque ad dextrum ventriculolum inclinato dextroriorum capite defuisse videatur. Interna superficies hujus ventriculi undique: lævis & albidior quam dextri fuit. A cruribus plexus choroidei in parte postica pendebant quoque corpora atro-rubentia papillaria nec pauciora nec minora quam in dextro ventriculo, vasque ejus sanguine turgidissima etane, adeo ut glandula pinealis his proflus obvolueretur. In ventriculo recto eadem aqua, sed minori quantitate pognavit. Circa glandulam pituitariam quoque vasa sanguifera capillaria conferta erant: ipsa verò & Infundibulum à naturali constitutione non multum defecisse videbatur. Cerebellum in suo antro delinuit atque ab aqua hujus illuvie immoere servabatur beneficio sepimentis à dura matre inter cerebrum & cerebellum existentis. Flaccidius multum erat cerebro uti solet. Spina docti ab ultima cervicis vertebra ad os sacrum usque manifestè duplex erat. Vertebrae lumbares in gibbum arctabantur: ibique curis multò sanguine, ob partum difficilem solutus erat. Incisa cutis in dorso circa primam vertebram lumbarem sub illa invenit substantiam me-

dullarem cerebro similem, subflavam ad vucis juglandis magnitudinem: qua remota nullum foramen ullumve aditum alium ad spinalem medullam deprehendere potuit, nihilque aliud quàm cavernula huic substantie destinata apparuit. An verò per utramque spinam medullæ descendit? Per morositate patens indagare non licet. *See communicatione Clariss. Viri Antonii Deslauris Rerum Publicarum Bernensis & Eriburgensis Archiatri Extraordinarii & Amici.*

Hydrocephalus apertus.

Clariss. Ambrosii Stegmanni. Miscell. Curios.
Decur. liij. Ann. 1.

Meretriz quædam infantem Wettmi enitebatur hydrocephalo laborantem, qui post mensem in tantam tantem crecebat, ut mater impar esset infantem ex omnis accollere. Hinc, cum sic in sua matris perisset infans, ex curiositate & poitis quorundam amicorum appetebat caput, ex quo plura ultra xii. menses vel ibi. xxiv. ichoris profluebat (velut hoc Chirurgi & omnes alii attestantur, qui huic apertioni intertuerunt) Cerebrum exiguum erat, instar oculi bovini ad 3. 1/2. accedens, & simul totum putrefactum & corruptum.

Hydrocephalo laborantium Anatomia. Clariss.
Joh. Conrad Brunneri, Miscell. Curios.
Decur. liij. An. 1.

Hentzel Slatteri filia, nata Beringæ prope Scaphusium die 24. Febr. Anno 1688. capite bene conformato matris & obstricti vici fuit. In dorso, ad latera vertebrarum dextrum, macula liuida apparuit uncias quinque longa & tres lata, quæ 10 dies aliquantulum augebatur, nunquam tamen ad altitudinem & crassitiem parvi digiti assurgere; tam splendida evasit ut mater faciem & speciem vestium totneri in ea, ceu in speculo potuerit. Per dexter à vixæ primordio semper immorus fuit. Circa decimum ætatis diem, cum aqua per tenuissimam maculæ membranam, transiret; à Chirurgo vulnusculum instituit, ut, profluit aqua limpidissima, ac si puellus, ut mater loquebatur, mingeret: Vulnusculum brevi coaluit, quod mater sexies adhuc diebus insequentibus refecit: qualibet vice aqua ex vulnere ad 3. 1/2. effluxit: hæc emissio, suus amplius, & in hoc cæso cruda per curam conspiciebatur: sedente tenerima cute ulcus manifest, quod à Chirurgo paucorum dierum intervallo consolidatum fuit. Quasiprimo ulcus cure obductum fuit, nihilque seri amplius exstillavit, sine caput dextrum primum, postea & sinistram in fastigium accollit cepit, ac intra quartum ætatis septimanam hydrocephalus vasti molis emersit. Interer semper edit, luxurie infans, alvi feces & urinam recte excrevit: habitus autem qui ante plenus, sensum emaciati cepit.

Die 1. Misi caput vasti molis apparuit, altum tres palmas & ferme totidem latum; Sinciput mitè in utroque latere fastigiarum, in duos quasi colles divisum, intermedia convallè: tempora summoere prominabant: frons depressa, planè non prominula, & occiput depressum erat. Ossis sincipitis ad duas palmas à se iocuerunt, & temporum palmam à sincipitis offibus distabant. Atractu molle

molle totum caput fuit & manifestè fluctuatio percipiebatur excepto ubi ossa crani affixa erant. Vasa sanguifera in temporibus & sinuibus rutilabant; sanguine diluenta. Caput tepebat, alibi frigidum erat. Vertebra prima dorsa magis debito protuberabat, ubi macula olivæ, ibidem cutis depreffior, & rubicunda cicatrix remansit. Famelicæ & sinuolosa mîx linguam vibravit, & labia lambit: Postquam mater lac in infantis osculum emulsi, avidè illud abligavit, posteaque suxit; secus si fecit, non suxit. Pulcrum avidè comedit, & sùxit. Alebat mater nycthemis spatio præter lac matrem (quo non abundabat) ad quatuordecim dies. Vaguit, brachia movit, oculos item, quorum tamen non nisi albam conspiciebatur, nisi doctum ductis palpebris inferioribus. Excrementa alvi & urinæ rîdè excrevit. Diaphragma ordinatè movebatur, hypogastrium inæqualitè intumescibat, mox iterum subidebat; intumescensque intestinis tormina pari videbatur; nam præsentibus illis intumescens subinde vagit. Habitus mollior extenuatus erat, non tamen tantopere, ut in hosticis & tabidis observatur. Illam audire ex nullo iudicio constitit, & at rectum interitum esse manifestè patuit. Mîx lacte materis delectatæ ex lingue vibratione & lambitione lambitione colligere liceat, quæ alacritas fiebat ex ejus suctione, quam aqua osi infillatæ. Cutis capitis non proliis depilis erat. Capilli erant subfusi. Inter sugendum & bibendum inter aliquid convulsivi patiebatur in faucibus, propter quod deglutitio impediebatur. Hæc omnia abundè contemplans licetis consignavit *Venerandus Wepferus noster*, parentem ut infantis obitum indicaret, præmissis insignavit.

Die 15. Maii missæ diem suum obiit. Absente Venerando Wepfero in me secundi inunus recidit. Percepto nuntio, eodem die ad dissecandum cadaver propetavi, neque è vestigio secutus est Excellentissimus Dn. D. Scretæ. Mîxi sumus ambo stapedam capitis molem atque figuram insolitam; eam cum superius jam sit descripta, hic repetere supervacuum duco: Anatome autem sequentia nobis exhibuit: Incisa decussatim cute capillata, quatuor ejus lobos detraxi, inter separandum multum kri exsudavit; ex incisis autem & dissecatis venis sanguis aquosus efflavit. Separata cute, pericranium cum dura matre coaluisse observavimus: utrumque Cerebri hemisphærium mîx sanguineum erat, corpusque falciforme intermedium formaliter convallens. In summitate cerebrum erat pelliculæ, seu vesica aqua plenacidem incumbens. Ossa cranii longissimè & se invicem mîx membranatum entensibilitate abscesserant. Sinus longitudinis utriusque hemisphærio rîdè immortis, non nisi à patte postica, qua sanguis pellucebat, fuit conspicuus: hunc incidit, styrumque immisi, qui in profundum ipar inter utrumque hemisphærium ad trium digitorum transversorum longitudinem: Corpus falciforme secundum longitudinem & latitudinem extensum & extenuatum fuit. Abhinc vultusculum in summitate cerebri pappo madido, quæ examumsum referebat, nec tamen protupit aqua, donec vultusculum alterum infixi: tunc nempe profluit aqua limpidissima. Instrumentis idoneis destituebantur, quibus aqua ponderari possisset, octo aquæ libram pondere, tum Excellentissimo Dn. D. Scretæ, tum mihi quoque vis fuit. Ejus in cochleari ferreo nonnihil prunis impositum; sensim evaporavit, & bulliendo spumam concitavit non in gelatinam concrevit, uti aqua in ventre

hydrocorum tepe solet, sed post evaporationem sal acie reliquit; Effluente aqua, utrumque cerebri hemisphærium unà subsidit, tandemque bacpneis emulsi, usque adeo capitis moles concidit, ut modo conspici caput sine cerebro distixit. Dilatatè vultusculum, intus specus nitidus & ingens caverna apparuit, cujus interiora vasa sanguifera ornabantur. Remoto corpore falciformi, quod profundè cerebrum sulcabat, corpus callosum candidissimum, sed mîx extensum & extenuatum in conspectum venit: Speculum lucidum & in hoc cavitatem, quam duplicatura constituit, intui sumus. Nullam autem ruptionem ultra modum ostentatam partium reperimus. Corpora striata depreffa erant & interiori cerebri superficies adque Lucis exposita exhibuerunt innumeras papulas, aciem autem cap tellorum magnitudine præmutant; acrius nec asperæ nec inæquales, nec nisi radiant lucis obverit conspiciebantur. Procerius, qui erora medullæ oblongatæ conjungi transversos, brevius aliis ad unciam unam cum dimidia vi aquarum diluatus erat. Thalami nervorum opticorum cum proceribantibus oculoculicibus, sed scis habuerunt. Glacula pincalis parva & muciginea inter contredandum distixit. Plexus choroidei utriusque tuberculum phascoli magnitudine erat innexum, testiculos semineos examumsum referens, circum cley ex hydatides seu ovula in ovaris mulierum conspicebantur, Procerius mammillares didi, exigui, cæci & impervi fuerunt; reliqua nervorum paria omni vicio caruere, nisi quod aqua erat submersa. Infundibulum reicissim inflare frustra conatus fui, quippe statim non transmissit. Glandulam pituitariam diligenter examinavi nihil tunc præternaturale in hac offendi, nisi quod humor unduosus, pellucidus tamen stylo, visci tñst adhe-

Cerebellum flaccidum fuit; ventriculus quatuor peramplius, emissa aqua tubidus. Spinalis medulla in nudatillo perforata fuit & aqua tescita. Syllus immixtus imbricatur sponte sua ad palmæ longitudinem versus maculam; quæ juxta spinam dorsa visa fuit. Hanc incidit, cavitæ adhuc, & spinalis medulla nuda apparuit; vertebæ ibidem ad pollicis distantiam habebant. Tubulo exploravi atque statui, h quo forte meatus exinde versus ceterum & vice versa discurrat; frustra autem fui, nullum quippe statim transiit. Circa primam dorsa vertebam (de qua supra) tuberculum apparuit; incisus enter, ossiculum inæquale & informe subsuit. Longiorem perveigationem impetune muliercularum statui prohibuerunt; loculo proin nos, alii terre mandavit cadaver.

II. Michaelis Flor, Civis Heidelbergensis filius, natus die 24. Octobr. Ann 1688. omnibus bene conformatus visus fuit. In dorso supra os sacrum macula, seu substantia tendinosa & coriacea apparuit; fuit infans & bellè valere visus fuit; brachia movevit, pedes autem ferè immoti manserunt; postquam ad eam pervenit ætatem, quo alii infantes, quorum plures peperit mater, pedibus consistere valebant, penduli manserunt erecto infante, & omnia sponte effluxit; anus insuper ad trium unciarum longitudinem excidit, ut repetita repositione opus fuerit. Alvus plerumque fuit lubrica. Macula dorsa in dies augebatur, & in majorem molem, quin tumorem tandem insignem excrevit, ut præ hoc nec cubare nec quiescere liceret infanti nisi in alterutrum latus devoloro. Tandem de abscissione tumoris monstruosi cogitare ceperunt Patres, voca-

ranque Chirargum Circumforaneum, qui decimâ quartâ ætatis septimâ ad extirpationem ausus fuit. Tumorem circumcidit temerarius, & filo, ac traducta comprehensum protraxit, mox abscedit & extirpavit funditus. Inter abscessionem plus libæ aquæ limpidissimæ effluisse, saporis salis, testatum fuit. In medio tumoris radix seu pedunculus apparuit cavus, qui inflatus in varias ramificationes, tandemque expansiones membranaceas abili, cum cellulis & concamerationes, in quibus dicta stagnavit aqua. Post amputationem caput infantis consistere statim & mole minui observatum fuit; indicio hæc obscuro, aquam ex ventriculis & cerebri cavitatibus promanasse. Pedunculus nominis congeries fuit, seu fasciculus nervorum & spina dorsæ exorbitantium, in medio petvius, ut stylum facile admittit. Circumciæ alii nervi non eodem fasciculo comprehensæ ad tumorem tendebant: vasa quoque sanguifera & spina dorsæ emergentia eodem appellabant: Subtus membrana spinalem medullam alias involvens apparuit inanis; adeo ut vel omnis medulla spinalis hæc exorbitans, in dictum tumorem seminari videretur. Anos pendens ad unciam unius cum dimidia longitudinem. Caput collapsum fuit eo usque, ut fonticulus pollicem meum capite cepit, & ossa temporum sibi invicem impenderint. Cæterum nihil vili foris apparuit; interiora perflustrare vetuit superstitionis matris pietas.

Scholium. Qui ventriculos cerebri tantum levitatis gratiã conditos esse existimant, nimis leves mihi Naturæ contemplantotes; neque ad temis fati attendisse illi videntur, qui non ex primariâ naturæ intentione, sed secundariâ tantum & accidentaliter ex cerebri complicatione hos resoluere existimant. Sed & insuper mirari subit eorum sententiam, qui cerebri ventriculos spirituum domicilia statuere non dubitant. Censê si attentius perscrutarentur, quæ crebrius dissecant cerebra obtingunt phenomena, modò aquarum illuvies & flagrationes in hisce cavitatibus, etiam in sanis (uti in capite viruli hodie dum maciari, quod per manus est, videre licet) modò eorumdem vacuaturæ glandulæ pinealis (quæ in lepore mira est & visu lepida, in homine etiam sano modò mucaginea, modò subulosa, modò etiam lapidea; in canibus vero intricatissima) diglutarunt non tantopote extollerent, dum in hac cu iolio sedenti animæ circumstantis spirituum satellitium famulari, glandulæ morui obedire, mandata audire & fideliter exequi ingeniosè fingunt. Mihi veto pro nobilissima functione stabilis ac certa in microcosmo fabrica, non variâ aquarum illuvie turbata, condita & assignata videtur. Tandem verò qui cerebri ventriculos meram cloacam nominant, mihi decenter de sacra Palladis arce sentire postea pateret. Aliæ autem sentiet, qui miram concamerationem cerebri structuram, mirabilem in hisce. Plexum choroidæorum expansionem, ipsam denique convallam, qua inclinator & sponte sua tuant in illa contenta, attentius consideraverit; nec potest non horum usum batiolari, & ad experimenta conversus ipsos quasi oculis inspicere. Alibi laticis lymphici, per totum corpus ubertim manantis historiam pro modulo tradidi, & experimentis fretus in ipsa quoque distione animalis hunc contemplantur sum. Spiritus nempe, seu particulæ sanguinis subtilissimæ sub lymphæ involueto, cum Schemate fluidi ad penitissimam cerebri penetralia deduci, crassius involucentum exuunt & diversum ab eo iter instituunt. Probabile est (quod deinceps clarius patebit) lympham suo functam

monete, cum phlegma spirituum, partim per venas remicare, partim verò ad infima penetrare postquam petvuit venarumque superavit regionem, ubi temere non daret, ulterius progredi, & in ipsos cerebri ventriculos tanquam in cisternam confluere: Ad quid enim tantus ventriculorum cerebri apparatus & admirabilis structura, nisi humorem quem etiam in sanorum cerebri lat ubi videri videtur, susciperent, suscipereque aliò derivare? Nec, verò excrementis censi debet, quippe per mirabiles viarum & serpentinis sinus ad ipsam Palladis artem petductus, purissimus censi metiò & defecatissimus audire potest: nobili insuper hoc fundus monete, plima adhuc corpori elargiri potest comoda, cujus generis recrementa, natura nunquam immediatè eliminare solet. Quapropter rem minus artem penitissimè videntur, qui per processum mammillares hunc in narium cavernas exetui putant; quid pro narium humedatione, qui secundariis ipsi tribui possent usus, sat glandulatum suppetit, adeoque superfluous & inutilis in his foret. Validum in Doctissimi Lovverci de cathartis argumentum, cum autem non in omnium manibus veritetur elegantissimum scriptum (cujus exemplar mihi in Angliã agent), Author humanissimus dono dedit) textum ipsum apponente, opetæ pretium erit: „Humorem, inquit, „intra processum mammillares (de brevis sermo „est) contentum ipsos non permeare aut pettrans- „ire melius innoscet, si ipsorum substantiam, „conformationem & usum paulò accuratius pet- „pendemus: duplici enim substantiâ, non secus „ac reliquæ cerebri partes, medullari sellæ & co- „ticali consistit; in medullari autem ipsi spiritus „animales hospitantur, unde in nervos ab ea ex- „ortos, & in nates implantatos excurrunt; si au- „tem aqua in cavitatibus processuum contenta „per medullarem ipsorum substantiam in nates „transcat & extillet, necesse est ut per nervos „sinat, & ipsorum corpora pervadat. At quid „inde obsequi fieri, si ipsa ejus organa conti- „nua humore excrementis scatant? In huma- „no cerebro processus isti sunt exigui, imò cæci & impetvii, nec à ventriculis cerebri, sicut in quadru- „pedum plerique, sed à substantia medullari sub „corporibus striatis ubi nulla datur cavitatis, utrin- „que oriuntur, nervosque ex amussim, internum „nervorum fasciculum referunt, nervorumque proin, „nec alio officio fungi credam tantisper, dum ali- „me petpica:iora cava hos mihi ostenderent in homine.

Viam, qua excrementa homines contenti, mon- „strabit sedulo natura contemplantori, vel nica concamerationum structura, quæ ed inclinate videtur, ut humor ex omnibus recessibus cerebri consusus velut infundibulum sponte suat & subiectæ glandulæ insillat per piramida. Huc opet velificatur plexus choroidæ; Alibi demonstratum fuit; quam facile lymphicus humor à frigore lentorem contrahat, tumque soliditatem amittat. Ne id io his cerebri cavitatibus eveniret, mirabilis vasorum plexus cantum est, ut igne hoc jugi perpetuim calcent cum hypocausta, & humor in his contentus liquecens commodè in infundibulum devolutus ulceris proveheretur, de quo Willis ingeniosè differt. Accedit motus cerebri successorios, attritionem pulsatione & vibratione concitatus Quæ- „admodum autem cribra artificiosè agitantur, & in molendinis petconitur ut materia contenta cribretur & ejiciatur: ita & in cerebri humoris redundantis

exactio

exercitū seu mechanicè perficitur. Ipsum denique infundibulum inter binas carotides continud pulsantes & verberantes reperitur constitutum, quæ motu atque calore suo lympham in infundibulum defluentem liquant, ejusque excretionem promouent. Ex hâc ulam retil mirabilis in bractis perficere licet. Etenim quæ pendula gestant capita, & ad demetendas herbas in terram defixa, pleraque retil mirabili donantur & in suo genere gaudent bruta animantia. Facile quippe lux in cerebro stagnaret, lentorem conciperet, & ad excretionem minus aptus fieret: pulsant autem hæc & calidissima plexus arteriosi machinâ, tum fluiditati ejus, tum morali atque excretioni consulum videtur. Homini, cui erectus ad sydera vultus, gregoso equo, & ut nuper vidi lepori, animali cerebro sedenti erecto capite, eodem machinamento fortè opus non erat; humor enim in cerebro seculans, elato capite facili, quia sponte sua depluit: sufficit proin carotidum, tum verberando, tum calefaciendo lymphæ motum juvenium vicinia.

Diu mihi hîc cum aliis hæsit aqua. Vidi equidem cum meridiana luce clariùs humores in ventriculis cerebri collectos in infundibulum confluere, & ad subjacentem glandulam pituitariam decumbere, viam autem, quæ erant aut excoarctate, nullam reperire potui. Doctissimus Lovverus duplicem describit in homine ductum & iconè illustrat: „ Duo, „ inquit, vasa ex utroque sellæ tursicæ latere con- „ dita sunt, quæ hianibus quasi oculis, aquam om- „ nem à glandula pituitaria distillatam excipiunt, „ quorum ductus facili patebunt, si aqua aut lac „ è siphone in venam jugularem utramvis propè „ calvariam injiciatur, mox enim conspicietur pro- „ pe glandulam pituitariam erumpere atque scaturire. Idem experimentum Clariss. Thomas Willis ante perfectè, qui cum diligentissimo Lovvero merito curiosissimus hujus glandulæ scaturit audire potest. Sed pace tantorum virorum dicam, quæ ego circa hanc observavi. Vasa, seu ductus, quos illi detexerunt, certè nonnulli venarum sunt propagines. Foramina quippe in capite vixituli ossi conciformi insculpta dicunt ad subjacentem, ossi ipsi immectum vas sanguiferum, quod in binos rivulos diffusim reflectitur utrinque ad venas jugulares. In capitis humani Anatome injeci olim, ope siphonis, ceram tubicundam in alterutram venarum jugularium penetravit hæc usque ad glandulam pituitariam quam undique aluit & coronavit pulcritè, ipsam verò glandulam non sibi, sed tantum illuc claro hoc experimento didici. In scutino glandulæ pituitariæ è calvaria vituli exemptæ, cautissimè membranam qua investitur separavi, nullum autem vasculum excretorium, quod ipsum subingrediamur, bibatque infusum laticem dependere, nec vel minimam hujus vestigium observare potui. Aden, ut ex Anatomia, tum aliorum, tum propriâ, parum mihi de excretionis modo in hac glandula constet. Nec tamen probabilis mihi videtur Clariss. Diemerbroekii sententia, dum glandulam pituitariam penum sum superne versus cerebrum effundere statuit: quippe per processum mamillares nihil humoris saltem in homine externi ex supra dictis abundè constare arbitror; quo autem concederet tandem humor in cerebrum effusus, faceret me non concipere. Quin strassura hujus glandulæ contrarium innuere videret, quippe in signis hæc cavitate prædita est, saltem in homine, quæ humorem superne infusum excipit. Vetustum est hæc laticem ex omnibus

cerebri partibus conflum in infundibulum devolvi, glandulæque pituitariæ infusum ejusdem porulos trahere ac pertrahere, oculus valorum redocentium ad hoc configuratis hianibus infundi, juvenibus hoc opus pluribus machinamentis perquam ingeniosis, & ita (more totius corporis lymphæ) in massam sanguinis derivari: hujus enim consecutioni, cum humoris vilissimi naturam mirè studere alibi demonstratum sit. Ne autem arripamus in abstracto hoc, sed sicut perquam necessariæ naturæ artificii; fert sententia, vala lympham in hæc glandulâ absorbentia non esse languifera, qualia depingit ingeniosissimus Lovverus, sed reventa lymphatica existere, quæ etsi ob loci asperitatem Anatomiconum diligentia nondum fuerint detecta: adque invisa, eadem tamen existere nullus dubito.

Quemadmodum nititur reliquæ glandulæ conglobatæ in capite lympham five circa nervum expansiones in membranis (ut dudum observavit Venerandus Senex noster Wepferus) scaturientem & ad glandulas conglobatas per vasa lymphatica transfusam, five ab ipsis immediatè arteriis ipsidem infusam filtrant, percolant, & per alia in parte sima exortientia vasa lymphatica ad commune lymphæ receptaculum remittunt; ita quoque cum glandula pituitaria comparatum videtur. Experiundo enim didici, in capibus præsertim bouum, lympham in partibus nutriendis resulantem, glandulas, tum maxillares tum parotidis tum alios conglobatis, per peculiaria vasa lymphatica advehi, eorumque parti convexæ suis ramificationibus infundi (cujus elegantissimum argento vivo experimentum cepi) quæ posteaquam glandulæ substantiam pervasit, ab aliis parte sima utiendis vasis lymphaticis excipitur, & ad commune lymphæ receptaculum defertur. Cum itaque glandula pituitaria ex conglobatarum genere videatur, lymphæque supernè instillatur, quid obstat quo minus vasa lymphatica supponamus, quæ percolant lympham absorbent, & more aliorum, ad commune receptaculum tetrahant? Nec enim fas erat, lympham à cerebro talem, immediatè in sanguinis massam sedire, quin more totius corporis lymphæ suo characteri in glandula conglobata insigniretur, de quibus forsitan aliis pluribus dicendi erit occasio. Plura sunt in nostro Hydrocephalo, quæ hanc Theoriam confirmant Phenomena; inter quæ illud in primis enucleandum est, cur in recens natis precipue cadat hydrocephalus? Equidem nullum est dubium quin humores in cerebri ventriculis collecti apud plures sustineant exitu, & alios quoque ætatis homines perfundant; unde merito Carolus Pissio Caput castellum seu labrum feri appellavit. In adultis autem non hydrocephalum sed Apoplexiam, uti subsequens Observatio testatur faciet, aut alium affectum sapientium inducit: nimirum ab exundante perpetua sero in adultis corpora medullaria ob soliditatem & resistenteriam cranii cedente necesse comprimuntur, spirituumque animalium effluxus per nervos intercipitur: in tenera autem ætate credit exterior cortex, integumenta membranosa humiditate sententia dilatantur, & mitum in modum diducuntur. Recens autem nervi præcipue manet hoc faum (nil videre est apud Fabric. Hildan. Forehum & alios) quia prono plerumque capite & inclinatio, nonnunquam planè demisso, præsertim circa tempus partus, in utero reperitur, quo sicut restagnat humor in cerebro: lentorem fursum concipit, hinc percolationi per glandulam

dulum pituitarium minus idoneus, infarctus ejus potius congeritur in ventriculis & accumulatur, donec caput in immensum exerceat, tandemque obcatur aqua. Præterea dum eluctatur infans per uteri claustra, caput ejus misè comprimitur, ut interdum vel terrore infancie inperitis primipariæ ex ista coarctatione fibrillæ cerebri non possint non violari, nec mirum si humorem nimium admittant in cerebri ventriculos calidissimè, minusque proportionem, quam ut sileat sui potius transiciat atque pervadat. Nullum est dubium, quin in memorato caso affectus primordiæ jam in utero facta fuerint, antequam lucem aspexit miscella, nimirum postquam aqua in ventriculis cerebri collecta exitum per glandulam pituitariam, sive propter lentorem, sive aliud vitium non obtinuit, regurgitavit versus cerebri ventriculos, quos adimplevit, inde versus quarum redandas ventriculum, spinalem medullam perforavit, cuniculumque per medium hunc egreditur autem loci, quò vertebrae hanc adhuc in tenella hac ætate exitum molita est, cutim autem densam dum petrumperet non potis erat, saltem maculâ lividâ notavit, quæ itatim post partum animadversa fuit. Illud verò attentionem meretur, nimirum quòd intra decem dies conque cumulara fuit aqua in ventriculis cerebri, ut non modò per spinalem medullam cuniculum egreditur, sed et inperit conque excrevit, ut aqua intus conspicui potuerit, quæ vulneratâ cute, tantâ vi profluit, ac si puellus, ut mater loquebatur, miungeret: sex in sequentibus diebus postquam vulnusculum refecit mater, qualibet vice *iiiij.* aquæ limpide effluerunt. Consolato ulcere, intra mensem caput in tantam molem excrevit, quantum in Historia morbi describitur. Duplicem autem hujus colluviei in dissectione capitis, videtur mihi videre scaturiginem. Sunt equidem, qui omne feri depluvium glandulis plexuum choroideorum tumefactis tribuerant. At verò ventriculi cerebri, quos ad recipiendos hujus superfluitates conditos esse tantum non omnibus probatur, non solum præpree hæc glandulas facti videntur; quippe lacis patent, adeoque etiam aliundè, quam ea hisce glandulis humores in illos conduere videntur. Dissocii olim caput vituli vertiginosi: inven in ipsa cerebri substantia tres hydrades, ovi columbinæ magnitudinis, humore limpido plenas: in dicto, etiam in ipsa cerebri substantia fluere humores & epidermide obduci posse. Id effecti autem merito nubiuis papillulis, quæ in corporibus stristis, lævibus aliis ac perpolinis, capicolum aciculorum magnitudine præminabant notatissimæ, ut serum copiosius eructant in cerebri ventriculos: sanè similes in aliis quoque cerebris morbofis observavi, præsertim in colluvie ferosa, de quibus in postremo mecum viderint alii, si quidem nascatur occasio; interim admonitos velim, nonnulli ad radios solis conspicui hæc papillulas. Nec tamen omni culpæ eximimus glandulas plexuum choroideorum, quippe rursutiores repetæ fuerunt, easque vitiosas ut plurimum observavit in hydrope cerebri Clariss. Thom. Willis. Utrum primariò & per se, an huic immerse lacunæ fuerint variatæ, dobito. Ceterum tamen est, in hydropicorum ventre glandulas plerumque corrumpi, tandemque quali ciliari. In pleibus choroideis glandulis id muneris delegatur, ut, cum vix deat immediatus ex

arteriis in venas transitus, sanguis arteriolas (qui calore perfundit hæc cavernas) venis per dictas glandulas committatur. Si quis autem has glandulas propterea tantum conditas, & pleibus choroideis intertextas existimet, ut serum seu lympham fecerant, huic retero, non opus fuisse tantâ venarum & arteriarum locum ac frequentia. Nec ad deputandum sanguinem desinere videtur, quippe si ce arteriis plexuum choroideorum, non ad substantiam cerebri corticalem, ne spiritus inde elaborentur, progreditur, sed proximis redditur venis ad intusculas reducentibus.

Quantùmque autem copiâ cumulara fuisse aqua in cerebri ventriculis, hydrocephalum non produisset, nisi viâ, qua aliis externi soleat aut intarctâ, aut aliâ obstruât fuisse. Sed unctuosus circa glandulam pituitariam humor, qui stylo visci instat adhæsit, indea fuit facientis intus, & colatorum, seu glandulam pituitariam obstruentis mœliliginis Interceptâ ita & interclusâ excretionis viâ, stagnante & regurgitante versus cerebri aqua caput infantis non potuit non brevi temporis spatio in vastam excrecentem molem.

Exemplum Hydrocephali, in quo glandula pituitaria planè desuit, videre est in Colleg. Coctio. An. 2. Decad. 1. Observ. 47. Aliud apud Doctissimum Loverum in tractat. de eabur's, ubi glandula pituitaria, qua infundibulum inferebatur gelatinâ quadam viscidâ ad magnitudinem minoris fabæ præterea opplera fuit. Usque adeò verum est, humiditates cerebri per glandulam pituitariam transcolari & in massam sanguinis derivari. Ex hisce quoque inferitur, improprie cerebri excrementa dici, quæ natura nunquam in suum finem recipere solet. Cur verò non immediatè per apertos tubulos, sed mediante glandula hac lymphâ in cerebro resutans venis instilletur, ratin videtur, quia quemadmodum lymphâ ubi in corpore, saltem, quod compertum habeo in capite resutans, antequam in massam sanguinis resutandis, glandulas cingulatas alluit, ne in iis aliquid delibet (nec enim frustra has conditas fuisse existimare fas est) ita etiam cum lymphâ in cerebro resutandis comparatum videtur, nec enim prius in massam sanguinis reduciur, quàm in glandula pituitaria character suo insignita fuerit, de quibus albi fossas pluribus.

Hydrocephali Anatome.

Clariss. Joh. Davidis Maucharti. Miscell. Curios. Decur. *iiiij.* Ann. 4.

Anno 1691. d. 18. Maii, obitè Mothingæ, Eslingensis Diocæles pigo puer octennis, per annum integrum Hydrocephalus, octidno ante mortem mihi monstratus, ut si quid opis in me esset, conferrem; Quem tamen cum prognostico brevi mortuum esse, dimiseram. Obtinui verò à parentibus, quibus à veneficis altissimum esse, perlatum erat, ut calvariam saltem aperire liceret, uti adstantibus Chirurgis duobus sequeusia à me detecta & observata sunt.

1. Totum corpus ad sceleti formam matre consumptum postulique sicciis plurimis consipetum.

2. Caput maximum, quatuor spichamærum extent-

cautione circumferentia sua superans, undique durum & tactui nullibi cedens, cutis post capillos ablatos livida, nunquam læsa fuisse videbatur, hæc vero cum pericranio sublata.

3. Cranium undique integrum, omnes suturas, sagittalem totam, coronalem & Lambdoideam fere integras duplices exhibebat, ita ut suspicio non vana sit, postquam puer ex alto, per 5. nuntium gradus lapidosus, lapsus esset, & ituræ ab invicem ob violentiam externam discessissent, novum os in spatii ab illis relicto generatum fuisse, & hujus suturearum duplicaturæ, causam casisse, erat verò binarium sagittaliū suturarum distantia sesquipollicatis.

4. Sertā ablato superiore Cranii hemisphærio, totam hujus cavitatem cerebro repletam, nullam verò aquam inter hoc & matrem duram repertī.

5. Durā matre, vasis sanguineis ad rupturam erigida disticta, inter hanc & cerebrum ne guttulum aquæ invenī.

6. Cum ergo cerebri magnitudinem admiraret, & ut penitus inspicere queam, quod in cadavere fieri incommodus ejus sicut prohibebat, extrahere illud anniterer, vi non adeo magni adhibiti, æque plenum, & altera dimidiam mensuræ Wirtembergicæ partem prostravit, quam ex anterioribus cerebri ventriculis oriandam, horum maxima cavitās, & cum dolore nostro rupturā docuit.

7. Cum verò nihilominus in extrahitione cerebri pergerem, hoc quidem cecit, cerebellum verò erat immobile & cum dura matre, hæcque cum cranio firmiter coalescant.

8. In cerebro ergo solo extracto, præter cavitatem anteriorum ventriculorum maximam, cerebrique substantiæ tenuitatem plexus choroideus magna, rumidos, glandulis plenum, nulli grano non nihil majoribus, durā resptos continebat.

9. Cerebellum deinde magna vi evulsim, totum induruerat, in dextra tamen parte & majus & durius, ita ut dextra medietas 3ij. sinistra 3iij. saltem pondere æquarent, ad bilancem examinatæ, interim totum cerebellum erat solidum, nullamque cavitatem habebat.

Cætera perulstrare non licuit.

Hydrocephali 24. Annor. Anatome.

Clariff. Viri Riedlini. Ephemer. German.

Centur. 1. & 2.

Decem præterite anni, quod Augustæ Vind. vocatus fui ad virum quendam ex haud ignobili, quin sic sit clarā familiā ortum, qui tum arthritide decumbens meum desideravit consiliū; hujus quærellis domi aures præbeo, & medicamenta præscribo, obtutu meo fæ obtulit puer, horrendæ magnitudinis capite instructus, manuum pedumque usu destitutus, & sedendo decumbendoque tempus consumens. Hydrocephalo itaque hunc laborare statim statui; & vel hac de causa eductuosis in quævis ejusdem facta inquiri, quia

tum multa quidem de hoc morbo laborantibus legeram, hæcenus tamen nullum unquam videram; quantum verò memini, tum mater reverens, se hunc filium sanum atque incolumem fuisse, nisi quod interdum cathartici (quorum originem pæctibus tum recens inculcatis & dealbatis adscripserat) laborarē. Hæc verò tum suadente insigni quadam Marrona se unguentum quoddam opposuisse, quod catharticos quidem calcavim, at caput ab illo tempore semper crevisse sic ut anno ætatis tertio magnitudinem confectam jam longè exacerasset, quæ ab hoc tempore semper majus incrementum sumferit, donec anno fere septimo increfcere desierit, & tam diu quidem puerum inoffense; nec manuum usu destitutum fuisse, ac supervenisse tum apoplexiæ quendam insultum, qui eum sic debilitavit, ut ex illo tempore arcuum usu continud fere destitutum vivat; Intellectu tamen semper sic gaudeat, ut tandem & ad S. Synaxin admitti potuerit; Jam tum verò statim in votis habui, ut aliquando post mortem caput hoc aperire liceret, ut vera tam diu instantis hujus mali causa innotesceret; hocque votum meum non uni solum amicorum meorum detexi; ex quibus Pharmacopæus industria, Dn. Joh. Bierman, mei memor, cum nuper Ann. 1703. d. r. Januar. beatè defunctus fuisset, à matre superstitē imperavit, ut hæc sequenti die monstruosi capitis apertionem concesserit, ubi primò quidem circumferentiam externam exploravi, hancque undecies hujus lineæ

longitudinem æquasse, juveni; remotis hinc integumentis communibus, ut in aliis hoc morbo defunctis, suturas minus firmiter coherentes, quin hiansæ tepetæ fuerit ita in hoc cranio tam arctè clausæ conspiciebantur, ut in quibusdam locis illarum vis vestigium quoddam notari potuerit; sertā medianæ hinc non absque labore, remotā eā, quæ eminet cranii parte, per felicem Chirurgum Samuellem Seurmium, hoc duplo crassius ubique fere comparuit, & quoniam cerebrum arctè eidem conjunctum fuerit, absque hujus lésione, ubique terra penetrare non potuit; unde sub apertione adhuc non parva feri limpidissima copia profluxit, quod vase ad id destinato excipimus; licet verò hujus feri semper plus efflueret, quo magis cranii superior pars remota fuit, ubi tamen sedem suam habuerit? ea seposita non statim patuit, donec cerebrum in duos hemisphæria divisum fuit, ubi statim tanta cavitās in utroque oculis paruit, ut in ea omnem liquoram contentum fuisse nemo dubitavit; qui nempe ventriculos utrinque sic distenderat, ut facillimè duos pugnos quilibet admisisset; cerebrum verò ad cranium sic compresserat, ut nullibi digiti transverso crassius existeret; & fere quidem, quantum vase subtus posito excipi potuit, mensuræ quatuor cum dimidia evacuata fuerunt; utque de cranio insigni extensione judicare possis, parā ferrā resecta duas cum dimidia Augustanarum continebat mensurarum: Ante septem annos, cum & visum perdidisset, metet ejusdem postmodum retulit; & quod notum dignissimum, cum per aliquos annos, per quinq; vel sex hebdomadas alvum obstatam habuisset, & tum quidem vionis parum admodum fecum excrevisse; sique vel ex Sol. senn. paratum laxans eidem exhibuerit, hoc statim convulsiones exstiterit, eadem narravit: In quorū contingentium causam plus oculi me nocti,

fing

sine dubio non absque quadam utilitate inquirent: quotquot verò ego hac de re consului Auctores, qui tam diu Hydrocephalo laborantem descripsisset, mihi quidem non obvenit: Natus enim hic puer An. 1678. Mense Maio, & eo tempore, quo supra memini, vivis subiectus fuerat, per integros viginti quatuor annos itaque cum tanto hoc malo confectus est; adeoque inter rarissimos hic casus merito locum obtinebit.

HYDROMPHALOS.

Vid.

HERNIA

HYDROPHOBIA.

Vid. sub titulo *RABIDI MORSUS*.

H Y M E N ejusque Chirurgia.

Hymenis Chirurgia in eò tota est, ut cum hæmembrana in anteriore sinu pudoris sede posita, solito crassior, ac densior est, nullòque foramine prædicta reptitur, scissione per novaculam incidatur, & immixta turunda plumbea foramen apertum ad plenam cicatrizationem teneatur. De ætiori tantum foramine, nihil hic addimus, quia ipsius dilalandi methodus omnibus satis nota est.

HYPOPIUM. Vid. sub titulo *CORNEÆ VITIA*.

Fini Libri Octavi

BIBLIO

JOH. JAC. MANGETI
BIBLIOTHECÆ
CHIRURGICÆ
LIBER NONUS

*De Affectibus atque Operationibus Chirurgicis à Literâ
I incipientibus.*

ICHOR & MELICERIA CELSI.



*E hinc morbo articulus variis de causis
affligente, tam accurate pro more agis
Tractatâ specialit Experientissimus Guil-
lielmus Fabricius Hildanus, ni illam
integrum h'c legendum tradere commo-
dum omnino credamus. Sic autem*

Vir Eximius.

Cap. I. *Quid sit Ichor & Meliceria,
aut Hydrarthros, & quomodo inter
se differant.*

Quia affectum, de quo in hoc libro scripturus
sum, antiquis & rationalibus Medicis & Chi-
rurgis, imò & qui superiori seculo floruerunt, in-
cognitum fuisse, inde nobis conjicere licet, quod
apud Hippocratem, Galenum, Avicennam, Pau-
lum Aeginetam, Oribasium, Aetium, Albucasin,
Lanfrancum, Theodoricum, Rogerium, Guido-
nem, Vigonem, Tranchinum, imò ne quidem
apud Ambrosium Paracelsum, quem tamen diligentissi-
mum scriptorem, & longe peritissimum & ex-
citissimum Chirurgum fuisse scimus, nihil de
ipso legimus, quare ut rectè intelligatur, pri-
us quid sit Ichor in corpore humano, dice-
mus, eumque duplicem, Mitem videlicet & Acrem
esse, ostendamus. Postea quid Ichor & Meliceria
acris, sive Hydrarthros sit, differemus, causas præ-
terea, signa, pronostica, & curationem, tum Em-
piricam, tum Methodicam addemus. Tandem quo-
que quomodo symptomatibus, quæ subsequen-
tur, occurrendum sit, obiciemus, & sparsim
Medicamenta empirica, & quæ in hoc affectu præ-
ter rationem applicantur, testabimur, Omniaque
observationibus, exemplis, & historicis utilissimis
illustrabimus.

Ichor autem, sive, ut loquitur Hippocrates, se-
rosum excrementum, in corpore humano (ut post Ari-
stot. Chirurg. Tom. II.

Aristotelem testatur doctissimus Casparus Hofmannus;
libro de Ichoribus) est sanguis crassus, aut quia
nondum concoctus est, aut quia ferat. Et alibi,
Ichor est aquosum scilicet sanguinis, sive id fiat, quod
sanguis nondum perfectè sit coctus, sive quod post
coctionem corruptus sit. Ex quibus colligere licet,
duplicem esse Ichorem sive serum in corpore huma-
no, Mitem videlicet & acrem.

Ichor mitis, est excrementum serosum chyli; ab
hepate ex venis lacteis attractis, ad nutritionem qui-
dem corporis destinatum, sed à calore nostro innaro
nondum satis coctum, & in sanguinem conversum.
Converteretur tamen paulatim in sanguinem, nisi
suum quoque haberet nomen, & diutius moram ipsa
hepate traheret. A summo itaque Architecto hujus
Microcosmi, in hepate à sanguine segregatur, hoc
modo, ut quicquid crassum & viscidum est, ad
renes & vias urinarias descendat, & excremen-
tiosos humores hepatis secum vehat. Hinc plerum-
que in morbis urinas spissas, turbulentas, multasque
excrementis repletas prodire videmus. Subtilissimam
verò & purissimam partem hujus Ichoris, sanguinem per-
miscetur, & ex hepate per venas in totum corpus
spargitur, in hunc finem, ut sit veluti vehiculum
sanguinis, qui alioquin ad venas capillares, præ-
sertim minutissimas, permeare non posset: in nutri-
mentum tamen corporis non transit, sed tandem ut
excrementum per sudorem exhalat evacuaturque.
Est & serum biliosum, amarum & acre, quod in
hepate à sanguine segregatur, & in vesicula fellea
congregatur, in hunc usum, ut ad intestina descen-
dat, & quoddam excretionem alvi promoveat. Est
etiam quartum genus Ichoris qui in splene, à san-
guine, pro nutritione splenis destinatum, veluti ex-
crementum (non tamen planè inutile) per vas bre-
ve ad ventriculum mittitur. Etque frigidas & su-
stentus, ad appetentiam ventriculi excitandum.

Ex his perspicuum sit, Ichorem sive serum (lo-
quor autem de Ichore miti, sive mansueti) quan-
vis sit excrementum sanguinis, ad conservandam
tamen optimam valetudinem, non exiguum usum
habere. Si verò acrimoniam, non qualicet ali-

Pp

quoniam

quam malignam adeptus fuit ichor ille, harmoniam istius partis, in quo decumbit, destruit. Verbi gratia, si ichor crassius & pituitosus, propter intemperiem aliquam præter modum calidam hepatis, & admissionem bilis, sermioniam contraxerit, sequitur incongruentia & Allicidium urinx, cum maximo ardore & dolore, nonnunquam quoque ulcera trunci & vesicæ procreant. Si ichor ille tubilis & pusillius, qui cum sanguine ad venas capillares fluit, acrimoniam & malignitatem aliquam acquisiverit, sequuntur ulcera, scabiez, & hujus generis vicia in externis partibus corporis, in quorum numero quoque affectus, de quo in sequentibus acturus sum, collocandas est. Non tamen obvis corpus infestat, sed articulos nervosæque partes saltem, propter causas, quas posthac recensito, occupat.

Est autem Ichor & Meliceria Celsi, feri acris ad latus, & dolore magno & inflammatione tentatus articulus, ex reliquo corpore copiosa affusio, & cum ingentibus doloribus, inquietudinibus, febre, viumque prostratione effluxio, aliorumque symptomatum scaturigo. Dixi ab initio, affectum huncce antiquis incognitum fuisse, Celsum tamen, quem merito Hippocratem Latium appellamus, ejus noticiam aliquam habuisse ex libr. suo 5. cap. 26. sub titulo de sanguine & sanie & pure, & eorum speciebus, quando meliora deteriorave sint, colligere est, hæc enim habet verba. Est, inquit, quidam sanies, quæ vel Ichor vel Meliceria uominatur. Et paulo post, Ichor tenuis subalbidus ex malo ulcere exit, maximeque ubi nervo læso, inflammatio sequuta est. Meliceria crassior, & glutinosior, subalbidæ mellique albo sublimis fessur. Hæc quoque ex malis ulceribus, ubi nervi etia articulos læsi sunt. Et inter hæc loca maxime ex genibus &c. hæcenus Celsus. Hæc quia ad institutum nostrum faciunt, & affectum huncce Celso cognitum fuisse indicant, placuit illum Celso ascribere, & Ichorem & Meliceriam Celsi appellare.

Apud Germanos, quia frequens est affectus in articulorum vulneribus, Chirurghi nonnulli de eo scripserunt, inprimis Paracelsus, Felix Wiltzius, Hans von Gersdorf, *gerant* Schilhan, Petrus von der Etzle / Christoph Wilsung, Johan. Colerus, forsan et alii, qui mihi ad manus non venerunt, sed pæce eorum sit dictum, hæc appositis rem tegerunt, ut posthac suis ostendamus. Cur autem symptoma hoc antiquis & etiamnum rationibus Medico-Chirurgis veluti incognitum (nullus enim ex professis quicquam de hoc quod sciam scripsit) Lector posthac videre poterit.

Diximus superius, Ichorem & Meliceriam Celsi, ferotum, crudum, indigestum esse serum, testatur id Celsus, loco præallegato, & ipsa experientia fidem quoque facit. Est præterea acris Ichor iste, propter doloris vehementiam, inquietudinem & interiorum viscerum intemperiem calidam, calor natus ad debilitat, in ferotum huncce humorem in paulatim concoqui non possit. Quapropter ab intemperie illa calida acrimoniam acquirit, nervos, ligamenta, imò & plerumque ossa ipsa erodit, & canalicula ulcera hinc inde perfodit. Læsi præterea articuli squintur Ichor acris, tum propter nervorum abundantiam & exquisitissimum sensum, quo præditi sunt, tum etiam propter caloris nativi imbecillitatem, & sanguinis penuriam, quæ omnia ad concoctionem ichoris deliderantur. Non omnes autem læsi articuli Ichore, & Meliceria acri tentantur, sed li tantum, in quibus dolor maximus, & inflammatio supervenit: nisi enim superveniret dolor, nulla foret attractio humorum ex cæcisioribus & sanguinis, & proinde nulla subseque-

retur inflammatio, aut membri læsi intumescentia, multo minus copiosa illa ichoris profluxio. Calor enim natus patris læsi sufficiens esset, ad concoquendum ichorem, qui ab initio mitis est, & cum vulnere proportionem habet. Quia autem propter inflammationem partis affectæ, & totius corporis intemperiem calidam, propter doloris item vehementiam, vigilias, aliæque gravissima symptomata, calor natus destruitur, & quodammodo extinguitur, idcirco affluens ichor in pus converti non potest, sed crudus & indigestus affluit, sed & propter maximam inflammationem acrimoniam acquirit, ex qua symptomata omnia ingravescunt, & plerumque non tantum partem læsam, sed totum corpus destruit. Dixi antea, læsa articula symptomata, hæc præsertim supervenire, vulnera erim, & contusiones crassiorum partium, propter nervorum paucitatem, minus sunt dolorosa, & proinde affluxui humorum, & inflammationibus minus obnoxia. Abundant præterea his in partibus, sanguis & spiritus vitalis & naturalis, sanis & humidum radicale, quorum beneficio mox ab initio, nisi error in curatione à Medico & Chirurgico commissus fuerit, affluens ichor in pus inasabile convertitur.

In toto præterea corpore ad articulum læsum Ichorem live serum hoc confluisse dixi, contra falsam & ineptam bachelionorum & Anatoniz imperitorum hominum opinionem, qui ichorem illum articulo læso ingentium esse, & nequaquam aliunde profluere statunt, hæcque ob causam ineptissimam, ut Joh. Langius Epistolarum Medicinalium lib. 1. Epist. 3. & alibi testatur, vocabulo, Das Schiedmasser / hoc est, aquam articulum appellat, & esse arbitrat. Quod tamen falsissimum esse, etiam medicocriter in dissectionibus Anatomicis veteris Medicis atque Chirurgis, notum est. Sciunt enim, in omnibus articulis totius corporis, non tantum humoris feroti contenti, quantum ex digito uno vulnerato nonnunquam una die & nocte producere videmus. Addam exemplum unum aut alterum.

Nobilissimus & Prudentissimus Vir, Dn. Johannes à Wasenw. Inclitus civitatis & Reipublicæ Bernensis, Consul prudentissimus, Patronus & Amicus meus observandus, scilicet memoris, cum vulnus quamvis exiguum in digito medium recepisset, illud à bachelione male curatum fuisset, exorto dolore, icbur exillare coepit, & quidem tam copiose, ut intra paucos dies plus quam mensuram integram Bernensem effluxisse sapienter mihi affirmaverit: idque tanto cum dolore, febre, varium prostratione, aliisque gravissimis symptomatibus, ut parum abfuerit, quin vitam amitteret. Tandem quidem convalescit, sed articulus fœditus suo motu destitutus fuit: uti hinc meīs non raro vidi oculis: reliqua ex relatione nobilissimi ægri habeo.

Ante annos aliquos, cum Lausannæ Equestrium Medicinam & Chirurgiam facerem, in suburbio Maîtres, civem quendam quadragenarium Claudium nomine, doliarium, curandum habui. Ille fundendo ligna fibrem ipsi vulnus ad rotulam dextram secure infixisset. Id cum ab initio non usque ad magni momenti esse arbitrarer, & proinde expensis Chirurgos non adhiberet, sed nescio quo Balsamo semetipsum curare vellet, & labia vulneris intra dies quindecim unire, collectus fuit ichor in profundo vulneris; quapropter exorto dolore intensissimo me advocare jussi. Tum totum genus supra modum intumescentum inveni, inprimis tunc, quod & inflammatione adeo erat obfusum, ut Gangrænam in proximis esse, mihi videretur. Adter præterea febris continua & ardensissima, capitis & lumborum

cum dolor maximus, si sit inexhausta, causa, eructationes, cibi fastidium, Inquietudines, Vigiliæ, Lipothymia, & tanta vicium prostratio, ut sibi vix in alterum diem usque vitam transigere posse putaret, parumque superest spem. Ex ipso autem vulnere caro fungosa & livida, ad magnitudinem ovi gallinæ excrescit, quæ pelluculo obducta esse videbatur: In illam cum styli exploratorium immisissim, (quod facillè & sine ulla violentia præstari) Ichorem copiosè effluxit, ut prima illa vice ultra æquilibrium in scutellam colligere, sequentibus quoque diebus consolidè & sine intermissione castillavit, ita ut sanè athermate possim, intra paucos dies ad multas libras effluxisse. Tandem summa à me adhibita diligentia utcumque contrahit, utcumque inquam, genu enim suo motu privatum fuit, totumque corpus propter morbi violentiam & diuturnitatem cacochymicum, languidum, & ad vitæ suæ finem imbecille remansit.

Exempla hæc (quorum nisi Lectori tardiosum esset, insinua habeo) adhibere placuit, ut barbariores eorum ineptiam ex eis viderent, continent quidem articuli in se humorem viscosum, & veluti macilaginem, à natura (ut docet Hippocrates lib. de locis in homine, & libro de fracturis ossium) in hunc finem procreatum, ne continuo motu excrescerent, sed lubrica persistere verum tantam copiam, ut plerumque effluere videmus, in se continere posse, absurdum est dicere. Secundò, ut indigantem, Ichorem hunc ex reliquo corpore ad articulum læsum confluere. Quod & post Democritum testatur Langius, loco superius allegato, his verbis. Quamvis, inquit, bona pars Medicorum causam phlegmonis vulnere, in corporis Cacochymiam referunt, Democritus tamen (me iudice) rectius in dolorem refert, qui ex musculorum nervis & tendinibus vulnere, obortur circa articulos, sensus & arbitrii motus organa: quæ cum ferè nulla carne sint cooperta, acutius sentiunt, & ob id majore dolore quam Epigastrii musculi canisoli affligunt: qui velut cucurbitula omniarum humorum alluvie ad vulnus pellicie, quod tandem vulnus intumescens, rectio aut ad plurimum quinto die phlegmonie & aliis symptomatibus corripitur. De his videt Lector plura apud doctissimum Langium loco citato, & in epistola ad Lectorem libri primi Epistoliarum. Tertio patet ex prædictis observationibus & historiciis, affectum huncce scaturiginem esse quamplurimum gravissimum symptomatum, ut sunt Cacochymia, isætiæ, Atrophia, hydrops, & infinita alia, de quibus in fine hujus libri singulatim & fusius agemus.

Distinguit quidem Celsus loco citato affectum huncce in Ichorem & Melicæ, sed distinctio hæc solummodo in colore & consistencia materię, quæ effluit, consistit, nec usque adeò magni momenti esse arbitror. Si quis tamen accuratam observaverem, & diligentem Chirurgum se præbere voluerit, videbit materiam, quæ ab initio morbi effluit, verum & subtilissimum Ichorem plerumque instat aque limpidissimæ esse, tandem verò in Melicæm abire, & crassiores & glutinosiores fieri. Mutatio illa materię effluens, optimum signum est, & naturam citra concotionem ichoris occupatam esse, & in victricem morbi evadere posse, spem facit.

Est alius affectus Melicæ dictus, de quo Gale-nus libro de tumoribus præter naturam, sed cum Ichore & Melicæ Celsi nullam habet affinitatem. Est enim abscessus mollis, flaccidus, & indolens, ex materia frigida, mellis albo non absimilis, & membrana inclusa, groitius. De quo instituum nostrum non est hic tractare.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

H Actenus quid sit ichor acris, sive hydrops articulo-rum, breviter exposui, sequuntur nunc causæ. Sunt illæ externæ & internæ, adde tamen concurrunt, ut una sine altera via reperiantur. Externa est vulnus aut contusio, fractura vel dislocatio, Interna est Cacochymia, & redandantia pravorum humorum: plerumque etiam plethora. Paracelsus etiam addit causam, videlicet negligentiam vel potius inscitiam Chirurgi, quam ego causæ internæ præfero. Etiam enim corpus Cacochymicum, vel etiam plethoricum fuerit, raro tamen Ichorem consequi videmus, si vulnus à rationali Medico aut Chirurgo ex arte curatum fuerit, uti postea fusius dicam.

Non autem omne vulnus hujus mali causa existit, sed illud præcipue, quod aut in ipso articulo, aut prope ipsam infirmum est: idque propter sequentes causas, Nervi, qui, ut testatur Galenus de usu partium lib. 12. corpori motum & sensum largiuntur, hinc inde pet musculos dispersi, in ipso articulo tam copiosè concurrunt, ut via detur vulnus in articulo, ubi non sit læsus nervus, aut nervolum quid. Hinc protinus sequitur ingens dolor, dolorem (quia humores ex vicinis locis ut cucurbita ad se trahit, ut idem Galenus ducit) sequitur inflammatio, quæ calorem ejus partis ita debilitat, ut influentium humorum impetu resistere non sit sibi potens: quapropter tanto cum impetu, tantaque in copia circa vulnus confluit, ut cum beneficio nature in pus laudabile converti non possint humores illi, indigesti & crudi effluent, necesse est. Ichor ille propter maximam intemperiem calidam partis læsæ, mox acrimoniam acquirit, pariesque nervosæ pungit & erodit: hinc dolor magis & magis excrescit, morbusque augetur, donec dolor ledatur.

Sunt præterea juncturae respectu aliarum partium propter carnis, venarum item & arteriarum penuriam imbecillæ, & fragiliores, & proinde minus idoneæ ad digerendos serolos hofce humores. De contusionibus & fracturis, quæ circa juncturas sunt, idem statendum est. In his enim si error in curatione commissus fuerit, dolor, affluus humorum, & inflammatio supervenerit, facillè hydrarthros sequetur, ut postea exemplis ostendam.

Non solent autem externa sive primitiva illa causa, nisi interna, quam Medici antecedentem vocant, concurrat. Si enim repleto sive ad vites, sive ad vasa, non adhaerit in agro, non facillè vulnus inflammacione tentabitur. Non facillè merito ascribendum est nonnunquam enim affectum huncce in corporibus robustissimis, sanis, & putis accidisse memini: addam exemplum unum aut alterum.

Rusticus quidam sanus optimoque corporis habitu prædictus, Hans Egligher nomine, fobditus Nobilissimi Viri Dn. Petri à Wartenwul, Domini in Weil &c. Cum Anno 1617, ab alio quodam rustico in consuetudinem, ad secundum articulum medii digiti manus sinistrae mortuus fuisset, & ab inoperto quodam barbariore curari posse, credidisset, non diu post sequens est dolor maximus, inflammatio & tantus affluus humorum serolorum, ut vix credibile sit. Tandem exitis & putrefactis ligamentis & appendicibus; à me, divino aspirante auxilio feliciter restitutus fuit, nisi quod junctura illa rigida & immobilis permaneret, quemadmodum prolata dictum fuit in quarta Cent. Obsev. 87.

Anno 1583, Mercatori cuidam in Langenberg prope Dusseldorpium, Gihard Manch nomine, post

modum hominis in dextrum indeclem idem accidisse memini. Is quamvis esset Vix juvenis, robustus, & optimo corporis habitu præditus, nihilominus tamen, exorto prius dolore, tanta sequuta est humorum affluxio & inflammatio, ut Chirurgi, quibus curatio commissa fuit, manum ad corpus amputare decreverint. Industria tamen & arte Viri præstantissimi, Dn. Cosmi Slotani p. m. (apud quem ego tum temporis artem meam exercebam) non tantum manus, verum etiam digitus conservatus fuit. Propter erosionem tamen tendinum & ligamentorum primus & secundus articuli rigidi permanserunt. Longa quidem ac laboriosa fuit curatio hæc, adeo tamen ad votum successit, ut in toto isto ætate, tam à nobilibus quam plebeis, laudibus veluti ad cælum excolletetur Dn. Slotanus.

Hæc in eum finem scribo, ut manifestum fiat; tantam doloris attrahendi esse potentiam, ut etiam ferum & veluti nutrimentum ipsum pro nutritione constitutum, ex toto corpore ad se trahere, & in excrementum convertere possit. Hinc sequitur atrophia illa maxima, quam plenumque hydræthum sequitur. Vidi id plenius Novissæ in Belgio in pella quadam sana, & optimo corporis habitu prædita Magist. i. Anthonii ben dem Kan/ p. m. barbitonioris filia. Illa die quodam ambulando per urbem, pedem sibi aliquantum contrivit; verum cum dislocati nem nullam adfuisse, mater, rerum Chirurgicarum non ignara, cognovisset, non usque adeo hæc de re sollicita fuit. Post dies aliquot cum per Invenisset, & dolere accrevisset, accedit ad ipsam barbitonior quidam, qui antea attem suam apud prædictum M. Anthonium discebat. Is ultro se offert, se velle & posse intra paucos dies pedem in pristinum statum restitueret. Mater itaque concedit, filia patitur, barbitonior ex parte vino oneratus, excutit pedem eandem, & hinc inde d. torquet; quid fiet? Exoritur dolor immanis, & longè acerbissimus, nec unceret veluti tectis oculis affirmare ausus sum, intra paucos dies ad multas libras aquæ aut ichoris ex pede, multis in locis exulcerato, effluxisse; at quis non videret ichorem aut humorem huncce lerofum & indigestum ex toto corpore, doloris vehementia attraxit fuisse? Reliqua enim membra intra paucos dies ita exaruerunt, ut ossa vix esse obtegerentur. Statim quoque post crudelem ac nullo modo necessariam illam extensionem, febris, lipothymia, nausea, inquietudines, delirium aliæque gravissima symptomata supervenerunt. Tandem post infinitos dolores, arte & industria Domini Johannis Daingens, ejus urbis Chirurgi non vulgari, utunque restituta fuit, utunque inquam. Ligamenta enim, cartilagine & appendices articuli, quia ab humore illo acri erolæ fuctant, rigida & immobilia permanserunt junctura, ita ut per totam vitam claudicaret. Anno 1622. simile exemplum vidi Bernæ in juvene quodam, cujus historiam v. de circa finem hujus libri cap. 29. de ulcere cum esse carioso.

Dupl'cent autem esse materiam effluentem ex articulo hydræthæ obliquo, sui loco dixerat, nimium aut tenuis aut labilis, quæ propter ichor dicitur, aut aliquantum spissior, & Melicetia appellatur, quæ diversitas ratione humoris, in corpore redundantis, accidit. Si enim pituitosus fuerit ager, materia quæ effluit, ichorosa, alba & veluti serum lactis calet; nonnunquam quoque aliquomodo viscida, glutinosa, ac si albumen ovi consensum permixtum esset, effluit. Si biliosus fuerit corpus, aliquantum flavescit; si arabilis, obscurus erit. Rubescit verò, & cruenta erit, si æger plethoricus, aut vena aliqua capillaria erola fuerit.

Secundum porro calor innatus parvis affectibus conditionem, & humoris effluentis copiam ichor, qui affluit, nunc subtilissimus, nunc vero aliquo modo spissior erit. Si enim ad summam imbecillitatem reddatus fuerit calor innatus, tum partis affectus, tum totius corporis, serum, quod effluit, subtilissimum erit, præsertim si copia efflueret. Quantum vero prædictus calor robustior fuerit, tantum ichor erit spissior. Calor enim natus violentam illam materiam digerit, concoquit, & paulatim in pus convertit. Hinc evenit, quod in dydathro ichor primò subtilissimus effluit, post impetum vero morbi, & sedatis doloribus, cum natura vires suas recolligit, paulatim incassatur materia illa acri, sique in illa mellis est; deinde quoque oleaginosa, donec vi naturæ in opurum pus redacta fuerit.

Testim causam hydrops articulorum, ignorantiam Chirurgi esse, ab initio hujus capituli diximus. Paracelsus hujus quoque tenuis sententia, & synoviam suam leplissimè propter incuriam & insitiam Chirurgi accidisse, diversis in locis testis tui, Bertheonæ l. b. 1. cap. 7. mihi romo. 3. pag. 347. inter alia hæc habet verba: *Wenn das Schiedwasser gethet / so ist es ein Zeichen eines unvorsichtigen Arztes*: hoc est, quando aqua articulorum thar, ignorantiam Medici denotat. Tattur Paracelsus, ignorantiam Chirurgi quidem esse causam, interitum tamen quomodo aliquis hunc malo præcavere, vel methodicè illud amovere & curare possit, tuos non ex arte instructe, ex eis, quæ in scriptis suis continetur, satis apparet.

Joh. Langius l. b. 1. Epistolæ. Medicinalium, Epistolæ 3. de ineptis & incuratis Chirurcis scribens, rem veluti acu rigit, his verbis. *Quam*, inquit, *teste Galeno in curanda vulnerum uhi sit prius, providendo ne plegmona corripiatur, hi*, (videlicet barbitoniores) *non modo quod plegmona se, ignorant, sed nec musculorum aut tendinum, aut nec calorem compingunt, aut firmum novum, &c.* Quibus verbis magnus ille vir, præcipuum illud, quod in Chirurgo rationali d. fiderat, Theoriam videlicet, sive fundamenta artis Chirurgicæ, comprehendit; ut enim fidelis ac diligens architectus primò fundamentum ponit, deinde superedificat: ita etiam vult Langius, ut Chirurgus primò imbuitur sit Theoria, hoc est cognitionem habeat principiorum artis. Ubi enim Theoria deficit, præcis incerta & labilis est, omniaque experimenta Empiricorum periculosa sunt, astante Hippocrate lib. 1. aph. 1. Contra, si Chirurgus ingeniosus & diligens in Theoria versatus fuerit, facile in excellentissimum prædictum evadit, in gravissimis quæ etiam affectibus, quæ facienda, facillè cognoscet.

Theoria autem in se comprehendit cognitionem subiecti Chirurgicæ, hoc est, structuram corporis humani, notitiam item morborum, eorumque causam, accidentium, & hujusmodi. At quia hæc plenumque in Chirurgo Germanis, pro dolor, desiderantur, ut quorum major pars studiosum, quibus fundamenta artis acquiritur, contemptiores, mirum non est, si symptoma hoc inter ipsos tam frequens est, & vix repulsi barbitonior, cui non sit notissimum. Quæ methodo verò sit evitandum, aut quibus remediis curandum, ipsos ignoret, sedem facit quædam experientia, imò & remedia ipsa, ut cap. 12. fusius ostendamus.

Vult præterea Langius in prædicto loco, Chirurgum notitiam habere structuræ corporis humani, & merito. Quemadmodum enim oculis attitex, quamvis rostris, in sua arte perfectus esse potest, n si habeat notitiam subiecti suæ artis, ita etiam nemo perfectus esse Chirurgus, nisi Anato-

mix scientiam aliquam habuerit. Præcipuum autem in curatione vulnere est, scire, quamnam pars sit læsa, inde enim quamnam symptomata expectanda, facile conijciat Chirurgus. Si enim vena aut arteria secta fuerint, hæmorrhagia expectanda est, nervo vero aliisque nervosis partibus læsis, dolor ingens, inflammatio, convulsio & huiusmodi symptomata merenda sunt: quibus omnibus diligens & io Theoria versatus, Chirurgus, tam videtur ratione, quam evagationibus, aliisque prædictis manū testifere potest, hæc verò quæ pui Empirici ignorant, mirum non est, si valuerat etiam ex minimis volucribus gravissimo hocce symptomate corripuerit, Paracelsum quia etiam ignorantiam & inficiam Chirurgi synoviz caulam esse, statuisse.

Præter prædictos errores alios quoque nonnullos vulgus Chirurgorum, propter infirmitatem committit, dum ali de cocto vulneratio, ali Emplastro stictico, sive fodicationem Paracelsi, vel balsamis quibuldam, vulnera omnia, sine distinctione statim ab initio, protinus occludere, & ad cicatricem perducere tentant. In vulneribus carnosorum partium, ubi neque nervus, neque nervosum quid laesum, neque contritio adeit, etsi id locum habere posse videatur, quia tamen periculo non vacat methodus illa Empirica & irrationalis, & doctrinæ Galeni adversatur, idem à rationalibus Medicis non probatur, sed ut periculosa & incerta rejicitur. Nos enim sufficit, ut citò eumemus ægrotum, nisi id tunc quoque & jacundè, hoc est, sine dolore fiat. At huiusmodi medicamentis, quæ vulnus potius claudunt, sine periculo ab initio uti nos non posse, docent quotidiana exempla & ratio ipsa. Dum enim superficialis vulneris, quæ carnosa, calida humidatque est, & sanguine abundat, citò coalescit. Nervosæ verò partes, quæ frigida & sicca, paucosque sanguine præditæ sunt, consilium ac simul consolidari nequeunt, colligitur materia serosa in profundo vulneris, quæ mox acrimoniam acquirit, nervos nervosque partes pangit & vellicat, hinc dolor gravissimus, & plerumque hydarthrosis sequitur, sed de his plenius suo loco dicturus sum. Rectè itaque dicit Seneca: *In morbis nihil magis periculosum est quam immatura Medecina*. Vidi id Anno 1620. Mense Junio in juvene quodam Benetini, 12. circiter annorum, & Magistri Matthie Keller Accutali Kell. Is sibi ipsimet cultro insignis vulnus in sinistri indicis articulum, qui medius est in ordine, ubi sola cutis in transversam fissa fuit. Superficiem vulneris decocto vulneratio, intra paucos dies consolidavit. Verum collecta materia in profundo vulneris, digitus totaque manus mirum in modum intumuerunt, dolor maximè exortus, & hydarthrosis sequutus est, ut capite 7. fufius dicam. Quæ incommoda & horrenda symptomata ex Emplastro stictico, & balsamis ab idiotis & theoria artis imperitis, applicatis, sequi vira sunt. Lector suo loco quoque videte poterit. Hinc curationes huiusmodi, quæ citò fiunt, tunc tamen, sed & multò minus jucundæ, fieri non posse, videmus. Quapropter doctrinam, quam magnus Hippocrates lib. 1. Aphor. 21. de internis Medicationibus nobis reliquit, ad externa vulnera haud inepte & male quoque referte, & accommodare posse mihi videtur, de quo plura cap. 6. Deo dante.

Aliam & gravissimam profectò errorem Felix Wirtz, Chirurgus Basileensis, alioquin diligens, sed in theoria arte parum versatus, inter Chirurgos Germanos introduxit, quæ plerumque Ichorem & Meliceriam provocat, dum to digitorum & manuum vulneribus, usum turundarum improbat. Hinc cutis, quia membranosa est, protinus contrahitur, vulnusque

Bibl. Chirurg. Tom. II.

clauditur. Natura enim partes nobiliores, veluti venas, arterias, nervos, nervosque omnia, eute ab injuria ætè vindicare solet. Porro caro, multo magis membranæ, partesque nervosæ, quia tam citò coalescere nequeunt, colligitur materia in fundo vulneris, (præsertim si angustum fuerit) incalcescit, & dolorem, inflammationemque primo, deinde quoque hydropem io articulo faciunt procreat, uti lector videre poterit in quæta Centotia observationum nostrarum. Observe. 76. ubi errore Wierzi paulo prolixius refutavimus.

Inter Empiricos, & theoria artis imperitos barbitonifores, & hujus farinæ homines, maximo in pretio habetur unguentum, quod vocant armatum, eoque cultum aut gladium, quo vulnus infictum fuit, innungunt, sed ut plurimum parum felicitat, dum enim gladii aut cultri curam habent, vulnus verò negligunt, contrahuntur ipsius labia, gravissimaque subsiquuntur symptomata, uti capite 10. prolixè scripsi.

Nunnulli inter Empiricos & Theoria ignaros, ulterius & magis ad Diabolici progrediantur, & vulnera hi characteribus & signaturis, aliis conjurationibus diabolicis, aliisque mediis, Christianis illicitis, sanare student, & justissimam Dei iram provocant, ægrotique suos plerumque io maximum periculum deducunt. His omnibus consideratis & ponderatis, quis quæso non videt, ignorantiam barbitoniforum, aliorumque imperitorum Empiricorum hominum, ut rectè Paracelsus scriptum reliquit, præcipuum esse causam hydropis articularum, sive synoviz.

Cap. 3. De nomine hujus morbi.

A Pud Methodicos & rationales Medicos Ichorem & Meliceriam tarum quid esse, imò & æstivis Medicis, præter Cellum, incognitum fuisse morbum, capite primo ostendi. Ut igitur essentia morbi rectè intelligatur, visum est adhibere nomina, quæ Germani Chirurghi ipsi imposuerunt. Paracelsus variis in locis hujus fæctus mentionem facit, eumque synoviam Ghidmasser appellat. Felix Wirtz eisdem vocabulis utitur. Vulgus quoque Chirurgorum Germanorum, dictionem Ghidmasser, aut, ut aliis placet, Gluttmasser retinuerunt.

Videtur autem Paracelsum appellationem suam ab ovo deducere voluisse, cum enim Ichorosa materia, quæ ex læsis articulis fluit, albumini ovi non multum sit abhorrilis, synoviam ex Græco vocabulo syn & genitivo ovi, formare voluisse (similitudinem quasi cum ovi albumine habentem) verisimile est. Sic enim alio in loco affectum huncce definit: Ghidmasser, inquit, ist / wann der Klar des Eiders austrinnet / idèe wie ein geschlagen Eyerklar / hoc est, synovia est, quando humidum nervorum viscidum. veluti albumen ovi concussum, effluit. Ut ut quoque Paracelsus vocabulo isto Synovia in alia significatione, sed de hac institutum nostrum non est hoc loco agere. Videat Lector Scholia sua in libris Paragaphorum, Commentarium de Gura, mihi rom. a. p. 139.

Nonnullos affectum huncce Gluttmasser appellare diximus, & rectè quidem. Vocabulum enim hocce à prunis & carbonibus accensis Germanicè Glut / & aqua Germ. Wasser / deducum est. Quemadmodum enim prunæ corpus nostrum adurunt, dolorem maximum pariunt, pariemque, nisi maturè amoveantur, destruant, ita etiam ingoribus doloribus & tormenais assurgunt illi, quibus Ichor æctis, sive aqua illa corrosiva ex vulneratis articulis profluit. Deinde quemadmodum Carbones igni, insigniter exsicant, & omniaque comburant, ita etiam

ichor ille, propter acrimoniam, quam habet, non tantum humidum radicale exsiccat, verum etiam ut plucimum venas, arterias, nervos, ipsaque ligamenta & ossa erodit, & sepius calorem nativum penitus exstinguit, ita ut Spæcacles, in quo pars affecta nigra, veluti carbonis cernitur, subsequatur. Præterea ut ex carbonibus ignitis, vapores calidissimi sursum tendunt, ita etiam in hoc morbo ex parte affecta vapores calidissimi exsurgunt, partemque nobiles, in primis hepar, cor & cerebrum ferunt, gravissimæque symptomata excitant, de quibus in sequentibus scribam.

Cæterum quantum ad appellationem Germanicam *Ölhdraffer* / hoc est, aqua articulozum, si simpliciter & de ea significatione ponitur, in qua vulgus Chirurgorum illam sumit, ineptissimum vocabulum esse, cum Joh. Langio, lib. 1. *Epist. 3.* sentio. Vult enim, aquam hanc in articulis naturaliter contentam esse, id verò falsissimum esse, in præcedentibus ostendi. Non potest enim vox illa *Ölhdraffer* / quæquam aliud, quam naturalem articulo insitam aquam significare. Adjuncto verò vocabulo Germanico *fucht* / perbelles ad hunc morbum accommodari posse existimo. Appellarem itaque affectum huncce Germanicè *Ölhdraffer-fucht* / hoc est, morbosam articulozum aquam. Vocabulum enim *fucht* / dispositionem morbosam denotat. Sic rectè dicitur Germanicè *Wasserfucht* / *Öel-fucht* / *Ballen-fucht* / *Lungen-fucht* / &c. Latine unico vocabulo eleganter appellamus affectum huncce hydropem, hoc est, hydropem articulozum. Etiam enim in ipsis juncturis tanta copia aquæ naturaliter non continetur, ut antea demonstratum est, in ipso tamen articulo lato recipitur, colligiturque. Sic quoque dicimus, hyd ocephalus, hydrocardia, hydrops uterinus, quando aqua in capite, circa cor, aut in matrice, præter naturam concole colligitur. Hujus sententiae quoque fuisse Dn. Johan. Langium, ex epistola paulo antea allegata apparet. Ubique enim Celsus (loquitur autem de edit omnibus Dn. Hieronici Sæpiani, & Dn. Johan. Furnæii, quæ mihi ad manus sunt) Ichorem scribit, Langius hydropem ponit. Adhibeam verba Langii, multum enim ad cognitionem vulnorum rectè instituendam, & hydrarthrum prævidendum faciunt. *Quam inquit (telis Galeno) in curando vulnere nihil sit prius, quam providere, ne phlegmone corripitur. hi (videlicet imperiti barbariores) non modo quod phlegmone sit ignorant, sed nec musculorum & tendinum, aut articulorum compagemine & firmi noverunt. Nec principio nervorum, ne spasmus corripitur, provident: nec febris, quo totum corpus tabescit, rationem habent, quum vulnereis membris libere vinum, cibariisque æquanimi conditura preparatis, libere vesci permittant: nec vulnereis inflammationem agnoscunt, dures pro sanis bene cella, liquoris faulem, oleumque, & in illis feri laicis tenent, ubi cum emicare viderint, quem Democritus perbelles appellat ichorem, erigendyaleptem, Curculius vero Celsus hydropem & Meliceriam appellat. Est, inquit, quidam sanies, quæ velut hydrops tenuis, subalbidus, ex male necre exit, maxime ubi nerve læso, inflammatio subsæva est. Hæc tamen Langius.*

Non male autem vocabulum hoc hydrarthros, five *Hydrops articulozum*, & Germanicè *Ölhdrafferfucht* / in hoc morbo, propter sequentes rationes, convenire mihi videtur. 1. Quemadmodum in hydropse aqua in partibus carnis torus corporis, ut in Anasarca, vel in abdomine, seroto, & cretibus tantum, ut in Ascite, colligitur, ita in hydrarthro in hanc vel illam joncturam læsam confluat. 2. Quando calor nativus hepatis ita languescit, ut chylus in sanguinem converti non possit, generatur hydrops, ita

quoque ubi in articulis propter doloris vehementiam, inflammationem, & abundantiam humorum excrementiorum, calor nativus veluti suffocatus, prostermitur, aqua ita concoqui non potest, sed cruda & indigesta effluit. 3. Quotiescunque insignes obstructions viscerum, præteritum hepatis, adiant, hydrops plerumque oriri consuevit. Si in articulis vulneratis, Medicamenta quæ insigniter exsiccant, constringunt, & poros claudunt, uti sunt, pilæ cataplectæ, de quibus vide Langium loco citato, aut pulvis Ostreorum, Cranei adulti, ossis sepiæ, spodiæ &c applicas, aut vulneris labia protinus, & æquequam vulnus probe sit digestum, & mondificatum balsamis, portiozibus vulnerariis, aut emplastro Scithico, five fudicationum Passæli, claudis, Ichorem aciem five hydrarthrum excitabis. Clauso enim vulnere in superficie, & patrefcente materia in profundo, incalebit, sitque acris, dolorem excitat, & serofos humores ex proximis adjacentibus partibus, vel etiam ex toto corpore attrahit, sequiturque hydrarthros periculosissimus, quemadmodum capite primo de civc Lausannensi dictum fuit.

Cap. 4. De signis Ichoris & Meliceria Celsi, hoc est hydrops articulozum.

Etiam si inter Germanos adeo frequens sit hydrops articulozum, ut etiam plebis hominibus, & ipsi barbi notum tyrionibus notissimum, antea dictum fuit, & proinde ut de signis aliquid scriberem, superfluum esse videatur. In gratiam tamen aliorum, quibus affectus ille a. huc incognitus, observationem singulariter, ex qua omnia fere signa hujus affectus colligi possunt, adhibeam.

Anno 1616. patricio coidam Bernensi Dn. *Philippo Kitchlerger* nomine, in conspectu vulnus ad si oitrum carpi me insiditum fuit, ubi vix curæ ad ligamentum obliquum usque fasciatum. Advocato Chirurgo, qui loco more vulnus curat, & in parvo, parvo quoque spacio temporis cicatricem obducere tentat. Ab initio quidem ex voto successit omnia, & nullum addidit symptoma, præterquam quod in digito annulari & auriculari de stupore quodam molesto conquaretetur æger, quod in vulnereis nervorum partium, brachiorum videlicet ac manuum, eorum item pedumque, veluti symptoma inleparabile esse consuevit. Dum enim illico post ictum humores circa partem læsam confluunt, facillè impeditur spiritus animalis, quo minus libere ad extremitates confluere possit. Ex hoc porro stupore (quod monendum est, antequam ulterius progredior) facillè cognoscet diligens Medicus & Chirurgus, non solum quæ pars sit læsa, verum etiam læsionis magnitudinem. Nervum enim aut nervorum quod læsum esse denotat: & propterea major fuerit stupor, eò majorem quoque nervosarum partium esse læsionem, argumentum est. At si nervus omnino fuerit abscessus, non stupor tantum, verum etiam sensus & motus abolitus sequitur. Sed hæc obiter. Redeo nunc unde passim digressus eram. Diximus, vulnus tam exiguum fuisse, ut ligamentum obliquum vix læsum, quapropter ab initio neglectum, & tam in viciis ratione, tum in reliquis omnibus erratum est. Porro circa tertium diem morbi, cum æger ipse simul & Chirurgus omnia jam in tuto esse arbitrantur, paulatim exortus est dolor, qui intra horas 24. ita auctus fuit, ut incredibile sit dictu. Ego quinta die morbi ad vocatus, ægrum præ summo dolore ejulantem, & alta voce exclamantem juveni. Febris maxima, ardens & continua, cum

linguz

linguæ ardore, capitis dolore continuo, & sitis inexhausta adeat. Vigilis quoque, inquietudinibus, nausea, eructationibus, cibi fastidio & vomitu vexabatur, & liporchymia frequenter superveniebant cum ventris constipatione, renum & lumborum dolore inenarrabili. Manus simul & brachium mitum in modum erant tumefacta de inflammatione obfusa. Vultus carne spongiosa, & aliquo modo livida, aut ex pallido livescens, teplem: ex quo non pus coctum, sed humor turbidus, & veluti ferum lactis copiosissime extillavit. Hæc etsi gravissima esset symptomata, cum bono Deo tamen feliciter à me restitutus fuit, nullo remanente manus incommodo.

Ceterum etsi ex prædicta historia signa omnia hujus symptomatis colligere possint, in gratiam tamen ryonum paulò profutius ea explicare visum est. Primum itaque signum est, quod non pus, sed ichor, hoc est, serosa & viscida materia ex vulnere effluit, ab initio quidem parvè, paulatim tamen copiosior. Sed hic notandum est, in omnibus ferè vulneribus nervosorum partium, ab initio serosum & crudum quid effluere, etiam omnia rectè & ad votum succedant, quapropter ex solo isto signo, aquam articularem ut ita dicam, fluere, nouum est judicandum, donec & alia adveniant symptomata.

2. Circa tertium & quartum diem, pars affecta intumescit, ex reliquo enim corpore humores circa vulnus confluant.

3. Eodem quoque tempore propter affluensium humorum copiam, inflammatio sublequetur, & æger vapores quosdam calidos, (siccitè dicitur) ex ipsa parte læsa sursum ascendentes, percipit.

4. Oritur dolor inenarrabilis. Materia enim in parte affecta collecta & acris rediit, nervos nervosque partes pungit, atque vellicat.

5. Labia vulneris in aliquibus coarctantur, ut plurimum tamen, & ferè in omnibus, elevantur & iurumescunt, & vulnus carne quadam spongiosa, & ex pallido livescens, replem conspicitur: Quæ omnia ex serosi humoris abundantia & malignitate, nec non caloris nativi ejus partis labefactione procedunt.

6. Febris adest continua, quæ in aliquibus ardens, in omnibus remissior existit, prout dolor intensus aut remissior, & abundantia humorum in corpore adjuvat. Ex febre postea linguæ asperitas, sitis, capitis, lumborumque dolor, inquietudines, & vigilæ, nausea, & cibi fastidium, vomitus, alvi constipatio, aliaque symptomata supervenire consueverant. Hæc breviter de signis; Quæ præterea symptomata expectanda, lædè ex frequenti capite colligere poterit.

Cap. 5. De Prognosticis Ichoris, sive Meliteria.

Quid sit hydrops articulorum, ipsiusque causas & signa breviter exposuimus, nunc quæ ante curationem percipiendæ, & ægroti adstantibus prædicandæ, paucis ut annectam, ordo tractationis postulat. Ipsiis autem scire expedit, omnem Hydroperem articulorum, gravem atque periculosam esse ædum, etiam in minimo fuerit digito. Talem enim esse morbum, & omnes partes principes ab ipso altereotur, sæpissime vidi. Idque præcipue sit ratione doloris. Dolor enim quotiescunque partem aliquam infestat, humores ex toto corpore cum violentia, & veluti cucurbitula ad se trahit: testatur id Galenus multis in locis, ut experientia fidem faciat. Inde cacoethem, ut testatur Gal. meth. me-

dendi lib. 5. statim fieri, quæcunque in articulo accepta vulnera sunt, omnes ferè sciunt. Humores enim serosi, qui ex toto corpore ad articulum confluant, incallescunt, putrefiunt, maligni & acres fiunt, tandemque ligamenta, appendices, cartilagine, nonnunquam & ipsa ossa erodunt. Porro cum omnes partes corporis arteriis, venis, & oervis præditæ sint propter doloris vehementiam, & in parte affecta collectam materiam acrem & malignam, per venas beat, per arterias cor, inficiuntur & incallescunt, & hec quidem propter venarum multitudinem & magnitudinem primo, mox quoque cor mediis artibus, sic febilis, sitis inexhausta, dolor capitis & lumborum, multaque alia symptomata, quæ febres comitari solent, oriuntur. Si dolor diu duraverit, Liporchymia quoque supervenient, primo, quia dolor vires dissolvit, deinde etiam quia vapor putridus & malignus ex ipsa parte affecta per arterias ad cor ascendit. Delirium quoque nonnunquam supervenire consuevit, idque tam propter contumiam, quem cerebrum cum parte affecta, mediis nervis habet, tum etiam, quia vapores multi calidi & sicci, sive biliosi & putridi, ad caput ascendunt. At fidelitatem diu infestaverit ægrotum, placentis quoque periculosam consequi solet. Diu durante dolore, spasmas tandem invadit ægrotum. Accidit ille ut plurimum aut propter Sympatiam sive contumiam, quem pars læsa cum cerebro & spinali medulla habet, aut quia vehementia doloris & continuis vigilis, nervi præter modum excitati & arefacti fiunt, tum etiam quod præter maximam copiam serosorum humorum, qui ex vulnere effluunt, totum corpus, & per consequens nervi extenuati & exsiccati sunt.

Gangrenam in aliquibus consequorant fuisse hydropem articulo, ubi servavi. Johan. Langius Epist. 3. lib. 1. id quoque testatur. Accidit illa propter ingentem inflammationem, præcipue si frigida medicamenta, ut mos est quorundam barbariorum, applicentur, ulceribus enim frigidum si frigidasque mordax cutem obducit, substantiam ejus densam & coarctant. Dolorem insupportabilem facit, eo quod nativum calorem, qui suppurationis causa est, extinguit, livorem obducit, & denigrat, rigores febiles, convulsionem, distentiones creat. Hæc faciunt frigida medicamenta, præcipue in vulneribus nervosorum partium, ut alibi testatur Hippocrates. Est igitur summo studio procuranda & acceleranda suppuratio, sive digestio vulneris, quæ quidem in aliquibus citò, in aliis tardè perficitur ut cap. 6. fusius dicemus.

Ut plurimum autem sic in copia, uti sæpissime antea dictum fuit, affluens humoribus (qui propter intensissimam intemperiem calidam partis affectæ, acrimoniam, & quidem malignam acquirunt) ligamenta & appendices articuli eroduntur, quibus cæcis, ossa, mediante callo validissimo connectuntur, & junctura sit rigida atque immobilis, nec ulla arte aut industria (quod ryonibus artibus diligenter notandum est, ne inconsideratè ea, quæ ætuo præstare possent, ægroti aut adstantibus promittant) restitui possent, quod ego in multis observavi, etiam in nobilissimo viro Dom. Johanne à Wæterovill, cujus meo facta fuit cap. 1. & in rustico quodam, cujus memini cap. 2. Habeo inter ista mea anatomica, ossa brachii finistri, in sepulchro quodam reposita, quæ in ipso cubito validissimo callo, & quidem tam eleganter sunt connecta, ut ut antea ibi fuerit junctura, vix appareat. Accidit id procul dubio propter hydroperem istius articuli. Quæ enim humeri supra cubitum fractum fuisse, etiam nunc ex callo evidentissime apparet. Hinc conficio, fracturam

Churam non satis rectè curatam, inflammationem & affluxum humorum ad cubitum, ejusque hydropem sequutum fuisse. Hominem autem huncce multos annos cum hoc affectu vixisse, nec unquam brachium sursum elevare potuisse, & ad pectus semper gestasse, ex capite cubiti apparet; illud enim non igituram habet figuram, sed obtusum & depressum est.

Anno 1618. Basilæ in Comitæto ad S. Elisabetham os femoris sinistri inveni, quod in Museo meo etiam nunc reservo. In hoc osse caput femoris cum capsula sua callo tam rectè & valide coheret, ac si unicum esset os, vixque apparet, juncturam ibi fuisse. Vulnus autem globulo plumbeo vel sagitta ossi ipso femoris infixum fuisse, non longè à capite femoris in osse perbellè apparet, sed de his plura cap. 25. Placuit exempla hæc addere, ut ex eis juniores Chirurghi & Medici discant, se oleum & opusculum perdituros, quotiescunque post hydropem articulorum, amissum morum articuli restituerent student.

Sæpius quoque in ipsa curatione propter doloris vehementiam & inflammationem, nervi & tendones strahuntur, & incurvatur membrum, illæsi tamen ligamenti, & appendicibus, quod in casu adhuc aliqua spes restitutionis superest, quemadmodum postea dicemus cap. 26. Cacoehymiam quoque, uti & ichtericiam & Ascitem, post Melicericiam sequam fuisse, observavi, sit id præcipue, quando malum inferiores articulus, veluti pedes, genua & coxas occupat. Tunc enim dolor vehement est, & ægrum ut plurimum per multos menses vigiliis & inquietudinibus animam in modum excruciat, vixta proferunt, omnesque actiones corporis impedit retardatque. Dormiendo enim concoctiones omnes periculiunt. Contra si somnus doloribus & inquietudinibus interrumpitur, tunc chylosus ventriculo & venis melaëticis semicæcus & veluti crudus ad hepatis pervenit. Hinc obstructio, & labefactio caloris nativi, & gravissimi morbi sequuntur. Si verò hydrops articulorum manus aut brachia occupaverit, minus est periculum: humoris enim in tanta copia, uti ad crura, non affluunt, & æger postquam impetus mali cessaverit, deambulando corpus exercet, calorem innatum excitat, & concoctionem promovet. Contrarium fit in affectibus crurum, in quibus propter diuturnum decubitus in dorso, renes, præcipue autem sanguis in vena cava & hepate incalcescit, inde interitum patitur perpetua intemperies calida, febricula, sitis, vigiliæ, tandemque ichtericia & hydrops sequuntur, renem quoque & vesicæ calculi generantur. Intestina quoque viscera & ipsæ sanguis in vena cava & hepate quando ita æstuant, vapores multos ad caput mandant, sique inde catarrhis obnoxium.

Si æger natura cacoehymicus fuerit, aut illum in morbo ipso contraxerit, difficiliter sanabitur, præcipue si humores acres ad ligamenta & ossa pervenerint, & easque carie contaminaverint. Hydrops articulorum (ut & alia gravissima vulnera, quemadmodum Clarissimus ac doctissimus Vir Dn. Petrus Pavlus Anatomicus & Botanicus longè celeberrimus p. m. amicis meis sincerus ostendit) ætate superveniens, periculosior est, quam qui hyeme, innatus enim calor alacrior, & plus potest hyeme quam æstate, multo resistere, siquidem æstivi ætatis non ambiens æstus, evocat dissipare nativum corporis calorem.

Potèd cum in vulneribus magnis & impravis ut tumor adsit, natura ipsa postulat, sequitur, evanescente tumore, protinus circa vulnera articulorum convulsionem, & delirium in proxima esse, uti

docet Hippocrata lib. 5. aphor. 65. & 66. Quippe, uti testatur Galenus, indicium est, humores noxios ad principes partes transmitti, qui tamen propter dolorem, quem prava & magna ulcera sequi par est, ad vulnera ipsa potius confluere debent. Quippe dolor attrahit, & fluxiones concitat. Sæpius quoque meliceria in ulcus magnum & insanabile degenerat, quando videlicet ligamenta eroduntur, & caries in osse consuevit. Propter doloris vehementiam & duritiam, propter vigiliis item & appetitus prostrationem, in nonnullis vires ita dissolvuntur, & humidum radicale adeo absumitur, ut etiam animam essent, in iis autem qui morituri sunt, ulcus ante mortem lividum & aridum, aut nigrum & acidum fit, parum aut nihil egerens materiam. Id autem æcchili propter summam alteratam & expultricem facultatem labefactionem & imbecillitatem. De quo vide Hippocratem prænotionum lib. 1. cap. 3. & tractatum noitum de Gangrena & Spaculo cap. 11.

Cap. 6. De curatione vulnerum in genere, ubi ab initio vulnus eruentum digerendum & suppurandum esse, ostenditur.

DEbebam nunc testà ad curationem methodicam Ichoris stris, live hydropis articulorum progredi, sed quia multi Chirurgoem decocto vulnera, balsamis, emplastro stictico, aut unguento amario, aliisque medicamentis, præter rationem adhibitis, gravissimum hocce symptoma pletumque excitant provocantque, operæ pretium esse duxi, nonnulla de curatione vulnerum in genere, & quibus intentionibus incipiendi & absolvenda sit curatio, præponere. Adhuc quoque suo loco, quid de prædictis Medicamentis sit censendum, & quomodo eis cum fructu & secundum rationem utendum.

Omnem autem solutionem contriuitatis, unitiorem sequere, etiam idcirco novum est, & post Galenum, Guidonem, omnes, qui de re Chirurgica scripserit, docent. Unio autem hæc, live consolidatio vulneris, à natura tanquam à principali agente, à Medico vetò veluti Naturæ instrumentum & ministro perficitur. Natura enim illa est, quæ per se sufficit consolidare vulnera, modo Medicus obstacula, quæ illam in suis operationibus impediunt atque retardant, auferat. Impedit autem natura consolidare vulnus, si ossa fracta, & à periosio penitus separata fuerint, si telum, globulus plumbeus, ferrum, lignum, aut simile quid extraneum, vulnere infixum sit.

Summa itaque diligentia in hoc laborandum, primum ut sanguis, si profluxerit, sistatur: quia enim rheotus vitæ est, multos ex ipsius profusione animam simul profundere, videmus. Deinde diligentia adhibenda, ut quicquid extraneum vulnere infixum, dum adhuc eruentum est, extrahatur. Ossa contracta in locum reponantur, vel si à periosio separata fuerint, extrahantur. Impeditur quoque natura, & sanatio live unio vulneris retardatur, si dolor, tumor, vel inflammatio, aut affluxus humorum supervenerint, & partem læsam infestaverint. Hæc omnia diligens ac exercitatus Medicus & Chirurgus facillè auerit, si optimam vietus rationem instituerit, corpus à pravis humoribus expurgaverit, venam, si plethora adfuerit, & vires permittant, inciderit. Sed nec illa omnia sufficere, nisi topica ex arte quoque adhibita fuerint.

Potèd doctrinam, quam Magnus Hippocrates de Medicationibus internis, nobis reliquit, ad externa vulnera hæc incepti quoque referri, atque

accommo-

accommodari posse, mihi videtur. *Concella*, inquit, *Medicamenta purgare ac materiam aperire, non eruda neque incoctam morbo, nisi materia torquet, plurimum vero nec torquet.* Vult Hippocrates in hoc aphorismo, materiam peccantem primò concoquendam & digerendam, deinde movendam atque expurgandam esse, non tamen ab initio, dum adhuc cruda & indigesta est. Quandoquidem nihil crudi, in quatuorque parte corporis id laesit, commodè evacuari posse, experientia fides facit. Hæc quoque in vulnere curationibus locum habere, exemplis monstrabo.

Anno 1640. Mense Maio Reverendi & doctissimi Dn. Stephani Ecclesiarum Bernenis Ministri primatui filius, decem circiter annorum, vulnus conculum ad dextram palpebram recepit. Chirurgus, cui curationi vulneris mandata sunt, cum digestionis vulneris curam nullam haberet, decocto suo vulneratio & insigniter constringente, vulnus intra paucos dies cicatrice obdixit. Cum vero durities & tuberculum scierholum & deforme remanisset, advocatus fui, purgato prius corpore, ea quæ insigniter emolliunt, primò per dies aliquot, deinde quæ dissolvunt & discutunt, simul applicui, quibus & quàm optimè restitutus fuit. Quam infelix fuerit ulus decocti vulneris in puella quadam, ad eilam dextrum vulnere, Lectôr posthæc cap. 7. videre poterit.

In tumoribus præter naturam, si quis materiam peccantem, crudam adhuc, nec satis concoctam & emolliam, in halitum resolvere, & per insensibilem transpirationem; ut loquuntur Medici, evacuare studeat, is profectò subtiliores partes quidem exolvat, reliquum autem in scitrum coagulabit. Addam exemplum. Nobilis quædam puella in arce leucodermi Principis mei, Gulielmi Ducis Juliacensis Clivenum & Montensium &c. felicissimæ memoriz, cum ab adolescente in transitu ultimi digiti ad papillam sinistram accepisset, & exinde dolor, postea quoque suppuratio totius manus exorta fuisset, ac puella propter vetustudinem malum celsissimè, & illa ipsimet, quæ inflammationem extinguunt & insigniter tepellunt & discutunt, nequaquam tamen darentur, sibi applicassent, resolutis subtilioribus partibus materia peccantis, crassa in scitrum coacta. Ego literis nobilissimæ matronæ, Domine ab Hal, Architriclinæ Illustrissimæ Principis, Hildens Dusseldorpiam accesseris Anno 1590. scitrum dorissimum, dolorosum & cancrum, magnitudinem nucis juglandis non minus excedentem, ad latus papillæ, versus Scernum inveni. Consultui, ut præparato lris coepote, curis superficeretur (non enim in profundo larebat scitrus ille) secundum longitudinem incidere, & scitrus cum sua membrana extraheretur, vulnusque, ut artis est, curaretur. Cum verò manuali hacce curationem, longè facillimè & securissimam, respuerent, cum ipsa ægra, tum etiam adstantes, nihil cum ipsa tentare volui, sed ad meos me consuli. Post meum abitum cum alius quidam, ipsam abique manus operatione sanare vellet, & primò emolliantia, deinde erodentia applicuisset, in horrendum cancerum degenerans est scitrus ille, ex quo tandem miserè petiit puella illa. Quod si ab initio morbi, materia circa papillam confusa, digesta, postea, ut artis est, resoluta fuisset, procul dubio gravissimum hocce malum non supervenisset.

Redeo nunc ad Aphorismum Hippocratis, ex quo Methodica & artificiosa vulnerum curatio quoque colligitur. *Concella* inquit, *medicare aspice materiam aperire*, quasi diceret, si res materiam peccantem probè concoctis, postea moves atque evacuas, omnia, quæ circa ægrum facienda sunt, præ-

stabis, & de natura, quæ præterea requiruntur, faciliè perficet. Cæterum etiam ad vulnere curationem hæc quatuor requiruntur, digestio videlicet, mundificatio, carnis generatio, & cicatricis procreatio, priores tamen duæ præcipuè arte, posteriores natura beneficio fiunt. Valius ita ab initio probè digestum, deinde mundificatum fuerit, natura faciliè per se carnem generat, & cicatricem inducit, modò Medicus illa, quæ naturam in suis operationibus, ut antea quoque dixi, impediunt, amoveat.

In abcessibus eodem ordine procedendam est, ante omnia enim materia in parte affecta contenta, emollientibus & adodynâ digerenda & concoquenda est, tam vomica aperienda, & pus evacuada. Tandem mundificatio sinuolaribus (dummodò Orificiis abcessibus tamen aptum ostendatur, symptomatica quin etiam, si supervenerint, amoveantur) natura per se sinuolares carne adimplebit, tandemque cicatricem inducet. A digestionis itaque, secundum doctrinam Hippocratis, Casatio inchoanda est.

Potè cum omne vulnus ab initio sit crudum & indigestum, & ex se, præcipuè vulnera nervosorum partium, materiam terrosam emittere incipiam, statim secundum mentem Hippocratis digerendum est; Digestio enim vulnere, & optimo ex se emittente pus, non faciliè symptomatica aliquod ægrum molestat, nisi error vel à Chicago vel ægu commissus fuerit. Quandoquidem humores, qui propter solutionem coarctantur, labitantque mutationem, ad partem læsam decumbunt, & symptomatica excitant, digesto vulnere effluunt, non igitur vèd, in parte læsa remanent, pessimaque symptomatica excitant. Deinde perpendendum est, vix occurrere vulnus, etiam si instrumento scindenti factum fuerit, in quo non aliquid sit contritum, Ecchymosis, quæ tenuissimè in ambitu vulnere esse factorem conspicietur, satis suppete fides facit. Cum itaque caro conculsa, docente Hippocrate, ut putrescat, & in pus convertatur, necesse sit, iterum manifestum sit, curationem vulnere ab eorum digestionis suscipiendam esse. Nisi enim venæ capillares, & mensura in ambitu vulneris, qui statim ab initio propter affluentiam humorum copiam occluduntur & adimplentur, relictæ fuerint, & materia præternaturalis, in ipsis coacta, digeratur & concoquatur, putrefcit in ipsis vas, & acrimoniæ acquirit. Ex qua sequuntur extensiones vasorum, inurnefactio, dolor, aliaque commemorata symptomatica. Ex quibus satis superque apparet, quàm periculosa sit eorum methodus, qui decoctionibus vulneratilia, balsamis, aliisque similibus medicamentis, vulnera statim ab initio, & antequam digesta fuerint, occludere tentant. De quibus loco fusius.

Ut igitur symptomatica evitentur, ab initio celerantia, emollientia & medicatissime calefacientia sunt adhibenda, vulnerebusque imponenda, huiusmodi autem sunt ingesta à prædictis Digestiva appellata. Præparantur illa ex Cera, Theriacina, Colophonia, Gummi Elemi, oleo rosæ, amygdalarum dulcium, illorum alborum, oleo de vicillis ovorum, butyro recentissimo, croco, & similibus, ut suo loco dicetur. In universalibus quoque nihil omitatur, & quæ affluentes humores reprimunt, calorem intumescens conservant, præter digestiva, loco affecto applicentur.

Cæterum, antequam huius capitis finem faciam, monitos esse velim tyrones, de tempore, quo digestio vulneris perficitur, nihil certi statui posse. Vulnerum enim hæc citò, illa vèd tardè suppurant, id, quæ secundum conditionem vulneris, ac naturam partis læsæ,

læte, constitutionemque ægri; Cuius suppuratus vulnus, instrumento bene seindendi facta, confusa verò erudè; in illis enim vasa omnia ita sunt aperta, ut materia absque impedimento effluere possit, in his verò, propter consusionem, sanguis extravasatus, & humores, qui affluunt, diutius retinentur, & propter contusionem putrefcunt, hinc calor innatus, eoque beneficio digestio perficitur, aliquo modo proferuntur. Circa digeruntur & suppurantur vulnosa catasofiam partium, propter sanguinis & caloris nativi abundantiam; tardè verò in iunctura & partibus nervosis succedat suppuratio, propter caloris nativi eis in locis penuriam, & dolorem, qui sequitur, actioneque naturalis setardat, dum humores noxios ex universo corpore ad se trahit. Quapropter sæpius ex vulneribus articulorum ulcera eacothica fieri, Galenus ipsaque experientia testantur. Circa suppurantur & consolidantur vulneta, quæ in corporibus putris, & optimo succo repleti, occurrunt, tardè verò cacochymicorum, propter caloris nativi imbecillitatem, & humidis radicalis defectum.

Hæc, candidè Lescot, non sicc gravissima causa adscribo. Vidi enim Chirugos non vulgares, qui ubi certum tempus ac diuturnum numerum, ad digestionem perficiendam, fingeant. Elapso hoc tempore, ad mundificationem & abstergendam transtierunt, etiam vulnus non satis digestum & suppuratum esse, idque maximo ægrotum cum damno. Non enim in omnibus subjectis æqualiter perfectio digestio, ut jamjam dixi, sed in his citò, in illis verò tardè: Si itaque ante perfectam digestionem vulneris, & symptomatum remissionem, mundificationem & abstergendam (quæ acrimonia quidam prædia sunt) applicaveris, vulnus irritabis, dolorem excitabis, de ovo affluxum humorum ad partem læsam provocabis, tandemque naturam in suis operationibus ira perturbabis, ut ex simplicibus vulnere fiat ulcus eacothicum & malignum. Hanc ob causam digerentibus & dolorem sedantibus, plerumque ad finem usque curationis feliciter procedo, præsertim in vulneribus nervosorum partium. Hoc modo enim ab omnibus symptomatibus, modò in universalibus nihil omittimus fuisse, securus sum.

Cap. 7. De decoctis Traumaticis, sive vulnerariis, & an ab initio in vulneribus articularum conveniat, nec ne?

Quia permultos atque gravissimos errores, magnæque symptomata, & præcipuè hydropem articulorum, ex usu decocti traumatici sive vulnerarii, quotidie consequi, in præcedentibus dictum fuit, necesse est investigare, an symptomata illa ratione decocti, an potius propter imperitiam barbaris sonum, aliorumque theoriæ artis Chirurgiæ imperitorum hominum, supervenerint, nec ne? Omne vulnus eructum erudum esse, & digestionem, sive luptationem requirere, primam & præcipuam intentionem in curatione vulnorum esse, proximo præcedenti capite demonstratum fuit. Suppurationem quoque medicamentis, quæ modicè calefaciunt & humectant, fieri, diximus, quapropter nonne investigandum est, ad decoctum vulnerarium hæcne habeat facultatem, anque digestio ulla vulnere ex ipso petenda aut expectanda sit? id verò ut commodè & rectè fiat, ipsius ingredientia examinanda sunt. Decoctum autem Halvilanum, & plerumque omnia, præcipuè ex pyrola, sanicula, consolida saracenica, Artemisia

(quam rotæ Doctæ appellat) vinca pervinca (Halvilanæ Estræit vocatur) Alchimilla & fragaria præparantur. Addunt sabinam, si aliquid præter naturam, spinæ videlicet, feluxæ, fragmenta ossis, globulus plumbeus, aut simile quid corpori inhæret. Herbas primò in umbra, dein in cilbano exsiccatas, in pulvere redigant, unamquamque seorsim. Postea æquali pondere simul commiscant, & ad usum reservant. Hujus pulveris accipiunt cochleatæ plenum (sic enim habet eorum recipe) quem in mensura una vini optimi tam diu coquant, quantum ad ova durissimè coquenda sequitur temporis. De hoc decocto, una cum incocto pulvere prædictarum herbarum, ter in die ægro exhibent. Adultis cyathum unum, hoc est, ad unguem aut sex uncias, pueris verò & delicatioribus minus. Lintheum quin etiam in ipso mactafaculo vulneri applicant. Hoc solo medicamento, neglectis omnibus aliis remediis, imò & universalibus, vulnera omnia, quantumvis maxima & periculo plena, sanari posse, sibi persuadent, sed eventus plerumque contrarium ostendit, ut ex eis, quæ sequuntur, videre est. Sed videamus nunc ordine ingreditur omnia. Pyrola excisat, attingit, & agglutinat, Martholus in *Dioscor.* lib. 4. cap. 16. Hieron. *Tragus* lib. 2. cap. 53. Collocatur autem in tertio gradu licetis, *Fuchsius plantarum historia* cap. 176. *Triernensis* tom. 2. *secl.* 11. cap. 39. Sanicula non est simplicis naturæ, sed ut indicio est spiritus, altitigrit, simul & amara est, ut hoc nomine calefactionem & excitationem esse, nulli dubium sit. Siccantur autem calidam & siccam ordine secundo, *Fuchsius plantarum historia* cap. 261. *Tragus* lib. 1. cap. 173. Sanicula refrigerat & siccatur, cohibet, sepius, gloriatur & soborat, *Marthol.* in *Dioscor.* lib. 4. c. 38.

Consolida Saracenica, sive consolida aurea, Gctm. *Spensish Mundtraut* / ralicat. *Tragus* lib. 1. cap. 164. Constringendi vim quoque habet Tabernæmontanus testatur, *Tom.* 2. *secl.* 6. cap. 18.

Artemisia calefacit, & modicè dicitur, quod ad calefactionem attingit, ordinis secundi, quod verò ad teficationem, aut pelmi inensu, aut secundi remissi, est etiam modicè tenuium partium. *Galenus de simplicium mod. facultatibus* lib. 6. *Dioscor.* & *Marthol.* in *commentariis* lib. 3. cap. 211. *Fuchsius hist. plantar.* cap. 13. *Hieron.* *Tragus* lib. 2. capite 113.

Vinca pervinca sive Clematis, alvi profluviis & Dysentericis prodesse, *Dioscorides* lib. 4. cap. 6. *Galenus de simp. medicamentorum facult.* testatur. *Refrioret*, *Martholi* verbis utoc, *siccatur, roborat, cohibet, sed siccitate prævalere reliquis qualitatibus, ex Paulo Aegicæta reverset* *Fuchsius Hist. plantar.* cap. 131.

Beta nigrosæ facularis est panticeps, quia tunc digerit, tum extingit, & pes naves expurgat, cæterum cocta nigrosæ exult exult, evadique leniter digerens, ad detergendum tamen digerendumque calidior est beta alba. *Galenus de simp. medic. facult.* lib. 8. Nigrum verò, sive rubrum, adjunctum habere astrictionis quippiam testatur *Martholus in Dioscor.* lib. 2. cap. 176.

Alchimilla excisat, cohibet atque congelat, *Marthol.* in *Dioscor.* lib. 4. cap. 115. Folia & radicæ adstrictione vehementer participant, atque adeo excisat. Recentiores idipsum in secundo efficit ordine tradunt. *Leopard.* *Fuchsius historia plantarum.* cap. 234.

Sabina terribilis est ordinis exalefacientium & desiccantium, & ex numero eorum, quæ vel maxime tenuium sunt partium *Gal.* lib. 6. *de simp. medicam. facultatibus.* *Fuchsius historia plantarum capite* 54.

Fragaria refrigerat ordine primo, siccatur secundo

do Martini. lib. 4. cap. 38. in Dysenter. Radicea & folia attingunt. Cordus hysteria plantarum lib. 9. cap. 186. Enchyris historia plant. cap. 318.

Vinum nostrates eligunt generosum, quale est Valdensium aut Equestrium, de consule appellant, Germani vino Rhenali aut Neccarino utuntur. Sunt illa plerumque omnia calida & sicca in secundo gradu. Quod si admodum vetus fuerit vinum, ex tertio ordine calefacientium & siccantium erit. Ut Galen. de simplic. medicam. facultatibus lib. 8. tractat.

Ea his luce meridiana clarius elucet, decoctum vulnerarium insignem calidandi, costringendi, & agglutinandi facultatem ex præscriptis herbis acquirere, calefacti quoque propter saniculam, Artemisiam, & in premis propter sabina, quæ in tertio ordine excalefacientium & siccantium, ut antea dictum fuit, collocatur. Vinum præterea calefactorium vim adauget, estque veluti vehiculum, quo reliquæ facultates ad viscera vehuntur. Non promouet itaque digestionem aut suppurationem vulnerum, sed eam impedit retardatque. Deinde quoque, quia calidum est, uti ex ingredientibus videre licet, sanguinem & humores incendit, & symptomata omnia imprimis verò dolores & inflammationes excitat. Digesta verò & satis suppurato vulnere, nec non ab omnibus symptomatibus liberato, cum Intentio Medici est abstergere, mundificare & consolidare, Inique & longè excellentissimum esse medicamentum, omnibus rationalibus Medicis in confesso est. Hinc videmus, non esse, propè loquendo, decoctum vulnerarium per se, quod dolores, inflammationes, & hydropem articulum excitat, sed inscitia atque ignorantia barbariorum aliorumque barbariorum hominum, illotis, ut dicitur, manibus, sacrosancta Dei dona sine modo & contra naturæ ordinem tractate, & ut Plinius loquitur, experientia per viros ducere non erubescens. Quam insulsi etiam hæc aliaque plerumque succedant, exemplis nonnullis declarabo.

Anno 1616. gladiator quidam Bernæ, M. Conradus nomine, gladio acuto in brachium sinistrum inter carpum & cubitum vulneratus fuit: Restricta hæmorrhagia, decoctum Halvillianum ter in die bibit, coque per barbariorum vulnus abluere iussit. Ab initio curatio ad votum incescit, circa tertium verò exorta est inflammatio, dolor ingens, febris, nausea, & appetitus prostratus. Ego cum in consilium vocatus essem, manus totumque brachium intumefactum, & ad cubitum usque inflammatum reperi, musculi quoque pectoris per consensum afflicti erant, hinc quoque de angustia pectoris conquerebatur, propter vapores quoque ex inflammato brachio ascendentes, cor nonnunquam veluti lipothymia afflictebatur, vulnus exterius veluti crusta obductum & clausum erat. Accepto stylo exploratorio, cum anguem in herba latentem deregere vellem, ecce adstantes, qui criminari me incipiunt, meque admonent, ne tale quid tentarem, ne vulnus resiccatem, cutem enim superficiei tenus, tantummodo fidam esse, ægrumque decoctum vulnerarium ab initio bibisse. Imaginamur enim sibi nostrates homines, decoctum hoc consolidationem externam vulnere non concedere, nisi ipsa concavitate prima consolidata. Immisso stylo exploratorio eum vulnus ipichamam, scilicet profundum esse, & versus cubitum ipsum penetrans vidissent, obstupuerunt scilicet, & supra modum admirati fuerunt. Quibus remedia autem ipsam cutem, Lector in quarta Centuria Obs. 83. videre poterit.

Anno 1619. Nobilissimi ac strenui viri, Do. Nicolai & Mullinen, Indycæ Reipublicæ Bernensis Consiliarii prudentissimi, & Ducis exercitus apud

Rhetor fortissimi, ancillia, cum vulnusculum contusum ad Cilium inferius dextram receperit, illud intra paucos dies nulla præcedente suppuratione aut digestionem vulnere, decocto Halvilliano consolidatum fuisse; iterum in profundo collectum fuit pus. Ego cum advocatus essem, oculum insigni inflammatione tentatum inveni. Dolor capitis adterat maximus, simul & Febris atque vigilie. Suppurativa & pus moventibus per diem unum aut alterum applicatis, in ipsa elasticæ vomicae scalpello incidi, deinde abstergentibus & mundificantibus per dies aliquot adhibitis, ulcus felleiter consolidavi, nulla relicta oculi sui visus læsione.

Anno 1620. Juvenis quidam 13. circiter annorum ætatis, & Magistri Matthiæ Keller, articulari filius, cum sibi puerum vulnusculum in sinistri indicis articulum, qui medius est in ordine (ubi sola coris in transversum incisa fuerat) insigisset, & decocto traumatico vulnus, ut videbatur cicatrice obduxisset, iterum collecta fuit materia in imo vulnere, quæ propter exortum dolore intensissimo & acutissimo, in consilium me adhibuerunt parentes. Tum juveni manum & brachium ad cubitum usque intumefactum, febris quoque aliaque cap. 4. commemorata symptomata aderant, imprimis verò Lipothymia, quam primum vulnus obligare vellem, ipsam infestabant. Dolores aded erant magni, ut nullis scilicet anodynis sedari possent, tandemque propter vigiliam vehementiam ad soporem mihi conficiendum fuit. Ex quibus quam maligna & acris sit materia, in parte hoc morbo affecta contenta, apparet, dum enim non tantum partes mobiles, veluti cot, hep, & cerebrum, malignis suis vaporibus afficit, verum etiam proximæ adjacentes partes erodendo invadit. Vid. id in hoc puero, in quo quamvis nihil eorum, quæ facienda erant, prætermittentem, obitare tamen non potui, quin materia sinum, verus posterum articulum & metacarpum, sibi faceret. Tandem nihilominus felleiter sanitati restitutus fuit, & ita quidem, ut digitus suo motu nullatenus privatus foret.

Potè quemadmodum tempus morbi, quo decocto traumatico curari convenit, perpendendum, ita etiam subiectum ipsum, hoc est, corpus ægri, ipsiusque constitutio, diligenter examinanda & investiganda est. Cum enim in'gignit affligens & exsiccans, ut antea quoque dixi, & temperamenti ingreditur, tum videre licet. Omnibus qui obstructions viscerum, veluti hepatis, lienis, & vearum lacerarum laborant, adversissimum esse medicamentum, nullus in controversiam vocare poterit. Quoad quidem costringendo & exsiccando excrementitios humores in visceribus regnent. Hinc dolores, tormina hypochondriorum, inflationes, scitili viscerum, tandemque vitium & appetitus prostratus, aliaque incommoda sequuntur, quemadmodum ego in diversis ægris observavi. Imprimis autem in nobilissimo viro Dom. Jacobo Waller, qui cum à teneris annis obstructions viscerum obnoxius fuisset, & anno 1609, propter gravissima ulcera decocto Halvilliano usus fuisset, omnia illa incommoda, quæ recensui, ex usu decocti prædicti in se expertus est. De his videat Lector observationem & citationem singularem, de vulnere gravissimo scilicet, à nobis editam.

Nobilis quidam prope Lausannam cacochymicus, & obstructions viscerum, simul & ulcere circa costas laborans, cum ex consilio Imperatorum hominum decocto vulnerario nreter, in tertiam incidit, quæ diu periculosa labor-

ravit. Videat itaque Chirurgus primò, ne decoctum adhibeat nisi vulnus sit digestum, suppuratum, & ab omnibus symptomatibus liberum. Nunc enim solummodo impedit digestionem & suppurationem vulneris, verum etiam dolores & inflammationes adjuget, dum ratione vini aliarumque herbarum, quæ ingrediuntur calidarum, sanguinem & humores incendit, calidamque intemperiem in visceribus inducit. Deinde prospiciat, ne viscera excrementitiosis humoribus sint repleta, aut obstruccionibus obnoxia. Decoctum enim vulnerarium astringendo & siccando, meatus obstruit, transpirationem prohibet, & proinde potredinem inducit, ex qua cachexia, febris, ischæmia, & huiusmodi gravissimi morbi subsequuntur. *Quæ enim perspirationes carent, inquit Galenus, facili putrescent.* Quapropter ante usum decocti, & dum eis utitur ager, corpus diligenter ab omnibus humoribus excrementitiis expurgandum, & vena, si plethora adfuerit, & vires permiserint, incidenda, optimaque victus ratio observanda est. Hæc verò quia vulgus barbarosorum, propter inscientiam theoricæ, non observat, quis quæso non videt, eorum ignorantiam, non autem medicamentum, hydropis articulo, alio, tumque gravissimorum symptomatum causam esse præcipuam. Est itaque vestissimum divinum oraculum à Galeno prolatum: *Auxilium sinuum dextrarum usum, partem artis esse præcipuum.* Plura quæ de decocto Vulnerratio videre cupit, illudque ad Vulnera externarum partium pervenire non posse, & proinde vulneribus non prodesse, internis verò visceribus miram in modum obesse, scire desiderat, is doctissimum Virum Dom. D. Johannem Mattheum, quæstionum nobilium, qu. 30. legat.

Cap. 8. De Balsamis, tam naturalibus, quam artificialibus, num & quando in vulneribus articulo, conveniant?

Quum ab omni ævo Balsamum veluti singularem donum Dei extiterit, & ad plerisque, tam internarum quam externarum partium corporis morbos sanandos, medicamentum fuerit laudatissimum, ne dicam plane divinum, factum est, ut eo quoque abutantur empirici & irracionales Chirurghi, quasi medicamentum adeo universale esse possit, ut in omnibus morbis, in omnibus locis, etiam ægris, ætatis, nativis, & temporibus anni aut morbi, utò & sine ulla distinctione applicari possit. Hinc ex hoc tam optimo & pretioso medicamento, tot tamque gravissima symptomata, & ipsum hydropem articulo, consequi videmus. Habent morbi interni, ut Medicis oortum est, sua tempora, ut vocant. Principium videlicet, augmentum, statum & declinationem. At quia unquam fuit tam insulsi Medicus, ut uno eodemque medicamento per totum cursum morbi uteretur? De vulneribus eadem est ratio. Habent vulnera sua quoque tempora, secundum quæ medicamenta sunt mittenda. In principio sanguis est sistendus, & quæ res extraneæ, veluti plumbum, ferrum, lignum, festuca, ac nisi plane sepiata, vulnere iohæserint, extrahenda sunt. Hæc diserte quoque docet Hippocrates lib. 2. aphor. 29. loquens: *dum morbi incidunt, si quid movendum videtur, move, dum verò confians & vigens, nebus est quærens habere.* In augmento cum propter solutionem continui, substantiamque mutationem, humores ex toto corpore, veluti cum imperio af-

fluor, dolores, inflammationes, aliaque gravissima symptomata excitant, eis, quæ repellunt, refrigerant & astringunt, ad alia loca repellendus est humor affluens, & ex parte affecta repellendus, dolent leniendus & inflammatio sedanda est, id verò ut commodè & ex arte fiat, digerendum est vulnus, quemadmodum capite 6. demonstravimus, id statum, hoc est, non amplius affluentibus humoribus, sedato item dolore, & remissa inflammatione, optimèque digesto vulnere, clementer abstergendum & carne implendum est. Materia quin etiam in parte affecta collecta, emollientibus & resolventibus discutienda est. In declinatione cicatricem inducere, & partem affectam, propter solutionem continui labefactam, corroborare convenit. At quia scilicet, ac ineptissimi barbarosores, de una eademque fidelia omnes volunt curare ægros, mirum non est, si gravissimos errores circa ægros committant. Hæc autem ut dilucidiora evadant temperamentum ac facultates balsamorum consideremus.

Balsamum hodie habemus duplex, naturale, & artificiale, naturale est aut veterum aut recentiorum. Naturale veterum, cuius Dioscorides lib. 1. cap. 17. *Galenus de simplicium medicamentis, fascit, lib. 6. Plin. lib. 13. cap. 25. Avicenna lib. 2. Tractatu 3. Paulus Aegineta, Oniasus & Actuus meminerunt.* Olim, ut testatur Dioscorides, in India & Aegypto calcabatur. Hodie an arbores, ex quibus probæbatur liquor iste, existant, & si existant, ut sit, scimus, ex præscriptis aliisque probatissimis authoribus Balsamum antiquorum lumen calidum fuisse medicamentum. Sic enim habet Dioscorides. *Efficacissima, inquit, vis inest ferro, & quam maxime calfaciens:* Galenus Balsamum siccate & exallescere in secundo gradu & tenuius esse partium scribit. Avicenna verò Balsamum in principio tertii gradus esse calidum testatur.

Balsamum recentiorum quadruplex est, Iodicum, Americanum, Balsamum oorum ex Insula Hispaniola, & Tolosanum. I. Iodicum seu Occidentale, quod ex Occidentali India in Hispaniam adfertur liquor est arboris, Indis Xilo dictæ, punice malo mporis foliis unice similibus ferratis, & arnabibus, cuius cortice, qui tenuis est, vulnerato, liquor reorax subalbidus, pascus, quem incolæ sibi retervant, effluit. Sed ex ramis & truncis assularum & minnatis concisis, & cum aqua in lebebe decoctis, ubi refrigerit, conchis oleum supernatans colligunt, quod ex nigro rubet, odoris suavissimi, gustus acuti & aliquantulum amari, calidum & siccum est gradu secundo, sumitur in corpus, foris illinitur, & Chirurgis remediis permiscetur. II. Balsamum Americanum, quod ex America sive novi orbis continente adfertur, seu Peruvianum, liquor est arbori huius magnitudinis, ad radicem ramose, duplicique cortice, quo vulnerato ex medio spacio alba, lymphidissima & odoratissima lachryma effluit. III. Balsamum novum, quod ex Insula Hispaniola adfertur, succus est plantæ sponte nascentis, arboris magnitudine ad dorsum hominum proceritatem interdum assurgente, caulibus cinereis, foliis supernè viridioribus, acutis, costa per medium divisis, foliis sex digitorum longis, quatuor cum dimidio latis, pediculis tuberculentibus, fructu racemoso longo, acinis rubentibus, ex asparagis & summitaribus, ut etiam racemis, expressus succus in aqua ad medias coquitur, ad mellis crassitudinem, quod ad ulcera & vulnera utuntur Balsamo, efficacius. Plura apud auctorem generalis Iodorum historici. IV. Tolosanum, quod ex continenti quædam provincia inter Cartha-

Cathaginæ & Numen Del sita, Tolo ab India appellata, liquor est arboris pumilæ pino similis, ramosa, foliis instat Cerasia perpetua vitreolibus, cujus cortice inefso, arboris veluti quibaldam cochlearibus & terra nigra confectis, admixtis, liquor colligitur ex rubro ad aureum tendens, dulcis, odore liminum fragrantiam referens, quod præstantius eo, quod ex nova Hispania adfertur, & ad omnia ad quæ & Balsamum Egyptianum efficitur. Plura vide apud Bauhinum, Nicolaum Monardem, & in appendice hystoriz Lugdunensis.

Ceterum et si Balsamum sit Medicamentum laudatissimum, & in vulneribus approbatissimum, quemadmodum ab initio hujus capituli diximus, & ego ipsemet à multis abhinc annis in agris meis experitus sum, & in dies experitur, quin tamen adeo universale cœlesti non potest, ut in omnibus vulneribus & quovis etiam tempore tutò applicari possit. Videndum primum, in quibus vulneribus conveniant balsama; deinde etiam quo tempore applicanda. Conveniunt autem in simplicissimis vulneribus, huc est ubi nullum symptomata, veluti dolor, inflammatio, affluxus humorum, aut simile quid concernit, restat id quoque Nicolaus Monardes, in sua, quam de Medicamentis ex novo urbe delatis, scilicet hystoria. Cum enim calidum sit medicamentum, quemadmodum antea dixi, inflammationem & affluxum humorum, & proinde dolorem adauget, gravissimæque symptomata excitat. Conveniunt præterea, ubi nihil extraneum vulneri inhæret. Quia enim balsamorum vis arque potentia est, propterea labia vulneris contrahere, consolidationemque accelerare, remanente re aliqua extranea & pure in profundo vulneris, subornantur mox symptomata gravissima. Suos itaque in vulneribus catenularum partium, si simplices & à se incidentes factæ fuerint, uti etiam in ulceribus, post eorum mundificationem adhibenda. In vulneribus autem confusis non totum est eis uti, nisi digestis, & satis suppurato & mondificato vulnere. In vulneribus faciei à se incidentibus factis, excellentissimum est medicamentum, præcipue Balsamum Tolutanum, quod mihi familiarissimum est, nullam enim ferè cicatricem post se relinquit. In aliis verò capitulis vulneribus nonnulli cauti in applicatione balsamorum procedendum est. Cranium enim si laesum, aut confusio & contusio aliqua cerebri adfuerit, ab initio morbi ab eis abstinendum est, ne propter immaturam consolidationem vulneris, & retentionem sanguinis extravasati aut puris, grave aliquod symptomata incidat. Eadem est ratio, cum in vulneribus juncturarum mihi semper suspectus fuit usus balsamorum, quemadmodum postea, cum de balsami artificialibus dixero, egam fusius. Si quis tamen à principio Balsamo Tolutano (cujus ego præcipue experientiam habeo, quid & hodie præ reliquis ad nos affertur, cum fructus in articulo vulneribus uti voluerit, ut in universalibus oculis prætermittat, necesse est, deinde etiam ut vulnus, & ipsius labia proutin contrahantur coalescentesque, pulvis doriculæ ex filamentis parietis, admixtæ, res ipsa postulat.

Sequitur nunc, quo tempore morbi sint applicanda balsama? Nullum enim medicamentum, quod planè sit universale, existeret. Medicis norum est, vulnera quin etiam sua habere tempora, non minus æg morbi, ab initio hujus capituli diximus. Deinde quidnam in unoquoque circa vulnus molandum sit, adscripsimus, ex quibus satis superque apparet, balsamum neque ab initio, neque in augmento applicandum esse, nisi vulnus fuerit simplex, & in parte planè cæciosa. In augmento enim, ut dicitur suppa-

randum est vulnus & quæ movendum, soporatum autem fit calidis & humidis medicamentis, veluti sunt unguenta digestiva, de quibus suo loco, non autem calidis & ficcis, ut sunt balsama. Sciunt præterea præfici, vulnera ab initio afflata humorum doloribus, inflamo alionibusque esse obnoxia, quapropter medicamenta lenientia & anodyna sunt adhibenda, non autem quæ actionem aliquam ubrincent, ut sunt balsama. Quantum ad vulnera articulorum, in quibus tantopere celebrantur balsama, via repetes quod planè sit simplex, propter exquisitissimum enim sensum, quibus puncturæ sunt prædictæ, statim exortitur dolor, dolorem sequitur affluxus humorum, quondamque dolor veluti encubito ad se habet ex tota corpore humores, & sanguinem, hinc inflammatio, abicillis & hydrops articulorum, aliæque gravissima mala. Sed estne in causa Balsamum? Nequaquam. Est enim medicamentum planè divinum, ut antea dixi. Sed in causa est infectio & impetia ba humorum, aliorumque artis Medicinæ impetissimorum humorum, quæ illud indifferenter & absque iudicio in omnibus vulneribus, veluti panacea applicant. Concludemus itaque, Balsamum in principio & augmento ex arte applicari non posse, nisi vulnere fuerint simplicissima, & nullius ferè momenti. Digressum suum & satis suppurato vulnere, excellentissimum est medicamentum. Mundificat enim, abtergit, carnem generat, humidum radicale adauget, calidum que innatum refocillat, & partem arideam, propter solutionem condoli labefactam, corroborat, cicatrice quin etiam planas & pulchras efficit. Olla castorei & confecta balsamo extrahere voluit aliqui, quod ego tamen non observavi, nec videtur mihi rationi contentum esse, medicamentum quod insigniter conglutinat, labiaque vulneris contrahit conungitque, simul quoque ossa (nisi forsan id facilius quodam occulta heret) extrahere posse, cum ad ossis extrusionem vulnus apertum ac hians requiratur. Hæc nos de Balsami naturalibus, sequitur oratio de artificialibus.

Quoniam à multis jam annis, ne restarent viri docti, Balsamum illud, quod ex Judea & Egypto olim proveniebat, præterit, & Balsamum recentiorum nonnulli supetioel seculo ad nos, ex regionibus istis à Christophoro Colombo, Americo Vesputio, Magelano, Francisco Pizarro, Francisco Draco, Thoma Candilio, & aliis noviter inventis, aliam, ac tanto pretio à Mercatoribus est matum venditumque sit, ut nonnulli locupletissimi homines eo uti possint, cogitare caperent viri docti, quidnam ipsius loco substitui possit. Neclaudis, profectò, fuit ipsorum labor atque industria. Exant enim balsama artificialia, quæ balsamas naturalibus tam in loternarum quam exterarum partium morbis, haud molitum cedere videntur. De quibus lector videre poterit Johanne de Vigo, Andernacum, Celsæum, Evonymum, Fallopiam, Wæckerum, Quercetianum, Paracelsum, & alios, apud quos varias & diversas compositiones inveniet. Parantur autem Balsama aut ex vegetalibus, veluti ex radicebus, herbis, floribus, seminibus, corticibus, nucis, & gummis item, Resinis, Terebinthina, Cera & aliis. Aut ex mineralibus, ut Mercurio, Marte, sulphure &c. De quibus vide Quercetianum & alios, qui attem Chymicam excolunt. Nos, ne quid hic desiccare posset lector, compositionem unam aut alteram ex vegetalibus, ex Johanne Vigone, Christophoro præfatio, & æterna laude dignissimam, quæ sub Jolio fecundo Pontifice Max. circa annum 1503. Romæ floruit, hic adscripsimus, plura qui videre cupit, præscriptor

scriptos amthores consulat. Descriptio que exstat lib.
18. cap. 19. sic habet.

R. Ol. Omphacini ℞ij.

Syracis calamiæ.

Landani.

Croci.

Olybani.

Gummi Arabici.

Rubia tinctorum.

Quammi hedera.

Alees.

Mafficiis.

Caryophyll.

Galanga.

Cinamomi.

Nuci muscata.

Cubebe an. 3j.

Gummi Elemi ℥j.

Alyrbe.

℞℞℞℞ an. 3j.

Galbani 3vj.

Spica.

Ligni Aloes. an. 3j.

Serapini.

Ammoniæ.

Oppopacis. an. 3x.

Omoia pulverisanda pulveriscentur, & permisceantur cum dicto oleo: deinde ponantur in alembicum cum suo capello & recipienti, & arte & igne elambeeant, & omoia sint bene illutata & obrutata luto sapientie. In principem per horas duodecim ponendo alembicum ad ignem lenum, & ipsum meliorando in sex horas, donec elambeeatum fuerit, quo facto, statim residuum speciem iterum pulveriscentur, & cum predicto oleo elambeeatum, iterum ordine ante dicto per tres vices reiterando elambeeant, & tandem habebis oleum, quod verè est sicut balsamum, stat enim ad omnem ballami probationem.

Vale autem (ut idem Vigo testatur sequentibus verbis) *oleum hocce benedictum sive Balsamum, ad multas corporis passiones, videlicet contra spasmodum de repletionem, contra paralyticon, contra unguicularum dolores, & materiam mixtam causantem, fallam universali purgatione, & valet etiam contra dyscrasiam cerebri, fallam à materia frigida. Et propterea cerebrum frigescitum confortat. Valet quoque contra morbum caducum, nullum parum supra coronalem commissuram. Valet præterea ad fistulas descendas, fallam prius mundificatione cum medicamine feri. Valet insuper ad magnas plagas recentes sanandas, Catarrhum ciliis frigidum, & omnem cerebri humiditatem extraneam destruit, & spiritus cerebri confortat, aperit venas oppilatas, causam humorum frigidorum. Et si in aure, cum bombyce imponatur quatuor una, auditum devotum emendat, præsertim quando à causa frigida confusur. Item pennum resatum madefactum cum dicto oleo, & applicatum temporibus, dolorem hemitranum & vertiginosum tollit, & scorbutoem, & vena oppilationem cerebri multam levat. Et si bibatur de dicto oleo uncia semis cum modico vini adserferi, de aurore per tres dies, animam, cor, pulmonemque renovando mirabiliter confortat. Item adversus quatuordecim, si sumatur cum modico vini adserferi, mirum in modum valet, & si ad quantitatem coctibatur, & hic erit per quatuor terminos servandus est, sumendo quotidie prædictum oleum per horam ante diem, in diebus in quibus non expectatur paroxysmus, item sumptum per triginta dies cum modico vini, & parum panis, ad quantitatem jam dictam, morbum caducum sanat, item adversus undequing, animalium morsum am*

venenosam mirabiliter valet, denique ad omnem debilitatem nervorum (crædo mihi) magna est Medicina. Uterius adversus dolores morbi Gallici, est præsentaneum remedium, & istud eleum est sicut Balsamum, & tante virtutis & potentia super jam dictas agritudines, quod nec Auro nec Argento emi possit. Hactenus Vigo.

Porò cum in præparatione hujus balsami aliquo modo obsecutus sit author, sciant tyrones, non esse, propriè loquendo, distillationem, de quo loquitur, sed potius fermentationem sive digestionem. Oleum enim Omphacinum, multò minus gummatum, per alembicum simplicem, de quo hic utitur Vigo, ascendere non posse, sed remanere in fundo alembici, cum reliquis ingredientibus, & nihil præter phlegma, ut vocant, excillate, eis, qui in aere distillatione versati sunt, notum est. Ad quid igitur, inquit, labor iste? Respondeo, ipsum summopere necessarium esse. In hac enim distillatione, quæ velori fermentatio, maceratio, aut digestio est, beneficio caloricæ activæ partes subtiliores à crassis & excrementitiis separantur, & acrie ab innili, ut dicunt, ita segregantur, ut postea diversæ qualitates ingredientium sentiam ita inter se commisceantur, ut inde fiat medicamentum temperatum, & ad prædictas operationes aptum. Ut enim in ventriculo, beneficio caloricæ nativæ, & iscolasticæ concocticiæ, ex diversis, & quidem facultate inter se contrariis, ciborum generibus chyli, pro nutritione corporis aptus, conficitur, ita & in hac distillatione. Rectè itaque ab initio per duodecim horas leno igne procedit. Quemadmodum enim violentus corporis motus, statim post sumptum cibum digestionem destruit retardatque: ita quoque violentus ignis, ab initio admotus, ut diversæ corpora probe ad invicem copulati atque conjungi possint, impedit. Tandem verò augendus est ignis, ut vi caloricæ tota vis ex medicamento extrahatur.

Ceterum absoluta prima distillatione, quæ spacio 18. horarum perficitur, non protinus apertendum est alembicum, ne inclosi spiritus evanescant, & in halitum abeant, sed expectandum usque dum omnia ferè sint refrigerata; feri inquam: Oleum enim dum adhuc tepidum, percolandum, fortiterque exprimentum est. Residuum quod in coloratorio remanet, contrisum, denudò in alembicum projiciatur, & affundendo oleo percolato, & phlegmate exstillato, reiteranda est distillatio & expressio, eodem planè modo, ut ab initio, idque tertio repetendum est. Tandem percolatum & expressum oleum in vasis vitreis diligenter clausis, seu balsamum pretiosum reponendum & conservandum est. Atque hanc esse mentem Vigonis, existimo. Si quis tamen non tantum phlegma, imò & ipsum oleum exstillare voluerit, ille ut loco alembici, de quo loquitur Vigo, retortam accipiat, necesse est, sed balsamum etiam acre, insigniterque calidum, ut vix in interitis affectibus niurpari possit.

Aliam descriptionem balsami in vulneribus, ulcibus, aliisque externis affectibus nervorum, ex causa frigida ortis, efficacissimam eodem litgo & capite describit Vigo hunc in modum.

R. Terebinthina ℥j.

Thuris albi

Ladani an. 3ij.

Mafficiis

Galanga

Caryophyll.

Cinamomi

Zedoaria

Nuci muscata

Cubebe

Legat aliter an. 3ij.

Gummi elemi 3vj.

Olei refati Omphaciaci lb. f.

Olei masticeini 3ij. f.

Vermium terrestrum lotorum cum vino 3ij.

Omnia simul mifceantur & elambicentur in vase vitreo; more jam dicto in fuperioribus receptis. Hæc Vigo.

Ego ex fola terebinthina & gummi elemi conficio Ballamum lenge excellentiffimum, cupis preparatio exigui laboris eſt, interim tamen in vulneribus, poſt ipſorum fupputationem & digeſtionem: in ulceribus & fiſtulis, poſt ipſarum mundificationem, præſantiſſimum eſt medicamentum.

Fundo hinc tres terebinthina puriſſimæ in retortam vitream, diligenter lutatam, eamque in fornacem aptam impoſitam. P. imò oleum (ſive ut vocant ſpiritum) limpidiſſimum leniſſimo igne, ſex circiter hucurum ſpatio, quæ ſeparatim refero. Deinde parum adaucto igne, oleum rubicundum, & veluti xubinus lapis, pellucidum prodit. Tandem ad ſummum fetè gradum accenſo igne, oleum ad milis circiter ſpiſſitudinem exiit. Primo oleo, ſive ſpiritu in internis affectibus uſor, ſecundum & tertium oleum in affectibus nervorum, à cauſa frigida oriis, præſantiſſimum eſt, ſi partes malè afflicte eo inſurgantur, ſive id potè ſuerit, ſive cum aliis oleis, veluti lumbicorum, vulpioo, & ſimilibus mixtum. Poſtremo, quod veluti ballamum eſt, in vulneribus & ulceribus uſor hoc modo. Accipio huius olei ſive balſami 3ij. Gummi Elemi puriſſimi & pinguis 3lb. commiſceo ambo in ſattagine, leniſſimo igne, donec gummi diſſolutum ſit, tunc percolo, & in vase vitreo refero. Quod ſi nimis ſpiſſum fuerit balſamum, addo parum de tertio oleo. Eſt autem Balſama præſcripta artificialia, uti quotidiana experientia docet, præſantiſſima ſine, cautè tamen in vulneribus juncturatum cum eis procedendum eſt, & omnia, quæ de Balſamis naturalibus ſcripſimus, in applicatione eorum obſervanda ſunt. Nequaquam autem, niſi vulnus probè digeſtum fuerit, conveniunt. Si enim ab initio morbi applicentur, graviſſimum hocce ſymptoma, Hydropeem videlicet articulum, excitare ſolent. Vidi id in cive Lauſanenſi, Claudius nomine, de quo lætor videat hiftoriam Capite primo. Poſſem & alia exempla in medium proferre, niſi id forſan lætori eſſet tedioſum. Omnia itaque ſecundum rationem ſunt faciendæ, quemadmodum docet Hippocrates.

Cap. 9. De Emplaſtro Stictico, ſive ſodicationum, an & quo tempore in vulneribus articulorum conveniat?

Libetale artes omnes, imò & Mechanicæ, in Germania ad ſummum gradum perfectionis & ſplendoris perveniſſe, omnibus notum eſt. Chirurgia tamen lucumbit & planè velleſcit. In cauſa eſt, quod illa imperitiis, & plerumque in theoria indoctis habitoribus, ſine contradictione, & examine à Principibus & Magiſtratu, maximo mortalium damno, concrediſſetur. Hinc ſequitur theſeorum non raram ſperant, verum etiam in ipſa verſatos Medicos atque Chirurgos conſpiciere & hocce facere non erubescant. At quia Magiſtratus ampliffimis illis non interdicit, quin potius committit & huiusmodi garrulos & inflatos ſupercilios præ aliis nonnunquam promoveat, mirum non eſt ſi omnia in deterius ruant, & nobiliſſima ars edò petteſcat, ut etiam in malis locis plerique loquuntur in Germania. *Bibl. Chirurg. Tom. II.*

mania (horribile dicta) ipſam carniſices excegerint. Ad hunc autem contemptum artis, & ignorantiam habitorum propagandam & augendam, antiam dederunt nonnulli, qui ſi per octi ſeculo multa variæque remedia Empirica, in medium attulerint, quibus (ſpecta theoria) mirabilia, ac dicam impoſſibilia, ſe præſtare affirmant. Hinc fit, ut cum illi decocto vulnerario, ſive balſamo aut Emplaſtro aliquo, vel unguento armario, omnia curare poſſe ſibi imaginentur, ut ſtudium theoriæ negligant, ac juvenculo ætatem in puerilibus ac ſtultis rebus conſumant.

Potè inter Medicamenta empirica, à modernis & præcipuè à Patacelſo aliſque Germanis inventa, non poſtremum locum obſignare Emplaſtrum Sticticum ſive ſodicationum (*Stichpflaſter*) quo nihil præſtantius in rerum natura exiſtat, nonnulli affirmant, inter quos etiam fuit *Oswaldus Crellius*, alioquin in arte Chymica vir excellens & præclarus. In praxi verò Chirurgia ipſum haud multum vetuſtum fuiſſe, ex eis, quæ Emplaſtro ſuo Stictico adſcribit, ſatis ſuperque apparet. Scribit enim in Baſilica ſua Chymica, imhi pagina 269. *Prius fui emplaſtri Stictici innumera eſſe, nec ſub lunari globo reperiri efficaciſſima. Præſantiſſimum eſſe emplaſtrum Sticticum Crollii, uti & alia emplaſtra Stictica, quæ à Patacelſo in Chirurgia ſua, à Felite item Witrizio & aliis proponuntur, in controverſiam non voco. Sed tantum hoc dico: ſepiſſimè & quoque affectum, de quo hic agitur, Ichorem videlicet actem, hoc emplaſtro excitari. Non quod emplaſtrum per ſe cauſa ſit, ſed quia ſine ratione applicator. Eſt enim certa, & firmiſſima regula, ut loco loco dicam, nullum eſſe remedium adèd generale, ut in omnibus morbis, omnibusque ægris, & per totum curſum morbi applicari poſſit. Sed aliud in principio morbi, aliud in augmento, aut ſtatu & declinatione applicandum eſſe. Quapropter dum Chirurgi ſuo emplaſtro Stictico, ab initio vulnerem nervoſum parium, & ad finem uſque curationis utuntur, graviſſima ſymptoma excitant. Addam exemplum unum aut alterum. Anticus quidam Illuſtriſſimi Principis Juliacenſium, Clivienſium, & Montenfium &c. circa annum 1580. vulnus circa cubitum accepit, ubi auxillariis venæ, & nervi nonnulli abſciſſi fuerunt. Incidit in manus empirici, qui hoc ſolo emplaſtro (acriter tamen diſſuadeere Coſma Slotano, epiſtem Principis Medico-Chirurgo primario, Præceptore meo plotumum honorando) vulnus ſe feliciter curare poſſe gloriabatur. Brevis quidem eicitrice obduſtum eſt vulnus, ſed brachium mox intumuit ac doluit, tandemque exorta eſt febris, hinc affluens & inflammatio nova, & collectum fuit pus in profundo vulnere, ex illo demum putrefactio. Exeſa & denud æpeta vena, tanta ſequens eſt hæmorrhagia, ut vulneratus interiret. Idem & in aliis advenſiſſe obſervavi. Juvenis quidam robuſtiſſimus prope Hildenſem, in duello vulnus culero ad dextram ſpinæ doſti partem, circa quantum vertebrae lumborum recepit. Incidit in manus barbariſſimorum, qui cum vulnus ſolo emplaſtro Stictico curare vellet, brevi ex vulnere ſaris laro facta eſt fiſtula anguſtiſſima, profunda, & ſomnè dolorificæ.*

Anno 1591. & biennio poſt acceptum vulnus, venit ad me Hildenſem, ubi tunc Chirurgiam faciebam. Immiſſo Stylo exploratorio, (*vid. Tab. viii. fig. 1.*) in profundum vulneris corpus quoddam durum ſele obſtat, cum verò lateret, an para eſſet cultri, an verò eo ipſum, ſtylum exploratorium fabricandum curavi, cuius cuſpida fabricata eſt in forma torcularis. Inſtrumentum hoc ad fundum uſque vulneris leniter immiſſo & circumducto, cum illo corpori illi prædico inſingere non poſſem, ægro audacter dixi. cultri cuſpidem vulneri.

vulneri adhuc inhæret. Si enim pars vettebat se fe obtulisset Stylo exploratorio sine dubio torcular admisisset. Præparato corpore, cum optima victus ratione, tum purgationibus, & venæ sectione, dilatata fistula, spongis præparatis, & radicibus gentianæ, aliisque convenientibus remediis in ima ulceris pariete culpædem cultri inventi, cujus longitudinem & formam depictam lætor in prima Centuria Observat. 62. videre poterit.

De infelicis successu emplastri Scitici aliam historiam, annotatione dignissimam, Lætor videre poterit in tertia Centuria Obs. a. 4. de juvene quodam, qui gladio (non tamco districto) in sinistro maxillam prope osium graviter vulneratus fuit, adeoque ut il- lum ipsum gladium tanta vi facili foris, manubrio atque odo in terram delapsus, sibi ipse am- bus manibus totisque viribus tandem extrahere coactus fuerit. Quo facto & extracto, osium planè vaginæ vinculum, sed nodum tantummodo gladii mucronem conspicere licuit. Hic quum Chirurgus, qui hoc vulnus solo emplastro nigro, sive fodicationis (Germanicè (Säichpflaster) nullis injectis turundis, spatio sex septimanarum cicatrice obduxisset, sequutus est affe- ctus longe gravissimus, qui ægrum in quartum usque ansem mitum in modum excruciat, ut lætor proli- zè videre poterit loco præallegato.

Cæterum quam emplastra Scitica suum quoque usum habeant in præxi Chirurgica, maximamque virum sine, si rectè & methodicè adhibita fuerint, visum fuit hic inserere ea, quæ post Paracellum Oswaldus Crollius de suo emplastro Scitico scriptum reliquit, simul & descriptionem suam, quæ mihi inter reliquas compositiones puritantis esse videtur. In cu- jusus, inquit Crollius, salutaris emplastri Scitici com- positione, secundum Paracellum, quatuor diversorum generum ingredientia consideranda veniunt.

1. Sanatio, quæ fit ratione Cera & Colophonia. 2. Acci- dentia, quæ tolluntur & impediuntur beneficio gumma- tum scilicet Opopon. Galb. Sagap. Bdell. Ammon Elemi.
 3. Parado (quodlibet enim vulnus, etiam sine accidenti puritatis est eliminatum, generas vermes, & carnis mala excreverunt) quæ tolluntur & præcavetur spe magnorum consolida- tione, & Massicæ scilicet, Myrrha & simili- bus. 4. Ut præstetur ad mucres, scabie, aridam, contra- cturam, Syntoria, & similibus accidentibus, quod fit per mineralia, scilicet, lithargyrum, Minium, Antimonium, Cerussam, Marsiasum, Calaminarum, & similia.
- Vulnere Ulcerumque refo insistorum, Sciticum emplastrum præstantissimum.

1. R. Minii

Calaminari.

Lithargyri auri & argenti an. ʒij.

Ol. Lini.

Olivorum an. lb. 1. f.

Laurini lb. f.

(Cera

Colophonia an. ʒ. 1.

Vernicis

Terrebinth. an. ʒ. 6.

2. R. Opoponacis

Galbani

Serapii

Ammoniaci

Bdelli an. ʒij.

Carabe cistrini

Olibani

Myrrha Alexandrina

Alui epatica

Utriusque Aristolochia, longa & rotunda an. ʒ.

Mammia Transmarina

Magnes

Hamacis an. ʒij. f.

Cradellorum aliorum & ruberum

Marris perlarum

Sanguinis Draconis

Terra Medicea Strigenti

Virioli albi an. ʒij.

Flor. Antimoni ʒij.

Cerei Marris sanandem.

Camphora ʒij.

Modum parandi talem servavi.

1. Gummata quinque in aceto macerata & cocta exprimantur per lintum crassum, bis repetendo co- cturam (dosis gummatum potest augeri, propter fa- ces ab expressione remanentes & abijciendas) postea super lentum calorem in modum sarragine usque ad con- sistentiam medioctem inspissentur.

2. Oleum lini & olivum imponatur alteri sarragi- ni, & addatur lithargyrium auri & argenti, co- quantur agitando, donec oleum colorectur, postea ad- datur Calaminari, & paulò post Miciom, Omnia il- la agitando ferè per duas horas, coquantur simul ad sufficientiam, cujus proba est, si supra unguem gutta concreverit & condensetur, nec amplius diffuset.

3. Tandem etiam addatur circa finem vernix, oleum laurinum, Cera, Colophonia, omnibus be- ois invicem mistis & liquefactis, & ab igne sepositis, postea da operam, ut sarrago cum gummatibus pau- lum caleat, & successive affunde liquorem & se- cunda sarragine, gummatibus diligentissima agitatione incorporando supra lentissimum calorem (cave ne bul- liat, alioquin, gummata in grumos coeunt, & oleo dif- ficulter miscentur) postea agitando addatur pulve- ri, & diligenter per horam omnia agitentur. Ultimo Camphora resoluta io oleo juniperino addatur, si for- tè nimis duram esset, addatur adhuc aliquid Cera & Colophonia.

Proba justæ decoctionis hæc est; bacillo intincto gut- tulas aliquot in aquam stillare sinito, si digitis adha- eret materia mollis, coquatur diutius, donec dures- cat. Tum de eadem ab igne deponatur, & in magnam pelvim aqua plenam infundatur, ac manibus (Oleo Chamomellino, Rosarum, juniperino, lumbecorum, Hypericonis ana q. sufficit, mixto) perunctis pinsete, ac instar malagmati subigere convenit, horis tribus vel quatuor, servetur ad usum, efformata inde prius magdaleonibus alore includenda.

Vires huius emplastri, inquit Crollius, sunt innumera, sub Lunari globo non reperitur efficacius.

1. Coorta inveterata ulcera, nec non recentia vul- nera, & ictus, obicuoque sunt in corpore, etiam in capite.

2. Siccat & modificat vulnera, carnem bonam producit, consolidat, ac sanat una septimana efficacius quam aliud mense integro.

3. Putrefcere non sinit bonum, insuper corruptio- nem, malæque carnis excreveriam impedit.

4. Nervis truncatis aut contusis optimum est re- medium.

5. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quoque de vul- neribus extrahit, superpositum eis tantum.

6. Venenosorum animalium curat morsus istiusque, attrahit enim venenum.

7. Marascescere facit apostematata cuncta, superpo- sitione sola.

8. Contra Cancrum, fistulam, scrophalas, igitur perficum, est remedium excellens.

9. Mitigat omnes dolores cujusvisque vulneris, aut ictus,

10. Contra ruptum am.
 11. Ubi caput intus est, calantur capilli, & imponatur emplastrum.
 12. Dolores dorsi, impositione tollit.
 13. Ficos cutis extra & intra sanas imponendo.

Vires suas servat integras annos quinquaginta, quo tempore æque efficax est ac recens compoliturum. Eadem ferè verba habet Paracelsus in fragmentis de morbo Gallico, mihi pag. 673. Atque hæc sunt quæ Oswardus Crollius de suo emplastro Scitico scripta reliquit. Paracelsus & alii sui non minus ad eum usque extollunt. Sed quia nudo, hoc est, solo emplastro ista omnia adscribunt, & universella negligunt, cavent sibi tyrones, ne splendidissimis istis encomiis, & laudibus hujus emplastri seducantur. Si enim tantis virtutibus præditum esset hæc emplastrum, tunc atq; Chirurgica non amplius esset ars, imò unusquisque idiota, enim subsulcus hoc emplastro instruetur, optimus esset Chirurgus. Olim impudentissimus *Thessalus*, ut testatur Galenus, Method. medendi lib. 1. se totam artem Medicam sex tantum mentium cunículo tradidit, ut pollicebatur, cetera ullam aliarum artem institutionem. At si illa omnia, quæ huic emplastro adscribuntur, vera essent, non menses sex, imò ne quidem dies sex, ad discendum artem Chirurgicam requirerentur, sed quæmadmodum doctrina *Thessali* olim in perniciem humani generis cessit, ita fit & hodie cum hujusmodi medicamentis emplastra, & præter rationem adhibitis, dum enim horum medicamentorum facilitate alliciuntur barbitoniores, Theoris artem relpuit, negliguntque. At cum nullus commodè curare possit, nisi prius naturam corporis universi perspexerit, ut docet Galenus loco præallegato, mirum non est, si hi, qui nudis istis medicamentis emplastra procedunt, gravissimos committant errores.

Potest omnia reliquis prænotationibus hujus emplastri, videamus, an in vulneribus articularum, nervisque truncatis & confusis, optimum & securum sit remedium? Ubi illa omnia, quæ in præcedentibus, de Balsamo, & decoctis traumaticis sive vulneratis, in medium adduximus, in memoriam revocanda sunt. Nimirum circa curationem vulnerum, non minus ac circa internam partium morbos, quatuor consideranda esse tempora. Diximus præterea, in augmento vulnera assuui humorum, & inde nascentibus inflammationibus, maxime obnoxia esse. Etenim in incipientibus inflammationibus, referente Galeno libro de venæ sectione, avertere, quod insinit, expedit: idque ut alibi docet Galenus, commodè astringentibus & refrigerantibus fieri posse, omnibus in confesso est. Sed videamus nunc, an gummata illa, *Opoponax* videlicet, *Galbanum*, *Sagapenum*, *Bdellium*, & *Ammoniaca*, illam habeant facultatem, ut affluentes humores, qui omnium symptomatum causæ sunt, repellere, partemque affectam ab accidentibus, ut *Crollius*, & alii volunt vindicare possint? Id verò ut commodè fiat, ex quæ *Dioscorides* & alii de ipsorum facultatibus scripta vobis reliquerunt, ordine perpendemus.

Opoponax, inquit Galenus, de simplicium medicam. facult. lib. 8. tum molli, tum digerit. At calefacit quidem in tertio ordine, in secundo autem siccat.

Galbanum, docente *Dioscoride* lib. 3. cap. 81. excalefacit, urit, extrahit, dilucit, menses ac partus extrahit, appositus vel suffusus. Galenus *Galbanum* ordine tertio incipiente, aut secundo completo excalefacere, siccare verò secundo ordine incipiente testatur, de simp. med. facultatibus l. 8.

Bdell. Chirurg. Tom. II.

Serapinum Othcins, sive *Sagapenum*, ut *Dioscorides* lib. 3. cap. 79. terulacis herbe succus est, quæ in Media nascitur, gustu acris. Calidam & tensivum esse partium, Galenus quoque de simplic. Med. facult. lib. 8. testatur.

Ammoniaca tantam vim calefaciendi & attrahendi habet, ut etiam partus extrahat, testatur *Dioscorides* lib. 3. cap. 82.

Bdellium Lachryma est *Saraceniæ* arboris, calefacit & emollit, partium quoque extrahit, *Dioscorides* lib. 1. cap. 69.

Cum itaque prædicta gummata sint calida, & ut jam jam demonstravimus, facultate attrahendi prædita, tantum abest, ut in principio & augmento applicata, partem læsam ab accidentibus vindicare possint, ut potius partem affectam excalefaciendo, & humores copiose attrahendo, symptomata omnia vehementiora & periculosiora efficiant. Hæc evidentè testatur lumen illud *Chirurgiæ*, Joh. de Vigo, cum emplastrum oxicroceum in fracturis ossium rejicit, illudque propter accendit, quæ exicare solet, *Diabolum* appellat. Sunt enim, inquit, aliquæ ingredientia, quæ virtutem habent attrahendi materiam ad locum, cum malitissime non parva, veluti sunt *Ammoniaca* & *Galbanum*. Hæc *Vigo*. Sunt & alia ingredientia hujus emplastri, quæ ipsius facultatem calefaciendi adaugent. *Therebinthina* nimirum, ol. *Laurinum*, lini, *Colophonia* &c. Ex quibus perspicuum fit, emplastrum hoc ab initio, & in augmento, & diametro contrarium esse in articularum vulneribus, quæ quia, propter exquisitissimum sensum partis læsæ, doloribus & assuui humorum maxime obnoxia, potius anodyna requirunt.

In primia autem, ad evitanda symptomata, vulnera ab initio digerenda esse, antea ostensum fuit. Digestio autem & suppuratio non calidis & siccis, veluti gummata prædicta, aut frigidis & siccis, uti minime, lapis calaminaris, *libargyrum*, sanguis draconis, terra *Serigensis*, & quædam alia, fed calidis & humidis perferitur. Cetam quidem & oleum olivæ, lini, & *Terebinthinum*, vim digerendi, & per movendi habere scio, sed eorum vis à reliquis ingredientibus, videlicet calidis & siccis, simul & frigidis & siccis, obstruuntur. Alius præterea committitur error circa vulnera, cujus erroris auctor fuit *Paracelsus*, & ipsius sectatores, imprimis *Felix Wirtz*, dum usum curandarum in vulneribus rejiciunt, non sine maximo damno ægorum. Vultus enim nisi curandis monitum fuerit, contrahunt ipsius labia (membrana nola enim omnia facillè, & naturaliter quidem, contrahuntur) gravissimaque symptomata inde sequuntur. Pus enim in profundo vulneris colligitur, incalcescit, putrescit, ac inflammationes, apostemata, spasmus, gangrenas, aliasque ulcera insanabilia excitat. De quibus lectur exempla & observationes singulares, in quarta *Centuria* observationum nostrarum 66. videre poterit. Hæc verò omnia facillè evitabit rationalis *Chirurgus*, si, si arundis aut filamenti contortis, secundum vulneris conditionem, apertum illud conservaverit. Ex his omnibus manifestum fit, emplastrum hoc ab initio & augmento applicatum, symptoma, hydropem videlicet articularum, provocare posse. Circa finem verò status, uti quoque in declinatione, remissis symptomatibus omnibus, præstantissimum esse medicamentum eror. Partem enim affectam ex vulnere labefactam corroborat, & si quid humoris præter naturam, aut durities aliqua in ipsa remanserit, resolvit, carnis generationem promover, tandemque cicatricem inducit.

Cap. 10. De Unguento armariò, ejusdemque
 aethere, & quomodo Ichorem & Meliceriam
 procreet?

HUc usque de abusu & vero usu decocti traumati-
 ci, de Balsamis item naturalibus & artificiali-
 bus, uti quoque de emplastro Scitico, quantum ad in-
 stitutum nostrum necesse esse videbatur, egimus, ubi
 quoque demonstratum fuit, errores & symptomata,
 quæ ex usu prædictorum medicamentorum sequuntur,
 illa non medicamentis, quæ sua natura optima sunt,
 sed ignorantia potius & inscitia Chirurgi adscribere
 esse. Sequitur oratio de unguento Armario, quod &
 stellarum, & sympatheticum, Germanice *Wassensalz*
 vocant. Plerumque enim omni solum asitum, de
 quo in hoc libro agitur, verum etiam alia quàm plu-
 rimis symptomata gravissima excitat, optimamque
 valetudinem corporis destruit, Conscientia quin
 etiam maculam interit. Hæc autem ut rectè intel-
 ligantur, ejus inventorem & propagatores eorum-
 dem, item compositiones & usus, ordine & paucis
 hic ioseiam.

Inventorem hujus unguenti esse Diabolum, tes-
 tatur viri Doctissimi, in primis *Petrus Helvicus*,
 Medicus doctissimus, & in Academia Coloniensi
 Professor Celeberrimus, libro de essentia Ellebori
 Extracti Capite 2. *Johannes Georgius Godelmannus*, de
 Sagæ & Veneticæ lib. 1. cap. 8. *Tob. quoque Robertus*,
 in eis, quæ de hoc unguento contra Goclenium scrip-
 sit, diversis in locis, præsertim sectione undecima,
 id manifestè ostendit.

In officina porò Diaboli unguentum hoc pessimu-
 rum nomenclatum, non medicamentum, culum ex
 scripto Empirici custodiam, Germanorum celeberrimi,
 liquidum est, qui de hujus unguenti compositione,
 usu, atque præstantia scribens, iofania & impietate
 summa ductus, docere non erubescit, quomodo quis
 unguento hoc adhibito, ægrum ium possit tormen-
 tis, doloribus, ac cruciatibus, lacessere, & eundem
 ab illis liberare vicissim. O hominis inaudita
 impietas? ô seiva inhumanitas? Diaboli autem in-
 stitutum à Paracelsio superiori seculo introductum fuisse,
 nemo negare potest. Quod & ipsemet in libro
 quodam de Podagra faletur, his verbis. *Hoc verum est*,
 inquit, *Multa sunt in Med. una artes, quæ à Dia-*
bolo, & spiritibus malefacta sunt. Vides, addit Erasmus,
quem habes sua Meducina anihillare? Vox auditu impia,
quæ & sacro S. Scriptore è directo repognat. Omne
enim munus bonum, & omne donum perfectum, in-
quit Divus Iacobus, supernè est, descendens à Patre
lummenum. Diabolum quoque aliquando per præsti-
giatores & incantatores, homines & bestias sanare
videmus. Fit hoc permittente Deo, Alioquin (Libavii
verbia, libro de Lapidator. vulnereum & per onguentum
armariu curatio, utor) qui malus est, & malorum
efficitur causa, aiquid boni per se producat? Si quem
curat, ad confirmandam de se opinionem curat, id
profectò longè pejus est; sublato enim corporis vul-
nere, animæ inordinis morbus gravissimus, & pletum-
que exitum interitum afferens. Morbum autem
levem, graviore inducto curare, bonum esse ne-
quit.

Certum cum virtus eorum, quæ cultro, telo,
 aut alio aliquo instrumento, quod sauciavi, inper-
 gantur, aut applicantur, naturaliter ad vulnus per-
 venire non possit, cum inter agens & patiens mu-
 tuum contactus requiritur. Et proinde neque vulnus
 curare, multò minus dilacerare, aut ægrum doloribus

doloribus excruciatè possint, necesse est, idantè & indu-
 stria Diaboli fieri, qui cum artifex sit longè altissimus,
 acutissimèq; & jam à primis seculis exercitissimus, id
 perficere difficile sibi non est, ubi apud doctos & fide-
 dignos viros exemplò nostro dignissimum habemus, quod
 quia ad institutum nostrum magnoopere facere video,
 hic annectendum duxi. Sic eolm Godelmannus post
 Heortem Boëtium & Cardanum de Duffo Scotonum
 Rege. *Duffus Senior Rex novo affligebatur generi-*
morbi, ita ut quotidie sub primam vigiliam, lecto de-
cumbens, insigne cruciatu per universum corpus sen-
tires, & in sudorem resisteret, vigilique totam no-
ctem anxius peragebat, sine ulla aliquo figne, vel febris
vel viscerum humorum; Interdum vero à sudore liber
quiescebat, & ita sensum quasi tabe consumebatur; pluri-
mus quidem à variis Medicis exhibitis remediis, nihil
prosus juvabat, tandem populari ramore, incerte ta-
men aurore, increvit. Regem in Alcravia, Regione
Scotia apud Ferres, à Veneticis muliercula ita torqueri &
cruciari. Disbabat autem Ferres quinquaginta milli-
ariis à regia sede. Hæc cum à regis aures pervenisset,
missi Rex elancularis exploratores, si qua muliercula ve-
neticis aut incantationibus esset suspecta, quæ ubi ex dili-
genti inquisitione præfetti Ferrenon essent explorati, nullum
circumdans aditus cuspidam vitula, seves erumpunt, ac
vitulam quæ meretricula filia ad ignem sedens, & cor-
ream imaginem Regis. Duffi vero circumvigilant, ac ad
ignem tarcumventus invenientes, ac comprehedunt.
Altero die tertio à subella muliercula, confestim, Regis
mortem, nisi fuisset rapta, paucos post dies, sensim
verenda eius imaginem, continuo subsquecurant fuisse.
Autem imago ejus certis terminibus admodum rectè, ab igne,
quotidie liquefere, ita ipsum Regem quotidie tabe
consumptum fuisse. Exstis his veneticis, unà cum cereâ
imagi Regis, proxima Rex pristina sanitati restitum est.
Hactenus Boëtius. Si certa imagine, quæ proflua ni-
hil commune cum Rege habuit, arte diabolica hic af-
fectus sequens. quomodo magis id sit cultro, aut in-
strumento, quo vulnus inflicum. Cum vulnere enim
cooforti aliquid habet, cum sanguine id aut ichore,
ex vulnere profluente, illitium maculatumque sit.
Verum detestanda impietas est, docere, quomodo æget
sit torquendus & doloribus afficiendus, cum Medici ho-
ni officium sit, ægum à dolore levare, non cruciatum.
Vulnus sanare, non ovis symptomatibus dilacerare.
Dolorem enim vulnere supravivensentem, omnium
gravissimum esse symptoma, & Ichoris causam primam,
jam sæpius ostendit, itaque mirum non est, si
superstitiosam hanc magneticam curationem plenum-
que sequatur, ut postea fufus. Hæc de inventore ac
præcipuo auctore unguenti armari, quod postea in-
dustria Paracelsi primò propagatum & à supersticioso
homine Diaboli instinctu acceptum. Ante Paracel-
sium enim unguentum hoc inventum non fuisse, ostendit
Johannes Robertus in libro suo de Ungu. Armario
contra Goclenium sectione 8. & sect. 17. Post Paracel-
sium Osvaldus Crallius, Johannes Ernestus Burggrævin,
& nonnulli alii, mira modis hoc extolerunt. Vixit ho-
jus unguenti apud multos hæreticos descriptiones. Paracelsus
Tom. 2. in Archidoxia Magice, libro primo, mihi pag.
549. hanc posteritati reliquit.

4. *Musci crani humani 3ij.*

Mumia 3ij.

Pinguiculi humana 3ij.

Sanguinis humani 3ij.

Ol. Ros 3ij.

Ol. rosmarin 3ij.

Bals. Armeni 3ij.

Miscerantur in Mortario & agitentur tam diu,
 donec redigantur in unguentum.

Eadem

Eadem pagina aliam habet descriptionem, ubi præcedenti compositioni addit Mellis ʒj.

Seri loris ʒj.

Rudol. Goelenius hujus Citationis Magneticæ hanc habet descriptionem.

R. Ufnez concotetæ in calvaria futa suspensi, & in aëre detecti.

Munia vera,

Sanguinis humani adhuc calentis, singulorum unciam unam.

Adipis humani uncias duas

Ol. lini.

Terebinth.

Boli Armeni sing. ʒij.

Miscantur omnia simul in mortario, serventurque in vitro, vel urna oblonga & angusta.

Alii, addit, recipiant ufneam abrafam à cranio hominis violenta morte petempti, duarum avellanarum pondere.

Adipis veris aprugni,

Ursini sing. uncia vi.

Lumbicorum terrestrum ex vino lororum, inque pistoris formæ olla recta rectefactorum (non adustorum): uncias iij. horum in pulverem redactorum, uncie uni adjiciunt.

Cerebri aprugni siccati,

Santalii rubri odorati, Mumie, & hæmaritis, singulorum unciam j. omnibusque mixtis cum adipæ faciunt unguentum. Hæc, inquit, descriptio optima est, si fuso & nervis, hoc est sanguine & adipæ humano (in quibus maxime dominatur spiritus ille vitalis, vegetabilis, & h. h. h.) non caret. Inque in vera hujus unguentum compositione, sanguis & adipæ humanus non sunt contraria, quæ etiam modo consellum apud nos quævis ut tempore possit haberi (quoniam Chirurgi sæpe vel non sunt præsentis, vel etiam à vulneris remotioris) sunt optima quantum possumus imitando Cœli: Undum autem est, inquit Goelenius, sole existente in libra. Ufneam enim colligit cum Luna crescente, inque Venris existeret. Doms si fieri possit, non Martis aut Saturni. Si in Venris domo locum habere Luna non potest, diligenter attende, ut possit abradi ufnea, luna versante in piscibus, hoc enim signum est omnium convenientissimum. Propter loris dimissionem, & Venris exaltationem, propterea hinc est aurum & libra. Hæcenus Goelenius.

Hæc, quantumvis sufficere possent, descriptiones & compositiones unguenti armarii. Quia tamen Crollius maximus habetur patronus Magneticæ hujus curationis, ejus descriptionem, quæ in sua basilica chymica, mihi pag. 178. existat, quoque hæc apponam.

R. *Adipis Veris aprugni*

Ursini ana lotones olei.

Quæ sentia animalis, est melior adeo. Utriusque animalis adeo prius in vino rubro per dimidiam horam lentissimo bulliat, postea effunditur super aquam frigidam & coelestis & ligatur pinguedine, quicquid fundum peti, abiciatur.

Postea recipi lumbicorum ex vino vel aqua lororum sextarios duos, terrestrum in olla tellæ in fornace pistoris, cavendum tamen, ne adurantur, postea terantur in pulverem.

R. *Huius pulveris*

Cerebri Aprugni siccati,

Santalii rubri odorati,

Mumia

Hæmaritis ana unciam unam.

Demum accipe ufnea à Cranio hominis, violenta morte petempti, abrafam, lunam crescentem, & in luna domo existeret, Venris, si fieri possit, non Martis aut Saturni, ad pondus duarum avellanarum circiter. Ex omnihus tritis & iocicem mixtis, cum adipæ secundum artem unguentum fiat, in vitro clauso, vel pixate, diligenter ut usui reservandum.

Si forsitan temporis successu unguentum exstiteret, Alio adipæ vel melle virginis humellari & emoliri de novo poterit. Paratur unguentum sole in libra existente: Hæc Crollius. Proprietas quoque suas descriptiones & deliramenta habet tabularum Cœli lib. 18. cap. 145.

De vitibus ac usin hujus unguenti Goelenius, Crollius & alii, hæc habent, faciant inquit Goelenius, hoc unguentum sic confecto, omnia vulnera, quæ ferro, illa, vel jactu insignuntur. Excepantur tamen illa vulnera quæ sunt in arteriis, & uno à membris principalioribus, ut corde, cerebro &c. Modò saltem cum infractum non quod sanari possit, haberi possit, etiam si pariter multis miliaribus à nobis absit.

Usum hujus unguenti docent Goelenius, Crollius, & alii, his verbis: Immo gerendum ferrum seu telum est, quod sanari (vel in hujus desolati lignum, seu ramum salignum in apertura cruenta madefactum) in unguentum & ita relinquendum: apert quidem si à urina vel puri aqua vulnus eluat, deligatque mox de panis lino semper prius extergendo, vulnusque aurora manducando, & absque ullo dolore sanabitur. Hæc Maximilianum Imp. comprobasse, in conspectu est. Si infractum, quod vulnus instillatum est, haberi nequit, aliud ducatur per vulnus, & loco veri telii id innoge utroque latere, repenatur loco mendo & temperato. Si enim aeri vel frigori nimis exponatur, excitabitur dolor. Evadendum est tamen casum ne aut punctum saltem sit vulnus. In punctura enim telum innogendum est à cuspide Caputem versus, in Casura ab acie versus tergum. Meminisse præterea oportet obligare tela. Si non appareat quam alitè fini infixa, tota sit & innogenda, sit apparet, pars illa sanum, quæ sunt in vulnere. Cuius naturæ sæpe ultima (præterit veri sit vulnus est magnam & profundum): si maturatio apud non est, necessitas non urget, intermitte quidam dies prorsus, immò infirmit, si semel diebus id fiat his, vel ad summum ter, semper cum vulnus manus abluendo, extergendo, iterumque deligendo. Hæcenus Goelenius. Crollius & nonnulli alii eisdem fere utuntur verbis: quæ quidem pollicet, & ut apud ipsum leguntur, adscribere volui, non in enim finem, ut Chirurgos in Magica atque superstitiosa curatione erudire aut instruere, meus animus sit, atque intentio mea, quin potius ut cognoscant, à Diabolo esse inventam & ab hominibus superstitionibus additis, propagatam, & proinde homini Christiano nullo modo licitam. Præterquam enim quod conscientiam piam ac Christianam offendit lædique, cum neglectis naturalibus, & à multis seculis approbatis remediis, ad supernaturalia & superstitiosa transcamus, etiam periculo non vacat, quicquid dicant Goelenius, Crollius & alii, qui sequens Exemplum observatione dignissimum fidem facit. Genere & virtute nobilissima matrona, ANNA SIDONIA BREMSERINA de Rodesheim, Nobilissimi ac Strenui Viri Dn. HERMANNI à CRONBERG, conjung, cum Anno 1613. feliciter peperisset, nescio quoniam infortunio factum, quod decima die post partum, vulnus ad latus papillæ accepit. Vulnus erat non usque adeo profundum esset, sanguinis tamen copiose efflavit. Tentantur quidem linguis fluxum beneficio unguenti armarii cohibere, sed frustra. A Chirurgis itaque refectio sanguine, non vulnus, sed coltrum, quo insiduum fuerat, summè diligentia curabant &c.

tractabant quotidie ; eisdem quidem & sine dolore ferè curatum fuit vulnus, verùm vix inducta cicatrice, obeso in profundo oborto dolore, febre cum rigore, aliisque symptomatibus correpta fuit, & mamma cum tanto dolore intumuit, ut dies noctesque ejulare coacta esset agra. Tandem 19 Aprilis 1613. cum ego Wormatiâ (ubi tunc ad Genetolam ac streoum Vitum, Dominum Eberardum Kemerer von Wormb / genant von Dalberg / vocatus fuissim) ad ipsam Oppenheimem accersitus essem, in maximis angustis ipsam inveni. Mamma enim supra modum tumefacta & indurata fuit. Dolor maximus & pungitivus, & febri ardentissima, nausea, eructationes, & Lipothymia aderant, cicatrix tamen præcedentis vulneris vix apparebat. Circa papillam livida erat cutis, hæc tamen mollis, ut fluctuatio puris facile deprehendi posset, quapropter fualu, ut incidereetur vomica, id cum à me factum esset, dolor reliquaque symptomata remiserunt, pùstinaque sanitati restituta fuit, & per multos annos supervixit. Integrum historiam vide Centur. 3. Observat. 25.

Sed objicit aliquis, quidnam in causa fuerit, cur mariona hæc curata non fuerit, cum tamen multi alii ex eadem pizide, & ab eodem vulnere præstigiolo curati fuerant / Causa in promptu est. Hæc mariona illa pia, fidelis & superstitionibus minime addita, ideoque fidem, quæ cum fortissima imaginatione in hujusmodi & similibus cautionibus (ut multis in locis testator Paracelsus) requiritur, non habebat: hinc Diabolus, qui potens est in infidelibus, in illa operati, curationemque abolvere non potuit. Contractis itaque & conglutinis labilis vulneris, pus, quod evacuandum erat, in profundo vulneris collocatum fuit.

Ex hac historia patet, quàm periculosus sit usus hujus angustii, quomodo autem hydrarthros sive hydrops articulorum esse ipsius nû consequi possit, paucis dicam. In curatione vulnerum diversæ intentiones ut habeat Medicus, necesse est, videlicet: 1. Ut fluxus sanguinis stitatur: 2. Ut affluxus humorum & inflammatio accendatur, & dolor evictur. 3. Ut labia vulneris, si magnopere inter se disjuncta fuerint, ad mutuum contactum deducantur, relicto tamen foramine, per quod pus commodè evacuari possit: 4. Ut vulnus, si profundum simul & angustum fuerit, apertum erit atque utque dum satis digestum, & à pote mundificatum sit. 5. Ut pus bonum generetur. 6. Ut malignitas vel venenum, si quod vulnere simul illatum, uti fit in morbo is & lèthibz biliarum, ex abatur. 7. Ut caro restituarur & generetur. 8. Ut vulnus cicatrice obducatur.

Porro ut uno eodemque medicamento omnibus istis intentionibus satisficere possit Medicus, absurdum & ridiculosum est dicere: Ad sanguinis enim fluxum cohibendum frigida & sicca requiuntur. Talia quidem sunt asina, hæmatitis, bolus Armenus, & saturalum, verùm hæc qualitates suas in mixtione amittere, doctè ac evidenter ostendit *Isaaci Marthani* Quæstione 29. Id quoque verissimum esse, prædicta mariona experta fuit, ut ex præcedentibus videre licet. Affluxus præterea humorum ut impediantur, quæ refrigerant & repellunt, vulnere tunc applicanda quæque frigida, ut portulaca, sempervivum; lactuca, albumen ovi, acetum, bolus Armenus, terra sigillata, rose, & alia quamplurima. Tertia poro & quarta intentio manum chirurgi expecti requirunt. Id verò quia in nobilissima illa mariona neglectum, vulnus profundius clausum, iterumque pus in profundo collectum fuit, inde dolor ille gravissimus, reliquaque

symptomata. Quod si in articulo aliquo existisset vulnus, pedicel dubio hydrarthros sequens fuisset. Quotid, ut vulnus digeratur, & pus optimum generetur, sua quoque requirit medicamenta particularia, ea autem modicè sint calida & humida, veluti, cera, colophonia, terebintina, crocus, oleum Amygdalarum dulcium, vitellum ovi, & ejus oleum, de quibus suo loco plura; Sextæ indicationi ut satisfiat, ea quibus virus potenter extrahant, & vulneris labia biancia ferant, applicanda sunt, uti cepa, allium, sal dictamnus, ruta, Theriaca, Methridiatum, radices gentiane, Angelicæ, & hujusmodi conveniunt. Septimò, ut caro restituarur & generetur, danda est opera, idque fit sarcoeis, hoc est quæ modicè detegunt & siccant, uti sunt Aloë, Thus & Aristologia sordida, ex quibus cum cera, terebintina, & gommæ Elemi sit unguentum præstantissimum, additum parum olei rosacei. Octavæ & ultima intentio est, ut cicatrix inducatur, hæc eis, quæ refrigerant & siccant, ut galla immatura, Tutia, Afumen visum, lapis calaminaris, cerussa, & hujusmodi. Hæc sunt, quæ rationales Medici in curatione vulnerum observant: idque maxime cum fructu 29. Qui verò aliter faciunt, & pondictis intentionibus omnibus spreis, hocce unico unguento Armariò satisficere putant, ægriam in maximum periculum adducunt, propter ingratia symptomata, quæ empiricam hanc curationem ut plurimum secuntur, p. æstetism in vulneribus magnis, profundis, angustis, & quæ circa articulos sunt. Ludibrio præterea pils & bonis sese exponit Medicus, qui neglecta medicamentis, à Deo hominibus concessis, & à majore nobis longo usu comprobatis, & ad præstigiola à Diabolo inventa & introducta confugit.

Sed objicit aliquis, jam olim experientia & exemplis comprobatur, vulnera multa, tam in brutis quam in hominibus, hoc unguento sanata fuisse; Nihil horum inficior, ultra vulnera, præsertim in corporibus sanis, optimoque succo præditis, & in partibus masculis existentibus per se, & sine mod. camero, si quocumque, ut jubet *Galenus*, per pannum munda obstergantur, perstantur. Diabolus autem, ut affluxus fluxus & frandulentissimus, per se vulnerarios semper dolo malo agit. Quotidie enim vulnus, ut docet *Galenus*, vel utriusque, vel aqoi puri abluunt, mundoque panno leni po pus abste gont, delinantur. Porò à urinata extergendi, mundificandi, & consolidandi vim obvinere perteret experientiam testis neur *Galenus lib. 20. de simpl. Medicam. facultatibus*. Ubi inter cætera hæc quoque habet. *Nemnulli, inquit, Medici, à videlicet urina, spissas & lepras detegunt, perfunduntque necera per abominabile & sordida: multaque magis temporis ferunt. Aqua præterea, propter facultatem suam frigidam, cum in nonnullis vulneratis afflictae humores repellere; vulnusque à pravis symptomatibus vindicare sufficiens sit, ac vindicare, natura per se vulnus consolidat: hæc de unguento statuo. Flora qui cupit, legat tractatum Clarissimi & Doctissimi Viri D. And. L. Baviæ de Impostoria vulnerum per unguentum armarium sanatione.*

Cap. 11. De dolore, & quibusnam prædiis sit tollendus; ubi de anodynis in genere; & quibus facultatibus ea prædita esse debeant, agitur.

Dolorem, qui vulne tatis articulis super venit, præcipuam esse causam Ichoris & Meliceris acris, antea per se demonstratum fuit; quapropter quancissimè tollendus & sedandus est; sic enim ablata causa tollitur quoque effectus ipse. Variis autem prædiis

periculis sedant dolor, quæ aut interna sunt, aut externa & topica. Internis veluti eis, quæ humores ad partem laesam fluentes per alias vias evacuant, & à membro laeso avellant, sive id per alvum, aut per vomitum, sudorem, vel vias urinarias, aut alia loca convenientia, fiat, ut sunt venæ sectio, scarificatio, sanguisuga. Sedatur præterea dolor per ea, quæ acrimoniam humoris peccantis ex corpore ad locum affectum fluentis temperant atque refrenant. Deinde etiam quæ vires à dolore prostratas insistant. Nisi enim vires adfuerint, purum aut nihil efficient medicamenta, etiam si ex arte præscripta & adhibita fuerint. Sunt enim vires, quæ medicamentum ex potentia in actum convertunt. Hæc tamen, propriè loquendo, verè anodyna non sunt, testante Galeno de simpl. medicamentor. facult. lib. 5. cap. 18. Quandoquidem universalia sunt, & in omnibus morbis particularibus externarum partium, à Medicis & Chirurgis rationalibus topicis præmittuntur.

Externa remedia, dolorem lenientia, duplicia sunt: alia enim verè sunt anodyna, alia impropiè ita dicuntur. Sunt illa, referente Galeno, loco præallegato, quæ suo ingente frigore partem stupefaciunt ipsaque sensum imminuunt, veluti papaver, Solanum, Mandragora, Hyosciamus, Opium, ex quibus unguenta, olva, cataplasmata, & huiusmodi præparantur, de quibus Initiorum nostrum non est, hoc loco agere. Monitos tamen velim esse tyrones, ut sibi caveant, ne huiusmodi medicamentis narcoticis, faciliè, & nonnisi maxima urgente necessitate utantur: quandoquidem summa eorum frigida calorem nativum mitum in modum debilitant.

Vera anodyna, ut docent Galenus, Avicenna, & alii, temperatè calida & humida ut sint, necesse est. Sic enim habet Galenus de simplic. Medicam. facultatibus lib. 5. cap. 18. *Quæ itaque, inquit, revera sunt anodyna, partium sunt tenuium: & calidiora sunt, est necesse, ut scilicet evacuent, digerant, rarefaciant, exsiccant, concoquant, & æquabile reddant, quicquid partibus doloris est causa. Quare nihil prorsus astrictionis habere oportet. Astringentia signidem, ut alibi docet Galenus, & contrahunt, conspiciuntque & condensant substantiam nostram, hæc Galenus. Debent itaque anodyna esse calida, propterea quod calor temperatus naturæ nostræ familiarissimus, & calorem nostrum innarum similitudine quadam fovet, & demulcet. Humida præterea ut sunt, necesse est, ut partes propter inflammationes aut affluxum humorum extensa, relaxentur, denique ut facultas medicamentalis altius penetrare, & ad nervos pervenire possit. Varia autem anodyna ab authoribus ponuntur. Ego sequentibus in meliceria maximo cum fructu utor, ex quibus diversa conficio medicamenta, ut lectior postea capite de Curatione videbit.*

Rad. *Altheæ, liliorum alborum, Malva.*

Herb. *Altheæ, Betonica, Origani, Calabri. Malva.*

Anethi, folior. violarum.

Flor. *Chamæmilla, betonica, primula veris; salvia.*

Meliloti, croci.

Sambuci.

Rosa.

Sem. *Lini.*

Pinigraci.

Anethi.

Gleditsium.

Meliloti.

Ol. *Liliorum alborum.*

Anethi, chamæmilla.

Lumbricorum.

De velleis roborum, Pistillum item ovi,

Croci, Rosarum.

Oleum ex floribus Solani.

Oleum de Rami.

Ping. *Humana.*

Ursi.

Capris, aseris.

Cani, felis, maris alpini.

Eupyon recens, non solutum.

Gumma & similia.

Cera.

Terebinthina.

Celophonia.

Gummi Elemi.

Facinæ.

Tridici.

Herdi.

Fabrorum.

Lupinorum.

Mica panis.

Liquores.

Aqua simplex.

Lac mulberis.

Vaccinum.

Caprinum.

Asinum.

Ex his confici possunt, Emplastra, Unguenta, Linimenta, Cataplasmata, & tomenta, uti Lectior suo loco videbit. Nunc ut curationem Empiricam, quæ Paracelsus & vulgus Barbitorum in Ichore vel Synovia utitur, videamus, ordo translationis postulat.

Cap. 12. De Curatione Empirica Ichoris & Meliceria, inter barbitorum Germanos usitata, ubi eorum Medicamenta examinantur.

Incidiam barbitorum, aliorumque theoriæ artis Medicæ impetitorum hominum, præcipuum esse causam Ichoris sive hydropis articularum, testatur Paracelsus, ubi capite secundo & alibi dictum fuit, quibus præterea Medicamentis præcipuè id perficiant, adscripsimus. Sunt illa veluti decoctum traumaticum, balsama, Emplastrum Sticticum sive sodicationum, & similia, perpetam & sine ratione Empiricorum more adhibita, de quibus cap. 7. 8. & 9. prolizè. Videamus nunc, quibus medicamentis intemptivum maximum illum consilium candorum & indigestorum humorum compescere, ac gravissimum illud symptoma removere; nervos intendant: quicquid præterea de eorum medicamentis, quibus in Ichore & Meliceria utuntur, censendum sit, anque tutò adhiberi possint, paucis, quæque apertam.

Paracelsus lib. 1. Tract. 2. cap. 5. Chirurgiæ suæ magnæ, mihi pag. 6. Meliceriam (*das Gliedwaffer*) Emplastro Stictico, & aceto rosaceo calido curandam esse docet. Prælectionum Chirurgicarum de vulneribus cap. 7. mihi in Chirurgia magna pag. 160. & 466. inter alia hæc quoque proponit medicamenta.

R. *Ostreorum 3j.*

Cretæ aduji.

Offi

Ossis Sepia

Manducula lucis usque an. 3ij.

Spedil

Tertius Sigillatus an. 3j. f. fiat pulvis. Tolle, inquit, aquam articularum ex imperia Medici. Scire oportet, si coquantur cum sanguine ex vulnere, & superponatur, tollit aquam articularum. Item Cochlear, ut facimus raseses. Hac & quædam alia hujus farinae medicamenta, hinc inde à Paracelso præcitantur.

Felix Witz Basiliensis, unguentum suum fuscum (sein braunes Salblein) pro summo secetere in Meliceria habet, nec quicquam præstantius inveniri posse, autus est affirmare. Videat lector lib. fœum Chirurgicum, in quarto editum parte 3. cap. 5. & 6. item parte 4. cap. 1. Conscitit autem unguentum hoc ex aceto, in quo per dies octo macerata fuerint sequentia, nimirum radices scrophulariæ, cennodii, Chelidonium, & Veronica. Hujus aceti uncias tribus additis vitrioli calcinati ad rubedinem, & præparati 3ij. phlegmaris vitrioli tantundem, Mellis despumati 3vj. storum sulphuris 3j. f. Omnia simul coquitur lento igne ad spissitudinem Electuarii.

[Hans von Geszendorf genant Schyban,] Chirurgiam Castellensem Germanica Lingua in lucem dedidit, in qua Gualteri Ryffii Argentinenfis Doct. Medici longe celeberrimi nomen præfixit. In hoc libro mihi pagina 35. Meliceriam sequentibus curari posse asserit.

R. Alumen, Cineres Saisidis & lithargyrium, combure omnia simul, pulveris & insperge vulnere, postea de eodem pulvere cum alumine vis commisce, & vulnere superpone.

Aliud.

R. Vitrioli, hoc est, aquæ vitrioli, coque cum paucis aluminis, parumque sulphuris, fiat lavamentum, quo vulnus abluatur.

R. Sandaracæ adulterinæ, lithargyrium, & acetum, & equæ omnia simul.

Aliud.

Accipe micam panis siliensis, vinum, mel, & rasuram ceræ beas, coquantur omnia simul in olla nova, extendantur super lineum, & applicentur more cataplasmati.

Aliud.

Accipe mel, farinam volucrium & fuliginem, ex his confice emplastrum, & applica, cum elem vulnere infiltratum fuerit. Oleum sic confice.

Accipe Olii lini lb. f. adde stures verbasci, expone oleum ad radios solares dies 14. postea adde pinguedinis saxi ad vii magnitudinem, & vulnere calido impone, gossipio oleo madefactis.

Petrus von der Seille, alioquin Chirurgus non innotuit, in Ichore & Meliceria hæc proponit remedia.

Accipe Alumen vis, parumque croci, concute, & commisce omnia, addende aluminis ad magnitudinem nucis, avellana, & cum filamentis vulnere impone.

Aliud.

R. Olibani, sanguinis Draconis, Rosi albi, Terra sigillata an. 3ij. fiat omnino pulvis tenuissimus, qui cum alumine vis mixtus, filamentis applicetur vulnere.

Aliud ejusdem Auctorit.

R. Oleum olivæ, & terebinthinum, misceantur in sanguine lento igne, postea adde farinam lenitum effuscatum q. sufficit, ut firmam unguentum acquirat, quod filamentis vulnere applicetur.

Atque hæc sunt præcipua atcana, quibus barbariores gravissimam hæcæ symptomata debellare

tentant. Hisce tamen si curatio ad votum non succederet, suadet *Al. Hans von Geszendorf*, loco antea allegato ex consilio cujusdam *Cern. Jacobs* nomine, nervos & venas causticis erodendas, aut cauterio actuali comburendas esse. Ille omni procul dubio à Paracelso edoctus fuerat, qui tractatu secundo cap. 10. mihi p. 497. Curationem Ichoris sive Synoviae (die Heilung des Gliedwassers) cum hæmorrhagia eandem esse statuit, eademque adhibenda esse remedia docet. In hunc quoque finem stercore porcinum præscribit Paracelsus in meliceria. Illud enim vim sistendi sanguinem habere, *Christophorus Landreus*, Medicus Gallus asserit, si cum sanguine ex nase aut vulnere coquantur, & ab ægro devoratur. Sed videant Junioræ Chirurghi, ne splendidi ac fastuosi isti Encomiis hujus stercoreis à Landreo proditiis, nimium confidant. Memini enim, olim in vitrico meo, *Peter Kraut*, cum hæmorrhagia nasum petiosè laboraret, medicamentum hoc ex stercore porcino frustra adhibiturum fuisse.

Christophorus Wirsung, ne curatio hujus morbi gravissimæ, in libris suis desideraretur, maluit ex aliis Empiricis quædam inserere, quàm planè tacere. Idem de Johanne Colero affirmare possum, qui farraginem medicamentorum Empiricorum, nec ullo ad morbum hæc debellandum accommodatorum, compilavit & Calendario suo perpetuo lib. 18. cap. 172. inseruit. Imò ad illam quoque impudenciam devenit, ut fluxum hujus Ichoris spatio quadantis unius horæ se restringere posse, autus sit affirmare, his verbis: Ut aqua articularum facio quadrantis hora sistunt. R. Medullam panis recentis, & si niteus aqua articularum cum impetu fluit, accipe guttulam unam vel tres sanguinis, hominis siliis, cui aqua præfuit, & resque panis infunde, æque comedendum exoleo, & statim sistunt. At quis quæso non videt, hæc delitamenta esse, hominemque nullam habuisse noticiam morbi, sed ex aliis absurda sua compilasse, & sibi adscriptisse. Hac in eum finem scribo, ut videant Chirurghi, ne Empiricorum scriptis seducantur.

Potest gravissimè Paracelsum à via recta aberrare, cum curationem Meliceris cum restrictione sanguinis eandem esse docet, eademque requirere remedia, scribit, manifestum fiet, si negotium paulò exactius examinaverimus & consideraverimus. In hæmorrhagia unicam intentionem habere Medicum, nimirum ut oscula venarum & arteriarum occludantur; Quibus autem remediis, id commode fiet, docet Hippocrates inquiens. In his frigida uti oportet unde sanguis copiosè profuit, aut præsternatur est. Quæ enim refrigerant, sanguinem crassiores adeoque ad profluendum minus idoneum reddunt. Præterea, quæ egregie efficiant absque mortificatione, si apertis venarum & arteriarum osculis inspergantur, sanguinem sistunt. At hæc omnia si in Ichore & Meliceria adhibita fuerint malum adaugere, ex præcedentibus facile colligit rationalis Chirurgus. Quæ enim efficiant & astringunt dolorem non leniunt, quin potius ipsum exasperant dum materiam in parte affecta confluentem retinent includuntque. In periculosa hæmorrhagia oscula nervorum & arteriarum (nisi vulnus fuerit prope membrum nobile) causticis, ut etiam ferro candenti obturari posse, Medicis notum est, sed quid quæso hæc in Meliceria efficiant? In hæmorrhagia corrigere causam mali, videlicet apertionem vasorum, Meliceris verò causam, dolorem nimium adangere.

Præterea in hæmorrhagia vulnorum nihil præter solutionem copiosius, & fluxus sanguinis, emendanda sunt. Non solum enim adeo solutio continui

& affusus citorum humorum, verum etiam febri, inflammatio, dolor maximus, labefactio vitium, nausea, vigilia, & hujusmodi, quæ omnia diversa requirunt medicamenta, quorum in hæmorrhagia nullum adeit. In hæmorrhagia applicamus quidem frigida, juxta doctrinam Hippocratis, non tamen supra ipsas partes, unde profluit, sed juxta ipsas. *Prædidit enim, ut alibi docet, ulceribus mordax, curam olidat, & dolorem insuperabilem facit.* At Paracellus ad eam quoque insaniam devenit, ut in Ichore & Meliceria, in qua res tantæque graviora sunt promissa, quibus frigida sunt inimicissima, concurrunt, ulceribus ipsis acetum rosaceum applicat, & quia insignis adeit inflammatio & intumescit in Meliceria, propter copiam humorum qui ad partem læsam confluunt, idcirco exiguus ille calor innatus faciliè à medicamentis illis frigidis ac siccis, ut sunt, acetum, Oïstra, Terra sigillata, bolus, albumen ovi, Lithargyrium, & similia, à Paracello ejusque sectatoribus præscriptis, faciliè suffocantur: quapropter Gangræna nonnunquam consurgit Meliceriam, ut testatur Lingius Epist. 3. lib. 1. Sequuntur quoque ulcera maligna & insanabilia, propter erosionem ligamentorum & cariem ossium, quæ à materia illa acie contaminantur.

Ceterum ut ad institutum revertar, Dolorem præcipuum esse causam Meliceriæ, antea persæpe demonstravimus. Est igitur tollendus. Id præterea anodynus, hoc est medicamentis, quæ temperatè calida & humida sunt, fieri debet, ab initio hujus capitis demonstravimus.

Videamus itaque, an medicamenta à Paracello aliiis quæ prodia, hæc medicamentis facultates, ut dolorem hunc tam gravissimum lenire possint.

Inter Medicamenta à Paracello in Ichore & Meliceria celebrata, primum locum obtinet emplastrum Strickium, sive fodiotionum. At non illud ipsum emplastrum Meliceriam provocare posse, capite nonnisi rationibus & exemplis demonstravimus. In ipso enim, quæ insigniter excalescunt, & proinde attrahunt, ut sunt Oppopoea, Galbanum, Ammoniacum, Bdellium, Cypripheia, Ol. Laurinum & hujusmodi, aliis ingreditibus præcellunt.

Acetum refrigerare & astringere, tenuiusque esse patium, docent Dioscorides, Galenus & alii, acce quoque est, & proinde ulcera vellicat, mordet, doloremque exolat. Ex quibus videmus, acetum in Meliceria adversissimum esse. Testatur id quoque Avicenna inquit, *Acetum est ex illis, quæ nervis sunt nocivissimas.* Nervus enim, ut partes spermaticæ, cum frigidis sint, calida requirunt. Si enim aqua frigida ulceribus inimica & mordax, ut testantur Hippocrates lib. 5. Aphor. 20. ac proinde dolorem excitat, quanto magis id faciet acetum, cum sit non solum frigidum, sed & acrimoniâ quadam præditum. Astringit præterea, ac anodyna, ut nihil adstrictionis habeant, necesse est, quemadmodum antea ex Galeno lib. 5. de medic. facult. cap. 18. demonstravimus. Gravissimè itaque hallucinatur Paracellus, dum acetum in Ichore & Meliceria applicat.

Oïstra, etiam si ulceribus cavis, fistulosis, & humidis conveniant, ut testatur Galenus de simplici medic. facultatibus lib. 11. Inde tamen non sequitur, in Meliceria quoque ex usu esse posse. Loquitur enim Galenus de ulceribus, ubi sola intentio est esciccare, quod Oïstra præstare possunt. At in Meliceria prius tollendus est dolor, quam curatio vulneris instituenda.

Os septæ cum Oïstris easdem habere facultates, Dioscorid. lib. 2. cap. 23. & Galenus de simplici medic. facultatibus lib. 11. testantur.

Mandibulæ lucci, uti reliqua ossa combusta, vim digerendi & escificandi habere, quæ dubita?

Spodium, ut docet Cordus in Dioscorid. lib. 5. cap. 81. nihil aliud est quam extinctæ metallorum favillæ, quæ propter pondus totius decidunt, & circa fornacem ejusque pavimentum colliguntur: Spodium autem easdem habere facultates cum pompholyge, medicamentum omnium, quæ circa mortuum exhaerent, præstantissimo, Galenus de simplici medicamentorum facultatibus lib. 9. testatur.

Desiccandi vim quamvis tenuis possidet testatur Galenus, de simplici medicamentorum facultatibus lib. 9. Ergo & terra sigillata, & bolus Armenus desiccant, & proinde ex numero medicamentorum, quæ in Meliceria adhibentur, metis excluduntur.

Quid dicam de vitriolo, alumine, cineribus lictidis & sulphure, quibus nominatim in Meliceria quoque utuntur, ascidumque adaugent. Hujusmodi enim actioribus, dolores magis magisque exant, assiduumque humorum ad partem læsam.

Felix Wirtz, Basileensis Chirurgus, unguentum suum fuscum (*sive brunner Seltem*) in Meliceria mitum in modum extollit. Conficitur illud ex aceto, vitriolo, ipsiusque phlegmate, mellis & floribus æris, ut antea dictum fuit. At hæc nimis, ut æris, in hoc assiduus dolores exacerbare, & proinde perniciosâ esse, quis non videt? Etiam enim in aliis ulceribus putridis & foetidis summo quoque habeat usum prædictum unguentum, in necibus tamen articulorum, inprimis tantis doloribus obsessis, propter acetum, vitriolum, & mel, quæ omnia acia sunt metis rejiciendum est. Morbi enim curantur non eis, quæ ipsorum causam adaugent, sed quæ ipsam tollunt, ut dolor causa est Meliceriæ. Ergo eis, quæ ipsam leniunt, est curanda. Atque hæc sunt Medicamenta, quibus morbum hunc tam gravissimum Pa acellus, & post ipsum bartheolus, & empirici in Germania, debellare volunt. Interim tamen de causa antecedenti, ut vocant Medici, de vitæ ratione, & de evacuandis per pharmaca, & venæ sectionem, multi quæ aliis symptomatibus removendis, de quibus postea fuit nihil adscribunt, præter decocta nonnulla, veluti sequens à Johanne voss *Gersdorff genanni Schylhani*, præscriptum loco prælegatur.

R. Centaurii

Origani

Radix Garophyllata

Plimpinella

Auricula maris

Summitatum Canabæ

Brassicæ

Tanacetii

Pentaphylli an. Mj. Cognantur in vino & melle. Hujus decocti exhibent ægro cochleate unum, bis in die, mane videlicet, & vespere. Si decursum, addit Dr. Schylhanus, in corpore remanet, non per urinam aut vulnus effluit, segnum est, ægrum vis evasurum.

Potest non possum silentio hic præter audaciam Gersdorffii aut Schylhani, qui aules fuit Chirurgus sue Cæstris, in qua incepta hæc quoque habentur, nomen istius viri tam celeberrimi, tam quæ docti Dr. Gualterii Rybii perfigere, procul dubio in eum finem ut libro suo splendorem asstret, eumque vendibiliorum redderet. Cum tamen verissimè sit, Dr. Rybium de hujusmodi nugis atque ineptiis ne quidem cogitare. Cognoscat id faciliè, qui reliqua legat.

ipsum scripta perlegerit. Ex eis enim manifestum sit, ipsum fuisse Medicum & Chirurgum rationalem, & in arte Medica versatissimum. Sed & fucum facile deprehendit, qui librum Gersdorffii, cum opere illo magno Chirurgico, Dn. Ryffii, ex Guidone & Tagan- tio excerpto, & Germanico idiomate impresso Fran- cforti partim Anno 1545. partim quoque 1562. conferte voluerit. De his L. ctorem admonere volui, quia ego ipsemet in hac sui opinione, prædictas nugas à Dn. Ryffio prolatas fuisse, tandem verò ex præfatione Gersdorffii Chirur- gæ suæ Castrens, & collatione Chirurgiæ magnæ Dn. Ryffii, fallaciæ cog- novi. Simile delictum in Vesalium, Anatomicorum Principem, commisit olim quidam, *Properius Ber- gersinus*, nomine. Ille enim cum mortuus Vesalius, ip- sius scripta Chirurgica in locum emittere vellet, ea, quæ Vesalius propter inspiratam & inopinatam mor- tem nondum absolverat ex Fallopio adscripsit, præcep- tæ ex libro de humoribus præter naturam ex quo multa de verbo ad verbum descriptissæ Bergersinium facile videbim, qui unus atque alterius librum per- strare voluerit. Inter alia quoque, ut Lector in ita- liæ meo de Gangrana cap. 17. videre poterit, Vesa- lio adscribit longè perniciosissimam illam opinionem, nimirum, Membra ipsochalem in parte mortua esse abscindendum. Error qui omni procul dubio Vesa- lio nunquam in mentem venit, & cui acerrimè se opposuisset, si ipso vivente tale quid de ipso prolatus sparsissimè fuisset. Bergersinium præterea hæc ex Fal- lopio deceptissæ, & Vesalio a descriptissæ, stylus ipse lu- culenter indicat.

Non absumile furtum Gallus quidam, Medicus, *Anthon de Four, Ferrus* nomine, Excellentissimum ac longè humanissimum Vitam Dn. Jacobum Amber- tum Vindonem, apud Lausanenses Medicinæ doctorem longè celeberrimum, amicum & præceptorem meum ætatem honorandum, perpetravit. Is enim libellum Gallicum de Peste Laodannæ in 8^o. im- pressum, Anno 1571. defuncto D. Amberto de verbo ad verbum descriptit, & Anno 1588. Lugduni sub suo nomine in quarto excudit coravit, typicisq; & consiliariis Cameracensibus in Sabaudia dedicavit, quibus (vide impudentiam hominis) Epistolam ipsam dedicatiorum, quem Dn. Aubertus Consiliæ ac Sena- toribus Lausanensibus inscripsit, paucis immutatis vocalis sibi accommodavit. Hæc profecto & similia furta homini docto, præcipuè Christiano, planè indig- na, à Magistratu merito muldanda essent.

Ceterum antequam finem faciam hujus capituli, ineptia & inscitia illius Gersdorffii tribus verbis testanda est. Sunt hæc ipsius verba pagin. 35. *Si deest illud* (videlicet antea ex centauro, Origano, Rad. Gario- phyllatæ &c. præscriptum) *in corpore remanferit, nec per urinam aut vulnus effluerit, sepius est, agrum vix curasum.* Porro exhibet singulis diebus cochlearia duo sui decocti, usum manè, alterum vespèri. At quis quæso observare poterit, an eaquis illa quantitas, cum urina aut ex vulnere effluat?

In Meliceria enim serosi humores tam copiose per vulnus effluunt, ut si lyoclei oculis opus haberet, qui videre nosset, sit ne decoctum, aut aliquis alius hu- mor extremeturis, qui per vulnus aut vias urinarias effluit. Per vulnus enim, ut & per vias urinarias, nihil effluit, nisi prius in ventriculo fuerit concoctum, in ioculisque quinetiam segregatum, ut si quid excrementiculi adfuerit, per alium evacuetur, parum verò per vias urinarias & portam ad hep. de- feratur. In hepate præterea iterum fit concoctio atque segregatio, ut in ioculis & serosis humor per renes vias- que urinarias effluat, utilis verò & laudabilis, qui est

isoguis ipse, per vias in totum corpus abeat. Ubi demum tercia & ultima fit concoctio atque segrega- tio. Purus enim sanguis admiranda atque singulari na- turæ industria, in nutrimentum partium corporis ce- dit, excrementum verò per sudores, nec non insensibilem transpirationem evacuat. Perusta itaque ter- tia concoctio, saltem ad vulnus pervenit decoctum. Judica itaque, dico iterum, an decoctum sit, quod per vulnus effluit, an aliquis alius humor? Sed testifex Gersdorffius ad eventum eorum, quæ fieri solent, magis quàm ad causam ipsam, Ulcera enim eorum, qui mortui sunt, ut testatur Hippocrates prænotionem lib. 7. ante mortem livida & sicca, aut etiam pallida & sicca fiunt. Faculas enim expointrix adeò est infir- ma, ut materiam antea per ulcus evacuari solitam, ad partes remotiores propellere non sit potens, remanet itaque in corpore, & partes primarias magis magis- que lædit. Hinc ipsum vrinis siccum & atrium conspici- tur. Eriam hujusmodi, aliaque decocta copio- sissimè sorberet æget.

Ceterum cum de mortui, ut prudenter monet So- lion, *nil nisi bonum*, vitio fortis aliquis mihi veniet animadversiones hæc in Paracellum, Gersdorffium & alios. Is si perpenderet Errores, qui in per- niciem humani generis cedunt; detegendos potius, magisque utilitari viventium, quàm famæ defun- ctorum consulendum & propiciendum esse, facili mihi condonabit.

Cap. 13. De curatione methodicâ ichoris, seu hydropsis articularum, & primò de victus ra- tione, quæ prima est intentio.

Cum varia atque diversa symptomata, & quidem gravissima Ichorem & Meliceriam comitentur, quemadmodum in præcedentibus obiter quoque monui, & posthac capite 16. fusius dicam, necesse est, ut Medicus aut Chirurgus rationalis summam adhi- beat diligentiam in curatione, eamque sic instituat, ut omnia ex arte expurgare possit. In primis autem sciat ichor, totum negotium curationis Melicerie in hoc consistere, ut dolor sedetur. Est enim necipia & principalis causa omnium reliquorum symptomatum, quemadmodum sepius dictum fuit. Sic itaque insti- tuenda est curatio. Primò præscribenda est victus ra- tio. 1. Propiciendum, ut humor peccans concoquat- & expurgetur. 2. Ut topica convenientia appli- centur. 3. Ut symptomata corrigantur: de his or- dine & succinè dicam.

Circa victus rationem considerandum est subje- ctum, hoc est agri constitutio, si enim fuerit juvenis & optimo corporis habitu præditus, atque robustus, et otiosusque gravis, & symptomata periculosa, v. c. ut, docente Hippocrate lib. 2. aphor. 7. tenuis & exqui- situs convenit. Sin fuerit senex & imbecillus, aliquo modo plenior esse convenit victus ratio, ut vires firmæ & humidum radicale, quod facillimè doloris vehementia absumitur, conservari possit, sit præ terra frigidus & humidus: talis enim febricitantibus, uti sunt, qui ichore aut Meliceria laborant, convenit, ut testatur Hippocrates, talis præterea victus ratio acrimo- riam humorum ad partem ipsam fluentium ob- tundit, eosque manifestationes efficit. Aer sit temperatus ad calorem vergens, frigidus verò diligen- ter vitandus, frigidum enim cum nervi sit inimicum, facillimè exacerbat dolor, si vulnus aut frigidum exposuerit aut in loco aliquo frigido delectum & curatum fuerit. Quapropter aëre exiliente frigido, interim dum vulnus cura, satiatione prunis tepetum, à ministerio à regione vulneris,

vulneris, aut supra illud ipsum tenendum jubeo. In vulneribus capitis, præcipue ubi cerebrum detectum est, idem facio. Hoc modo enim aer corrigitur, Frigus præterea digestionem vulnerum, in Melicera tantopere necessarium, retardat atque impedit. Aer præterea intense calidus fugiendus est, Aëris enim ambientis nos aeris, calorem nativum corpora nostri evocat dissipare. Hepar quoque & massam sanguinis, ipsosque spiritus incendit. Hinc humores, qui ad partem læsam fluunt, omnesque lymphomata graviora reddunt. Quapropter cubiculum ægri aqua frigida sæpius alpergendum, & herbis frigidijs, veluti folijs querculinis, salicis, rosis, & similibus, iterandum est.

Cibus sit subtilis & concoctus facilis, pane ex optimo tritico bene fermentato & probe cocto, non calido, neque nimis duro & sicco utatur. Facile concoquitur caro castratorum, agnina, gallinarum, caponum, perdicum, tudorum, columbarum, avium in arboribus degentium, item ova recentia, aliisque quem plurima edulia, quæ ex prædictis caribus & ovis cum butyro parantur. Cum carne coquantur lachina, potulaca, acetosa, cichodium, endivia, & similia, quæ vim huncidandi & nutriendi habent. Ex prædictis quoque herbis, cum aqua parumque butyro & sale parata julsula, summo opere conveniunt, uti quoque ea, quæ ex avena & hordeo decoctæ sunt. Ab eis, quæ difficultat concoquantur, abstinere æger, sunt illa, veluti caro bubula, porcina, fœtina, & in genere quicquid sale conditum & summo exsiccatum est, sive caro aut pisces fuerint. Legumina, veluti lentes, fabæ, pisæ, & phascoli, quia difficultat digeruntur, ventriculum gravant, & obstructions viscerum patiunt, fugienda sunt. Brodio tamen, in quo lentes & pisces coxerint, quia abstergit, urinam docet & obstructions viscerum tollit, uti poterit æger. Usus piscium rarus sit atque paucus. Eligendi sunt laxatiles & mediciores, veluti trutta, lucii parvi, petenæ, & hujusmodi. Cætes quoque quibus dissilile concoquuntur, & ventriculum gravant, fugiendus, uti quoque fructus horæli (cibus enim putrescunt & in bilem convertuntur) acetaria & similia. Ab omnibus, quæ insigniter excalescunt viscera, sanguinem comburant, & humorem biliosum augent, abstinere æger, sunt illa veluti aromata, in primis pipet, Zinziber, gastrophilli, cardamomum, allium, sinapi, raphanus, cepæ, salsa omnia, & fumo exsiccata, atque hujus generis alia; Cinnamonum tamen, croco, nucibus muscatis, & macce, uti poterit æger in cibis.

Quantum ad potum, necessesse est, ut interim dum morbus in suo vigore consistit, hoc est, dum ichor fluit, febris & dolor adeit, à vino planè abstinere æger. Vinum enim, præterquam quod natura sua nervis inimicum, etiam interna viscera excalescit, incendit, & dolores augeret, quapropter ab eo cavendum est, ut monet Galenus ubi phlegmons suspicio adeit. Loco itaque vini utatur æger Cerevisia simplicissima, lacte amygdalarum dulcium, aut sequenti decocto.

R. Florum & foliorum betonica

Agriemonia

Ferula an. p. ij. Ligustria mundæ & c.

issa ʒ. ss.

Mellis dissimulati ʒij.

Coquantur cum libris sex aquæ ad consumptionem tertie partis. Decoctum adhuc fervidum in poculum stanneum affundatur, & addatur Cinnamonum minimum contriti ʒ. ss. quæ diligenter cooperato de recto poculo relinquantur, donec per se refrigeratum fuerit. De hoc decocto bibat æger ad libitum.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

tum, & quidem dum dolor est ingens & magnus per se, præcipue si fuerit juvenis, sene vero quamprimum febris, dolores, inflammationesque temiserint, & vulnus ad optimam digestionem pervenerit, aliquid vini admiscere poterant. Sitis vero, si ingens & maxima fuerit, ad ea, quæ magis refrigerant, & fervorem humoris biliosi effluant, transeundum est, de quibus postea capite 16.

Potè quom morbus in suo vigore consistit, maximique dolores adsint, vigilem prospiciendum est, ne nimis graveretur corpus cibis, ubi enim morbus peracutus est, statim eum habere labores, & extremè tenuissimo victu utendum est, inquit Hippocrates lib. 1. aphor. 7. *Melius enim est, addit Galenus in commentario, naturam permittere vacare circa curam colligendam, quam distrabere ipsum ad cibum recentem assumptum comburendam.* Nutritæ itaque æger, quamvis dolores fuerint acerbissimi, tantum julsulis ex prædictis herbis paratis, cremore hordei, & avenæ decoctis, panatellis, & eis, quæ facili concoquantur. Si æger juvenis, robustus, & nondum à morbo absumptus fuerit, impetetur ipsi inedia, juxta illud Hippoc. *extremis morbis extrema convertunt remedia.* Sin contrario modo omnia se habuerint, paulò plenior ut sit vitæ ratio, necesse est, quoniam vires conservari possint.

Passiones præterea animi sunt fugiende, præcipue ira. In ira enim sanguis & spiritus in ipsis visceribus excalescit, veluti cum impetu ad externas partes, & præcipue ad membrum læsum effunduntur. Humores præterea in ira & excalescentia acres & fluidiores efficiuntur; quapropter cum impetu ad vulnus ruunt, dolores reliquaque lymphomata omnia augent. De his poterit lector videre observationes singulares in Ceonulis nostris. Diligenter quoque prospicere convenit, ne alvus quotidie lemel lax fungatur officio. Ex regentis enim excrementis symptomata omnia ingravescunt, ut capite 19. fusius dicemus. Hac de prima intentione, victus videlicet ratione.

Cap. 14. Quomodo in Ichore corpus à prævis humoribus sit expurgandum, quæ altera est intentio.

Quia propter doloris vehementiam humores ad partem affectam trahuntur conflantque, necesse est, eos per alias vias educere, & à vulnerato membro avertere. Fiet id quamprimum & statim ab initio, quum Chirurgus ad egrum convocatus fuerit, & quidem antequam vires à doloris vehementia prosternerent, nervique & ligamenta pustillagie contaminata fuerint. Evacuatur autem humores noxi per pharmaca laxativa, per venæ sectionem, cucutibulas, Menfes, hæmorrhoides, & sudorem, de quibus ordine. Ex primò de purgatione, prius tamen preparato & concocto humore peccante; Concocta enim medicanda atque movenda sunt, non cruda, ut docet Hippoc. Ante omnia autem alvus si constipata fuerit, movenda est, fiet id suppositoriis, aut clystere. Si æger ab alio clystere alienus fuerit, dentur ipsi pruna laxativa, aut sequens minoratum.

R. Rhabarbari electi ʒj.

Fol. Sennæ ʒj. i.

Flor. Tartari

Sem. Anisi ʒ. ss.

Infundantur in aqua Cinnamonum sine vino distillata, & aqua Cichorii ana q. c. Colatura fortiter co-

R.

præ-

preſſe adde ſyrupi roſari ſolutivi ſimplicis ꝑj. Milce, fiat potio. Sic purgatis primis viis præparetur humane peccans ſequenti ſpōnematæ.

R. Rad. Cichorii,

Polypodii

Lapathi aceti

Corticis interiorum

Rad. *Frangula*

Alſapari an. ꝑj.

Fol. & Flor. *Brunica*

Primula Veris,

Scabiosa

Agrimonia

Veronica

Acroſa, an. Mj.

Trium florum cordialium &

Geniſta Hiſp. an. p. i.

Sem. *Aniſi & ſemenuli an. ꝑj.*

Liquiritia mundata

Uvarum paſſularum exacinatorum an. ꝑj.

Coquantur in l. q. aquæ ad conſumpſionem tertie partis. De hoc apozemate accipiet æger ſemel aut bis in die ad uncias tres, quibus admisce unciam ſyrupi de ſucco acetofæ, ciceronum, granatorum, aut berberorum. Vel detur ſequens Julepus.

R. Aq. Cichorii

Acroſa

Endriva

Primula virens

Iva arthetica an. ꝑj.

Syrupi de ſucco ciceronum & acetofæ ana ꝑj.

Syrupi de ſucco berberorum ꝑj.

Alſice, fiat Julepium pro tribus doſib.

Sic præparetis humores

Acæpe de prædicto apozemate ꝑij.

Foliorum ſennæ ꝑj.

Seminis aniſi ꝑj.

Coquantur ut colatura redeat ad uncias duas, in quibus infunde:

Rhabarbari eleſti ꝑj.

Cinnamon ſpini &

Florum tartari an. ꝑj.

Mancant in Infuſione per noctem, & quidem in loco tepido, facta expreſſione fortiffima admiſce elect. de ſucco roſarum ꝑj.

Syrupi de Cichorio cum rhabarb. ꝑj.

Milce, hæc potio, deur in aurora cum caſtodia. Aut detur in forma boli, ſequenti modo.

R. Pulveris de hermodactylis

Pulv. ſennæ Braſavali an. ꝑj.

Electuarii de ſucco roſarum ꝑj. l. cum ſuff. q.

Syr. de Cichorio cum Rhabarb. fiat bolus, involvendus ſaccharo. Solus quoque pulvis de hermodactylis miſcitur conſect in Meliceria affectibusque articularum, ſive cum ſyrupo de Cichorio aut roſarum in forma boli, ſive cum liquore aliquo convenienti exhibitus. Ego ſequenti modo ipſam præparete ſoleo.

R. *Hermodactylorum*

Turbiſ ana ꝑj.

Diagridii & ſorum tartari

Foliorum ſennæ mundat. an. ꝑj.

Zinziberris

Cinnamon

Adſolis an. ꝑj.

Sacchari ꝑj.

Milceantur ſicque l. a. pulvis tenuiffimus, cojas doſis eſt ad ꝑj. ad ꝑj. & l.

Sic purgato corpore reſeretur apozema per dies aliquot; iterumque expurgetur corpus, ſi opus

ſuerit. Frequenter æorem propter ingentes dolores, quibus corpus ægri & præiens æque ſummum periculum, quo animus exortetur, etiam ſava bellis in ætatem convertitur. Hanc ob cauſam que humorem atrobilium reſpiciunt, præſcriptis admiscere convenit; ſunt illa veluti fumarla, Tamarificus, ſcolopendrium, lingua cervina, herba capillares, cortic. capparorum, ſummiſſes lapuli, culcuta, epithymum, Syrupus de humaria, de polypodio, ſyr. de pomis, capilli veneris, de bizanſis, conſ. Hamachi, Electuar. diacatholici, pilul. item de fumarla, de lapide laſuli, aggregativarum, de hermodactylis, Extractum quoque Eſule arboſcentis, Ellebori nigri, & hujusmodi inſitiis alia conveniunt.

Phlebotomia & cucubitalæ hîmânumque applicatio conducibilis, cum ad trullionem & derivationem, cum ad humoris peccantis evacuationem, præſcriptis ſi affluſus ſanguinis ad articulum vulneratum magnus fuerit. Venæ ſectiōnem enim, ut docent celeberrimi Medici, præſcribimus, ut morborum incrementum impediāmus, inflammationes vitemus, meam ſperiamus, tranſpirationem liberam reddāmus, peccantem materiam minuiamus, corpusque refrigeremus. Illa autem vena ſecanda eſt, ut Galenus docet, que ab ipſa affecta particula ſanguinem celeſtiet avertat, inprimis ſi præter affectum externum interna inflammation quoque adfuerit. Rectitudo autem fibrarum in venæ ſectiōne obſervanda; quapropter ſi affectus in brachio aut manu fuerit, vena in poplite, aut pede, ejuſdem lateris, ſecanda eſt, ſi pes aut genu vulneratum, venam in cubito ſecemas; ſanguis autem ſecundum magnitudinem morbi & vitium tolerantiam extrahendus eſt, ubi necesse, ut Chirurgus Medicus aliquis erudit conſilio utatur. Uel etiam in reliquis, que ad internas medicationes ſpectant. Cum enim graviffimus ſit affectus, temerarius eſſet Chirurgus libimetipſi adeo ſidere, ut Medici conſilia ſpernentur. Plura de venæ ſectiōne, hic quoque ſcitæ neceſſaria, videat lætor in tractatu noſtro de Gangrana, poſtrema editione in quarto.

Uſus cucubitalium quoque in hoc affectu minimè ſpernendus eſt. Si enim humor peccans ad partem aliquam cum impetu ſiut, cucubitalis ad aliam partem commodè trahitur. De menſibus atque humoribus diſbus idem intelligendum eſt, ubi enim hujusmodi purgationes naturales ſupprimuntur, vulnera ſimul & ulcera externarum partium conſumaciſſima efficiuntur; quemadmodum ego ſepiffimè in peſſi expreſſus ſum, imò & quandoque inſanabilia evadunt. Sunt hæque, ſi fieri poteſt, provocandæ hujusmodi purgationes ſoppreſſe. Per ſudores & frictiones quoque etiamſi evacuantur humores ſuperflui, in Meliceria tamen non temerè ſunt provocandi. Cum enim id fieri nequeat, niſi excalefactis vilceribus, ſimul ac maſſa ſanguinea incenditur actiōne ſic humor biliſus, omniſque ſymptomata adaugentur. Quapropter in vigore morbi eos nunquam provocare auſus ſui, in ſue verò ſi ſymptoma aliquod remanſerit, in quo ſudor profuſus eſſe poſſet, audacter provocandus eſt, de quibus poſthac.

Cap. 15. De topicis medicamentis in Ichore adhibendis, tanquam tertia intentione.

Etiāſi curationem Melicerie, diverſis capitibus comprehenſi fuerimus, non propterea tamen mens eſt, præſcribere unum poſt alterum adhibere, hoc modo enim curatio in longum

tempus protrahatur, & occasio, quæ præceptis est, amittetur, uno itaque tempore præcipua præsidia simul præscribenda sunt, ut periculum quod ex mora provenire posset evitemus. Quapropter cum primum Chirurgus ad ægrum Melicetia laborantem vocatus fuerit, eodem tempore dum victus rationem præstabit, de reliquis quoque præsidis administrandis, sollicitus ut sit, necesse est, ideoque ut humorem peccantem concoquat, evacuet & ad alias partes tam per pharmaca, quam etiam per, venæ sectionem & cucurbitulas trahit: ita quoque in topicorum medicamentorum applicatione oñi prætermittit.

In uso autem horum medicamentorum hæc præcipua sunt observanda, 1. ut medicamenta, quæ vulnere ipsique parti affeclæ (quandiu dolor infestat) applicentur, omnia sint sordida & dolorem sedantia. Dolor enim cum præcipuum & principale sit symptoma, ipsius sedandus est. 2. ut intemperiem partis affeclæ corrigamus. 3. ut materiam ad partem læsam cum impetu fluentem, tepellamus. 4. ut coagulatum evacuemus, & ulcus mondificemus. 5. ut id caroe adimpleamus, tandemque cicatrice obducamus. De quibus omnibus hoc capite breviter disseremus. Et primo de anodynis. Cum primum itaque ad ægrum hoc symptomate laborantem vocatus fuerit Chirurgus, vulnere sequens unguentum filamentis tepide imponet.

R. Cera nova

Colophonia ana ʒi.

Gummi Elemi.

Terebinthina Veneta ana ʒiij.

Ol. lumbriarum

Amygdalarum dulcium

Ol. de vitellis ovorum,

Rosarum ana ʒvi.

Misceantur lentissimo igne in farragine, & per pannum percolentur, postea admisce pulv. lumbriarum terrestrium tenuissimi ʒij. Croci ʒi. Misceantur, & tertioque unguentum in vase vitreato. Ad uncias duas huius unguenti admisce vitellum unius ovi, & magis fiet autodynum. Deinde Emplastro basilicone tege vulnus, totum verò membro malè affeclæ sequens cataplasma anodynum applica.

R. Farina hordei

Farinam ana ʒiij.

Pulv. florum chamamilla, betonica, Iva arithetica.

Meliloti

Rosarum ana. ʒ. ʒ.

Croci ʒ. ʒ.

Coquantur cum lacte recens emulso ad formam cataplasmatis, tum admisce

Vitellus ovorum numero duos

Ol. rosarum

Buxi recens an. ʒi. ʒ. ʒ. Misce & applica calide.

R. Mica panis albi ʒvi.

Pulveris florum betonica

Rosarum

Iva arithetica an. ʒiij.

Pulv. fenigraci

Seminis cydoniarum, anethi,

Et Meliloti an. ʒiij.

Pulveris lumbriarum exsiccatum ʒ. ʒ.

Croci ʒi.

Buxi recens & al. lumbriarum

Ol. rosarum ʒi.

Cum aqua vaccino aut caprino recens emulso, fiat cataplasma, addendo vitellos ovorum numero duos, applicetur calide. In maximis & ingentibus

Bibl. Chirurg. Tom. II.

doloribus Ichoria & Melicetia sequenti sacculo alio, quando cum fructu usus sum.

R. Radicum althea

malva an. ʒi.

Foliorum althea

Florum chamamilla

Meliloti

Sambuci

Hypericidis

Iva arithetica

Rosarum rubrarum

Lumbriarum recensium an. Mj.

Foliorum malva M. ʒ.

Seminis anethi ʒi.

Lini &

Fenigraci an. ʒ. ʒ.

Incidentur & contundantur omnia grosso modo; pro sacculis ejus magnitudinis, ut totam partem affeclam cooperire queant. Coquantur in aqua, vel, si dolor ingens fuerit, in lacte vaccino, applicentur calide, & incrementor quodcumque accessit esse videbitur. Ante applicationem autem cataplasma aut sacculi, totum membrum oleo lumbriarum & rosarum inungendum est. Aut

R. Ol. rosarum ʒi.

Ol. lumbriarum

Amygdalarum dulcium

De vitellis ovorum

Pinguinis humana an. ʒ. ʒ.

Misce fiat linimentum, quo tepide inungatur pars affeclæ. Quod si inflammatio aliqua ingens partem affeclam infestaverit, olea & pinguia non temere sunt applicanda, inflammatoribus enim sunt adversissima easque adaugent, herpes & exulcerationes excitant, ut testatur Galenus de simplic. Medicamentorum facultatibus lib. 2. cap. 21.

Ad intemperiem itaque calidam corrigendam primum tet universalis sequens applica cataplasma.

R. Farina hordei ʒiij.

Pulveris florum & foliorum betonica

Rosarum rubrarum

Myrrillorum

Balanstriorum an. ʒiij.

Cum decocto betonicæ, Iva aritheticæ & rosarum fiat cataplasma, addendo sub finem vitellos ovorum numero duos, applicetur calide, aut præparatur cataplasma ex mica panis hoc modo:

R. Mica panis albi lb. ʒ.

Pulveris rosarum

Myrrillorum

Balanstriorum an. ʒiij.

Seminis cydoniarum

Fenigraci

Anethi &

Meliloti an. ʒiij.

Pulv. lumbriarum exsiccatum ʒ. ʒ.

Croci ʒi.

Cum aqua betonicæ & lactis, vel harum herbarum decocto, fiat cataplasma, applicetur calide. Si adfuerit herpes miliaris, vel exillimè sit in maximis inflammatoribus, & post intemperitiam osium olei, & pinguinum, poterunt pustule longè unguento albo Rafis cum camphora. Aut

R. Seminis cydoniarum subtilissime pulverisati

ii. ʒi. ʒ.

Aqua rosarum

Plantaginis an. ʒiij.

Aqua betonica ʒiij.

Cera cervi nbi & præparati

Cassa lina

R. ʒ.

Capitis

Lapis calaminaris an. ʒij.

Miscet, fiat unguentum, quod linteis eo intinctis pulsibus calide applicetur, & reiteretur ter aut quater in die, ne escicatis pannis præter modum incallescant & majorem copiam humorum ad se trahant. Interim medicamenta, quæ ipsi vulnere imponuntur: quæque superius à nobis præscripta fuere, uilè unguentum ex cæra, colophonia, gummi Elemi &c. Item emplastrum Basiliconis, mutanda non sunt, usque dum dolor omnino remiserit, & vulnus quàm optimè digestum fuerit, sed de his posthac prolusius.

Tertio in usu topicorum observandum est, ut materiam, quæ ex corpore ad partem læsam fluit, aut potius doloris vehementia trahitur, in aliam partem repellamus. A patiente autem loco, inquit Galenus in arte medicinali cap. 19. abstringendo atque refrigerando humores affluentes repellimus. Repellentia autem sunt vel frigida & humida, vel frigida & sicca; frigida & humida aquæ substantiæ sunt succi, & aquæ destillatæ, veluti

Latices, succus granatorum

Portulacæ

Sempervivi

Seleni

Plantaginis

Rosarum

Equiseti

Acetum, aqua frigida simplex

Albumen ovi, & infusa alia.

Frigida verò & sicca tætax substantiæ sunt, veluti

Terra sigillata

Bolis armenis

Sanguis draconis

Balaustria

Noces cupressi

Cornices granatorum

Rad. Bistortæ

Termentilla

Talia

Albumen, & similia. Ex quibus varia ac diversa componuntur medicamenta, hodie à prædictis Defensivæ appellata.

Non autem ipsi vulnere applicanda sunt repellentia, aut defensiva, sed regioni supraposita ulceri, testatur id quoque Galenus de compos. medic. secundum genera lib. 2. Ulceribus enim sunt ioinicissima primò quia frigida, quandoquidem ulceribus frigidas mordax, & dolorem tacit, inquit Hippocrates. Frigus præterea condensat contrahitque cutem, quæ in melicaria emollienda atque relaxanda est. Quapropter si vulnus in pede fuerit, totum pedem quidem & tibiam oleo rosaceo & humbitionum inunges, defensivum verò ad popitem applicabis. Sin genu vulneratum, ad inguen usque crur prædictis oleis inungendum, sed defensivum in medio fere inter genu & coxam applicandum. Idem etiam de digitis, carpo, cubito, & humero intelligendum est. Applicetur itaque sequens defensivum.

R. Bolis Armeni ʒiij.

Terra sigillata ʒij.

Cornu cervi nati, &

Rosæ eboris an. ʒij.

Capivæ ʒij.

Cera ʒiij.

Ol. Rosæ ʒij.

Aceti ʒij.

Aq. Rosæ ʒij.

Album ovorum numero 2.

Miscet, fiat unguentum, quod diu servari potest.

Ego sequenti sequenter utor, paratissimum est, & minoris pretii, efficax tamen.

R. Farina hordei ʒiij.

Bolis Armeni albi ʒij.

Cornicum granatorum

Pulv. Rosarum

Balaustiarum

Rad. Bistortæ an. ʒij.

Cum polca fiat defensivum in forma cataplasmatum, applicetur repide. In castis si prædicta medicamenta in promptu non fuerint, Expasias succus temperivi, portulacæ, plantaginis, soliorum salicis quæci, lactucæ, & similia, aut eorum decocto summo potest conveniunt, si parum aceti, & albumen ovi alimixtum fuerit. Linteam autem seduplicatum prædictis succis nringatur, & repide applicetur. Si affluxus humorum maximus, æger juvenis & robustus, quintetiam corpus probè expurgatum fuerit, in decocto prædictarum herbarum, vel eorum succo aut aqua destillata & aceto, fasciam intingere, & membrum ad truncum corporis ferè involvere solet. Hoc enim modo affluxus humorum quàm maximè impeditur. Vulnus tamen ipsaque pars affecta unguentis, emplastris, cataplasmate diligenter munienda atque involvenda est, ne humiditas tætax vulnus, aut ipsius circumferentiam attingat. Accursum enim omniaque frigida hujusmodi vulneribus adversissima esse, antea ostensum fuit. Interim autem dum circa repellentia occupatus sumus, corpus, etiam si ab initio expurgatum fuerit, alvus tamen ut quotidie respondeat, necesse est. Virum præterea diligenter habenda est ratio: Si enim imbecillis, senex aut decrepitus fuerit æger, in usu repellentium prospiciendum est, ne modus excedatur, neve calor nativus intempèrivo usu refrigerantium ita labefactetur, ut ex vulnere sequatur ulcus malignum & incurabile. Quapropter prædictis, calida nonnunquam, præcipue si humor, qui affluit, ex parte pituitosus fuerit, addamus hoc modo.

R. Farina hordei

Lapinum an. ʒij.

Pulv. rosarum rubearum.

Absinthii

Sordii an. ʒij.

Radicum torment. &

Bistortæ an. ʒj.

Salis marini ʒj. cum decocto betonicæ; lavare, patemque aceti, fiat cataplasma. Cum primum autem affluxus humorum remiserit, ab usu repellentium desistendum est. quo calor nativus liberè affluere, digestionemque ulceris ac curationem promovere possit.

Quarto in usu medicamentorum localium observandum est, ut omnia eo dirigantur, quo materia præter naturam post usum repellentium in ipsa parte affecta relicta, collecta, & impacta, evacuati possit. Id. quoque duobus efficitur modis. Primò medicamentis vulnere impositis, quæ non tantum mundificant, verum etiam proprietate quadam specifica, materiam circa asculum partemque nervosam collectam, attrahunt, & sensibiliter, ut vocant Medici, evacuant. At secundò, quæ materiam circa vulnus impactam resolvunt, in hanc convertunt, & insensibiliter per poros evacuant. De illis primò, de reliquis postea. Hæc tamen simul eodemque tempore applicantur remedia. Illa videlicet vulnere imponuntur, hæc verò toti membro malè affecto applicantur, sive id in forma cataplasmatum, sive foveæ &c. fuerit. Diligentem tamen prospicere convenit, ne præpositè, sed deceptè & opportune id fiat. Quapropter in memoriam

moriam revocanda sunt ea, quæ capite R. monuimus, videlicet vulnera non minus ac morbi interni, sua quoque habere tempora, principium nimirum, augmentum, Stasim & declinationem. Circa finem lesque Stasim abstergentia de mundificanti sunt admovenda, hoc est, non amplius affluentes humores, sedatæ item dolore & quàm exquiritissimè digestæ vulnere, reliquique remissis symptomatibus pravis, febre nimirum, vigiliis, inquietudinibus, nausea & similibus, antea commemoratis. Abstergentia autem & mundificantia sunt calida, & plerumque amara & nonnulli acris, quapropter in vulneribus ac ulceribus surdes potenter ad se trahunt, expurgantque.

Ne tamen dolores excitent, semper aliquid quod dolorem lenit, uti est crocus, Ol. de vitellis ovorum, & hujusmodi addendum est. Johannes de Vigo, Chirurgus longè celeberrimus, sequens mundificativum præscribit in vulneribus capitis, quo etiam in vulneribus articularum maximo cum fructu utitur.

R. *Terebinthina clara* ℥ij.

Mellis rosati

Succi Apii ℥b.

Brillant simul parum. Deinde additur vitellum unius ovi, farior hordei bene cribellatæ ℥b. croci parum. Et si in prædicta formula, inquit Vigo, addatur Mithæ ℥ij. & tantundem Alos hepaticæ, parumque saccolæ, esset hujusmodi vulneris optimum incarnativum. Legendum autem esse existimo, drachmæ dæ Mithæ, & tantum sem Alos, non uncie, alioquin Mithæ, & Alos pondus reliquorum omnium excederent, nec sufficerent terebinthina & mel Rosatum, ut medicamentum consistentiam acquireret requisitam. Si præter modum sordidum fuerit ulcus, ex usu esse poterit mundificativum nostrum de succo Apii, cujus sequens est præparatio.

R. *Succi Apii*

Scardis

Arnica majoris

Ruta an. ℥ij.

Mellis rosati lb. j.

Coquantur ad consistentiam Symplicis, tum admisce farinæ lupinorum

Puls. radic. Aristoloch. rotunda

Angelica

Pincenexi

Theriacis an. ℥b.

Aqua rosæ ℥j.

Misce, fiat unguentum, quod servetur in vase vitreo. Applicetur per se, vel Unguento anodyno, ab initio hujus capitis descripto, mixtum.

Pulvis præparatus, diligenter præparatus & rectificatus præstantissimum esse Medicamentum in vulneribus Articularum, sæpius expertus sum, non solum enim mundificat, verum etiam materiam viscosam & circa partes nervosas collectam, specifica quadam facultate ex profundo ad præcavendum dolorem ex se trahit, elementa tamen de sine dolore. Materiam præterea leborosam & tubilem inspissat, tandemque cætem laudabilem procreat, & ita quidem ut frequenter eo ad finem usque curationis usus fuerim. Non autem ab initio inspergendus est pulvis, sed circa finem status morbi, quemadmodum de reliquis mundificativis paulo ante quoque monui. Præter autem pulvis ille aut per se inspergi, aut aliis medicamentis permisceri hunc in modum.

R. Unguenti ex cæta, colophonæ, gummi Elemi, &c. ab initio hujus capitis descripti, unciam 1. pulveris præparati ℥b. Misce & ulcers filamenti impone.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Atque hæc de his, quæ materiam circa articulum collectam sensibilibiter evacuant, sequitur nunc de reliquis.

Interim autem dum hujusmodi mundificativa & viscosa materiam ex profundo attrahentis ulceri imponantur, Cataplasmata quoque & sacculi, qui dolores leniunt, nervos roborant, materiamque circa partes nervosas collectam resolvunt, applicare licet. Ubi sequens cataplasma convenit.

R. *Farina fabarum*

Lentium an. ℥ij.

Pul. rosarum

Camomilla

Alyssum

Baccarum lauri

Foliorum & florum salvia

Primula veris

Iva arctica

Sem. Anisi an. ℥ij.

Pul. lumbicorum ℥j.

Fini caprini pulverisati ℥ij.

Cum decocto betonice, Iva Arctica & florum Camomille q. l. fiat Cataplasma, sub finem adde olei rosati & lumbicorum an. ℥j. applicetur calidè. Ani fiat sequens sacculus.

R. *Fol. & flor. betonica*

Salvia

Rosmarini

Iva Arctica

Primula veris

Origani

Hyperici an. M. ss.

Flor. Camomilla

Astelin

Sambuci an. M. j.

Sem. Anisi

Fenicali

Carvi an. ℥j.

Incidantur & contendantur omnia grosso modo pro sacculis ejus magnitudinis, ut partem affectam cooperte possint. Coquantur in aqua fontis & applicentur calidè, prius tamen tecto vulnere emplastro aliquo appositio, veluti est emplastrum de Rana sine Mercurio, aut Emplastrum Diapalmi, vel (quo ego utor) Emplastrum Storani, cujus descriptionem postea adscribam.

Antequam autem Cataplasma aut sacculus applicetur, torum membrum malè affectum inungendum est oleis, quæ nervos corroborant & materiam impactam resolvunt, qualia sunt ol. & succus lumbicorum, ol. vulpini, ol. betonice, de Rana, ol. ex floribus Storani, & hujusmodi. Si durities aliqua insignis circa nervos adhaerit, addatur pinguedo humana, caponis, Ursi, felis, vulgæ, de alchæ, ol. liliorum alborum, ol. amygdalarum dulcium, & similia, de quibus sequenti capite fusi.

Sic satis mundificato ulcere carne implendum, & cicatrice obducendum est. Est autem generatio carnis opus vite naturæ, Chirurgis tamen sua industria auctores, quæ naturam in suis actionibus impediunt retardantque, Sarcocicæ autem, inquit Galenus, detergendi vim, sed sine erosione possident. Prospiciendum tamen, ne eorum vis detergendi & secandi primum gradum excedat, alioquin excitaretur dolor, & de novo suboriretur affluxus humorum, & inflammatio. Ego, uti antea dixi, sæpius ad finem curationis pulvere præparato, diligenter præparato & rectificato, ad finem curationis usui fui, divitias enim facultates in se continere pulverem istum sæpius expertus sum, dum sordidum ulcus mundificat.

dicat primò, deinde quoque carne implet. Unguento quoque anodyno, ab initio hujus capitis descripto, frequenter ofque ad finem curatiois usus sum, aut per se, aut paucò pulvere præcipitato admixto. Nonnongquam quoque ad unciam unam prædicti unguenti, myrrhæ & sarcocollæ an. ʒj. admisceo, & addo vitellum ovi, etque sarcoricum optimum; egregiè quoque hujusmodi ulcera, ex melicæria relicta incarnant, plenissimeque consolidant balsama, tum naturalia tum etiam artificialia, de quibus superius capite octavo satis dictum fuit. Plura qui videre voluerit, legat Galenum, Aëtium, Guidonem, Vigonem, Hulletium & alios. Ego enim nihil præter ea quibus cum successu usus fui, hic in medium profertè constitui.

Cicatricem generat natura per se, nisi hominibus ulceris obfecit. Tollant itaque eis, quæ insigniter effricant, sine modicatione tamen. Hujusmodi sunt Alumenustum per se, aut cerussa lota, calx decies lota, lapis calaminaris, litargyrium, plumbumustum, cornu cervi ostium, totia, corallia præparatis, & similibus mixtum, & ulceri inspersum. Inter unguenta convenientia uog. album Rhalis, camphoratum, unguentum pompholigos, unguentum de minio, unguentum de cerussa coctum, & diapalma; sequens quoque aqua insigniter exliccat, & cicatricem inducit, præcipuè si interperies aliqua calida pattem læsam occupaverit.

R. Aq. Plantaginis

Rosarum

Cauda equina an. ʒij.

Taila præparata, calicis decies lota

Cornu cervi ass. & præparati

Lapidis calcisariæ an. ʒi.

Misceantur in mortariò & lineis reduplicatis, & in ea madefactis applicetur tepidè.

Qui in castis, medicamentis destituti, degant, sequenti decocto uti possunt.

R. Fol. & Rad. Plantaginis,

Fol. Salicis, Quercus

Pruni silvestris

Cauda equina an. Mj.

Incendantur in minutissimas partes, & cum libij. aquæ coquantur ad consumptionem tertie partis, applicetur tepidè lineis eo madefactis.

Cap. 16. De symptomatibus Ichoris & Melicæria corrigendis, & primò de Febri.

Melicæria cum affectus sit adeò gravis, ut plerumque symptomata plus negotii faciant Medico, quam morbus ipse, opetæ pretium esse duxi, si de eorum curatione in gratiam tyrannum & præcipuè eorum, qui in locis à Medicis temeris vivunt, aliquid hic commemorarem. Inter symptomata autem nonnulla sunt acuta, reliqua minus acuta & veluti Chronica, & morbum ipsum comitantur, subsequuntur. Comitantur morbum dolor ingens, inflammationis, febris, vigilia, lipothymia, conspissatio alvi, aut ipsius relaxatio immodica, ardor urinae, & caecochymia. Externa sunt, veluti fungus ex laeso articulo erumpens, atrophia totius corporis, vel partis læsæ, retractio nervorum, ulcera fonsida, vel etiam cum carne ossi, labefactatio & imbecillitas partis affectæ, de quibus omnibus ordine & succinctè dicam, & primò de febre, dolor enim quomodo sedandus & inflammationes compescendæ sunt, capite undecimo & decimo quinto ostendit fuit. Accidit febris præcipuè propter vehementiam atque diuturnitatem doloris, propter vigilias item, & quæ paulatim spiritus & humores circa cutem inscalescunt, intemperiemque calidam & pectusmarascalem in universo corpore, mediantibus arteriis & venis, excitant. Ex his faciliè videtè est, quomodo febris sit occutendū, nimirum si causa ipsius collatur & dolor sedetur. Sed ut decenti ordine fiat omnia, videtur illa ratio capite 13. præscripta, exactè observanda est, corpus quo etiam à prævis humoribus expurgandum, & si plethoræ adfectus, venam secare licet, de quibus quia capite 14. satis superque dictum fuit, ne adum agam, nihil hic addam. A vino, uti in præcedentibus sæpius monuimus, abstinere aget, & bibat pro potu ordinario lac amygdalarum, aut decoctum Agrimoniae & Vetonice, Saccharo & Cinamomo atomatizato, sequenti quoque Julepio ardor febrilis arceatur:

R. Aqua boraginis
Baglissa
Asterosa ana ʒij.
Syrapi de sacco Citronum, &
Granatorum ana ʒj.
Misceantur pro duabus dosibus, addendo spirit. Vitrioli guttul. duodecim; in castis loco prædictarum aquarum.

Acipe Agrimonia

Veronica

Asterosa an. Mj.

Floram boraginis &

Granatorum ana ʒj.

Baglissa, si haberi poterunt, ana p. j.

Mellis ʒj.

Coquantur in libris VI. aquæ ad consumptionem tertie partis. Colaturæ adde succi berberorum ad saporis aciditatem. De hac Julapio sumat æger bis terve in die. Quod si tussis aut angustia pectoris adfuerint, acidis abstinentiendum est, præcipuè à spiritu vitrioli, bibat itaque lac amygdalarum, aut sequens decoctum.

R. Agrimonia

Veronica ana M℞.

Flor. scabiosa &

Tussilaginis ana p. j.

Liquiritia ʒijij.

Mellis dissoluti ʒj.

Coquantur in lib. 6. aquæ fontanæ ad consumptionem tertie partis. Colaturæ aromatizetur drachmis tribus Cinamomi coctus. Carpis applicetur sequens epithema.

R. Aqua baglissa

Borraginis. j

Mellissa

Rosarum ana ʒj.

Asteri resaci ʒij.

Specterum diatriæ fameli ʒj.

Capitur ʒj. Misse, & liorici reduplicatis & madefactis applica. In castis acipe baglissam, boraginem, pomalacem, laducam & hujusmodi herbas refrigerantes, ex quibus prius cum aceto coctus, succum extrahæ, & loco prædicti epithematis carpis applica.

Regio hepatis & renum coungenda est sequenti linimento.

R. Ol. Nymphaea,

Rosarum ana ʒj.

Cerati fundam ʒij.

Caplura dissol. in aceto rosar. ʒ℞.

Misce.

Cap. 17. De vigilis & capitis dolore.

Solent quoque ægri capitis dolore, & vigilis torqueri, propter maximum enim ætham febilem, vapores, qui ad caput ascendunt, membranas cerebri vellicant, dolores excitant, & somnum maximo ægri cum damno impediunt. Vigiliæ enim, ut testatur Hippocrates, si modum excesserint, malum. Quandoquidem intempestivæ vigiliæ concoctionem impediunt, cerebrum siccant, mentem & ingenium perturbant, & debilitant, nativum calorem humidumque radicalem consumunt, & nonnunquam morbos peracutos veluti, delirium, phrenesio, mortem quin etiam inducunt. Quapropter summo studio hoc laborandum est, ut causæ vigiliarum quantum tollantur. Ablata enim causa, tollitur etiam affectus, sunt autem illæ imprimis dolor, uti etiam ardor febilis & acrimonia vaporum. Dolor quomodo sedandus, & æstus febrilis arcendus, antea facis dictum fuit, sequitur nunc quomodo vapores benigniores & manifestiores reddantur, & deorlum trahantur. Hæc id tam internis quam externis præstidit. Internis veluti victas ratione & purgatione humoris peccantis, de quibus in præcedentibus. Vapores præterea benigniores reddunt & incassant, somnumque clementer provocant sequetia.

R. *Aqua lactuca*

Et perulacea ana ʒi.

Syrupi papaveris ʒi.

Syrupi de succo acetosæ ʒss.

Specierum Diamargar. frigidi ʒi.

Misce, fiat potio, detur per duas horas post Cenam. Aut

R. *Aqua Nymphae*

Cichoris ana ʒi.

Laudani grana tria

Conf. Alkermes ʒi.

Syrupi papaveris Erratici ʒss.

Misce, fiat poculum, detur ut dictum. Acrimoniam quoque humoris peccantis obendant & somnum concilient hæc amygdalatum & emulsiones ex seminibus frigidis addito item. papaveris albi. Item sequens Elevarium

R. *Conferua flor. Nymphae*

Buglossæ, Boraginis, violarum ana. ʒi.

Seminis papaveris albi

Perulacea ana. ʒss.

Diamargaritis frigidi ʒi.

Confell. Alkermes ana. ʒi.

Margar. preparatarum ʒi.

Misceantur & cum l. q. Syrupi de papavere, fiat f. a. Elevarium quo æger sæpe utatur ad cassaneæ magnitudinem, & superbibat de suo decocto ex agrimoniam & Veronica vel lacte amygdalatum. Ene-matibus præterea & suppositoriis vapores qui ad caput ascendunt, deorsum trahendi sunt, ubi sequens Clyster convenit.

R. *Florem Malva*

Beta

Lactuca

Helicines ana M. i.

Herdei mundati ʒi.

Sem. anethi ʒi.

Anisi

Feni grati ana ʒi.

Coquantur in l. q. aquæ ad consumptionem tertie partis in lb. i. colaturæ dissolve.

Elect. Diacatholici ʒi.

Viellus ætherum numero duos

Salis ʒi. Olei violarum ʒi.

Misce, & fiat Enema. In castris ubi Elect. Diacatholiconis in promptu non est, ægerius doses talis, loco quoque Ol. violarum butyrum terebinthi tuatur. Suppositoria fiant ex melle cocto cum sale aut sapone. Hæc de internis. Si iocentis illis præstidit dolor capitis & vigiliæ non remiserint, externa quoque sunt adhibenda, iocet que vena sectio, cucurbitula & sanguinæ numerantur. Quapropter si vires permiserint, & plethora adhaerit, secanda est vena, hæmorrhoides & menses si præter naturam suppressi iocent, provocandi. Scapulis & applicentur cucurbitulae primo siccæ, ut vocant, deinde etiam cum siccificatione. Ne id tamen fiat lo Lacónico præstidendum est. Ad divertendam materiam ad caput accedentem adhibent nonnulli frictions, sed male meo quidem iudicio. Sanguis enim & humores, ex frictionibus magis magisque incalcescunt, & aciores redduntur. His si dolor capitis non remiserit, iocungenda sunt tempora & frons, Oleo Rosaceo. Aut

R. *Unguenti populeonis*

Olei rosæ ana ʒss.

Opil. dissoluti in aceto gram. liij. Misce.

Cap. 18. De Lipothymia.

Accidit lipothymia sive deliquium animi in Ichore & Melicæria, propter doloris vehementiam acque diturnitatem: propter vigilas item & inquietudines. Hæc enim & spiritus vitales, humidumque innatum absumunt, facultatemque cordis prosterunt. Accidit & nonnunquam lipothymia propter vaporem aliquem malignum & putridum ex parte affecta per arterias ad cor ascendentem facultatemque vitalem labefactantem, vidi id in multis, præcipue iuvene quodam Bernensi, Filio Dn. Martini Kellier, cujus mæro facta hæc capite septimo.

Curationem quod attinet io primis instituenda est victus ratio ex cibis euchymis & plurimum nutrientibus, uti sunt iulcula ex vitellis ovorum, cum pauco viui albi & georosi, nisi febris vehementer tuerit. Item dentur iulcula carniæ rectorum, caponum, gallinarum, & pollorum, cum quibus coquantur flores buglossæ, boraginis aut calendulæ, Cinamomum, Macis & huiusmodi. Si propter Cocchymiam torrens, vapores putridi ad cor ascendant, clementer exurgendum est corpus, quibus remedia id fieri debeat, in præcedentibus satis superque dictum fuit. Exhibenda quoque sunt medicamenta quæ cor partemque nobiles roborant, & a maligna vaporibus defendunt, qualia sunt lapis Bezoar, coros cervi ulsi & præparati, coralli & margaræ, confectio Alkermes, de hyacintho, Theriaca, Mithridatum, aqua Cinamomi & similia. Aut pateret sequens postmunda, de qua exhibitur frequenter ex cochlear.

R. *Aqua buglossæ*

Melissa

Reserum ana. ʒi.

Aq. Cinamomi sine vino distillata ʒss.

Confell. Alkermes ʒi.

Cornu cervi ulsi & præparati ʒi.

Syrupi papaveris Erratici, (mirum enim in modum vitales spiritus recreat.)

Syrupi de succo citræ ana ʒi.

Misce, fiat potio. Capis sequens applicetur Epithema.

R. 4

R. Aqua

R. *Aquarum Calendula.*

Beraginis

Melissa

Rosarum an. ʒiʒ.

Aceti rosarum, &

Vini Maluatici an. ʒj.

Spec. Diatrios fental.

Diamargariti frigidi an. ʒʒ.

Cephura &

Croci an. ʒʒ.

Miste, fiat Epithema.

Libentius enim Epithemata carpiis quam regioni cordis applicari. Quandoquidem facultas medicamenti carpiis applicati, facilius per arterias ad eos pervenit, quam si regioni cordis, ubi vasa facis sunt exigua, adnotum facit. Deinde frequentes ex incuria additamentum linteamina Epithemate madefacta refrigerant, maximo cum damno aegri: praeterquam in peste, aliisque morbis venenosis. Frigus enim illud externum praeterquam quod pectori adversissimum, etiam materiam acrem, & vapores malignos, ad perspirationem paratos, retrorsum pellit, fontemque caloris facultatisque vitalis destruit. Labia quoque, nates, & tempora eodem Epithemate fricantur. In maximis praeterea & frequentibus vitallium spirituum labefactionibus, Regioni cordis & ventriculi sequens Emplasticum applicari poterit.

R. *Alica panis triticeo ʒiʒ.*

Pistaciarum &

Amygdalarum dulcium an. ʒj.

Specierum Leviticarum Galeni

Et diamentis daleis an. ʒj.

Croci ʒj.

Misceantur, & probe pistentur in mortario, addendo aquam Cinamomi & aquae rosarum ʒj. iusculi caponis q. s. fiat pasta, quae extendatur super alutem & applicetur tepide.

Qui in caliditate artem exierint, & medicamentis delinunt sunt, Aestatis tempore sequens Epithema preparare poterunt.

R. *Foliorum & Florum beraginis*

Busiopa

Melissa ana quantum voluerit. Incidunt & pistentur, addendo parum aceti & aquae rosarum, si in promptu est. Exprimantur valide, Colaturae addere parum Cinamomi & nonnihil croci. Applicetur tepide carpiis.

Cap. 19. De Alvi constipatione.

Alvi constipatur in ichore & Meliceria laborantibus, tum propter diuturnum decubitus in dorso, & usum febriem, tum etiam propter facultatis expulsiuæ imbecillitatem, quae laxissimè in huiusmodi aegria concurrere solebant. Propter decubitus enim & calorem maximum febriem non solum excrementa exsiccantur, verum etiam facultas expulsiuæ ita labefactatur, ut suo officio fungi non possit. Porro cum ex huiusmodi constipatione alvi reliqua symptomata, veluti febris, dolor capitis, vigilis, delirium, nausea, cibi fastidium, & huiusmodi, interum in modum exacerbantur, propterea quod viscera, hepatis imprimis, & sanguis in ipsis ventris incalcescit, & proinde vapores ex infimo ventre sursum eleuantur, partemque nobilissimam feriant, videat Chirurgus, ut alvum sit lubrica, conveniunt itaque iuscula, in quibus spinachia, attrita, beta, folia rhubarbari monachorum, mercurialis, & similia coxerint, quibus butyrum recens, & sal g. s. addantur. Aut accipe pruna Damascena no-

mero sex, coquantur in aqua admixto saccharo ad libitum aegri, inter coquendum adde foliorum feniculi in linteis mundo ligatorum drachmam onam, cremoris tartari, & sem. anis an. ʒj. sumantur cum iusculo suo duabus horis ante prandium. Conveniant quoque suppositoria ex melle & ale, aut sapone Veneto, vel infundantur Enema sequens.

R. *Radicum & foliorum albica*

Matra

Violarum

Mercurialis an. M. ʒ.

Florum Chamomilla

Meliloti

Sambuci an. p. j.

Semini anis

Feniculi

Lini an. ʒʒ.

Coquantur in aqua ad consumptionem tertii partis in ʒ. j. Colaturae dissolve Elect. diacarboli, & sacchari rubri ana ʒj.

Pistulas eorum numero duos

Ol. Chamomill. ʒ.

Anabini an. ʒj.

Milce, fiat enema, quod iteretur quotiescunque necesse videbitur.

In caliditate, ubi plerumque medicamenta omnia deficiunt, praeterquam hyemali tempore,

R. *Decocti brassicae subtrita ʒ. j.*

Butyri aut ejus loco acurgie porcinae vel Ol.

nucum aut rapum ʒj.

Salis pugillum unum.

Vitellos ovorum numero duos. Hoc enemate legitimè tuti maximo cum fructu usus fuit. Quod si nonnulla ex supra dictis, veluti flores aut semina carminativa, in promptu fuerint, addantur quoque, & praestantius erit medicamentum. Ubique itaque locorum, imò quovis etiam tempore, Deus suppeditat medicamenta, quo urgente necessitate aegrius opem ferre possimus. Sed nonnunquam instrumentum, quo infundi possit Clystet, desideratur, uti aliquando mihi contingit. Ubi tamen parvo cum negotio ex ligno sambucino, aut nucis, mihi cannulam paravi, & vesicae bovinae aut porcinæ alligavi.

Cap. 20. De immodico alvi fluore.

Propter vehementiam symptomatum, quae magis exoriri solent, inter quae praecipuum & onustum maximum est, dolor, quemadmodum interea per se dictum fuit, viscera omnia, & inter alia quoque nutritioni intervenientia, nonnunquam ita labefactantur, ut cibum, usque dum à calore innato & facultate concoctrice probe sit coctum, retinere non possint, sequiturque fluxus alvi immodicus, qui plerumque in 'Lienteriam, nonnunquam quoque in 'Dysenteriam periculosam transit. Propter febris enim vehementiam, maximamque intemperiem calidam hepatis, major pars sanguinis in fluxum bilem convertitur, & singularem acrimoniam acquirit. Si itaque huiusmodi bilis ad intestina decumbit, facultatem expulsiuam praeter modum irritat, intestina quoniam etiam nonnunquam erodit, & dysenteriam procreat.

Si ab initio morbi, cum vires adhuc constant, fluxus alvi supervenerit, non illic, nisi in dysenteriam transierit, silendus est. Hoc enim modo multi humores pravi simul evacuantur, maximo cum fructu aegri. Si vero in statu, aut quovis alio tempore, cum vires propter doloris vehementiam & diu-

tur-

turnitatem sunt prostratæ, & humidum radicale a calore febrili exhaustum, supervenerit, periculo non vacat; vires enim magis magisque absumuntur; tandemque planè prosteruntur, præcipue si febris quoque adfuerit. Digestio præterea & consolidatio vulneris retardatur, omniaque symptomata ingravescunt, & ut plurimum cachexia, icteritia, vel etiam hydrops sequuntur. Diligentia itaque adhibenda est, ut fluxus ille immo dicus sistatur. Fiet id si Principalia, dolor videlicet, ablati, victus qui etiam raro conveniens, ac reliqua omnia debito modo adhibita fuerint. Dolor quibus sedandus, capite 15, & alibi satis superque dictum fuit. In victus ratione præter ea, quæ cap. 13. tradidi, hæc sunt observanda; videlicet, si tormina & dolores intestinorum ingentes fuerint, uti sit, si fluxus alvi in Dysenteriam transiit, eum sedandum esse addito jussulo butyro recteni, & oleo amygdalarum dulcium, aut pinguedine castoreorum liquesfacta, lumbicos terrestres, locos & concitos, & cumque carne castratorum coctos; si ægro eotundem jussula exhibita fuerint, mirum in modum dolores & tormina ventris, præcipue dysentericorum compescere, lepidissime capietur sum, de quibus videat lector tractatum nostrum de Dysenteria cap. 7. Porreunt quoque cum carne coqui radices tormentillæ, bistortæ vel eryngii marini. Pro potu bibat lac amygdalarum, aut psillanum, in qua radices tormentillæ, aut bistortæ coadunt, vel

R. Agrimonia M. j.

Prænuca M. ß.

Rad. Bistortæ, Laguritidæ &

Rapana cervi cervi ana ʒi.

Coquantur in lb. 9. aquæ fontanæ, donec tertia pars sit absorbpta, idque fortissimo igne & in vase aperto. Herbz aortem & radices ut sint exsiccatæ, necesse est. Recentes enim decoctum reddunt ingratum. Decoctum aromatizatur Cinamomo, in poculo stanneo, quemadmodum dictum fuit cap. 13. Post passum uterque æger conservâ rosum antiquâ, aut Mivâ Cidooniarum pro corroborazione ventriculi, & partium nutritioni inservientium, aut præterit sequens Electuarium.

R. Conserva rosum.

Consolida majoris ana ʒi.

Cornu cervi usi præp.

Corallorum preparatorum an. ʒi.

Tormentilla subactissimi pulv. ʒi.

Confectionis Alkermes, misclicæ enim partes omnes nobiles roborat, & vires instaurat ʒi. Miscuantur in mortario, addendo syrupi de rosâ siccis q. l. fiat conditum, de quo sumat æger frequenter ad nunc juglandis magnitudinem. Cum jussulis exhiberi poterit sequens pulvis.

R. Terra sigillata

Cornu cervi usi & præparat

Corallorum preparatorum

Radicum bistortæ ana ʒi.

Genitale Cervi exsiccatum, & scalp pro aut lima

abrasum & comminatum ʒi.

Miscantur, fiatque pulvis, de quo detur ad scrupulo uno ad drachmam, vel drachmam unam &c semis.

Si vires permiserint, & fluxus alvi ea materia acri ad intestina delapsa originem traxerit, expurgandum est ante omnia. Ubi sequens potinacula ex usu esse poterit.

R. Rhubarberi Electi ʒi.

Myrobalanorum Carinorum ʒi.

Syrupi de Coturnis ʒi.

Aqua Cinamomi ʒi.

Cum decocto radicum & foliorum plantaginis fiat potinacula.

Si verò fluxus alvi ea prostratione virium, & facultat' retenticiis imbecillitate fuerit, purgantia nullum habebunt locum. Dolor ventris si magnus fuerit, emulsiões seminis papaveris albi, & amygdalarum dulcium, syrupus quin etiam de papavere, Laudanum & hujusmodi conveniant. Venter inungendus est oleo Cydoniorum, rosum, aut Myrtillorum. Plura videat Lector in Tractatu nostro de Dysenteria.

Cap. 21. De Ardore urinae.

EX maxima illa intemperie calida hepatis, multum humoris biliosi in hepate generati, præcedenti capite dictum fuit. Ille si per Cholochochum ad intestina defluxit, fluxum alvi excitat, cum cum sero ad tenes & vesicam pervenerit, ardor utrinque, sive mixto ardens sequitur, quæ intolerabiles quandoque cruciatu, & sunt mingendum præcipue, excitat, & ita quidem, ut febris, vigilæ, inquietudines, reliquæ symptomata omnia inde adaugentur; summa itaque adhibenda diligentia, ut ardori illi protinus occurratur. Fiet id tam internis quàm externis medicamentis. Interna sunt, veluti victus ratio, evacuantia, & ætærantia, de quibus ordine. In victus ratione omnia illa, quæ cap. 13. commemorata fuerunt, hic quoque diligenter sunt observanda. Imprimis autem tremor hordei, avena decorticata. Jussula item eorum recentium, in quibus alterantia & tæstigantia, veluti acetosa, borago, buglossa, folia violitum & malvæ, portulaca, lactuca, efchorium, agrimonia, & similia cum butyro recenti aut oleo amygdalino incoherant, summopere conveniunt. Interea quæ ardorem utrinque leviunt, vitellum ovi, non inhumum locum obinet, quapropter jussulis admisceri convenit. A viuo planè abstineat, cuius loco lac amygdalinum, psillanum, aut decoctum betonicæ, agrimoniz, veronicæ & liquiritiz, antea capite 13. præscriptum, bibat, loco tamen mellis nouthil syrupi de althea Fernelii admisceri poterit: serum lactis quoque convenit, humorem enim biliosum contemperat & hepatis tæstigerat. Aer sit temperatus. Figidus enim est in hoc symptomate conveniens videatur, valentibus tamen nervorum, ut superius quoque dictum fuit, mirum in modum obest. Internum tamen ab ætæ calido, omnibus quæ corpus, humores & sanguinem vehementer possunt accendere, uti & à vehementi motu coepos, omnibusque accidentibus sive perturbationibus animi, & imprimis ita, abstineat æger. Propter itam enim, calor qui facta cor est, ut testatur Galenus lib. de causis morborum, & proinde sanguis ipse lo venis, effervesce, acrimoniam acquirit, & cum impetu ad panem emulceratur, veluti debilitatem, & proinde destituatibus magis obnoxiâ decombuit. Vidi id Anno 1613. Mense Januarii, in Generoso quodam 40. circiter annorum ætatis, constitutione planè bilioso, & ulcere fistuloso in pectore à longo tempore laborante, cui (cum in toxa præscripta victus ratione peccasset) bilis adeo ad vias ostensas deflaxit, ut cum ipsi venam in cubito secussisset, & ad uncias sex aut septem sanguinis extraxisset, ne guttula quidem bilis in sanguine confecta fuerit. Dolor erat maximus, qui facit mingendum incepit, & ad duas circiter horas post mictionem continuavit, deinde ad proximam usque mictionem nullas fere erat dolor. Tandem ex infima parte

parte scroli rupta laterius vomica, & per priorem fistulam copiosè evacuatâ materia purulenta, plenissimè convulvit præter fistulam, cujus consolidationem non exposcit. Cum urina enim quotidie multi humores excrementitii, ex superioribus partibus maximo ipsius commoto evacuantur.

Duo autem in hoc casu annotatione digna occurrunt. Primum, quod diutius, quam in ardenti missione fieri solebat, urinam retinere potuit, ipsamque nonnisi bis in die, videlicet circa sextam matutinam & quintam vespertinam excernebat. Deinde quoque, quod neque doloris vehementia, neque puris generatione in genitro ulla excitata fuerit febris.

Potè evacuantia omnia leviora esse debent, fortior enim purgantia, uti sane, qui ex copioso scamentio, colocynthide, & huiusmodi præparantur, qui viscera & humores inflammant, malum exacerbare solent. Laudatur Cassia, reliquique medicamentis in ardore urinæ à prædictis præsertur, verum propter vim diuresicam, quæ prædicta est, pericèpe dolorem augeri, ab ægris observatum est. Retulit mihi aliquoties illustis ac Generosus Dn. Zacharias Geizkoffer à Geilenbach &c. p. m. cum Anno 1610. Haunheimis in extractione calculi operam meam ipsi præberem, se perisephe Cassiam in afflicto suo sumpsisse, sed nunquam cum fructu. Testatur id quoque in epistola quadam ad me scripta, & Cenevæ primæ Epistolæ unum meum inserta. Petrus Pyrag Chirurgus Regius, Vir eruditione & expertientia insignis, idem de Cassia observasse, ex capite quarto lib. 7. Chirurgiæ suæ apparet, ubi Cassiam calculosis ad verissimam esse scribit, loco itaque Cassiæ ægro sequens porioncula exhiberi poterit.

R. Radicum polygadi, Acetosa,
Liquoristia an. ʒij.
Passilorum emulcatarum ʒʒ.
Prunorum numero 6.
Trilium flavum cordialium an. p. j.
Seminis anisi ʒj.
Foliorum sennæ ʒij.
Herdei p. j.

Coquantur in aqua, donec colatura redeat ad uncias tres, in quibus infundantur & maceantur per noctem

Rhabarbari electi ʒj.
Turbiti electi ʒ.
Cinamomi an. ʒij.

Mase post unictam aut alteram ebullitionem fortiter exprimantur, addaturque syr. rosati solutivi simpl. ʒj. Misce, fiat potio. Aut

R. Radicum Chorici, corticum interiorum radicem
fractula an. ʒʒ. ʒ.
Foliorum Agrimonie
Lactuca
Cichorii an. p. j.
Tamarindorum ʒ.
Passularum emulcatarum an. ʒʒ.
Foliorum sennæ ʒij.
Sem. Anisi, ʒ.
Sem. Caribami an. ʒj.

Coquantur in aqua, ut colatura redeat ad uncias duas, in quibus infunde Rhabarbari ʒʒ. Cinamomi & cremoris tartari ʒj. maneant in infusione horas octo, expressione fortiter facta, adde Syrupi de cichorio cum rhabarbaro ʒj.

Pueris & delicatioribus datur Syrupus rosatus solutivus, compositus cum rhabarbaro, agarico & senna per se, aut addito scrupulo uno Electuarii de succo rosarum.

Aut

R. Menna Electi ʒvj.

Elect. de succo ruforum ʒij.

Syrupi de Cichorio cum rhabarbaro ʒʒ.
cum jusculo carnis rec. fiat porioncula s. a.

Aut

R. Gutte Gamand, à granis quatuor usque ad octo, secundum tolerantiam ægri, cremoris tartari subtilissimè pulverisati ʒʒ. coquantur parum in jusculo carnis, aut aquæ lactucæ & cichorii, & fiat porioncula, addendo parum Symp. rosati solutivi simplicis, ad libitum ægri. Convenit quoque vomitus, præsertim eis, qui ad vomendum parati sunt, potenter enim bilem ad superiora repellit. Provocetur itaque aqua tepida, cum oleo vel butyro, & gula immisso digito vel penna.

Aut

R. Decoctionis radicem raphani ʒx.

Syrupi acetosi simplicis ʒj. Misce fiat vomitorium, sumatur tepide & provocetur vomitus, gula immisso digito, ut dictum.

Aut

R. Rad. Asari ʒj.

Agarici ʒj. ʒ.

Decoquantur parum in aquæ hordei ʒx.

Colaturæ adde oxymelitis simp. ʒj. Sumatur ut dictum.

Prodest etiam venæ sectio, si vires adfuerint. Hippocrates in dysuria interiores venas malleoli incidere jubet. Illud tamen, inquit Varandus lib. de aff. &c. Renum & vesicæ cap. 7. sit potius vacationis particularis causa, ex parte jam inflammata, quàm refrigerationis totius corporis, & revulsionis, quæ hic valde est necessaria, siquæ ex vena cubiti dextri, propter situm hepatis. Hæmothoides quoque in consuetis provocandas esse, suadet Platenus Tract. 3. c. 10. mihi pag. 851.

Purgato corpore alterantia, quæ refrigerando intemperiem calidam hepatis, & acrimoniam humoris biliosi ad tenes viasque urinas desluentis, corrigunt, propinanda sunt.

Laudatur ab aliquibus lac recens emulsum, admodum enim lenis, & si excoriatio aliqua facta sit ab urina, eam sanat. Diligenter tamen in exhibitione lactis observandæ sunt regulæ, quæ Hippocrates nobis reliquit lib. 5. Aphorismo 64. sic inquit. Lac dare caput dolentibus, malum; malum verò & febricitantibus, & quibus hypochondria suspensæ murmurant, & siticulosæ, &c. Facillè enim acescit & corrumpitur in ventriculo promptèque in bilem vertitur, & caput fecit. Præstat itaque exhibere lac amygdalarum & seminum frigidorum majorum, quibus addatur sem. papaveris albi. Dolorem enim & ardorem urinae compescit. Aut;

R. Aq. Lactucæ,

Porioncula

Cichorii an. ʒj. ʒ.

Syr. de papavere, ʒ.

Syr. de albea an. ʒj. Misce, fiat julapium pro

duabus dosibus, in aurota, & duabus horis post eandem sumendis.

Aliud.

R. Fol. Agrimonie

Fennicæ an. M ʒ.

Flor. Cardui an. p. j.

Flor. Violarum

Malvæ, ʒ.

Albea an. p. j.

Coquantur in fero lactis optime depurato, ad tertiam partem

partis co-lamionem. In libra una coacturæ dissolve
symplici vinularum.

Syr. de Albæ. &

de Papavere an. ʒj. Milce, fiat Julapium,

de quo æger bibat frequenter & quidem ad libitum,
in maximo ardore utinæ, ubi dolat intensus est,
sæpius ad narcotica confugere coactus est Medi-
cus, ut

R. Laudani grana tria

Syr. de Albæ ʒss.

Confectionis Alkermes (spiritus vitæ, pro-
pter doloris vehementiam labefactam, initiatur)
ʒj. Cum l. q. aquæ lactucæ fiat peruncula, detur
duabus horis post cenam.

Reginæ reclinæ ac lambi inungantur ol. rosaceo,
violarum, amygdalarum dulcium, Nymphae, ungu.
rosato & similibus, Aut

R. Ol. Violæ &

Nymphae an. ʒj. ʒss.

Ung. Rosæ ʒj.

*Mucilag. sem. Cydoniarum. extr. aqu.
rosæ. ʒss.*

Caphura dissol. in aceto rosæ. ʒj.

Misceantur in mortario fiatque unguentum, quo
regio hepatis & renum inungatur. In maximo ar-
dore hepatis.

R. Aqua Agrimonie

Veronica

Cichorii an. ʒij.

Aqua Absinthii

Aceris an. ʒj.

Species Diamargaritæ frigidi &

Diatrisi semali an. ʒj.

Caphura dissol. in aceto rosæ. ʒj.

Milce, fiat episthma, quod tepide regioni hepa-
tis applicetur linteis in eo madefactis. Carpis quo-
que, ad temperandum cordis calorem, simul appli-
cari poterit.

In maximo ardore utinæ & cruciatu intest. min-
gendum, ardorem compescit, & dolorem lenit in-
tussio, siue semicupium hunc in modum factum.

R. Radicum & foliorum malvæ, albæ,

Violarum, florum Chamomillæ,

Meliloti an. m. ʒj.

Sem. lins.

Fenigræci,

Anisi an. ʒj.

Incidentur, contundantur & coquantur in aqua
pro semicupio.

Cap. 22. De Cacoehymia, & ejus curatione.

Duplicia esse symptomata in Ichore vel Melice-
ria, videlicet acuta & chronica, antea cap. 6.
dictum fuit. Acuta morbum comitantur: lubre-
quuntur Chennica. De illis in præcedentibus breviter
dictum fuit, sequitur nunc de reliquis, inter quæ
cacoehymia primum occurrit. Quæ nihil aliud est,
quàm vitiosa humorum qualitas. Testatur id Galenus
lib. 13. Meth. Med. c. 6. Ubi cacoehymiam ita des-
cribit, ubi loquitur, flava bile, vel nigra, vel puru-
lenta, vel fetida humeribus repletum corpus est, cum
habitu cacoehymiam vocant. Non solum autem
in quantitate homines isti in cacoehymia abundare;
verum etiam in qualitate, iterum docet Galenus lib.
3. de temperamenti, cum in multis cacoehymiam
ex prava & vitiosa cibo, aliis ex corruptela &
pueritior fieri scribit.

Causa primaria & principalis hujus mali, est ven-
triculi summa imbecillitas, item viscerum natura-

lium, hepatis, lienis, & venarum mesentericarum ob-
structio, atque labefactio, quæ omnia ægri acci-
dunt, in Meliceria præcipue, propter doloris vehe-
mentiam atque diuturnitatem, & primis hæc malum
partes corporis quæ sub umbilico sunt, occupaverit,
quemadmodum capite quæro dixi. Propter doloris
enim vehementiam non tantum vigilie, & inquietu-
dines superveniunt, verum etiam operationes om-
nes naturales, quæ dormiendo perficiuntur, retar-
dantur. Somnus enim ad concoctionem plurimum
conferre, testatur Galenus multis in locis, præci-
puè lib. 1. de alimentis cap. de tritico, ubi hæc ha-
bet verba. Quod autem entum plerique, qui se
consecraverant laboribus, minus à pravis cibis lardun-
tur, tu causa est, quod his somni sunt profundio-
res, quæ res ad coctiones multum ipsis adferre mo-
menti. Et lib. 4. de tuenda sanitate. Nihil æquè
concoquit, aut malos succos discutit, ut somnus,
inter dormiendum itaque non solum cibus in ven-
triculo concoquitur, & in chylum convertitur, ve-
rum etiam fit separatio & transmissio chyli ad he-
par. Ubi secunda perficitur concoctio, segregatio
item excrementorum & ad omnes partes corporis
sanguinis distributio. In quibus demum fit tertia &
ultima concoctio & segregatio, ita ut optimus san-
guis in nutrimentum partium cedat, excrementis
verò burnit veluti excrementum, per poros, emun-
datoria, aliqua ad id destinata loca expellatur. Ex hâ
manifestum fit, dolorem præcipuum esse causam,
aut pravi bumores in ægri, Ichore laborantibus
generantur. Cum enim propter ipsius violentiam,
& vigiliarum diuturnitatem, concoctiones, segre-
gationes & distributiones non perficiantur, contem-
pitur cibus in ventriculo, & Chylus immiscetur ad
venas mesentericas, & hepar ipsum à chylis istis cru-
do, crassis & fænicibus obstruitur, inde febres,
scirrhi hepatis, & lienis, calculi renum, vesicæ,
aliarumque corporis partium, idest ita item & hy-
drops subsequuntur.

Cacoehymiam quoque procreat & adauget prava
victus ratio. Inprimis autem adversissima sunt om-
nia, quæ difficultat concoquantur, & chylum viscosum
reddunt, qualis sunt extremitates animalium, caro
salis & fumo exsiccata, legumina, cateus & similia.
Cacoehymiam quoque adaugent decocta traumatica
siue vulneraria; propter insignem enim vim exsiccandi,
quæ prædicta sunt, materiam vitiosam in visce-
ribus exsiccant & indurecunt, uti cap. 7. fusius
dictum fuit.

Cacoehymia autem semper præcedit cachexiam,
de qua Cælius Aretianus lib. 3. de morbo. Chon.
c. 6. hæc habet verba. Cachexia nomen sumptum à
corporis habitu malo, Cæcia enim vitium vel ve-
tustatem Græci vocaverunt, hexin habitudine.
Quum enim viscera naturalia ut antea dixi, officio
suo fungi non possint, sanguinem quæritam ad nu-
tritionem aptum, prætereare non possint, fit ut ex-
crementa & superfluitates quamplurimæ generentur,
sequiturque primò Cacoehymia, hoc est, humorum
vitiosa qualitas, quæ si non tollatur, in cachexiam
transit, quæ sic cognoscitur. Calor cæcis su-
balbidus, aliquando etiam plumbeus est, tardus ac
piger fit motus corporis, cum inflatione lumbi.
Aliquando etiam ventris fluor, cum fibrilla lacer-
te, quæ circa vesperam magis augetur, supervenit,
pulsus crebet ac densus, angustia pectoris & cibi fa-
stidium adest, & plerumque omnes à carne recent
abhorere solent. Nonnulli vinum, alii magis aquam
puram appetunt. Urine ut plurimum crude conspi-
ciuntur.

Porto quia caecochymia principium sit gravissimorum morborum, & plerumque in fidusiam & hydropem transire, uti superius dictum fuit, videtur Chirurgus, ne quicquam eorum, quæ necessitata sunt, intermitat, ut haec Medicum aliquem doctum, & in operibus Medicis caecarum, in consilium advocet, etiam atque etiam necesse est. Et tamen quia ubique locorum & praesertim in castris fieri non potest, in gratiam & ægrorum & Chirurgorum pauci hæc adscribere volui, qui ut benevolus lectur benignè interpretari velle, somnoscere rogo.

A victus autem ratione curatio inchoanda est, quæ talis esse convenit, ut non solum corpus nutritur, verum etiam loco medicamenti intersitve possit. Aer, si fieri poterit, temperatus sit, ad calorem et siccitatem aliquo modo vergens, adversissimus est frigidi, non solum enim poros claudit, et perspirationem impedit, sed et membram, nervosque omnia, quæ antea ab Ichore cruciata fuisse, debilitat. Præcipue si glæra adfuerint. Testatur id Hippocrates multis in locis, præcipue l. 5. aph. 17. 18. et 20. Aer præterea summè calidus, quia sanguinem et humores acres efficit, et infusas facultates et vires partium dissolvit, viscidamque materiam visceribus inclusam effacit, obstructionesque magis magisque adauget, vitandus est. Quoad cibum, perpendendum est primum, ventriculum, omniaque viscera nutritioni inservientia propter præcedentes dolores, vigilias, et æstus febrem, ad summam labefactionem et imbecillitatem redacta esse. Abstineat itaque æger ab omnibus, quæ difficulter concoquuntur et succum crudum cialumque generant, qualis est panis sine fermento, omniaque in lartagine, butyro aut oleo frata. Nosia quoque est caro bubula et porcina fide condita et in fumo siccata, caro item ferina præcipue leporina, Cervina, Uulina, aptina, et avium in aqua vivuntium, cæsus item, lac et lacticiuia omnia, præter butyrum, Pisceis salis, et qui in stagnis et limo vivunt. Adversissima sunt legumina omnia, jute tamen lentium et pilorum uti poterit æger, ut postea dicam. Ab acetariis quoque et froctibus crudis et horariis abstineat. Nutrimti enim nihil, multum vero excrementi procreant.

Secundò abstinere aget ab omnibus, quæ infligunt et præter modum sanguinem & humores excalescunt & adorsum, hujusmodi enim, sive medicamenta sive alimenta fuerint, non solum alvum siccam reddunt, verum etiam humores viscosos in venis molaris, & hepate infarctum efficiunt, omniumque viscerum obstructions magis magisque adaugent. Sunt autem illa imptius fallimenta omnia, uti quoque aromata, & præcipue calida usque in tertium & quartum gradum, qualia sunt piper, zinziber, garyophylli, cardamomum, piper ut vocant Hispanicum, allium quocumque, potum, cepe, raphanus, & sinapi, cisti in eigua quantitate fuerint sumpta, nocent, inserta aromata conveniunt clauomomum, macti, nux mofchata, & cernuus.

Tertio consulit cavere ager, ne glutinosis utatur cibis, ex viscosis enim cibis viscosus provenit chylus, qui postea venit tam Lactis, quam hepatis includitur, omniumque viscerum obstructions adauget. Exteminitates itaque & interitum animalium omnium, ut quoque caro virulina & agnina (mucilaginosa enim succo pendula sunt) pilices alacres, squammas, aut qui in stagnis vivunt, caesus, lac & lactisina, praeviscuerunt in omnibus morbosissimis, longis, minime convenient. Quapropter non videtur, quomodo huiusmodi alimenta viscosa, praecipue exteminitates animalium, abque insigni detrimen-

mentis in fracturis ossium agris offerri possunt. Ex-
cis enim chylus viscosus generator, qui venas Mela-
taicas & hepatis ipsam obstruit. Sanguis verò, qui
ex ipso produciunt, quia viscosus est, nonnulli cum
difficultate pro nutritione partium distribuitur, im-
minuendo itaque calore nativo propter penuriam ali-
menti, sanguis ille viscosus in venis putrescit, vari-
que symptomata procreat. Cujus rei exemplum an-
notatione dignum vidi. Nobili cuidam Juveni, &
optimæ corporis habitu prædito, ex familia Helve-
tica haud obscure optimo, cum anno 1608. in Gal-
liis os femoris in medio confixum & comminatum
fuisset, cum ingenti contusione & dilaceratione mus-
culorum, per multos menses lecto affixus perman-
sit. Interim à Medico quodam docto, Chirurgo quin
etiam doctrina & experientia claro, curatus fuit, &
quidem ex arte, & eâ quâ posuit, diligentia. Inter-
im tamen, ut de gravissimis symptomatibus, quæ
ab infuso morbi supervenerunt, taceam, post multos
etiam menses, ne dicam annos, propter obstruc-
tiones gravissimas hepatis & lienis, quas in nobis con-
traxerat, diversis & & gravissimis affectibus, scirrhis
videlicet hepatis & lienis, febribus tertianis & quan-
tatis, ictericia & similibus excruciatum fuit. Ego
tandem cum in consiliis adhibitus fuisset, & multa
tamen curæ quæ interna præsidia adhibuissent, & che-
mis piperinis alia quoties usus fuisset ager, restitutus
fuit, & in hunc usque annum 1630. bona vale-
tudine fruatur. Præcipuum autem causam obstruc-
tionis viscerum tanquorūque gravissimorum symp-
tomatum, ad usum alimentorum viscosorum referen-
dum esse arbitror. Per menses enim novem & decem
quotidie cibis viscosis usus fuerat. Quapropter agris
meis nutritivis viscosis semper interdixi, nihilominus
tamen fracturas multas & quidem maximas,
etiam in magnatibus, feliciter, & cum laude cura-
vi. Hæc obiter, & præter institutum, in grati-
am tyronum monere visum fuit. Plura videat Le-
ctor Obl. c2. cent. 1.

Quarto videtur eger, ut ab omnibus cibis, faciliè putrescentibus abstinere, uti sunt fructus horarii, videlicet Cerafa dulcia, pruna recentia, persica poma, cucurbita, melones, nux recenties, murum, & hujusmodi, qui concoctionem ventriculi impediunt, calorem narivum debilitant & imminuunt, succumque crudum & putridum procreant.

Postremo danda est opera, ne cibis aut potus eacochymicorum sit abstringens, & exsicicans, hujusmodi enim non solum alvum siccam reddunt, verum etiam vias costringendo, materiamque viscidam in visceribus cascando, obstructions adaugent. hujusmodi autem sunt legumina, caro ferina, de quibus in prima classe quoque dictum fuit. Noces quoniam etiam, amygdalæ, castaneæ, nespila, Cereæ, pruna sylvestris, forbes, uvæ, & fructus omnis immaturus. Farina quoque avenacea, apud oos ulceratissima, propter torrefactionem, quia insigniter calescit, minime convenit. Coronas autem etiam attingunt, post partum tamca sumpta fammopere conveniunt, Ventericulum enim corroborant, & digestionem promovent. Utatur itaque æger cibis, quæ facile concoquantur, succum quin etiam laudabilem procreant, neque excrementorum priventum faciant. Hujusmodi sunt carnes recentes, veluti bovina, vervecina, item caro Gallinarum, pullorum, alandarum, columbarum, petidum, ficedulatum & avium in azobis degentium. Conveniunt quoque ova recentia & ex ipsi præparata edulis. Cum carne coquantur sunt herbe, quæ interemptum hepatis corrigunt. Quapropter & interperies internatum partitio ad-
fuerit.

fuerit calida, tunc lactuca, endivia, Cichorium, spinachia, Cerefolium, & portulaca conveniunt. Sin calor natus viscerum propter vehementiam ac diuturnitatem morbi profuturus fuerit, tescollandus est eis, quæ medicoriter calefaciunt, quapropter salvia, rosmarinus, Majorana, folia, & bacce lauri, mentha, betonica, & hujusmodi cum carne cocta, conveniunt. Macis quoque, Crocus, Cinamomum, nux molchata, cortices arantiorum & citrionum cibis addita, calorem innatum tescollant. Inflaurant quoque calorem innatum, & humidum radicale adaugent Vitella ovorum, si in fusculo carnis dissolvantur. Etiam si legumina nutritivum crassum reddant, fusculo tamen pisiorum & lenium, cum buyro recenti, sale, & nonnullis macis vel croci, cocto, uti poterit æger, uti quoque cremore hordei, & avenæ decoctis. Conveniunt & sorbiti, nuculae ex vitellis ovorum, cum vino & aquæ præparatae, addito saccharo, Cinamomo & croco; tempore Veris holuscula herbarum tecemium, veluti Cerefolii, feniculi, spinachie, betonica, foliorum urticae, & summitatum sambuci, præparata maximo cum fructu æger in prima mensa aut (quod magis mihi probatur) per boram unam aut alteram ante prandium exhiberi poterunt. Diueticæ enim sine damno cibis viæ permisceri posse, alibi demonstravimus. Sanimopere quoque convenit succus, qui ex perna vervecina, in veru percocta, & culro hinc inde perussâ & compressa, effluit. Vires enim labefactas instaurat, & humidum radicale adangit, præcipue si nonnulli vini, parumque aquæ Cinamomi sine vino dissilata, admiscueris.

Si æger magnopere acetaria appetit, poterit per intervalla uti cichorio, cerefolio, feniculo, asparago, lapulo, mentha, gemmis genista conditis, & caparibus. Ab eis verò quæ insulsi et refrigerant veluti sunt lactuca, portulaca, & cucumeres, & melones abstineat.

Bibat vinum album, tenue & quàm optimè defecatum. Si generosum fuerit, diluatur aquâ aliquâ appropriata, aut quod efficacius, decocto veronicae, saccharo, & Cinamomo aromatizatum. Si Cerevisia uti voluerit, aut eis in locis, in quibus nihil præter Cerevisia pro potu unantur, constitutus fuerit æger, videat ut illa sit bene cocta & defecata, non nimis generosa, vetusta vel acida. Vinum secundarium, uti quoque potus qui ex prunis & pomis sylvestribus, ovis immaturis, & granis oxycanthæ fit, propter astringentiam in modum nocet, si sitis maxime & vires profuturæ fuerint bibat æger lac amygdalarum, non tantum enim sitim testinguat, verum etiam viscera humectat & egregie nutrit. Reneus Solinander magni nominis Medicus in consilio 6. sect. 3. pro cachectico, vult ut quarta vel quinta, vel etiam sexta pars amygdalarum sit amara, & rectè quidem, ita enim lac magis fit medicamentosum, quandoquidem abstergit & mundificat præcipue, si, ut laudet Solinander, cum jure furfurum macrorum præparatum fuerit. In fine mensis pomis aut pitris coctis saccharo, amilo, aut feniculo aspersis, uti poterit. Conveniant quoque Cydonia cocta, & saccharo parumque Cinamomo aromatizatum aut Miva Cydoniorum siue speciebus, vel sumat cochlear unum pulveris nostri peptici statim à pasto.

R. Panis albi tosti ℥ij.

Pulpa Cydoniorum explicatorum

Cinamomi optimi

Pellicularum intersterni ventric. gallinarum

Seminis anisi ʒj.

Coriandri præparati an. ʒij.

Misce, & sit pulvis. Hæc de cibo & potu. Porro

Bibl. Chirurg. Tom. II.

quia exercitatio digestionem promovet; exigua meatus expurgat, & excrementa expellit, utilis quæ, teste Galeno de ieiunia valetudine lib. 2. eam ante cibum administrare, dummodo modicè sit, nec laboriosa, Vult autem Galenus duplicem concoctionem, videlicet eam quæ fit in ventriculo, & eam quæ fit in valis sanguinis petactam esse, ac denique tempus cibandi instare. Post paulum tamen modicè quoque corpus exercere convenit. Modica enim exercitatio, post sumptum cibum calorem nativum excitat & adauget, & concoctionem promovet. Si verò æger propter debilitationem ignitum, corpus deambulando aut equitando exercere non potest, frictiones sunt administrandæ. In somno & vigiliis modus quoque est servandus. Intempestivæ enim vigilie concoctiones omnes impediunt, ceterum siccant, mentem perturbant, & humidum radicale absumunt. Contra somnus immoderatus calorem nativum obducit, & multos humores crudos gignit, corpusque ignavum reddit. Passiones animi quoque veluti sunt ira, metus & mentis, æger quantum fieri potest, vitabit. Præter hæc opetam quoque dabit, ut alvus quotidie ad minimum semel respondeat, id si naturæ & ciborum beneficio non fiat, sollicitanda est prunis laxativis vel clystere lenitivo cap. 19. præterpro. Vel imponat suppositorium ex melle & sale coctum. Summopere quoque conveniunt pilule sequentes. Pates enim nobiles corroborant, obstructions viscerum tollant, mæstiam vicidiam incidunt, attenuant & alvum lubricam reddunt.

R. Aloe purissima ʒi. ter aut quater succo gratiæ imprægnata iterumque expicata ʒi.

Rhabarbari Electi ʒij.

Turbith. gummosi

Cremoris tartari an. ʒij.

Gummi Ammoniaci purissimi & dissoluti in aqua

cinamomi ʒiij.

Consoll. Algeris ʒj.

Ol. Cinamomi ʒss.

Syrupi rosati solutivi compositi cum Rhabarbaro; Agarico & Senna q. s. Milce siuque massa, de qua æger (si tantummodo alvum durum lubricum reddere cupit) sumat à granis 12. usque ad ʒj. aut drachmam semis, per duas horas post eam. Sin ampliores evacuationes habere cupit, ad ʒij. aut ʒj. deglutiet, ut postea dicetur. Hæc de victus ratione.

Sic substituta optima victus ratione corpus quantum fieri poterit à pravis humoribus expurgandum est, verum enimvero quia materia peccans in cacochymia tenacissimè visceribus inhæret, difficulterque suo loco movetur, juxta mentem Hippocratis lib. 1. Aphorismo 22. coquerda & præparanda est apozemate aliquo convenienti, ante omnia tamen vias communes sequenti lenitivo expurgabis.

R. Radicum polyodi q. Liquiritia

Cichorii an. ʒss.

Coricem interiorum radicem frangula ʒj.

Veronica

Flores cordialium. an. p. 6.

Sem. Anisi ʒij.

Foliorum sennæ ʒi. ʒ.

Incidentur, contendantur; coquanturque in aqua, ut colatura redeat ad uncias duas in quibus dissolvat

Elect. diacarbami, &

Diaphenici cum Rhabar. an. ʒij.

Cremoris tartari ʒj. ʒ.

Syr. de cichorio cum Rhabarbaro ʒi.

Misce fiat potio, detur in crepusculo matutino, cum costodia.

ʒi

custodia. Posttridie, aut tertio die à purgatione, si plethora adfuerit, & vires permiserint, vena incidenda est, idque ex cubito ejusdem lateris de quo æger præcipue conqueritur. Si menses, aut hæmorrhoides suppetant fuerint, vena ad malleolos incidenda, aut applicentur sanguiugæ venis hæmorrhoidalibus. Sin tamen maxima adfuerit virium omnium prostratio atque imbecillitas, vena scilicet omittenda, & ad humorum concoctionem progrediendum est, obsequens convenit apocæma.

R. *Cirsium interarum*, & *flavorum*

Radicum frangulae ʒj. •

Radicum polygali q. Ligustici

Lappæi acui an. ʒiij.

Asparagi

Cichorii

Isidiculi, & *petroselinæ an. ʒij.*

Herbarum & florum betonica

Veronica, *Cuscuta*, *stachys an. M. ʒ.*

Trium florum cordialium &

Gnissæ an. p. j.

Seminis anisi

Feniculi an. ʒij.

Coquantur in f. q. aquæ potissimæ, ut Colatura tedeat ad lb. iij. Clarificetur & dulcoretur Sympo de quinque radicibus q. f. hujus apocæmatis bibat æger per dies tres ad uncias duas in aurota, totidemque per horas duas ante cenam.

Postea accipe de eodem apocæmate ʒatj. In quibus infundantur, macecentur & coquantur f. a. inconcisa.

Foliorum sennæ ʒj.

Rhabarbari ʒiij.

Agarici recent. trochiscati

Cremoris tartari ʒj. ʒ.

Cinamomi electi ʒij.

Maneant in infusione & loco tepido per horas xxi. deinde post unam aut alteram ebullitionem fortiter caprimanue addanturque,

Syrupi de Cichorio cum rhabar. ʒij.

Aqua Cinamomi sine vino distillata ʒj.

Misce fiat potio purgans pro quatuor dosibus in tempora sumendis, cum custodia. Si primus haustus sufficienter operatus fuerit, alteris saltem diebus medicamentum sumatur, aut dosis diminuat, ut vires conservari possint. Quod si nimis segner sit, cessaverit operatio, postrema dosis acuenda est dechina unâ Diacarthami, aut Diagæneticon cum rhabarbaro. Sic satis purgato corpore, poterit æger per dies aliquot quiescere, post passum tamen nonnihil de suo pulvere peptico sumere, deinde apocæma præscriptum iterandum est. Quod si apocæma ingratum fuerit ægro, soleo sequens præparare jusculum; quod propter singulares operationes rum in morbo reglo, rum in reliquis omnibus obstructionibus viscerum, jusculum Regium appello.

R. *Rad. Apii ʒij.*

Petroselinæ

Feniculi an. ʒiij.

Pastillæ exanthematicæ ʒj.

Cerei ʒj.

Macis ʒij. Incendantur omnia & caponi ant Gallinæ, cui collum, pedes & alæ abscissæ sunt, infascentur. Coquantur in aqua, donec caro ab ossibus separata, & jusculum ad doctæ lex consumptum fuerit. Caro cum suo sarcimento fortiter exprimitur, & fiat Colatura, addito sale, quantum satis est; sumat æger per duas horas ante prandium, quantum libuerit. Addo quoque nonnunquam nonnihil Cremoris tartari, aut salis coacti deopillativi, ex Cichorio, fœculculo, pe-

troscilino, Hypericone, Eupatorio, & similibus herbis & radicibus appetitis confecti. Si subacido sapor ægro gratus fuerit, nonnihil vini aut aceti sambucio admisceri poterit. Si pmstratio virium fuerit maxima, addatur nonnihil aquæ Cinamomi sine vino distillata. Jusculum hoc Excellentissimum est medicamentum, simul & nutrimentum in gastrochymicis, quo ego sapissimè maximo cum fructu ægrotum usus fui. Sin ægro vinum aliquod aperitivum gratius fuerit, sequenti uri poterit.

R. *Rad. Asparagi*

Bruci

Ebuli

Feniculi an. ʒj.

Cinamomi electi ʒij.

Macis ʒj.

Herb. Betonica

Agrimonia &

Veronica an. M. ʒ.

Centaurei minoris,

Absoth. Panici,

Card. benedicti an. p. j.

Incendantur & contendantur siarque nodulus, cui affunde vini albi & optimè depurati lbij. De hoc vino bibat æger ad uncias tres aut quatuor, tribus horis ante prandium. Interim autem dom æger utatur aperitis prædictis, subinde leniter leviterque capurgandum est corpus. Ubi sympo de Rhabarbaro à Solinando tanroperè celebratum, convenite, lapsissimè vidi.

R. *Rhabarbi optimi ʒvj.*

Fol. Sennæ Alexandrina drach. 10.

Mecheacæ, albiss. ʒij.

Flor. Violarum recentium,

Fl. Putorum sylvestrium, si haberi possint,

vel cotoneorum an. p. ʒ.

Cinamomi acuti interioris ʒj.

Zinziberis albi ʒij. ʒ.

Aq. Betonica

Cichorii

Basilic. distillata in balneo Mariae an. ʒ4.

Rhabarb. & Mecheac. pulveribus iteratis

aqua Cinamomi, infundantur omnia f. a. per noctem. Mand ebullitione & expressione facta, coletur & cum sacchari albiissimi ʒj. quinqve vel sex Sympo rosat. solut. ʒij. Misce fiat f. ætem sympo. Datur ad uncias duas in caligo haustu juris pulli oon pinguis, cui pauca passululæ demptis gigartis, pauca folia tosmarini & macis tassillum incocta sint, bibat.

Cæterum præter victus rationem & purgationem pravocum humorum, partes nobiles summo studio corroborandas esse, ratio ipsa suadet. Quia enim in præcedenti morbo propter vehementiam & diuturnitatem doloris, ætium item febrilem, vigilas & decubium, humidum radicale absumptum, calus quin etiam nervos prostratus, & proinde facultates omnes minus in modum imminutæ fuerant, nisi rescocillantur, frustra medicamenta adhibentur. Est enim robur naturæ, quod medicamentum ex potentia in actum vertit. Corroborabis autem imprimit visceris, si præscriptam optimam victus rationem, observaveris, & pravos noxiosque humores (ex quibus continud putridi vapores ascendant, facultatesque omnes afficiant) uti antea satis dictum fuit, evacua-veris sine quibus corroboranda omnia nullum crunt momenti. Corroborat ventriculum & viscera ruti-tionis interserviens pulvis pepticus, antea præfati-pus. Aut:

R. *Diacarum*

Diarrhodis Albas

Aromatici refusi an. ʒj.

Sacchari

Sacchara dissolva in aqua Cichorii ʒiij.

Misce, hancque tabellæ addendo ol. Cioamomi ʒʒ. de quibus utatur æger aliquoties in die, præcipue ante & post prandium & coenam, ad drachmam unam aut duas. Aut detur sequens Electuarius.

R. Spec. Aromat. resati.

Diacitronum an. ʒj.

Cinamomi electi ʒj. 6.

Corticum Citronum &

Rad. Cichorii condiderunt an. ʒj.

Cum f. q. Syrupi conservæ Corticum Citronum fiat Electuarius, de quo somas æger ad magnitudinem nucis juglandis, ter aut quater in die,

Aut:

R. Conserva storax benetica

Resinæ

Satvæ,

Majorena an. ʒʒ.

Specierum Diamorbi ʒiij. cum Syrupo de betonica fiat Electuarius.

Aut:

R. Spec. de gemmis

Lauræ Galeni an. ʒij.

Consolidæ Alkermes &

De hyacinthe an. ʒj.

Conserva storax anglica

Borraginis & Melissæ an. ʒʒ.

Cum Syrupo Conservæ Corticum Citronum fiat Electuarius. Sumatur ut præcedentia. Hæc de Intermit. Nec omittenda sunt externa; idem si propter dolorem & vigilias caput labefactum, & defluxioibus uberiorum factum fuerit, præter optimam viâ rationem & purgantia, etiam per intervallâ cucurbitulæ scapulis applicentur. Quod si carathus ut æpissimè sit, cum impetu ad oculos aut pulmones defluerit, lacteum in Vertice, aut fonticuli in brachiis efformandi sunt, Cucupha quoque ex sequeoibus parari poterit.

R. Rad. Iridis Florentina ʒij.

Syracis Calamita,

Benzoini,

Masticis,

Olibani an. ʒj.

Resarum rubrarum,

Summitatum Majorana &

Flor. Benicæ, an. ʒij.

Melissi ʒʒ.

Incendantur & contendantur omnia grossu modo pro cucupha intertexta, ut artis est.

Corroborat sequens linimentum, si carpi, & regio cordis eo inungatur.

R. Ol. Rosæ fragrantissimi ʒʒ.

Ol. Cinamomi ʒʒ.

Ol. Corticum Citronum ʒj. Misse, An:

R. Ag. Boraginis

Buglossæ, resarum & Melissæ

Aq. Cinamomi an. ʒj.

Acet. rosæ ʒʒ.

Consell. Alkermes,

Spec. Diamorbi dulcis an. ʒj.

Cret &

Captura an. ʒj. Misceantur, hancque Epirhe-

ma, Carpi autem tantummodò lo eo imbutis pulvillis, applicetur repide. Medianibus enim arteriis, vis ipsius facillè ad cor perveniet. Si quis tamen de hoc epithemate regioni cordis applicare voluerit, non errabit, videat tamen, ut lioteis calidis cooperiatur, frigoris eorum pectori & spiritibus vitalibus no-

Bibl. Chirurg. Tom. II.

centissimum esse, omnes scilicet practici. Ventriculorum roboret & concoctionem promovet sequens linimentum.

R. Olei masticis, & mentha an. ʒvj.

Gummi tacamaca ʒj.

Tetantur lentissimo igne & percolentur. Postea admisce olei nucis Muscatæ per expressionem ʒj. 6.

Ol. Garryphylorum ʒj.

Misce, fiat linimentum, quo regio ventriculi usque ad umbilicum quotidie bis inungatur, & linteum calidum apponatur, aut applicetur sequens emplastrum supra alutam extensum.

R. Gummi Tacamaca ʒj.

Ol. mentha & masticis an. ʒʒ.

Dissolvantur lentissimo igne, & per linteum colescent, postea admisce pulv. nucis muscatæ ʒj. Garryphylorum.

Mactis an. ʒj.

Misceantur & cum cera nova q. f. fiat ceratum, applicetur ut dictum est.

Hepar corroborat, obstructionsque insigniter tollit sequens linimentum.

R. Unguenti deopipillativi Foëtii, Ol. lumbicorum an. ʒj. Misceantur, hancque linimentum, quo regio hepatis, totaque venter præter regionem ventriculi inungatur bis in die. Secundam enim concoctionem mirum in modum promovet, Unguentum deopipillativum Foëtii sequenti modo præparatur.

Capis. succi Apri,

Endivie,

Mentha,

Alfimbii,

Petroselinæ vulgaris,

Valeriana an. ʒʒ.

Olei alfimbii

Mentha ana semilibram, Cere citrinæ quantum satis sit. Misce, & ad ignem fiat unguentum f. a. Viscerum obstructions libet, & coque crebrius in jecorariis uritur, addit quodocunque pulvris calami Aromatici, spicæ cardii, sing. drachma una & olei capparum aliquid.

• Sum qui hoc modo etiam parant:

Succi Ebuli ʒviij.

Succi Apri,

Petroselinæ sing. ʒiij.

Succi Alfimbii, &

Iridis singul. ʒv.

Ol. Camphoræ semilibram,

Ol. Alfimbii &

Chamaemeli sing. ʒvj.

Asurgis anatis, &

Callina sing. ʒij.

Fervefiat omnia simul ad consumptionem superiorum. Postea colescent, & cum cera alba & pauillilo aucti patentur unguentum. Hæc Foëtius de unguento suo appetivo, quæ hic insere libuit, cum expertus loquor propter medicamentum præstantiam, tum etiam quod optimus ille vis & de re Medica tam bene meditas, olim mihi cognitus fuerit. Ego ceram non addo, ut facilius altiusque ad subiectas partes penetrare possit.

Lien, si propter vehementiam atque diuturnitatem morbi labefactum, & obstructum fuerit, hypochondrium sinistrum inungendum est sequentibus.

R. Ol. de capparibus &

Regæ an. ʒvj.

Ol. amygdal. dulcium ʒj.

Miscantur,

Aut

R. *Succi cochlearia* &
Nasturtii aquatilis an. ʒij.
Ol. liliorum, *amigd. amararum* an. ʒij.
Pinguetudinis caponis & *ursi* an. ʒj.

Coquantur lentissimo igne ad consumptionem ferè succi, in colatura dissolvantur Amomiaci purissimi, & aceto scilicet dissoluti ʒvj. Ol. nucis Moschatae ʒij. Misce; si interperies calida renum adfuerit, inungantur lumbi, os lactum, & regio renum linimento, antea capite de ardore urinae descripto. Hæc de cacochymia, de qua nonnulli prolapsæ agere nolui. Est enim veluti scaturigo, ex qua lœticia, febres etiales, quartanæ, & quamplurima alia symptomata proficiunt, de quibus omnibus si sigillatim agere vellem, opusculum hocce meum in immensum opus excreveret, & multa jam antea dicta, repetenda essent, quod lectori ingratum foret. Itaque ubi diligenter quis curaverit cacochymiam, reliqua symptomata facillè evitabit. Quod si tamen adventint, Medicus consulendus est.

Cap. 33. De fungis in vulneribus articulo-
 rum crescentibus.

Hæc genus de symptomatibus interitis, tam acutis quam minus acutis agimus. Nunc de externis aliquid quoque annexam, inter quæ fungus inprimis sese offert, præsumque eadem in ipso vigore morbi accidere solet. Estque corpus carnosum, laxum, & ferè indolens, ea ipso fundo vulneris erumpens. Bruno affectum huncce *Nellam*, Theodoricus *Naptam*, & Berapalia *Naptam* appellat. Ego cum Galeno lib. 1. de locis affectis, & 3. Epidem. affectum huncce fungus rectè appellari puelle, caillium. Quemadmodum enim fungi ut plurimum una nocte ea te. ra prorumpere solent, ita etiam excrecentia hæc subitò, vel etiam plerumque una nocte ex ipso vulnere propullulant atque excrevunt. Præterea quemadmodum fungi sunt laxi, molles & porosi, veluti spongia. Fungi propter malam humiditatem terre crescunt, ita etiam excrecentia hæc carnea, propter ingentem affluxum humorum ea toto corpore ad partem laziam subitò propullulat, & quidem in tantam molem, ut plerumque non tantum totum vulnus adimplere, verum etiam ipsius labia & margines obtegere soleat, uti ego in aliquibus vidi. In hoc tamen differunt, quod fungi ea putridis & corruptis rebus excrementis, hæc verò excrecentia ea benignis ut plurimum humoribus nascantur, quemadmodum fulvis diai observatione 36. Centur. 2. Poterò nascuntur fungi in vulneribus articulo, propter maximum quidem continuam humorum, ea toto corpore, sed summa naturæ providentiæ & beneficio Dei. Cum enim nihil magis inimicum sit nervis, quam injuria aeris, præsertim frigidi, natura, quæ semper studet, ut conservare possit suum individuum, excrecentiâ hacce nervos, aliasque partes nervosas fasciatis & detectas, veluti culcitullâ plumæ tegit atque cooperit, ne videlicet nervi, uti diai, tum ab aère, tum etiam inter curandum & abstergendum vulnus, lædantur. Idem in vulneribus capitis, ubi membranae cerebri detectæ sunt, sepius acidissimè memini, ut lector videre poterit Obf. 14. & 15. Cent. 1. Solent autem fungos hinc comitari dolores ingentes, inflammationes & plura alia symptomata, de quibus antea cap. 4. dictum fuit. Hinc Chirurghi nonnulli commoti (existimantes excrecentias hinc causas esse symptomatum) eas forticibus, aut novaculâ abscedere, vel

causticis abrodere, non sine ingenti damno & periculo ægri. Adacta enim fuerint symptomata omnia, præcipuè ab erodentibus, quorum acrimonia fungosam hancce substantiam ad nervosas partes detectas, facillè penetrare, easque lædere possunt. Ab initio itaque horum fungorum præscripta Methodus, ratione hujus fungi, non est mutanda. Sed in debellandis reliquis symptomatibus, veluti sunt dolor, inflammatio &c. progrediendum. Sunt enim, ut ea præcedentibus colligitur, summo naturæ beneficio excrecentia hæc in commodum ægri sit procreata, non est absumenda ab initio, donec nervi partesque nervosæ carne latius fuerint tectæ, ut amplius ab externis injuriis lædi non possint. Sedato dolore, remissaque inflammatione, reliquique symptomatibus, si fungosa excrecentia non temerit, eis quæ efficaciant, deprimenda est, à lenioribus tamen incipiendum. Primò itaque sequens pulvis, qui caliccat, extra omnem tamen mordicationem, inspergendus est,

R. *Rad. Iridis Florent.*
Angelica an. ʒiij.
Arisoloch. rotunda, &
Cerium ligni guajaci an. ʒij.

Misce, & in copia fungo insperge, postea sequens applica cataplasma.

R. *Farina fabarum* & *Lupinorum* an. ʒiij.
Fini columbini ʒij.
Pulv. Rosarum rubearum
Myrrillorum
Balaustiorum
Absinthii an. ʒij.

Salis Marini ʒij. Cum linaivo simpliciter, fiat cataplasma, applicetur calide bis in die, insperso prius pulvere prædicto, & filamentis aded contexto, ne nihil humiditatis à cataplasmate ad fungum pervenire possit, ne propter acrimoniam Cataplasmatum fungus irascatur. Hoc per dies aliquot applicato pulvere, si fungus non succedet atque immineat, accipe prædicti pulveris ʒij. cui admisce Aluminis ulsi ʒj. vitrioli ulsi, & pulv. Mercurii præcipitati, rectificati, & loci an. ʒss. Misce & insperge, uti dictum, cum applicaveris Cataplasmatum. His remediis semper fungos in articulo vulneribus scilicet sanavi. Quomodo verò in fungis cerebri sit procedendum, vident lector Obf. 15. Centur. 1.

Monitos autem velim esse Juniores Chirurghi, fungos in articulis, uti etiam quæa denudatis meningibus cerebri prorumpere solent, etiam si non illic & subitò, sed pederentim te. rocedant, nequaquam tamen erodenda, multò minus sepius applicanda esse, ea enim in vulneribus capitis mortem accelerant. In vulneribus verò articulo, dolores, inflammationes, aliasque gravissima symptomata de novo exacerant, curationemque retardant.

Cap. 24. De atrophia post Ichorem aut Meliceriam acrem articulo, exulceratorum, ejusque curatione.

Quia plerumque Ichorem & Meliceriam acrem articulo, exulceratorum, atrophiam sequi videmus, non abs te esse diai, si in gratiam tyronum Chirurgie, de ea hic quoque aliquid annexerem. Est acrem Atrophia, ut docet Galenus, de symptomatum causis lib. 3. privatio citra noxiorum adionem, ac deficiens nutritio. Etque vel universalis vel

vel particularis. *Universalis* est, quando totum corpus contabescit, extenuatur & absumitur: *particularis*, quando aliqua saltem pars ita afficitur: utramque post Ichorem accidere possit, sæpius tamen in praxi videre consigit, uti postea exempli demonstrabo. Fit autem quando vel totum corpus, vel saltem pars aliqua, Liguine, fucco & spiritibus ad sui nutritionem & viam requisitis privatur, idque in Ichore aceti, ex articulis producente, hoc modo fit. Quotiescunque propter doloris vehementiam ac diuturnitatem, propter vigilias item, inquietudines & febris vehementiam, interna viscera, interempte calida vehementer diu (ut sæpius in hoc morbo) molestantur, afficiunturque, ventriculus, hepatis, lien, ac reliqua partes, concoctioni primæ inservientes, imbecilles fiunt, ita etiam, ut plerumque propter diuturnitatem morbi & prædictorum symptomatum vehementiam, mesenterium, hepatis ac lien, non solum imbecilles fiant, verum etiam plerumque in seipsum indurecant. Ex imbecillio itaque ventriculi seipsum indurecant. Ex imbecillio itaque ventriculi seipsum indurecant, ex illis & imperfectis sequitur, ita cum ad venas mæstasias & hepatis pervenerint, obstructions sanguinem crassum, viscosum, & ad nutritionem partium ineptam gignit, propter crassitatem enim & viscositatem, quam habet, ad vias illas angustissimas, venas capillares, & partes extremas & musculosas permeare non potest; contabescunt itaque partes, sequitur atrophia universalis, uti videmus accidere tum in morbis Chroniis, tum etiam in acutis, & Ichore aceti articulo, si in longum tempus protraxerit. Vidi id in quadragenario quodam civis Lausannensis, Claudius nomine, cuius mentionem quoque feci capite primo. Ille enim cum ab initio morbum neglexisset, tandem propter doloris reliquorumque symptomatum vehementiam in maximam cacochymiam incidit. Inde sequuta est atrophia universalis, ita ut ossa vix carie obtegerentur. Ex qua nunquam perfecte sanari potuit. Erat enim pauper, non habens unde requiratur victus rationem observare possit. Vixit quidem per annos alii quot, sed miserè claudicans per totam vitam.

Anno 1622. juvenem Bernensem 12. annorum, Jacobum, Dni Jacobi Hübneri p. m. Filium, Ichore aceti circa talum tam graviter laborantem, ut barbitonator, cui curatio demandata fuerat, ipsum pro deplorato reliquerat, curandum habui. Ille similes propter symptomatum vehementiam in tantam atrophiam incidit, ut corpulculum suum universum portus skeleton, quàm vivum corpus præ se ferret. Maximo cum labore tandem à me sanitati restitutus fuit. Ex atrophia quoque propter juvenilem ætatem, optimamque, quam observare potuit, victus rationem, convaluit, & non sine ulla ferè claudicatione incedit, currit ac saltat. Quid non potest juvenilis ætas? Sed de hoc ægero alibi tulsus. Fit quoque atrophia universalis, quando partes indurecant. Impedit enim quo minus chylus ex mesenterio per venam portam ad hepatis pertransire possit, uti Lector videre potest Obs. 70. Cent. 1.

Atrophia particularis propter defectum atque penuriam sanguinis & alimentum, membro quoque alicui peculiari accidere potest, reliquo corpore existente integro, varias ob causas, imprimis verò si dislocationes circa magnas juncturas, veluti coxas & humeros, sive ex causa interna, sive externa acciderint, & in summa naturalia repositæ non fuerint. Tunc enim caput ossis, extra locum suum delapsum, venas, per quas sanguis defluere solebat, comprimit, inde brachium aut

etiam, nutrimento suo destituitur & contabescit. Si tuberculi duri, aut scitri circa majora vasa, vel si inflicto vulnere abscessus aut præter modum arcte ligata fuerint, idem accidere solet. Atrophia verò post Ichorem acrem articulo, accidit, non quidem ob dislocationem, sed primò, quia vena aliqua magna ab Ichore isto aceti, ex valvulis citæ coxam aut humerum effluxu, erosa fuerit. Secundò, quando serosa illa materia ex corpore ad genus, pedes aut manus, cum impetu & in copia fluit, fit plerumque ut subtiliores partes ultra ad pedes, vel manus perfluant, quicquid autem crassum, vel viscosum est, circa humeros aut coxas remaneat, viasque, per quas alimentum fluere solet, obstruat. Tertiò fit atrophia post Ichorem acrem, quando pars afflicta propter tuorem imbecillitatem nutrimento non attrahit, atramentum non satis rectè concoquit, minus in nutrimentum convertit. Quando accidit atrophia, quando pars aliqua corporis, puta brachium, aut crus, uti sæpius in hoc morbo, diu non movetur, motus enim partes corporis impinguescit. Testatur id Hippocrates lib. de Artic. lvs verbis: *Omnia quæ in corpore ad usum facta sunt, si quis moderatè usque utatur, & in his laboribus exercet, ad quos singula sunt assueti, sic quidem facta sunt, & augescunt, & probe coequeant, si verò qui non utatur, sed quiescat, morborescunt, & non augescunt, & cito coequeant.*

De signis ut quicquam commemorem, supravacaneum est, Morbus enim per se satis manifestus, omnibusque cognitus est, minimè tamen negligendus, præsertim si atrophia universalis fuerit. Arguit enim, ut ex præcedentibus manifestum fit, intereorum viscerum, præsertim ventriculi, partiumque concoctionis intervientium, hepatisque (quod officina & leaturio & sanguinis & alimentum, quo totum corpus nutritur) summam adesse imbecillitatem atque labefactionem, imò tantam, dico, adesse, labefactionem, ut sanguinem pro nutritione corporis sufficienter generare, malè minus ad partes longinquas mittere, minus sit potens. Si senex post Ichorem acrem sit claudus, vix ab atrophia curabitur, præsertim si victus rationem exactè non observaverit, uti ex præcedenti historia de Lausannensi, colligere est. In juvenibus verò non ita est periculosum.

Atrophia ex inveterata dislocatione in senibus incoriabilis est, in juvenibus oòo item. Vasa enim ab ossis compressa, quia nondum induruerunt, paulatim aliquo modo prolongantur, ita quidem, ut sanguis ac spiritus pro nutritione partis commodè perfluere possit.

Atrophia si propter majorum vasorum, arteriarum videlicet & venarum erosionem, uti sæpius in Ichore, fuerit, insanabilis est. Si propter tumores duros & scirrhosos, vel denique propter retentam aliquam materiam crassam & viscosam circumcirca vasa majora, aut in ipsorum vasis fuerit, nonnulli maxima cum difficultate sanabuntur: præsertim in senibus.

In curatione atrophie tam universalis quam particularis, semper ad causam respiciendum est. Ablata enim causa, tollitur quoque effectus. Si itaque propter obstructionem atque labefactionem viscerum, & appetentiam prostratam, fuerit atrophia, uti sæpius in post Ichorem acrem articulo, viscera suæ referenda & corroboranda; idque fit medicamentis, tam per os sumptis, tam

etiam ceteris adhibere, non neglecta victus ratione, de quibus omnibus capite præcedenti satis dictum fuit, superest itaque de cibis insigniter nutrientibus, qui in hoc affectu magnopere requiruntur, aliquid adhibere. Ante omnia autem sciant juniora Medici & Chirurgi, dandum esse operam, ut corpus, quantum fieri potest, sit mundum. Impura enim corpora, à cibis etiam optimis & insigniter nutrientibus, non nutriuntur, sed magis magisque pravis humoribus replentur. Quicquid enim boni ingeritur id à pravis & viscosis humoribus, visceribus inclusis, contumitur. Testatur id Hippocr. lib. 2. aphor. 10. quibus autem medicamentis corpus leniter sit expurgandum, capite de cacochymia dictum fuit. Nutrimenta omnia sint calia, quæ concoquantur digeranturque facile, & bonum succum procreant, quod natura eis substantiam corporis edificatam atque extenuatam, partes etiam procul à fonte caloris nativæ sitas, sine magno negotio irrorare, humectare atque reficere possit. In primis conveniunt jussula carnis boum juniorum, veterum, gallinarum, caponum, perdicum, columbarum & similibus, in quibus vitella ovorum dissolvantur, poterunt quoque cum prædictis jussulis amygdalæ aut pistaciæ dissolvi, & veluti amygdalarum exhiberi, hujusmodi jussula faciliè concoquantur, & in nutrimentum transunt. Cavendum tamen, ne extremitates animalium, siue fuerint quadrupedum, siue volatilium, addantur. Continent enim in se succum ac nutrimentum nimis viscosum, quod obstructions parit. Capite de cacochymia jussulum, quod Regium appello, præscripsi, quo ego sæpius maximo cum fructu in eis, qui propter cacochymiam vel hydropem extenuati erant, usus sum, quod & hic summopere convenit; non tantum enim nutrit, verum etiam obstructions simul aperit, & proinde chylus atque nutrimentum, quod ex eo provenit, faciliè etiam ad longinquas partes corporis pervenit. Insigniter nutriunt cymor hordei, & avenæ decorticatæ; præsertim si gallinam, caponem, aut frustum carnis cervicis jussulo simul incoxeris. Cavendum tamen, ne præter modum coquantur hordeum aut avena, ne nimis viscosum reddatur jussulum. Convenit quoque usus lactis in atrophis, inprimis autem lac muliebri, uti & vaccinum, ovium, & asinum. An. 1597. matronam 63. annorum curandam habui, illam, quam propter herniam intestinalem, in gangrenam degeneratam, præter modum extenuata & emaciata fuisset; remissa febre, beneficio lactis muliebris post Deum in integrum restitui, & in 15. usque annum post curationem supervixit. De gravissimo hoc affectu videt Lector Obi. 55. Cent. 1. Singulis autem institutionis, absolvere somno, maximum habuit lactis ex juvencula, & optimo corporis habitu prædicta, tussis, ad lectum ægri emulsi, ægre propinavi. Deinde circa decimam prædixit. Aliud habeo exemplum memorabile de præstantia lactis muliebris. Dn. Jacobi de Teibus Paterniacensis filiolus, 4. annorum ætatis, post Dyssenteriam gravissimam Lyncæria correptus fuit, quam secuta est periculosa atrophis, ita ut ossa vix cute obtegerentur. Jussula & quicquid assumeret, indigeste iterum per fecalem excrebatur. Sussu ut mater infans semelstem, quem lactabat, nutriti aliquid committeret, periculum fore faceret, an atrophiam hæcce ac summam emaciationem corporis, cum labefactione virium, lacte suo reficere posset. Mater consilium, infans vero papillas celeriter arripuit, & cum aviditate exsurrexit, omnemque cibum in postera recipuit. Hæc

cum ego viderem, & de salute ægri spem aliquam conciperem, singulis diebus regionem ventriculi, totumque abdomen sequenti unguento bis calidè laungete jussi.

R. Mallicis &
Mentha an. ʒi.
Ol. nucis Muscat.
Gummi Tacamaca pinguis ʒi.

Terantur omnia lentissimo igne, percolentur & referantur in vase vitreo. Hisce prædictis convaluit, & permultos annos supervixit; Egregiè quoque nutriunt vitella ovorum, & quæ ex eis consuecuntur edulia, modò ne sint dura cocta. Instaurativum longè excellentissimum hoc modo præparo, ægris quæ ex morbo præter modum extenuati, maximo cum fructu exhibeo. Accipio caponem, vel eo deficiente gallum aut gallinam extenuatam, extremitatibusque abscissis, carnem ossaque nonnihil contundendo, postea in vas stanneum amplum atque spaciosum projicio, addo nonnihil cinamomi, & si in promptu est, perdicem. Poculum siue vas stanneum, velica bovina madefacta, lineæve forti diligenter clauda, & in duplici vase coquo per horas sex; per se refrigerato fere potulo, siue vase, carnem per pannum colo, succumque carnis ægro exhibeo. Est enim præstantissimum nutrimentum. Adjiciant nonnulli aurum, corallia, lapidesque pretiosos. Id unicuique integrum est, ea vel adhibere vel omittre. Ego cum aorthismo D. Sennerto & aliis sic sentio, ea ita fixa & compacta esse, ut coquo vis hoc modo extrahi nullo modo possit. Nonnulli quoque carnes, adjectis coralliis, margaritis & auro per alembicum distillant, sed revera parum nutritæ aquam, quæ effusillat, expertus sum. Nam alimentosa pars carniū viscosa & stabilis est, difficulteque transpirat, ne Galenus lib. de Ma. coc cap. 9. scribit, quapropter addit Sennertus, glutiū instat habet, seu ut Chymici loquuntur, minus volatilis, sed fixior est, quam ut calore balnei in alium artolli possit. Quicquid verò in alium balnei illo calore elevatur, maxima ex parte vapores æqui sunt, qui nullam nutriendi vim habent.

Aliud instaurativum longè excellentissimum phthisicis extenuatis, & atrophis laborantibus, hoc modo conficere soleo; Accipio carnem illam musculosam, quæ sternum caponia vel gallinæ opplet, probè coctam, & minutim conciam, projicio illam in mortarium, & adjectis nucleis pinearum, pistacearum, & amygdal. dulc. ana. ʒi. 6. Omnia pistillo contundendo, cum jure caponia, quantum satis, addo nonnunquam aliquid sacchari, vitellum unum aut alterum ovi, parumque aquæ rosacæ, & inter duos catillos super carbonem coquo ad consistentiam poltæ. Nutrit quoque plurimum caro perdicum, turdorum & avium nemoralium, caro gallinæ siue rusticæ, non tantum nutrit, verum & in obstructions convenit. Pisces parum nutriunt, si quis tamen per intervalla eis ut voluerit, saxatiles, veluti trutæ, perca, salmonem, lucium; item carnem caudum & chelurum, gammatorum, & hujusmodi eligat.

Pro potu utatur æger lacte amygdalarum dulcium, aut emulsionibus pistacearum, & pinearum, vel decocto hordei, Liquiditæ, & ovorum passularum extractatum, saccharo, vel quod melius est, mellic despumato, parumque Cinamomi, aromatizato; Vinum, si æger bibere voluerit, subdulce, sibi bene desecatum, vetus, minimeque generosum sit.

Qui

Qui cerevisiâ utuntur, eligant sibi cerevisiam quàm optimè defecatam, bene coctam, nec nimis recentem, crassam item & spissam. Crassa enim cerevisiâ quia plurimum frumenti habet, plurimum quoque nutrit. Hæc de cibo ac potu. Quoad exercitium, sit illud modicum; Sin verò propter imbecillitatem corporis deambulando aut equitando æger sese exercere non poterit, fiant frictions, primò cum linteo calido, postea cum succo lumbriorum, cujus modum præparandi præter Lechot ex tractatu meo de Gangrana & sphacelo capite 13. in fine. Frictiones bis in die fiant, præcipue tempore matutino, antequam æger Lecto egrediatur. Tunc enim quila potui linte aperit, medicamentum facilius penetrat. Aër sit temperatus, calidus & humidus, somnus & vigilie mediocres conveniant.

In Atrophia parietali, commetaturata omnia, videlicet victua ratio, exercitia & frictions, inprimis verò succus lumbriorum, & oleum nostrum de raris, uti & aqua, quæ in præparatione colligitur, mitum in modum conveniunt. Oleum meum de raris sequenti modo præparo.

R. *Ranarum vivientium novæ. XII.*

Lumbriorum in aqua latorum M. li.

Florum & foliorum leonicæ

Jovæ arabicæ an. M. ij.

Rosmarini

Majorana

Florum primulae Peris

Seseli

Chamemilla

Meliloti an. M. j.

Omnia cum raris & lumbriis incidantur, & in mortario conquantur, projectis postea in cucurbitam affunde.

Aqua Juniperi sine vino distillata lb. vj.

Olei olivarum lb. vij.

Axung. humana

Felis

Canis &

Muris Alpini an. ʒij.

Mancant in infusione horas 24. postea cucurbita sub capite recta, ponatur in arenam, & tam diu coquantur, donec tota ferè aqua sit exstillata. Oleum adhuc tepidum per prælum exprimat, & reservetur ad usum. Odor, qui aliquantum gravis est, additione nunc olei salvie, nunc Olei granorum Juniperi, spicæ, vel ol. ex floribus Slocani, emendari poterit. Aquæ, quæ exstillavit, & in ampulla spaciola collecta fuit, sequentia adde.

Cinamom. opimi

Gariophyllorum

Nucis Mystica

Zinciberis

Curcumæ

Macis

Cardamomi

Piperis ana ʒij.

Cerei ʒb.

Contundantur grosso modo; misceantur fiatque infusio in prædicta ampulla, per Mensem integrum. Aqua hæc per inclinationem & expressionem separata, præstantissima est in affectibus nervorum & nervosorum partium: dummodò inflammatio aut interperies calida non adfuerit. Manifestè enim

corroboretur, & circa nervos & articulos humores frigidos absumit. Odor ipsius aliquo modo gravis additione aquæ granorum Juniperi, spicæ, aut Cinamomi caltigatur. Oleum similiter, ut dixi, coctum, postea per prælum expressum, in articulos nervosorum partium dolentibus, & proinde in Ichore & Meliceria. Celsum tumum est remedium.

In præparatione autem & coctione hujus olei id observandum est, totam illam aquam Juniperi, quæ herbis affusa, simul & succum ranarum & lumbriorum nequaquam elici posse. Oleum enim, quod aquæ supernatât, & in opere spatula in alembico deturbati & agitari non potui, impedit, quo minus tota aqua exstillet. Post distillationem itaque expressum oleum à subsidentia separandum, & seorsum conservandum est. Idem de Subsidentia Olei intelligo, quæ separatim quoque in ampulla per annos aliquot conservari potest, dummodo oleum commune sit assatum; Subsidentia hæc utor in cataplasmatibus, lumentis, aliisque medicamentis dolorem sedantibus, dislocantibus, & resolventibus. Propter succum enim ranarum & lumbriorum, præstantissimum est medicamentum, quapropter etiam in colicis doloribus, ubi & Dykenteria utiliter Clysteribus admiscetur.

Si oleum de raris in promptu non fuerit, poterit sequens linimentum,

R. *Oli. lumbriorum ʒij.*

De piperibus de Euphorbia

Seseli an. ʒj.

Oli. granorum Juniperi ʒij.

Misceantur, vel

R. *Axungia Equi Ramschmaltz*

Axungia humana

Ussi

Muris Alpini an. ʒj.

Misceantur & addantur Lumbriorum exsiccatorum, & subtilissimi pulv. ʒj.

Euphorbiæ

Piperis longi

Pyreni an. ʒj.

Misceantur, fiatque linimentum; quo tota pars affecta quæcidè bis calidè inungatur, donec ruborem concipiat.

Si durities aliquo in loco parva affectu adfuerit, & transactum nutrimenti & spirituum retardaverit emollienda & resolvenda est sequenti fomento,

R. *Radices albæ*

Liliorum alborum

Bryonia &

Ebuli ana ʒb.

Falorum albæ

Malvæ

Betonice

Florum Chamemilla

Meliloti

Sambuci ana M. ʒij.

Seminis lini

Fenigraci an. ʒij.

Anisi ʒj.

Incidentur & contundantur omnia grosso modo pro sacculo interfuro, qui aqua coquendus & calidè applicandus est, ter quaterve in die, post fomentum inuncto loco affecto oleo lumbriorum, liliorum alborum & ungu. de albæ, emplastrum de

Mucilagibus; vel Ocyphi Philagii aut de rana sine Mercurio; convenit & emplastrum de Ciente, mirum enim in modum emollit & resolvit.

Cap. 25. De rigidis & in unum concretis articulis, post curatum Ichorum & Meliceriam.

Frequentet post curationem Ichoris & Meliceriae, juncturam adeo rigidam & induratum remanere vidimus, ut neque in hanc, neque in alteram partem deflecti possit. Hinc plerumque in longum tempus Chirurgus diu multumque laborare videt, quo juncturam, nervos & ligamenta emolliri possint, sed oleum atque operam perdidit. Ichor enim ille, qui ex toto corpore ad articulum vulneratum fluit, & ut antea dixi, acrimoniam contrahit, primo ligamenta & vincula, quo articulum cingunt, deinde etiam cartilagine, quibus junctura incrustata est, erodit & absorbit. Hinc se, ut ossa à suis cartilaginibus & vincula denudata, inter se per callum (quod ante me nullus, quod sciam, observavit) tam firmiter coalescant, ac si nunquam ea in parte fuisset articulus. Hoc multis paradoxum esse videbitur. Ego verò expectus loquor. Habeo enim in Museo meo ossa in Camæteris & os suarii reperta, in quibus id evidenter apparet: & primò ossa brachii sinistri, hominis consistentis ætatis, quæ in cubito mediante callo tam firmiter & eleganter sunt connexa atque concreta, ac si continuum esset os, ac nunquam adfuisset junctura. Hoc quia, ut dixi, à Medicis nondum, quod sciam, observatum fuit, figuram horum ossium annexere placuit. (Vid. Tab. VIII. Fig. 1.)

Hujus connexionis ossium in cubito causam fuisse fracturam ossis brachii, & fracturam non satis rectè repositam fuisse, exuberantiz, & promineutiz Calli A. & B. notatz, fidem faciunt. Propter asperitatem itaque & prominentiam fragmentorum ossis fracti, sequutum fuisse dolorem maximum, inflammationem & affluxum ingentem humorum cubitum versus, verisimile est, inde in cubito hydrarthros ortus fuit, à quo primò erosæ fuerunt ligamenta & vincula, quæ articulum cingunt, ita ut humor ille lentus ac viscidus, qui articulis naturaliter inest, affluerit. Postea à prædicto Ichore acii crustula illæ cartilagineæ, quæ appendicæ ossium regunt, erosæ quoque fuerunt, & ita quidem, ut partes spongiosæ apophysium tam ossis humeri, quam etiam radii minoris, & facili majoris invicem attingerentur, inde factum est, ut ex nutrimento, ad utrumque os dilato, callus productus fuerit. De miranda hæc confectione ossium videat lector Obs. 77. Cent. 3. & Epistol. ad Dom. D. Pavium Anatomicum celeberrimum.

Habeo præterea in Museo meo oulei, hominis ætate propecti, in ossuario repositum. In hoc osse caput femoris suo acrobulo tam firmiter simul & eleganter innatum est, ac si cum osse coxendicis unum & quidem continuum esset os, ita os an unquam ibi fuisset junctura, non nisi artis peritiam fecit, ut ex annexa figura appareat. In qua partem suam agræ opposui, ut affectus eo melius cognosceretur. (Vid. Tab. VIII. Fig. 3.)

Ex ætali autem inspectione etiam manifestum sit, femur à majore, sive extremitate processu, usque ad internam, sive minorem, ubi os signatum est, olim glande plumbea trajecit, mirumque in modum contraxit, & quamplurima ossicula ex-

tracta fuisse, hinc femur brevius altero evasis, ut ex figura appareat. Globulum autem plumbeum prædicto modo os perforasse, inde conspicere licet, quod foramen in osse circa processum majorem parvum, ex adversa vtrò parte ostenditur, magnum exiit. Experientia enim docet, globulum in suo ingressu parvum, in egressu vtrò magnum relinquere foramen. Porro cum femur iam prope juncturam perforatum, mirumque in modum tractum continuatumque fuisset, dolores ingentes, & affluxus humorum supervenissent, erosæ fuerunt ligamenta & cartilagine, ita ut caput femoris cum suo acrobulo mirando quodam modo in unum concreverint. Vidi id quoque in aliis corporis juncturis & præsertim in digitis. Habeo præterea in Museo meo etiam integrum, hominis consistentis ætatis, in quo femur cum ossibus in genu ipsio tam eleganter connexum est, ut ne Vestigium quidem juncturæ appareat. Iud & rotula ipsa, mediante callo tam archè annexa est genu, ut nullo modo separari possit, sed ita incurvatum geos ut cerum sit illum gualia in celsisse. Addidit effigiem hujus crucis, sed verò lectori odiosum esse, librum figuris minus necessariis onerare. Mirum autem, vestigium tamen est, plerumque ex connexionem hæc ossium, membrum non debilius, sed robustius, quam non fuit antea, evadere, dummodò in curatione, membrum, ut postea dicam, inscio minus collocaum fuerit. Exempli vidi primum in rustico quodam in agro Bernensi, de quo vide Cap. 2. hujus tract. Item Cent. 4. Obs. 88. Ille enim aliquoties sanctè mihi affirmavit, se in hac manu post curationem plus roboris, quam antea habere. Aliud exemplum annotatione dignissimum vidi Coloniz Agrippinz, in nobilissimo quodam viro, ad quem una cum Clarissimo viro Dom. Henrico Sæpide, Medicinæ Doctore celeberrimo, & Regnero Salano, pharmacopæo excellentissimo, vocatus fui An. 1612. 6. Septembris. Ille ante aliquot annos ad dextrum cubitum vulnus ense receperat. Ex quo gravissima symptomata orta fuerat, tandem quoque Ichore gravissimo, ossiumque in cubito connexio sequuta est, & ita quidem, ut junctura rigida & immobilis facta fuerit. Infinitorum propemodum Medicorum, Chirurgorum, atque agyrtarum, consilio usus fuerat, sed frustra. In hunc itaque finem accersitus fuit, ut ex me intelligeret, an Medicamento aliquo apio atque idoneo, durities atque rigiditas illa arisniti tolli, ac membrum in integrum restitui possit. Quam verò ipsi significarem, ossa ipsa in cubito per callum connexa esse, non tantum ipse eger, verumetiam adstantes omnes non parum admirati fuerunt & de hac connexionem articulozum, se nunquam audivisse, neque apud alios legisse, affirmarunt. Commemoratione autem dignum est, nobilem huncce virum hoc brachio aliquantulum intorquero, tam robustum, tamque validum fuisse, ut cuius etiam robustissimo viro, in certantibus, par propemodum fuisset. Ance omnia autem necesse est, ut Chirurgus perpendat, an articulum prædicto modo coalescit nec ne? Si enim per callum connexum fuerit, frustra erunt omnia, quæ adhibebit. Vidi id Anno 1618. in Basiliensi quodam viro juveni, cui propter Ichorem & Meliceriam cubitus connexus, & ita concretus fuit, ut junctura nullo modo moveri, flexi, aut extendi possit. Ego cum una cum Clarissimo & doctissimo viro Dom. Joh. Frederico Wartenbergio, Doctore Medico Celeberrimo, in consilium vocatus essem & coalitionem hanc juncturam observassem, etiam omnia frustra futura prædicavi.

fig. 1.



fig. 2.



fig. 3.



figure 4 & 5.




fig 10.






figure 8 & 9.



figure 6 & 7.



mus, turgent tamen patentes, ut testatim, ut vocant, cupationem instituerimus. Corpus itaque purgavimus, fomenta, olea, emplastra, & Cataplasmata Emollientia per mensem terè integrum applicavimus. Deinde ad Instrumenta sequenti capite delineata perveimus, omnia quæ tutati potuissè, tenuimus, verum laboris nostri fructu & industria privari sumus. In hujusmodi itaque affectibus nihil aliud tentandum est, quàm ut membrum corroboretur, de quibus posthac capite 30. dicemus sum.

Interim autem dum Chirurgus circa articulos, hoc morbo affectos, occupatus est, si de concretionem ac coalitione juncturæ dubitaverit, necesse est, ut maturè pendat, quoniam situs membri aptior commodiorque fururus sit ægro? Si enim brachium in cubito malè affectum fuerit, præstat ut sit incurvatum potius, quam rectum & extensum. Idem de digitis censendum est. Sciat tamen Chirurgus, digitos hoc modo affectos, non semper incurvari posse. Si enim ulcus ea interna parte digiti, & nervi digiti flexentes erosi & putrefacti fuerint, digitum verò extendentes illi permanserint, via fieri potest, ne digitus incurvetur. Sin verò nervus digiti extendens erosis fuerit, facile incurvabitur digitum. Cum crure verò longè alia est ratio: si enim anulum genu, aut coxam infestaverit, longè commodius erit ægro, si crurum eademque, quàm si incurvatum fuerit. Incurvatio enim crure, æget absque gralla via incedere potest, ut ego in aliquibus vidi. Apparet id quoque ea præcedenti signa, ubi caput femoris non solum acetabulo suo adhæret, sed & in transversum detorium est, ita ut ægri nunquam incedere imò nec gralla uti potuisse, ea sirosis factis appareat. Videat quoque Chirurgus ut ossa, interim dum per callum connequantur, rectè se arctant, ne unum ad iatus alterius caribetantiam deformitatemque faciat, & imbecillitas perpetua illius membri sequatur.

Cap. 26. De retractis nervis, & incurvatis juncturis, post Ichorem & Meliceriam.

Retrahuntur plerumque nervi in hoc affectu, & incurvantur juncturæ, sine coalitione tamen ossium. Cum enim, propter dolorem maximum ac diuturnum, æget membrum extendere non possit, retrahantur nervi, & à calore ipsi præternaturali ac inflammatione, quæ membrum lasso infestat, exsiccantur, & acidi sunt, ita ut postea non nisi maxima cum difficultate extendi possint.

Diligenter autem hic affectus cum præcedenti distinguendus est, ne error in curatione committatur; si enim articulus per callum conctus fuerit, frustra adhibebuntur omnia, sin minus, curatio sequenti modo instituat. Primò observanda est optima victus ratio. 2. Corpus clementer caputandum, de quibus in præcedentibus abundè dictum fuit. Tertio, omnibus modis homedandi, & emolliendi sunt nervi, partesque nervosæ, ubi sequens convenit fomentum.

R. Radicum albae
Liliorum alborum
Benion &
Ebuli an. ʒʒ.
Foliorum & stirum benionie
Iva arabica
Rosmarini
Majorana an. M. ʒ.
Florum chamemilla

Meliloti
Sambuci an. M. ʒ.
Seminis lini
Fenigraci an. ʒʒ.
Amyg &
Austri an. ʒʒ.

Incendantur & contendantur omnia grosso modo, coquanturque in jure capitis & pedum viruli aut vervecis; in hoc decoctum immergatur membrum malè affectum bis aut ter id die, per horam unam aut alteram, prout ægro libuerit. Aut fiat sacculus ea præscripta herbis, qui in prædicto junculo coquatur, calidè applicetur, & per noctem relinquatur. Abstracho sacculo, & linetis calidis absterfo membro, inungatur sequenti linimento calefacto.

R. Olei nostri de tanis, cojas descriptionem habes cap. 24.

Ol. ex floribus an. ʒʒ.
Ol. Lumbicorum
Pulpi
Amygdalarum dulcium
Pinguetinis Maris Alpini an. ʒʒ. Mifet.
Aut

R. Ung. de albica ʒʒ.
Pinguetinis humanæ
Anseris & caponis an. ʒʒ.
Ol. Lumbicorum ʒʒ.
Ol. Granorum juniperi ʒʒ. Mifet.

Post lunctionem applicetur emplastrum aliquod insigniter Emolliens, uti est Empl. de Meliloto, de Macclaginibus cum gummiis, vel Emp. Ocyphi Philagii. Hoc modo bis in die cutandus est affectus, donec satis emolli sit crur, & junctura ipsa. Tum adaptandum est membro unum ea sequentibus instrumentis (Vid. Tab. VIII. Fig. 4. & 5) stupis, gossypio, lintelisque munitum, quod dies noctelque relinquatur, & pro arbitrio, & secundum tolerantiam ægri extendatur & incurvetur. S.ogulis tamen vel alternis diebus instrumentum amovendum, membrum inuagendum, Emplastrum quinetem renovandum est. Horum instrumentorum beneficio membrum incurvatum extendatur, lente tamen, ne dolore oriantur, & gravissima symptomata de novo subsequantur. Omne violentum enim periculolum, Interim autem dum genu appositum est instrumentum, drambulando blandè se se. si ullo modo fieri potest, exerceat æget. Sin brachium incurvatum fuerit, tunc autem sum, nunc retrosum, sursum aut deorsum moveatur.

Cubitos incurvatos nunquam, sine prædicto instrumento, in pristinum statum reduxi hoc modo, Jossi ægro, ne præter prædicta Emollientia singulis horis manu pondetofum quid, veluti abentem lapidibus oneratum, attriperet, & drambulando hinc inde portaret. Est quidem cætemporaneum sed non spernendum præsidium, quo in multis felici cum successu usus sum, etiam hoc Anno 1632. in filio nobilissimi ac strenui viti Dom. Jodoci à Diesbach &c.

Instrumenta ad cubitos & genua incurvata, ex magna Chirurgia Gualteri Riff depremta.

Aot ntere sequenti Instrumento, ea nostra inventionone, quod quivis parvo cum negotio & sumptu habere, & tam ad genua, quàm cubitos incurvatos, adaptare potest: (Vid. Tab. VIII. Fig. 6. & 7.)

Instrumenti præfigurati Explicatio.

Capfulam ex ligno fabricatam, tam in prima, quam in secunda figura denotat.

Annulus est ex lamina ferrea, ejus latitudo, ut genu totam possit amplecti, fabricatum. Is autem in prima figura apertus, in altera vero clausus, & genu amplectens conspicitur. Ut autem eò melius adaptari possit, pars illa, quæ rotulam respicit, aliquantum excavata sit, necesse est.

Torcular exitiit, beneficio cujus annulus capsulam versus trahitur, aut quantum opus est, in altum elevatur.

Tam in prima quam secunde figuræ parte una claviculum, altera vero foramina denotat, quorum beneficio, in annulus tantum, quantum necesse est, constringitur vel laxatur.

In prima figura cardines, quibus annulus clauditur aperturæ, denotat. Aperto itaque annulo, collocataque tibia in capsulam, annulus circumcincta genu adaptandus est, stupisque undique & lineis muniendus; postea clavis & foraminibus, D. D. D. notatis claudenda. Habet præterea fibulas duas, F. F. F. denotatas, & lota duo G. G. G. signata, quorum beneficio tibia capsulæ alligatur. Circumdactio præterea torculari C. C. notata a dextra in sinistram, annulus, simulque genu, capsulam versus trahitur, extenditurque tibia tantum, quantum Chirurgo opus esse videbitur. Porro torcular ut libere in annulo circumvolvatur, necesse est; ideoque ex interiori sua parte nodum habet H. notatum.

I. Lamina est ferrea, quæ capsulæ mediantribus duabus clavicularum fimitur annexa est, ut in ea torcular commodè circumvolvatur.

Cap. 27. De ulcere sordido, post Ichorem & Meliceriam, ejusdemque curatione.

GRAVIA sunt symptomata præcedentia, quæ verò sequuntur videlicet ulcus sordidum, putridum, & cum osse corruptum, periculo quoque non vacat; plerumque enim hominem vel interimit, vel per totum viæ suæ cursum misere affligit. De ulcere sordido, de quo in hoc capite actus sum, exemplum singulare habeo.

Nobilis quidam in Ducatu Brunsvicensi, *Commodus à Sternberch*, Vir juvenis, robustus, optimoque corporis habito præditus, cum in Belgio militaret, & quadam die in acie contra hostem strenuè pugnaret, idu sclopeti ad sinistram rotulam vulnus recepit. In proximam urbem quidem conductus, ibidemque à Medicis & Chirurgis curatus fuit. Interim tamen propter dolores vehementissimos atque diuturnitatem hyarthrosis sequens est, quapropter in patriam deportatus fuit. Ubi per multos annos ingentia dolores & cruciatus perpassus est. Ichor enim acris cum ad tempus fluxisset, in sordidissimum ulcus degeneravit, cum tanto dolore, ut vix suffulcitis incedere posset. Tandem Anno 1582. Dn. Colmas Slotanus Medico-Chirurgus longè præstantissimus, præceptor meus ætatem honorandus (apud quem tunc temporis ætatem meam exercebam) in aciem *Bodenberg* in ducatu Brunsvicensi, prope *Hildesheimum*, ad prædictum nobilissimum Virum vocatus fui, ad quem cum pervenissemus, genu mirum in modum intumescens, reliquum verò cruris externum invenimus. Genu variis in locis ulceribus sordidis lacerabatur, cum ossibus cariis, & doloribus

maximis, qui dies noctesque ipsum exercebant. Hinc viscera omnia interna mirum in modum labefacta & obstruata fuerant. Mansit Dominus Slotanus apud ægrum in arce *Bodenberg* per menses aliquot, ubi illum adhibuit diligentiam, ut æger non patum sublevatus foret, immoque ad opus suum scopum tendere videbantur, quapropter ut in curatione progressi vellent Slotanus, sedulo contendebat æger. Cum verò Dn. Slotanus à Principe suo *Duiseldorpii* vocatus esset, nec ægro amplius adesse posset, camerario vehiculo *Duiseldorpii* se vehi curavit, ubi per menses aliquot in ædibus Dn. Slotani decubuit, interim a tribus istis præstantissimis Medicis, videlicet Dn. Renero Solinandro, Dn. Galeno Wiceto, ac prædicto Dn. Slotano, ea quæ fieri possent, diligenter curatus quidem, non tamen sanatus fuit. Propter maximam enim obstruactionem labefactionemque internarum partium, tandem, & quidem in ipsius vigiliis Divi Michaelis, pie placideque obdormivit Anno 1582. Sequenti die, cum coram prædictis Medicis, item Dn. Hermannio Hagio, Med. Candidato, & Dn. Wilhelmo Flodorpio, cadaver aperisset Slotanus, interiora viscera omnia, præsertim hepatis, mirum in modum à naturali statu recessisse vidimus, & in vesica felle lapidem nuncius molæque magnitudine & figura invenimus. Genu cum insuperabilem, ligamenta, cartilagine ipsaque ossa putrillagine infecta & consumpta erant. Cadaver *Duiseldorpii* à nobis conditum, & ad suos in patriam depositum fuit. Hujus lapidis in vesica fellea reperti, meminisse *Renero Solinandro* Consiliarium Medicinalem fecit. 3. Consil. 16.

Historiam hæc non tantum in memoriam optimi ac nobilissimi hujus Viri Dn. Com. à Sternberch adscribere volui, veritatemque, ut Chirurgus magnitudinem hujus morbi inde videat, eumque præcavere ediscat. Si enim ab initio à Medicis & Chirurgis intacta fuisset, tam gravia symptomata procul dubio non supervenissent. Hydropeum enim articulum, sive Synovium, ut *Paracelsus* testatur, ex ignorantia Medici aut Chirurgi provenit, ab initio Cap. secundo demonstratum est. Ichor eodem acris non fuit, nisi error in curatione, sive à Medico, sive ab ipso ægro commissus fuerit. Ego jam in quinquagesimum annum fere usque præxim Chirurgicam exerceo, ac interim hæc istiusmodi articulos lauciatos curandos habui, per Dei tamen gratiam, nunquam symptoma hoc ægris meia supervenit, benedictus sit *Jehor* a. Apud Dom. Sitarum quoque, cui in sexum annum infirmi, neque apud alios rationales Medico-Chirurgos, illud vulneris supervenisse memini. Nunc, quomodo instituenda sit curatio, annexam.

Ance omnia præscribenda est optima victus ratio; expurgandumque corpus secundum humores peccantes naturam, parca quin etiam nobilia corroboranda sunt, de quibus cap. 22. de *Cachochymia* facis superque dictum fuit. Post hæc ulcus diligenter explorandum est, si enim angustum fuerit, inprimis dilatare optere pretium est, idque fit turandis, vel ex spongiis præparatis, vel radicibus gentianæ factis, & modificativo aliquo inundatis. At si circa periculum fieri potest, causi co ex solo capitello facti, cautè tamen agendum est, ne nervi partemque nervosæ ledantur, & dolores de novo excitentur. Satia aperto atque dilatato ulcere, si sordidum saltem & sine carie ossis fuerit, non utique adeo laboriosa erit curatio, imponentur itaque sequens mundificativum.

R. Mollis

R. Mellis rosacei ʒij.

Terebinth. non lora ʒ. 6.

Pulv. radicum aristolochia crotunda

Myrrha

Alees

Thuris an. ʒi. 6.

Misceantur in mortario, addendo Ctrici ʒij. Vitellum unius ovi, ad sedandos dolores, si suppetverint.

Aut :

R. Pulveris radicum gentiana

Iridis Flavanina

Ligni Guajaci ʒ

Farina Lupinerum an. ʒij.

Suominates centaurei, hyperici ʒ

Scedii an. ʒi.

Terebinth. non lora ʒʒ.

Mellis rosacei q. f. fiat in mortario unguent. Mercurium præcipitatum præstantissimum esse medicamentum in omnibus oleribus, indies expetior; Inspergo ipsum per se, vel hoc modo in forma unguenti filamentis impono,

R. Mercurii præcipitati, relificati, & aquâ rosacâ ʒ planaginis lori ʒij.

Unguenti rosati. Mf. ʒʒ.

(ora ʒi).

Misceantur diligenter in vase vitreo, spatulâ lignâ. Mundificant quoque ulcera sordida ac putrida, unguentum Ægyptiacum oostum, in tractatu de Gangræna & Sphacelo descriptum, uti & ungu. Apostolorum, & Mundificat. de succo Apil. Præter pulverem autem vel unguentum, quod ulceri imponatur, loquens quoque applicatur Cataplasma.

R. Farina fabarum

Lupinerum

Herdei an. ʒij.

Pulveris florum betonica

Ire arbutica,

Origani

Hyperici

(centaurii

Rosarum oleiferar. an. ʒij.

Salis commun. ʒiiij.

Coquantur cum decocto salvis, Absinthii Vulgaris, & granorum Juniperi, hæque Cataplasma addendo sub fuem supz ʒiiij. vel, in ejus penuriam, mellis tantundem. Applicetur calidè.

Aliud.

R. Farina lentium

Lentii, an. ʒij.

Fini caprini ʒij.

Pulveris florum Chamemilla,

Sambuci, betonica an. ʒʒ.

Ligni Guajaci ʒi.

Salis Marini ʒʒ.

Cum Lixivo tonsorum fiat Cataplasma; addeda supz, vel mellis ʒʒij. Cataplasmata hæc corroborant, & insigniter exsiccant, quapropter diligenter perpendat Chirurgus, adit ne dantes aliqua præter naturam circa oervos, velio ipso articulo: tale coim quid si adfuerit, plerumque autem adest, non pura exsiccantia, sed quæ simul emolliunt; ex usu sunt, uti est loquens Cataplasma.

R. Farina iridis

Fabarum

Herdei an. ʒij.

Pulv. florum & foliorum betonica

Ire arbutica,

Origani, ʒ

Rosarum an. ʒij.

Florum Chamemilla

Meliloti

Sambuci

Radicum albea an. ʒij.

Farina fenigraci

Lini an. ʒʒ.

Coquantur cum decocto radicum & foliorum malvæ, hæque Cataplasma, addendo ol. liliorum alb. & lumbicorum ana ʒi. vitellos ovor. oom. 2. Aut applicetur Emplastrum ex Mucilaginis vel de meliloti, aut Oclypi Philagil. Præscriptis remediis plerumque ulque ad finem curationis usus sum. Commemorata enim unguenta oon solum mundificant ulcera sordida, verum etiam incarnant, & cicatricem iocducunt. Quod si tamen circa sinem caro aliqua laxa atque spongiosa excreverit, alumenustum inspergeto, & Emplastrum Diapalmæum, aut Stuviani, vel de cerusa cocta, de minio, vel simile quid, applicato.

Cap. 28. De ulcere putrido & sphacelato, post Ichorem & Meliceriam.

Inter ulcus sordidum & putridum sive sphacelatum, maximum est discrimen; In ulcere coim putrido, calor natus, (qui concoctionis humorum in corpore, & digestionis faciei in volucribus opifex est) propter doloris vehementiam ac diuturnitatem, propter affluentis huius humoris feroci copiam, vel ex toto, vel ex parte exstinguitur, de membro actum est, ut videre licet ex historia, quam posita ex Johanne Langio annectam. Si verò ex parte exstinctus fuerit, pars saltem aliqua membris morietur, & in escharam abscedet. Scire accedit in sordidis ulceribus, in quibus calor natus quidem ad maximum languorem ac imbecillitatem, reductus est, oon tamen exstinctus. Humidum quin etiam innotum in sordido ulcere; non absumptum, sed aliis pravis humoribus iniquiorum ac depravatum est; hinc fit ut quum operationes naturales circa ulcus segneriter perficiantur, excrementisli verò humores (qui hinc intermissione affluunt) propter partem læsæ labefactionem, excipiuntur, ut ulcus putridum ac sordidum sequatur.

De ulcere putrido & sphacelato; post Ichorem & Meliceriam sequuto, exemplum nollum me vidisse memini, facile tamen membrum Ichore & Meliceride affectum in sphacelum transire posse, non absurdum est dicere, uti quoque in tractatu nostro de Gangræna & Sphacelo c. 4. demonstratum est. Johannes Luangius lib. i. Epistola. 3. de Ichore vel hydropis articulo loquens, exemplum singulare habet; illud, quia commemoratioe dignum esse cenſeo, hic annectere oon gravabit. Audi, inquit, obſſere ulcerum, videlicet Chirurgorum, dememiam. Ne talis leber, quem ipſi centumum articulis humorum arthritæant, efficit inſeſum: pills caprularum, quibus Ephippia Equorum inſarſcitur, ſtendum vulneris, appaſſe ſpleniorum ſaſticulo obſſuavit, quo ſi, nec ſaniet illa ſſuere non poſſi. ut ſubſequentia totum perrepti membrum, tandem hoc ſenſuputridum, obſſuatis vitalis ſpiritus motibus, ſphacale emoritur. Dicere me pudet, ſed dicam quod hiſce oculis vidi. Ambergæ Chirurgum unguentum populæntis in poteſta ſervofacium, bullient

bulliens adhuc; vulneris osculo infundentem, à quo cum remedi rationem sciscitaret, malis mala curari oportere, respondit; tuum patiens effusus lacrymis. Certe inquit, tua remedia non mala tantum, sed pessima esse sentio; cui ego post biduum abscisso ferro brachio medebat. Hæcenus Langius. Ex quibus colligere est, dolorem omnium esse gravissimum symptomata, & hujus morbi causam præcipuam.

Supertellet nunc, ut de curatione quoque aliquid adderem, pethicior illa optima viciis ratione, evacuationibus, tum per pharmaca, tum etiam per venæ sectionem, & topicorum administrationem; de quibus omnibus quia in tractatu nostro de Gangrena & Sphacelo satis superque dictum fuit, illa ut hic repetam, supervacuum esse existimo. Unum tamen lectorem commonefacere volui, videlicet, ut mollius tractet hujusmodi ulcera, quam si in aliqua parte muscularia essent; ne aucto dolore vites penitus proflamantur.

Cap. 29. De ulcere cum osse carioso, ejusdemque curatione historica.

Tanta est Ichoris, qui ex læsis articulis fluit, acrimonia, ut non tantum cariem partesque molles, verum etiam cartilagineas & ipsa ossa erodant atque contaminent; ut in nobilissimo ac strenuo viro Dom. Conrad à Steinherch, & in aliis vidi. Longè præterea lateque serpit, & ulcera subcutanea & cuniculosa fodit, uti ex sequenti historia videre licet, quam in gratiam tyronum hic inserere volui. Est enim veluti compendium atque exemplar totius curationis hujus affectus.

Anno 1622. decima Augusti, Juvenis quidam Bemerensis 14. annorum, Reverendi & doctissimi viri Dr. Jacobi Habermuri p. m. quondam hujus urbis verbi divini Ministri filius, cum inter deambulandum pedem dextrum leviter contorsisset, & ab initio malum neglectum fuisset, post dies aliquot exorto dolore, barbitonsor vncatus fuit, qui dislocationem adesse, constantiter asseruit; Id tamen falsum fuisse, inde apparet, quod ager in tertium & quatuor diem per urbem ambulaverit, scholam vlsitaverit, & cum condiscipulis suis currando & saltando se ex hilaraverit. Quid sit? temetipsum ille tonsor, nulla habita ratione doloris, aut inflammationis, dislocationem à se falso fictam reponere tentat, pedem violenter extendit, & ex una in alteram partem derotat, ne misere ægrum excruciat. Hinc aucta fuit inflammatio, auctus quoque fuit dolor, ita ut dies noctesque ejulare coactus esset. Febris quoque ardentissima, sitis inexhausta, lypothymia, eructationes, cibi fastidium, uris ardor, omniaque symptomata, quæ affectum huncce comitari solent, supervenerunt. In mortis itaque agonem ferè cum redactus, & à barbitonsore suo pro deplorato derelictus esset ager, ac ego in consilium vocatus essem, pedem totumque crus ad coxam usque mirum in modum intumefactum, omniaque symptomata, quæ exire quarto recensui, adesse observavi. Pes in suo ambitu octo habebat ulcera, fœdidissima, quorum nonnulla in ipsam juncturam penetrabant. Ex quibus ichorosa materia tam copiose effluebat, ut mirum sit, unde in corpore extenuato ac debili tanta colluvies humorum provenire potuerit. In medio ribiæ ulcus erat profundissimum, & cuniculosum. Ex ona enim parte ad popliteum & versas flexuram ferè genu ascendebat; ex altera vero parte ad talum & articulum pedis descendebat.

Vix autem (quod annotatione dignum est) reperiatur ulcus in hoc affectu, quod non sit cuniculosum, & maxime circa vasa vanatum & atteriatur. Sanguis enim & humores, qui doloris vehementiæ ad locum affectum trahuntur, propter ingentem inflammationem incalcescunt, & in ipsis valis acies fiunt, proximæque partes erodunt; quemadmodum itaque prædicta vasa in diversas partes sparguntur, ita etiam ulcera cuniculosa efficiuntur. Hæc diligens Chirurgus diligenter observare, & cuniculosa hæc ulcera maturè detegere debet: ne materia in eis retineatur, & adjacentes partes devaleant.

Curationem à viciis ratione (quam imperitus & temerarius ille tonsor neglexerat) inchoavi, illamque propter summam imbecillitatem atque extenuationem corporis, insuper nuriemem, ratione febris aliquo modo refrigerantem institui. Est quia alvus non respondebat, suppositorio ipsam laxavi. Eadem quoque die, circa decimam noctis sequentem potiunculam exhibui.

R. Maceris calere solis preparati ℥℥.

Confectionis Althermes ℥j.

Syt. de pomis ℥j.

De succo citri ℥℥.

Aq. Cinamomi sine vino distillata ℥ij.

Aq. Bugle & beraginis q. s. Misceantur, fiatque porio. Carpis Epithema hoc modo præparatum applicui.

R. Aq. Roforum

Buglossæ,

Beraginis

Acrofa an. ℥ij.

Aceti rosæci, &

Aq. Cinamomi sine vino distillata an. ℥j.

Confectionis Althermes ℥j.

Capsura ℥j.

Misce, fiatque Epithema. Applicetur carpi, & singulis horis renovetur.

Eadem quoque vespere totum crus à genu usque ad coxam sequenti linimento unxi, pedem vero ac tibiam propter maximam inflammationem inungere ausus non fui.

R. Ol. Roforum

Violarum, &

Amigdalarum dulcium an. ℥j.

Ol. ex floribus ℥℥.

Misceantur.

Tibiam & pedem, ut dixi, non unxi. Pingula enim inflammationibus adversissima esse, Galenus docet, & experientia fidem facit. Ulceribus, quorum novem, omniaque angusta erant, filamentis imposui.

R. Cera nova ℥j.

Colophonia

Gummi Elemi an. ℥vj.

Theriacalis Aq.

Benzoica levis ℥℥.

Ol. Lumbigerum

Amigdalarum dulcium

Ol. de vitellis ovorum

Roforum an. ℥℥.

Misceantur lentissimo igne & peteculentur; Postea admisce croci pulverisati ℥j. Vitellos ovorum num. 2. Pedi ac tibiæ usque ad genu sequens cataplasma calidè applicui.

R. Farina bordet, &

Mica panis albi an. ℥ij.

Putoris radicem Albea &

Sem. *Fusi grati* an. ʒiʒ.Sem. *Cydoniarum**Anethi* &

Meliloti an. ʒi. Cum lacte vaccino fiat cataplasma, addendo ol. Lumbicorum, butyri recentissimi an. ʒi. Croci ʒiʒ. vitellos ovorum No. 3. fervetur in vase vitreato, bene clauso, applicetur calidè. Hic error Chirurgorum quorundam notandus est, qui cataplasma, quotiescunque illud applicant, in fatigine ad ebullitionem ferè calefaciunt, sed perpetuum enim illud secundo vel etiam tertio ebulliunt, virtus ipsius evanescit, aut saltem multum imminuitur. Hæc cum ego lo juvenute mea perpendere, aliam institui methodum. Antequam enim fascias solvo, & vulnus aut nlcus derego, omnia prius præparata medicamenta necessaria. Cataplasma supra linteum extendo, turundas, aut pulvillos adapto, & unguento iungo. Tandem fascias solvo, Medicamenta abstraho, protinusque ulcera abstergo, non tamen tela, ut vulgus Chirurgorum, sed penicillis ex spongulis, hunc in modum bacillis annexis. (vid. Tab. viii fig. 8. & 9).

Tela enim plerumque aspera est, nec sordes ulcerum, uti facit spongia, excipit. Absterio vulnere aut ulcere, protinus turundam aut pulvillam appono, partemque, si opus est, inongo. Interim dum hæc facio, cataplasma impositum typboto cum prunis sensim & ad libitum calefit, Typhorum si in promptu non fuerit, regulam vel rutabulum calefacere jubeo, eoque cataplasma impono. Hæc autem ea propter sic instituo, ut vulnus illud claudatur. Aër enim, præsertim si frigidus fuerit, vulnerebus & ulceribus omnibus, imprimis capitis, pectoris, & paribus nervosis, adversissimum esse, docet experientia. Methodum hæc in omnibus agris meis observo, quam in gratiam tyronum ætis, simul & ægrotorum, hic annexere visum fuit. Nunc iterum ad institutum.

Prædicta Medicamenta bis in die, epithema verò singulis horis iteratim, renovatumque fuit, & sequens mox quietior exstitit, quapropter cum prædictis medicamentis in decimum quartum usque diem processit, singulis quin etiam, vel alternis diebus, aut de tertio in tertium diem, præscriptam potiunculam cordiale ex Meconio & populearnæ propinavi. Hicce remediis dolor intra paucos dies sedatus fuit, & ulcera ad optimam digestionem pervenerunt: vires quin etiam recolligere cepit. Etæ enim adolescentem vividus, & optimo corporis habito præditus: quapropter sequenti potiunculâ clementer ipsum purgavi.

R. *Pulveris nostri Laxativi* ʒi.*Syrapi refusi solutivi compofiti* ʒiʒ.

Cum decocto pectorali fiat potio, quam in crepusculo matutino sumptis, & clementer expurgatus fuit. Symptomata quoque ab eo tempore paulatim remiserunt.

Statim autem ab initio (quod notandum, & io omnibus ulceribus ichorosis, si angusta, sinuosa, & cuniculosa fuerint, observandum) superficialis ulcerum nonnihil dilatavi, clementer tamen, ne dolores excitarem. Dolor enim cum sit causa hujus morbi, ut antea peripse dixi, evitandus est. Ulcus verò, ut ichor illic acris, indigestus, & corrosivus, effluere possit, dilatandum. Dilatatio porro hæc turundis jam ex carbonis, jam ex spongulis præparatis, & superacripito digestivo inunctis, facta fuit.

Impetum mali, cum jam devium esse viderem, & Stylo argenteo ulcera explorarem, hoc Deus quot ductus cuniculos, sinuositates, imò & in ipsam juncturam usque penetrantes inveni! Ex interna parte tibie in medio, inter geno & talum, circa ramum

Dist. Chirurg. Tom. II.

venæ caræ descendente, ulcus erat sordidum, quod ex una parte ad genu ascendebat, ex altera ad talum & juncturam descendebat, circum circa juncturam pedis ulcera octo angusta, & ad juncturam penetrantia erant. Hæc omnia spongulis præparatis, & nunc digestivo, antea descripto, nunc mundificativo ex pulvere præcipitato illinxis, paulatim dilatavi.

Dilatatis ulceribus, membranas & ligamenta putrida inveni, quæ quom paulatim beneficio naturæ & paribus sanis separata essent, ex calca ex utraque parte non saltem cariosum, verum etiam (quod dicam admiratione non vacet) ex uno in alterum latus perforatum inveni, non alter ac si aliquis terebello hujus O magnitudinis illud perforasset. Foramen hoc non statim ab initio, sed successu temporis cum detectum esset, funtem sericum mundificativo, capere de ulcere sordido, ex radiibus gentianæ, Iridi Florent. ligno Gonjaco &c. præscripto, insuacatum, ex una parte pedis ad alteram per ipsum os Calcis perforatum traduxi. Quod & multi etiam Medici nostri, & *Do. D. Job. Burgaver* Medicus celeberrimus, qui quot temporis commensalis meus fuit, non sine admiratione aliquoties viderunt. Funiculus enim istis per multos dies, ne dicam septimanas, ad perfectam ulceris mundificationem ulus fuit. Tandem squamma ossis in forma tribuli excidit, foramenque ossis callo, & ulcus cicatrice obducum est.

Cæterum quia perforatio hæc rara, forsitan & à paucis observata, reliqua quæ exempla habeo, hic annexere non gravabor. In tribus autem diversis agris illam vidi. Primus fuit æger uoster, de quo hic agitur. Secundò illam vidi in quadragenario quodam Genevensi, *Siphono juvenoris*. Ille cum anno 1601, undecima Decembris, in acie adversus hostem pro patria acriter pugnaret, vulnus idu sclopeti ad humerum dextrum recepit. Chirurgus cum ab initio glandem plumbeam ad sinistram homoplatam, ubi cuti erat proxima, excidisset, & nescio quo balismo artificiali empiricorum more vulnus curate vellet, & intra paucos dies labia vulnecis contracta essent, in gravissimum affectum evasit. Ulcus hocce quæ in decimum mensem usque Genæ curatum fuisset, & pro deploro am, ac insularabili haberetur, venit ad me Paterniacum, ubi tunc temporis Medico-Chirurgus ordinarius eam, ubi ipsum feliciter, per Dei gratiam sanavit restitui. Laboriosa quidem ac longa fuit curatio, in qua & varia annotatione digna occurrerunt, & inter alia furculam in medio ferè ex una in alteram partem perforatam inveni; ex hoc foramine squammam ossis quoque in forma rebuli suo tempore extraxi, res profectio mira, cum sit unum ex ossibus totius corporis durissimum.

Tertium exemplum vidi Paterniaci Anno 1607, in puero quodam novem annorum, *Jobanne Dam. N. Pennini*, verbi divini ministro prædicta Ebrodunensis, filio, qui mihi ex adibus patris Paterniacum adductus fuit. Laborabat autem puer iste ulcere fistuloso & inveterato ex interna parte tibie dextræ. Illud quom spongulis præparatis & lazarem, (exterius enim angustum, interius verò cavum & cuniculosum erat) & mundificarem, foramen rotundum ac magnum ad medullam usque penetrans, in fossili majori inveni. Io hoc foramine, & quidem in ipsa medullâ motum arteriatum, quotiescunque ulcus curabam, observare potui. Cunctis quamvis laboriosis & longa fuisse, multa enim ossa cariosa extraxi, ad operum tamen finem ipsam per Dei misericordiam reduxi, neque ab eo tempore usque ad annum 1639, circa festum divi Martini, quo me Bernæ invitit, de hoc malo amplius conquestus est.

T

Curatio

Curatio autem hujus ulceris capropter laboriosam, longa, ac difficilis fuit, quod prope talum extrabat. Et proinde ulcus & circumjacentia partes inter deambulandum, contendum & falcandum (poet enim præter modum vividus erat) continuò contraherantur. Venit mihi tunc in mentem curatio, cujus fit mentio Cent. 1. Obs. 38. quapropter ut pedem immobilem facerem, capitulum inferius depictum ex ligno fabricavi, (vid. Tab. VII. fig. 10.) in quam pedem tibiæque ad genu usque linteria, stupis ac falcis tam continè adaptavi, & tam arctè inclusi, ut pedem neque in hanc, neque in illam partem movere posset. Etiam si propter ipsius vivacitatem, fustulcria incedendo continuò corpus exercebat, Capitulum hanc per menses aliquot dies vobiscum gestavit. Interim ulcus ab ossibus cariosis mundificatum & cicatrice obductum fuit. Ex his videtur Chirurgus diligens, quàm novicia fit mortui in vulneribus & ulceribus artibus proximis.

A. Foramen est in fundo capsulæ excavatum, ad excipendum calcaneum.

B. Affertulus capsulæ & regione ulceris parum excisus, ne ulcus compingatur.

Tria hæc Exempli, uti dixi, in ægria meis vidi. Habeo quoque in Museo meo ossa nonnulla tibiærum, quæ olim in ossuariis inveni, quæ eodem modo perforata sunt. Ex quibus perspicuum fit, ossa in ulceribus propter Ichoris acrimoniam sapissimè perforari. Mitum itaque non est, plerumque ulcera ad finem vitæ durare, quando videlicet foramina hæc cariosa à Chirurgo non deteguntur. Sed hæc obiter, nunc ad institutum.

Dilatatis ulceribus, quæ sordida erant, mundificativo ex Mercurio præcipitato & anguento rosato, Capite de Ulcere sordido descripto, vel etiam pulvere ipso præcipitato, parè insperso, mundificavit. Ubi vetò os cariosum & denudatum fuit, jam pulverem Euphorbii per se, jam vetò sequentem inspersit.

R. Rad. *Aristolochia rotunda*
Angelica
Aridis Florent. an. 3ß.
Ligni Guaiaci &
Ceriscum ejusdem an. 3ß.

Misce, siæque pulvis tenuissimus, qui ossibus cariosis copiosissimè inspergatur. Invenit tamen danda est opera, ne labia ulcerum concidant, & ulcera claudantur, quapropter spongi præparatis diligenter aperta sunt conservando, donec ossa cariosa naturæ beneficio excidant, nullo enim modo vi sunt extrahenda, quemadmodum sapissimè juniores Chirurghi in scriptis meis monui. Caro si in ulceribus præter modum excreverit, pulvis præcipitatus, testificatus & lorax, carni inspergendus est; Luxuriantem enim carnem reprimat, & malignitatem ulceris corrigat. Circumcirca juncturas Cataplasma corroborans ex farina fabarum, lupinorum, hordei, betonicæ & similibus, Capite de ulcere sordido descriptum, applicui. Et hoc modo ad finem usque curationis processit. Longa fuit ac laboriosa curatio, & per aliquot menses duravit, ita ut numerus rotundarum, tam ex spongis præparatis, quàm ex carbaso præparatarum, & in usum adhibitum (ut æger ipse diligenter observavit, notavit, & etiam heri 30. Septembris 1630. coram me & aliis constanter affirmavit) numerum mille & quingentarum excedat: ossicula quoque multa extracta fuerunt, interim tamen lesa convalescit, ut incedendo, deambulando, vix claudicatio ulla

appareat. Calcaneus tamen nonnihil retractus est, & junctura pedis planè coarctat, & per callum eodem planè modo, ut antea Capite 25 de coalitione cubiti & coarctatum, concretit. Hac methodo ac Medicamentis in ulceribus cum ossi corrupto procedendum est.

Nonnulli ossi carioso oleum vituli, vel aquam, quæ autem ab argento leparatur, quam vulgus *forem* appellat, applicant. Maximam enim efficaciam vim habere, referunt; Quod quidem verum. Carum tamen ossis non corrigit, sed adjacentia partes sanas destruit, in juventute mea apud prædicos observavi, præsertim Duiseldorpii in nobili quodam viro, cui in levissima & superficiali casie ossis tibiæ, à Chirurgo suo applicatum fuerat oleum virtiolis, hinc tanta sequuta fuit caries in osse, ut Dom. D. *Galenus* *Præparatus*, Medicus longè celeberrimus, illam vix tribus cauteriis bene ignita castigare atque emendare potuerit, cuius rei ego sum testis ocularis. Quapropter caveant sibi Chirurghi, ne hujusmodi Medicamenta ossi applicant, sunt enim sublimissimarum partium, ita ut ad proximas partes longè latèque perfluant, & quæ sanæ sunt, destruant. Requirit quidem os cariosum medicamentum, quod insigniter exciset, sed necesse est, ut simul sic crassatum partium, tale autem est Euphorbium, quod cariem ossis, ut alibi dixi, & in multis meorum ægris vidi, corrigit, carnem tamen, ut hæcenus Prædici voluerunt, non audivit, aut inflammatione excitat, quapropter eo etiam in pueris uti possumus.

Pharmacopœi autem, quod notandum, quando Euphorbium in pulverem redigunt, guerulam unam aut alteram olei affundunt, ne eorum nates feriat, aut extirperet, sed male; oleum enim ossibus denudatis advenissimum esse, & sunt Prædici, & facultatem exciscandi Euphorbii infringit. Loco itaq. olei Euphorbium spiritui vini irrorare convenit. Hæc de ulcere cum osse corupto, videlicet quando superficie tunc cariosum est.

Si verò corruptio, aut caries ossis in ipso articulo fuerit, ita ut Euphorbium ad carnem pervenire non possit, de salute tamen ægri desperandum non est. Io prædicto enim ægro non ubique ossibus cariosis Euphorbium inspergere mihi licuit, nihilominus tamen felicitè sanatus fuit. Ulcera enim beneficio turandarum ex spongis præparata aut radicibus gemmarum, aperta retinui, & mundificativum sequens quotidie imposui.

R. *Ceriscum ligni Guaiaci*
Sassafras
Rad. Angelica
Rad. Aristolochia rotunda an. 3ß.
Alirba

Aloes an. 3ß. Fiat omnium pulvis tenuissimus, in mortario admisce extradi scordii 3ß. Mellis rosacei quantum sufficit. Milicantur, siæque mundificativum, quod præstantissimum est in omnibus ulceribus sordidis, putridis, & cum ossibus corruptis, quo & in nostro ægro tanto cum fructu usus fui, ut natura ligamenta, vincula & cartilaginea potrida paulatim ejiceret, & juncturam per callum connerit, eodem planè modo, ut antea de cubiti & cova dictum fuit. Interim autem dum circa ulcera, ut illa aperta retinerem, mundificarem, & ossa cariosa extraherem, occupatus eram, in universis nihil omnium quoque fuit: optimam videtur rationem observavi, corpus per intervalla blandè expargavi, & ne dolor exciteretur, operam dedi.

Prædicta Methodo & Medicamentis ita restitutus fuit pes, ut inter deambulandum per urbem vix claudicatio observari posset, ulcera etiam clausa permolerentur, quapropter

quapropter Icholam iterum frequentavit, tandemque artificium Mechanicum didicit, idque exercendi gratia, post annos aliquos ad externas regiones profectus est. Quam verò Anno 1629. in ipsius turbis bellicis in Germania opifitium suum exercebat, multosque labores & molestias sustinuit, cibis quinetiam sale conditis, & fumo exsiccatis vesceretur, & corpus ab eo tempore, quo Bernâ discesserat, purgatum non fuisset, ulum quinetiam fasciarum neglexisset, humores iterum ad pedem defluxerunt, & inflammationes, pruritus, aliaque incommoda, quæ ulceribus præcedere consueverunt, excreverunt. Hæc cum iterum floccifaceret, ad utrumque talum exortum est ulus, cum quibus deinde per menses aliquot occupatus fui, iterum tamen, laus sit Deo, convaluit.

Cap. 30. *Quomodo pars affecta post curationem Ichoris & Melictriae, corroboranda?*

Postremum quidem, sed non minimam symptomata Ichoris, est labefactio & imbecillitas partis læsæ, post curationem ulceris, inde fit, ut plerumque haud paucas ægro pariat molestias. Propter imbecillitatem enim pars affecta defluxionibus fit obnoxia, præsertim si malum in pede fuerit: humores enim ad locum decliviorum facili decumbunt, facillimè verò propter summam imbecillitatem partis malè affectæ recipiuntur.

Imbecillitas autem hæc propter caloris nativi ac humidi innati diminutionem procedit. Quandoquidem intemperies illa maxima & calida, quæ partem læsam non raro per dies multos, ne dicam septimanas, aut menses, infestat, calorem innatum, & humidum radicale absorbet immittitque, ita ut ad repellendos humores, qui affluunt, non satis sit valida: & præsertim si vasa arteriarum & venarum erosa fuerint, uti in adolescente illo, cujus cap. proximo de ulcere cum ossis corrupto memini, accidit. Hinc fit, ut plerumque (si æger de conservanda valitudine non satis sollicitus fuerit,) ulcera circa talum sequantur, quæ & difficultat sanantur, uti in prædicto adolescente vidi. Ille enim quum in quartum annum post curationem Bernæ in patria subsisteret, ac ego totum illud tempus de ipsius valitudine sollicitus fuisset, sana ac integra permansit tibia: quum verò ad externas regiones profectus fuisset, molestias atque labores multos sustinisset, in victus quinetiam ratione peccasset, & corpus in quantum annum purgatum non fuisset, humores frequenter ad tibiam defluerunt, ac ulcera circa talos excreverunt, quæ mihi, cum Anno 1630. Mense Septembris Bernam reversus essem deinde labores multos procreantur, uti in fine præcedentis capituli dictum est.

Ponamus itaque casum, pedem Ichore fuisse affectum, juncturam quin etiam per callum (ut in præcedenti juvene accidit) coaluisse, hæc ægro observanda sunt. Primum utrum cibis bene nutritivibus, & optimis succum ac sanguinem procreantibus, à salis & pipæris abstineat, ne excalescat hepate, sanguis incalescat, & ad tibiam præter modum debilitatam defluat. 2. Corpus per intervalla pharmaco aliquo benigno evacuandum est. 3. Si plethora adfuerit, Venam quoque brachii incidere convenit, de quibus in præcedentibus suo loco abundè dictum fuit. Superest agere ut de topicis, quæ calorem nativum corroborant & æger, aliquid adhibeam. Eorum autem nonnulla ex cap. 24. de atrophis, uti est succus lumbicorum, oleum item & aqua ranarum, petenda sunt. Aut fiat sequens aqua:

Bibl. Chirurg. Tom. II.

R. Flor. & Fol. Betonica

Iva arberica

Flor. *Primula Veris*

Craneum juniperi an. M. liij.

Lavendula

Hyperici

Calamendi

Rosmarini

Majorana an. M. ij.

Oculorum populi arboris lbj.

Incidantur & contendantur omnia grossio modo, quibus affunde aqua betonica, ut superneat quatuor digitos. Maneant in infusione dies quatuor aut quinque, postea destillentur per vesicam l. attem. aqua hæc præstantissima est in affectibus nervorum ac nervosorum partium, etiam in deflexionibus ad articulos, modo intemperies calida non adfuerit. Succus lumbicorum si cum prædicta aqua præparatus fuerit, præstantissimus erit. Totum autem crus ad dorsum usque prædicta aqua aut succo lumbicorum iungatur. Articulus malè affecto Emplastrum Strolani (cujus descriptionem alibi in scriptis meis habes) applica. Aut

R Empl. *Diapalme* ʒij.

Cera nova ʒij.

Gummi Elemi, &

Tacamahaca an. ʒj.

Masticis

Olibani an. ʒx.

Pulv. *Lumbicorum terrestr.* ʒij.

Pulv. *Rosmarini edersiferarum*

Myrsitorum

Balanitarum

Iva arberica, &

Flor. *Hyperici an. ʒj.*

Dissolvantur gummata lentissimo igne, cum Ol. lumbicorum q. l. & petecolentur per lineam. Postea commisceantur omnia cum Emplastro prædicto & cera liquefacta, fiatque massa, addendo nonnihil ol. grinoam juniperi, aut spicæ, Emplastrum hoc præstantissimum est in affectibus juncturarum & nervosorum partium, si intemperies calida non adfuerit.

Tibia à digitis pedum usque ad genu fasciæ ex tela semitrita & luavi singulis matutinis involvenda est, ne sanguis & humores cum impetu ad pedem defluant. Fasciæ hæc, ut majoris sit efficacis, cetâ hoc modo preparatâ imbuenda est.

R. *Cera nova*, ʒvj.

Gummi elemi pinguis, ʒij.

Pulv. *Masticis*,

Olibani, an. ʒj.

Oli rosacei q. l.

Misceantur lentissimo igne

in芳草ine.

Si verò affluxus humorum vehemens fuerit, fasciam singulis matutinis, antequam æger ad lectum surgat, sequenti decocto infuscare convenit.

R. *Foliorum & florum betonica*

Iva arberica

Salvia

Absinthii vulgaris,

Rosarum rubearum

Florum chamemilla &

Sambuci an. m. lb.

Salis commun. ʒ. lb.

Ti 2

Cum

Cum illius, fiat decoctio usque ad consumptionem quartæ partis. Fasciâ hoc decocto insuccatâ unius interdiu, quando necessitas maximè urget, & casum est calidum, aut eger lecto vel hypocausto non egrediatur. Si verò tempus frigidum fuerit, fascia humida nonnisi noctu utor, interdium verò siccam applico. Modus ille, fasciâ ligandi tibias, mihi frequens est & utilissimus, eoque maximo cum successu in ulceribus tibiæ utor. Aliscentes enim humores retinet, partemque affectam exsiccat corroboratque.

Vulgus, etiam multi ex Chirurgis vulgaribus, methodum hanc improbant, nulloque modo humores ex corpore ad ulcera tibiæ humeris (quos parvos & coarctos esse dicunt,) facili repellendos, ut tardandoque esse volunt. Si enim inquirunt, in corpore retinentur, quânam expectandum, quin tempore interitum? Respondeo, humorem, qui ad ulcera fluit, duplicem esse, naturalem & excrementitium. Natura enim gagax atque pudent, etiam individuum suum ut conservet, semper occupata atque sollicita, fieri tamen non potest, quin cum excrementitiis humoribus laudabile quid ad ulcera suas, facit id loci malè affecti declivitas & imbecillitas, quapropter excrementitiis simul & bonos recipit, qui cum reliquis in parte affecta corruptionem, non aliter ac si in solium humore aliquo putrido imbutum, generosum vinum insudetis. Sed ponamus casum, partem aliquam humotis excrementitii propter ligaturam in partibus supra genu sitis retineti, id tamen sine ullo incommodo ægri fieri, & quotidiana experientia fidem facit, & ars ipsa medica docet. In partibus enim istis musculosis, supra genu positis, calor nativus vegetus est & fortis, quapropter si quid excrementitii humoris in partibus istis remanserit, non tamen in corpus remeat, sed beneficio caloris nativi corrigitur, & per insensibilem transpirationem evacuetur. Habes candidè Lector, meam de gravissimo hocce affectu sententiam, quam ut candidè interpretari, & ad DEI Opt. Max. gloriam, commodumque ægrotanti, in usum converti velis, ex corde opto.

IMPERFORATI.

De cura eorum quorum penis podexve clausa, similiter ac eorum quorum vagina non aperta.

IN recens natis non raro podicem imperforatum observari, exclusionem fecibus denegante membranâ quadam crassiore, officium intestini recti claudente, varia ab authoribus variis proposita exempla declarant, legi hac de materia possunt quæ habent *Fabr. Hildanus part. 1. obs. 3. Antonius Benvenius lib. 1. cap. 30. Ambrosius Pareus lib. 24. cap. 17.*

Membranam hanc anoni clauderent unguitibus lætari posse Paulus Ægineta lib. 6. cap. 6. docet Hier. Fabr. ab Aquapendente fortissimè clausa instrumento secante aperiri vult. Imò unguitibus venenatis imperitæ obstetricis apertionem hanc minimè permitti debere; addit Insuger monitum hoc: Nullam sectionem perficiendam esse aliqui in parte corporis apertione alio loco, quam ubi veri foraminis vestigium, digito obvium, notari possit. Ubi enim, inquit, vestigium nullum occurrit, color usus non obtinet. Exemplum hujus rei apud *Hildanum part. 1. cap. 31. invenire licet.*

Honesta, inquit, quondam Matriona Genevensis filium peperit, qui clauso ano extremè per ductum urinarius simul & urina excrebar, accersito itaque Mediorum & Chirurgorum collegio, nullus in ea fuit opinione, ut de ani incisura quicquam tentaretur. Tandem cum extremè insisterent, nec per ductum ullum amplius permeare possent, inflatus est venter, exorta febris, alique sympotoma, ita ut decimo septimo ætatis die è vita decederet, aperto cadavere inventum est intestinum rectum vesicæ fundo adnatum. Admonitionem hanc consideravimus in recens nato filio alicujus artificis, cujus glans non perforata, nullo præsertim meatu vestigio. At subus glandem insculpti observabamus foraminis vestigium, membranaceo modum velamento rectum, hoc loco instrumento à nobis noviter invento, in hypopio usali, apertionem fecimus, & effluxit urina insigni satis copia, satique rivulose.

Infantes nobis occurrerunt varii, quorum anus imperforatus; Inegumento membranaceo incrustatus, similiter ac puellæ diversæ, quarum vagina uterina velamento simili oclusa. Io omnibus felici successu instrumentum modo indicatum usurpavimus, nec unquam foraminis facto turundas aut alia ejus fortis imponere coacti sumus, cum nullus meatus sit modo dicto aperta conglutinari subito iterum posse, quale quid sibi persuadet Paulus, continuis enim materiz affluxus unionem hac non potest non impedire, in puellulis tamen cum larga, continuaque adeo imò nulla excretio humoris excrementive liquidioris per vaginam, non inutile observavimus Emplastum Diapalma liquefactum plumaceolis excerptum turundæ forma vaginæ imponere, quo inhibeatur conglutinatio, *lib. à Meissem in observation. Medico-Chirurgicis.*

De imperforata quadam, Epistola ad virum celeberrimum D. Joannem van Horne, Anatomæ Profess. Lugd. Batavum.

Domine; Ultimas nostras ad te missas, quibus dubia quadam curiositatis gratiâ solvebantur his concludebamus verbis:

Quod si quadam rariùs occurrentia in arte nostra se exhibuerint, haud intercedit quin eorum te participem reddam.

Accipe ergo, Vir Celeberrime, haud adeo admiratione dignum, quam rariùs occurrentibus annuerandum quod civitas nostra mulieres tales quales hic proponimus ratios exhibeat.

Propositum minime nobis de puellis agere, sed virginem exhibebimus adulationem.

Renæ Eclijens, ex Frisia oriunda, Amstelodami licet nata, virgo robusta, annorum viginti duorum, & alvi & urina excrementa legitima quantitate, debitoque tempore, ponebat; menstrua vero necdum observaverat, satis licet annosa; urinae tamen excretio tandem valde interrupta fuit, forsan quod materia serosa ventris cavo colligebatur, brevi enim abdominis tendio tumore correpta. Accedebant pressiones dolorificæ gravissimæ circa pondenda, vehementes adens fuerunt, ut vestimenta lacertare, omniâque turbare coacta fuerint, imò desperatione mox violenta sibi intulisset manus, si lotor impedimento foisset.

Quæcumque ipsi præscripserat fuerant medicamenta plus noxæ quam commodi attulerant.

Difficentium medicorum Chirurgorumque ingentis fati

fatis hic numeris, unde factum, quod quæcumque usurpatorum oihil omnino effecerint, adeoque an- fa data fuerit vulgo, Medicorum Chirurgorumque incisciam magis accusandi, quam statum ægrotan- tis desperatum deplorandi.

Fuerunt qui causam horreoidi symptomatis men- struorum suppellicioem confisterent, ex vasorum uterorum præternaturali angustia ortam.

Alii graviditatem subesse suspicabantur; taci de- uique vegetio tem totam adhibere baud deter- rant.

Petrus Porcietier, Chirurgus, publico salatio ad id obligatus, ut parturientibus pauperibus in casu necessitatis succurrat, uterum ad orificium externum prolapsum statuebat, quod vitium manuale opera- tione corrigere nitabatur, sic tamen ut capiti suffi- ceret ægrotans.

His aliisque sic frustra usurpatis, vaginam ute- rinam imperforatam esse, sic ut ingesta æque ac egressus negatur excludendo æque ac admittendo, eo quod membrana valida orificium clauderet, in- notuit.

Membrana hæc Medicia vastia excrecentia habebatur carnea, aliis cæcinoima, aut aliud incurabile malum, ite te adeo dubia certi aliquid quo consili- ueretur, Medici Chirurgique alii prioribus junc- ti, inter hos & me accedere voluerunt consan- guloei.

Inspectione conveniente habita portam eam an- gustam per quam Cæsares, reges, medici, omni- que o-dinia homines, mundum hunc inteor mem- brana quadam incassata clausam iovenimus, cui si- mile exemplum Hildanus part. 3. observ. 60. & 61. proponit; Claustra hæc arcta adeo observabatur, ut digito nullus coocederetur introitus, unde factum quod mensitrus sanguis, in dies actimoniam, mense quovis quantitate, auctus, ad locum angustatum fuerit collectus, & quæ causa tetipetioia, troluiois, in- tumescenzæ, dolorisque summi.

Hoc in casu medium nullum excogitari posse in- dicabam, quàm instrumens commodum vaginam aperire, & quidem ad modum eum quem io an- cilla fere mo-rua exercuit Fab. ab Aq- appendente part. 1. opet. Chir. cap. 81. & Wierus lib. de præst. Da- mon. cap. 38 in virgine Cranenburgensi. Assensiebat ægrotans, suadebant idem Chirugi Medicique præ- sentes.

Operationis modus quis fuerit, antequam propo- namus, duo hæc consideratione nostra digna occu- rebant. 1. Aeonon exiguus quodam foramine mem- branam d-ctam perforare necessarium, ne materia in- trus collecta confertim nimis effluat, cum virgum pro- stratione lumina, quale quid io apertione abscessuum magnorum observatur.

2. Aeonon sectio quam hic institui debeat, cru- ciata, quam commendat Corn. Celsus lib. 7. cap. 18. ne lædatur via urinaria.

Ad primum respondebam, vix eam humoris copiam hic collectam esse, quæ æquiperari queat ponderi factus recens nati cum annexis, nec tamen puerperæ calore, spiritibus, roboreque præter modum semper destituit.

Ad secundum, sufficere hic sectionem simplicem, quæ à parte inferiore deducatur ad superiorem, quo, etiam jam effluente materia, apertio continuari queat, nec humor ex ens eam inhibeat.

Operatio ipsa hoc modo instituta. In dorsum pro- strata virgine crura utrinque primo ad latera depre- fta, quo labia pudendi magis distarent, hinc lanciola dissecio membranz obliquo ducto ne orificium vesicæ

urinariæ læderetur, peracta stillico materiz impetu, aliquomodo fortentis, colore & confistentia h-pati comminuo similis quantitas ex effluxit, quæ libra- rum quatuor cum dimidia, nocte sequenti ejusdem humoris quantitas major se exhibuit parciore hincast alterius conditionis.

De eventu suo tempore certiorum te faciemus, in- terim tuum erit Hymeo, an membrana incassata im- perforata vitium hoc appellari debeat, determinare. Operationi dixit adscribere. Arnoldus Tholius. Fran- ciscus van der Schaagen. Ioannes Deyman. Simon Dille- man; Adriaen Reyniers, Medici. Georgius Van Lede, Chirurgus.

Vale vir magne in commodum Reipublicæ Medi- cæ, & omnium gloriam æternam; faverique potes- in nullo non lolesvire tibi paratissimo Jobo à Mee- xten. Idem ibidem.

Atresia accidentalis, & una menstrua.

Non temerè statim omnem atresiam, quæ infantibus puellisque evenit (pro periculosa habendam esse sequentibus exemplis persuadeor. Puella erat annicula, inextrigie aut excoriatione copiosa ob urino ædimo- niam, ut fæti solet, affecta, huic tandem Vulvæ oræ coalescente interveolente membranula alba, nonnulli etiam dora, quippe quæ initio immixti specilli apicem repellere videretur. Mita inde Parentum sollicitudo, non statim io hoc caso ad Medici aut Chirugi operas p-operantur; sed, dum interim animi pendunt loco- que iterum iterumque inspicunt, vetiti, ne longiore mora magis io duvelteret valvula & eodem sero orghi- gentiæ procam luenter, auxilium Medici implorare constituit; Nutricula autem, cum Medici Chirur- givæ maoum crudellem omniauerat, effusissimis preci- bus fere & flaribus Parentum propositum Medicique præsentiam si non avertit, certe dilationem aliquot die- rum impetravit. Illa interea locum quotidie diligen- tius inspeclat, nec, quod ante sæpe & liberali ma- nu tentaverat, parca illas sero obducit. Octavo inde die foraminulum, quod fortè serum ante oc- cluserat aut oculum solidaverat, apparet; magna in- de Nutricula, inayura etiam Parentibus tripudia. Jam vero parulum forameon non inspicere tantum sed & tractare ausa Nutricula, balnearium alterius fa- minæ coofilio immittit virgam, leotique ad justæ magnitudinis proportionem dilatat, ex qua nihil tale in adolescente virgine conspectum. Adeo etiam initio leviculus adjuva natura magna præterite morboia solet. Crediderim ego hic ab urino acti- monia excois interioris laborum naturalium margi- nes purulenti qu'd fudasse; hinc deinde sanies, conjuncta io illo membrorum pusum supetficie utra- que, exsiccarum membranaule quondam præbuisse speciem, non aliter atque excoriatæ parca coire invicem, aut jungi per lympham sanioiam glutino- samque solet. Aliud menstruz æquæ genus puel- læ jam nobilis & octodecim annis majori evenisse me- mini, cui quoties mooflris fluxere, fluxerant au- tem ab anno quovis decimo, toties tribus qua- tuorve diebus aote fluxum nymphæ per membra- nam coalescebant gelatinosam, adeo ut editus pen- tinus obstrueretur; hanc illa adveniente iam sangui- ne mollissimo digitis facile resolvebat, potente hinc io modum fluxui via. Cettè hic etiam à lymphæ ore- rina & vaginali, quæ sæpe acris & copiosa præter men- stris solet, membranulæ valvulorū speciem enarum arbitror, sed quæ à sanguine emollita, & digiti fa- cile cederet, nec ante rediret quàm eadem illa san- nies, quod tribus quatuorve diebus ante menses

fieri solebat, angustias subire mensuramque quamvis repeteret. *Ioh. Nüßl. Pecklinus in observationibus Physico-Medici.*

Infantis penis non perforatus.

Sicuti puella quandoque clausis nascuntur vaginis (quod pluribus probaverim testimoniis) ita poeti interdum ocellus prodeunt virgines. Huiusmodi exemplum vidi cum Chirurgo Adriano van der Crays, in nuntio cuiusdam filiole, cuius masculi membri anterior pars non erat perforata, vel minimam saltem aperituram indicium, folio gerebat loco, quæ tamen transmittendo lotio non esset apta. Ita ut procedente tempore aliam sibi aperiret urinæ prorumpens viam, sub freno videlicet penis. Infans tamen, quoniam recens natus erat, fidelis Chirurgi opera hoc incommodo fuit liberatus.

Varia clausurarum virgarum exempla passim habent scriptores nostri in quibus, folio deiciente et anseru, urinæ sibi alium aperuit, vel infra glandem penis sui præcænti observatione patet, ac mox de ad idcirco dicitur) vel in media urethra, aut etiam circa penis radicem probe pubem, ipsove quandoque in periculo.

D. Melchior Fräbe obs. 98. Miscell. Medico-Physico-m., Ann. 3. p. 158. viam quandam se novissime tradit, cui penis non solius loco, sed infra prope siemum perfo. aus esset per quam aperituram idem non urinæ tantum, sed & genitalia egredere. Duxerat bis uxorem illam, ac sex genuerat liberos, nec minus quatuor alii coitu duxerat. Nec dissimile est quod tradit G. Samuel Polissius obs. 104. Miscell. Medico-Physi. Decut. l. ann. 9. p. n. 267. de senescente, cui ejusmodi male formato pene prodierat, ac licet hic folio loco foraminis quoddam gereret vestigium, sedulus tamen non inique extensor non sufficiebat hæc tamen ille per aperituram infra glandem absque incommodo egredere. Uxorem duxerat, liberos autem non procreabat.

Apud Livianum cap. 90. p. m. 259. de puero legitur est, qui obit uita aetate penis parte, per angulum foraminis infra glandem urinæ egrediebatur, quod earum vi paulatim eo loci factum erat, quamvis non sine lachrymis, membrisque illius tumore procederet ejectio. Item quoque de puero refert, qui, licet pene perfo. aus, e arum tamen utriusque fune media in virga, huius pauribus ne noctu ledum perlingeret, pueroclerat. Ita ut vinculum istud, quamquam inopere ferretur, removere vesica urinæ duobus in locis tumentem admodum aperiret penem, quæ foramina, nonnulli hac via transiente urinæ, atque ocella etiam temporis processu callo obductis, sanari nunquam potuerit. Meo quidem iudicio, nisi cutis fustas fuerit minus tenuis, foraminis labia incidit & abradit potuiffent, inducta interim antroscum in penem plumbea vel argentea cannula, donec medicamentis idoneis cicatrix uata fuisset, remanens.

Simile præclusi fune penis exemplum Bierlingus obs. 209. p. 305. Ephemer. Medico-Physic. German. se vidisse ait in puero, cuius virga supra locum quo præclusa erat tora sphacelo corrumpebatur, ac putrescebat. Ille autem per factam, quæ proximè ventri adhereret, penis aperituram, postea semper absque incommodo lotium excrevit.

De fusante bimulo scribit Amatus Lusitanus Cur. 27. Cent. 1. p. 42. cui pene non perforato, nec ullo foraminis loco debito existente signo, prope testiculos per aperituram egrederebat urinæ.

Pueri trimuli meminit Gerh. Blasius obs. Med. 5. p. 39. qui rectè alioquin se habens, locum per foramen in perinaeo excreverit prope penis radicem, hic enim nullum omnino permittebat stansium, nec ullo tegebatur præputio.

Causa ejusmodi meminit Theod. Kerkringius obs. 54. p. 115. de egro quodam, cuius in cadavere infra scrotum fistula fuerit reperta, per quam multos annos, perforata etiam ipsa vesica nec non transmissa nigante virga, urinæ emiserit. *Cornelius Sempers. observationum rariorum Cent. 1.*

Annus imperforatus, Eiusque Anatome.

Ancilla ea illicito concubitu prægnans, av. Octobris 1779. Viennæ sortum, quoad externa masculinum ad initium noni mensis, alias quidem vivum (sed cum pedibus prius in partu venisset, ac collo diutius inter sinus mulieris lætebas hæsisset, deinceps suffocaram, enias est: Qui cum à Medicinæ Studio ad me delatus esset, convocatis aliis Collegis studiosis, partes earemas, examino, in quibus alias nil præter naturale observavi; nisi quod deatra manus duobus tantum digitis prædita esset, Membrum etiam ita contractum, ut potius planam pedis n. ferret, addita portione callosæ pellis circa earemas applicatur pariem, quæ non incontinè calcem tepescebat. Pedes etiam nisi quod minime contracti, nil insoliti habebant: convertito verbò factu in abdomen in dorsi spina *rudens* seu obliquatio observata tum & anus d. siderata, loco cuius eminentia quoddam callosa ad lineam asque, scrotum dirimem, protenta erat, contraxeratque à me digitis his partibus, Meconium per penem prodierit, unde, statim conjectatum, naturam viam pro alvinis excrementis per antrum affluisse: quæ ut melius pateret, abdomen decussatum, illis tamen Umbilicalibus vas, aperto, inter quæ arteria Umbilicalis sinistra, tum & Urachus desiderabatur, deatra etiam non rectè deorsum in scrotum descendere ferebatur, sed paulo altius ante divaricatum Aortæ inferebatur. Hepar mole vastum, &c. ut fieri in supet nais affollet, utrumque Hypochondrium occupans: sub eodem stomachus hærebatur; qui admodum contractus, ac multum protensus potius intestinum quoddam referebat: Scatebat is præterea mucosissimè, qualis & in ore reperiebatur. Lien naturaliter se habebat, intestinum duodenum verò, ubi cholochochus, seu potius communis ductus inferebatur, summo prete dilatatum, ita ut novum quasi ventriculum repræsentaret. In jejunio & ileo nil, p. n. observatum; Cecum vero, licet protensum, contractum tamen & vacuum. Colon ab initio satis tenue, sed in progressu dilatatum, nec multis cellulis eastrum, vetus rectum copiosissimum Meconio targebatur, ac tandem in rectum terminabatur, quod etiam eo loci, ubi aliæ vesica locari solet, in appendicem vesicæ emulam (hæc enim etiam in hoc sexu deficiebat, dilatabatur, ac tandem non per anum, sed antroscum, membrum vel pendulum præputio suo munum referebat, eare corpus finiebat, cuius structuram, ut melius innotesceret, propria manu delineatum transmittere lubuit. Jam admirabat naturæ industriad, quam putabam loco vesicæ dilationem seu appendicem recti substituisse, siquæ compendiaris via utrumque excrementi genus excrementum voluisset, sed cum in Renæ inquirerem, hi non glandulosi reperti, sed eorum loco glandulæ tantum Renales, irregularis figuræ, substantia solito solidiori prædicæ,

præditæ, & compressæ admodum coarctatæ, adhærescebant ex insuper ramificulis ex Aorta & cava descendente oriunda, quæ emulgentes venas & arterias supplebant, nulli etiam Uræteres ad appendicem recti, velicæ amulam, viciebantur: unde in opinione mea superiori me falsum deprehendebam. Ex istdem Aortæ & cavae troncua vala exoriebantur spermatica utrinque in testiculos minutos eicere magnitudine, & compressos, formineos fere æmulantes, ac vasis seu capillis suis pampiniformibus insignitis, terminata, qui testiculi non in Scroto, sed ad latera pelvis in abdomine (qui locus aliis muliebrium est) sitinabantur. Scrotum verò vacuum erat ac dano crassiori prædium. Inquirebam in testiculorum defectiva vala, ac vesiculas feminales, & prostatas, sed præter confusum nem vasorum quasi gangrena tactum, ob compressum rectum meconio admodum turgescens, nil observare licuit, neque aliud in abdomine præternaturale visum. Unde ad examen medici & mox venteris progressum, qui nil p. o. etiam in se secondabant. Dubium tamen ex hæc movet pulcrit, utrum factus hic enitas.) in utero enim visisse supra relatam) supervivere potuisset? & num ad generationem aptus? Putarem ergo salvo meliori iudicio, nec vivere illum stante hac conditione partum potuisse, nec enim locus erat p. o. excretioni Urinæ, nec generatiori aptum (cum & locus pro excretionis feminis desiderabat) fuisse, tum corpora nervosa penem non constituabant, quæ ad rigiditatem illius in generatione necessaria; involuorati etiam faeces alvinas deturbasse, inde colligere licuit, quod Musculi antem levatores, tum sphincteres disticebant, *D. Walffriegel in Lit. Vienna dati ad D. Sachsum.*

De Ano clauso.

Anno 1672. d. 7. Jan. Vocatus fui ad Civis ejusdam primarii filium vix viginti quatuor horas natum, inveni intestum illum fere involutum in gremio obdormientis jacentem & quasi animam agentem, ut ab adductibus etiam mortuus erederetur: à fasciis ergo ipsum liberavi jussu, & lenticis calidis debile illud & pene emortuum corpusculum involvendum curavi; hoc facto, quamprimum ex proximo pharmacopolio affecti porrit exhibui cochleate aque ex typhla C. C. recens destillata, inde sensim ad sese rediit pulsio, inquisivi postea ultetius in causam istius debilitatis & lypothymicæ; animi ergo guttur ilud infestis impervium esse comperi, observatis præterea quoties mitellas ille respicebat, materiam excrementosam in suo latente, exitum vi quadam molitæ: meo jussu advocatus fuit Chirurgus expedite manus, qui instrumentis incisorio tunicam illam quæ anum claudebatur, perforavit, exiit illico materies excrementosa atramenti crassioris instar satis magna copia; sublevarius inde paulum bonus ille pulsio liberius respirare cepit, sequenti tamen die satis concessit, quia quamprimum anus pervius esset, etiam per nares materies parvula effluabat, fortè oboculis ibi lateoria signum: sic Ars nisi naturam adjutricem habere frustra sepe tentat auxilium. *D. Casp. Kolichen.*

Anus imperforatus.

Anno 1669. Mense Octobri in Suburbana Utatavalia Villa, Fabro cuidam lignario nascebant puellula cætera optime conformata, præterquam quod anus penitissime clausus cisset. Obstetrix id vix ex

negligentia non observaverat, vel nescio qua ex similitudine sem parentibus revelate dissimulavit. Tandem quarta post partum die anxia ad me venit, consilium petens; cum respondi periculum hinc vix impendere, nisi oculus a Chirurgo perito clausa porta aperiretur, opus tamen fore ut ante ipse infantulum viderem, & vix certum cotatiouis modum determinare possem; propterea obsecra & patri responsum meum denotavi; qui haur cunctanter filiolam ad me deferri curat, ipse spectator curatiouis futurus. Sublati ab infante lineoleis compello anam ite quidem locatum, nonnihil tamen prominentem præter solum, & penitus coactum veluti confutum, nec nisi levissimum, ac vix ab acutiori oculo ite discernendum indicium Foraminis, quod lineola subtilissima, veluti calamo inscripta, designabat. Digito est comprimebatur anus, in interitum tamen recto quicquam derineri excrementum, nondumque dissoluci poterat. Contra guttati semel atque iterum, aliquando etiam paulo longius faeces alvinas modo tenuiores modo crassiores, propter paucior copiosiores urinaque diluibus, per maculam excremebantur, ex qua non tati etiam flatus cum sibilo p. o. rumpebant. Jam quæ venter ab excrementa retenta manifeste intumescibat. Interea serio pensitavi, quia in tali calo, Sennertus, Riolanus, Mercurius atque Minadus consulunt, atque insuper in consilium adhibitis viris aliquot ex Praxi Medica celebribus, Faustoribus & Amicis meis omni cultu & honore obsecrandi, vitium hoc non sine ratione pro inemendabili habui: Nihilominus ut parenti, tam enixè flagranti ut quodvis auxilium tentaretur, etiam si feulcraneum foret, faceretur, indultum fuit Chirurgo, aliis satis solerti, ut periculum faceret, quoad apertæ clausura posset. Hic quidem Lineolæ supra memoratæ, atque ab ipsa natura in prominentem anum inscriptæ, Lineolam dextrè insigite, vesumiamen live ob p. o. funditatem coactentia, live ob laxitatem contrageat in extimo Sphinctere cutis, acies instrumenti etiam valentius & bis adacta, profundius penetrare non poterit quam ut loca superficialia tenus ut non paucum ginta um sanguinis profusione, vulnera erant, quemadmodum laudatus Sennertus satis clare & fideliter lib. 5. insinuat. p. m. 1605. prædixerat.

Cum ergo melius esset, ut ab operatione hæc manus detraheretur, quàm ut infantulus potto & finitro torqueri deberet, statueretur, patri spe omni curatiouis excluso filiolam donum reportandam reddens est. Infantulus vero, abdomine toto à Gentilibus usque ad sternum, mirum quantum intumescens, ut tantum non iocunda ibi viscera, præprimis tamen ventriculus, transperterent, die abhinc tertia (quæ septima à partu erat) miseritimo adductum patientum ipseculum, suffocatus obiit.

Cadaver, sectione dignissimum, nec prece, nec promissis, nec comminationibus à matre nimium superstitione oblitata impetrari potuit. Infantulum hinc spectantur Consilioque & operationi interfuere Viri Nob. & Experientiss. DD. Godefridus Tilius, Physicus Reip. DD. Philippus Jacobus Sachs à Levenheim, D. Gasparus Feldnerus, D. Job. Lanius, Præfidi Præulavienfis, nec non Dn. Daniel Schmid, Chirurgus.

Scholion. Treæ ocellorum Podicum potissimum dari species ex prædicorum traditione & quotidiana Experientia comprobata facile; videlicet Angustiam live Conviventiam intestini Recti, Ani Clausuram per membranam, & Conileum, propter quæ

quem patientes propriè Aeretæ five imperforati dicuntur.

Illam observavit Scultetus in Armamentario Chir. obf. 77. (vel 71. secundum exempl. German. Francos. edit.) ibique curationem per immisos penicillos ex radice Gentianæ, ad intestinum dilatandum, exhibet.

Ibiâ descriptionem & curationem Sennett. Infit. l. 5. p. 1. S. 2. c. 7. p. m. 1005. Fabricius Hildanus C. 1. obf. 73. Ronficus Epist. 14. p. m. 45. nec non Botellus C. 1. obf. 77. & C. 3. obf. 9. fideliter communicant; unde elucet Eandem coniungere triplicem, videlicet, in aliâ inveniri membranam tenuem, quæ facile digito dilacerari potest; in aliâ membranâ densiorem, quæ scalpello opus habet quale exemplum Nobiliss. Dom. D. Sacha à Levenheim, Fautor & Amicus, inter præcipuos ob singularia benevolentia suæ testimonio merito habendus, communicavit; nimirum quod Anno 1663. mense Maio vocatus fuerit ad Fabri ejusdam Lignati recens natum puellum, cuius anum membra nuda contractum invenit, subtili latente colostro nigro, in, sectione membranâ adhibita, & supposito absterivo & diluente, operationem faciliore Chirurgo Henrico Neugebæro, feliciter restitutus est, & aliquot annos vixit. Similem huic historiam *Odenus observavit, referente Schenck. lib. 4. pag. m. 383.*

In aliis denique foramen ani membrana prædura, in qua nullum fere vestigium ani, præter maculam (quam lividam in suo infante spectavit Hildan. l. modo citato) apparet. Nec dubito quin ad hanc classem reduci debeat Sculteti obf. 77. ubi refert, se novisse obitricem Patavinam, quæ anum totaliter occlusum ac:ula communi perforare, & foramen turundis ex Gentiana ampliare solita est.

In hac ultima, five tertia specie foramen podicis omnino occludit five carne, uti Ronficus Epist. cit. existimas, five etiam cute densiore, vel, quod fortasse sæpius contingere potest, utroque modo. Neque etiam à vero absona videtur conjectura naturam in his duplici modo aberrare, vel in Conformatione intestini recti, quando illa hoc vel fundo vel ipsius corpori, recto ductu (quemadmodum oblique nretes inferuntur) implantavit, quod Anatomia pueri Genevensis apud Hildan. C. 1. obf. 75. & filiol. lapicidæ Scaphusiani, ap. Schenck. l. 4. obf. 6. de intest. recto p. 383. itemque Laurent. beug. Proceff. Anat. l. 1. c. 16. confirmat vel quando collo vesicæ intestinum inferitur, uti in foemella in pudendum, ut plerumque solet desinere.

Vel II. in Conformatione Ani, quando intestinum rectum quidem recte conformatum est, Sphincter verò constrictus vel carne oppletur, quod Beniven. c. 30. d. Abdit. observavit. Hinc minimè mirum, si quandoque una cum fecibus alvinis Urina quoque supprimatur, quale exemplum Garnerius Schenckio communicavit, & ab Hoc recensetur l. 3. obf. p. m. 283. vel etiam si intestinales feces per Urethram excreantur, citra infectionem intestini recti in vesicâ, siquidem pluribus exemplis competum est, materiae reterant sua sponte sibi viam ex intestinis ad vesicam per exulcerationem ac fistulam quævisse, videlicet ex morbo intestinali, ut Scitcho, Calculo, Vulnere, Ulceribus venetis, &c.

Hoc tamen mirum dignum videtur adeo remella infanum corpora ramdiu sub tormento tam atrocis morbi durare posse; cum ut nosse infans teptimum, sic Ronficus undecimum, Garnerii ap. Schenckium decimum tertium, & Hild. decimum septimum diem

atrigit. Observatum quoque dignum, quod imperforatis, stricte nobis sic dictis, Puernis hoc vitium semper lethale sit, quod à Rioloano c. 33. lib. 5. Enchir. Anat. p. 220. non obsecutè innuit & plurimis exemplis alibi, præcipuè tamen ap. Tulpium l. 4. c. 35. p. 50. & Plater. l. 3. obf. p. 505. confirmatur; Foemellis verò non item, certe non tam subito, aut frequenter funesta est ani occlusio, quod à Minadoo lib. 5. d. Extr. Aff. c. 18. p. 27. col. 3. exemplum puellæ, comprobatur, cui cum anus imperforatus esset, & intestinum rectum in pudendum desinere, per id seces nunquam non excrembar, viam ad annos 6x. & forte plerumque producens: cum quo confertur *Fr. Sanchez. obs. p. 375. & alii.*

Denique verbo notamus, quod non aliud exemplum imperforati ani, quod nostro magis simile sit, in lectione Practicoorum obtrigit, quam quod Platerus in obf. p. 564. habet, excepto eo, quod ibi præputium quoque coaluerat, & nota in Ruga figuram totundam obtinuerat. *Hier. Polnadi.*

De intestini recti perfecta & profunda coalescentia.

Pellionis filiolus aetate demum post partum die imperforato ano deprehenditur; insinuat proin inspectione, & collecta hinc intima coalescentia, pio deplorato habitus est. Cum autem patentes quidvis experiri vellent prius, quam innocens pusio propolis excrementis quasi suffocaretur, eordas quidam Chirurgus intervenientia, scisto tamen denuo prognostico, lancetta aperturam aggressus est, loco simulæ non tam oculis, quam conjectura quæsiensque concepto, puello interim, quasi bene secum ageretur, quietissimo, imo conatum fere quandam egerendi adversus Chirurgi manum ostendens. Postquam ad a tucili pene longitudinem lente sursum pergendo perveniret, nil vero exiit, destitimus, donec clapsus aliquot horis, rogantibus denuo parentibus, insertaque iterato lancetta (exigua semper cruentatione) sensim ac sensim ad finem coalescit, qui longitudine sua duos Auricularum digitos atticulos (in meolocr viro) facile æquavit, perveniretur, & excrementa nuper natis consueta, cuspidi occurrerent, satis liquida. Unde inserta turunda prelonga mestus amplius dilatatur, indeque circumcicæ utalibus medicamentis cicatrifarus est: infante bene iocgerente, bene egerente vigetoque. Demum annulus, nil fallor, (affectu maligno tum, an epileptico? mihi non incertum,) diem suum inspectato obitile dicitur. *Damalis Ludovici.*

De Pudendo Muliebris naturâ clauso, arte adaptata.

Quemadmodum sæpe Infantes occlusio ani occluso nalcunt: ita nonnunquam & foemina sinu muliebris in Utero Matris membrana quadam obducitur, seu plurimi A thores annotantur, quorum observationes congesti Schenck. lib. 4. observ. Medic. obferv. 12. 13. 14. Plater. obs. Guil. Fide. Hildcent. 3. observ. 60. & 61. & Dan. Sennertus Insit. Medie lib. 5. p. 1. lect. 2. c. 7. similitum casuum tractationem propoluerunt. Nos quicquid hac in materia Anthonii Seidelander Chirurg. nobis communicavit, tibi benevole Lectos candide impetremus. Vocatus est prædictus Chirurgus ad Scabinum Veteris Civitatis H. B. mihi bene notum, cujus filiola quatuor annorum à prima

Ratam

statim ortu huiusque unam gutturam & cum summa difficultate atque maximo dolore reddebat. Patientes calculum suspicantes ad eum depellendum varia remedia quæsierunt, sed frustra. Chirurgus autem naturalia puellæ inspicies, invenit eadem membrana valida obducta, viz conspersa rima, quasi aculeis facta versus luteolum rectum apparente, per quam urina in vagina cumulus non stillabat, sed vix transudabat: Ulterius instrumento illuc intruso, invenit membranam admodum crassam, circumcirca cum carnola parte firmiter connexam, imo cum ipso mestu confusam, unde puella gravissimum dolorem in emissione urinae perhibebat. Tum Chirurgus Patentibus indicavit, naturale hoc vitium nullo alio remedio præterquam Sectione corrigi posse: Sed hæc demum sententia die, illis petteritis, adhuc est, ubi Chirurgus in præsentia Patrum & Consanguineorum, puella decenter disposita, sectionem ab inferiore parte versus superiorem aggressus, benediciente Deo, feliciter peregit: primum quidem scalpello, dein forcipe acuta ad id singulariter formata: separatis itaque singulis urinae liberum transitum huiusque prohibentibus, partes vulneratæ Medicamentis, partim doctorem, partim sanguinem silentibus, à prædicto Chirurgo undique secundum artem circummunivit, & tandem unguento Diapompholygos perfectæ sanæ sunt. Puella ista per Dei gratiam in totum restituta in hunc usque diem optime valet. Notandum autem in eiusmodi operationibus magnam diligentiam adhibendam esse, ne vel partes versus collum lædantur, vel, quæ separari debent, intusque maneat, neve foramen nimis angustum fiat, quod postea in matrimonio constitutis nocere poterit, & tandem ne partes diversæ iterum coalescant: Quæ plura exempla talium casuum apud auctores inveniantur. Singulare casum de partium Genitalium coarctatione videtur benevolus Lector apud Gregor. Hock. Epist. Med. lib. 1. Sect. 19. Faciliorem Sectionem & Curationem instituit dictus Chirurgus in Nobili quadam Virgine, cui Genitalia naturaliter membrana, tympani crassitie, obducta erant, relicto à natura foramine ad pili magnitudinem per quod tamen orina libere effluebat. Similia exempla & operationes vide apud Hier. Fabr. ab Aquapend. Oper. Chir. pag. 1. cap. 84. 83. & 84. Joh. Andr. à Cruce Offic. Aut. lib. 5. cap. 47. Guid. de Cauliac. Tract. 6. cap. 7. Beverovic. Chirurg. cap. 3. de Paracrot. Hent. van Roonhuyfen obs. P. 1. pag. 102. 103. Paul. Barbet. Part. 1. Chirurg. cap. 13. tum etiam apud Franc. Pectet. & Pigram in Chirurg. &c. D. Simonis Schultzei.

Ruffica imperforata.

Par conjugum ex plebe tuscanica se invicem Ratione coram Consistorio Episcopali, de impo-
recoia maritali coarguentes, divorcium petebant. Præfens consistorialis, post multas altercationes ad certiore huius decisionem, per certas personas, more veteri, utrorumque conjugum inspectionem corporalem decreverat. Qua facta, culpa in utroque recidit: hæc etenim præter usuram, licet vicennali major ætate fuerit, imperforata inventa est. Igitur per Chirurgum ex artia lege inciso facta, posthinc concordem satis in conjugio suo vixitque atque liberos progenetaverunt. D. Ioh. Helwigii.

Annus imperforatus.

Clariss. Samuelis Iedleii Miscell. Curio.

Decur. iij. Ann. 2.

Obstetricum incursum plures fortis mortis fau-
cibus intrudere, experientia probat. In accessu
meo Gubenbergensis Obstetricæ sorora Puellam, quarto
à partu die apertam in mulem, & mensa im-
ponebat, consilium quærens. Perilusto factum, &
abdominis inflationem intueor, cum levi convul-
sione faciei & vomitu. Interrogo, an alvus sit
aperta? respondet nondum: applicata fuisse suppo-
sitoria, sed invito conatu. Ano viso, subito per
Chirurgum clysterem applicare, & dum canalem in-
trudit, resistere aliquid animadvertit, inde concludo
anum esse clausum. Expono parentibus, necesse esse
membranam, aut quicquid sit, lancetâ perforare
ut exitus debeat stercoreibus deliberant biduum, &
 tandem conuincunt. Disscindimus membranam, ap-
plicamus Clysterem, hinc aliquid feci excrementi,
cum entemate & pauca sanguinis guttula, nulla au-
tem excrementa, id quod pro malo reputabam si-
gno. Propio oleum amygdalarum dulcium ad lubri-
canda intestina, verum omne vomitu rejicit, ut
& Clysteres ano injectos, cum lacte maris cochlea-
tim infuso Vitam potius habere hic factus ad 12. diem
quo obibat. Non dubito, si statim à partu vix fuisset
referatæ, quin vitam postea protulisset ad lon-
gius tempus: leprosum namque demum die operatio
instituebatur, fibris intestinorum jam convulsis. Viam
tamen ordinariam fuisse apertam, monstrabant Cly-
steres, ano injecti, & per os exfluxi. Sic in tempore
venire omnium rectum est primum. Lege sis Dec. 1.
Ani 1. Observat. 2. Item ejusdem Decur. Ann. 3.
Observat. 2. Pertinet autem ad Obstetricum Of-
ficium, statim à partu omnes sanctas partes exan-
tate, & an aliquid desit, an superflue adsit, aut quid debet
apertum esse, oculumque deprehendatur, & vice versa,
sine motu parentibus intimare, ut maturè prospiciant,
ne futuri ulla noxa afficerentur.

Infans imperforatus natus, cum defectu intestini recti.

Clariss. Laurentii Heisteri. Ephemerid. Germanic.

Centur. 3. & 4.

Quamvis non desint Auctores, qui exempla infan-
tum ano clauso natorum (vulgo atretorum) annora-
verint, & Amstelodami jam duos ipse vidit: ob
singulares tamen circumstantias, observationem quæ
hic in vicino pago Palatinæus superioris, Ehlbaach
dicto Anno 1714. d. 24. Febr. seculo obtulit, hic de-
scribitur utile pariter ac curiosum arbitratum sum.
Accessit sum ad infantem masculini sexus die
quarto à natiuitate, de quo obstetricæ illius loci
ad me transmissa referebat, infantem hunc ca-
rere aperturâ ani, eum jam faeces nigras sive
meconium vomitu rejecit, summamque vitium pro-
stitutione laborare, & propterea parentes auxilium
à me desiderare. Quæ de tali me mox cum matri-
cis Medicinæ studiosis in vasis contuli, & ostendi
infantem debilem vomitusulentem, cuius colorem
ex viridi & flavo atrum, anum clausum, & loco
ani vestigium quoddam sumum cicatricem repræ-
sentans, introitum, tactui non vel primum de-
dens. Ex quibus circumstantiis paucum spei infantem

in vita conservandi superesse, Parentibus & adstantibus indicavi, quia ex duritie vestigii suspicabar intestinum rectum deficere, sicut cum Celeberr. Raylechio jam olim Amstelodami observavetam, & propterea etiamsi apertura sive scissio institueretur, tamen ad locum sæcurn me pervenire non posset. Nam in calibus sanabilibus, ubi intestinum rectum tantum cute vel membrana clausum est, vestigium molle & protuberans ostendi solet; atramen ne quid in casu tali accipere & deperatato, ubi mors certa imminerebat, à me omitteretur, unde auxilium adhuc quoddam expectari vel sperari posset, me appeturam moliti velle proposui, quam & parentibus annuentibus tentavi. Nihilum ex illis infantis divaricatis lancetrammagiore, quali pro abscessibus aperiendis Chirurgi utantur, in cicatrice sive vestigio illo an sensum, ac blande secundum situm intestini recti introiti ad quatuor transversorum digitorum longitudinem, sed sine cavitatis sensu ac sine sæcurn effluxu (quæ aliàs cavitare repetitæ per vulnus effluunt) verum perpetuo cultellus in densa massa carne hætebat, nihilque nisi guttæ quædam sanguinis effluiebant. Sed ne quid omitterem, quod prodesse posse, existimarem, mox loco lancetæ longiore aciem triangularem (quam Galli *travar* appellant) immisi profundius, sed frustra quoque & sine effecta. Immisissis tandem digitis accuratè exploravi, an intestinum aut cavitatis ejus explorari queat, verum nihil reperiri licebat.

Cùm itaque nihil auxilii superesse videbam, facto suo infantem relinquendum esse annunciavi, & infante mortuo ejus dissectionem à parentibus expectavi. Moriebatur nocte sequenti post multos vomendi conatus & convulsiones horribiles, proximoque die dissectionem & explorationem suscepi; ubi observavi intestinorum crassiorum cavitatem tantum usque ad recti principium, sive ad supremam ossis sacri partem se extendisse, reliquum ad anum usque spatium densa quadam carne substantiâ repletum erat. Ex qua Observatione discere licet, quod non omnes atteri unus ejusdemque sit naturæ, & quod illi, quibus anus tenuiori tantum substantiâ claudus est, curationem faciliem, tales autem sacri hinc nostri casus, nullam admittunt.

IMPETIGO Vid. CUTIS PITIA.

IMPREGNATIO.

De eâ vid. sub titulo *Pregnantium Meriti*.

INFLAMMATIO seu PHLEGMONE.

A Nôqui omnem calorem, naturæ modum excedentem appellabatur Inflammationem, & hanc duplicem faciebant, *phlogosæ* & *phlegmonosæ*. Igitur sicca illa inflammatio, in qua citra villos humoris defluxum calor parti intus excrescit, *phlogosæ* Græcis, Latine Exsiccio appellatur, estque prope inclinata inflammatio. Sed Phlegmone dicunt, 1. de quibus tumore calido, & eo respectu est calidiorum humorum defluxio, sanguinis nempe potius, volatilibus aut biliosis, tenuis, fervidi, ut complectantur erysipelas, herpes & similes tumorem speciem. 2. De ea inflammationis specie, quæ nomine generis absolute & usitate recentioribus dicta est Phlegmone; tumore nimium à sanguine puro, & eoque mediocri, seu temperato.

Est ergo Phlegmone seu inflammatio rubescens, renitens, dolorificusque tumor. Vel potius dicatur, tumor præter naturam in sanguine in eum & subjectis muscularum effuso, calorem, rubredinem, dolorem, pulsationem, & tensionem excitans.

Distinguitur porro Phlegmone in exquisitam & non exquisitam seu spuriam. Exquisita dicitur, quando purus sanguis extra sua vasa in aliquod membrum effusus est, eique inhaerens alteratur, & incenditur. Non exquisita appellatur, quæ sit ex sanguine minus puro, sed hoc vel illo humoris genere abundante, unde Phlegmone Erysipelatodes, Oedematodes, Scyrrhodes.

• Deoque Phlegmonis causa habita temper fuit, vel purus sanguis extra sua vasa effusus, vel permixtioe alius humoris inquinatus, qui non solummodo in eum, sed in subjectam quoque carnem tandem confluit. Quam enim venæ arteriæque majores immodica sanguinis copia distenduntur, gravatæ in majores quasi onus deponunt, atque hæc demum in minimas, tumque per minima illam ocula sanguis, qui cohiberi nequit, effluit, ac in vacuillabitur spatia; quæ inter fibras sunt primorum organorum, præcipue musculorum, arteriarum, venarum, nervorum, atque membranarum. Quæ partes dum fluxione perfunduntur ac implentur, copia distente quasi divelluntur, ferventique sanguinis ardore incallescunt, ac dolorem excitant: sanguis quippe extra vasa collectus, nec libere circulare potens utcellat pūtescit, ac incenditur.

Verum enim vero sanguinem licet veluti causam tumori huic emodando pletici assignent auctores, tamen sciendi modum plurimi tacent; quem inter veteres aliquatenus exprimit, Doctissimus Fernelius l. de extern. corpor. affect. c. 2. quando dolorem ex calore, hunc ex vehementi inflammatione, illam à sanguine non in solam cutem, sed & in subjectam carnem impacto, & ea venis eo conflente oriri contendit. Hic quancumque causam attribuit fluxioni vasæ distendentis, quæ distensio à plethora ad vasa oritur; eundem credendum non est, omnem omnino inflammationem à sola sanguinis copia fieri, cui ratio & experientia quoque contrarianter. Enimvero in plethora cuor tali modo vasa distendi; permeantque, ut sua sponte carceres suos non perfingat, nisi aliud quid accedat, quod sanguinis motum retardet, quodque stagnationem, effusionem, atque adeo inflammationem moliant. Cl. Sylvius Præcos Medicæ l. 1. c. 40. incendi sanguinem, & inflammationem oriri arbitrat, quatenus ea ipso in vasis suis valde distentis, & aliis quibusvis partibus subsistente, hoc est, stagnante moa incipiunt evocescere partes spirituosæ, magisque volatiles & subtile, tum acidas, tum salinas remperare solent, unde utroque actiones factæ acris in se motus insurgunt, effervescensque ob pauculas sanguinis oleosas calidam excitant, quin paulatim sanguinem illa corrumpunt, ut in pus vertatur, & quidem pro sanguinis corrupti varietate plane varium: ubi satis clarè acidum accusat minus temperatum, partibusque spirituosius volatilibus illud tempestantibus privatum.

Ex dictis itaque constare videtur, sanguinis in minoribus vasis stagnationis, hinc ejus effusionis, indeque oriri inflammationis, primam esse causam Plethoram ad vasa, vel ea obstructione vel compressione. Enimvero venæ cum nunc à sanguine, nunc à pituita in ipsis coagulatis ac concretis obstruuntur; vel ab aëris æterni frigore, aut potenter adstringentibus, medicamentis admodum contrahantur, tunc plus sanguinis per arterias influat, quàm per venas nunc obstruatas vel compressas refluxere possit: hinc

crucior

error pulsation collectus, eadem vascula magis, magisque distendit, & ita quidem, ut retracts corundem oculus, exitus ipsi pateat; & modo runc (quoniam sanguis ex arteriis in venas non per anastomoses, sed per intermediam partium substantiam, hoc est, carniū tubulos seu poros circulari) is ocellatio extravasatur, ac in vicinarem partium substantiam effunditur; ubi copia medioti saltem collectus, modo nunc expositus, mox exarscit, & caloris sensum molestem in parte sensili producit; quæ mutatio inflammatio vocatur.

Sequuntur nunc ordine symptomata pluribus omnibus communia, qualia sunt dolor, tensio, pulsatio, rubor, febris, perpendenda. Ex sane inflammationi plerumque coadjunctus est dolor, propter peccata acidum acidus & volutius, effervescentiam inordinatam primo sanguinis, deinde membranolas partes vellicando dolorem inducens. Dolorem excipit tensio, quæ affluxu sanguinis in partem subjectam, quæ venæ recipere oqueunt effervescentia præternaturali, obstructis vel compressis vasis, incipiente, tandem quæ ebullitione sanguinem in pus præcipitante, quæ postmodum cessat. Rubore oritur ab extravasato & exarscente sanguine per cutem ac cutis lam transparente; alius eodem impressus per musculos, cutemque vix transpatet, ac minorem inducit ruborem, qui tamen pro ratione ebullitionis vel effervescentiæ sanguinis vel accrescit, vel decrescit. Cæterum febris, quæ non raro adest, vel primitiva est, vel symptomatica; Vix à sanguine acido, vel aliter depravato atque hinc in parte inflammata stagnante, unde motus ejus violatur, ac inordinatur fit.

Signa porro, quibus dignoscitur hic affectus sunt membri inflatio, rubor, calor, dolor, profunda pulsatio, molestiaque tensio, & alia ejusmodi, quæ sanguinis abundantiam, & extravasationem aperte arguunt.

Hæc verò partium externarum inflammatio à multis morbis liberat partes internas, adeoque salutis plerumque; nisi extensione gangrenam producat. Periculosa equidem & difficilis curationis est inflammatio, quæ Oculos, Fauces, Penem, Mellebre pudendum, Articulose occupat. In juvene, & ætate brevius curatur; tardius in corpore pingui, quæ macilentio.

Ut autem rectè perfectèque phlegmone turetur, duo imprimis sunt observanda: primum ut causæ antecedentem occurramus; secundum ut causam continentem evacuemus: quibus tertium adjungi potest, ut emendantur symptomata; quæ aliquando tam sæva superveniunt, ut omnem Medentis curam ad se neglecto etiam morbo, convertant.

Repellimus ergo, & corrigimus causam antecedentem recto rerum nonnaturalium usu, & humoris in partem influentis Resolutione.

Rectus rerum nonnaturalium usus in bona Dieta, seu debita ac ordinata illarum rerum dispensatione consistit. Aër eligatur serenus. Cibus Potusque modice fumentur, sique refrigerantur: calida quævis, dulcia, pinguis, & Zinziber, Piper & similia nocent. Nocet etiam corporis motus, imprimis parti læsæ. Conducit fomus moderatus. Oblunt Alvi durities, Venus.

Quod si bona Dieta, hoc est, recta rerum nonnaturalium dispensatio ad humorem, qui in partem affectam influit advertendum, nec satis idonea, nec satis valida foret, venisectio quamvis impudenter inflatur, utpote summoque necessaria, vel ad evacuandum, vel ad revellendum, vel ad dirivandum.

Interim vero dum hæc sunt, cum tardissime corpora vitiosa non abundet humoribus etiam per Clysteres, atque purgantia leviora tunc usupant, sæpe æque ac venisectio iteranda, multum edicere possumus.

Alterum autem Medici ac Chelurgi de evacuanda conjuncta materia consilium versatur in recta Topicorum applicatione, & commoda administratione, hoc est, in dubia ac tempestiva eorundem ad partem affectam appositione, diligenter considerando, quod sit tumoris initium, quæ progressio, &c.

Remedia igitur quibus in inflammatione laqueo uti oportet, sunt modice repellentia, quibus alia quid discutientium admiscetur, ut influens materia atteratur, & quæ nunc influxit leviter interim resolvatur. Quæ in finem eoducunt æquæ planaginis, solati, spermatæ & narum, rosmari, storacis sambuci, acerrum rosmari, sambuci, vitium rubrum adstringens, saccharum Saturni, camphora, & similia: abstergendum verò à vehementer adstringentibus, Bolo q. anneno, sanguine Draconis, Aracia, Gallia, Alumine, onibulque oleosis & pinguis, utpote valde noxia. Quæ omnia ponis obstruendo, adeoque distillationem prohibendo dolorem, calorem, hinc & inflammationem augent.

Sed quæ sunt in irripientia inflammationi fieri imponenda Repellentia, ab his tamen abstergendum, 1. ubi iuxta partes nobiles est inflammatio, vel in glandulis, 2. quando humores maligni sunt. 3. Quando critice expelluntur. 4. Quæ fit inflammatio in corpore Cachectico, quæque pars affecta debilis admodum sit.

In incremento, hoc est, incretente Phlegmone, quoniam & repellere, & digerere tunc oportet, habenda magis ratio humoris influentis, & ejus qui iam effluxit. Sic nimirum repellentia admixtis resolutivis & lenientibus erant temperanda, ut resolutiva prævalerent. Fomentum vet. gr. applicetur ex Malva Althæa, Violaria, Absinthio, Scordio, Ruta, Floribus Camomillæ, Meliloti, Sambuci, Rosmarum rubrum, Baccis juniperi, similibusve in aqua, vel Cerevisia tenui decoctis.

In statu verò resolutivum pondus augeatur, admixtis unà anodynis, si dolor molestus admodum sit. Cum autem ad declinationem vergat inflammatio, vix minus discutite convenit, adeoque sola discutientia & resolutiva sunt imponenda. Quæ in finem applicetur sequeas, aut simile Cataplasma.

℞. Fol. malvæ, althææ an. Mj. sumen. absynthii, flor. camomillæ, meliloti an. Mss. Coq. in cerevisia tenui ad mollitiem, dein in mortario contrahantur contritis adde farinæ hordei, seminis an. ʒiij. olei anethini ʒiij. pulv. croci ʒss. M. F. Cataplasma. Cataplasma loco non minore cum fructu apponatur fomentum ex superascipitis discutientibus, additis & aliis, deorsum, cui vel Vinum Gallicum, vel spiritus violi, pro te nata, admisceri potest.

Quod si inflammatio ægrè resolvatur, tendatque in suppurationem, promovenda erit & accelerata parvis confectio ac generatio. Hoc verò præstant omnia medicamenta emollientia & Macurantia vulgo dicta, Radices puræ & folia Althææ, Malvæ, Liliorum alborum, Brancæ orina, Flores Camomillæ, Meliloti, Farinæ Lini, Foeniculi, Farinæ, Catixæ, Capæ sub cineribus assæ, Unguentum Basilico, Emplastrum Diachylum, & similia. Ex quibus commodissime parati solent cataplasmata, ex gr.

℞. Rad. liliorum albor. recent. ℥ij. caputem sub cineribus assat. ℥ij. fol. malvæ, althææ, Bor. melliloti an. Mj. Catiscum ping. confic. N. a. coq. in aqua pura vel cerevisia teoui ad molliem; tunc in mortario contusus adde farinæ seminis lini, sermigenæ. an. ℥ss. unguenti basilici ℥ij. M. F. Cataplasmata.

Si aorem Agelis arideant magis unguenta vel Emplastrata, nec à pinguibus ledantur; si ungui poterit semel aut sapius pars dolens litu, ea unguento Agrippæ, Althææ simplicis vel composito, Oleo liliorum alborum, similibusve parato; mosque ei imponi emplastrum Diachylum cum gummi, ut & Mucaginum.

Igitur ubi Calor, Febris, & alia accidentia temiserint, quando in mucrone tumor atrollitur, quomodo pressione digitorum fluctans velut humoris inundario percipitur, tunc intelligere licet pus confectum esse. Quare siue procalificatione tumor sperandus erit, ne pus diutius conclusum mora reddatur acius, ideoque nocentius, atque ab ipso partes vicinæ magis magisque corrumpantur, sicque ulcus majus, sicciosum, & fistulosum fiat. Aperiendus autem est loco commodissimo, hoc est, in loco tumoris maxime molli & declivi. Fiat vero apertio aut cauterio, aut Scalpro; eundem Scalprum Cauterio præferendum puro, præsertim quomodo tumoris inest robur, ardor, atque purulenta materies calida est.

Sed patiens si admittere nolit apertionem, danda opera, ut versus corporis superficiem alliciatur pus, quo citius ab ipso perforetur corrota cutis; cui usul Cl. Sylvius prax. Medic. lib. 2. cap. 40. §. 58 loquens emplastrum valde catollit.

℞. Mellis optimi, farinæ fecaliginis an. ℥j. vitellum unius ovi; imponitur blando igni, & agitentur ad emplastri consistentiam. Emplastrum hoc extendatur supra lineam densum, & applicetur parti affectæ, in diærenovando.

Possunt etiam Ficur contundi, & cataplasmatis modo calidè applicari loco tumoris maxime molli & eminenti, quo sic facilius ac promoveatur abscessus apertio.

Ubi autem multum pus continetur in abscessu, sedulo cavendum, ne omne una vice educant, sed partim; quoniam Agororum vires aliis non parum proferuntur. Ubi vero parum pus adeit, nil nocet omne effluere, quod aptum est paratunque ut effluat; omnia pressione forti & diutina molleis Chirurgis famulanti, à qua nunquam aliquid commodi Agis evenit, ut sapius multum inconsumit.

Ceterum facta & aperta pari via, ad ulceris mundationem & consolidationem pergendum; in quem finem conducit digestivum ea Theribinthina, Melle, & Ovi Vitello, peris impostum; vel applicetur unguentum Basilicon, vel unguentum Auream, vel si magis detergendum sit.

℞. Theribinthinæ venet. Mellis optimi, vel Rosæ an. ℥j. Vitellum unius ovi, Farinæ Hordei ℥ss. Thuris ℥ss. M. F. S. A. Digestivum. Nonnulli laudibus catollunt Deterfivum ea Apio, cujus hæc est descriptio.

℞. Succ. apii, plantaginis, betonicæ an. ℥j. Mellis optimi ℥v. Terebinth. venet. ℥ij. farinæ hordei, ovis an. ℥ss. pulv. aloës, myrrhæ, iris Florent. an. ℥ss. Coquantur mel cum succis, quibus consumpta addantur farinæ & pulveres, & omnia miscantur ad formam unguenti. Sin adhuc validius detergere fuerit consilium, utendum unguento Apostolorum vel oleo unguento Basiliconi admixto.

Ubi vero factis deterfivum est oleus, carne oppletur, & ciceatrice obducatur, adhibitis Medicamentis variis nunc capositis, & potio exponendis lib. 2. de Ulcerum curatione. Hunc tamen in finem vehementer laudat Balsamum sulphuris thetethothinatum Cl. Sylvius prax. Med. l. 2. c. 40. §. 61. 62. cujus effectus mirabilis ac fere incredibilis est, si ejus aliquid ulceri intillerit, aut illinatur. „ Mox enim, inquit, „ novi puris generatio ita suis inde diminuta, ut non „ raro hujus unius Balsami ope intra paucos dies ple- „ ne curata fuerit & in Mammis, & alibi excitata „ post inflammationes Apostemata notabilia.

„ Ea hoc autem experimento, haud parvi pendend- „ do, aut Ulcerum Apostemata consequentium „ Mundationem ac consolidationem consistere in „ Correctione puris acid, eosdemque olereat par- „ ti adhærentis, atque sanguinem ipsi nutriendi dica- „ rum ex parte saltem corrumptentis, ac in novum „ pus vertentis: Corrigi vero illud pus parti affectæ „ adhærenti à sulphuris Balsamo laudato, imprimis „ ratione Olei Aromatici, adeoque sale volatili oleo- „ so abundantia, à quo spiritus acidus in pute luxu- „ rians, quin sanguinem in pus indies corrumptens „ non tantum abundat, sed insuper mitigetur, „ emendeturque fit, ut affluens sanguis partes prius „ consumptas brevi teparet, consolidationemque ul- „ timam expediat.

Ultimus tandem curandæ inflammationis scopus est, ut symptomata, illam nonnunquam constantia placentur. Sunt autem ea ut plurimum quatuor, dolor, Durities, Gangæna, Febris. Inter hæc primum locum dolor obtinet, in eoque sedando diligentem esse Medicum oportet, Nam præterquam quod vires prostermit, fur ætionesque debilitat, etiam fluxiones ciet, adeoque inflammationem augeat. Igitur imponatur cataplasmata ea mica panis albi & lacti dulci, addito croci pulvere, confectum. Vel

℞. Flor. camomillæ, melliloti, sambucian. Mj. coctis in lacte dulci, & io mortario contusus adde farinæ seminis lini, sermigenæ an. ℥ss. vitellos duorum ovorum, olei rosacæ ℥ss. M. F. catapl.

Quod si dolor perseveret, nec his cedat remediis, ad validiora confugiendum erit, usupparis etiam Narcoticis; ea tamen Cautione, ne inde parti infertur Necrosis. In hoc casu læque cataplasmata addantur folia Hyosciami, Papaveris, Solani, &c.

Durities vel Gangæna quomodo curari debeant, suis locis sumus dicturi.

Ad curam Febris quod atinet, ea ad Medicum potius, quam Chirurum spectat: Tolli tamen ut plurimum solet Dieta, venæ sectione, & Medicamentis, quæ io phlegmonis curatione observanda modo docuimus. Ioh. Munnicks Praxis Chirurgica lib. 2.

Consultatio.

Inflammatio erysipelatodes cubiti in viro quodam Reverendo.

Maximi in Medicina momenti est, Vir Reverende, non tantum similia à dissimilibus lætetur acque morborum naturam exploratam penitusque cognitam habere; sed & perspicuè morbi idè & veto scilicet remedia quibus affectui debita præstent assignare. Hoc opus, hic labor. Quod affectus qui Te affligit, sit phlegmon erysipelatodes in cubito oborta, ut scribis, facile crediderim. Venarum eminentia & tumor rubens in parte affecta, atque io tumore fervor ac pulsantis dolor, quæ graphice admodum

in literis tuis delineasti, id ipsum manifeste evincunt. Methodum vero in curatione susceptum probare nullus possum. Vidi plures ægros petitiis magis debitorum remedium neglectis, quam intemptiva & temeraria sepe eorumdem administratione. Venæsectio, ut fecisti, nullo modo omittenda erat, quæ in corpore plethorico, quale tuum est, omnino requiritur, & præcipuus scopus est in morbis à plenitudine obortis, ne scilicet sanguinis copia ad affectam partem confluentis malum adaugeat, dummodo in principio instituat. Inchoantibus enim morbis ex Hippocratis decreto, si quid movendum videtur, movendum. Gignitur enim phlegmone ex sanguinis copiosioris influxu quam pars postulat, undecumque etiam insinuat, aut si qualitate præter redundantiam molestus sit. Requirebat eandem febris; quæ accessit, non quidem acuta, quod materia phlegmonis in parte extrema, longe à corde diffusa, hærebat, magna tamen, quod inflammatio fuerit magna & profunda. Huic generationi in Te proculdubio, si præincipientem causam respecteris, magnam animum præbuit, nimis concionandi labor & ardor immodicus, quo factum ut per actum attenuato sanguine & concalescente, exigente motu & in fervore sanguinis massam deducere, propulso foras sanguine è vasis majoribus ad minores; & inde ad minima, donec eandem è vasis quasi expressis & ad inaniam musculorum spacia delatus, in phlegmonem degeneraverit. Ex quibus patet, quam male & quanto damno tuo neglecta fuerit venæsectio. Nec obstabat, quam prærendis, vitium imbecillitas, tanquam contra indicans, cum illa à gravante sanguinis & humorum copia, minime vero resolutione aliqua eveniret. De purgatione omitta tristem et culpandum, præsertim in corpore cacochymo & sedentarie vitæ assuetum. Etsi enim inflammationes maxime à sanguine natales ortus derivant, atramen animæ his præbent humores viscosi & calidi qui sepe sanguinem secum rapiunt. Hi itaque expurgandi, quod commodè efficeris infuso rhubarbari cum cortigitibus in decocto tamarindorum, addita uncia una syrupi rosarum solut. & de cichor. cum rhubarb. Quod phlegmonem ipsam attrinet, cum jam suppurata sit nihil habeo quod addam. An sponte sua aperta fuerit, an vero ferro vel medicamentis, de eo nihil in literis tuis. Illud triduosum, diuturnum & sepe minus interum. Hoc non sine dolore. Ut ut sit, pus diligenter evacuandum, non una vice, sed pluries; dolor mitigandus; & si reliquæ quædam non suppuratæ apparuerint, in pus concoquendæ, vulnus mundificandum, ne ejus heri possit agglutinario, & alia, quæ Chirurgo tuo ex artis lege administranda relinquo. Tu his fructe in commodum tuum ubertim, meque, ut facis, amare petge vale. *Fredricus Lessius in Consiliis Medicis.*

Observationes.

Rustica quædam mulier magnam phlegmonem in brachio habebat, huic cum mensura descenderet, facta est phlebortomia in curre ex loco opposito. Postea applicuimus partem affectæ quæ repellent.

℞. Acceti opt. ℥iij. album ovi ℥i. aq. rosar. ℥ss. rosar. rub. pulv. ℥ss. M. & perias lineas in hoc liquore madefactas loco affecto applicato. Hoc utebatur Benedictus Faventinus Præceptor meus.

℞. Unguent. de cetuisa ℥ss. succi plantag. & semperv. an. ℥i. aq. rosar. ℥ss. M. & cum petis lineis sicis apponito. At cum hæc valde repellente ob insignem dolorem minus juvarent, apposui emplastrum ex

Bibl. Chirurg. Tom. II.

mica panis cribellati cum oleo tasc. & lacte; quod in omnibus inflammationibus cum robore sepe expectati sumus, & dolorem sedare, & fluxum materie inhibere; dolor vero illo appposito mitigari cepit, & inflammatio cessare. Interim fluxum post sanguinis missionem corpus purgavimus.

In alia, ad inflammationem brachii inunxitur primò unguento rosaceo. Postea cum dolor intensaretur, cataplasma sequens impolimus.

℞. Malv. m. ℥ss. pistentur ad mollitudinem, add. farina hordei ℥ss. ol. viol. ros. unguenti popul. an. q. l. F. cataplasma: leptica sunt reterazum. Postea etiam brachium inunxitur unguento populeo, oleo viol. amygd. d. ros. sp. part. æq. imposito deinde iterum cataplasmate supralapso, tandem bene habuit & à phlegmone curata est: alteri hoc cataplasma egregie proutur & dolorem sedavit.

℞. Farin. tritic. q. l. coq. in aqua, addendo ol. rosac. q. l. & parum croci; hoc etiam maturat: hoc item emplastro commodè sape uti sumus ad dolorem sedandum, & tumorem & tensionem remolliendum, & materiam insensibiliter resolvendam.

℞. Farin. sem. lini, fenigr. sem. aneth. fl. cha: mem. melior. bisulc. coq. pistentur & corpulentur cum mucilag. sem. althææ & buryo recenti, porcessi addi in processu farina tabarum. *Teirus Ewings. elis.*

5. lib. 1. elis. Chirurg.

Ubi cognoveris resolutionis non complete opus suum, statim debet sollicitate ipsius phlegmones impurationem, quam complebis sequenti emplastro.

℞. Rad. malv. fol. viol. an. M. ig. rad. alth. m: nutum iness. ℥i. rad. lil. alb. ℥ss. bulliant omnia in aq. ad medietatem, consumptionem: deinde adde mucil. sem. cunilium ℥ss. lacin. frumenti ℥i. pingued. porcini, bury. rec. lact. mulier. an. ℥i. ol. lil. alb. amygd. d. an. q. l. ad impinguandum emplastrum, quod calidum loco dolenti apponatur. Ad idem egregie matians & suppurans.

℞. Læcis vaccini. lib. medull. panis subtiliter trita trita: thi. succi cunilium ℥ss. croci ℥ss. ol. lil. alb. ℥ss. M. & calide apponito: maturata vero phlegmone (cujus indicia etiam mollities cum undolitate apparent, carentia doloris, & tensionis privatio;) debes te preparare ad illius dispersionem, quod si patiens ferro vel igne terretur, discumpatur sequentibus.

℞. Diachyl. simpl. ℥ss. fermenti ℥i. ol. amygd. d. ℥ss. M. grosso modo, extend. iuxta coriæm, in medio pone stercor. columb. subtiliter pulv. ℥i. & phlegmoni applicato; stercore apposito in loco in quo habilior erit ejus dispersio: secundum ingenium est hoc ruptorium.

℞. Fermenti ℥ss. filis ℥i. accri opt. ℥ss. pulv. cantharid. div. omnia simul bene misce, & in mortario bene ducantur, quousque fiat pasta, cupis ℥ss. vel secundum quantitatem phlegmonis discumpendæ applicabis apostemati, superposito emplastro supradicto: rupto apostemate, sic ut plurimum medicabis beris.

℞. Terebinth. ℥ss. vitell. ov. numero 1. optimè agitentur simul, quousque F. forma unguenti, in quo tentam factam ex pecia vel ejus filis ad quantitatem foraminis effecti iunges, & foramini impones, tum vero ipsum unguentum extendens supra peciam, & totum apostema teges: factaque idonea ligatura non multum stricta, ne prohibeatur eventatio spiritus & caloris ad membrum, & materie reliquæ maturatio: sic continuabis per dies, donec materia fuerit sufficienter evacuata, & labia

P 8

148

vulneris optime digesta. Postea ad maiorem mundificationem & absterisionem, apponens unguentum sequens, & tentam intinctam in eo.

19. Terebinth. ʒij. mell. ʒl. M. & usui serra; semper superponendo unguentum digestivum prout factum: mundificata phlegmone, quod potest videre ex privatione generationis saniei & alterius malæ materię currentis ex ulcere & sufficienter absterisa, indigebit tunc ulcus incarnatione & consolidatione: ideo cum sequenti unguento procedas.

20. Terebinth. ʒil. mell. ʒiʒ. thor. mastich. myrrh. aloes; an. ʒi. sacrocoll. ʒʒ. pulverizanda pulver. & omnia in mortario bene ducantur & agitentur, quousque F. unguentum: & sic continuabis usque ad veram ipsius consolidationem: hæc Præceptum meum Favendum admonet: si vero vehementer dolor inflammationi accesserit, modis omnibus is mitigandus est, quod si aurodys nunc demulcetur ad narcotica trahendum erit: inter hyoscynam admirandam opem sepe consulisse frequenti experimento præter quorundam auctoritatem comprobaturum est: itaque solia ejus sub calidis cineribus coquito, recenti atroxigie miscero & admovento; hoc vehementer dolores mulcet, & phlegmosos tumores ad suppurationem perducit. Petrus Forestus, schol. obs. 5. lib. 1. obs. Chir.

Vir quidam verabatur in metacarpio & gibbo manus phlegmone seu apostemate calido: exsuhui balsamum sulphur, ut eo mane meridie ac vespere apostema probe illingeret, & lincola superimponeret cum levi ligatur: quod fecisset, statim maturationem, mox disruptionem & tandem perparcis diebus consolidationem & optatam curationem consecutus est. *Martinus Rulandus curat. 90. cent. 1.*

Plurimos, cum patientes apostematata, seu phlegmones, sanos feci intra paucos dies solo emplastro dialaph. (cujus descriptionem, vide lib. 18. sect. 22. subsect. 4.) admoventem illud mane & vespere, unde citissime ad suppurationem venerunt. Deinceps ultra rursus, & indies his mundificata, mox ad consolidationem perducta sunt: quia in hoc emplastro mitanda & celeris inest vi emolliendi, suppurandi, cumpendi, absterigendi & conglutinand. *Martinus Rulandus curat. 94. cent. 1.*

Cuidam laboranti phlegmone erysipelate in facie, solia hederæ arboreæ in aqua quæ à rectis regulis extulcis defluit cocta, & humida super faciem posuimus: hoc experimentum habuimus à Chirurgo quodam seniore, quod in seipso, tunc sua uxore sepius, ad guttam quoque rosaceam in facie expertus fuerat: & ego in quamplurimis: semper enim mihi feliciter succedit applicatio sol. hederæ post universalia adhibita remedia: eodem modo & sol. ruscilag. cocta in aqua & apposita egregie proluunt, ut expectus sum; quamquam in herpete magis conveniant. *Petrus Forestus, obs. 6. lib. 1. obs. Chir.*

Planta pedis inflammationes periculosa.

Com plantæ pedis partes sint nervosæ, ac proinde exquisitissimo sensu præditæ, atque in parte declivior: ita, non leviore symptomata ex ipsarum inflammatione orti solent, cujus rei exempla aliquot in gratiam tyrorum hic in medium addere non gravabor. Juveni cuidam Colonie viginti circiter annorum ætatis, ex domesticis generos Viri Dom. Guilhelmi de Flodoff. Dn. in Leod. & Wcl. &c. cum ex nimis violenta decambulatione dolor in ipsa

planta pedis exortus esset, & ab initio temedii nulla adhibita fuissent, auctus est dolor, & mox sequuta inflammatio. Ego vocatus totum pedem in tantorem elevatum, & phlegmone occupatum inveni. Dolor aderat maximus, & ad coxas usque se se extendens; febris continua & ardens; inquietudines item, delirium & lipothymiz. In curatione autem hunc lo modum processit. Instituta videtur ratione tenui, sequenti postlancula corpus purgavi.

21. Elodiar. de succo colas. ʒʒ. pulver. PAssavari cum rhubarb. ʒʒ. fyr. rosar. sol. ʒi. cum decocto agrimon. veronic. radib. lapath. acuti, conic, inferior, radic. frangul. & sem. anis, fiat postlancula. Quæ elementet expurgatus fuit. Eadem die post cenam per duas horas ipsi ad gr. vi. laudani ex hui; quievit ea nocte, vitæque aliquo modo refocillare fuerunt; quapropter postidie venam brachii lateris laborantis incidi, & sanguinem ad ʒx. extraxi, erat enim plethoricus & robustus, hinc febris, dolores & inflammatio multum imminuta sunt. Statim quoque ab initio, coxam, groin, & quicquid ab inflammatione liberum, sequenti linimento inunxi.


22. Olei rosar. ʒii. olei lumbri. & axung. human. an. ʒii. M. loco vero affecto, quia pinguis ex Galen. doctrina lib. 5. de simpl. medic. facultatib. admovenda non erant, sequens applicui cataplasmata.

23. Sem. cydonior. sanigt. aleh. an. ʒii. pulveriscentur & macerentur aqua calida per duas horas, deinde admisce farina hordei ʒii. pulver. rosar. ʒʒ. coquant. cum q. q. ad formam, cataplasmatas, postea admisce vitellum ovi cum albumine; applicetur & renovetur quotiescunque opus videbitur. His adhibitis medicamentis dolor multum cessare cepit, & locus materię apparuit, cui emplastrum basiliconis, toti vero pedi cataplasmata præscriptum applicui. Et quia pars illa pedis maxime callosa, lacte calenti, in quo semen sanigraeci, solia malvæ & violarum incocta erant, diligenter foveotavi, deinde novacula callositatem illam abstraxi, quemadmodum obs. 97. cent. 1. in curatione paronychiæ scripsimus. Sic brevi in ipsa planta pedis rupta vomica, feliciter evasit. Interim dum circa curationem atque sanationem hanc occupatus eram aliquoties mihi narravit Generosa Dom. de Leod. quendam ex suis consanguineis ex simili morbo intra paucos dies extinctum, fuisse. Quod mirum nemini videri debet, cum locus iste, ut antea dixi, sit nervosus, & exquisitissimo sensu præditus, ut proinde gravissima symptomata acceteret. *Gulielm. Fabr. Hildanus obscurat. Chirurgicar. cent. iii.*

INSTRUMENTA CHIRURGICA.

PLura hinc inde in toto opere dispersa reperientur. Verum non sic minus præcipuam ipsorum partem sub hoc ipsò titulo tradere necessarium credimus: Ac propterea sequentes tabulas super iis exhibemus.





TABULA NONA.

Offert varia instrumenta pro canterii inurenda, ut & illa omnia que in Tripani Operatione, ut in osium cranii fracturam levigatione adhibentur.

Fig. 1. **E** Xhibet cannulam ferream, per quam fonticulis loco in sutura coronali inurendo, & prius arramento adnotato, foris sit impositam, extrahitur subsequens cauterium solidum Figura 2. expressum, hocque bene ignitum.

Fig. 3. Denotat eisdem cannulam ferream, superiorem paulo profundius, excipiendo eam Fig. 4. expressio destituta. Hoc nitrum cauterium non est solidum ut prius, sed cavum ac incidens, adhibeturque cum animas est in fonticulo prædicto applicando, non tantum locum applicationis inasere, sed etiam incidere.

Figura 5. 6. 7. 8. 9. 10. & 11. Depingunt totam illam machinam quâ utebatur Cælius pro fonticulis applicandis illis qui ad visum serti, vel copri ignis perhorrescebant. Hic scilicet stylus ex eupo indidit 6. immittitur in tubum ab inferiore parte cavum, qui descendit de lamina superiori ad inferiorem figuram 5. & 7. trunquæ hoc machinamentum in placidam ligneam, eum sub operculo Figura 8. & 9. declinatam, & ab inferiore parte apertam reponitur, ut sine aspectu ignis tubuli ignitum stylum continentis extremum loco cui fonticulus inurendus venit immediatè applicati, imò per pistillum 10. per pistidis operculi medium ejacetur, foris ad validiorem impressionem emprimi queat. Videant jam nostri an operoso ejusmodi instrumentò opus habeant.

Fig. 12. Exhibet cauterium ineliformem quò pax aliqua non tantum rescinditur, sed etiam vi ignis instrumenti in id adhiberi hæmorrhagia sistitur.

Fig. 13. & 14. Siliunt illa cauteria quibus intermedia eximuntur, ac putredine accedente, commodè uruntur, imò ob gangrenam emortua eradantur.

Fig. 15. Oblongum ac convexum præbet cauterium, putredini osium quorundam inurenda accommodatum.

Alas non addimus cauteriorum figuras; illa enim siquidem variare debent & in formâ, & in magnitudine, ut & etiam in metalli essentia; pro ratione & figurâ partium quibus applicanda, veniunt, ut & pro amplexione vulnerum, ulcerum, ac osium carinorum quibus imponi debent; item etiam pro satine gradus ignis in illâ applicatione requisit. Hæc omnia ingenio ac industria operatoris committi debent, qui nescit debet quomodo apta confingenda veniant instrumenta, vasis suis applicationibus facientia.

Fig. 16. Est instrumentum, quod ab Hipp. lib. 2. de morb. cap. de suppuratione perspicuum, præcipue & notissimum à Cælio anem & Pauli passim spatio appellatur: Scalpellum nimirum anceps, utrinque acutus, & in superiore parte paululum laus, qui in extremitate sua unam cuspidem coit. Hoc vulnere capitis in crurum vel triangulum dilatatur, & paracentesis in rhotaie modo peragitur.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Fig. 17. Est *cubiter rasperius*, sive scalpellus rectus, ex una tantum parte incidens, ex altera verò retusus, quo utuntur, quando partium subiectarum non est habenda ratio, videlicet in cute capitis incidenda atque ad cranium, & gummosibus Gallicis, in ribis præsertim vel alibi, apertendis: deinde ubi utraque acies aliquid lædere possit, ac in facta mortuo intra utrum in plures portiones dissicando, & vultu carunculis incidenda. *halls* vocatur *Sordybine*.

Fig. 18. Est *Atodini mus*, seu instrumentum ex optimo chalybe paratum, cavum, tees, imis oris serratum & quatuor alis præditum: illa scilicet pars Tripani, quæ circa os circumvolvenda est, & dicitur Græcis *χωνίον*, Cælio verò l. 8. c. 3. *medialis*: qui in medio clavum habet, ut in principio circumvolutionis, *calvaria à petrarum denudata*, similitè insulat, & partes circumpositæ, labia nempe vulneris & petrarum, ut maxime sensibiles, ab offensione vires reddantur: Quod si modiolus in principio adhibendus clavum non haberet, summo cum periculo, & vehementi dolore fieret perfuratio calvarie.

Fig. 19. & 20. Sunt *Medioli femina*, ejusdem magnitudinis cum præcedenti masculo, neque aliter differant à ille, nisi quod clavo careant, unde *femina* nuncupantur. Antequam his feminis utamur, beneficii masculi cranio aliquid vestigium imprimendum, ut ei femine firmius insisteret possint. Pro perforatione autem Cranii admittitur ad minimum tres, sed exactissimi aequales modiolos in promptu habet, unus nimirum masculum & duas feminas, ut aliquoties morat, & in aquam frigidam, aut oleum rosaceum immergi queant, ne vel scobe pleni operationem retardent, vel ex crebra circumrotatione calefacti, erant ipsique subiectas membranas inflamment.

Invento alarum, quæ modiolos in cerebri membranas, vel propterea substantiam immergi prohibent, summum Hieronymum Fabell ab Aquis. ingenium arguit: nam quamvis ex recentioribus nonnulli, ut Vid. lib. 4. c. 10. & Joan. Andr. à Cruce l. 7. de instrum. etiam alarum in modiolis mentionem faciunt, eas tamen nullus eorum tam exactè & accuratè fabricari curavit, quàm Fabricius. His modiolis nunquam non felici successu sum usus, nequeque hodierna tempestate (omnibus veterum instrumentis, quæ olim ad perforandam calvariam excogitaverunt, & quorum schemata apud citatos modò Autores & Paracelsi 9. c. 18. inveniuntur, repositi) chirurgi, præcipue Paravini, Fabriciique in praxi & professione chirurgica succedentes; inter quos superius est celebrissimus ille Medicus, Chirurgus & Professor Paravini, Petrus de Marchettis, Eques Divi Marci Venetorum, meus olim in Anatomia & Chirurgia, per plures annos, respectuè emendissimus, cupis mitificam operandi dexteritatem (qua sæpe omnibus Italis palmam præcipit) tota non tantum Italia, & undique concurrenti studiosorum cohorte stupet, sed ex innumeri felicissimè restituti quasi ad celos usque extollunt.

Fig. 21. Est Tripani altera pars, quæ manubrium seu *veribulum* appellatur, & exitum habet foramen, quo mediante *modiolorum apæ gressio* involuta promptè excipitur & extrahitur, quotiesconque commutato & *χωνίον* fieri necessarii.

Po 2 Hæc

Hæc ratioe ea modiolis & vertibulo componitur *Tripanum*, quò citò, rorò & juundè perforatur cranium.

Fig. 22. Modetiores Chirurgi aliud manubrii genus adinveniant, figurâ hâc notatum. Illud est accuratum, & commodè postquam nodò seu globò in superiori extremo positò, fronti operatoris fuit applicitum, ejusdem manû vertitur sic, ut perforatio promptius perfici queat per modiolum inferiori extremo insertum.

Fig. 23. Est instrumentum compositum ex scalpro (ob lenticulam in extremitate) lenticulari dicto, & vecte. In sine perforationis cranii, hic *Vectis* inter labia excisi ossis immittitur, ad ossiculum hinc inde movendum, ut vasculis, & vossellæ (*Totul.* hujus Fig. 31.) parte dentata auferri possit. Confert quoque ad modicas cranii depreffiones elevandas, firmatam suam in manu sola chiburgi obtinens. Lenticula intersit ad asperitatem (*qua post terebrationem, & ossis exortu remotionem relinquuntur*) abradendas & levigandas, ne cerebri membranz, ob contritionem eorum motum, illis aliter offendantur.

Fig. 24. Est instrumentum *Lenticulare* solum, quod oras facti foraminis, veluti modò dictum, levigat, ne membranas pungendo, dolorem & inflammationem inferant.

Fig. 25. Est lamina argentea (*ex ferro enim nunquam parari debet, ob ipsi ingentem frigiditatem, quâ tam crassâ quàm tenui membrana cerebri nocet*) firma, paulùm resima, & ab exteriori parte lavis, quâ utitur in magis cranii depreffionibus & fracturis, ubi res quaterve cranii os tripanò perforat; atque foraminum interstitia excidende necessarium est; tunc enim lamina inter calvariam & duram materem demittitur, ut ejus pars exterior cerebro proprior sit, ut acuminis forcipum & fetularum, membranz cerebri vel pungatur, vel incautè incidatur. Hinc membranz cultus dicitur, Græcis *μυρρηνομήτρεα*.

Fig. 26. Est instrumentum decussorium, quò dura mater modicè depreffa, cranio easquè applicatur, ut purulenta materia inter cranii & membranas collecta, per foramen modiolis factum faciliè egrediatur.

Fig. 27. Est malleus plumbeus, quem olim usurpabant, quando scalpris incisionis particulam cranii separare volebant, ad prohibendum strepitum & cerebri commotionem. Recentiores Chirurgi utuntur ad hanc operationem forcipibus & fetulis.

Fig. 28. Est terebra triforamis, instrumentum scilicet merè ferreum, tribus, illique d. versis terebris constans, quarum usus in puncturâ cranii, quæ ambas laminas non penetrat, est necessarius, ut his vestigiis calvariz impressum deleatur.

Fig. 29. Est vectis qui in depreffionibus cranii elevandis usurpatur, quoque valentiorè attollit robore, quàm qui figurâ 23. delineatur.

Fig. 30. Est instrumentum, ob triplicem basim quam habet *Triplidus* appellatum. Si depreffio cranii tam magna est, ut præcedentes vectes ob infirmitatem non sufficiant, *Triplidus* vectem B. (si ipsam adest) submisit, & os depreffum perpendiculariter attollit. Si autem locus huic vecti non conceditur, media depreffio, *triploidis* terebrâ A. tertia *diplidus* perforari debet, & dictò elevari modò, unicè cavendo ne terebra ambas cranii laminas perforaret, & duram materem pungat.

Fig. 31. Est vectis, quò utuntur alii in maximis calvariz imprecationibus, imitando vlciores, qui do-

trabete. Inditâ igitur vectis aduncâ catenulata a. sub os depreffum, alterum vectis brachium rectum b. ossi sano innititur debet, ut, dum manubrium d. rorò deprimatur, aduncâ instrumenti parte id quod depreffum est erigatur.

Fig. 32. Est instrumentum ad operationes manuales valdè necessarium, quod *Cellus* vossellam, *Paulus Aegineta* *ἀνδρόπυλον* vocat. Hujus parte duplicatâ & dentatâ a. frustulum ossis corruptum ac mobile, (spicula item & globuli, eorumque fragmenta, turundæ atque pili, & quæ idgenus aliis in vulneribus eazianea reperiuntur, rattrahunt. Famulatur præterea medicinz compotiz, eâ namque summi pili in supertiliis & aliis corporis partibus radicibus extirpant. Latiore sui parte b. ad ceatorum conducit extensionem, item ad pericranii ab ossis separationem antequam modiolus admoveatur.

Fig. 33. Est forceps eacilfoda, cum rostrò pŕittac: d. cui superius cochlea umbellata b. affigitur, quæ rostrum ad duram materem immergi vcat. Inferiùs habet manubrium c. quod cochleæ d. fig. 34. circumvolvitur.

Fig. 34. Est rostrum pŕittaceum extra suam cannulam c. Fig. 33. positum.

Fig. 35. Est forceps alia cum rostrò vulturninò, canaliculata, ad cujus cochleam circumducitur clavis.

Fig. 36. Est rostrum vulturninum sine cannula depictum. His forcipibus ossis aliquid frustulum in curatione vulnerum capitis, partim rumpendo, partim incidendo, auferitur.

Fig. 37. Est fetula versatilis, tympanis duobus, illique dentatis prædita, utilis maxime ad intercidenda duorum vel trium foraminum, modiolis factorum, interstitia: Ubi enim vectes ob rime angustiam spatium non habent, loteridum opus est ut in cranio duo vel plura foramina modiolis conficiantur, quorum interstitium hæc fetula, sine ullò læsionis periculò interciditur, quò vectis ad elevandum commodus submitti, & ossis frustulum, quod non ratò membranas pungi, caui possit. Hujus instrumenti partes conjunctæ literis minusculis, separatæ verbò majusculis notantur.


Fig. 38. Est lamina ferrea A. in mediò secundùm longitudinem eacilâ, quæ superius manubrium B. habet, & foramen C. in flexurâ laminæ, inferiùs autem utrinque aciem acuminatam D. quibus cranio nodulo sumit inŕillit.

Fig. 39. Est claviculus umbellam asteriscò notatus, per foramen C. Fig. 38. tranŕiens, unde capsula E. inŕigitur. Hæc capsula laminæ ferreæ foramini A. Fig. 38. beneficiò orichalcæ lamellæ Fig. 40. regulariter annectitur per duas cochleas quæ capsula in parte averŕâ obtinet, correspondentes orichalcæ lamellæ, totidemque nodulos, ut Chirurgus beneficiò claviculi, capsulum in ipŕo operandi actû, (tursum & deorsum, pro libitò moveat valeat. Foramini H. axis rotæ imponitur, ut ea Fig. 41. & totulæ centrò appareat. Lamella I. superius dentata est, & ibi excipit rotulam; inferiùs L. utrinque æqualis, ut fetula K. in capsulâ, & Figuræ 42. fissuris M. beneficiò rotulæ & capuli, regulariter deorsorîum & sinistrorîum moveri apta sit. Lamina orichalcæ N. in mediò crava est, & duas habet cochleas O. hujus laminæ beneficiò fetula, eam instrumentum planè fuisse compositum, æqualiter hinc inde dicitur.

Fig. 40. Est lamella orichalcæ, cum duabus materialis, quæ suprà nodulû vocantur.

Fig. 41. Est totula semid-nata P. & dimidia capsula Q. unâ cum tribus foraminibus R. quibus tres cochleas Fig. 39. recipit, cum nodis, seu materialis S. firmata.

Hæc



F. S.

aliam extremitatem Chirurghi adhibent ad perficiendum vulnere & fistulam flatam.

Fig. 30. Est specillum compositum ex lara extremitate ad prædictos usus; & cochleæ in alterâ ejus parte acumina 2, quæ gossipio obvolvitur, pro desorptione sordium in vulneribus, ulceribus, ac prædictis fistulis oculorum.

Fig. 31. Est scalpellum falcatus ex uno tantum latere incidens, cujus mucroni argenteus affixus est globulus. Hôc utebatur Veteres pro separatione palpebrarum quæ coherant cum tunicis oculi.

Fig. 32. Est hamulus auctus, ac in mucrone recurvatus, qui tam ad palpebram attollendum, quam ad oculorum ungtem levandum maximè est idoneus.

Fig. 33. Est vasculum oculare vitreum, ex crystallò ita conficiendum ut exactè oculi orbitæ respondeat, & medicamenta per infundibulum de cò exurgens immittit contiocte valeat ne defluant. Ab Aquapendente inventum est hoc instrumentum, fortan minus necessarium.

Fig. 34. Est instrumentum rectum, seu potius renalybe recta, pro polypo è naribus extrahendò, ex chalybe constructa, extrinsecus convexa, intrinsecus concava, aciem habens introcùm recurvata, quâ nihil prius incidendi potest præter apprehensum polypum.

Fig. 35. Est instrumentum incurvatum, quò itidem inciditur & extrahitur polypus qui per narium foramina interna ad fauces tendit & suffocationem minatur.

Alia plura instrumenta pro eadem polypi extractione excogitata sunt, quæ hic non recensimus, quia unusquisque pro occasionum varietate, ea facile variare novit.

Fig. 36. Cannula est ex ferro solida, quæ naribus tam aliè immittitur, ut alceris, quod ozænam vocant, longitudinem attingat. Postea cannula huic omnino integre, nullibi perforatæ, inditur stylus ferreus bene ignatus, quò cannula calefit, & ulcus exsiccatur.

Fig. 37. Est cannula ad latus perforata, pro callò prædido ulceris in naribus existens, per cauterium actuale consumendò, aut ossè corruptò maximè exsiccandò, idonea.

Fig. 38. Est cannula in luminitate foramen habens, quæ naribus inditur, quando post escisionem & extractionem polypi, Linguis nimium profuans, Chirurgi per insertionem intendunt est. Præterea usurpatur, cum luminitas narium, pro ossis corrupti remotione aduti debet.

Fig. 39. Est Stylus ferreus, qui bene candens dictis cannulis immittitur, statimque retrahitur: quæ immisio & retractio rotas repetenda est, quoties necessarium fuerit. Ad operationem hanc citò perficiendam. Chirurgus ad minimum duos in promptu stylos habet, quos alternatim candefactos cannulae immittit. Notandum verò, quòd vasculum oculare atque hæc cannula naribus immitti tendit, in justâ magnitudine deplangi nequeant, quoniam pro ratione ægrorum & magnitudine locorum affectionum debent confici.

Fig. 40. Est instrumentum, quo absconditur uvula, orichalceum, quod in parte superiore circum habet nonnihil excavatum A. in inferiore fistulam B. per quam fili (postquam in seminodum circumvolutum E. & in concavum annuli, ne hinc inde vacillet, repositum fuerit) externum C. mediante stylo superius perforato D. trahitur, alterum fili extremum, per duos circuli annexos annulos ducitur, & inferiori fistulæ annulo alligatur. Hoc instrumentum

primus invenit & descripsit Guilhelm. Fabricius Hildanus cent. 2. observ. 21. quò correctò quulam militis Cæsariani, à Lue Gallicâ infectam & corruptam, absque negotio ligavit Scuteros, & bonè eum succisù abiecit, Ulmæ die 8. Junii anno 1637.

Fig. 41. Est instrumentum uvula relaxata admoventum, pariter orichalceum, cochleat nempe parvum (dimidio autem majus debet parari, quam delinatum est) cujus manubrium fistulosum, & novem pollices longum, inferiori cochleatis parti annodatur. Hoc cochleat pulveribus adstringentibus & digerentibus mixta replerit, & uvula relaxata submittitur: d inde Chirurgus ore arripit fistulæ basin, & infundendo pulveres collumelle & palato undique aspergit.

Fig. 42. Est instrumentum oris dilatatorium cum cochleâ, ex Paræli 9. c. 25. delinatum, quò dentes constructi, valdeque commissi diducuntur, ut cibis præberi possit, ne fame pereat æget.

Fig. 43. Est rostrum grævium, dentatum, & in angulum obtusum directum, globulos, & peregrini corporibus, arripendis, & è vulceribus extrahendis idoneum.

TABULA UNDECIMA.

De Instrumentis vossella simili, cannula fascibus immittenda, forcipe pellicano, rostro corvino, vossibus trifidis pro dentibus evellendis, infundibulò, item aliis variis in paracenthesi abdominis adhibendis &c.

FIG. 1. Est instrumentum Acantabolo simile, forceps nimirum in semicirculum recurvata, dentata, & in apice nodulò donata, quâ ossicula, spinæ, aliæque res extantes, imis fascibus infixæ solent eximi. Quando Clariss. Hieron. Fabricius ab Aquap. in fascium Chirurgiæ acantaboli mentionem facit, intelligit instrumentum aliquod oblongum & tenne, quò duplex, alterum rectam, alterum securum, quale hoc est: utrumque tamen ob arripendi & extrahendi facultatem vossellæ nomen meretur.

Fig. 2. Est cannula argentea ut fascibus immitti queat, incurvata, casside pennæ oleis, & longitudine unius pedis, cum dimidiò vel circiter. Est undique perforata, & in sua extremitate spongiam, magnitudine avellanæ, novam & summitè alligatam habet, quâ ad spinas è fascibus & mediò elopha-go trahendas felici successu utitur Guilhelm. Fabricius Hildan. Cent. 1. Obs. 26. ubi docet operandi modum per cannulam hîc depictam.

Exhibent tetramenta Figura 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. & 10. quæ usurpantur ad dentes perforatos, aut mobiles, vehementissimè per intervalla dolentes, sub accerbissimò doloris paroxysmò emendandos: unde

Fig. 3. Est forceps, pellicani dicta, quoniam rostro pellicani volucris assimilatur: cò autem nomine ad extrahendos dentes molares.

Fig. 4. Est forceps dentaria communis, Italica capote appellata, quòd stium canis morsum imitatur.

Fig. 5. Est forceps rostrum cervinum referens: quæ dentium radices extrahuntur: de qua Cornel. Celsus (quem veluti in omnibus Chirurgiis mirabilem, nostrum versare manu, versare diurna consulas Fabric. ab Aquap.) l. 7. c. 12. de dentibus ita scribit: Quotiescumque dente exempto radix relicta est, protinus ea quoque ad id facta forcipe, quam Græci *plegma* vocant, extrahenda.

Fig. 6. & 7. Sunt forsymp dentariorum officis, quæ



nommatus, ob rostrum illius avis, quæ Latinis *Gal-
lango*, & Græcis *Χαλκιδεύς* dicitur, nempe longus,

Gonorrhæa virulenta subortum in mentu
Fig. 43. Est instrumentum acû *tricuspidæ* (a).

V 4

...circuli annexos annulos docetur, & info-
fistule annulo alligatur. Hoc instrumentum

pléguu vocant, eximenda.

Fig. 6. & 7. Sunt forcipum demaratorum effigies,
que

quæ valent ad dentes evellendos, quibus neque pellicani, neque forcipis communis opera potest operari.

Fig. 8. & 9. Sunt *velles crispæ* appellati, quod plerumque tres cuspides habeant ad procrudendos & excutendos dentes incisivos, & caninos, qui maxillarum alveolis simplici radici infiguntur.

Fig. 10. Est *dentifcalpium*, quo separatur gingiva à dentibus, ut minori cum molestia & periculo evellantur.

Fig. 11. Est infundibulum seu fistula argentea, cujus pars angustior inter gingivas ægri, qui archæ confectus habet dentes, æternas ponitur: latior vero cibum liquidum & potum excipit, atque ad æsophagum demittit.

Fig. 12. Cauterium ad dentagrum demonstrat ex Clariss. Antonii Nuckii; in quo

- A. Est vagina ex cupro facta.
- B. Anstus.
- C. Cauterii manubrium.
- D. Cauterii extremitas, ad lineæ dimidiæ mathematicæ latitudinem caput exsertens, ut intus, quàm decet, cauterium penetret.

Fig. 13. 14. & 15. Sunt limæ diversæ aciei & formæ, quibus dentes vitæ acuminati ac prominentes abraduntur; punedoque inter eosdem interjecta, ut alienis serpat, separatur.

Fig. 16. Est forcex cum rostro plicatino, quæ utuntur in fracturis cranii, quando frustulum ossis, quod membranas cerebri vel pungit, vel deprimit, auferendum venit.

Fig. 17. Est instrumentum, cum rostro corvino in eundem finem abbatè factum.

Fig. 18. Quid sit ex Tabulæ X. Fig. 43. colligi possit.

Fig. 19. Est speculum oris, quod deprimitur lingua & maxilla inferior, ut oris visus exactè perspicui, idoneis tam instrumentis, quàm medicamentis tractari possint.

Fig. 20. Est instrumentum incisorem instar forcipis, quod exciduntur tumores & caruncule oris.

Fig. 21. Est forcex cum rostro græno, dentata & recta, quæ volitæ vices agere potest.

Fig. 22. Est commune oris speculum, quod lingua à Chirurgi sepius deprimitur ad affecti oris visum saltem inspicendum. Hujus speculi annulus aciei prædix est, quæ abstergentur crassiora lingue excrementa, quæ ipsi in febribus ut plurimum tenaciter adherent; quævis præter ea abstergere linteò imbuto liquore aliquo appropriato.

Fig. 23. Est instrumentum argenteum, quod Chirurgi infantum recens natorum linguam facile elevent, elevatæque vinculum acutissimâ forficula tunc excidunt.

Fig. 24. Est canalis ex ferro obliquus, & ad extremitatem f. perforatus, qui faucibus immittitur, ne partes vicinæ lædantur, quando post abscessionem vulve corruptæ, vel nimium auctæ sanguis enormiter profusus inuisione est compescendus.

Fig. 25. Est cauterium ætiale, quod præcedenti cannulæ immittitur, instar catenæ pro Chirurgi lubri & necessitate affectus, potest incurvari, vel ad tangendum saltem vulvam corruptam, vel ad sistendam diminuat hæmorrhagiam.

Fig. 26. Est scalpellus sepietorialis, quod tumores in ore rursus radicibus excindi queunt.

Fig. 27. Est scalpellus, *Ξανθομαχίδης* à Græcis nominatus, ob rostrum illius avis, quæ Latinis *Gallinago*, & Græcis *Ξανθομαχίς* dicitur, nempe longus,

& ad cuspidem paululum incurvatus veluti rostrum scolopacis. Hoc scalpello dilatantur vulnera thoracis nimis angusta, & apertuntur abscessus magni. Eundem laodat Fabric. ab Aquap. pro aperture abdominalis hydropicorum infra umbilicum ad aquam emittendam. Nota, hic scalpellus pro dilatatione valvæ in thorace requirit globulum ferreum in mucrone, ne pulmones cuspidē scalpelli offendantur.

Fig. 28. & 29. Sunt scalpelli ad *macronem recurvati*, & scolopomachi Græcorum formam referentes, quibus fistula in habitu corporis mediocres commodè inciduntur, unde etiam *hæmorrhæus* appellari solent.

Fig. 30. Est scalpellus *falcatus*, qui Italici vocatur *gammali*, & incidit ex parte cava, tenuis id parte gibba est. Hoc frequentissimè utuntur ad omnem incisionem, quæ passim fit in omni apostemate, præcipuè vero in parvis incisionibus. Hic scalpellus habet manubrium oscum, quod commodum est, ad dividendum ac separatandum aliquid ab aliquo: unde Celsus, l. 7. c. 16. de *tumoris tunearum* dicit: tum scalpelli manubrio tunica (quæ post incisionem cutis protinus alba & intenta se ostendit) diducenda à eure & carne est, ejciendaque cum eo; quod intus tenet: hæc diducitur quoque pericranium à cranio, & ungula ab oculo.

Fig. 31. Est *scelopomatatorium* sine manubrio.

Fig. 32. & 33. Sunt scalpelli *ancipites*, qui ad extremitatem referunt formam foliorum myrti: his utimur ad mammas mulierum cancro affectas abscindendas.

Fig. 34. Est *acus acutissima*, longa & anceps, quæ mammae auferendæ trahuntur in basi.

Fig. 35. Est *canalis ex auro Ungarico* parvus, & plurimis foraminibus perforatus.

Fig. 36. Est *stylus* ex eadem materia confectus, qui cannulæ priori immittitur, ut ex duobus figuris unicum fiat instrumentum, quod in vulneribus thoracis pro Siphone utiliter applicatur, & sanguinem ex thorace non concretum, aut pus tenue, trahit. Instrumentum hoc tractorium in angulum rectum vel obliquum flecti, & thoraci per vulnus, casu vel studio factum, immitti potest, ut sanguinem nondum concretum vel sanem contingat: Chirurgi extrahant stylum ex canali, & statim profuerit de canali materia in thorace contenta. Hic trahendi modus ex thorace materiam tenuem, ubi sectio inter 5. & 6. juxta Paulum, vel inter tertiam & quartam costam, juxta Hipp. propter virium debilitatem, vel aliud prohibens non conceditur, optimè succedit.

Fig. 37. Est scalpellus ille recurvus, qui annulū autè potest abscindi, inciduntur hoc apostemata in facie aut gena puerorum & in mammae feminarum timidarum, ne concipientes scalpellum perterritæ, & ita incisionem abscessus prohibeant.

Fig. 38. 39. 40. & 41. Sunt *cannulæ* magnitudinis differentes, *alata*, & pluribus foraminibus perforatæ, ut vulnus thoracis teneant spectrum. Sunt *alata*, ne vulnus immittit, dum æger spirat, thoracem ingrediantur: tot verò foramina habent, ut ea ex omnibus, prout opus erit, possit exire coluvies.

Fig. 42. Est *fistula* ex auro Ungarico fabricata; quæ ante excisionem urinx *meatus urinarius* immittitur, ut per eam exeat urina, atque ita lenitur gravissimus ille dolor & stercor, quem sentiant ægri; quando urinam sine cannula reddunt, ob ulens ex Gonorrhœa violenta sobortum in meatu urinario.

Fig. 43. Est *instrumentum acii uricæ* (a) & can.

nula alata (b) constans, quo hydropicorum umbilicus, & io hernia aquosa scrotum perforatur, ad emittendam aquam. Hoc instrumentum intra- ducitur usque ad cannulae asserimentum, postea acus retrahitur, & cannula sola ad alam intus in abdomine relinquatur, absque omni periculi metu.

Fig. 44. Est cannula sola, & sine acū depicta.

Fig. 45. Est acus sola extra cannulam posita.

Fig. 46. Est acus rotunda cum suo tubulō, quā, in defectū acūs tricuspidis, pari securitate perforat hydropicorum umbilicus, & berniosorum scrotum aquā repletum.

Fig. 47. Est solus acūs rotundae tubulus.

Fig. 48. Est sola acus rotunda.

Fig. 49. Est acus Magistri Jacobi Blokii; in quā

A. Exprimat canoulam argenteam cuspidē rotundā.

B. Foramen per quod aqua ē ventre in cannulam fluit.

C. Stylum, sive ferramentum, cannulae mundificationi, post operationem inservientem.

D. Clariss. Pauli Barbette, cannulam exhibet chalybeam, cuius culpis lanceolae in modum est acuminata.

E. Eiusdem foramen exprimit, quale videtur in superiori Blokii cannulā.

F. Idem ferramentum quod supra.

Fig. 50. Ea deficiuntur acūs & cannula à Dnō Thevenot, in paracenthesi Abdominis instituendā, usurpatae. In quā

A. Prima acūs est simplex, & ex chalybe.

B. Eiusdem cannula ex argento, quae superius est alata.

D. Est secunda acūs simplex rursus ex chalybe, cum suo manubriolō argenteo.

E. Est ipsius cannula, cum capite, seu alā in superiori parte, quae duplici organo elastico, & cochleā est munita.

F. Est clavis inserviens occludendo & retinendo magno organo elastico.

G. Est retinaculum secundū organi elastici.

Hac autem cannula confici potest ex autō vel argento.

H. Est acūs simplex ex chalybe cum suo manubriolō argenteo.

I. Est praecedentis acūs cannula argentea, cuius caput ab aliis est diversum. Hic ceterum reperitur cochlea 3 figurae peculiaris lapsa quam locatur processus quadartus 2. cuius M. clavis est. I. verò in specie operculum striatum, occludendo praedicto capiti 2. & 3. destinatum.

TABULA DUODECIMA.

Exhibet Siphones cum tubō rectō, ac incurvatō, matriculari & auriculari: Item fistulam encephalicam, pileolum argenteum pro mammarum papillis, candelas cereas, syringotomos; ut & varia in castratione, calculi vesicae extractione, ac glandibus & scelopetorum vulneribus educendis, usurpanda instrumenta.

Fig. 1. EST siphō ad extrahendum & infundendum aliquid saepe necessarius, qui hic tubum annexum habet curvum, ut & rectus Fig. 2. videri possit.

Fig. 3. Est tubus curvus plurimis foraminibus

perforatus, quem Metrenchyma nominant. Hoc siphoni adaptatō urinetur feminae quae negotium injectionum in uterum immittendarum aliis per pudore facile non concedunt; quaeque sibi ipsi liquores pro curatione variorum uteri, aut ejus vaginae affectuum, commode satis applicant. Hic tubus confici etiam potest capite globoso, & ad amplitudinem ovicis juglandis minoris extenso, per cujus foramina liquores protrusi, vaginam atque uteri interioris colum cum imperiō irrigant sicque eas partes eluunt.

Fig. 4. Est siphō auricularis Oreotheia dictus, quō liquores in auribus organa, pro ulcerum detractione & consolidatione, infunduntur.

Fig. 5. Est Enterenchyma, causalis nempe orichalceus, in foramen catheteris recurvatus, quem parari current illi qui sibi ipsi clysterem infundere maluit, quāvis ab alijs quoque accipere, praeteritum, si ob intestinorum, ac praecipue recti vitia, crebret eorum usus requiritur.

Fig. 6. Est dicti canalīs, seu fistulae incurvatae clavis, per litteram B. in figurā praecedenti expressa: Cujus beneficiū enematis liquor in vesicā vulgari modō alligat, ad ægrotaor. s. libitum retinetur; quantoquidē illius ope canalīs vel claudatur, vel aperitur.

Fig. 7. Est claviculus umbellatus, in Fig. 5. per litteram c. adnotatus, qui clavi B. ejusdem figuræ introqueretur, ne aliquid de clystere in circumrotatione clavis possit elabi quod intestina inquinaret.

Fig. 8. Est pileolus argenteus, vel etiam plumbeus, undique perforatus, qui exulceratis mammarum papillis applicatur, ut oarices infantem cum minimi molestiā lactare possint. Usurpatur insuper hic pileolus io thoracis vulneribus: Postquam etenim cannulam prius depictarum aliquā thoracis foveae immissa, & spongiae particula orificio cannulae propē alam indita, superponitur pileus, ut materia, omni quāsi momento, per ejus foramina paulatim, & sine vitium iudicia, transfluat.

Fig. 9. & 10. Sunt candelae ex filō forti duplicatō & cera albā (cui modicum reserbiolinæ additum sit, ne tam facile frangatur) paranda, quae usurpantur ad suppressionem urinae ex canunculā in meatu urinario existente, curandam. Candelae Fig. 9. frailes sūt, ne in extrahente candela frustulum cerae, quae non nunquam in medio filum non habet, in meatu relinquatur, & ōstria augetur; quare portionem fractam ad ellychni extremitatem chirurgus forcipe abscondat, deinde meatui urinario, quantum opus erit; immittat candelam, oleo amygdalarum dulcium illitum.

Fig. 11. Est scalpellus recurvus, qui parte interna (a) aciem habet, & externa (b) est tenuis, Syringotomus scilicet, ex altera extremitate (c) pugnax, & incideus, quo utimur in fistulā quāvis unum foramen habente, ut finis fistulae perforetur, & postea ab unō ad alterum foramen incidatur intestinum: ad hujus cuspidem insisteri oportet globulum ex cera alba formatum, quo fistulae immissio scalpello, sine omni obstaculo, dolore & noxa, ad fundum perveniat.

Fig. 12. & 13. Sunt scalpelli syringotomi, quorum uterque ex alterā extremitate obtusus est, & globulum ex sero levigatum obtinet: His inciditur fistularum penetrantior torus ductus.

Fig. 14. Est scalpellus Syringotomus, quo distantur vulnera abdominis, ut intestina prolapsa & flantibus turpida commodē reponi possint. Globum habet in alterā extremitate multo majorem, quam scalpelli duo




Fig. 33. Est Furax communis, quo processus peritonæi à scroto separatus, acui perforatus, filoque constrictus, conclusus cum testiculò abscinditur.

Fig. 34. Est Furax, qua extra aspera est, & requiritur, quando utralibet anse modo delineatis perfectè utitur.

nald
 bilic
 ad t
 dicu
 trah
 min
 F
 F
 F
 in d
 tur
 tum
 F
 F
 F
 qui
 A
 rund
 B
 fluit
 C
 ficat
 L
 chal
 acur
 E
 fupe
 F
 F
 The
 ulur
 A
 B
 alar
 L
 cum
 E
 peti
 chle
 F
 mag
 C
 F
 arge
 F
 bitio
 L
 capi
 coel
 cefli
 fpec
 piti

Ex

Fig

sub

videt

F

bus curvus plurimis foraminibus
 bus rursus commodè reponi possint. Globum habet
 in altero extremo multò majorem, quam scalpelli
 duo

duo priores, ne vulnere inactula intestina lēdant.

Fig. 15. Est *acus*, seu *instrumentum ferreum*, aciem aneipitem habens, quod Nussius meo tempore in Italiā hūc in Chirurgiā (qua *hernia curat cum existeret ossiculū*) maxime exercitati, eoque nomine celeberrimi castratores, per inguinis vulnus ad scrotoī fendum demiserunt, quem instrumenti cuspidē (cui *perpetuū cerra alba exiguum globulum annellare oportet*, ob rationem supra allatam) perforant, quo purulenta materia, quæ per inguinis vulnus ad scrotoī descendit, expurgeret. Hæc operatio, quoniam satis est horribilis, & maximo vitæ periculo non vacat, (quod illius auctores optimi norunt, unde curandos suscipiunt ut moriens) Chirurgiæ studiosi alium eumque tutum huius instrumenti usum aperiam. Inciduntur eo feliciter fines sinuum declives, quorum causā fistulæ expurgari nequeant, nisi æger ita sitnetur, ut pedes sursum & caput deorsum convertat, ac materia dein propriū motu emanet. Notum enim est, sinus illos, qui callum nondum contraxerunt, de quibus etiam hic sermo est, medicamentis solum agglutinantibus, & fasciā convenienti posse curari, modò materia in sinu collecta exitum quotidie habeat. Cum autem situs iste sursum conversa pedibus & capite deorsum, satis sit importunus, hōc instrumentū, cuius cuspidi globulus ex cerā debet annexi, sinuum fundus perforatur (intraçdū foraminum inextensibilis) ut per se inferius foramen egredi possit, & sinuum parietes agglutinari.

Fig. 16. Indigitat forcicem quā filum plumbeum, apprehendit & circumgitur in cā herniæ desperate operatione, quam punctum aureum vocant, & in quā multo satius est plumbū quā aurū uti.

Fig. 17. Est forceps quā filum prædictum abscindit. C. autem demonstrat forcipem ipsam; d. verò acrum quō clauditur.

Fig. 18. Tradit aciem lunatam, unā cum filō plumbeo, quæ pro prædictō filō apprehendendō & transmittendō in acromiō perforata est. Hic a. demonstrat aciem, b. filum plumbeum.

Fig. 19. Est scalpellus rectus, & instat novaculæ ex unā tantum parte incidens, æc alterā verò reclusis, quō solō lithotomis quidam Ulmenis cutim inguinis & scrotoī, ad longiorē duorum, trium, aut quatuor digitorum transversum, pro separatione peritonæi, & extractione testiculī, dextere solebat incidere. Alii prædictam inguinis incisionem scalpellō falcato tentant, eamque, si nimis angusta fuerit rectō instrumentō versus scrotoī sufficienter producant.

Fig. 20. Est instrumentum orichaleum, quod castratores non immeritō retinaculum vocant: prohibet enim ne intestina extra abdomen, in peritonæi processum, à scrotoī separatum, & acū perforandum, filō constringendum, & forcice abscindendum, prolabantur.

Fig. 21. Est acus filum validissimum trahens, quō castratores in curā onerocoles, herniarumque aliarum, processum peritonæi, à scrotoī separatum, sufficienter attractum, & elevatum, immediatē supra apiculum retinaculum tutissimè fixant.

Funiculus hic (a) non est filum simplex, sed ex viginti ad minimum filis simplicibus compositus, & cerā leviter obductus, quo processus peritonæi perforatus ante abscissionem æctissimè constringitur.

Fig. 22. Est *Forx communis*, quo processus peritonæi à scrotoī separatus, acū perforatus, filoque constrictus, conclusus cum testiculō abscinditur.

Fig. 23. Est *cacheter*, seu *Syringa tentatoria*, quā in canalem vitæ & vesicam potest exploratum intus vesicæ anfractus, in quibus latere solet lapillus, & quo humana natura læpnum cruciatum: Græcis appellatur *καθετήρ*, & usurpatur ad urinam suppressam reddendam. Est argentea, ut insecti possit, omni asperitate vacat, ne patet exquisitissimo sensu prædita in transitu catheteris afficiatur, & ut sine dolore vesicam ingreditur. Pluribus in extremo foraminibus perforata est, ut retracto stylo, urina in vesicā contenta, per fistulam libere, & sine difficultate exeat. Notandum, quod stylus fistulæ non immittitur, ut quasi vi vacui urinam suppressam secum trahat, sed ne urina statim effluat, dum Lithotomus vel Medicus lapillum expellatur occultum.

Fig. 24. Est *stylus argenteus*, qui inserti debet in fistulam, quam in medio sui usque ad extremum obtinet, in dorso vel gibba parte habet: Latius vocatur *linetarium*, eō quod vitæ immittitur fidelissimè collum vesicæ monstrat, & super ipsum incisio faciendā sit, pro extractione calculi vesicæ.

Fig. 25. Est instrumentum orichaleum, quæ extrahitur calculus, qui in meatu urinario residet, specillum scilicet, quod parte, quæ ad cochlearis articularis similitudinem excavatum est, in canalem collis demittitur, ita ut lapillum prætereat & superet, ipsamque suo labro & cavo comprehendat: quo factō, per stylum specilli cannulatum, & laud orificiō donatum, uretræ, ut labela fiat, immittitur oleum amygdalarum dulcium, postea specillum lenissimè extrahitur, & canalis post lapillum digito comprimitur, donec is & meatu urinatō foras deducatur.

Fig. 26. Est forceps prædita tustō corvino, quæ hoc instrumentum Corvinum rostrum nominatur, ad excipiendos & trahendos calculos ex vesicā, paratum. Principium ejus notatum a. est forceps, in quā duæ sunt cavitates e. e. ut calculi commodius apprehendantur, b. est cochlea armata c. ne calculus apprehensus in extractione forcis cedat.

Fig. 27. Est instrumentum eandem figuram ac nomen habens ac prius, cuius forceps a. dentibus u. a. a. a. a. monita est: ut calculum, si eā magnitudine foret, ut nec forceps eam apprehendere, nec vulnus ei transire dare posset, in minimas partes frangeret. Ala c. ob dictas causas, est cochleā f. munita.

Fig. 28. Representat speculum vesicæ apertum, quod in Figurā 29. clausum exhibetur, nisi ad collum vesicæ (per quod instrumentum pro capiendō calculō ad fundum vesicæ transiret) dilatandum.

Fig. 30. & 31. Sunt forcices quarum una clausa, altera aperta exhibetur, rostri aspectus similitudinem referentes, unde ipsi nomen. Sunt illæ in dilatandis vulncribus mediocribus apæ, ut aliis instrumentis, si quod in cavitatem vchem per vulnus introiit debet, transitu prebentur.

Fig. 32. & 33. Sunt *Unci*, quibus in minori apparatu extrahitur calculus, digitis ultra vesicæ collum protrusis, & scalpellō directis. Ambo ab extrinseca parte, quæ corpori janguntur, laevi sunt, ab interiore verò, quæ calculum attingunt, asperi. Posterior in medio divisus post immersionem beneficiis cannoles (f). retracta dilatare possit, ut calculum extrinsecus melius comprehendat.

Fig. 34. Est *Forceps*, quæ extrā levis, & laud aspecta est, & requiritur, quando vulgari calculi extrahitō unci modo delineatis perfici nequit.

Fig. 35. Est Scalpelli instar spatia anceps, quo Liborius C.R. sectionem suam supra calculum, digiti altera collum velicæ protulsum, instituit inleat.

Fig. 36. Est instrumentum globulari ex vulnere trahendis maxime idoneum, ex optimo chalybe fabricatum, & tribus constans partibus, duabus nempe cannula & terebellis. Cannula externa a, cannulam internam, quæ in alterâ sui extremitate in duo divisa est cochlearia ferrata b, claudere potest, ut globulum firmit, ne cum terebellis, quod ipsi infundendum est, circumvolvatur. Terebellum autem c, acutissimum est, & duobus suis cannula paulo longius, quod per foramen capuli d, cannula immittitur cernitur.

Fig. 37. Est Terebellum extra cannulas suas depictum.

Fig. 38. Est idem instrumentum cum illis quod Fig. 36. depingitur, nisi quod terebellis careat; & eo extrahuntur globuli minus intractabiles.

Fig. 39. Est instrumenti præcedentis cannula sola.

Fig. 40. Est instrumenti stylus, ad dividendum solidum, in extremitate alterâ cochlearium deceptorum effigiem referens.

TABULA DECIMA TERTIA.

Varia rursus depingit instrumenta globulis & vulneribus educendis apta, atque illud in specie quod Alphonsinum vocatur. Item cannulas, tum foraminibus destitutas, tum iis ad latera perforatas, cum stylo proprio, quibus in annu immixtis excisari quænt intestini recti ulcera, ac comburi hæmorrhoides. Hic præterea reperitur vitrum extrahendis mammarum papillis occultatis idoneum, ac describuntur omnia instrumenta, tum quæ pro anò aut utero explorandò, tum quæ pro fætù extrahendò adhibentur, additis etiam pessariis variis &c.

Fig. 1. Reptasentant instrumentum quod Alphonsinum vocatur, quodque extrahendis & vulneribus scopulorum glandibus, accommodatum est. Illud describit Alphonsus Ferrus, Medicus Neapolitana, lib. 2. de Vulneribus scopulorum. Ut autem commodius ac valentius manu teneri possit, atque ita globuli ac cætera extranea in vulnere certius explorari valeant, annuli forcipibus adjectantur; qualis est ille notatus A. in Fig. 1. qui ad anteriorem instrumenti partem protrusus, illud claudit. B. in Fig. 2. qui ad manubrium retractus, idem instrumentum aperit; quò in Fig. 3. globulus jam apprehensus depingitur.

Fig. 4. Est forceps anserina, quæ circa manubrium cochleam habet, ut globulum firmiter comprehendat.

Fig. 5. Est hamulus ferreus, educendis glandibus inferiens.

Fig. 6. Est forceps anserina, quæ si cochleam haberet, priori similis esset.

Fig. 7. Est terebellum acutissimum, cannula innata, quod educuntur globuli scopulorum.

Fig. 8. Est idem terebellum extra cannulam positum.

Fig. 9. Est spatula rostris anserinis prædita, ad ex-

cipiendos & trahendos globulos parata.

Fig. 10. Est instrumentum ad resciscandas hæmorrhoides internas, quæ vel tument, vel superficialiter intestinum exolcant, idoneum; cannula nimirum fetra, quæ anò inditur: Est illa alata, & in fundò occlusa, ne fetraementum candens Fig. 13. quod ejus cavitate sæpius immittitur, altius quàm oportet perveniat.

Fig. 11. & 12. Sunt tubuli anò parieti immittendi, sed in latere (secundum situm ulceris callosi, aut profundi, quod topicis non credit medicamentis) perforati, quibus intruditur fetraementum ignitum Fig. 13. depictum. His tubulis parietis sanæ ab immediatò ignis contactu defenduntur, quò solum nlcus tutissimè, bia vel ter, fetrò ignitò tangi possit.

Fig. 13. Est stylus fetrens præmemoratus, qui ignitus in cannulas, ad nlcus mox assignatos immittitur.

Fig. 14. Est vitrum vacuum ad formatò propè cocoribitalæ fabricatum, cujus altera extremitas oa habet papillæ magnitudini respondens: Altera verbò foramen parvum cum longâ fistulâ, per quam patiens ipsa fistulâ foras trahit papillam occultatam, ut ipsam infans ore possit commodiùs apprehendere, sicque lac matrem fugere queat.

Fig. 15. Est instrumentum, quod speculum ani ac etiam vaginæ uteri appellant, eò quòd hujus beneficiò speculentur ulcera intestini recti, & vaginæ uteri. Pars speculi A. notata aperta, & masculus dicta, maribus applicatur: Pars verò clausa, & B. signata, feminis adhibetur, unde femina appellatur.

Fig. 16. Monstrat ejusdem speculi partem quæ maribus convenit, clausam, ac eam quæ feminis applicari solet, apertam.

Fig. 17. Est forceps deceptoria, quia agrotum decipit, dum in dilatandis, juxta antiquorum sententiam finibus impeditur.

Fig. 18. Est magnam matricis speculum, quod mulieribus adhibetur, solum, quando incidendus est fætus mortuus, aut inspicienda matricis ex locatio. Videant periti an eò commodè ac tutò ejusmodi speculum ultra vaginam intrudi queat, pro colli inter uteri dilatandò, & an sic compleri facili queant uteri emulcerationes &c.

Fig. 19. Est instrumentum duobus unciis donatum, quò olim utebantur pro extrahendò fætù mortuò, vel in frusta incisò. In hoc autem, quandoquidem unci ex catenis dependent, vix possibile est ut illud fætù tuto dirigatur, & in extractione facta situm su, ut omnis variatio præcaveatur.

Fig. 20. 21. 22. 23. Exhibent instrumenta quæ hodie in fætus extractione adhibentur: scilicet.

Fig. 20. Cuiuslibet qui in utero inact digitos occultatus inducitur pro extractione partium liberam fætus educationem impediendum.


Fig. 21. Uncum duplici acumine seu cuspidè præditum, quique aliâ etiam simplex adhiberi potest. Ille itidem manû cooperitur, ne partes per quas trahi debet lædat, in utero introducitur, & in solidiorem aliquam capitis partem, fætù mortuò existente, ac ad pedes nullatenus convertibili, intruditur, sicque totum illius corpus educitur, in id adhibito vel unò tantum uncò, vel duobus, ab utroque scilicet capite latere unò, si ita requirit necessitas.

Fig. 22. & 23. Cochlearia duo, quorum alterutrum pone caput fætus, ab ejus corpore in educatione separatum, & in utero restans, demittitur, pro









pro eas sitū firmando, & impediendo ne variet dum per unum instrumentum eadeū.

Fig. 24. Instrumentum nobis depingit quod figuram refert pedis gūis, & inservit extractioni capitis infans in paupertate uterō cernentis. Constat autem in sui extremitate quatuor dentibus seu oncis, qui per cochleam in inferioribus positam dilatare aut contrahuntur, pro commodō ejusdem capitis apprehensione & eductione.

Fig. 25. Gūis unguem delineat simplicem, quō molē medicamentis minimē eductibiles, detrahuntur. Hic cochlea ut in priori, & in eodem usum adeft.

Fig. 26. Candelam ostendit latissimā basi præditā, ex cetā flavā & pavel assā fæcidā confectā, crassile uterinæ respicientem cervicē, quā prolapsus uterus in proprium se naturalem suum retrahitur firm.

Fig. 27. & 28. Exhibent pessaria, quorum primum ex pyriforme, secundum verō simpliciter globosum. Illa ex subere cetā illius confecta, & in sui mediō tubulata pro humoris ex uterō stillantis evacuatione, in vaginam ad usque uteri collum intusduntur, pro eō retruso in propriū sitū firmando. Iis appenditur funiculus, ut commodē pro derelictione identidem eperendū, retrahi queant.

Fig. 29. 30. 31. & 32. Sunt itidem alia pessaria, seu citicali uterici, ex lignō buxō fabrefacti, qui in eisdem usus ac priores adhiberi possunt. Hi autem citicali ab ea parte quā in vaginam introducuntur, debent esse paulō minoris circumferentiæ, quam in aliā quæ ipsorum quasi basis est, ut sic scilicet commodius introduci queant.

TABULA DECIMA QUARTA.

De instrumentis, quibus pes contractus paulatim extenditur; cubitus rigidus sensim & sensim flectitur, arteria carpi vulnerata comprimitur; De Machina quā scarificationes omnes in curvicularum applicatione nūc itū imprimuntur; Et tandem de brachii, manibus, pedibus, & membro virili arte factis.

Fig. 1. EST instrumentum ex ferro fabricatum, incurvatum & convolutum crure, genu adaptandum, quod consistit ex diversis partibus, nimirum capsulā A. ferrea, quam transiit cochlea B. & affigitur annulo ex lamina ferrea in latitudinem, ut genus totum complectatur, fabrefacto. C. fibulis D. ut claudi & aperiri possit: foraminibus in extremitate E. ut gossipio & liuto instruat, & tandem clavícula ferrea F. cujus beneficio attrahitur annulus, & crura in rectitudinem tendit.

Fig. 2. Est dimidia & inferior pars cochleæ B. Fig. 1. depictæ.

Fig. 3. Est cochlea B. Fig. 1. extra locum, duabus constans partibus, quarum superior (a) post attentionem annulo affixa reliquitur, altera (b) extrahitur. Hoc instrumentum non parum differt ab eo, quod Guilielm. Fabricius Hildanus in libro suo de combinandis c. 15. se invenisse scribit.

Fig. 4. Est instrumentum ex variis & ferreō laminis confectum, plurimique foraminibus perforatum, ut gossipio & liuto induci, ac cubito instat manica adaptari, claudi atque aperiri possit. Cochleā umbellatā, quam habet instrumentum, comprimitur arteria carpi, consilio aut fortius aperta, ne vitam cum sanguine profundat.

Fig. 5. Est instrumentum ferreum, quo utitur, quando cubitus inflecti nequit: Hic instrumentum paulatim, mediante cochleā, flectitur.

Fig. 6. Est forfex, quā abscindantur non solum ossa, quæ in fracturis cum vulneribus eminent, & teponi non possunt: verum etiam ea quæ sub acmine cerebri pungunt. Hic forfex etiam abscinduntur digiti manuum & pedum, superflui, sphacello & carcinomate affecti.

Fig. 7. Est forceps incisoria, ad partes cartilagineas & callosas facta.

Fig. 8. Est cultellus falcatus, quō caro nūc ad os ferā resecandum inciditur, antea amputationem cruris, aut brachii necessaria.

Fig. 9. Est scalprum, quō non tantum digitorum verum etiam cubiti & radii capita amputantur.

Fig. 10. Est malleus ex lignō durissimō fabrefactus.

Fig. 11. Est truncus ligoris rotundus & altus, in quō partes scalpro asserendæ collocari debent.

Fig. 12. Est scapellus rectus, ex utraque parte incidens. Lanceolam, seu Lancetram vocant, & est instrumentum Chirurgis omnium maximē usuale, quod in sanguine è venis educendū adhibent. Illius autem culpis, vel est acutissima, quæ vas cum minori dolore percutit, vel in modum grani hoteli se dilatat, unde incisio vense paulō amplior efficitur, unde thrombi non ita facili generantur. Verum manus dexteritas hæc omnia corrigere, ac commodē prævertit.

Fig. 13. Machinam Scarificatoriam in partes divisiſſam depingit. In superiori scilicet parte,

B Operculum est pixidis, quā machina scarificatoria continetur.

b Pixis.

o o o o Orbis, in quo phlebotomi figuntur, prout se ab inferiori parte viti præbet.

..... Puncta hæc indigent foramina citicali, in quo firmantur phlebotomi.

A A A Scarificatoria machina.

d d d Est axis rectus, cui annectitur orbis, in quo lanceolæ hærent.

ff Lignum transversum.

g Circulus est, quem quadratus axis perforat, atque sub eō Offendiculum, ne axis ulterius prolabatur.

h Arcus, quō machina deprimatur.

i Foramen, in quo arcus globus globo axis infigitur.

k k Duo transversæ stili, qui orbem in æquilibrio teneant.

b Orbis, cui imponantur phlebotomi.

c c Phlebotomi.

n n Phlebotomi extra orbem, quorum numerus augeri & minui potest juxta arbitrium medicæ.

o o Obstacles, quibus impeditur, ne phlebotomi profundius secare possint.

m Arcus extra machinam, ut alim Figura.

D Axis.

G Lignum transversum.

K K Scilicet.

In inferiori parte.

B. Depingit machinam quā pars gangrenosa, vel aliā de causâ scarificanda, unō idū scarificatur.

o o o o o lachdentes rotulas.

C Clavum, quæ rotulæ circumgiranur.

A Operculum.

Hæc omnia non ita distincta sunt, quin alterius opus habeant explicatione, quam Lector industrius facile supplebit.

Fig. 14. Est ferreum brachium, in quò 22. est ferrea corolla, quæ brachii formam exhibet.

b. Est clavus, qui in maiore cavitate continetur, quò brachium extenditur.

c. Est maior eubiti cochlea; quæ ex chalybe temperatò, & nium pedum longitudine, vel circum circa esse debet.

d. Sunt dentes,

e. Est clavus.

f. Est cochlea, quæ clavum premittit.

g. Est pessulus, qui cochleam claudit.

h. Est interior lamina brachii super cubitum.

i. Est apex ferreæ manice cum fistula carpi, cuius tubi io manus sursum deorsumque movetur.

k k k k. Sunt inligacula, quibus ferreum brachium connectitur.

Fig. 15. Arrestatam manum exhibet, quæ imposita trunco deperditæ manus, ita movetur, ut calamo scribat: hæc conficitur ex coctò coriò, quæ, si patientis, cuius manus detrunca est, l'etis scribendis si det, per foramina o o o trunco sive brachio alligatur.

a. Manum denotat.

b. Metacarpum, in quem patiens truncum suum, quousque poterit, intrudet, ut motus eò melius percipiat.

c. Est pena aenea, quæ d'gitis erecta tenent.

d. Pluma calami est, quæ aeneæ impositur: ut si quis aeneâ scribere non possit, ob gravitatem ejus calamus cygni, ad hoc paratum, aeneæ imponat.

Fig. 16. Artificioium pedem exhibet.

a. Est ligaculum, quò annulus fibulæ sursum trahitur ad flexum pedis.

b. Est coxæ ligaculum, cum cochleatis clavis, clavorumque toramisibus, quò coxæ incurvantur vel eriguntur.

c. Est nodus, quem manu comprimendo contorquimus.

d. Est minor annulus ante coxam, ad motum pedis iuxta arbitrium compescendum.

e. e. Sunt fibulæ anteriores, & posteriores ad pedem rheoaci annexendum.

f. Est minor inferior basis, in qua coxa quiescit.

g. Est cochlea, ad movendum clavum, qui pedem sustinet.

h. Est clavus, qui baculum pedis rectum tenet.

i. Est annulus, cui funis annexitur, ad clavum retrahendum; ut baculus eò melius in fessione flexuam suscipiat.

k. Est pars, quæ conducit motui patellæ.

l. Est minor fibula, quæ impedit, ne clavus coxam prætergrediatur.

m. Est ferrea fistula, quæ baculus includitur.

n. Est vena, in extremitate baculi, qui membrum sustinet, quò pes movetur.

o. Est Clavus, quò pes reducitur.

p. Est metapodium clavi, ad pedem ad inferiorem pellendum.

Fig. 17. Est vestis præscripti pedis.

a. Laminas, quæ ornaamentum, & motum genium præstant, demonstrat.

b. Laminam tibie, ut pes debitum retineat situm.

c. Laminam suræ.

d. Laminas articulationis pedis, ut situs musculi conservetur.

Fig. 18. Est erector manus, qui, tendonibus & nervis metacarpi præcisus, ægto nū veni t, hæc machina ex bractea confecta, & serico, lana aliisque re molli referta manui subponitur, prope primam digitorum conjunctionem. Posteaque aptis ligulis ligatur! Huius instrumenti præsidio manus erecta tenetur, ut ægto usui veniat: unde huic instrumento Erectoris manus nomen convenit. Rotunda instrumenti extremitas applicanda est a. articulationi primæ digitorum, æquidistant altera b. spectet carpum, hocque instrumentum ligulæ c. per foramina o o. trajectis magis, aut minus constingatur.

Fig. 19. Interiorem ostendit machinam, quæ manuum digiti moventur, & numerus.

1. Exhibet rotulas singulorum digitorum, motui utiles.

2. Demonstrat ferreum axem, qui dictas pertransit rotulas, & circa quem moventur.

3. Sunt cochleæ, quibus singuli digiti sustinentur.

4. Sunt clavi, quibus singuli clavi sustinentur.

5. Est major cochlea, quæ minores quatuor aperitur, pro digitorum clausione procurandis.

6. Est globulus in extremitate majoris cochleæ, cuius pressurâ aperitur manus.

7. Est clavus sub magnâ cochleâ situs, quæ manus clauditur.

8. Sunt digitorum axes.

9. Sunt digitorum cochleæ.

Fig. 20. Exteriores manus apparatus exhibet, & motum quò brachio & thoraci annexuntur. N°. 1. Demonstrat conchas digitorum articuloa referentes.

2. Sunt laminæ manus formam exhibentes, in quinque distinctæ, ut motu commodiores sint.

3. Sunt fasciæ.

4. Sunt ferrei stili, quibus fasciæ annexuntur.

Fig. 21. & 22. Ochreas delineant, quibus curvat puerorum pedes, paulatim ad naturalem situm restituntur. In Fig. 21. aperte; in Fig. verò 22. clausæ apparent. In illis autem.

a a a. Sunt nudi, qui foramina b b b. apprehendendo ochreas claudunt.

Fig. 23. Erectorem pollicis indicit, quò pollex, si tendo aut nervus abscissus sit, in suo situ retinetur, utque manus apta foret digladiationi, aliorumque instrumentorum apprehensioni; hic erector pollicis ex bractea conficitur; superius in articulatione cum manu coriacis ligulis 22. firmatur annulis duobus e e.

Fig. 24. & 25. Exhibent penes arte compositos, qui usū veniunt stantibus pro utina excretionē, quando ob tenebrosâ furia improbe Deus in penam membrum virile dederunt, ne more sexus famine incurvari mingere cogerentur. Hæc cannula urinaria principio notatò d. ductui urinae apponi debet, ex arò, lignò, laminâ plumbeâ, coriò, velj aliâ materiâ confecta, a. Est corpus cannule, c. exterior ejus foramen.





TABULA DECIMAQUINTA.

Hic demonstratur Sutura quam siccam vocant, ac præterea ea sutura qua in Labiis leporinis curandis adhibetur. Item artificiosi oculi, nasi, & lingua, ac varia instrumenta in membris luxatis reponendis maxime utilis.

Fig. 1. Exhibet methodum exciscentis fuitæ, in qua

L.L. Denotat longitudinem vulneris, in facie sita.

M.M. Linea glutine instruita quæ ab utroque vulneris parte agglutinari debent.

aaaaa. Demonstrant fila per illa duo lutea quorumque notatione vulneris labia invicem approximantur.

N.N. Emplastra conglutinantia depingunt, à vulneris abstracta ac separata.

a.a. Sunt fila quæ duos ex eorum finibus perforant

O. Est acus per quam filum traductur.

Fig. 2. Offert caput hominis Labiis Leporinis deformis; in qua

E.E. Sunt ambo lineæ acis.

a.a. Sunt Labia acis beneficio combinata.

c.c. Filum demonstrat, quod circum acum giratur:

In Figurâ, jam explicata proximâ.

a.a. Exhibet labia separata ac divisa.

b.b. Locum inter illa medium, seu locum divisionis.

o.o. Designat loca quæ perforari debent.

d.d. Extremitates laborum, postquam acû conjuncta fuerint.

f.f. Circumvolutionem filii.

Fig. 3. 4. 5. & 6. Representant artificiosos oculos ex auro, vitrò, cristalline confectos, naturalem colorem mentientes. Figuræ 3. & 6. exhibent exteriorum seu convexam oculi artificialis partem: 4. & 5. interiorum, seu concavam.

Si oculus artificialis orbitæ imponi non possit; curandum ut ille fiat ad modum qui in Figurâ 7. depingitur: Qui scilicet ferreum filum curvatum habet adnexum, cui appenditur tenella quæ circum aures giratâ in situ firmatur.

Fig. 8. Demonstrat perspicillum Infantibus applicandum, quando in stabilissimum incidunt. Ejus autem foramina accuratissimè oculis supponi debent, ita ut pupillæ directè respondeant.

Fig. 9. & 10. Delineant artificiosos nates, ex auro, argento, ligno, vel conglutinato lino compositos, & ita pictos, ut nasum naturalem depriditum aliquatenus reparare queant. In figurâ autem 10. characteres I I T T. barbam exprimentur, aptam illis qui magnam pondus sruerunt.

Fig. 11. & 12. Designant instrumenta quibus loquela perficitur, si pars linguae depedita sit. Superior pars a. quæ crassilem dimidiâ imperialis æquat, dentibus incisioribus adherere debet: inferior verò b. quæ tenuior est, directè ac proximè truncatæ linguae apponitur, c. autem est filum quod instrumentum collo annectitur.

Fig. 13. 14. & 15. Sunt obstrumenta quibus palatum venerat ulceratione cortosum, pro voce articulatorie faciendâ, obstruitur. Ex argento

Bibl. Chirurg. Tom. II.

conficiuntur, ac crystallum coronati Gallici, & ut a ligaturis spongia, quæ palatò adhaerere possint.

Fig. 16. Instrumentum itidem præbet ejusdem quæ priora naturæ; sed in quò locò spongiæ repositur appendicula, seu protuberantia, quæ corvino costis Figurâ 17. expressio, ita giratur ut in palati foramen introducat pro sustinendò instrumentum.

Fig. 18. Modum depingit, quo luxatus humerus beneficio communis luxatorie machinæ Hippocratis, in locum suum repositus, custoditur.

AAA Est extensum brachium.

B Annulus luxatorii Instrumenti.

c c c Sunt sustentacula, quæ brachium in pizide tenent.

DD Columna, in qua luxatoria machina quiescit.

EEE Pedes columnæ.

FFF Cochleæ sunt, quibus pedes columnæ sustinentur.

G Machina luxatoria Hippocratis, ambe nominata, dissoluta.

E E Annulli, quibus superior pars brachii interponitur.

I Extremities Instrumenti luxatorii.

K Sinus seu rima columnæ, cui machina imponitur.

F Seilas, qui Instrumentum & columnam conjungit.

D Columna ipsa.

OOO Ejus pedes.

Fig. 19. Delineat, quâ methodò luxatus humerus reponatur.

Fig. 20. Exhibet machinam à Peritissimò Chirurgo Patiensis, Dno. J. L. Paris inveniam, pro humeri luxati reductione, in eâ autem.

AAAA. Sunt quatuor columnæ sedilis, quod nullâ doctrinâ expidine fixâ donatur, quia pro laetere sinistis æquè ac pro dextro usurpatis debet. Verùm illa tempore usûs conficiuntur, trajectis ab alterutâ parte bacillis DD. per columnas scilicet, vel M. N. vel O. P. CCCC. Est ipsius ipsam sedile in quò reponitur æger. dorso ad columnas P. O. conversò, ubi dexter hamum fuerit luxatus: at verò ad columnas oppositas M. N. ubi sinister.

E. Alius est bacillus quò semper trahuntur columnæ P. & N. idque altiori, vel minus aliò locò, pro varietate patientis statuat. Ille culcitellâ lineâ instruitur, ut super id reponatur ac colligatur brachium sanum, ne suis motibus Chirurgum operationis tempore interturbet.

KK. Est machina ferrea ad modum lunæ cœlestis, vel semicirculi, in sui mediò paululum compressi, efformata, cujus duæ extremitates XX. latissime sunt, earumque altera instar manus scapulam complectitur, dum altera anteriorem eadem pedoris partem amplectatur. Illa machina lani debet semper esse instructa ac præcipuè in sui mediò, quò luxatum humerus recipit, ne scilicet patientem lædat, & extremitatibus suis inducitur in foramina literis R. & L. designata. Præterea eadem machina, in sui mediò grandiori petunditur cavò per literam F. expressio, quò cardinem excipit in extremitate ligni S. S. situm. Hoc autem lignum trochleis instruitur T. T. ut.

X x quæ

que instrumentū in eorum mediō posito, ac ipsarum cordas versante V. Acget autem sedebit v. g. si sinister humerus sit luxatus, dorso ad columnas M. & N. conuerso, ponetque prædictum bumerum luxatum super medium machinæ K K. quæ est pars ejus crassior, lignumque trochleas concludens catidine suā in cavum ejusdem machinæ inducet, ut per cordas laqueo brachio injecto connexas pars illa sufficienter extendatur, idque per gradus mediane instrumentū cordas versante quod rotulā armatur densatā, reversionem omnem motus condarum præpediente. Postquam autem extensio perfecta est, depimitur lignum cum suis trochleis, quarum tum cordæ laxantur, & repositio seu reductio facta est.

Fig. 20. Luxatorium cochleam depingit, abique lignis, ex ferro & chalybe fabricatum.

AAA. Est tota cochlea quæ machina circumgittur, crassissimè habens unius pollicis.

B. Pixis est cui unitur cochleæ extremitas, & quæ debet habere crassilem duorum pollicum.

a. Sunt duo unci divisi, de pixide nati, quibus funes connectuntur.

b. b. Sunt funes ipsi, ex densō canabæ confecti.

C. Globum delineat quem bacillus ferreus

D. D. Trāpici, ut cō cochleæ circumgittur.

EE. Demonstrat aliam cochleæ machinam, cuius opē tota luxatoria machina mensē affigitur.

o. o. Ultima hujus prædictæ machinæ cochleam exhibet.

b. Est globus in hujus cochleæ extremitate positus.

F. Stylus ferreus quō cochleæ circumgittur.

GG. Sunt instrumenta duo ferrea, quorum alterum mensē infidet, alterum vetō sub eam sēmiter per cochleam inducitur, ut sic tanquam per fabricorum scissatorum forcipem comprehensā utriusque mensū cochleā super eam commota seu potius vehementius etata, vacillare nequeat.

H. Est aliud instrumentum annulo in quo cochleā AAA. contorqueat circumvolvitur, indeque ad inferiorem descendens ac instrumenta GG. ac cochleam n. n. piliis descriptam sustinent; ut cō tota machina mensē sēmiter annexi possit.

Fig. 21. Ostendit capsulam, seu pixidem cochleæ suprà descriptæ in operatione quidem usitatam; sed jam ab eā separatam, cum duobus suis uncis, & lunc appendis.

Fig. 22. Coriaceum exhibet ligamentum, quod brachio, aut pedi, pro eorum extensione annexit. In quo,

AAA. Sunt bami prædicto ligamento appendi, quibus connectuntur funes uncis suprà per a. a. designati colligati.

O. Est fibula quā clauditur coriaceum vinculum.

Fig. 23. Idem vinculum in longum extensum delineat: Ibi autem,

AA. Est prædictum coriaceum vinculum duca pollices latum, ac pedem unum & sex pollices longum. Ex densō hoc confici debet coriō, & ab utraque superficie periti, ut ab eorum unā indantur linteæ o. o. o. & puncta ipsi intersecta. Sic erentim melius vim cochleæ in extractione sustinent. Puncta autem crassiora quæ utrinque per totam longitudinem adnotantur, foramina designant, quibus styli 1. 2. assignantur, ut ferrei bami firmantur, dum per vinculum, unde dependent, mem-

brum extrahendum, stringitur.

O. Est fibula quā vinculum membro circumvolvitur, colligatur.

NN. Sunt ferrei unci mobiles, quibus funes ex uncis piliis suprà descriptæ prodeunt, annexiuntur.

Fig. 24. Funem depingit uni ex vinculi huius appendis.

Fig. 25. Est pixis quæ cochleæ luxatoris pro membri extractione unietur. Illa autem hic uncis nunc planō donatur, qui secundum aliquos melius per lineas parallelas membrum adducit, quam unci divisi, quandoquidem funes sēmitis in planō quiescunt, nec ita vacillare possunt, ac in uncis divisis facile est. Sic itaque tractio magis ordinata perficitur.

Fig. 26. Patientem ostendit, cuius humerus luxatus reponitur.

Fig. 27. Chirurgum ostendit, qui molli linteō membrum reponendum, quod cochleæ rotatione trahent, lente in naturalem suum locum premitt.

Fig. 28. Repræsentat famulum, cochleam pro extractione circumgittantem.

Fig. 29. Mentiam, aut aliud fuscum aprum demonstrat, cui cochleā mediante suā appendice, sūmmit annexit.

TABULA DECIMA SEXTA:

Exhibet Tubam soniferam pro gravi auditu; Torquem ad collum incurvatum; Torcularē (Gallis Tourniquet) ad restringendā vasa sanguinea in membrorum amputatione; Brachierium ad urinae incontinentiam; Pessmen ad eundem affectum. Item applicationem aliquorum ex instrumentis suprà descriptis super corpore humano: Sed præcipue totum apparatus, instrumenta, ac fasciationes quæ adhibentur, in illā Chirurgiā quæ Curtorum dicitur, & de quā sub titulo Cæci ablati quomodo restituenda, ex Taliacotii.

Fig. 1. Tubam soniferam proponit, ex Clariss. Nuckiō; ubi,

A. Tuba.

B. Pars illē tubæ quæ meatui auditorio admodum.

C. Os tubæ amplum, in quod aditus loquitur.

D. Mannbrum quod patiens manū alterā tenet.

Fig. 2. Torquem d. pingit ad collum incurvatum, ex eodem. Ibi autem,

AA. Hemisphærium est ex ferro confectum.

B. Annulus in parte elatiori, per quem trāpiciur chorda trahi adalliganda.

C. C. Extremitates, quibus alligatur corium crassissimum lanā investitum.

Fig. 3. Torcularē ostendit (Gallis Tourniquet) pro restringendis vasīs sanguineis, ubi membra amputanda veniunt.


AA. Chorda.

B. B. Duo bacilli, quibus circumgittur chorda, ut vasa constingantur.

Fig. 4. Brachierium ad urinae incontinentiam ostendit, ex eodem.

AA. Brachierium.

B. Fibula





B. Fibula.

C. Pars pendula corii perforata, quæ constringit brachetulum.

D. Coehle, ejus ope comprimitur pulvillus, eum annexo capitulo E. compressum instruito.

Fig. 1. Postlomen ex eodem tradit, ad eundem affectum.

A. Postlomis ex argento cuprivo confectus.

B. Clavis instrumento affixa, quæ pro lubitu claudet & aperiri potest.

Fig. 6. * De fundâ Galeni, cancro Labiorum, arteria incisæ compressione, pedis contracti distensione, cubiti rigidi inflexione, sinu in femore magni apertione, locis & fasciis fonticularum, glandium è vulneribus sclopetorum extractione, varicum sectione, Labiorum vulneris per fibrillas additione, tibia cariosa abrasione, & deligatura pectoris, quam Galenus Cataphractam vocat; agit ex Sculteto.

A. Est funda Galeni l. de septe. c. 6a. fascia scilicet in quatuor partes fissa, ad labrum inferius deligandum accommodata, ejus descriptionem in gratiam studiosiorum chirurgiarum, in primis verò barbariorum, quibus raro iste liber de fasciis est ad manus, transferre volui, ut hanc fasciam, ejusque applicandi modum, ad curandos labiorum affectus, præcipue verò cancerum exulceratum, utilissimum pariter, ac chirurgiam exercitibus seu summæ necessitati, addicerent. Mediam, quod integrum est, injicio super labium inferum, superiores verò partes ad mentum adductas, atque inde ad occipitum, ibique in speciem literæ X. altera super alteram occidens, ad summum caput, & inter ipsam & frontem attrahit, minisque tradito, reliquas verò binas partes sub infusis auriculis ad occipitum porrigit, atque ad formam literæ X. ad frontem attrahit, & hæc & quæ à ministro continerantur inter se devincit.

Æ. Indicat labium exulceratum, fascia fuisse ad mentem Galeni deligatam. Pateriens erat Gallus Sigmæ, Rusticus Langenaviensis, ex Territorio Ulmenis, cancro labiorum exulcerato affectus, qui postquam à multis chirurgis petitis dolens percepisset, se illud malò liberari non posse, nisi sectione radiensis existeret: pariens ob difficultatem domesticam, quæ premebatur, ab Inelyto Reip. Patr. Senitū supplicem impetravit, ut in Xenodochium reciperetur, & cancer ferro ac manu chirurgi exercitæ Georgii Rindli abscinderetur. Abscissione per fortitem facta, & ulcere ad cicatricem ferè ducto, malum repulso. Senatus Inelytus hujus recidivæ cœteris factis patientem meæ cure tradidit. Hic ob dolores capitis & artuum nocturnos, mihi valde suspectus, in Nosocomium Gallico morbo affectis destitutum translatus, decoctum ligni Guajaci sumpsit, unde dolores capitis & parium extenuatum cessarunt. Cancer verò interim topicis tractatus nihilominus pauperculum vehementissimè cruciavit. Deinde corpus, per sudoriferam nimis calefactum, usu feri capiti deputari refrigerandum, & ab aerabilius humilibus per epistram purgandum existimavi, decocto Magistrali sequenti.

Bibl. Chirurg. Tom. II.

Æ. Ag. fuscâillis lib. XV.

Herd. integ. p. j.

Bulliant in vase obscurato ad crispuram herdei, tunc adde,

Fel. Berragis,

Cicber,

Reibon,

Cardui b.

Senec. ana Mj. & lixivum bulliant ad remanentiam ibidij. abjellis herbis, in calatura infund.

p. 24. her.

Rad. Polypod. 3ij.

Pulv. eolocynth. in prias ligat. 3ij

Rad. bell. nigr. præp. 3j.

Trosc. nistrati.

Agaric. crud. ana 3j.

Uvar. Passar. 3vj.

Semin. anis. 3ß.

Misce omnia & bulliant ad consumptionem medietatis, & in fuso præ unica ebullitione adde.

Cinamon. opum. 3ij.

Nuc. Mosch. incif. 3j.

Fel. seu. f. fipis. 3jß.

Calatura dividatur in 2. doses, ut una dosis fuit 3vijl servabatur in phiola quolibet, superaffuso oleo ad digiti latitudinem, & dabatur alterius diebus summo mane, à qua pariens jacuit in lecto benè cooperatus, donec madorem corporis sentiret, atque post horam jasculum sumpsit, & quia, ob eolocynthidem decoctum amarissimum fuit, statim post assumptionem deglutivit aliquid de pomo asfo, aut 3ß. passularum. Purgans hoc facile trahit non solum humorem, qui infusere potest, sed eum quoque, qui jam inflavit. Et notandum, hujus solus decocti cerebro usu, multos ab exulceratō carcinomatosis doloribus liberatos, pluresque à non dum exulcerato fuisse curatos. Hac obiter de decocto.

Preparato corpore, precibus pauperculi devictus labium forice abscedi, primo intus bono cum successu. At sequenti die observavi tuberculum, quod forice, nuper quæ ad talem chirurgiam valde est incommoda, reliquit.

Hoc tuberculum pulvere illo caustico, quem Empyrico acceptum Aquapend. describit lib. 1. penitentiæ. cap. de cancro, consumere frustra tentavi, iodeque de certa curatione dubitare, & imminentem recidivam rimere cupi. Pariens autem meo jussu, repetit usum decocti purgantis, singulis quaternis diebus, & cum ulcus beneficio Ung. de Tutia sequeoris

Æ. Ol. ros. complet.

myri. analb.

Servi anal. castr. 3vj.

Succi solis. hortens.

plumagis. ana. 3x.

Vini granatorum 3ij.

Bulliant ad succ. consumptionem, fassè extarv.

Æ. Ceras. pulver. 3x.

Lithogr. præp. 3ij.

Plumbi usi & lei. Animun. præp. ana. 3v.

Tutia Alexandr. 3j.

Campor. 3j.

Misce omnia in mortario plumbæ, &

F. Ung.

fere ad cicatricem duceretur, remanebat enim solum illud tuberculum, bona victus regula, internis externalique

Xx 4

externisque remediis instructus, spe citissime restitutionis lætissimum domum redire festinavit. At quod supra dixi, elapso semeltri etiam evenit, recidiva scilicet altera, malum prioribus multo pejor. Has recidivas autem fortifici, quia operatio peracta, unice adhibendas existimo. Hæc enim ad tenacitatem chirurgiam ineptissima fuit: *Si quis coner totum labium occupat, Chirurgus, meo & Riedlini erroribus delicti cum fortis abscindere caveamus, ferri enim impossibile, quia ea aliquod vestigium relinquit ex quo malum recurrere queat.* Memini quod aliquando in publicis lectionibus ab Excellentissimo Adriano Spigello, hæc cautionem audiverim, quam tamen pro nihilo habui, usque dum in rustico hoc & alio expertus ea non observata, patientes de vita, & de fama chirurgum periclitari. Ager secundum recidivam pallius, etiam tertiam chirurgiam à me petiit, quam moneta ex argento confecta, acuta, & aqua forti instincta, juxta Aquapend placitum, administrassem absque dubio majori cum fructu, nisi vasa circumcincta maxime tumida, laborem fratranentum fore indicassent.

B. Est usus & applicatio illius instrumenti, quod in vulnibus, vel potius puncturis, arteriarum carpi, quæ in duello facile contingunt pro libeundo sanguine, utilissimum expectus sunt ut infra ex singulari observatione patet. Alii famant monetam argenteam, quam vulnere superligant: quia tamen ligatura ista satis stricta esse debet (*laxior enim sanguinis fluxum nequaquam prohibet*) ob imminentem manus extremitate gangrenam, & subsequentem sphacelum (*comprimuntur enim vasa ut alimentum & spiritus vitales & animales insinere nequeant.*) valde periculosa videtur; unde hominum saluti enclius prospectum Julico, si omnes chirurgi simile instrumentum in promptu habeant, ut tempore necessitatis eo uti valeant. Patavii, ubi exercitum Anatomicum & Chirurgicum a plurimis seculis maxime servat, meo tempore spectabatur exactissimus Arteriotomus, qui ad curandis capitis atrocissimos dolores iussu medicorum arteriam carpi non raro incidit, factique sanguinis evacuatione ordinata, vulnus prædicto instrumento ita compressit, ut ne gutta quidem sanguinis citra chirurgi voluntatem profundereatur neque ullum ex compunctione alias metuendum symptomata superveniret. Sæpius Ulux accidit, ut ab imperitiis balnearioribus, & chirurgi titulo certe indignis, pro vena basilica arteria comes appetitur, unde pieturnaque vel nimia sanguinis profusio, vel aneurisma magnum quod male curatum mortem immolat. Si itaque in futurum præter spem talis error committitur, pro correctione hujus (præter remedium, quod Cassif. Colleg. D.D. Gregor. Hostius observationum chirurgicarum prima, lectu certe dignissima proponit) simile instrumentum, quod arteriam compungendo sanguinis fluxum sistit, aut arteriæ cubiti læse adaptetur, meo iudicio non esse alienum. In Helvetia arterias temporum casu vel arte ruptas & inclitas, parte cotricis medicæ nuda juglandis conyexa feliciter compinguntur.

C. Indicat applicationem ferri inservientis ad genui contracti extensionem. Jacobus Mardel Jacobi Lanionis filius g. annotum, in tetram siliicibus stratum patrem currendo insequens, & celsitans cecidit, sine doloris querela usque in quartam diem ambulavit, quo claudicare, & de genu conatus conquiescere cepit: Maffer de puero laice tollit

cita vocat basitonforem, Johann. Andreeu, qui statim cataplasma contra cruentum Felicis Wiran, altera die (pro discussione ut reor) lineum triplex ex vino calido expectus applicuit. Post ita tractatus corripitur febre acutissima, quæ remediis convenientibus à Medico ite adhibitis, die quodam critico per abscessum pedis affecti, inflammationem scilicet erysipelatolum solvabatur, quæ totum crur & femur ad inguina usque occupavit calore, rubore, & dolore puerum vehementer affligens. Curata inflammatione supererat io genu ante febrem confuso tumor ingens, quem, cum omnia resolutiva explosisset, ad suppurationem ducere tentarunt, & genu tam in parte domestica quam externa medicamine caustico aperturunt, materia nulla, vel certe paucissima effluente. Re ita se habente, Medicus ordinarius discessit, & totum curandi negotium Andreæ Bartholomæi reliquit, hic pro arte & Matte puerum tractavit, ulceraque caustico inusta consolidavit, & tumorem plane induxit. Mater magis quam unquam sollicita, & oblectans, bonum vinum huic malo esse insufficientem, & propterea etiam anxium, me consilii causa vocavit. Hæc ex relatione. Accedens invenit tumorem in genu haud ab similem iis quos vulgo *Girdiborum* appellant, puerumque contractum, crur enim extendere non possit. Facto prognostico, effusum hæc effe incipitis & quidem diuturnæ curationis, rem ita aggestus; pro emollior & discussione tumoris, quotidie per quadrante horæ cum spongia adhibui fomentationem ex sequentibus.

℞. Herbar. Malv.

Verbesq.

Berber. ana. Mj.ß.

Flor. malv. Mj.

Semib. sim. ʒj.

Rad. Alb. ʒij.

Insuf. & confuf. ad chariari.

Post fomentationem apposui ceratam diaphani, quod Hieron. Fabric. ab Aquapend. cap. de melicetis, dectipiti, & D. Spigellus ita cecitavit.

℞. Sælis gemm.

Labagris aur.

Ceræ. ana. ʒij.

Cera & Terenbuth. ana. ʒij.

Galkani.

Opepos. ana. ʒß.

Sinapi pulv. ʒij.

Ol. vater. ʒij.

acet. acerr. q.s. F. l. a. ceratam mellit.

Sed popl. se & ad latera iunxerit genu fecit.

℞. Unguent. Eva ʒij.ß.

Nervon. ʒ. vj.

Cerati elrini. ʒij.

Ol. lumb. terr. ʒij.

valpini. ʒij.

M. pro Unguento.

℞. Ol. elivon. lb.ß.

medul. crur. bovis

cera flava.

Resin. Pin. ana. ʒij.

Buty. rec. ʒij.

Ad. F. Ung. Eva. seu Anodynum, quod Escavimus ex Turcia secum attulit.

℞. Succ.

*℞. Sacc. Nicotian. ʒ. vi.
Cera citrin. recentij. ʒiv.
Regin. ʒ. iij.
Terebinth. ʒ. ij.
Ol. Myrrin. q. s. F. cerat. molle.*

cujus descriptionem habeo ex l. I. Pentateuch. chirurgic. Iher. Fabr. ab Aqpend. cap. de herpes. miliar. .

Ufus somentationis & cerati continuato, genu detumuit: ea inunctione yerd popliris pro extensione nullum juvamen patiens percepit; quare instrumentum hoc applicui, quo paulatim crus extendi posse, ferreum: quod pariens (prius applicato genu corroborato) ergo, cerato barbaro, cum Magistrali dialinap. misto, & facta inunctione popliris, cum superposito sparadapo seq.

*℞. Curini med. defec. ʒ. ij. s.
Cera flav. novij. ʒ. ij.
Resin. Terebinth.
Fin. ana. ʒi.*

Misce ad ignem & insingatur itela.)

Continuè, noctes d'esque portavit, singulis diebus cochleam instrumenti parum attrahendo, donec crus in rectum duceretur, ut spatium unius anni patiens sine baculo ambularet.

Anno 1636. Die 10. Octobris vocatus fui ad puerum Martinum Gravium Leipheimensem, qui mihi ostendit crus ex ganglio in genu versus postriora contractum, quod præcunctis universalibus, eodem instrumento illudque topicis octo mensium spatium, in directum extendi.

D. Instrumenti Tab. XIV. Fig. 1. descripsi usum ostendit: Nam sicut ad catenulocum brachii nil melius, quam lapidis ponderosi in manu gestatio, ita ad flexendum illud paulatim nihil conducibilis sum caperis, quam hoc instrumentum: patiens erat puer militis, qui luxationem cubiti passus, ob malam situationem, cum flexere non poterat: hunc ut pueros præcedentes, inuixi quotidie, spaciadappum applicui, & instrumentum gestare jussi: hic duorum mensium spatium convalescit, & pro necessitate cubitum, sine doloris sensu & impedimento, flexit. *Observa igitur juniores chirurgi, ut membra fracta aut luxata commoda collocent: non tardè enim præter membri contrahendam, sequitur inflammatio malam figuram.*

E. Anno 1646. die 19. Novembria me vocat fratres meus Martinus, ad locerum Joann. Walvenner, Neutem Ulmensem, & in Danubio navigando verisimiliter, ipse, quem Clariss. Collega, D. D. Greg. Horibus in suat. observ. Chirurgic. IX. catavix, ostendit mihi sinum in femore sinistro (qui ex contusione ad suppuracionem ducta, & negligenter tractata, originem duxit) petiitque medelam. Ego sinu magnitudinem specillo explorans superficiali tantum, ad satis longum & latum inveni. Cum autem hujusmodi sinus declives, ut notum, tardè agglutinetur, seq. die fornice deceptoria, incisio parientem eum incidere tentavi, postea carne replendum: sed cum nimis tarde per forsicem istam fieret operatio, nata instrumentum animadvertens, femur movit, manibusque mihi dextram repulit. Unde seposita curatione per ferrum præsumpit (ut ex F. Bohl. Chirurg. Tom. II.

gura patet) dilatarum, albamine ovi coagulato & stuppi perâ, obligavi: subsistente sanguine tertio & quarto die per siphonem infundebam hydromel pro eluenda cavitate: quinto, sexto & septimo vinum nigrum austerum, in quo coquebantur Baulaustia, cortices granatos, &c. injeci, & spongiam novam eodem liquore madefactam & expressam fasciâ longâ, & trium digitorum transversorum latâ, (laxior enim non ita stringit) superelagavi ligaturam ab inferioribus incipiens, & supra sinum in parte sana finiens; his medicamentis, in quibus magna glutinandi virtus posita, & deligandi modo, intra septimanam, fratris socer felicissimè curatus fuit. Ab eo tempore nunquam ad Chirurgum deveni, nisi remedia pharmaceutica frustra fuerint adhibita: Neque posthac amplius fornice deceptoria (quia Chiurgum, non agrum decipit) ad sinuum dilatationem tum usus.

F. Indicat locum fonsicularem in brachio. Variis in locis conspicitur fonticuli, hi tamen in brachiis laus reliquis utiliores, & accommodatiores esse videntur: Unde etiam à Medicis præ cæteris eliguntur, pro evacuatione scilicet, omnium eorum humorum, qui caput humanum offendere solent; cum inter partes inferiores superioresque exactè medium situm obtineant, humorum in caput ascensum impediunt, eosque influentes à capite, ob convenientem distantiam, commodissimè reveillant, atque derivent. Nec solum in capitis, oculorum, aurium, nasum, oris, faucium & gulæ viris, verum etiam in thoracis, cordis, & pulmonum affectibus, magnum & mirandum præstant auxilium. Quanquam autem hi fonticuli in prædictis morbis multum juvent, & ægria sint accommodatissimi, idque propterea, quod ipsos videre, propèitque manibus gubernare possint. Nihilominus tamen non pauci sepeluntur, qui fonticulos in genere, ut qui diligentiam & laborem requirunt spernendo sinistram, planè vituperant: alii ob foretorem deridentur; reliqui verò ob timorem ignis sibi lauci reculant. His respondet, quod neque vestimenta sine labore, manè & vesperi, induantur & extrahantur, neque extremamenta absque sævitate trahantur. Sicut autem hoc vel illud ad vitam humanam est necessarium; ita hi ad bonè vivendum, & integritatē sanitatē fruendam, summè utiles. Et quemadmodum nullum penitenter ullius laboris, quem induendo & exuendo impendit, ita nemo de his conqueritur, imò dum ipsos tractat, magnam voluptatem sentit, sive propter dulcedinem, quam ex pruritu percipit, sive quod de die in diem manifestè cognoscit illius materie evacuationem, quæ secundum errores consummissos genita, & in corpore retenta grave malum attulisset aut potius quod beneficio hujus sanitatem amissam restituatur. Unde sæpius uno fonticulo non contentus, sibi facillè duos, intendam etiam plures, prout opus erit, parati curat: addo quod Fonticuli, si arte regantur, non fœnant, & facti in debito loco non dolent.

Locus fonsicularem quatuor conditiones requirit, 1. ut paries ipsum videat 2. ut ad ligaturam sit idoneus 3. ut habeat venam 4. ut sit in musculorum duorum interstitio, ad prohibendum dolorem, quo impeditur facillè motus.

Locus hic in brachio invenitur, si chiurgus cubitum patientis, vario modo, volvit, scilicet.

✱ ✱ ✱

Se extendit, usque dum debitam musculi deltoidis & bicipitis separationem invenit. Multi concludunt fonticulum in ipso deltoide, quidam in fine hujus, alii in parte posteriore ipsius. Ego tamen, ob alias condiciones, locum lit. F. olearum eligo, interstitium scilicet musculi deltoidis & bicipitis, idque potius in parte superiore, quæ minus sensibilis, quam inferiore, ad quam brevi temporis spatio decurrit.

Invenio fonticuli loco, modus erit considerandus. Paratur fonticulus scalpello, caustico potenciali, & ferro ignito. Cum vero ferrum ignitum hujus chirurgie inventoris magis usitatum, caustica potentialia non probio, suppete quæ, tardè, & ut plurimum cum dolore magno operantur; nec ita securè adhibentur, quoniam eorum agendi vis nobis non ita exakte est cognita, sed interdum præter expectationem nostram efficacior, non raro impotensior invenitur. Miliam quoque facio ferrum secans, sive scalpellum, propter rationes modò recensitas, quibus addo, quod sectio fonticuli sanguinem profundat, quem plura videre nequeunt. Magna dextérité veteres utebantur ferro ignito, quod erat incurvatum, & longum habebat manubrium: Sed cum viderent, quod illud instrumentum non solum carnem à chirurgo signatam lacerat, sed etiam partes vicinas calefaciat, præter hoc excogitarunt aliud instrumentum cannulatum, quod partes vicinas defendat. Per cannulam hanc non ignitam, & cui fortiter impellitur intradens solidam candam, ut penetrat secundum Medici intentionem nonnunquam magis & minus profunde. Julius Caser, Placentinus invenit instrumentum, supra descriptum, & hic Lit. G. signatum, quod ignem occultat, partes vicinas à læsione defendit, & præ cæteris instrumentis ad omnes fonticulos extra caput inveniendos accommodatissimum est. Hoc me plus quam lætentibus fonticulis, cum administratione assidua, & ritu patientis fecisse, testantur illi, qui adhuc vivunt, & fonticulos à me paratos testantur.

H. Est fascia pro fonticulis in brachio ligandis commodissima, quia facillimè ab ægro adaptantur; utilissima, quoniam conservat fonticulum in suo loco & pulcherrima, eò quod, ex tela alba parata potest levati; neque hæc, ut reliquæ fasciæ, tam faciliè visus ac tactus sensu deprehenditur.

I. Locus fonticulorum in femore est (quatuor digiti transversus supra genu, inter musculum vastorum & vastum internum, quærendus) ad ligandum aptissimus, & comitem venas saphenas, ubi fonticulus in hysteriis affectionibus efficacissimus, revellendo & derivando. Coram eo mulieres quorum nominis parca, quæ ob suppressionem mensium, ocrii fautores, aliaque symptomata sine passi: plures etiam quæ ulcera in tibiis habuerant dyspneutici; illic revellendo, hic interceptiendo & derivando.

K. Est fonticulus, quem mihi in principio musculi gastrocnemii, contra dolorem Ichiadicum futurum & telicissimum cum successu paravi. Lapidat quidem Excellentiss. Adrian Spigel, in *lum. corp. fabricæ*, li. 5. c. 9. ob transitum venæ popliteæ inuisionem fonticuli in fura, seu miltici gastrocnemii principiorum costra, quem Daniel Boerhaave in *fab. (asser. Placentin. Tabul. Anatomie*, (quoniam ære emi Spigeliano ab Herodot. Caserii) lib. Tab. 2. lit. Graecæ, notavit. At quoniam locus ille ob suam declivitatem ad deligandum valde est incommodus, ego juxta And. Velal. in *corp. hom. fabricæ*, li. 2. Tabul. 100. de myelitis locum paulò superiorem eligi, eumque

non sine ratione: habet enim hujus loci fonticulus omnes boni fonticuli, quas supra recensui condiciones; venam popliteam, quam antiqui & recentiores in Ichiadæ, alique morbis plurius, quod Aurelius Severinus lib. de angustia cap. 26. collegit, magno certè cum successu aperiebant. 2. Interstitium principiorum gastrocnemii: neque enim metuendus ille nervus litis insignis, qui sub genu transcurrit, ut laceretur, nam ubi fonticulus conficitur, nervus progrediendo, jam jam profundiora petit, ut ferro candente offendi nequeat. 3. Deligaturam firmet consistentem. 4. Paciens ipse ipsum tergere, & gubernare possit. Notissimum est, qui semel Ichiadica doloribus vexatur, non faciliè ab illis liberatur, ita ut ubi polliciter possit, se in posterum ab ejusmodi cruciatibus fore immunem. Sanctè tamen testari possum, memperium post usum balnei Thalesiensis, vulgò *Dejandbrun* in agro Urbano, lit. benedictio hujus fonticuli, per novennium, à paralytico prætervalle, & si viresco fortan alterius, venæ Ichiadicae sectioni, omnibusque purgationibus, fodiiferis, & topicis medicamentis, quæ per annum integrum, ex clarissimorum Medicorum consilia, assumpti & adhibui, valedicens. Quare si in futurum in tali cruciata Ichiadica diuturno, tam interna, quam externa remedia sine successu usuturpa fuerint, meo consilio & bona fide saluti ad hanc chirurgiam, tanquam ad sacram anchoram consugiant, inuisionem scilicet fonticuli in loco signato; non dubito enim, quod paciens sanietur. Chirurgus vero maximam laudem deprecaturus sit.

L. Est fascia pro fonticulis in femore & supra deligendis, communis apertura.

Quomodo fonticuli jam parati consueverint, rectè quæ gubernari debeat, ex scheda Aquispendensis, qui ejus mentionem facit in opere suo *apparatum chirurgiarum, & simul de Fonticulis*, dicere potuissim, nisi illa incuria typographi, cui Aetor scheda tradidit, ut typis in lucem daret, amissa fuisset. Hac igitur delicti legant elegantissimum tractatum, quem scripsit Hieron. Capivaccus, de testæ cauteriorum administratione, & Dominicus Galvanus Medicus Athetinus (cui acceptum refert *sparradrapp. murum*).

2. Cerati de ceru, seu Albi colli Aug. 3ij.

Pol. consp. 3ij.

Thuris.

Tragacanthi ana 3vj.

Bres. Flor.

Benz. ana 3vj.

Sterac. liquid.

Ol. spic. odorati ana 3ij.

Saponis Veneti. 3ij.

Cera g. f. vel 3ij.

Vetoneses Chirurgi, in vici olucupando addunt parum moschi ad gratiorem odorem.

Mises f. art. & cum tela nova F. *sparradrappum*, quæ per annos viginti & duos, plus quam fonticulus mille summa cum ætatem administratione, ab omni symptomatum incuria præservati de fonticulis, lib. 2. cap. 23. 24. 25. 16. & 27. quæ ad mentem Aquispendensis, seu Princepsoris, accuratestima scripta esse certis scio, stylo tamen Italico, qui dignus esset, ut Latinitate donaretur.

Nonnulli miris laudibus deprecantur Ceratum, quo Dux Hertzog fonticulos suos ab omni symptomatum incuria præservat.

2. Succi Fæderæ. 3ij.

2. 2. Nicotian. 3ij.

Terebinth.

Rosin. pin.

Ung. ros. Mos.

Cr. curin. ana. ℥℥.

Ol. N. Mosib. ʒij.

Pulv. cyper. edor. ʒj.

Cera. c. ell. ℥℥.

M. F. Ceraum.

M. Forcips in multieribus sceloporum, pro extrahendis globulis in profundo sitis, assabte facta.

N. dictæ forcipis usum, & applicandi modum ostendit, qui talis est: extrahatur terebellum, & exteriore cannula demittatur verius cochlearia, leavi instrumentum claudatur: hoc facto exterior cannula oleo rosato inungatur, & instrumentum dextra chirurgi vulnei clementer immittatur, usque dum cochlearium extremum denticulata globulum amplectatur: tunc pollice atque indice sinistro, instrumentum chirurgus tenet, eoque quantum æge tolerare poterit, globulum premat ne forcipi cedat: postea digitis manus dextre, terebellum, per foramen capuli torandi immittat usque ad globulum, illudque circumvolvatur, & globulo paulatim insigat. Quam primam vero Chirurgus terebellum globulo sufficienter inhaerere cognoverit, cannulam exteriorem satum parumper & sensim trahat, eamque statim deorsum remittat, ut cochlearia divisa globulum recipiant, & receptum semissime emendo terebelli operam adjuvent: quibus ritè peractis, terebellum & ambe cannule, adeoque totum instrumentum cum alio de recepto globulo, extrahatur eo modo, quem figura designat.

O. Indicat *fellionem varicem*, juxta Aquapend. sententiam, quæ tamen, ut nostris Germanis est horrenda, ita facile ex ea oriri possunt prava symptomata. Dam Patavii literis operam dedi, vidi rusticum in Noloscomio D. Francisci sub Excellentiss. Spigelii manu, summa cum utilitate, chirurgiam delineato modo institutam, finire.

Ego, ad imitationem, hunc operandi modum in patria semel tenui: sed errore parentis, mori scilicet nimio, qui nullus esse debuisset, siquæbatur inflammatio ægrum vehementer alligens, & prohibens, ut voto non peruerit respondere exitus: unde patient cum suis parentibus, ea ut me corripere & touqueret inflammatio, operavit. Hoc famæ naufragium semel passus, vaticibus in extremis affectus, deinceps suis topicis, sub tibialibus ex pelle canina confectis tractavi.

P. Ostendit *vulnus acinace* femori profunde insitum, quatuor futuris seu sulcis anulum, & in decliviori loco foramen habens, cui rotunda Q. immittitur, ut, pro materis exitu, appetum conservetur.

R. Ostendit *modum deradendi tibiem cariosam scalpris Tabula VI. depicta.*

Martius Echnitz Ocellensis, puer undecim annorum conquisivit de vehementissimo dolore tibie dextre, & duobus foraminibus materiem puris feratim fundentibus, quorum unum erat circa malleolum internum, alterum circa externum. Hunc affectum Barbironfor pagi illius ordinarius tractavit pro luxatione pedis. Anno 1640. Die 16. Decembris æger receptus est in Xenodochium Ulmense, quem iussu Inclerij Senatoris visitavi, & statim animadverti affectum non esse luxationem, sed corruptionem & erosionem totius tibie, quam curare institui. Primis itaque diebus bonam victus rationem prescripsi, & sequentem potuencalam,

N. Symp. ros. fol. ʒi.

Ell. lentiv. ʒvi.

Decoll. s. & fr. q. s.

M. F. Pæio br.

à qua quinquies deiecit materiam valde ferream, 22. Decembris, à tibie capite usque ad malleolum internum sine latione venarum, arteriarum, nervorum & tendinum scalpello incidi crus, digitoisim ungubus periossum à tibia separavi, vulnusque stappa cannabina, medicamento stagnotico (ex albamine ovi, aqua rosarum agitata, & pulvere adstringente Galeni) & fasciâ duobus capilibus præstita obligavi. Die 23. subsistens sanguine, vulnus refigatum inspexi & inventi, quod mira me opinio minime fecisset: nam non solum pars anterior tibie in suspensio, veram etiam posterior usque ad medullam corrupta fuit: mox etiam aliquot corruptæ tibie particulas vossella exemi, & vulnus denovo, ob vehementem patientis clamorem, medicamentis & fasciâ obligavi. Die 24. os corruptum scalpello detrahi, & caput tibie inferius integrè corruptum, & valde fastens inventi. Quapropter os tibie decocto D. vino purgavi, ipsique pulverem aristolochiz & lisdia Florentinæ inspexi, & vulnus cerato diapalmæ cont. quam fasciâ obligavi. Die 25. & 26. propter magnam corruptionem os detrahi, & multas corruptæ tibie partes vossella extrahi. Die 29. ab inferiori & interno tibie capite magnam portionem corruptam foras abieci. Die 30. foras ossis ab uln decocto divini nonnulli remissi. Die 31. postquam dolor pedis & feror remisit, ægrum glutinosa victus ratione nutriti ad generandum callum, & vulneri cerarum divinum applicui ad inducendam cicatricem. Ab hinc usque in diem 4. Jan. Anni 1641. ex inferiore tibie capite, seu malleolo externo victus puulenta. Die 6. circa hoc foramen apparuit caro solida. Die 7. vulnus bene habuit & natata os tibie, à capite inferiore usque ad medium partem, erosum, integrè separavi. Osse separato, vulnus mensi spatio consolidatum fuit.

S. monstrat deligaturam cataphractæ, quæ nomen habet à similitudine thoracis Romani, & prodest illis, quibus deligare juxta jugulum conveniens larum scapularum os, pectus, doctum, aut latera. Fasciâ autem unius capitis ita obvolvitur. Alia primò circumdatur (Galen. l. de fasciis 79.) tum oblique per pectus ducitur, prope illam regionem, ubi jugulum cum osse pectoris committitur, inde per cervices, ad larum Scapularum os humeri contrahit, & atque ad alam subiectam, ab eaque ad cervicem, super partem prius injectam, ita ut prope cervicem, similitudo X. literæ fiat, posthac oblique datur, ad larem scapularum os ex altera parte, atque ad alam, ab ala ad cervicem, ut inveterata colli X. literæ figuram accipiat, deinceps sub ala, & oblique prope eam regionem ubi jugulum cum osse pectoris committitur, sic ut hinc quoque similitudo X. literæ fiat, & juxta cervicem, & super larum scapularum os, & sub ala, ut quater X. literam representet, nimirum semel à priore parte, semel à posteriore, bis prope jugulum. Ad eandem autem rationem, quoties opus est, efficit, deinde in orbem strahitur circa pectus & latera sic, ut tota junctura thoracem referat. Numeri autem undique dispersi denotant rationem atque ordinem convolutionum.

Figura omnes qua in hac Tabula sequuntur, representant instrumenta, fasciaciones ac totum apparatusum, qua adhiberi debent in ea Chirurgia exercenda, quam Curtorum vocant, prout à Tabascotiò depinguntur.

Fig. 6. Bicipitem exhibet forcipem & cultros.

- e. Lamina forcipis.
- a a. Labium internum.
- o o. Labium supernum.
- d d. Linea forcipis.
- i i. Arcus bicipis.
- k. Coniunctio.
- f. Coniunctio clavus.
- l. Manubrium ferratum.
- h. Manubrium anulare.
- g. Serra Manubrii.
- f. Annulus Manubrii fixus.
- e. Annulus mobilis.
- q. Culter.
- c c. Cultri acies.
- b. Manubrium.

Fig. 7. Forcipem tricripitem habet, cum delineatione longiori cutis propaginis, & cultros ad id operis necessarios.

- R a. Forceps triceps delineationis cutis propaginis.
 - m m. Lamina forcipis.
 - d d. Linea ipsius laminae, per quam cultro admissio cutis inciditur.
 - c c. Lamina inferum labrum, & brachium tangens.
 - c c. Laminae supernum labrum, & cutim propaginem respiciens.
 - o o o. Arcus triceps forcipis, à quo nomen sumpt.
 - i i. Coniunctio forcipis.
 - S. Coniunctionis clavus.
 - h h. Manubrium ferratum.
 - f. Manubrii serra.
 - n n. Manubrium anulare.
 - o. Manubrii annulus fixus.
 - g. Manubrii annulus mobilis.
- Culter delineandae cutis propagini necessarius, est idem qui in precedenti Figurâ, per litteram q. denotatur.

Fig. 8. Acus, & fasciarum typum habet pro deligatione faciunda.

- a a a. Acus.
- b b b. Linum.
- o o o. Fascia, quae regia dicitur.
- e e. Fascia cubitalis.
- f. Fascia pectoralis.
- g. Fascia brachialis.
- c c. Fascia axillaris.
- l l. Foramina funicularum.
- c c c. Funiculi.

Fig. 9. Forcipem ad inferendam columnam, & cultros, & incurvas acus continet.

S S. Forceps columnaris.

- r r. Forcipes columnaris laminae.
- a a. Forcipes laminae complexus. Nam illam clausam depingimus.
- b b. Arcus forcipis.
- V. Coniunctio forcipis.
- X. Clavus coniunctionis.
- c. Manubrium ferratum.
- d. Serra manubrii.
- n n. Manubrium anulare.
- f. Annulus manubrii fixus.
- e. Annulus manubrii mobilis.
- o. Culter pro excitationis inferendae columnae.
- g g. Cultri acies.
- h. Cultri manubrium.
- l l. Acus incurvus.
- m m. Funiculi, ut ante.

Fig. 10. Cultros configurationis habet & tubulos.

- e. Culter in mirchi figuram adductus ad efformandas rythonas.
- g. Cultri huius manubrium.
- f. Culter alius instat ulivæ, perque necessarius ad excavandas rythonas.
- h. Equidem manubrium.
- a a a. Tubulorum pars superna longior & nares continens.
- 1, 2, 3. Tubulorum pars inferna brevior & maxillæ injectæ.
- g g g. Tubulorum partes laterales.
- o o o. Tubulorum cavum ad capita.
- S S. Tubulorum cavum ad fines.
- d. Tubuli capitis apex interior, quod cavum spectat.
- e. Tubuli capitis apex, exterior quæ globulum & alatum principia amplectitur.

Fig. 11. Testoria, annulos & funiculos, ex quibus colligandi modus comprehenditur, continent.

- a a a. Testorium.
- b b b. Testorii summa pars, quæ perforanda est; & funiculus ille, quem iugum dicitur, transmittendus. Annulus non opus est. Nil enim ex nodò incommodi emergit.
- c c. Testorii durtum.
- o o o. Apex globuli.
- a a a. Columna testorii.
- e e. Alæ testorii.
- h h h. Testorii latera.
- d d. Annulus superior pro superna deligatione.
- e e. Annulus centralis Regiæ, pro regia deligatione.
- f f. Annuli laterales regiæ, pro regia & catholica deligatione.
- k o. k p. Funiculi deligationis regiæ.
- k c. k s. Funiculi catholice seu oblique deligationis.

Fig. 12. Vestitum universum, præter deligationis fascias, clavisimè demonstrat.

N L K H. Cucullus.

A. Cuculli pars anterior quæ facies est.

B B. Cuculli pars dextra.

O O. Cuculli pars sinistra.

C C. Foramen, quod patet auribus externa.

D D. Tho-

- D D. Thoracis, vel diploidis pars anterior.
 M M. Thoracis, vel diploidis pars posterior.
 E E. Locus quò brachia exeunt.
 F F F. Funiculi
 G G. Caligæ.

Fig. duæ 13. & 13. Exhibent egros, quorum labium inferius & nares decurtatae sunt. Item propaginem delineat, cum linteolo injectâ.

- a a. Cutis nares ex adverso posita.
 a g. Cutis propago delinctora, & à subjectis musculorum corporibus, secundum domesticam, ac interlorem illius superficiem le-juncta.
 H q. Pars illius superior.
 D c. Pars illius inferior.
 B E. Linteolum.
 g. Labium superum decurtatum.
 d a c. Cutis propago ex qua labium restitatur.
 d. Radix propaginis.
 a. Corpus ejusdem.
 c. Apex illius, & pars infima.
 l. Atea, & locus inde propago educta fuit.

Fig. 14. Anticam, ac dextram deligationis partem ostendit.

- L. Cutanei traducis apex, ubi adest incisio.
 l. Cutanei traducis radix.
 n y. Atea vulnus medicamentis obductum & del-gatum.
 a b c. Fascia regia.
 D d. Fascia cubitalis.
 c c c. Fascia pectoralis.
 m. Fascia brachialis.
 b b. Fascia axillaris.
 o. Cucullus.
 n n. Foramen auriculare cuculli.
 g. Thorax, sive diplois anterior.
 h. Thoracis disjunctio, infimus funiculus con-juncta.
 a. Funiculi, quorum opera fasciæ cum cucullo, vel diploide conjunguntur.

Fig. 15. Hac propaginis in supernum labium in-sersionem jam factam, & ejus deligationem de-monstrat.

- C. Cutaneus tradux labio insertus.
 n. Jusitio ipsa traducis cum labio.
 e g. Atea, unde tradux fuit eductus.
 a a a. Fascia regia, cui cæteræ inniuntur.
 D c. Fascia cubitalis.
 B. Fascia brachialis.
 A. Fascia pectoralis.
 F. Fascia axillaris.
 O O. Cucullus.
 E. Foramen cuculli ad aures.
 a e e. Diploidis sive thoracis pars anterior.
 b b b. Thoracis divisio, quæ funiculis consti-tuitur.

Fig. 16. Tum posticam deligationis partem; tum lateralem sinistram exhibet.

- D. Cutaneus tradux.
 C. Cutanei traducis radix.

- G. Atea vulnus medicamentis obductum & obli-gatum.
 a e o. Fascia regia.
 E. Fascia brachialis.
 A A. Fascia cubitalis.
 F. Cucullus.
 a. Foramen cuculli ad aures.
 H H. Thoracis sive diploidis pars postica.
 G. Principium fasciæ axillaris.
 Q. Subligaria.

Fig. 17. Nares monstrat deligatas pro con-se-quenda efformatione.

- a a. Fasciarum infra & supra nates applicitarum basis.
 B. Fasciæ ductus alter, qui ab imis naribus inci-piens, supra per autem ad occiput decurrit.
 D. Fasciæ ductus aliter, qui supra ab narium dor-so, per aurium inferna in cervicem defertur.

Fig. 18. & 19. Utriusque labii deligationem, & ea jam efformata demonstrat.

- A B E. Fascia deligans supernum labium.
 A. Fasciæ basis.
 B. Fasciæ ductus superior.
 C. Fasciæ ductus inferior.
 E. Finis & innodatio superioris ductus.
 F. Finis & innodatio inferioris ductus.
 A. Deligatio inferni labii uno fasciæ ductu.

Fig. 20. Aurium deligationem, post infusionem factam ostendit.

- O D E F G. Fascia.
 O. Fasciæ basis, quæ gutturi subjicitur.
 D. Fasciæ ductus anterior.
 E. Fasciæ ductus posterior.
 F. Posterioris ductus innodatio.
 G. Anterioris ductus innodatio.
 C. Cutis propago auri decurtata jam inserta.

Figuræ 21. & 22. Aures jam efformatas : & traducis arcam exhibent.

- A. Atea traducis supra autem
 B. Auris pars superior ex hac traduce efformata.
 C. Auris pars inferior itidem jam efformata.
 D. Atea traducis infra autem, unde pars hujus inferior efformata fuit.

TABULA DECIMA SEPTIMA.

Recollectionem seu repetitionem, quandam pro-ponit aliquorum instrumentorum, eorumque maxime usualium, ac quibus carere minimè potest Chirurgus in Artis suæ exercitiis. Item Turundarum, ac Cannularum, ut & Plumacolorum, Emplastorum atque Compressarum, in vulneribus & ulceribus adhibendorum varias Figuras ac formas tradit. Imò tandem Fasciationum præcipuarum super corpore humano, applicationem exhibet.

Fasciationum aliarum paucarum rationem ac methodum hic adjecissimus. Verùm præterquam

terquam quoddam illas quas collegit Clariss. Joh. Baptista Lamzverde, in sua ad Sculptori Armamentarium Chirurgicum Appendice, pro iisdem huc transferendis, attentius considerarem, vidimus omnes quæ ibi continentur, sine ordine à Tabulis, Tomo XII. Operum Hippocratis & Galeni, Editionis Characterianæ insertis, excerptas esse, ac obscurè nimis, imò prorsus erroneè ut plurimum explicatas: Unde ab illis consultò abstinuimus: Maxima pars earum aliarumque plurium, jam omnino est obsoleta; quæque verè necessariæ sunt in totò hujus Bibliothecæ decursu identidem occurrunt, aut satis commodè Chirurgi operantis industria indicantur.

Fig. 1. *Instrumenta, si ita loqui licet, universaliora, seu omni prorsus Chirurgo, in Artis sue exercitiò maximè necessaria ostendit, qualia à Peritijs. Chirurgò Gallò Donn. Dionis depinguntur.*

- A. Forcipes communes.
- B. Forcipes pro inclinationibus, quorum alter apex, seu cuspis in globulum definit, pro commodiori & minus dolentis in partes incidendis insinuatione.
- G. Forcipes incurvæ.
- D. Novacula.
- E. Scalpellus.
- F. Altitius formæ scalpellus.
- G. Instrumentum pes araneæ dictum, quod valis inter dissicandum sublevandis, inservit.
- H. Scalpellus, Gallis *Lancetta*.
- I. Scalpellus major, pro abscessibus apertendis.
- K. Specillum, in vulneribus ac ulceribus explorandis adhibendum.
- L. Specillum aliud planum.
- M. Specillum sinuatum, seu in sui mediò excavatum.
- N. Cultellus incisivus, Gallis *Bistouri*.
- O. Idem instrumentum rectum.
- P. Idem rursus instrumentum incurvum.
- Q. Spatula.
- R. Folium mirchi, seu instrumentum figuræ myrti folii.
- S. Aliud instrumentum ejusdem naturæ: sed paulò aliter conformatum.
- T. Elevatorium, per duas suas extremitates, quarum altera rotunda, altera quadrangularis, fororum se demum, sub ossa elevanda insinuandum.
- V. Vulsella.
- X. Acus recta?
- Y. Acus recurva.
- Z. Serra.

Fig. 2. *Varia turunda, seu penicilla, ut & cannulae, atque acumi ad setaceos conficiendos, seu potius vulneribus & ulceribus ab uno extremo ad aliud trajiciendū aptam; ex eodem exhibet.*

- A. Parvula turunda, seu specillum ex linamento confectum.






- B. Turunda major.
- C. Turunda rursus crassior, ex linamento parata.
- D. Specillum majus ex linteò complicatò ac convolutò confectum.
- E. Cannula major, canalis per annulos in sui altera extremitate politos armata, ut in locum in quem intruditur commodè contineri possit.
- F. Cannula in sui altera extremitate aliâ lateri donata ut in cavitatem in quam alterò suo extremo intruditor, illabi nequeat.
- G. Cannula depressa.
- H. Cannula incurva.
- I. Minor cannula.
- K. L. Acus pro setaceis, cujus acumen ad formam capitis alii confectum est, ut scilicet dum adhibetur pro vulneribus aut ulceribus ab uno extremo ad aliud trajiciendis, per eorumque longitudinem linteòs longioribus unguentis imbutis, deducendis inservit, facili non ledat ac pungat.

Fig. 3. *Plumaceolus varia forma & magnitudinis ex eodem Autore tradit.*

- A B C. Plumaceorum ubi longiorum tres variae magnitudines.
- D E. Duo plumaceoli in sui mediò, si ad firmiorem consistentiam colligati.
- F. Magnus plumaceolus duplici si ad caput colligatus, ut commodè è vulnere in quod intruditur, retrahi possit.
- G H. Duo plumaceoli plani figuræ rotundæ, magnitudinis variae, pro vulnerum & ulcerum quibus applicantur exigentia.
- I K. Plumaceoli magni plani ac ovalis, qui ad latera vulneris vastioris exterioris applicantur.

Fig. 4. *Varia emplastrorum formas proponit.*

- A. Emplastrum rotundum, quod est omnium maximè commune.
- B. Emplastrum quadratum.
- C. Emplastrum figuræ ovalis.
- D. Emplastrum quadrangulare longum.
- E. Emplastrum ad formam lunæ dimidiatæ, vel crescentis, quod in fistulis ani lateribus, & in palpebrarum aggritudinibus adhibetur.
- F. Emplastrum triangulare, in bubonocle, ut & eisdem in lachrymalibus fistulis usurpandum.
- G. Emplastrum ad formam crucis Maltheus, quod in vestendis extremitatibus atrium decuratorum impeditur.
- H. Emplastrum fenestratum, in sui scilicet mediò perforatum, in bronchorrhiæ aliisque casibus applicandum, ubi sine ejus sublatione vulnus curandum venit.
- I. Emplastrum quod trapezale dicitur. Utroque illius extremo per medium est sectum, ut commodè membris inaequalis magnitudinis applicari possit.
- K. Emplastrum fusciforme dictum; quod in spatio inter homoplasas præcipue adhibetur.
- L. Emplastrum ypsilonforme, perinae præparatum in lithotomiae operatione applicandum.
- M. Emplastrum ad formam T. majoris castrorum, incisionibus ejusdem figuræ imponendum.



10

Fig. 5. *Compressas super emplastris applicandas, earumque iidem varias formas delineat.*

- A. Compressa quadrata, emplastro quadrato superimponenda.
 B. Compressa splenica dicta. Ea si recta à summis ad ima imponatur, longitudinalis; si ab uno partis latere ad aliud, transversalis; si oblique, obliqua vocatur.
 C. Compressa longitudinalis alia magnitudo.
 D. Compressa quæ cicatricis vocatur. Illa quandoquidem ad ulque sui medium per longitudinem diffluit, facilius accommodatur partis cui applicatur inæqualitatibus.
 E. Compressa triangularis, quæ semper crassissima fieri debet.
 F. Compressa ad formam crucis Maltheus.
 G. Compressa fenestrata.
 H. Compressa trapezialis.
 I. Compressa ad icipulam: quæ in humeri luxationibus adhibetur.
 K. Compressa sexangularis: hæc figura rotunditati præfertur, quia partibus quibus imponenda venit, commodius multo applicatur.
 L. Compressa obliqua, è pluribus compressis longitudinalibus ac angustis, se invicem decussantibus composita. Illa aneurismati præcipue deligando apta est.
 M. Compressa rotunda, quæ ad formam integri globi, vel ejus tuncum medietatis conficitur. Illa sub axillis post reductionem humeri luxati præcipue imponitur, ante ejusdem deligationem.
 N. Sunt parvulæ compressæ, quadratæ.
 O. O. Aliæ compressæ parvulæ, figuræ cylindricæ.
 P. P. Aliæ iidem rursus minores, quæ in suturis præcipue tendinum usurpantur.

Fig. 6. *Varias fasciationem super corpore humano, applicationem demonstrat.*

- A. Fascistio cucullata, Gallia *Centoches*, quia totum caput contegit. Conficitur è parvo mantili duplicato, cujus medietas super capite; extremorum verò angulosum super facie pendens, duo ad posteriora reflexi, super nuchâ constringuntur ac nodantur; alii verò sub mento, colligantur.
 B. Fascia frontalis, circum caput, à fronte scilicet ad occiput convolvendo.
 C. Scapulare, quod ex lino longiori & crasso conficitur. Illud in sui mediò diffluit, ne per ejusmodi fissuram caput introrsum, hoc genus fasciæ super humeros devolvatur, ut per extrema sua ad anteriora ac posteriora dependentia suspendere possit varias fasciationes quæ vel abdomini, vel [etiam] thoraci applicantur.
 D. Mantile quò triplicato, vel quadruplicato; totum corpus cingitur in vulneribus cum peccoris, tum imi ventris.
 E F G. Sunt fasciæ & compressæ in venæsectionibus adhibendæ.
 H. I. Designant ejus fasciationis genus quod reperiens dicitur, quodque ab imis ad summa membri deligandi, in spiram deducitur.

- L. Fascia simplicissima, eam tantum longitudinem habens quæ pro unâ aut alterâ membri fasciandi circumvolutione necessaria est.
 M. Fascia alia simplex, quæ contentiva vocatur.
 N. Delineat eam tibiæ fasciationem quæ validior est, & non proprie differt ab eâ quam repetere mox diximus.
 O. Fascia ab utroque suò extremo ad medium usque convoluta, ut predictò mediò parti fasciandæ applicatò, fasciatio ad inferiora & superiora produci queat, imò etiam pro necessitate ad suam originem redoci.
 P. Fascia in unò extremo diffluit, quæ incensata vocatur. Extremitas integra post partis circumvolutionem per alterius fasciam traducitur, ut sic commodè vulneris labia ad se invicem adduci queant per extremitatum predictarum artificiosam tractionem.
 Q. Fascia quæ quadriceps vocatur, Gallis *Eudage à quatre chefs*. Si pluribus capitibus doneatur, numerus capitum denominationem faciet. Intervit autem ejusmodi fasciæ recondendi labii vulnerum alicujus partis transversalium; ac pro futuris in ejusmodi casibus deviandis non parum facit.
 R. Est fascia ad formam literæ T confecta. Hujus autem canda, seu pars inferior, vel simplex est, vel in duas diffluit partes, qualis hic exhibitur. Intervit hæc fascia in variis operationibus, sed præcipuis in lithotomiâ, atque ani fistulâ.

INTERTRIGO

Vid.

CUTIS VITIA.

Hic uno tantum verbo de sui intertrigine, quæ nihil aliud est quam partium uno vicinarum, ac inter femora etiam fratum, atque ac excoriatione, à motu vehementiori & equitatione orta. Curatur vero cervino & hircino, nec non pulvere ex floribus Balauft. ros. sint. emb. & camphora, parato ac insperso. Alii farinam nucis juglandis inspergant, sicque dolorem mitigant. Alii partem affectam aqua ros. in qua aliquid salis saturati sit dissolutum foveant. Alii laudant adipem anseris, anatis, gallinæ, chalcididem aqua subactam, mucilaginem semina cydonior, & tragacantæ, ex aqua rosarum, vel malvæ paratam, item oleum amygdalar. dalc. myrtin. rosar. vitel ovor. item plumbaginem cum aceto & vino mistam, pulverem gallarum oleo vitell. ovor. exceptum, mista plumbagine myrrha & alumine, unguentum de cerussa, de lithargyr. cum auxilio mercur. vivi, item gryseum ac sambagium. Tandem remedium Foetii est si intertrigis argentina herba contrita apponatur, vel hujus herba succo partes affectæ liniantur.

INTESTINORUM MORBI.

DE intestinorum fabrica, membranarum, vasibus glandulis, de eorundem differentijs, sita, connexionibus, actione ac usibus fusc agitur ex Clar. Gildonio & aliis in Bibliotheca nostra anatomica; & præcipue in Theatrò nostro Anatomico. Morbos quod

quod attinet; illi sunt inflammatio, Angustia, levitas, tumores, fluxus, motus immixtus, intussusceptio, vermes, hernia, vulnus, ulcus, ac intestini recti affectus speciales, qui sunt inflammatio illius specialis, veruere, rhyades, ulcus & fistula. De inflammatione, angustia, tumoribus, intussusceptione actum capite de illo, ac etiam de colica & de alvo adstricta, de levitate, capite de diarrhœa. De vermibus, hernia, vulnere, ulcere, veruere, rhyadibus, fistulis, propriis capitibus. Hic itaque spicilegium tantum aliquid eorum prope omnium per consultationes, observationes, & anatomicas inspectiones hinc inde excerptas, exhibebimus.

Consultatio.

Pro Illustri, & nobili Mirandulano, tumore scirrhoso intestini recti à sanatis hæmorrhoidibus exorto laborante.

Postquam satis perspectum est tumorem ad sinistram sedis partem in nobili, & Illustri viro ab hæmorrhoidibus olim immodice fluentibus per incisionem, ablationemque sanatis suboritur latitate, ipsum idcirco rectum intestinum obfideat pro certo habendum; & quoniam tumor durus, ac renitens existit, inter tumores ideo scirrhosus, eosque potissimum qui ex minera melancholica mixta prædominante sunt, est reponendus, in ea siquidem parte contexta sunt venæ prædictæ ejusdem minere receptacula, patenterque habitus melanchollicæ proponitur: atqui succum pituitosum subesse ex his vel facile perusculi potest, & primo quia occasione cojosiliter hæmorrhagiæ calor natus valde depauperatur, node insignis pituitæ provenit fiat, necesse est; secundo ubiquecumque succo melancholico pituitosus commiscetur, unaque ad cutem demandatur; colorem subnigrum suboritur contingit, qualis in tumore nostro conspicitur. Scribitur, pituitosus ergo succus melancholico subdominator; in cuius rei confirmationem facit, & illud, quod pars laborans imbecillior facta quam pro naturæ suæ conveniat, proprium hæc bene conficit alimentum, proindeque excrementa pituitosa cruda coacervare cogitur, ut minime interea dubitandum sit, scirrhum hunc illegitimum esse, non solum quia ex minera mixta ortum ducit, verum etiam quatenus ob dolorem adjunctum non est immunis à sensu, quamvis dolorem partes adjacentes magis, quam tumidam cruciatuæ putem: ut ex his etiam pateat, scirrhum hunc esse de genere eorum, qui non incipiunt, sed qui ex alterius morbi permutazione fiunt, patet adhuc à natura cancri liberum existere, quando neque venosus, neque lividus, nec inæqualis existat, continuoque non doleat, sed obi tantum ab excrementis caustioribus descendentibus, fluxioneque humorum irritatur.

Scirrhus igitur hic (ut modis generationis ejusdem clarius innoscat) à succo melancholico peccante, pituitosque lubreccante ortum ducit, & ex eisdem incrementum suscipit; an vero ab illis per repletionem, siccationem, vel concretione fieri, & an humores eundem efficientes per fluxionem, vel congestionem colligantur, meo iudicio non est difficile decernere, nam quoad primum cum non sit dubium, corpus egregii viti succo melancholico plurimo fœdere, minime fieri potest quin scirrhus per repletionem fœ-

rit subortus; patet quoniam locus affligus, minera morbifica, ac usus olim inedicamentorum adstringentium in unicam frigiditatem (à qua concretio) conspiciant, ea propter in hujus tumoris generatione concretione locum habere sentio, fierias autem, quoniam easque ipsum inducentes, uti nimis calefacientium, ac dissipantium usus, similique non præcessere, mori sententiæ omnino fœdenda. De secundo, & postremo statim, succum melancholicum per fluxionem, pituitosum vero per fluxionem, & congestionem (ut ex super dictis liquet) in parte laborante, & per transfluxionem, ac attractionem colligi; Per hanc quidem primum ob maximum in alvo deponenda conatum, qui ab angustia intestini recti per conspicienda tuberculum facta procedit, deinde ob doloris subsequenti acerbitate; per transfluxionem vero ob partis imbecillitatem tum nativam, tum adficiam, & à morbo, & à remediis adhibitis acquisitam, quam transfluxionem sicuti respectu humoris melancholici à toto, vili jecoris servidioris (quod succi melancholici feras esse solet) necnon totam lenis hæc bene missam sanguineam descendens, fieri non dubito, ita & respectu pituitosi ab eodem toto ob errorem sete triplicis colligendi totius nutritioni destituta prodire certum habeo; Errot autem hic non nisi ex caloris nativi jactura, ac late dependet, merito cujus in parte quoque laborante succo idem, ut statim fuit, ex parte coacervato.

Doloris vero generatio fieri & cojosiliter alterius ex objecto improporcionario tactus organo oblato dependet, & incompetet videlicet frigida inæquali, & soluta minare à copia materię partes sentientes distrahente productæ. Dolorem autem augeri modo, modo imminui contingit, quoniam minera peccans à debili calore in spiritum flammosum interdum aliqua ex parte resoluta majorem infert diffensionem, unde doloris augmentum, atque servitas; at spiritus illo dissipato distensio minuitur, sicque doloris miscere contingit; Idem deinde dolor est periodicus, quoniam causa illius, fluxio inquam, & spiritus flammosus quibuscumque intervallis accedunt, & agunt, ubi scilicet alvus suo proprio fuerit munere; casum vero propter quam per unam, vel alteram horam ab excretionem, & non statim dolor insurgat, ac inserviat, nullam aliam esse existimo, nisi quod fluxio sine temporis aliqua intercapedine materiam in ea copia, quæ vincat, & ob id tristitiam sensum excitet, suppeditare non potest, ut non sit mirum post omnia, vel alterius horæ spatium ab alvi conatu, atque secretionem dolorem accedere, ad quod etiam spiritus illius flammosus generatio, quæ subito fieri nequit, non parum conducit, tandem dolor est uniformis, quia causa operatur, & ad operandum uniformiter promovetur.

Ex quibus ita constitutis facile sit intellecto ad Medicum euntem attinere materiam absorptam, replentem, & concretam evacuari discutientibus, ac emollientibus, calefacereque moderate calefacientibus, prius tamen danda opera, ne hæc eadem de novo generetur per alteram viciata in contrarium, quod ubi Medicus obstricto non poterit, saltem materiam genitam ab affligo loco deflectat, sed inter cetera caloris nativi jacturam ut reputet omnino conabitur.

Sed ut veram fatear borum vix felix eventus est expectandus, quoniam sicuti scirrhus illegitimus dimcultet admodum ob materię putrefactionem curationem admittit, ita ab eodem graviora longe mala superimminent, primum quidem in casu nostro

forum

locum retentio, quæ facile ob ipsius inextenuationem (ut ego sæpius vidi) succedere potest, unde omnia postmodum occasio voluit: non exquiri; secundo imminet carcinoma non solum propter id, quod scitibi melancholicæ à medicamentis quàm facile lætari in cancerum degenerant, sed et potissimum ratione; quod patiens in ea est ætate constitutus (agere enim trigessimam septimam annuam) in qua ut plurimum succi instabiles signi consueverunt; At quod curatio nis difficultatem arguit, ut fere ex hoc impossibile evadat, est quod scitibus veluti interius existit, atque via topicorum usu gaudere potest, quibus & illud accedit, quod purgatio succi præcantis per medicamentum catharticum summopere necessaria per locum sit affectum, à quo maxime abhorret vera medendi methodus; In id igitur saltem incumbendum, ne aliquid detritum contingat; & quod nunc infestat magis quam fieri potest immutatur.

Quod affeque materiæ perisodiorum Médico libet, atque primum Chirurgici, ex quarum ordine præter vntæctionem pulvis medianæ dextra, deinde salstatellæ sinistra; hoc tempore admittendam & foniculos in brachio dextro, femore sinistro, tandemque ad spinæ caudam quamprius inuoluitur proprio, atque ut foniculi magis, ac magis prodicent, pilas in iidem gestas jubet ex pulvere hellebori nigri, & agarici simplicis cum cere excepto paratas, extrema quoque fricari, vinciri, lavari aqua adu calente, ac jugiter veneficiis vellem.

De pharmaciis autem ita sentio, ut ad universalia, ac particularia redigamur, in genere prius primo occurrunt quæ materiæ genium respiciunt, & sunt preparantia, & evacuantia. Prius erant; quæ ex beronica decocto, botaginis, buglossi, fumariz, lapulorum, agrimonii, echinorii pulsaturnæ & syrius appropriatis sunt; Posteriora vero, si sint evacuantia sensibilibus, ac primum lenientia, occurrunt tanquam accommodata syrupas de polypodio magistralis, & mel rosarum solvens; si sint purgantia per alvum, ab ipso hellebori nigri, & agarici cum electuario lenitivo, aut decocto Epitæ, aut syrupo de polypodio dicto, non est recedendum: quinimo non semel, sed pluries hoc vel simili medicamento uti proderit, quoties hellebori ejusdem præparati, tum pulvis succo rosarum pluries irrigatus, in umbraque siccatus, tum extractum ejusdem mihi plurimum arident, huc infusum myrobolanorum Infusorum, & chebulorum in vino subdoli, necnon epirum in fero caprino deputato, prout Dioscorides perhibet, est ut referatur.

Nec ab horum usu me abducit illud, quod, scilicet, per locum affectum non sit evacuan- dum, quoniam iam ipsam in Medicina (ut dicunt) regulari, non autem coacta, qualis est, quæ nunc facienda proponitur veritatem habet: Accedit, quod utique per partem affectum evacuatæ conveniens est, ubi materia medicamentis purgante diducta in ipsa non derineatur, sed statim educatur, eo purgantis genere, cui medicamentum aliquod robur addens sit annexum, & idcirco myrobolanum, Rhabarbarum, ac similia addere si opus fuerit, expedit.

Sed purgantia per sudorem, urinas, ac vomitum non despicimus, pro sudoribus ergo movern- dis præter Sympum Sancti Ambrosii vocatum, extractum cardui benedicti, decoctum chinæ, & sal-

is, modicæque guajaci, aliquot simplicibus dia- reticis temperatis, ac emollientibus, & coaractis, quæ temperatum, instrumentum ligneum ad sudores movern- dos paratum lumen laudibus extollo; Prociendū autem urinis ab usu scilicet caprini infusio- nis antiorum distillati adjecto lacte Cus. melonum non recedendum, quo non contentæ ad pulverem rube- rem tinctorum, ad species electuarias Justini adicen- dere non dubitemus. Vosquis si modo ad ipsum prosum, facilitæ patiens cunctis, cupia cibis lapus moveatur.

At si medicamenta evacuantia insensibiliter agant, Medicamentum aliquod ex viperis paratum, item jus galli antiquioris, simplicibus fere omnibus commemoratis medicatum, necnon antispasmodicum cum lacryma terebinthi, & utrumque anisidorum magnam, ac salem theiacalem ex coacta botaginis propiatum omnibus præfero.

Vtrum si medicamenta respiciant materiæ morbi- ficæ generationem, potissimum ad viscum altera- tionem disiguntur, quare gratia jecoris præter lac- tasinum, atque caprinum iterum cum succo eloc- tratorum assumptum, themas etiam frigidis bi- bitis de more proba, sicuti & persilionem factam ad hypochondrium dextrum cum succo prædicto adjecto aceto, ac tandem balneum aque dulcis non improbo; gratia vero lentis forsan scilicet usum tum trochiscorum de capribus, vel de agno casto, item & medicamenti ex chalybe assumendorum, tum ammoniaci in aceto dissoluti cum succo radici- cyclamini, & oleo caprarum ad movendi propositum proficuum; postremo gratia ventriculi mallichem, nucem myrticam conditam omnibus præfero, urgenteque necessitate themas calidas non vitupero, à quarum usu si aliqua vox timeatur, licet ex oleo communi, atque butyro cly- steres injicere; Exteriori pro eodem ventricu- lo convenit ceratum ex malliche cum speciebus diambæ, aut etiam stillicidium stomacicum, prout deest paratum.

Topica post hæc occurrunt, & primum sub for- ma infusus, qui commodè suis, vel ex oleo sem- lini, vel ex lotura lanarum, vel ex decocto herba- rum emollientium, adjectis pinguedinibus, ac me- dullis potest parari, quibus in progressum addere licebit oleum rutaceum, irinum, ac laurinum, lice- bit & incoquere herbam Nicotianam, radicem pe- cedani, cucumeris agrestis; pariter injicere præ- dicta medicamenta vel pulmo medicamentum filii Zacchariz, ceratum ex Oseipo, & diachilone gum- matum, deinde ceratum factum dissoluta in vino decoctionis fenugraci erit opportunum; sed mihi maxime placet injectio, quæ fit ex mucilagibus altheæ, fenugraci, sem. lini cum succo tabaci; Tenax etiam ex lana, quam succidam dicunt, præ- dictis imbuta uti & glandes factæ ex pinguedine cap- ræ, leonis, ursi; Medulla cervina, & gummi am- monisco, idellique, ac pulvere radicum cucume- ris agrestis, & florum tabacci andi non sine fructu usurpari poterunt; Iura quoque Paravina, primum Divi Bartholomæi, deinde Sanctæ Helenæ quomodo- comque administrata meo iudicio mirifici etiam vias, quinimo cum sciam ex his olea chimicè parari, illa propterea (sicut & balsamum verum) injectæ ma- xime efficacia sunt prædicto. Et quantum ad infusum arctinet statim, dum frequens est usus patienti jam di- ctorum, licet etiam mihi per anum fumum reci- pere, qui tum ex lapide pyrite; vel molari ignitis ac aceto acerrimo aspersis, tum ex decocto adu calen- te simplicium dictorum facto in locura lanarum, &

Ty aceto,

acero, in quo lapides igniti fuerint extincti, exci-
tarur.

Vivendi modum appositum non propono, quo-
niam ab excellentissimo curante appositae suis super-
que poterit institui, solum illud admoneo, ut conti-
nuo patiens bibat vinum aliquod cum chloa, gas-
taco, botagine, baglosio, ac similibus medicamentis,
& alvum ibi lubricum clysteribus emollientibus,
passis, ac prunis preparatis contineat; Atque hæc
sint satis à me nunc propiata pro salute nobilis viæ,
cui Deus utinam favcat. *Julius Casar Clandinus in
Consultationibus Medicinalibus.*

Observationes & Anatomica Inspec- tiones.

De Alvi excrementis per genitalia ejactis.

Martini Jenneri, mercatoris apud nos, filia sexen-
nais manibus pudenda continuo stricabat, quæ ob rei
surpseuduam à parentibus sæpius corripiebatur, tan-
dem ex fractuum horrorem intemperativo usu in ma-
lignam incidit dysenteriam, quæ de causa vocor in
consilium, propino contra malignitatem & humo-
rum acrimosiam pugnancia remedia, non neglectis
subinde cordialibus & roborantibus, enema etiam
ex abstergentibus & consolidantibus injici curo,
quod dum applicatur, liquor enematis per puden-
da rursus effluere conspicitur, terribis ad insolite
rei hujus vilium patens, me advocat, & ut in-
quirem & edicere causam obicit rogat; accen-
dens puellam tabula imponi cubo, pudenda inspi-
cio, & velamento aliquo castoso illa subducta,
lacque clausa esse animadverto, ita tamen ut superne
& inferne illius exilis intromitti possit, ubi exilia
foramina, per quæ urina impetuosè extrudebatur,
conspiciebatur; cum autem liberam effluxum urina
non haberet, moram circa velamentum trahere opus
habeat; a. rimosa autem feri terrena loca observa-
re debebat, & vellicabat, quæ causa erat frictuosa
pudendorum, erosum tandem per moram longam
sine dubio ex illa acrimonia intestinum rectum est,
unde per alvum excreta, per genitalia communi
facto metu exire conspiciebantur. Licet autem na-
tura viam apertionis & sectionis monstraret, nolui
tamen propter instantia fata, ne accelerasse me e-
dem jure culpam possem; nam summa virium debili-
tas, & extrinsecus testisgeratio, quam sudor colli-
quatus excipiebat, postero die in felicem terminum
terminabatur. *Joannis Schmidii.*

De Excretionem fecum per umbilicum.

Vocatus Haynam Milnicorum, & Medicinam
ad hunc usque diem ibi faciens, Anno 1668. ex
Gemellis ibidem natis, alter erat epilepticus tena-
cis, duodecimo à natiuitate die insulso epileptico tena-
cis, idoneis tamen medicamentis restitutus, post tres
aut quatuor præter propter Septimanas, circa umbi-
licum rubor quidam inflammationem minitans,
sine tumore tamen, io eo se prodidit. Applicatur
Chirurgus emplastrum quoddam defeciosum, coti-
die bis renovatum: Hoc tertio die remore, umbi-
licus simul excidebat, & postea: præputis alvo
segniore, stercota per umbilici foramen patiens ex-
creta, nihilque per anum deficiebat. Externis
consolidantibus umbilico læso impositis, simul in-

terus, nempe syrapi & clysteres emollientes, lu-
xaries, & iostetina rupta consolidantes alternam
adhiberi, consociabatur. Hic continuo adhibita,
non solum excrementa per emunctorium ordinarium
deficiebat, verum etiam intra paucas septimanas,
coalescente iterum umbilico, infantulus restitue-
batur, excepto, quod cotidie guttula quædam aquo-
sa in loco affecto ad hunc usque diem, quo hæc
bo, exsudet; sine ulla tamen læsione, rubore au-
dolet. *Melchioris Friber.*

Lapis in Intestinis.

Petillustri & Generosissimo Mastona Hildesie vi-
vens (cujus nomini consulo parco) à pridie al-
tumpis ex meo præscripto piualis è gummatibus
Nobilissimi Sylvi præceptoris honoratissimi; alero
mane cum excrementis lapidem extubar ovi co-
lumbini formam deferentem, in exteriori superficie
subincretum, & dum à me clavo ferro in duas
æquales partes disfringitur intectus indur crystalli
albicantem & sustulit, ita ut qui olim ex En-
nit stercore aurum, hic colligere potuisset gemmas
Job. Henr. Brechfeldi.

Intestina Sphacelata.

Viduis quidam literatus, J. S. Uratislaviæ de-
gens, quadragenario major, melancholicæ, & dem
viveret, valitudinaria constitutionis, M. Febuario
Anni 1670. solito plus conquestus est de ructibus as-
trosis, inappetentia & dolore Ventericuli, ope non
Renum & docti. Subsecuta dehinc sunt obstructions
alvi, noctes inquietæ & sæpe infomnes, dolorique
obituri, gravatissimi circa illa, iique in finitio li-
tere supra Ventericulum quasi accedente. Febri
apparui nulla, major tamen nonnumquam feb-
velpetam, quam interdum, Lomborum ditorique in-
calescentia. Urine pallidiores plerumque & crasso-
res deprehensa, cum sedimento copioso, nonnum-
quam tætaræ rubro, sæpe us albo, mucoso, pulvis
indies debiliior, ab initio sanior, ventis interitum
celerior. Supervenit his omnibus Vomitus sangui-
nis oigrancians in grumos majores tenacissimos ma-
ximam partem concreti; qui cum intra triduum
copiosior aliquoties rediisset, Agroteo, exhausto vi-
rium thesauro, lipothymias sequentes, ipsam-
que demum mortem, quam die 6. Aprilis beate
obii, accessit.

Ut læque tot Symptomatum causa inquireretur,
permisso ipsius Agnatorum, cadaver aperire conce-
sum fuit, quod etiam factum præsentibus Viris Ex-
cell. D. Godofredo Tilebo, Ph. & Med. D. & Phy-
sico Uratislav. meritissimo, & Dn. Phil. Jacobo
Sachs a Leuvenheim, phil. & med. D. & Prædico
famigeratissimo, Amicis meis honoratissimis, qui
ambo ultimis diebus mecum Egri curam habue-
rant, Sectore Do. Franzo, Chirurgo nostro in-
dustro.

In aperto Corpora demortui Abdomine atque
Thorace sequentia ad partem affectam, causæque
morbi & mortis imprimis facientes, occurrerunt no-
tatu digna.

- (1) Pinguedo quidem fat multa sub cute per totum
corpus diffusa;
- (2) Muculi vero Abdominis & Thoracis exacerati.
- (3) Cor oibulminous obdum satis, densissimum,
compactum, beneque constitutum, Sanguine
vacuum,

(4) Pul-

- (4) Pulmones quoad colorem quidem à naturali flatu parum differentes, flavidi tamen & exsangues, horumque lobus dexter interior versus dorsum Thoracis annexus.
- (5) In Ventriculo nullus Saugula, tonicæ bene constituta.
- (6) Lien iuste figuræ, magnitudinis & coloris.
- (7) Mesenterium non glandulosum, sed una cum Pancreate naturaliter constitutum.
- (8) Hepar admodum magnum, totum obvolvens ventriculū, admodum pallidum, coram licet Sanguine vacuum, ponderans tamen ponder. Medic. lib. iii. §. viii.
- (9) Vena portæ versus hepar Sanguis exhausta.
- (10) Intestina in sinistro latere ferme bene constituta, quæ vero in dextro, livida, nigricantia, sphacelata, Vasaque mellea in intestina defluentia sanguine nigricante turgida.
- (11) Intestini coli pars superior in sinistro latere supra Ventriculū inflata, qua vero dorsum vergit incisum, sanguine concreto fæculento, nigerissimo, instar picis, quale vomitu reiecerat Agrotus, admodum repletum.
- (12) Renes pallidi & flavidi, inque dextro horum materia multa cartacea, & circa infundibulum calculus instar fabæ minoris.
- (13) In sinistro vero major & albicans calculus, prodece scrup. V. fig. & magnitudine cordis avium oblongiore tomata, multa materie seroso-lactæ, quæ una cum plurimis particulis retarctis, instar calcis, per totam Renis substantiam dispersa erat, quasi innascens.

Mitum, quod viscera lienis, pancreatis, Hepatis cum suo felle, Ventriculique in hoc corpore omnia deperthesia fuerint sana & naturaliter constituta, cum tamen Agrotus per totum vitæ spatium, pallidus, & tristis incederet, solitariamque & sedentariam vitam amaverit, omniumque Medicorum consultorum sententiâ Hypochondriacus audivit.

Nec minus mitum, intestina illius sphacelata fuisse sine prævis doloribus Abdominis, sine prævia Febre manifesta. Conjectura est, Sanguinem melanolicum, acido austerum inhabilem quidem ineptamque fuisse ad concipiendum subitam & magnam fermentationem & exaltationem febrilem, nihilominus tamen, forte ab errore diæte excolescente intra morbi decursum commissio, in tantum irritari & commoveri potuisse, ut per vasa mellea (hæc enim versus intestina repleta, versus hepar vacuata apparuerit) ad intestina successive conflueret, hisque sphacelum, miscello vero mortem attulerit. *Friderici Orsibii.*

Vulnus Intestinale periculosum feliciter curatum.

Anno 1676. Dominicus Simeoni Patavius, ætatis natus xxvii. unus ex palatii apparitoribus, amicum quendam suum libris obrium è castello Baldo, Patavium inter & Fetsariam sito, educere cupiens, quem à lictoribus conquestum noverat, huiusmodi vi summaque diligentia ro concessit. Superveniens lictoribus quatuordecim, ioculsi tres,

Bibl. Chirurg. Tom. II.

portas aptissime obserant, adituque fortiter negaverunt. Explosa utrinque sclopeto lictori uni vitam eripuerit, duos alios graviter vulneraverit. Castellus domus & ipse globo transivisse occubuit. Noctis beneficio aufugit amicus ille, ob quem exorta erat ira. Solus remansit Dominicus, qui pulvere pyrit destitutus, hostium numero cedere coactus est, in latens & corpus anteriori submittens abdomen, sclopetum majus (quod archibub Itali nuncupant) explosum. Lictores adum esse de illo opinabantur, quem paulo post spirantem adhuc cernentes, in corru collocarunt, Pataviū reduxerunt. Magistratus indulgentia, Dominico saucio in aedes suas depositati concessum est, quem brevi in carcere periturum magna erat conjectura. Medicorum habito consilio, desperata fere omnia curantibus, Vultus maximum in epigastrio dextro non procul ab umbilico, disrupti, præter tegumenta, tendines musculique, rectus, transversus & obliqui, ingens *anajjzæ*, dejectiones superne infensæque, frequens syncope, prostratæque vites, ut ægro, sic Medicis spem omnem præcendere videbantur. Nunquam tamen omnino deservendum esse ægrotañem, dubiamque spem certa desperatione potiorē, & hoc confirmat exemplum. Quippe quinto morbi die, per alvum una cum fecibus à clystere sollicitatis, in pelvim excidit globulus, tragadiæ instrumentum. Longior non ero in enarranda cura: Serviora abhinc cessavere symptomata; atque post unius mensis periculum plene liberatus est æger. Non deficientibus miraculorum esse censentibus, benefici erga amicum animi pretium: At Medicis opera Naruræ curiosius scrutantibus alia via procedere expedit.

Perpendatur imprimis quæ à deciso globulo ostent maxima difficultas: Quo modo is in intestinum penetravit? quo modo & hoc sanatum est? Qui enim fieri posset per podicem deici quod intestina non subisset? si tubarit, intestino perforato quamvis fuit Medicina? Hanc casu delapsam ininterpretetur qui ulterius inquirere fastidit. Intestinelorum qualicumque illa sint, sectionem periculosissimam esse docent Auctores, ratio & experientia. Crassa vitæ sanantur, Tenuis namquam; ita Hipp. aph. 18. & 28. sect. 6. *ἡ ἐν τῇ πυλινῇ τῇ ἀνδρὶ*. Nulla profus facta fuit *ἐν τῇ πυλινῇ*. Ergo concludere licet profundum vulnus, Naturæ providentia agglutinatum fuisse, ut non immerito corpus nostrum innato balsamo sibi proprio testetum credatur. Quod majus est, nihil consutum fuit, neque curis, neque muscoli, neque tenuis illa membrana, nervosa atque exanguis, quæ vitæ atque telam mole superat, *peritior* nuncupatur, sed omnia tam cito coiere, ut fidem superet. Nihil perinde incommodi reliquum fuit. Observatum in omnibus Galeni præceptum, Meth. l. 6. c. 4. excepta foitione, quæ incilis censita est: Excisa intestina cum omento, in suum locum recondita sunt, medicamenta impoſita, & ne qua præstantior pars simul afficeretur, quantum fieri potuit, prospectum.

Multos audio dicentes globum præter musculos non penetrasse, ac inter adiposam abdominis molem latuisse, donec cum suo pondere, tum etiam Naturæ vi, in intus ejus patres collapsus fuerit. Esto, nec tamen patet ad exitum via: An deinde globulus in capacitatē intestini penetravit, abique substantiæ deperditione? quo modo reparata illa fuit? Qui facies, ne foras possit, coercita? Quid factum de sanguinis copia in abdomine sparsa, disrumpentis concurrentisque globuli vi? An & hæc per disruptum intestinum

Ty i efflavit

effluerit? Observationes huc referat quantumvis curiosius, à Schenckio scriptas, l. 3. de acu, cuitro, alisque per diversas à naturalis vias excretis, aut alienis humoribus per intestina deductis: Naturam continuo beneficam innoteta producere liquet atque non expectanda, imò ne speranda quidem. Hinc Gal. moriente, l. 3. de crilibus, Generosus Medicus neque difficillimis casibus terreatur. Celsus ad id. temeritate aliquando efficere docet in morbis, quod prudentia nullo modo tentare debetur.

Ego quidem ad hujus rei conjecturam nec à temeritate praedidium invenio. Si Dominico superstes fuero, ab eodem vitam adhuc agrote, venia jam accepta, scrutabor in ejus intestinis, si forte tam prodigiosa valetudinis lateratem modum dignoscere poterò. Interea si vobis, viri Eruditissimi, aliquid occurrat quod proposita difficultati satisfacere queat, pro vestra & in Collegam benignitate & io rem medicam studio, mihi palam esse facturos & spero & rogo.

Intestinorum aliquod à globuli explosi impetu fuisse hic laesum, vix dubitandum est; neque enim credibile eundem tam parvo temporis spatio, nec singulari aliqua violentia externa protrusum, cuniculos per tot illas partes, etiam fatis crassas & membranosas: agere potuisse, ut quinq. morbi die jam intestinum rectum ingressus fuerit: Symptomata etiam gravissima non levius aliquod vulnus cutem tantum penetrans, sed altius progressum, & in specie dejectiones ille supernae interaque &c. ipsorum intestinorum aliquod laesum fatis indicare possunt. Neque nullo modo obstat Hippocratis ambobus, multiplici ejus experientia procul dubio firmata, in aphorismo 18. sect. 6. ab Exc. D. Authore citato: ost enim Coem nostrum lethalia saepe dicere vulnera, quæ utplurimum, non ea necessitate & semper sunt talia, ubi in hoc Libro ex Galeno sunt notatum, atque ipse etiam lib. 2. Prothet. vulnera, quæ magnam quidem perniciem asferant; non enim tamen, ut, cum ipse se explicat, nemo ea his servari possit, teceatens, intestinorum quoque, onulo inter tenuia & crassa factio discrimine, quæ sunt, eis adnumerat. Dum vero Coac. prænot. 503. & sect. 6. aphor. 24. ea tenuibus si quod dissectum fuerit, non coalescere solet, parum de vulneribus utplurimum, cum dictum, taliter se habentibus, parum etiam de magnis difficultatibus interpretari debemus; prout ipse quoque §. seq. 509. Coac. prænot. cum mortem prædixisset io intestino aliquo, sive crasso sive tenui, vulneratis, si oempe per transversum fiat plaga & magna: si vero parva & testis, quodam evadere edicit. Nemo itaque amplius, intestina vulnerata mortem simpliciter inferre ex Hippocrate evincit. Neque aliud nos variorum docent observationes, qui tam crassorum, quam tenuium intestinorum, vulnera sanata videntur; illorum ex gr. Specimen suggerentibus Nicol. Tulpio lib. 3. observ. Med. cap. 20. & Joh. Riolano in app. Sim. Pauli tr. de febb. bozum Ephemeridibus nostr. Carol. Ann. 1771. obs. Jacob. Scidilio obs. Med. 5. Joh. Heurnio in comm. sect. 6. aph. 18. Hipp. & Jacob. Hollerio obs. prop. 17, de non Comm. io cit. aphor. Conferatur etiam histologia ab Amboe. Patzo lib. 24. Oper. cap. 19. memorata, nec oia alia bullæ Authoris admodum similis, quæ in Franc. Dallerioli lib. 4. obs. 9. consignavit. Unde etiam quodcumque tantem intestinum in hoc casu globulus transiit, licet vel ipsum jejunum id fuerit, cum quidem ex denominatione loci percussus, scil. epigastri dextræ non procul ab umbilico, quo nempe in locis illud naturaliter situm obducere solet, nobis conjecturare licet, saluum

evadere potuisse ægrom, non adeo est inestimabile. Videtur quidem hic posse, scrupulum inpicere metuendam chyli ea vulnere isto io cavitate abdominis effusionem, quam olim non nemo pro stabilienda similia in tenuibus intestinis vulnereum lethaliute publice in medium protulit, ita ut æger necessario nutrimento, in sanguinem & ad singulas partes derivando, orbus penitus necesse habeat: aut (ut tacem, quod ipsa læsæ partis glutinatio, de cujus utpote impossibilitate nullum penitus argumentum producat, calum illud chyli impedit, si quem vero egredi deue, sicque consolidationem is retardare queat, eandem tamen omnino inhibere minime valeat, cum chylus non continuo à ventriculo suppeditatur, perque intestina permeet, si io superiori parte intestini, & quidem ita in corpore à natura locati, ut transferulum situm obtior, plaga infligatur, ille chyli ea cavitate illius prolapsum non adeo prompte aut copiose contiget, ut mortis periculum. ob defraudatum corporis alimentum, inde fit metuendum. Galenus quidem lib. 6. Meth. Med. cap. 4. jejunum omnino incurabile esse adiecit, tum propter magnitudinem molitudinemque vasorum, tum quod tunica eius præterea nervosque si, bilentque insuper sinceram universam recipiat, & jejunum omnium maxime fies viciorum. Verum quod attinet 1. magnitudinem molitudinemque vasorum, scrupulo huic satisferet Hentius, pterquam calamitum non esse, l. c. scribens, si intestinum tenue ea parte vulneretur, quæ mesenterium attingit, ob venarum eo venientium magnitudinem, quæ plurimum sanguinis fundunt; id quod in parte opposita non adeo est metuendum. 2. ipse Galenus Comm. 6. aph. 18. tunica tenuitatem & nervosam naturam quodammodo impugnat, dum verba faciens de omnibus tenuibus, intestinorum tenuium naturam non parum participare air carnosæ substantiæ, ideoque in summa parte vulnerata sapius conglutinari, tota autem discissa nique ad eorum cavitatem, non quidem nunquam, sed tantum rarissime; hoc autem, addens, non tam propter eorum substantiam mihi videtur accidere, quam quod non possimus æque intestinis sicque extrinsecus medicamenta vulneribus imponere. 3. Illis in intestino jejunum jam accedentem fiam, quia vulneris unionem impedire posset, desoluit, videlicet tam à lymphæ puritate &c. quam ipso inprimis chylo acidulo alterata, atque ita in sincera sua natura multum immutata; sic ut humorum viscidum à glandulis intestinalibus egressum, aut etiam fecum nutritium ea discissa artetiolarum discillis exstillans impedire minime valeat, quo minus renacitate sua vel glutinositate, vis balsamica, si ten loqui liceat, virtute, cum saccollica aliqua, vulneratæ patris labia, ab ære externo improporionato, vulnere sanatiool non parum coartato, ob inflammoræ, quem occupat, in corpore situm, sic satis immunia, & post vulnerationem, dum aer in cavitate intestini prius contentus ea hiatu egreditur, concidentia, sicque propius ad foveam accedentia, conjungat, istanque continui solutionem ita reuniat; quod denique 4. de vicini hepatis dicitur, quomodo in consulationem venite hic queat, penitus non video. Caroli Patini.

De illi vulnerati curatione.

Vocatus ante decennium ad Sætoris conjugem, cui maritus cultro vinhos infligat in hypochondrio dextro supra Os illeco inen pestiva nodæ.

Vulnus

Vulnus obligatum est, mane dum Chirurgus, Nicolaus Reinhard, Emplastrum removeret, faeces alvine sublequuntur, dilatato parumpet volnere apparet Intestinum ileum lesum, placuit in casa desperato periculum facere, nec zgra 25. annorum dolores recubabat, modò vita donaretur, Intestinum caute acu alligari cuto cuto, recentisque laceratamella interposita, ut fecibus alvini pateret transire cūtem jungeret jubeo, quod & factum, positione præfatis vulneribus, quibus ad stuporem curata est, binosque enixa est liberos annis sequentibus: cum de valetudine ipsius nuper quaterem, satis cessisse anno proxime pueritio accepit D. Maibanzner.

De Intestino Colo vulnerato cum Hypogastrio vulnerato coalescente.

Quod Natura sit morborum medicatrix, nemo nefcit, & in hoc exemplo manifeste apparet. Anno M. DC. LXXII, die 12. Februarii, Servus à stibulis illustrissimi Do. Do. Comitris Schillhard, &c. temperamenti sanguinei in taberna inter componandam à quodam studiosa, circa tertiam lumborum vertebra ex parte dextra à tergo, gladio quadrangulari per initium intestini coli & hypogastrium versus illa sinistra transversus, in domo ejusdem Illustr. Do. decubuit. Curam ejus sedulam Chirurgus suspiciens illum deligavit: altero die amora ligatura, excrementa per vulnus hypogastri exivere, & hac via alvi instar navis se per dies novem exonerare conabatur, quod io quavis deligatione apertebat: quo etiam tempore, alvus suam, omentis per glandes sollicitata, præstidit officium: tandem decimo ab accepto vulnere die, per alvum copiosa elegerit, animo alias præfens: ad omnia oblata bene se habere visus est, nihilominus decimo sexto die satis cessit. Ut iustitiam adesse, Chirurgus ex me petit, quod etiam labens præfidi. Apertum abdomen retrum odorem spiravit, nam faeces per vulnus intestini coli in cavitatem illapsæ, intestina corrupta & gangrenosa reddiderant, vulnus vero intestini coli, siue labis illius, cum labis vulneris abdominis in unum ita convecerant, ut cunctello ad separatanda ab invicem opus fuerit: & si cavitatis abdominalis hæc fentina libera & expurgata primis diebus fuisset, ægrius evadere potuisset, una mecum aditantes affirmabant, nec desunt tales casus. Similem fere casum proponit DD. Franciscus Bouchardi, Anno 111. Ephem. German. Observ. 8. qui videatur. *Simonis Aloysii Tudeci.*

Intestini coli pars per triennium & amplius ab abdomine pendula, ambulationem non impediens.

Mihi Lutetia Parisiorum anno 1661. degenti, juxtaque Theatrorum Templum fortuito progredienti, Mendicus occurrit quidam, & cojus abdomine prominens Intestinum cum animadvertissem, illum propius stipi plus satis audientem, fecerim exegi, remque tunc ad libitum exploravi, & sinistri Renis & Umbilici loci propemodum intermedio, pendulam Intestini Coli partem semipalmo longiorem comperi, cujus sacculus identidem excipiens appendam ille larri scutellam apravit: hic peristalticum ipsius intestini motum mulcoris observare licuit, adeo ut palmi longitudine modo

profundi, deinde vero crassiores in trunculum cogi, sacculus nimirum excretis, videretur: nulla tamen ex parte (quod ego peculiariter demirabar) interstium recondebatur: Interrogatus homo num ullis adhuc munis anus fingeretur: num multis tormicibus afficeretur? peculiare quid aliud io se ipso pateretur? ubinam genium & quo pacto fuisset ita confosus? respondit, anum quidem omnino vacante; colicis vero doloribus, primo frigidiis alimentis, vel aeris occursum se cotereti, (quod lusus illi, mehercle, vultus) proindeque tegumento quodam ad id effuso leurellam ac Intestinum, pro renata, accingere & obvallare; nec nisi in dorsum paulo magis erectum quomode decumbere posse, quoad alias functiones belle se satis habere. Casum in Anglica nave jam ante triennium narrantem, majoris caputis glande, sinistram circa Renem (ubi magna superetur cibaria) trajectum ita fuisse. Rem hanc Clarissimo undequaque Viro domino Gondoni Patino Doctori Medico Parisiensi, Professori Regio, Præceptori olim meo amicissimo, præsentibus, qui mecum videbant, aliis compluribus postidie narravi. *Franc. Bouchardi.*

De Gangraena Intestini recti.

Anno 1673. die Augusti 10. vocatus sum uoà cum Antonio Statlander, chirurgo ad Magificum Dn. Burgavium Regium & Proconulem L. N. annos natum 63. qui de dolore ani seu intestini recti, maxime circa defectionem faecum alvinarum jam à sequeptimana continuante conquirebatur: hic autem quotidie intensior factus, cum prædicta die lecto altissimum domi delinuit. Eadem die & 11. Augusti, hora quarta vespertina febriaculam percepit: uti na erat admodum rincta & uominis confusa, pulsus celerrimus, calor ad tactum intensissimus, sitis maxima, hinc dolor, patris affectus, qui noctes dielque durans, omnem cibi appetitum prostravit & somnum cum magna inquietudine àderit. Chirurgus affectum locum cum inspectis, invenit inflammationem insignem cum tumore ab intestini recti parte circa orificium vesicæ ad exteriora vergentem, sed cum speculum ob dolores Magnificus admittere nollit, iste omnia manibus tractare necesse habuit. Cum vero ante ites septimanas Magnificus Proconsul purgatione solita, hucusque ob publica negotia dilata, usus esset, & ante duodecim dies venæ sectionem satis largam instituisse, vicinamque languor insignis adisset, julepis tantum & aliis alterantibus aique corroborantibus, tam internis, quam externis pro virili optime ei succurrimus: sed inflammatio indies majus incrementum sumpsit, viribus incrim corporis summe deficientibus. Die 14. Augusti, post applicationem enematis (cujus emolumentum jam sumel expertus est, ejusque repetitionem Ideo petiit) gangraena ex interiori intestini recti parte versus scrotum, (quam omnebat) in conspectum veniebat. Ista, licet limineo magistrali Hildaui & spiritui vini camphorato ei satis propiciebatur, in horas crescente & scrotum occupante, naturaque succumbente die 15. Augusti hora media sexa vespertina Magnificus Dn. Burgavius placide in Christo exspiravit. Notandum hic, quod jam à tribus elictis annis Magnificus Proconsul à dolore atrocissimo io sinistra parte faciei circa maxillam & oculum maxime infestabatur, qui quidem assumpta quolibet vere & autumoo medicamentia purgantibus solita aliquantisper remittebat, sed iterum mox revertebatur: & qua de causa ipsi

suasi, ut fonsiculum in brachio ejusdem lateris admitteret, sed frustra. Præterea sæpissime eidem molestus fuit totius corporis, præsertim autem superiorum partium, pruritus cum pulsibus quibusdam, cujus gratia frequentes scarificationes, & quolibet vere semel venæ sectionem adhibebat: quæ autem symptomata, post inflammationem in Intestino exortam, penitus evanescebant; scilicet metastasi acrimie humorum à capite ad inferiora & imprimis Intestinum rectum facta. De quibus vide I. Stephanum Rodericum Cæstlem in libello. *Quæ ex quibus, dicto, cum primis libri 2. cap. 3. &c. pulcre & docte dissertent. Simonis Schulzii.*

De oste maxilla Rhombi piscis ex intestino viri alicujus extracto.

Jacobus Joosten, vir mediæ ætatis, dolore sensim aucto, afflictebatur circa intestini recti extremum, cum suppressione alvi & febris gravissima, pluvibus, hinc inde ministratis, frustra utaripar, quod hæmorrhoidibus internis ipsum vexari persuaderent alii, nos advocari voluit.

Accedentes, in parte ipsam, quam doloris, summi subjeptione dicebat, nec inflammationis, nec tumoris indicia ulla observabamus, ne, in te licet incerta, nihil egisse videremur, linimentum hoc præscripsimus.

℞. Unguent. popul. rosac. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. neli rapurum $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. M. F. linimentum.

Nihil hujus usu effecimus; quod excretio alvina tarda valde atque molesta, immo materiæ purulentiæ cui pusillum plurimum commixtum, hoc enema injecti curavimus, ad doloris mitigationem valde convenientis.

℞. Decoct. emollient. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. neli mncag. amygdal. dulc. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. unguent. popul. mell. rosac. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. M. F. Clyster.

Podici applicatum hoc cataplasma.

℞. Muc. panis albi, farin. hord. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}$. mucagin. cydonior. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. unguent. popul. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. eroc. Britann. gr. $\mathfrak{x}\mathfrak{x}\mathfrak{i}$. vitell. ovi num. 1. M. F. Cataplasma.

Tantum hæc profuerunt, quantum profuissent si quidem pulveriati fuissent applicata: Febris inextincta, dolor, vigilieque, hinc quætele, magis magisque increscebant. Pharmacopœi servus qui applicaverat Enema, aliquod corpus durum occurrisset sibi, ubi fistulam atre imponere laborabat, per quam injiciendus clyster, referebat; hoc audito necessarium duximus dicto in anum immisso an aliquid loco in bæreret aut præternaturalis quedam confitatio intestini recti adesset, explorare; quamprimum digitus in anum immittitur occurrebat substantia illa dura, cujus mentionem fecerat pharmacopœus, hæc extracta mandibula erat piscis illius quem Belgæ vocant Eenschnel, benehi sub branchia hærens; eam ante oculos se avidius pisces tales comederunt deglutisse, ære auctorum jam memini, referebat æger, immo cum digitum ventriculi, intestinumque gestasse.

Ablato hoc ossiculo (quæ abluin non sine dolore peragebatur, eo quod transversum non solum suum obineret, sed & utrinque lateribus intestini firmiter inhaereret, unde symptomata dicta exorta) illico symptomata omnia remiserunt, febris scilicet, dolor, excretionis alvine suppressio, vigilie continuæ, somnus contra inducitur placidus.

Pæci affectu applicavimus turundam melle rosac. cui Aloes aliquid mixtum, immixtam. Ex in-

tegre convalevit.

Similis fere casus occurrit aliquando Medicis hujus loci celeberrimo Dn. Arnoldo Tholin, niti quod hic intestini recti circa plicatam exulceratio accederet, & Chirurgus frustulatum, duas scilicet in partes forficis ope divisum ossiculum, extrahere coactus fuerit.

Graviter obvenit ægotanti illi, qui referente nobis Collega nostro Dn. Daniele Flariano, curæ Rogerii Bernardi olim Notocomiti chirurgi ordinarii subfuit, in quo ossiculum simile, gravissimum cum dolore, per lumborum inferiora, ulcere intercedente magno, prodibat. *Joh. à Meerkem in Observat. Medico-Chirurgicis.*

De intestini tenuis vulnere.

Anno 1678. Vir nobilis viragis & robustus, annos circiter natus 31, cum Galli & Lotharingi, aliquandiu exilibus contra invicem agerent, gravi vulnere gladii punctum ictus, ex illorum exercitio, ad nos adveetus fuit, ut pristinae sanitati restitueretur, sedulam hunc ob finem operam ipsi locante chirurgo solerti Claudio Passavantio: deinde ad ampliato transierit vulnere; quod admodum angustioris primum fuit, in abdominis cavum illud vergente deprehensum fuit, medicamentisque hac congentibus illi prospectum: mox suspicium de intestini tenuis læsione Medicorum Chirurgorumque, quos ad ejusmodi vulnere spectaculum ille invitavit, animis inhærerere cepit, nec fessellit eventus, subsequenter enim quoties fere vulnus denudabat, materia chylosa evidentissime profluxit, & in intestinis vel phlogosolici conspicui poterat, adeo ut una de vasculis lactei punctura, chylis puro ita exillante, indicia certissimè depromere poterimus. Instructa exadissima dieta, quæ ægotus ipse peiorum symptomatum adventum elusit, & adhibitis vulnerariis convenientibus, singula feliciter celsent. *Joh. Jacob Harderus Observationum Anatomico-Prælicarum libro.*

Intestini à lumbricis perforatio cum tumore substans in inguine dextro.

Vir 50. & quod excurrit auctorum, *Gaus & incolatus*, uti sibi quidam videbatur, d. 11. Aug. 1683. cum tota d. stenue desudasset in vineis, domum rediit de avocissimis torminibus ventris conquisit, quæ exceptis illis honor & calor inguinisque tumescencia, paulatim ita adauca, ut femoris partem anteriorem & superiorem maxime occuparet tumor, qui primum renitebatur, aliquot autem dierum spatio, instat vesicæ humore distenta sua sponte ruptus fuit, ichoremque primum subarum, hinc viridem, & deinceps purulentum, i. magis faculentum copiose fudit, transudante primum sero tenui glandularum, mox hinc vis magis aperta, una materia faculenta: materia quoque saniosa inter muscularum femoris intestina collecta, illa pressa acervatim erupit: acerbissimum Chirurgus illius loci, medicamentis putredini resistentibus ac detegentibus sedulo pognavit, nostram autem mox implorare jussit operam: Vocari d. 25. ejusd. sub vesp. mali faciem inveni sumus, quam laris horridam deprehendimus: ex inguine dextro, poro scrotorum, materia faculenta, ubi tantillum premebamus, tenuis & graveolens, penulit, recutitque laris

Chirurgus, ex eodem aucto (quod vulnus dilatatum satis non erat) triduo ante lumbricos (ex se extraxit: pridie etiam cum uvæ comedisset ægrotus, femina earum per foramen dictum excrevisse, atque ab hoc tempore feces per alvum deiecit amplius: nec minus femoris interiora à massa terpenæ fuerunt erosa, foraminibus sinuosis hioc inde conspicuis: Facta incisione scrotum versus, ut mali exitus pateret magis, feces liquide, cum sibilò & strepito ex intestino evidenter protumbebant, hisque perforationem labii vulneris sensum tremoris, postridie magis patulam fore prædiximus, Interim seq. usum præcepimus: Chirurgus sex de die vulnus calidiuscule lavet cremore & sero lactis capilli, cui immista sint sanguis, dracoen. subtiliss. & myrrha cum melle, inde balsam. vulnerat., quod præscriptum, moderato caloris gradu vulnere infundit: plimacellisque eodem ferociter intestinum obmunit pro viribus: ægrotus autem singulis diebus m. hauriat cyst. lact. capilli, cui fânacula consol. farac. veron. & alchimi. fuerint incocta: borula v. post ut & sub 4. vespertin. dosim capessat pulv. vulnerat. ex radic. lymph. si. hyperic. corall. sang. dracoen. v. &c. paratum: Extractum quoque veron. cum sanguine, dracoen. in pilul. concinnatum sæpius exhibuimus. Postridie nuxietati fuisse Chirurgus vulnus jam magis patere, & post discessum meum sub vesp. lumbricis denno se extraxisse: triduo post cum ægrotum inviseremus, satis bene habebat, appetitus constabat, non nauseabundus erat, nec siticulosus, polius blandus & æqualis, feces etiam per alvum jam excrebantur, ac non diu subsisterent ista, quæ pristina. symptomata ingruerent, ægerque viribus fractis lenta morte consummeteretur.

Notatur dignissimum est Venerandi Hippocratis l. VI. Apborism. 18. & 24. eorum: αἷμα διακρίνεται ἐν τῷ σπλάχνῳ, ὃ καλεῖται ὁ σπλῆν, ὃ ἐστὶν τὸ πλάττω, ὃ ἵμαξ διακρίνεται: item ἐν τῷ σπλάχνῳ τὰ λευκὰ ὡς ἐν τῷ σπλάχνῳ quæ ipsa confirmat Coac. 509. istius modum autem periculum imminet, non modo quod intestina renuunt membranas partes sunt, & nervæ sensilæ, quæ facile non consolidentur, sed subsequenteribus gravissimis symptomata necent, verum quia cum vasti sanguiferi renuunt copiose instillant sunt, quibus hinc à vulnere profundiore læsio, hæmorrhagia nociva succedit, tum etiam ob mortum peritæticum, cui ob chylī absorptionem splenickæ vacante, latera vulneris difficiliter agglutinantur; enim vero uti beneficium succi nutritii, five particularum balsamicarum agglutinabilium, seu balsamo quodam parte separatæ rennuntur, ita vicissim mora & quies patientem ad isthoc operis feliciter perficiendam requiritur, ne dictæ nutritiæ particulæ distrahantur & in cavum inaniter effundantur: atque hoc esse porgit, cum vulnera crassorum intestinorum ita periculosa non sint, curamque facilius forte admittant, crassiore eorum substantia non rejecta: nec enim ea vasorum corpora est, neque etiam iuxta illi ipsorum morus, non nisi facibus blande versus anum protrudendis emancipata, cum contra illa non solum sursum deorsumque officio suo defungi necesse habeant, illis aliquando feriantibus: Docet nihilominus experientia, vulnera renuunt leviora, fuisse curata, idque ipsum historia prior confirmat, quæ vasculi lactei puncturam simul commovent: graviora certe hæmorrhagiæ, aliorumque symptomatum, de quibus fr. histor. altera) absente vulnus ibi superscissuram magis fuisse persudant: Excellentiss. vero Patritius Anni 1. Dec. 1. Ephremid. Observ. 20. meminit Dominici Simeonis Patavini à vulnere inte-

stin. li. globulo sclopeti indicto peritæticissimo feliciter liberari, solent quoque in gravioribus vulneribus, aliqui ipsorum infundere, istisque intestini separata ad invicem adducere: commodum autem ista non semper succedit: attamen si de corpore & massa præprimis humoralis iudicet, atque intestinali crassi robore certi fuisset, ejusmodi quid in quinquagenario nostro renasceretur, contrarium verò nobis raciei colore, copiosis lumbricis &c. imperantibus, remedium istud reluctanter adhibentibus ultro adhibere noluimus: Felicitior isthoc fuit Muliercula, cujus mentionem facit Clariss. D. D. Harsbæri, Societ. nostr. Rhæsi, cui post atroces cruciatus ex aperto in inguine tumore, lumbrici duodecim prodire, & quamvis adfectum non sit utrum ex intestino perforato promerperint, tormina nihilominus & abdominis cruciatus, de istius labe satis cessari posse videntur: quandoque etiam labia vulneris exteriori clauduntur, interiora necdum consolidantur, indeque fusello cum extr. tumore crudelissime: interdum ex tumore in inguine suppurato, & materiæ acrimonia, nlcus fistulosus lubnascitur, cujusmodi historiam hæc inferere operæ pretium faciemus, puella 14. annor. cluciet, quam cum B. m. Glæro in uototropio sapius invisimus, adhuc in tyrocinio constituit, tumore in inguine dextro vexata, ex materiæ suppurantis acrimonia, tandem ulcus fistulosum incurrit: cum totius corporis cachexia & emaciatione paulatim: plurima tum in usum vocata fuere remedia vulneraria, anæthetica & anæstetia, sed in cassum: sæpius quoque de intestinali crassi erosione (quod materia effluens gravi fœtore nates fœtebat) præfat. Viri Celeberr. Chirurgo ordinatio verba fecit, quia solum feces ejusmodi, nec semper nec eque distinctæ videbantur, illa indecisa pestifera, donec rore vitali profus absorptis, ac spiritibus extinctis, ægra inret vivos effe delit: sectioni, cum ob a gotia urgentiora Beatiss. Præceptor nostræ adesse non posset, aliquor nostram, à quibus Excellentiss. D. D. Matthæum Harderum nominamus Amicum honorariss. cum Chirurgo vacante, deprehendimusque præter viscum omnium labem ac corruptelam, intestinum dictum, rapte erosum, effluente simili, cum premeretur, materiâ, quam cum viveret miscella, nlcus reddidit, Non raro etiam Bubonocèle, ejusmodi sub tumoris in inguine specie occulatur, cujusmodi in ancilla quidam vetula notavit impo laudatus Sponius, quæ præ pudore affectum diutius celans, cum tandem Chirurgo communicavit, quæ hinc Bubonem præsto esse ratus, suppurantia imperite adhibuit, locumque paucis post diebus impudentius scilpello aperuit, unde ichores & effusa alvine uberim primo eruperant, ægræque paucis intra dies, superveniente necrosi, & vivæ crepta fuit: ejusdem, si non graviori mali, sed felici successu curari historiam nobis aliquando perscripsit Excellentiss. Horriferas Medic. Tugurios, veteri amicitia junctissimas quam ipsiusmet verbis hæc commemorabimus: Dignum, inquit, nuper levaret latendi in curam Viri vel pro deceptato relinquendi: uti chartas Obstitina aliis jobberet, hic cum aurotus 56. herniâ à multis annis affligeretur, curam palliatis certiorum, magno suo damno non admisi, sed apud artificem de tumore inguinali conquectus est, qui sive ex imperitia de tumore inguinali conquectus est, qui sive ex imperitia de remoris specie minus sollicitus, hunc pro raro habuit, & tanquam materiam bubonem traxerat, medicamentaque emollientia lacti incocta impostis, ex quo tumor cum intestino ipse

se contento, vi medicamentorum ad putredinem & subsequenterem ragnem tendebat: Ego omnino ignarus & abieci, unico rogatus de remedio sitim sedaturo, pro more iudicium consueque suscepi, donec mentione facta tumoris & singulis observari, non sive Dei providentia pejora suspicatus sum, atque ~~braviter~~ ^{braviter} aliquam ab hernia occidendam subirequi posse & periculum in mora esse dixi, ac ~~interfieri~~ ^{interfieri} cum manu petiti Chirurghi hoc requiri summo pete: Chirurgo viam inuenta & ægrum jam invulnente, gravissima comperimus, non vix tantum, sed etiam obliato: partes interiores portefactæ à sanis protenus erant libere: partes adhuc sine à contagio vindicande ac defendende, cum jam colon ipsum in hoc iocundiam coaptaverit, putredine infectum eatens, ut per hujus aperturam ex inguine, crassiora alvi excrementa, neque per unam, neque per duas solas hebdomadas fuerit excreta: & tamen tota hæc mali dicta tragedia tam felici cursu absoluta est, ut post sex septimanarum intervallum, sapientia fuerit reducta, sine fistula vel alio incommodo post relicto: hæc ille. *Idem ibidem.*

Interioris intestinorum tunica ejectione.

*Clariss. Godefridi Thomasi Miscell. Curiosæ.
Detur. iij. Ann. 3.*

Cum una jam atque altera in hoc Ephemeridum volumine comprehensa habeatur Observatio de intima fistula intestinalis tunica frustillatim una cum sordibus extremeoritis egesta, visum fuit Eac. Vito, qui Directorem in Academia nostra munus summam cum laude sustinet, haud incongruum fore, si quæ mihi de hac ipsa te ante annos duos, & quod excurrit, comperita fuisset, compendio hec enarrarem. Cujus, conjunctissimi Collegæ, Amicique plurimum merito suo æstimatissimi monitis obtemperare, uti ius ipsam atque hæc postulat, ita veniam mihi ab lecturis spondet scriptoris subitæ & ob festinationem nulli limæ expolire. Mulier plebica quinquagenarium ætate, cum vixit à victu satis tenet neque salubri malis fuisset coactata, tum in primis perinatæ alvi obstructions ferebat molestias, quod cætera inde exasperat; hæc ~~inter~~ ^{inter} viderentur. Cui malo ut remedium quæreret, pilulas dejectionis devorat, nescio unde acceptas, quarum reliquias cum mihi post ostenderet, apparebat ex affixo capsulæ titulo pilulas, Opiliones apud nos dictas, fuisse, quæ ex metis purgacibus studiis constantes optimum præbent robustioribus & biliosa imprimis colluvie divexatis catharticum, quod ad grana præter propter duodecim assumptam magni vi per intestum gurgit extortit noxias sordes. Illa igitur abs eorum usu dejectiones habuerat ex voto & expectatione crebris nec ab hypercatharsi multum abluentes; aut remanebant post eas turbas utcumque sopitas tormina atrocissima, quæ & lancinarent continue intestina, maxime circa umbilici regionem, & caloris atque æstuationis intensissimæ sensu missellam nostram dique divexarent. Meam igitur sibi opem expetere, quam paregoricis tam æternis quam incertis, & acrimoniam aliis infamem demulcentibus ad artis normam exhibere, unde non-

nah! quidem solati, pleni jam auxiliis nequidquam se fuisse expertum referrebat: donec post aliquot hebdomadarum intervallum, nescio quas à se membraas varie convolutas & in copia inter desiderandum, non sine molestia externi ciamit, cum toxicissimo quasi glutini sint immecta, & partim quidem intestini in minora frustula disceptis videantur similes, partim pelliculæ crassiores ac magis extense præ se ferant speciem. Monita ut ejectiones adeo mitas servaret coloris, ac ad me defecet prohibe lites mudatasque à sordium adhaerentium purgamentis, parer sine tergiversatione, atque altero mane bina pellicularum histosarum ac spissarum laris frusta, quæ præterea oede exulcerat, offert mihi miranti & attonito. Erant enim quinque pollicum, & ultra, longitudine, hinc admodum pollices lata, & in extremitate subinde atro colore notata, ut de summa, quæ his corrosiones fuerit, acrimonia coactare posset saria. Eas ego membranaceas formas Museo Würsbaimiano, laudatissimi nostri Directoris dedicati, quod & natas & artis mirabilium copiam in se continet, ac selectum mihi adspiciendum. Mulierem ipsam jubeo esse bono animo, brevi enim futurum, ut climasias, quæ ab acre infesto exelæ secesserint, tunice intestina Interius loccigenis particulis proxima salubris spes affulget, sublevis torminum distillorum causis, novæque adeo tunica in corruptæ locum exerceat. Petinde enim uti exterior hominis atque animalium pelvis, sive abscissu separata, sive resecta culestro, promptè satis repullulat denud, ita ocl seroti horum omnem maligni ac virosi acoris vi consumptam viderimus, & Chirurghi fortiter resectam, testiculis prolixius nudis miserabili sane habito propendens, qui tamen mox perfunato malo nova pelle fuisse vestiti, ut nullos hac in parte defectus agnosceret, eodem pariter modo in membranis, quæ corporis cavitates succingunt Interius res habere videntur, cum plura proleste passim exempla oeritiam minus quam hoc, quod modo recensuimus, miranda, & in dysenteria compressa atrociori pelliculatum tenuiorum ex intestinis abscedentium speciem videri restat, quibus commodum est laureolas in hoc etiam quætere mustaceo. Prædicti eventus respondit perquam salubris atque exoptatus, nulla eorum alia posthac usa mulier præsidis, ossi spernate ceteri in lætis calentis haustu propinato, decoctisque cicorum, nonnumquam aut pilorum adhaerens, & ballamo Saccharo Peruviano pulveribus acidum alborhentibus atque utemperantibus immixto, de die in diem mellius habere visa est, donec dejectionibus membranacea sensim immineat, sopitisque torminum & lancinatiois doloribus, pristina restitueretur sanitati ad hoc usque tempus quo hæc scribo, vegeta atque incolumis, orque quidquam amplius morbi aut gravioris mali experta. Ejecta memora, sive ita quis consideret oculis curiosioribus, facile videbit esse membranz interioris intestinum particulam, quæ tota rugas suas recepto ac asservato diutius humore acti, secesserunt deoque non sine exquisitissimi doloris sensu. Cujus autem intestini fuerint soboles, hæc obscurum est perspectu is, quibus notus est intersarcum situs, quique ex ante dictis cognoverint dolores maxime circa umbilicum graves poss-

hac ad sinistram hypochondriam tendit in declinatione affectus gravissimi.

Graviores intestinelorum perforationes sponte naturâ chræle.

Clariss. Alardi Mauriti Eggerdes. Miscell. Curios. Decur. iij. Ann. 4.

Intestinelorum perforationes, læsioneshue etiam graviores, non omnes, neque semper lethales esse præter superius enarratam historiam, sequentes casus demonstrant. Rusticus in Patria Luxemburgensi post ingentem ætatorum unâ cum uelleis devoratum copiam, in alvum tam adstrictam incidit, ut nullo eam negotio resolvere posset. Et cum ex ære nullum superetè videretur subsidium, illud natura suppeditavit. Nuclei enim isti, hospiti sui petrii exarum sibi inde quiescentes, abdomen in inguine dextro perforarunt, atque uno impetu quâ dâ portâ proruperunt: Foramen à Lapillorum egressu sponte sua coaleuit, neque ullum inde rusticum remansit incommodum. Anno reparatæ salutis 1682. fequeros casus Paduâ Romam, ad congestum Medicum, apud D. Brassavolam sub protectione Regiæ Sueciæ haberi solum examinandum mittebatur. Homo fortis mediocritatis postquam Paduâ bene jentasset, rus retendit; medio itinere ex insidiis bombardulâ impetitur, & globus non procul ab umbilico abdomen penetrat, non autem transit, susciatus ad Chirurgum deferretur, qui vulnus stylo explorat, globi autem nulla sentit vestigia, vulnere deligato patientem quieti & dietæ committit; De ab hinc tertio infirmus ad sedem cogitur, globumque unâ cum excrementis egerit, ac brevi dein convalescit. Post varias super hunc casum agitatae quæstiones, tandem hæc placebat resolutio, scopetum quo globus fuit jactus, erat parvum, ideoque ad transfodiendum non satis efficax, instrumentum lœdens fuit globus rotundus, qui postquam abdomen transiit, allisic ad intestinum excrementis fissoribus resectum, illudque coopertante leni fasciam resistens non disrupit, sed fibras & foveiculos ejusdem nervos à se invicem disjungendo in illud penetravit, tandemque in crassioribus excrementis quiescit, ac demum cum his per anum exit, fibra interion seie iterum contrahentibus, factumque foramen absque sanitatis dispendio occludentibus.

Intestini tenuis pars per anum exclusa.

Clariss. Georgii Franti de Frankenau, Miscell. Curios. Decur. iij. Ann. 5. & 6.

Nihil tam absurdum, quod Corpori non eveniat humano. In solidorum fluidorumque texturis tanta est varietas, ut nemo, nec assequi, nec recensere omnia possit, ut loquatur Illustri, deque re Medica optimè meritis D. Joh. Nicol. Pecklinus Observ. Phys. Med. lib. II. Obs. 32. mirabilem ibidem corporis tremorem in rustico Hol-

sato eleganter exprimens. Et quis est, qui natus, nova quotidie enata prodigia vel edtos calys mirabiles non suis à tot seculorum decursu, qui curiole rerum Naturæ scrutatori non præterit faciem, ad penetrandum facilius in abstrusos ejus recessus, nil plucum insensibilis vel malitiosius illis omnibus carere jam & succedere debet possentat. Idem & ego facillè de funesto nupt non minis quàm mirabili casu sentite potuissim, quando domesticorum noticiâ vel conscientia potius tempessivè accitus, ubi agebatur illud novum & quasi absurdum, simul eam prælaudat D. D. Wagnero non infiori ejus phænomeni me constituissim & testem & spectatorem; singulari enim videre erat prodigiosè, per consuetam faciem alvinam portam modo integram tenuis intestini partem spithamæ longitudine & ultra cum autem mesenterio adhuc portione manifestè satis conspicuâ, acerbis inter infimi ventris dolores & multas fides cruentas, ita ut animo lingueretur atque exolveretur æget penitus, ejus & supremus vitz terminus paulo post eadem die 22. Augusti noctu appropinquavit. Suspiciam autem non immerito licet explicatum seu Valsularum consentientium Anatomicis dictarum, præsentia, quas obtinebat intus materia subdava, tenax, quasi testaceâ ibidem exhibitis purgantibus Gummi Gutti (de quo mox acturi) splenderent particula, fuisse resectam intestini jejuni partem illam qua tenditur in ileum. Ordinariè intestinum quiescit hoc cæteris paulo rubundius, ob vasorum sanguineorum copiam apparere solet, tale tamen nunc non extitit, fortè quod æget in sella multum ante sanguinis perdiderit jam, vel alio modo intra corpus exhaustus fuerit. Contra unicâ intestini illius aligricantes & sublivæ magis vitz, non corruptæ vel etosæ, sed unitæ adhuc; solutus intestinelorum mucus interior sive villosa crassa aberat, alterum saltem principium, ubi læperum vi ioterna censabamus, valde tenue, divisum & disseptum videbatur. Ita verò accididit tristitem hunc in viro juvene, quippe 26. tantum ætatis, exitum, dum sponsalia contrahere meditabatur, certo compert. Laborat in quatuordecim prope modum diebus febre continua, non admodum sensibili, contumaci alvi obstruione & doloribus moleis colicis, siti &c. an vizio Dietæ, an alio modo contractum fuerit hoc malum ignoro: Ingravescente morbo iudica, Medicum præterentes, anum Medicastrum consulunt; quod genus hominum, uti aliis, nunquam otiosum esse solet, ita statim operosum se exhibuit, catharticum ex officina petendo, cujus non minima basis fuerat Gummi Gortæ, pharmacum potenter hydropicorum aquas evacuant, & colicis doloribus maximè adversum, isti principis morbi syndrome, tantum ut ipse in malum cacaret æget, pessimè sanitati suæ consulens. Quemadmodum verò malum consistori pessimam esse solet, teste Hippocrate, & et eo Galieno, ita & hic meotiri potuit minimè regula, nam dato uno absurdo pharmaco, absurdi plures & periculosiores tabsecuti sunt errores. Alvus bit, (ut sicut) commota torrens & dolentis, simul vomitiones continuas, biliosas enomous accersivit, vitæ & vites in presentissimum adducentes periculum.

Nunc demum Medica implorabatur manus, ubi vites omnes artitæ resque venturæ in angulo,

ut citissime ferret opem, morusque illos intestinos & hypercathartes cohiberet; sed nimis sero Medicina parabat; agendo enim auctor omnem Medici eludebat spem & operam, cum vitam postero die cum morte commicaret, postquam paucis ante obitum horis, dolore Epigastrii immensi, sedibus copiosis cruentis, & cum iis abscedente intestini tenuia simul patre, affligeretur, unde jam se mori liberatum ita clamaret, sed frustra, nam superveniens gravissimum animi deliquium, optimi sanguinis & nativi caloris perditio cum moribus convulsivis paulum vitæ imposuit.

Jam quæret fortasse quispiam, nec sine ratione, quomodo tam notabilem intestini tenuioris rupturam vel sectionem facere posset natura in corpore? quomodo, quod magis adhuc suspicio & admiror, factam talem sectionem foliæ panis in alvum demittere, ut per alteram superstitem intestini in corpore oram resorberet und cum sanguine & dela per ordinatum locum excludi posset? Quod cum affirmare omnino quidem asum, quarena io le verum est, modum tamen ejus mirabilem invenire, aut evidentiores circa hunc expocete causas prohibere, donec accuratior accedat Intestorum perulsiatio & cadaveria appetura, quam multa etiam precibus impetare à sponâ & agnatia non potuimus; ad sepulturam igitur oculis properant, antequam ad Magistram vel publicum impiæ hæ defecerant cæca, felicia prius quæ Veterinarum fraudes existimantes, quod adversos harum casus tellus, oblitio hominum & taciurnitas tegat.

Intestinum Ileum innoxie ulceribus perforatum.

*Clariss. Reinoldi Wagneri. Miscell. Curios.
Decur. iij. Ann. 3. & 6.*

Intestiorum tenuium vulnera esse lethalia: non tantum Hippocratis Sect. 6. Aph. 18. & 24. sed & C. Cris. Lib. 5. cap. 26. & Lib. 17. cap. 16. Galen. Lib. 6. de Meth. Med. 4. alioquinque veterum est sententia. Atque cum hæ humani corporis partes sint tenuissimæ, minusquo carnes; præterea, cum moto peristaltico perpetuo exercantur, vulneraque chylum necessariò effundant, facillimè inflammantur, vique remedium toplicorum admittant applicationem, minus non est ut ejusmodi læsiones committet sint incurabiles atque letales. Nihilò secius tamen, non tantum vulnera, sed & ulcera ejusmodi nonnumquam esse sanabilia exempla subinde restantur. Sic Intestinum Ileum culti stricturæ læsum per artificiosam suturam restitutum commemorant Ephem. Germ. Nat. Carlos. Dec. I. Ano. 3. Obf. 176. Item *Glandorp* Obf. 32. Ileum quoque, istu transverse dissectum, & extra vulnus prolapsum, intercedente tandem suturâ cum vulnere conglutinatam refert *Blegny* *Zodica* Med. Gall. Ann. 2. Obf. 4. M. Junii. Ita & de Intestiorum tenuium à lumbicis perforatorum curatione conferant Ephem. Germ. Nat. Carlos. Dec. I. Ann. I. Obf. 145. p. 321. & Dec. II. An. V. Obf. 45. p. 87. &c. Item *Blegny* Ann. I. l. c. Nec hæc, nec alla Intestiorum gracilium ulcera absolute lethalia & incurabilia pronuntianda esse, ois vel majora fue-

sint, vel cum vasorum inguinum læsione coarctata, unâ atque alterâ Historiâ nuper edoctus, culculum adpicio. Nimirum, mulier quædam quinquagena, in oppido Kôge in Seelandia, quatuor lapidibus à Metropoli Regiâ Hafniâ: dolores in sinistra pubis regione, eodemque in loco abscessu inguinali corripiebat; ex quo d. c. die sua sponte rupto, cum Chirurgis ejusdem loci Dn. Fischer lumbicorum unum atque alterum produsse audiret, ipseque unâ cum ingenti quantitate materiz purulente & foetidissimæ, æstissima alimenta paulo ante assumpta, cræda partim & semicræda, imprimis anisî semina integra prodire animadverteret, consilium meum petiit. Ego verò animum haud abiciendum, quin potius remedia balsamica & astringentia adhibenda hasi; aque factum, ut solius essentia Myrtæ, & alterius quandoque Elizii P. P. dulcia externo & interno usû, cibi magis digesti prodirent, sicque ulcere debito modo mundificato ægra pristina sanari, auxiliante Deo; fuerit restituta. Simili abscessi in Regiâ hac Hafniensi, Lanionis uxor sexagenaria, quæ ultra octennium Omphalocolem, tandemque diuturnam & pertinacem alvi sustinuerat obstipationem, laborabat. Hic abscessus circa regionem umbilicalem sinistram sphecelatus, foramine thaleri magnitudine abdomen perforabat; ubi non tantum copiosum & foetidissimum pus, sed & varia alimenta varique semina effluere; imprimis autem memorabile, quod e. g. carvi semina sub iocæra, dimidiatum verò concia multâ in copiâ è vulnere egredierentur, ægra intra duorum Mensium spatium, per solius D. E. I. gratiam similiter restituta. Hæc igitur cum dubitare non permitant de erosione & ulceratione intestini cuiusdam, quod ut visû deprehendi haud potuit, Ileum tamen affectum fuisse vero videtur simillimum. In priori enim Historiâ Ileum, lumbicorum illud domicilium, perforatum occasione dedisse Apollenæ inguinali, patet ex variâ *Manuâ Curatorum* observationibus. In posteriori verò Historiâ, idem Ileum ulcere læsum confirmant partim esculenta hævi è vulnere rejecta, partim sinus, partim quoque Anatomica sectio, quam Regiomonti Borussiae Patens Chirurgus Anno 1693. mecum instituit: In uxo enim Pellionia cupiscam Domnâ *Naberii* (simili omphalocole sphacelâ defunctâ) lumbicorum Ileum in ipso hoc loco herniæ affecto sacculum ostendebat; in cujus cavitate pugni magnitudine tria vel quatuor prunorum diametrorum reperiebantur putamina integra, quibus diffundia nuclei crant omnino carioli atque foetidi. Atque adstantes bona fide affirmabant, defunctam jam ultra trium Mensium spatium pruna deglutisse integra. Quod verò talis præternaturalis quandoque in Ileo status contingat, nuperitimum quoque monstrum biceps in agro Hafniensi editum, confirmavit, quod prioris Anni Mente Aug. à Consiliario & Archiatro Regio, Illustri Domno *D. Georgio Franks de Frankem*, cultro anatomico subiectum, copiosum Crura utricularem intestini Ile, exhibuit sacculum; hujus verò Anatomico prolixiore & eruditiori tempepe Eruditis Orbis propediem expectabit.

Inestinalis tunica abscessus glandulosus.

*Clariss. Joh. Ludovici Apini. Miscell. Curios.
Decur. iij. Ann. 9. & 10.*

Vix annorum quadraginta novem, temperamenti Sanguineo-cholelici, castra à prima juventute secutus, & Locumtenentis officio functus in turma Equitum Cataphractorum, sanus aliis & incolomis, laborum tolerans, sine dubio ob mutatum vitæ genus, quod olim in Hungaria, Rascia, Danubii Rhenique tractibus fuit occupatissimum, cum temporis autem, feriente Bellona, desidiosum erat & ignavum, accedente etiam victu crudiore & viliori, paulatim capite floridam faciem colorem amittere, oculisque cavos ac truces ostendere vulnere, qui mihi juxta ac alitis suspectus erat. Sed ut robore natate pollebat, ita nil opia flagitavit, donec d. 5. Februarii, 1699. rigore vehementissimo & omnimoda vitium prostratione corripitur, ita ut d. 6. summo mane vocatus, valde debilem & velut à se ipso mutatum deprehenderim. Non ambigebam ea pægresso rigore & subsequente caloris intensiore gradu, ledere acuta continas laborare ægrotum. Igitur ex methodo mihi familiari seq. præscripti Mixturam.

R. Aq. flor. sambuc. cortic. antisebe. n. ana ʒʒ. aceti thelac. ʒʒ. Ext. antisebe. n. ʒj. Ther bezour. ʒj. sirup. de cort. citr. ʒʒ. Hinc sudor erupit, quamvis non sine anæstetate, & peractio sudoris levis quædam intercurrente animi deliquia, cujus gratia seq. Epithemate ad pulsus & tempora fuimus usi.

R. Spic. Vin. camphor. aceti turac. aq. carbunc. ana ʒj. Jactabat etiam ob caloris vehementiam hinc inde corpus & haud raro per axillam dextram puncturas acutissimas transire sentiebat, ut universum corpus veluti terrore aut Epileptico insultu comprehensum elevaretur in altum, hincque facile colligerem, oculorum quid subesse.

Consumpta horis antemidianis Mixture Antisebeili in eundem scopum Pilule seq. præscripser. R. Ext. antisebe. ʒʒ. Camphor. ʒʒ. cum f. q. Ext. Myrb. f. Pilul. Numeto X L. D. S. Ad 4. Sweden ʒ. Sweden nehmur, sumat ʒ. singulis quatuor horis.

Hinc tamen ea voto ceti alius solent, æget haud sudavit, alvus verò bis solvitur, quæ qualis fuerit, nemo observavit. A meridie igitur horæ sextæ, cum sudor non satis responderet, dedi ʒj. salis coajdam Antimonialis bezoardici, ut ipore quo difficles ad sudandum plerumque solco à Naturæ reddere. Nec eventus felellit, sudavit enim copiose. Horæ nonâ nocturnâ jussu deinceps binas assumere pilulas à jam memoratis, quæ sine operoso regimine facilem moventur sudorem. Hoc ipso verò mane multo melius habebat æget, postquam ostendens vegetiorem cum habitu & vultu plenior ac rubicundo. Horâ septimâ matutinâ pilulæ binæ iterum præbentur unde jam, solutâ semel biliaris extensâ stricturâ & æqualiter circulante Massa humoralis, largiret sudor. Interim bene spiritibus, dolorem neque ventris neque pectoris querebatur, nullâ tussis vexabatur, & tamen caput post levem foremum sputum viscidum cruore tinctum, latericiam æveta, exspueret ac ejicere sine laboriosa commotione, sine ulla tussis, quasi sponte lo veluti per ebullitionem in os ejundaret & assurgeret. Vo-

micam proin alicubi in pectore rupeam non debuerat, & proin pectoralis Antisebeilibus tenuiori seq. in modum.

R. Aq. Cort. antisebe. n. Chetefol. an. ʒij. Ext. Antisebe. gr. X. bull. Sulph. anis. gr. ij. Sirup. floz. pap. etrat. ʒij. laud. eydon. gr. ʒ. M.

Hujus Mixturæ dimidium horâ nonâ nocturnâ dedimus, tervantes reliquum in crastini aurore. Nox superstitibus quietior. D. 18. 99. æget, quam aliis pacatior, jamque ad sudorem perfacilis, multum adhuc ipseus viscosi phlegmatici sanguine tincti. Mixture consumit pilulas pectorales & sinu Antipyreticæ seq. præscripser.

R. Succ. Lquit. depur. Ext. antisebe. n. ana ʒʒ. laud. eydon. gr. ʒ. f. l. q. Eff. antisebe. F. Pil. num. LX. D. S. Alle 6. Sund 10. Zu nehm. sumat 10. singulis sex horis.

Sub vesperam etiam Mixturem pectoralem terventem eadem ordinavimus.

R. Aq. Veron. Scabios. an. ʒj. cinam. aceti distillar. an. ʒʒ. sang. hircin. pp. Ocul. Cancro. ppt. ana ʒj. Sic. fl. pap. etrat. D. S. Alle Sund ein Löffel. vel Zu nehm. sumat singulis horis cochlear unum.

Hæc eo sumebantur successu, ut cum phlegmate sanguinolento nunc, etiam pus rejectetur. Potus ordinarius erat ex speciebus pectoralibus. Herb. Chetefol. fl. papav. etrat. & rad. lapp. maj. D. ʒ. continuetur expectatorio mixti cum pure cruenti ipsi incedibili copul, paulatimque tussis nunc accedit & ingruere, quasi ex profundo majori conatu exantila esset ipsi materia. Pergitur in lilem. Nux autem valde inquietâ ob collium perpetuam urgentem, cojis irrequieta sollicitatione d. 10. mane particula quardam membranacea spato rejecta, aquæ, cui inficiebatur, lanatans. Omnia hæc Vomica & abscessus intra pulmones loquebantur. Secus tamen fuisse eventus docuit. Cum enim alvus nimio hoc triduo obstructa esset, & æget tensionem quandam in abdomine perciperet, Clyster ex metis emollientibus injicitur. Unde alvo soluta, pus statim & sanguis, seu materia illi, quæ rejectebatur, similis conspicietur. Sequuntur paulo post tormina & iterum alvi solutio, quam cum d. e. mane inspicere, inter eæmentes integras tunicas intestinales conspiciari sibi videbantur, ad quod spectaculum ego vocatus, sanctissime affirmare possum, integras tunicas intestinales, tubulosâ formâ exactissime præditas. Hæc mei manibus me tractasse, & super baculum rectem expansas assistentibus & ad rei novitatem concurrentibus vicinis monstrasse. Erant autem utraq; sine lacere, pure & sanguine conspersæ, alicubi etiam punctulis tubicundis notæ, quasi acutis fortissimè, longitudinis diversæ, ita ut portio quardam spirituum longitudinem æquaret. Accuratore inspectione ambigua, parut fuisse frusta tunice interioris glandulosæ, quam vulgo peristoma villosum dicunt, & Malpighius ex glandularum nervæ minæ tanquam basi insistentium ductibus pilosis excretoriis componi asserit. Ruysschius verò in Epistola Problematica XI. ostendit, nihil aliud esse quàm vasorum sanguiferorum extremos molliores sinus & fasciculos, inflat pensillorum dentium concipiendo, teclulo sanguine mucidiorum istem lympham & prolam intestinale transmittentes. Manifeste enim tuge illæ ac pilicæ, in tunica interiore aliis notabiles, conspiciendæ erant. Cla-

suz adscripserit arti. Nam & sic ai tū vixit inq̃
 sp̃igere. Est in ægro, dum alvi illo fluxu purulento
 laboraret, facies tertia Hippocratica, atque t̃
 præcipue Jorg̃i diaphana h̃m̃ilissima non aliter atque
 fluxus ardorem præ nimia succitate arentia. Aniquis
 tamen semper præsens, respiratio libera & pulsus
 sibi confusus. Unde calamitissima illa & para-
 ñd̃is mortis tamen significationem non habebant.
 Sunt enim illa prædicta minis graviora *lego*
And. eadem Hippocrate teste in *Prænot.* 11. versic.
 13. & 14. Si alvi excrementa valde liquida fuerint,
 nec quicquam celerit faciei vigorem tollit quam
 alvus concitator quod in Praxi versati non igno-
 rant.

*Intestini Coli portio abscessa minimè
 lethalis.*

*Clariss. Syll. Samuelis Anhornii. Ephemer.
 Germanic. Centur. 1. & 2.*

Crassiorum Intestinorum vulnera, quamvis passim
 occurrant apud Authores vel sponte nata, vel per
 suto am consolidata atque curata, Intestinum tamen
 per medium sectum, abscessu ejusdem portio-
 ne curam admisisse, Inter rationa meretur poni,
 quæ occurere possunt observationum monumenta.
 Cuius hic obitit in Joanne Kreschenbuchur, Tur-
 govii Urvilland, juvene æd. annorum. Hic An. 1694.
 morbo adhuc & corpore sanus, ex annone caritate
 f. mis miseriam expertus, elibano pistoris adlatus,
 & paniculum inibi relictum videns, jubentibus to-
 cis clam irrepsit, panem petiurus & stomachum
 intrantem placaturus, verum seu vapore seu forna-
 cis calore mor inibi obmoruit: diuturniore morâ
 perterritis circumstantes, vocato Pistori recto expo-
 nunt: hic sine morâ pedibus extractum frigida largi-
 git perfudit: ex quo morus convulsi totum
 corpus prehenderunt, in habitum exinde Caducus
 etiepit, & per paroxysmos modò semel, etiam bis
 de die miserum cunctis, interdum unius & dua-
 rum hebdomadam inducias concessit; pervertis tandem
 cerebrum postis fatulenter indidit. Die 16. Maii
 1700. per septimanæ spatium toras atrens cum su-
 tore fuit, nodus ubique ausugere potuit, excut-
 fitabar, & ne vim sibi inferret, cultodis debuit.
 Ex infirmitate venæ sectione placabilior factus de do-
 lore in latere hypochochdii sinistro magnas que-
 relas moveri, quem atrocius faventem paroxysmi Epi-
 lepsiæ prodromum expertus est; precibus non ta-
 rō insistit, ut sibi cultro venter aperiretur. Die
 Mercurii ante Festum Pentecostis Anno 1700. Cui
 hoc cum totâ casus historia consignatum mihi tra-
 dere placuit plurimum Reverendo loci Parocho,
 Dn. Joh. Henrico. Erni, (Tigurno) solus in hypo-
 chondrio relictus cultrum arripuit; ventrem, palmam
 sup̃ umbilicem, magno idu non modo perfudit,
 sed & portionem intestini trium circiter unciarum
 & vulnerè propendenter abscedit, & ceu quid actum
 sic celerrim infra mensam projecit, seque ad for-
 nacem proripuit. Patet interveniens conspecto cul-
 ero, deterius quid sibi illud ominarus, filii manu
 crenatas de ventre abripit, & rem arentius videt.
 Vocatus loci Chirurgus, Dn. Joh. Conrad
 Voigt, portione Intestini abscessu conspectâ mortis
 prognosticon tulit, & Cardiacis refocillato Pariente,
 utrumque intestini patrem ex vulnerè propen-
 dere permisit, donec de illa certus esset, per
 quam fortis exirent. Re suis exploratâ, post plu-

Abst. Chirurg. Tom. II.

rium dictum decursum, Inferius Intestinum in ventrem
 intravit. Superioria verò extenuitatem protè ob-
 servari jussit, ne simul ad interiora recederet, &
 excrementa in cavum abdominis deponerentur. Sic
 tandem illius benignæ conservatricis naturæ provi-
 dentia, nemine hoc per arem intendente factum
 est, ut extremitas intestini laucius cum vulneris
 officio coalesceret, & sexto jam anno tamquam
 ex podice equino expressis prius tutilantibus rigis,
 excrementa alvina & flatus huc ullâ molestiâ hac
 viâ reddantur, per anum verò ne minimum quid
 excretatur, nisi quod primis diebus liquaminis cruenti
 secessit. Ante quinquennium circiter in viciniam vo-
 catus, nolui occasiones ipsam vitandi negligere:
 factus erat, moribus incompensis & vultu torvis
 ligamenta detracta tero madere, & imò hoc po-
 dice palmam supra umbilicum existente compresso
 serum fermentans spumulosum & graviter naret
 feriens, cum granulis hordeaceis & avenaceis auxit.
 Sic viribus valuit, ut ægocia rusticana in campis
 & pratis obiret; à triennio verò, dum in pisci-
 nam suffocatus sese profluit, jussu Magistratus
 vinculis domi custodiret, ubi fila duccendo vitam
 agit. Paroxysmus Epilepticum si frequenter pa-
 tuerit, & sitim extinctus largius bibat; pluri-
 mum aque potet per locum hunc exitu. Jam vi-
 bus fractus & emaciatus haud multum à feri li-
 mine abesse dicitur, quod cum ipso Patrotes und-
 cè vorent.

Intestinalis tunica similes pellicula excreta.

*Clariss. Joh. Melchioris Verdries. Ephemer.
 German. Centur. 1. & 2.*

Interiorum Intestinorum superficiei mucos quod-
 dam viscidore oblitui, nemo Physiologia atque
 Oeconomiæ animalis non plane rudis nescit; at-
 que hunc mucum prænaturali modo in lenem
 duramque pituitam Intestinorum parietes incrustan-
 tem, obducenem, gravissimæque hac ratione sym-
 ptomata producentem, concrescere, plus simplici
 vice solertia rerum Medicarum Observatores an-
 notarunt. Hinc ille pellicula diarrhæa excreta,
 de quibus lumen ac decus viri Excell. *Heliadorn*
nostr. Ephem. Dec. III. An. 9. & 10. Obs. LX.
 Nec adeo ignota est de celeb. *Lippio* historia, qui
 quum molem diu gravi cum malo esset collucta-
 tus, atque pharmaco sumptuo materiam cohercen-
 tem Intestinali similem excrearet, consensatus
 atque aliquid Intestinorum effluisse se ratus, con-
 festim Medicum vocari jubet, actum esse de vita
 sua exelamans; cum tamen te curatius perspectâ
 deprehensum fuisset, esse id ipsum. nihil aliud, quàm
 vicidiorum pituitam in intestinis sensim coacervata-
 tam, eorundemque superficiei coherentem, atque
 hinc Intestinali figuram retinentem, insigni corpo-
 ris emolumento exterminatâ, brevi enim pristina
 sanitati restitutus est. Non multum abissimis
 suis sequens æque procos ante annos hic locorum
 observavi, casus satis profectò curiosus. Videlicet
 Vir quinquagenario paulò major, temperamentis
 cholericis-melancholicis, febri biliosa sæpè graviter
 decumbebat, torminibus eundem simul miris mo-
 dis excruciantibus, ego cum secretis nihil con-
 tentatam, quod ratio officii postulare videbatur,
 brevi meliori loco res ipsius esse cepimus, utro-
 que malo multum à rigore suo remittente. Vix
 tamen id, quicquid erat levaminis, bona spe re-
 pletur.

pleverat adstantes, eum icturus ex improvſo ſuper-
pervenit nova eodem ſollicitudine, decinare. Ego
verò ſectus L. X. V. *Hippocratis* aphoriſmum Lib. I. V.
bonum id eſſe ſignum pronuntiari, atque huic
quoque nodo convenientem cunctum quaſiſſi. Ac-
cidit verò, ut cum Inſulum Anti- Iſchericum laxa-
cium obſculum, poſt dies aliquot me propter antea
acceſſiſſi juberet, cumque mei faciliſſim copiam,
& quid rei eſſet interrogarem / hoc quoque me-
dicamine ſe aliquantum quidem levare dicebat, eo
tamen loci veniſſe ſe ſuas, ut ſatiſ ſit medicamen-
tis abſtinere. Nihil ſpei eſſe reliquum, inteſtina
atque viceria putredine eſſe infecta, (*et ſcy ſaut in*
Leis quod in putredinem in corpore) nec audere ſe
nium Medicamenti continuare, Integra enim inte-
ſtina ſua ſua ipſum expulſiſſe. Ego facile ſuſ-
picabar, quod res erat, atque fruſtra hæc aqua abſta-
re affecti curabam, penitus contemplantur oihilque
eſſe aliud quam ejusmodi pelliculas concretas & ad
conſuetudinem inteſtini figuram accommodatas mani-
feſtè deprehendebam, quamobrem hono eundem
eſſe animo, jubebam, & ut in uſu optimi Medi-
camenti pergeret, ſerò horabatur; ita exeret ſin-
gulis diebus magnâ ſituloſe pituitæ & pellicula-
rum copiam, ex voto tandem convaleſcit atque poſtea
à crebris morborum Inſultibus, quibus ſubinde
antea diveſcebatur, Immunis vixit.

Plura hæc in ſegumento vide in Bibliotheca no-
ſtra Medico- præctica, ſub titulo Colica & aliis;
ut & in hoc ipſo Opere, ſub titulis variorum Tu-
morum, Vulturæ ac Ulecerum.

ISCHIAS.

Iſchia, *Barbaris Schiatica* dicitur, & eſt dolor
vehementiſſimus cujus ſedes non eſt propriè ſui
tempore in eo articulo qui femur cum oſſe inno-
minatò conjungit; ſed alius ad ſummam propè
natem, ubi oervi à lambis & ab oſſe ſacro emer-
gentes in crura ſeruntur, ſæpius ſignatur. Causæ non
multùm diſſerunt ab illis quæ arthritis, item quæ
rheumatismus ſciuntur; Si quidem oritur à ſerò acce-
ſſimò, undeque demùm illud adharuit, quod
pater membranoſas ac nervæ, in quas deſcendit ac
decumbit violentiſſus pangit, ac quali dilacerat.

Hic morbus à multis cum arthritis confundi-
tur, ac pro uno eodemque habetur. Verùm præ-
terquam quod nudi æthnici Iſchiadæ nunquam in-
ſultati fuere, & contra maxima Iſchiadicorum pars
podagrâ immunis vixit; Quæ neſci quod arthritis
nunquam in verum cumque puſulentiam termi-
netur: Iſchia verò ſæpe: Quodque præterea, in
Iſchiadæ, ſicuti in pleſiſque aliis puncturatum dor-
loribus, tumor & rubor oculis perſpicui non ap-
pareant; in a hritide autem contrâ.

Verùm diſcepiationes hæc minùs pertinent ad
inſtitutum Bibliothecæ noſtræ Chirurgicæ, in quâ
præctice præcipue ſolamur, & ad quam pertinet
propriè Iſchia, quaeremus ut abſcſſum quandoque
abit, ut ex obſe variorum morox adſcendens vide-
bitur, poſtquam ſi præmitimus hiſtoricam Iſchia-
diſis facili remediò curatæ à Cl. iſſ. Joſepho Lan-
ſonò, Miſcell. Carſoſor. Decur. ij. Anno 1. in-
ſertam, quæ hæc eſt.

Adoleſcens quidam diu Iſchiadæ laborabat, &
cùm multis ac diverſis, à variis quoque Medicis,
præſcriptis fruſtâ uſus fuiſſet remediis, ruſticum
medicamentum vocavit ad ſui curam, qui offeruit ſa-
lutem ejus ſibi debere ab urtica, di cā locus af-
fecſſus ad rubedinem uſque cedebatur, & vinò albò

generoſo poſtea abſtinetur; quò perſectò ſanatus eſt
non ſine adſtantium admiratione. Tale verò reme-
dium mihi novum non fuit, nam ſimile quid me
legiſſe recordor apud Wolfgang. Heſterum lib. 4;
Hercul. Medicæ.

*Scholium Clariff. Viri Luca Schrak. Luc.
Filii.*

Cornel. Celſus lib. 3. cap. 27. membris paraly-
ticis etiam prodeſſe cenſet, ſummam curam caſ-
perariſſe urticæ exſam, uſque dum rubere ceperit.
Quod num ſali alieni accedine Inſigni prædico, quò
nempe morboſum illud acidum contemperate, &
enervare valeat, adſcſſi meretur, valde hæc,
cùm præteritis nec lingue judicio tale tal in urti-
câ ſe maniſeſcit; illud verò quod ei ineſt blandum
exiſtere per experimentum à Tackeniò in Hippocr.
Chimic. cap. 1. adductum, evincatur. Unde
poſitum in ſpicalis urticæ undique cingentibus, &
acumine ſuo dum penetrat fibrillas cutis nervæ
pungentibus, medicæ cauſam quaeremus; quæ dum
à moleſtis hiſ coſpoculis convelluntur, motum
etiam ſanguinis pervertunt, ſicque unâ ſubſiſcentes
in parte adſcſſa particulas agitare, atque in natu-
ralem motum reducere poſſunt.

*Iſchia cum carie oſſis iſchii & femoris
lethalis.*

Mulier conſpicua Stavienſis atroci dolore iſ-
chiadicò diſturbatur. Varia ac varia à Chirurgia
adhibita ſunt auxiliorum genera; calide effluvia,
emplaſtra validiora parti roborande idonea, ut &
etiam diſcutientia: verùm omniſ ſine fruſtu. Un-
de cùm ego adverterem dolorem per ſomnum augē-
cere, ſepremque ſimul ac indolentem agram re-
zare, poſui in Iſchiâ parte interiore deliteſcere meri-
do ſuſpicatus ſum, illudque ſine apertione inde mini-
mè eſſe educibile. Sed cum pulpoſus eſſet clunia
ille, nec niſi cum ingentiſſimò dolore ſectio pera-
gi poſſet, conſului ut cauteriſ aliqua potentialia
inſibi appliceretur; per quorum ſcſchatam cum ſe-
dio inhi:ueretur, multum puris cum violentiâ eu-
ſtabatur, remittentibus inde urcanque & dolore
& febre. Verùm cum poſ illud per diuturniorem
moram petioſum eroſiſſet, & oſſis iſchii par-
tem carie effeciſſet, ſimulque femoris os non pa-
rum corruptiſſet, ſphacelus ac mors brevi accēſſi;
& doloribus ac viæ ſinem dedit. Ex communi-
catione Clariff. Viri Ananii Drolincurii Remun-
pularum Bernenſis & Friburgenſis Archidivi extraor-
dinarii ac Antiſitis.

Iſchia refrigerantibus ſanatur.

Vir illuſtriſſimus, Bernenſis Conſul, ſtatue pro-
ceræ, macilentus, repperamenti ſanguineo-bilio-
ſo, incidit in violentiſſimum dolorem Iſchiadicum,
quò cùm per dies multos diſtorqueretur, nocteſ-
que informes ageret; urgente præterea ſit, ap-
petitu proſtrato, viſibulque proſus deſectis; Me-
dicus clinicus multa adhibuit remedia externa, olea,
effluvia, ac emplaſtra calida Iſchiadica dicta, ſi-
cutione præterea calidas ac vehementiores. Verùm
ſic non lenitur dolor; quin poſitum in dies exacer-
batur, & febris accenditur. Vocatus ego in con-
ſilium, reperi Virum Conſulem quaſi de ſalute
deſperantem, ac propterea methodum curatoriæ
in illo inſauſaſſa avidus uſurpatam ex affe permutandam

in animum indolui. Clysteres itaque refrigerantes adhibui, emulsiões anodynas propinavi, à quantum vel paritè dosi placidam transigit noctem, cum prius à quatuordecim diebus somno & omni probris requie orbatus fuisset. Hinc fusco balneo aquæ tepide, illudque simplex & nullis medicamentis herbis, quo per dies cunctis octo usus, non neglexit interim & emulsiōibus & clysteribus super memoratis, remittebat febri, minuebatur dolor, cessabat, *Smetra*, viresque in dies refocillabant. Tunc pristinam præscribam laxitatem, diariamque idem morbi ac ægri temperamento accommodatam insinuebam. A phlebotomiâ autem, quia ab eâ summopere abhorrebat Vis illius abstinere coactus fui: Verum hic non minù per curam prædictam intra quindecim dies & stare, & etiam ambulare Vis Consul valuit, indignabundus contra Medicum clinicum mihi gratias dulcissimas agens. *Ex eadem communicatione.*

Ischias Cucurbitulis & Vesicatoriis curatur.

Vis Attenus Bernensis Dux legionis in Cataloniâ militans sub diâ pernoscere coactus, uvidi nocte, sub tegmine sagi homi recubans, primâ aurorâ exasperatus & irrequietus de dolore ossis illi & sacri conqueritur, & vix erectus & stans in pede incedere quirit, unde ubi primùm ab exercitu discedere ei copia dabatur: Monspeliū se consulit, opem à Medicis inibi erogatis, variis autem atque variis exquisitoribus quidem adhibitis ad sanationem remediis, sed sine successu, itaque atroci & perniciâ dolore excruciatu testâ Parisiis tendit.

Ad Medicam dabam confugit æger opem.

Auxilium querit à primoribus ibidem Medicis, diversisque adductis triplici ab armamentario auxiliis, doloris levamen nullum affertur, & sic animo dependenter Nobilis æger, Luteriâ resistâ, patrios latus repetit, longinquæ per iter, officinam quasi dolorem perpeffus, Medicos Poliatros accersit

Solliciti ut villus repetit gladiatur arenam, Et redit tunicas naufragæ puppis aquas.

Auxilium promittunt punctatis manibus temedia, ut ipsi videbatur appropinquatum cum extrema cum interna cirò & diu admoveat, sed incassum iussuque Nobilis patientis à me consiliū exposultant; sed ne crumbem recoquere videret, cirò ad externa præsidia confugio, armaque præferibo ab armamentario Chirurgico desumpta, scilicet himdines, vesicatoria, euseria, aut potentialia, aut actualia, ex feno candente, videlicet ex Hippocratis consilio, ad extremos quippe morbos extrema exquisitè temedia conveniunt. Verùm id consiliū Bernensibus Medicis non aridet, flocci faciunt spondere iterum sanationem aliundè quantam, sed frustrancam, unde æger defatigatus ac tædiosis ab usu remedium non fuit, Vergetigem se consule manus auxiliares meas efflagitans. Idcirco sine mora, convocatio Chirurgo experto, aliquantulâ nobili ægro concessa quiesce, ante focum sedere jubeo, fortibusque frictionibus in regione illi, ossis sacri, & circumstantium partium ad tubedionem detactis, cucurbitulas tres admoveat curo, duas quidem superiores ad illi regionem, tertiam verò inferiorem super osse sacro, quibus post attractionem detactis, himdines applicui farago, his autem sanguine saturatis, crumæque plenis, atque spontè delapsis,

Bibl. Chirurg. Tom. II,

iterum cucurbitulas tres admoveat, removereque toties quoties ichorem à profundo extrahere valent, hinc vesicatorium fonte & perampulum hinc partibus applicari jubeo, ac reliqui inibi loci alii quot per horas, quo detracto vesicatorio, quasi à reterato lacie largo, levum copiosum erumpit, ad uncias ad minimùm duas; levum inquam, saltem atque bile rinctum, hinc linimentum dulce applicatur, atque ab illo fortunato momento erectus æger incedere valuit, libet ab atroci crumæ, atque crassâ die sequenti, equos ad suum latus se recipit, immuniq; à tanto dolore exigit vitæ curriculum. *Ex eadem amica communicatione.*

Ischias lethalis, ubi mense riam perulentum repertum.

Vis incliti stemmaris, Bernensis ordinum militarium Dux, lustrum viæ fatum peragens, Nobilem ducebat spontem Lautanmentem, à mensibus autem nuptiarum aliquot ischiadico dolore molestabatur, consulebarque & Chirurgum & amicos ad doloris levamen, quo paululum sedato, Bernam se recipit cum dilectissima sua conjuge, ibique dolore renovatu opem exposulat à Medicis & Chirurgis, à quorum ope iterum ad tempus dolor obducatur. Verum verò cum revivisceret atrocioreque fieret dolor, accersit à Lausannâ Chirurgum urbem illius incolam, qui junctis manibus cum Medicis poliatris, Chirurgoque pariter illius urbis primario, à xilla pro virili quaestâ admoveat sed sine successu, febris ingratè lenta; dolor in dies acutior exorietur Nobilem patientem, undè nec immeritò abscessum in parte lacitante suspicantur, apertionemque ad exitum materię judicant summopere necessariam, ad quem finem deveniendum, rebus domesticis consultis, Lausannam devenerunt Nobilem ægrum lecto pensili, comitantibus & Nobili Matrōna uxore, & Chirurgis, tum Bernensibus, tum Lausanensibus prædictis; ubi ut consiliū insinere per cliu tam arduo, accersit Genevâ Doctorem Medicum expertissimum, Philosophiæ Professore, suadente Nobili ægroantis fratre D. D. Præfeco Nivindunensis prædicari Doctoris Medicæ Marcenat; convocant & abunde expertissimos Chirurgie Magistros Gallos è quorum omnium unanimi consensu, lectio instituitur à Chirurgo Bernens antiquiore, ad spithame tenuissimè circiter longitudinem & ultra, dilatatoque vulnere ex arte viginti post quatuor horas ex eo aperto, poscunt copiosam; vulnus curandum committitur elinico & domestico Chirurgo Lausannensi: hinc post dies aliquot elapso à prædicto D. Doctore temedia internis & convenientibus, insistentes Nobilem patientem revehant Bernam, eodem lectio pensili, sisdem comitantibus, & Matrōnâ, & Viâ, adponso Domino Doctore Genevensi præfeco, ubi cum degere ego convocatus ante ab simplissimo & Nobilissimo illius Republicæ senatore, accersos à Nobili decumbente ad consiliū intrandum cum supra nominatis viris poliatrisque Dm. Dm. mo aut altero, qui onanissimi conveniunt febre quam dicebant hecticam, à materia tam diu hospitante supra osse ischio, ejusque periosum corrode, doloreque atroce din eximare, originem ducere, in temediosis amibactis intras afusumdis pergendum, ad febris hectice diâ extinctionem non omittit præ ceteris à Dm. Doctore præscripti thei rinctura, extractâ cum aquâ Cichorii stilliticiâ, quâ quotidie utebatur ad laxandam alvum. Ego autem febre illam non hecticam nominabam.

P z 1 sed

sed lentam non à prædictis causis ortam, sed ex abscessu, ut opinabar, in mezentorio latitante, idcirco mandanda fore interna remedia, vinumque tam arde prohibebat ægro viribus fracto concedendum, ut in dies magis ac magis mellefcens, appetitu dejecto, ejus usu refocillaretur, alvulque sponte excrementa expromeret, sollicita à vini bilisque simul aculeis, quandoquidem evacuatæ arte huiusmodi rhabbari tincturâ, pigresceret alvus; nullus autem mecum convenit. Nobilisque æger deiecit se se suis demerari non posse me Medicum Gallum & quidem Patissimum, vini usum suadere posse (quantum non merum dixissem, sed aqua sui decocto appropriato probe dilutum) Præterquam quod si in Mezentorio hospitatet abscessus, de suis rebus actum foret: prædictum consilium igitur prætermittitur, curaque vulneris Chirurgi familiari & domestico committitur; hinc prælaudatus D^{ns}. Doctor Genevam se recipit, nullusque juxta ægriam rem relinquirit quam Chirurgus ille qui tummo mane me conveniebat die sequente, ad invictum D^{um}. decubentem, qui me adveniente exclamabat, bone Deus! quam noctem turbulentam in me excitati, vir amice! Revera etenim amicus erat ille mihi, quem ante annos aliquot à febre quartana vindicaveram: quam ruculentam, inquietam, noctem, bone Deus, excitasti mentionem faciens de febre lenta melerterica ab abscessu inibi latitante? Fallas ist uisum ego respondebam: sed vini usum, aiebat, mihi suadere heclicè laboranti? At veror vehementer dicebam, salva ne sit sententia mea de mezentorii abscessu. Fortè autem fortuito cum Chiræus incomberet grabatæ ad tractandum vulnus, cubito in abdomen patientis relaxato, inelamat subito, heus me occidisti, effluobat quippe sanguis à vulnere, statimque Chirurgus materiam effluentem explians, videt summum cum stupore, pus ubertans à vulnere emanare, premittit tunc manu admodum forti abdomen, regionemque possiduum mezentorii, unde pus ubertim magis ac magis extrudit, hinc me citius accersunt, ægerque tunc inelamat ad me, nunc te bonum vatem, me invito ac dolente, te nominor & respice, inquit, abscessus est in mezentorio, indeque tota ad vulnus confluit materia; cura igitur subito mutanda; traumaticas potiones ad usum revocare, vinumque exhibere, probe dilutum decocto Chini; utantur & decoctis guaiaci, cassia parilla, chine & aliis variis aperientibus & detergentibus remediis; valeantem usui decocti theli sit alvus libera; remittit in dies febris; paulatim redeunt vires; reviviscit appetitus, exiliatur æger; interea per sedes materia purulenta ejicitur, vulnus perfanatur, ac occluditur; statè incipit æger, deambulans scipione nixus per cubiculum, & post menses aliquot à fenest decernit Paterniaci præfectus quo theda devedus dolor utenquo ischiadicus senovatus melerentillique simul labores obtuli, profanatur æger & melerentillique fordes alvus deponit, torisque tunc ac universis cum melerentillis consumptis glandulis, languescit æger moribundus, ac animam Creatori tandem committit. *Ex eadem communicatione.*

ISCHURIA.

Vid.

URINÆ VITIA

JUNCTURARUM MORBI.

DE Juncturarum varietate vide capite de Ossibus, in Bibliotheca nostra Anatomica, idque præcipue ex præclarissimo Dom. Havers, qui de Ossibus tractatum sanè elegantissimum composuit, in quo de glandulis ipsius articulationibus adfixis, setumque pinguis, ad motus facilitatem vomentibus verba facit; à quo sacco degenerare, non pauca mala derivantur. Arthritis quæ præcipuum ex illa, aliæque quæ ex vulneribus, laxationibus, inconvulsionibus ac fracturis fiunt, propriis explicatur capitibus. Hic propterea tantum de apostemate ischiadico digitum, de contractura, rigiditate ac Synovia articulorum, per Curationes & observationes aliquot, pauca trademus.

De Apostemate scirrhuso Articularum digitorum.

Nascuntur circa juncturas digitorum quandoque apostemata phlegmatica seu potius ischiadica, dura, coloris fusci, in quorum circuitu venæ atrolentur: ulcerantia & corrodentia ossa, & ligamenta: cunctantia & morantia sedem, aliquando à membris ad membrum. Illorum causa, rudicia & cura sunt sicut strumatum malignarum & diffusarum per corpus: præmissa purgatione, dila fasciæ parilla, usu aquar. vitriolatar. & aluminosar. carnis viperæ, & serpentium præpar. In principio ingens est tumor oleo de spica, & de lilio, & superponendum emplastrum diachilom treatum. Quod si corripat ea ulcerari, mundificentur unguento Apostolorum & pulvere sphodelorum, vel mercurii præcipit. vel trochilicor. de melle, & si necesse sit arcticum adhibeatur, ut in seraphinis dictum fuit. Si autem os fuerit corruptum, utatur & removeatur ab eo corruptum: nam canterium omnem corruptionem removet, postea vero curatione aliorum vulnereum curetur. *Lib. V^gierius Chirurgia lib. 1.*

Contractura membrorum.

Manuali opera membra contracta si diluci possunt, tunc etsi mobilia non rursus fiunt; quod tamen incertum venit: nihilo secus forma alia illis: quæ minus in motu impeditum afferri, accommodari potest. Ut si digiti extensi stantur, tunc si contrahant paulo minus in apprehensione incommodantur. Si pes futurum tractum hæret, ad terram usque retrahatur, etsi articulus genu fixus maneat, tamen interstium, qui prius sublatu erat, seltituit.

Hoc autem manibus, vel instrumentis adhibitis, non magis vi, sed sensim in dies aliquantum impellendo, successo tempore, attrito, tendens & ligamenta ita magis magisque relaxando, in quibusdam locis aliquando se possumus efficere. Idque præ membri contradi ratione, variis modis. Ut si propter genu articulum fixum, ut sepe fit nervosum tractus sit, caleo induto, & alibi nulligato, contrinno dum sedent & aliquid agunt, & com detrahendo; vel pondere appenso saepe cum depimendo. Quod & eleganter perficitur, si laminis distabus oblongis, in medio cavis, tibie & coxæ posteriori sedi accommodatis, & juxta articulum junctis intersposita cochleæ, cum invertendo quardam festo

ferre potest, pes è superioribus deorsum sensim prope-
llatur. Uti & in aliis locis, eadem ratione co-
chlea strata habente, commode perficitur: cum si ve-
ratur, sensum ea quibus inferior prementio mem-
brum fixum impellat, & cum cochlea inversa sic
in mora maneat, eodem membrum quousque pro-
trahit, sustinet & retinet. Quod ego in multis cum
succellu, ingeniosè fabricatis instrumentis tentavi.
Sicuti quoque, si digiti nas extensus maneat, annulo
illi infesto, qui alio annulo, vicino digito adhibito
coniguus & affixus sit, dum hæc digito moventur, al-
ter fixus continuo impulsus, tandem cedere & flexi-
bilis cognitur. *Felix Platerus Prætor Medicus
lib. 2.*

De Cubito rigido, immobili, subito curato.

Ea incommodo, quoties in arte Chirurgica com-
modum aliquod relinquit & Chirurgus & ægotam
quodam anxia suspicio præbetur, evenit hoc in Helvetio
filio, cujus hæc verba meminit Hildan. cent. 5. obs.
89. Helvetius quidam adolescens Laufannæ studiis
datus operam, ea arbore cadens, brachium sibi ad
carpum fragit. Ego in consilium adhibitus fractu-
ram feliciter sanitati restitui.

Ante annos autem aliquot contusionem talem cir-
ca carpum ejusdem brachii ea calo quoque contrax-
it, ut eo tempore manus veluti resoluta & im-
potens permaneret: postrema autem curatio tam felici-
ter successit, ut manus penitus in integrum resti-
tuta fuerit, causam hujus sanationis hanc esse, mihi
videtur: Primum affectus sive contusio carpi, cum
ab imperio male curata esset, & imprimis plurima
medicamenta refrigerantia applicata fuissent, materia
quædam viscidæ inter ossa carpi remanserat, quæ
post fractum brachium, ab humore affluente veluti
intortata, emollita, & escalcata esset, postea me-
dicamentorum emollientium & resolventium, à me
summa, qua fieri poterat diligentia exhibitæ bene-
ficio, resoluta & dissipata fuit. Quæ calciosa no-
bis videtur, frequenter commodum maximum as-
ferunt.

Petrus Jacobi Amstelodemensis anno 1661. utrius-
que brachii laboraverat aliquandiu abscessibus, ul-
ceribusque, citra articulationem hærent & ulnæ,
Chirurgus, quo usus fuerat, ad veram eorum fi-
guram, convenientemque usum haud attendens, non
inequivoca sed rigida ea reliquerat, unde ori ali-
quid ita admoveere impossibile ipsi.

Cura nostræ obi subjectas, Fomenta varia, Ca-
taplasma, Emplastrum, applicata, diversæ brachio-
rum fricationes, extensionesque institutæ, ast nihil
hæc omnia effecerunt, nec humor glutinosus articu-
los fere accedens, nec motus articularis, articu-
lorum motui dictus, ullo modo resolvi po-
tuit, ut mobilitas aliqua adfectetur membris
dictis.

Cûm ori admoveere quod haud valetur, co-
chlea ipsi parati curavimus similiter ac coltrum eade-
dem longitudinis. Quid sit, penis dissecti particu-
lam cultri apici imposuimus ori admoveere laborans, ea
privatus, procidens enim in terram à cane præfente
asulserat, itatus ille pedibus percussit canem dum
laborat, in humum prolabitur, hoc ubi sit, eo quod
brachiorum nno resistentiam pavimenti lapidei per-
ciperet, soluta materia ad dictum articulum hucuf-
que detenta, & quod hæcenus rigidum immobileque
fuerat membrum, ex improvviso mobilitatem debi-
tam acquirit, sic ut eo ad modum pristinum uti
posuerit.

Joh. Henrici Wolvegad, bajulus, ea violenta ca-
tena pedis utriusque fracturam non solum, sed oen-
niam commotionem contraxerat. Hujus cura-
tio nobis committitur, quæ etiam ea voto successit.
Ex leso surgens, non modo fracturam dictam cura-
tam notavit, sed & herniam intestinalem inventam,
ad ejus tamen curationem nihil à nobis adhibito.

Plura hæc facientia qui desiderat, quomodo nempe
ea incommodis commoda producat, adeat Fabr. Hildan-
um part. 1. obs. 29. & part. 2. obs. 8. *lib. à Adreken in
Observationibus Medicæ-Chirurgicis.*

De Synovia.

Synovia nihil aliud est quam liquor chylosus nu-
tritus in parte vulnerata digerentur in liquorem fa-
niosum & aquosum, sub quo degeneratione acorem
occulum contrahit, & cande vulnera istarum partium
insigniter contumacia ac simul periculosa sunt
partes vero illæ interea, dum destituntur con-
venienti nutrimento, necessario arcescunt. Unde sibi
exsiccatæ & contractæ poros partis interinos angustant
eosque connivere, seu quasi lubidire facient. Itaque
sanato licet vulnere nihilominus tamen difficillime &
tardissime pars denuo nutrirî potest, quin potius sarpus
perinax aut contumacia ariditas fræquat. Quin & cûm
debilitata dicto modo pars minus robusta sit, atque
alia ipsi respondens, (id quod robor inæquale vocat
Helmont.) propterea facilius ac sensibilius fere exte-
riorum objectorum impressiones recipit, unde tales
ægrî restituti licet, tamen quavis ætatis mutationes in
loco antea læso mox patientiunt.

Ut autem hæc Synovia, periculosum sane vulne-
rum in partibus tendinosis articulationum symptoma
compescatur.

℞. Oleum, nempe testatur, ʒj cranii adusti,
ossis leporis, mandib. laci piscis calcinat. an. ʒij. Ipodi-
teris sigill. an. ʒij. quæ mista inspergantur: Sic nam-
que cito evanescit.

Optimum quoque est unguent. fusc. Wurtzii, quia
tamen præparatio est laboriosa, & propterea difficiliter
potest parari.

℞. Loco ejus vitriolum toties calcinatum spiz
vitr. dulc. speciatim ex vitrioli. marr. & dicto modo
cum hoc procedatur atque vult Autor; nempe im-
mitantur in acrum destill. quoddam vulneratum
& ita addatur mel, flores æris, sicque porro mist
ceantur.

Vel ℞. Unguent. Egyptiac. simplex, & adde ter-
ram vitriolatam Dulcem in aceto destillato dicto per-
mixtam, quantum postulat ingredientium proportio,
hæc potest esse loco unguenti fusc. Wurtzii, & un-
guent. Egyptiac. magist. compos.

Aliud singulare experimentum est, si sterus potu-
m cum sanguine vulnere foveicæ mistum coquantur,
& ita vulnere externe applicetur ista cataplasmatæ
hoc enim compescit synoviam.

Quin & linteum sanguine primo menstruo virgi-
nis tinctum humidum sive serum applicatum certi-
ssimum habetur remedium ad compescendum syno-
viam. Polychrestum est si destilletur aq. ex caner.
fluvialib. contusa: hæc enim cum lineis duplica-
tis imposita, non tantum synoviam sistit, sed præ-
terea omnes inflammationes, erysipelata, dolores
partium vulneratarum; ac NB, quod canceri flu-
viatiles maleum prolant in casibus Chirurgicis. *Michael Emmertius Collegii Trajecti parte 2. cap. 1.
Item in Chirurgia Medica.*

De Synovia Vena sectionem infansam in brachio factam subsequente.

Victori nostri oppidi Barbarossæ venam mediana Balnearor scalpello vehementiori cum talino adacto pertridat, tandem mulculi incipit subiacente simul læso, quod ipsum sicuti ab imperitis Chirurgis sepius magno cum ægrotum periculo fieri jamdudum notavit Adrian. Spigellius lib. IV. de humani corporis fabrica cap. 15. ita eventus in dicto Victore comp. ubavit; is namque primo detrepente brachii stuporem perpellus est, quem paulo post redeunte lenitate, dolor insignis & inflammatio excrevit, post elapsam autem triduum ichor flavescens, sive melicæria aut synovia Paracelsi, ex labiis vulnuseculi intumescit atque ex pallido livescentibus emanare cepit, cujus fluxione ultra octiduum in notabili copia petennante, miser victor in febriculam continuam ac rursus corporis atrophiam manifestam cum inappetentia & vigilis continuis incidit, frustra interea à balnearore, quem cum Terentio imprudentem harum rerum ignarumque omnium merito dixerò, unguentis emollientibus plingitibus divexatus. Vocatus igitur tandem ego in consilium, exhibitis prius ægro medicamentis internis convenientibus, pulverem stypticum ex sanguine draconis, boln armena, mastiche, rad. bistortæ & flor. rosar. rubrarum concinnarum cum albumine ovi exceptum Venæ sectæ admovi, quo facto mox Synovia immixta visa est, at cum labia vul-

nusculi unionem admittere adhucdum renuerent, illis ad p. optorem contactum adlatis Emplastrum sequens admovi, quod ubi per 24. hora um spatium affixum permansisset, desit emacate Synovia atque consolidatio ex voto successit. En plastrum tale erat prescriptum.

℞. Empl. de plumbo ʒi. diapsim. ʒij. Pulv. bol. armen. ʒiv. M. F. Magdal. trad. chart. ingerat. lgr. *Postea cum brevifera Gebrauch.*

Scalpellum, quo similis usus est Balnearor, notatibus communiter dicitur *eine Fluse* frequentissime olim in universa Germania, & hodie in quibusdam locis, propter vanam securitatis melioris persuasionem, nleatum, idemque depingitur à Bottallo in Tr. de modo incidendæ Venæ p. 94. ac verbis defenbitur sequentibus pag. 87. Auroreis *iniquen* simul continentibus Scalpellum aciem habet ad imum spectantem & manubrium, quod inter indicem est, pollicem ministræ manus, dum pullanda vena & prehenditur, & accommodata acie obliquo modo super locum venæ eminentiorem, dorsum ejus vel pollice illiditur, vel adverso medio vel indice digito taliter intro pulsatur. Quod instrumenti genus & utendi ratio non admodum approbata sunt: eo quod in ejus usu fallacia multa sit, & periculum non exiguum ferendi nervi, aut tendinis aut arteriæ, si venis tundendis hæreant; propterea quod ad unguem nulla repentina impulsio moderata possit. *D. h. Mauriti Hoffmanni.*

Quædam rursus hoc in argumento videri possunt sub titulo *Artenli*.

Finis Libri IX.





